







OBSERVATIONVM ET CURATIONVM MEDICINALIVM.

Liber Decimus sextus,

DE

PECTORIS PVLMONISQVE
Viti ac Morbis.

PETRO FORESTO A CMARIANO, REIPVB. DEL-
fensis Medico, Auctore.

M. Foresto

OBSERVATIO I.

De tussi ex frigida & nulla intemperie.



VM aquilonia constitutus
se, vir quidam hyeme ven-
redum iter faceret, tussiq;
molesta correptus est, et
non valde violenta. Hic vo-
cum auxilium a me petit,
in mentem mihi venit ex de-
cassus sympt. licet Gal. tussis,
quandoque fieri scriba ex refrigeratione in-
strumentorum respirationi: ab eodem quoq; ab-
temperantiis eorundem instrumentorum fieri pos-
se non negari: namq; cum non de malignis tussibus
(quas Hippocr. aridas, aquarum seu leuiter irritan-
tes, tum eodem sexto de morbis vulgaribus, in
aphor. 54. 4. lib. appellat) simonem faceret, eas
ob faucium, arteriarum asperitatem, aut instru-
mentorum spirabilium intemperiem oriri asserit: qui
intemperiem interim frigidam esse testatur, ut potest
in aquiloniis constitutionibus, in quibus Hippocr.
aph. 5. lib. 3. tussis ac fauces excitari assererat: non
propter aliud (ut Galen. fateatur commen. eiusdem aph.)
quam propter instrumentorum respirationi obser-
uentium intemperiem, & propter faucium asperi-
tatem: aer namq; admodum frigidus inspiratus in-
terdum faucium asperatq; arteriarum locos exasperat
atq; refrigerat: nonnunquam & toto pulmoni pec-
toriq; intemperiem affert: sapius vero & ambo
hæc contingunt: quapropter ex his arida modica-
que rufficula (ut huic viro euenit) vexantur, quod
quidem cognoui ex signo ab eodem Galen. sic de-
scripto: Cum ager spiritum attraheret, ad tussim prouo-
cabatur, potissimum cum multus subito aer, ipsi loquens
ac oscitanti, ac ore spiritum ducenti intraret, sed cum pe-

nares aerem extrinsecum attraheret in adibus calefactis,
tunc omnino parum aut nequaquam tussiebat. Ideo nos
consulimus, ut in domicilio calido versaretur, &
vini dulcis calido potu vteretur, partesq; pectora-
les lintheis calidis muniret: nam & animæ retentio,
pedum calor & capitis, sufficienti remedio aliquā-
do esse possunt. Si vero ex inæquali dūtaxat intem-
perie ortum ducat: frigida ea existente, per calefa-
cientia emendamus, ut inquit Aet. Hæc inquam tussis
(modo non valde magna fuerit) ex spiritus co-
hibitione, iuxta Gal. sententiam 2. de caus. sympt. curari
poterit. Quamobrem huic ægro inhibuimus frigi-
dam inspirationem, frigidum quoq; cibum ac porum:
& ut in calidis locis versaretur, imperauimus, & ut
calidis cibis, tum potibus vteretur: & summatim,
ut thoracis partes a frigidis defenderentur, ac cali-
dæ seruarentur, prius vnguento infra scripto inun-
ctæ: ℞. olei chamomil. anethini, amygd. dul. lilior. an. ʒ
ij. pinguedinis anseris, gallinæ, butyri recētis, an. ʒ ij. misc.
zaccharo etiā enulato utebatur: & breui cōualuit.

SCHOLIA.

CVm in hoc libro recte proposuerimus agere
de pulmonis & ceteris thoracis vitiis, æquum
est, ut omnium primo de tussi agamus. Hæc enim
cum omnibus vitiis ac affectibus pulmonis & tho-
racis fere semper copulatur. Ut in sternutatione
cerebrum, in vomitu ventriculus, quod noxium
est, cōcitato quodam naturæ impetu expellere co-
nantur: ita in tussi, partes thoracis simul insur-
gunt, concutunturque musculi, ut vel quæ car-
ni suæ molestæ sunt, in pulmonum arterias expel-
lant, vel quæ in aspera arteria præter naturam con-
tinentur, foras eiciant (non per contractionem, sed
confertim emisso per eius interiores ductus, pluri-
mo spiritu, haud secus ac si quis, quæ in fistula
cavitare hærent, efflatione vehementer expurga-

re velit) siue humor aliquis impactus fuerit, vel corpusculum, vel intemperies liberum spiritum prohibeat: vel compressio diaphragmatis a tumore, &que causæ id præstent: de quibus postea latius. Et si tussis est motus instrumentorum anhelitus, a virtute animali motrice, qua natura intendit expellere, quod in trachea arteria lædit, vel in propinquis membris. *Opifex sublimis*, inquit Galenus, *duplicem motum in animali constituit, ut contraria expellat, alterum sternutationis, alterum tussendi.*

4. Quædam animalia tussunt, quædam nunquam tussi vexantur, veluti boues: quoniam, *ut tradit Aristoteles*, humoris materia his extra saluari fluxu effertur. Tussis itaque, quam Græci *βήχας* appellant, pertinet ad genus deprauatorum motuum; non a natura, sed a morbosa causâ violenter facta. Est duorum generum, *iuxta Galenum 2. de causis symptom.* quorum vna est vehementissima efflatio, qua plurimus spiritus celerrime foras erumpit, ad quam pertinet vehemens & magna tussis: quales tusses fiunt ex destillatione a capite in asperam arteriam atque pulmonem, *teste Aetio cap. 54. libr. 8.* quas tusses malignas & contumaces appellabat, *Paulus cap. 28. libr. 3.* Aliud genus est, de quo iam exemplum posuimus, non adeo violenta, neque coacta, sed exigua, *ut Galen. 2. lib. de caus. symptom.* etiam testatur. Priorem autem sequi volunt morbum in via, nempe obstructionem viarum spiritus, quæ quidem valida est, vehemens, ac violenta, nec suppressi, seu prohiberi potest omnino ne eueniat, vide de his 4. *de loc. affect.* Alteram vero, exiguam scilicet, sequi voluit intemperiem frigidam aut calidam: Trallianus addit, siccam & humidam: alii, *ut Donatus*, humidam cum Galeno non admittunt, eundem ad longum videas. Alii vero symptomatis causas, id est, morbos, multi generis esse volunt, *ut Iacchinus*: Primum, repletionem arteriarum pulmonis, quod est frequentissimum, estque ea obstructio ex puluere & aliis corpusculis, quæ mordicant. Secundum genus apud eundem est intemperies inæqualis, quamquam & humidam prorsus molestia carere vult, quibus additur & vitiosus humor. Tertium genus ad asperitatem reuocat, quæ ex siccitate ortum habere potest: & est vitium in tunicis: aliquando in summo gutture solium, vel in tota arteria ex causis branchi, fit & ex asperis corpusculis irrudentibus cum aere. Galenus hoc genus reducit ad obstructionem: sed Iacchinus potius ad noxam partis ad superficiem: quam natura lenē fecit, propterea quod in asperam impingit spiritus, non in lenem. De hac Galenus *1. de differen. morb.* cum dicat tusses excitari ex faucium asperitate. Exasperant & acres humores, & medicamenta extergentia, *2. de caus. morb.* Cuncta ver quæ exasperant, dolorem faciunt, & continuu soluunt. Quartum genus mordicatio est, & omnino dolor partium: & videntur omnia ad vnita solutionem reduci. Siue enim ex asperitate, siue intemperie dolor excitetur, seu ob morsum humoris influentis sponte, ut in destillatione, vel extrinsecus, ut pipere, euphorbio, oleo præsertim ac. Hæc enim omnia eadem ratione tussim videntur

efficere. Sepe igitur vnus ex morbus est, qui tussim facit sæpe & variè iunguntur simul, quia & ab vno eodemque principio & causa, varios gigni affectus apparet. Partes autem quæ in tussi afficiuntur, secundum aliquos, sunt inspirationis organa, præsertim thoracis musculorum (*ut dicebat Iacchinus*) in hac re multum lorât Sophistæ, parum vero possunt: quoniam nec definientes, nec distinguentes omnia confutunt. Si de symptomate solo queritur, parum vti est questio, quoniam ipsi primo non debetur ratio, nisi ratio, cum causâ & morbi rationem obtin. Ideo musculorum pectoris motrix est, quæ symptomate afficitur. At tussis ad medicos aliud quoque significat, quod nomine accidentis significatur, & cui remedia adhibentur: & sunt quatuor morborum genera iam dicta: quibus curatio ebetur, quorum sedes requimus. Hic ergo non vnâ partem lædi videas, neque no modo: Aliando enim membra respiratorii deseruiencia, ex se læduntur, ut musculi, septus pulmo. Aliquando solum consensu quodam, cum ipsis læsio propria non sit: ut cum iocinoris gibbi phlegmone laborant: aut cum gula læsa est: nationi iuncta trachea, in consensum eam trahit, & tussim facit, similiter & cum fauces mordentur extrinsecus vel intrinsecus aliquo irritamento. Cum vero proprie afficiuntur, queret quis, num semper pulmo afficiatur. Videtur autem Galenus dicere, aliando musculis pectoris moueri, ad noxam propriam intemperiei pelendam, *2. de sympt. caus.* Experientia tamen monstrat, quod nisi affectus pulmonis aliquo modo communicent, tussim non faciunt: confossi enim latussunt: propterea quod animæ decidit & pulmonem tangit: aut medicamenta, quæ iniiciuntur. Sed cur tussis sicca in pleuræ accedit, cum pulmo adhuc non repletur? Si nter & tumores, qui in externis partibus thoracis eueniunt, tussim non faciunt. Contra vero statim, ubi aerem frigidum multum inspiramus, aut pie aliqua pulmonis arthente lædimur, fit tussis: idem motus ille pectoris, ut seruit in respiratione, in expurgatione acribus pulmonis seruire videtur. Igitur obstructio asperarum arteriarum pulmonis tussim facit: & vulneta & morsus circa eas parit, & intemperies visceris. Aer enim in simplici illo, & extrinsecus aer pectus refrigeret, certum est quod illam frigidam ad pulmonem quoque velocissime peruenire. Quamuis vero per motum hunc intendat natura expultrix noxas pellere, frustratur tamen sæpe sine suo. Cuius ratio est varia: prima, quoniam nihil aderat obstruens corpus, quod expelli posset: sed intemperies, vel vlcus, vel affixum tuberculum: & dicitur tussis sicca. Secunda causa est, quoniam mater est rebellis & contumax, non cedens impellenti, ut cum viscida nimium est, & hæret, aut crassa, quæ non facile per minores arterias præterlabi possit. Tertia, quoniam a spiritu dissipatur, dum impellitur ob tenuitatem, quod accidit in aquosa & tenui destillatione: Hæc ex primo epid. 4. de tussi arida Iacchinus quoque sumit. Sed nunc aliud exemplum proferamus.

Quæ pars in ea afficitur.

Tussis.

Affectus quæ

Duo genera tussium.

Quem morbum facientur.

Tussis causa, id est, morbi sunt multi generis.

OBSERVATIO II.

Tussis ex intemperie calida.

1. **S**icuti enim ex aere circumfuso frigido tussis generari possit, ita quoque ob vehementem aestum, immodicamque ariditatem a circumfuso aere tussis oriri potest, quod iuueni euenit post deambulationem in sole: qui cum etiam cibus calidis piperis conditis usus esset, asperitatem tracheae arteriae incurrerat, & arida & exigua tussi afficiebatur, qualis & in febribus aliquando euenire solet. Contrariam igitur huic victus rationem superiori praescripsimus, tum medicamenta aliaque omnia ad frigidum & humidum vergentia, cum huic siccitas quaedam permixta esset. Dedimus autem ptisanam cremorem, lenientesque cibos tum potiones, propter asperitatem, syr. pap. de iuiubis cum mucag. gummi tragac. Arabic. extract. cum aqua ungulae cabellinae, sem. cotoneorum. Et gargarisma ex lacte & elect. diatrag. frig. oleoq. viol. & amygd. pectus inunxi, quibus & hic breui restitutus est.

SCHOLIA.

2. *Causa tussis.*

Frequenter tussit homo pluribus de causis, ut in scholio praecedente dicere coepimus: a sola intemperie, alias frigida, alias calida, siccitate tracheae, unde exasperatur, vel si quid in eam fortuito inciderit aridum aut humidum, quoniam nihil aliud praeterquam spiritus ingreditur. Offendunt extrinsecus nix pota, aut aqua gelida, vinum item, aer quoque, & quae frigida pectori imponuntur, ferrea vel plumbea, quibus vocis studiosi vtuntur, aut nimium calefacientia exsiccantiaque, qualis fumus & calx: vel iis qui aurum & argentum ex metallicis facere arbitrantur, continuis venenatis vaporibus pectora replentur: cuiusmodi & puluerum genera hinc lapideae facile tussi afficiuntur, tum alii praedicti, & plurimi horum suffocati sunt. Causae vero horum affectuum sunt expositae fere. Nam obstruentes dictae sunt, destillatio, tuberculum, & quae extrinsecus in arteriam incidunt: quaeque intemperiem faciunt, externae sunt: quae exasperant, siccantia multum & extergentia, ut pulueres inter respirandum attracti, sitis nimia in febribus, ita & in acuta, aut pestifera febre, vel frequenter in pueris, cum boia vel papulis laborant, non sine contagiosa febre, tum enim antequam pustulas emittant, asperrime tussunt. Tussunt & hepatici, hecticique quam importune, quoniam tussis lomaum auferit. Addit Hippocrat. 6. Epidem. libr. 2. in eo aphorismo. Siccæ tussis ex cibus & potibus exasperantibus, cuiusmodi sunt austera nimis & acerba: quae etiam mordent, aut acria sunt intrinsecus incidentia, ut acetum, oleum verus rancidum, piper, euphorbium. Sapor enim acutus aut acetosus tussim excitat. Ex destillationibus nihil magis & frequentius, pituita autem liquida, aut crasso phlegmate, cum in pulmonis tramitem destillauerit. Fit quoque in his, quibus exesa est columella, vel diuisa: a compressione septi transversa, ut in tumoribus hepatis arida tussis: a liene quoque, vel a tuberculo innato in aliqua parte tracheae arteriae vel pulmonum. Actum quoque fieri vult ex lumbricis stomachum infectatibus, & acri humore ipsum perturban-

te: similiter & in his, qui stomachi morsum sentiunt, sed potius circa gulam irrationes a quacunque causa fiant: quibus Iacchinus adnumerat vermes in pueris: quam causam cum quidam scripsissent, Galenus nec negat, nec probat, dicit solum, eum non scripsisse, num ita fieri experientia an ratione compererint. Sed ipsi (inquit Iacchinus) loquebantur de ore ventris, quod non communicat arteriae: nos dicimus de gula, quae illi iuncta est, & experientia id monstrat fieri aliquando. A materia igitur fit, cum aliquid in arteriam dilapsum est, siue sit humor, siue corpus aliquod, ut mica panis, potus, aut aliud quoddam humidum, ut sanguis, pituita, a capite, ut in catarrho, aut acri defluxione: a materia, quae in pulmonem, vel in thoracem, vel tracheam arteriam, ut a serosa humiditate, quae in spatium resudat, sicut in hydropo: vel a tenui materia, quae ab inflammata membrana resudat, ut in pulmonis inflammatione, quando materia in asperam arteriam resudat. Plura de causis videas apud Benedictum Fauentinum praepceptorem meum in sua magna Praxi. Tussis praeterea alia sicca est, alia humorem continet, alia recens, alia vetusta. Celsus in duas tantum differentias redigit in humidam & siccam. Verum haec omnia exemplis clariora euadent.

OBSERVATIO III.

De tussi ex destillatione acri orta.

Quoniam igitur tussis non vnam, teste Tralliano, sed multiplicem causam sortita est, conuenientiam nos omni studio eniti, ut causam eius effectricem intenoscamus, discernamusque. Nam apud omnes hoc in confesso notumque est, contra internotionem non posse recte curari. Exemplum autem paulo ante attulimus de nuda intemperie calida: qui autem eam sentiunt, aerem frigidum respirare desiderant, iuuanturque magis aeris inspiratu, quam aquae potione: & facies rubicunda magis & caput apparet. Quod si igitur sola adeo nuda qualitas (ut in praecedente) fuerit: nihil pene aut nequaquam exspuunt, sin autem exspuunt, sputum falsam habet qualitatem, aut fumosam colore, aut leuiter biliosam, idque modicum admodum & tenuae apparet. Nihil vero minus etiam ex his, quae praecesserunt, hoc fieri potest, nempe in solatu magna parte, balneis calidis, victuque calefaciente. Tales, ubi materia acris ex iisdem causis praecedentibus coaceruatur, in destillationes acres incidunt. Sic domina illustris de Abbenbroeck, filia Domini de Bergen, cum fluxione tali acri laboraret, & ex destillatione rimas & pustulas quoque in lingua haberet, ut lacte tepido gargarissaret, iussi, & ut praesumpta cassiae 3j. cum decoct. hordei mundati, viol. glycyrrhizae 3ij. & mandauit, ut syrup. viol. papau. cum decoct. hordei mundati, sem. 4. frig. maior. malua sumeret, & diatrag. Deinde etiam & illa, quae ad tabem conferunt, ut puluerem Haly contra phthisin. Haec enim tussis, etiam si initio levis est, facile in tabem transire potest. valet & his diacodion iuxta Galenum, ut fluxio in principio inhibeatur. Postea etiam dedi loch de pino cum syrup. viol. papau. iuiubino, & similia. Pro cibo utebatur luteis

Observationum Petri Foresti Med Alcm.

ouorum, gallinarum alis, testiculis gallorum, piscibus dura carne præditis, tum aliis a Tralliano descriptis, pro iis, qui ex tenui & acri fluxione tussunt. Quibus remediis hæc & curata fuit: quemadmodum & vxor mea Eua Teylingia, mihi carissima: quæ sub noctem, cum pauca materia adesset: ex acri fluxione tussiebat. Cui deglutendum exhibui vitellum oui crudum, cum zaccb. cand. quod cum in introitu lecti ter quaterue deglutiisset, ilico in principio tussis cessauit, neque aliis remediis opus fuit. Prætor Reniburchius, cum de tussi mentio fieret, dicebat se omnem tussim curare pomo excauato, & melle rosato impleto, supra prunas viuas affato & sub noctem deuorato, quo seipsum semper, tum alios plurimos a tussi curasse iactabat.

SCHOLIA.

Tussis licet ab omnibus & visu & auditu, teste Aristotele, percipiatur: attamen a quib. causis oriatur, id non omnibus, sed medicis peritis, per signa quædam innotescit. Ideo diligenter æger percunctandus, quibus de causis tussire inceperit, vnde & signa specialius distinguimus. Si ex nimia caliditate, tum in parte pectoris aut capitis, feruor quidam facile percipitur, cum siti & faciei rubore, tum aere frigidus gaudet, pulsus magis excitatur. Si enim ab intemperie calida fuerit, necesse fuit præcessisse causas externas, vt in duabus obser. præcedentibus ostensum est: aut saltem præcedentes in corpore, vt febrem ardentem, calfacientem. Si adsit simul materia calida vel destillatio acris, ea quoque facile dignoscetur ex iis, quæ de distillationibus acris, & de raucedine diximus. Ex frigida vero causa signa iis contraria apparent, pallor faciei, frigiditas capitis sine siti, cum & calida prodesse sentiuntur, salua aut aquosa est aut acetosa, & victus ratio his subscribere creditur: Acidum enim, inquit Trallianus, magis quam amarorem sentiunt, neque salum exspuunt. Præcedit hos potius frigiditas, quam ardor solis: item intemperstiuorum balneorum, potuum, & ciborum frigidorum usus. Si autem materia admixta, & quis sit humora capite destillans in fauces, asperam arteriam, in pectus, vel pulmonem, & ex iis, quæ de destillatione & catarrho diximus, numquid lentus, viscidus, pituitosus, bronchiis infixus, vel acris, mordens, salus, vel tenuis, vt aqua, etiam ex sputo cognoscemus: Si a bile, erit citrinum, subrubeum, aderit amaritudo oris, sitis, tussis, molesta, magisque sonora. Si ex sanguine vel plenitudine, facies rubet, venæ tenduntur, pulsus grauis est & mollis, sputum rubrum cum dulcedine oris. Sic si a pituita sit, facies albescit, sapor insipidus, aut salus, sputum album, viscidum, aquosum. Sic tussis a sola intemperantia sicca est. Si ex materia, quæ a capite fluit, vt coryza siue grauedo indicat. Si in pulmonis vias defluerit, spirandi difficultatem facit, febrem inducit. Hinc si ab obstructione sit, erit vehementior & magis impetuosa, & si signa alia destillationis adfuerint circa fauces, nares, oculos, vel etiam totum caput, aut sonitus aliquis sentiatur in pectore, certo id significatur. Si ab asperitate, causæ exasperantes aderunt vel præcesserunt. Si a morfu, iam

dolor ipse manifestat, & eo magis aliqua causa certi sumus. Si non sit afflicta, us obstructio, moderatiores tussis sunt. Porro tussis, quæ ex influxa materia superueniunt, ea re innescunt, quod copiosa exspuantur, sed ex quibus particulis materiæ transmittantur, distinguendum, num a capite. Tunc enim irritationem quandam in vna vel aspera arteria concitari necesse est. Si ex inflammatione pulmonis, ex spirandi difficultate, febre acuta, lingua scabra, genis rubris & sensu grauitatis, vt latius de pulmonia dicetur. Si biliosum exspuatur sine grauitate & angustia, ab erysipelate pulmonis. Si strepitus elidatur cum grauitate pectoris, ex pectore. Et si a pleuritide, signa huius præcesserunt. Si ab vlcere vel tabe, huius signa quoque aderunt. Ita si tuberculū sit in pulmone, accedet angustia maior & spirandi difficultas, modo subito, modo paulatim: nihil exspuet. Strepitum aliquem aut stridorem sustinebit: quæ euenire nequeant dum pituita incocta sit & nondum reiciatur. Si autem æger angustiam subito citra molestiam febris sitimque multam percipit, stridorem autem quandam cum tussi experitur, interdū etiam humoris educationem; crassum viscosumque in pulmone humorem contineri, & ex capite, aut alia quadam particula, eo cōfluxisse liquet. Caput vero materiæ thoraci influentis causam existere, inde manifeste cognosces, quod irritatio quædam & gargarismus circa vnam præcessit. Si ex ulceratione, ruptura, erosionem, propria habebunt sua signa. Si & vitio stomachi, tussunt in crapula magis quam in fame. Ex abscessu iecoris, lienis, ex propriis quoque signis. Vir quoque ex Tralliani historia (vt antea quoque mentionem fecimus, cum de lingua loqueremur) calculum exquisitè figuratum exspuit. Meminit & Galenus aliquem non calculum, sed grandinibus similia exspuisse. Causæ itaque præteritæ, vt & externæ, ex relatu ægri & assistentium facile habentur, ex iis quoque, quæ præcesserunt siue a puluere, fumo, cibo, potuque aut aliis rebus ortæ. Internæ ex intemperie & materia abundante, tum ex iis, quæ diximus, cognoscuntur. Quæ per essentiam sunt membrorum spiritualium & maxime pulmonis, habentur ex continua & laboriosa tussi. Quæ vero per consensum a toto post febrem consequuta, cuius augmento augetur, & diminutione diminuitur. Si a capite per catarrhum dignoscitur, ex signis catarrhi, defluentis modo per tracheam arteriam ad pulmonem, qui cum per nasum exire deberet, nunc in pectus defluat. Si ob splenem, hepar, ventriculum, aut ab aliis membris, id læsiones & dolores eorundem indicabunt, tum signa ex propriis locis petenda. Signa autem præfagientia tussim, sunt corpora pectoris minus lata, collumque longum ac humeri eleuatos instar alarum habentia, debilia: & cæcerebrum debile sortiuntur, malique regimilis, senilia, tempore hyemali parata sunt ad tussim. Vbi æstas aquilonia, sicca, autumnus pluuiosus, aut strinus, tunc in hyeme, teste Hippocrate, tussis exspectandæ: & tempore boreali: quemadmodum & austrinum liquefacit borea subsecente, tunc

5.

Ex fluxione capitis.

Ab inflammatione pulmonis, vel erysipelate.

A tuberculo in pulmone contracto.

6.

Indicia viscosi humoris in pulmone.

Historia de viro qui calculos exspuit.

7.

Signa gientia

tunc

Signa.

Ex causa calida.

Ex causa frigida.

Signa materia vel humoris.

Alia signa.

Prognostica.

8.

9.

10.

tunc tussis sequitur austro dilatante, borea constringente, a frigidante, comprimente. Prognostica ex ætat: Tussis infantium deterrima, quod respirationem & somnum impediunt & præfocent, sæpe & ex multa agitatione febres acutas & comitiales excitent: plurimi ergo pereunt. Senes vero ob ætatem non maturantur, & affectus eos ad mortem comitatur. Secundo ex causis: quæ ex destillatione acri, periculossimæ de tabe, præterim in iuvene: Quæcunque igitur tussis ex destillante humore a capite oriuntur, siue ex alicuius spirabilium viscerum vlcere, aut ex aliquo in iisdem orto abscessu, siue ob ea, quæ vocantur empyemata, quæ ab Hippocrat. ferina appellantur, libr. 6. de morbu vulgaribus, omnes malignæ sunt, vt Galenus eodem loco testatur, maleficæ & contumaces, vt inquit Paulus: Quæ autem a fixa causa obstruente, difficilissimam habet affectus sanationem, & periculum tandem minantur. Et ideo validæ & vehemētissimæ tussis nequaquam prætereundæ: nam vbi diu protelentur, propter vehementem thoracis motum sputum sanguinis superuenire consuevit. At cum nihil excreatur, materia intus putrefit, & febrem mouet, & putridæ materiæ aut hecicam, & ideo tussis diu perdurans & sicca, reiectiones facit sanguinis, aut saniem aut phthisin, quæ omnium terribilissima est. Celsus quoque tussim propter faucium exulcerationem fere molestam esse asseruit: solent tamen (vt ipse inquit) interdum per se quoque male habere, & vix cum vetus facta est, eliditur. Quæ in hydropo quoque superuenit tussis, dira est. Ceteræ causæ faciles sunt curatu, vlcere excepto: nam reliquæ tussis, quæ malignæ non sunt (ab his siquidem diuersæ, ac exigua dicta) periculum (quantum in ipsis est) non minantur: suntque curatu faciles. Tussis ex qua materia facile excreatur, qua pulmo lenior fit, salutaris habetur. Exemplum tradit Galenus cuiusdam, qui subita tussi purulentum excutiebat tenue, deinde aliud crassius: exinde sanguinem; vnde corpus eius macie eliquata substantia conficiebatur, & mortuus est. Et se vidisse tradit quendam, qui pulmonis partem putris exscreauit: & alium diutine tussientem, qui frustum pariter pulmonis expuerat, & subinde quassdam veluti glandulas quotidiano excreatu. Tertio itaque prognosticum habetur, si febris multum eam exasperet. Si grauida mulier, de abortu periclitatur. Et licet tota ætate molestæ sint tussis, tenioribus tamen molestiores & periculosiores, vt constat Aphorism. 5. comment. 69. & 3. comment. 24. ex Galeno & 3. 31. Quicunque in febribus ardentibus sicca tussi molestantur, ii parum siciunt. 4. aphorism. 54. consule de his Galenum. Hepate quoque tumido facto, malum: ex 6. aphorism. comment. 16. & tussis ex aqua intercute mala. Et qui gibbi facti sunt ex tussi, ante pubertatem moriuntur, id quod nos in praxi sæpe obseruauimus. Quicunque tussi premuntur a frigido aeris ambientis, cauere frigida oportet, dicente Galeno 5. aphorism. comment. 24. Frigida, qualis nix & glacies, pectori inimica, tussis mouent. Quod vero tussis i aquilonia constitutione ac hyeme generari ma-

gis aptæ sunt, decretum reliquit Hippocrat. Aphorism. 5. & 25. lib. 3. Nunc ad alia exempla curationis procedamus.

OBSERVATIO IV.

De tussi ex materia viscida pituitosa, tam pectori quam asperæ arteriæ infarcta.

Andreas Petrus Sellius, vir consularis apud Alcmarianos, cum ad 64. annum peruenisset, Anno 1547. mense Octobri, tussi valida correptus fuit (alioquin anhelosus) ex materia pituitosa viscida, partim in pectore, partim in bronchiis asperæ arteriæ infarcta. Per ea igitur, quæ extenuant succos frigidos, & crassos, & discindunt, iuxta mentem Aetii, curationem instituimus; videntes eodem victu, quem diximus catarrho ex causa frigida conuenire. Et hunc syrupum præscripsimus: ℞. syrup. de hyssopo, de prasio, de liquirit. ana ℥j. β. aquar. hyssopi, feniculi, helenii ana ℥ij. misce, & a ieiuno per triduum bibantur. Deinde indiluculo solutium sequens ebibit, ℞. diacatholici ℥. β. diaphœnici ℥ij. β. dissolue cum ℥ij. decoct. pectoral. addendo syrupum de hyssopo ℥. β. misce, & quinquies aluum deposuit. Rursus sumit decoctum radic. ireos, inulæ, hyssopi, glycyrr. adianthi, carycarum pinguium, etiam marrubii, syrupis vna cum melle rosar. superius scriptis adiectis. Fiant quoque retula in tabul. ex speciebus diatreos simplicis ad ℥ij. & ℥ij. vel ij. cum decocto sumantur, & sæpe de eo in ore derineat, & quod superest deglutiat. Postea iterum pilulis infra scriptis illum purgavi, ℞. pilul. de agarico, cochiar. de assaieret, ana ℥j. cum aqua hyssopi, fiant pilulæ vij. quæ circa noctis dimidium sumantur. Interea & hoc linctum utebatur, vel eius æmulo, cum baculo glycyrrh. ℞. loch sani & experti ℥j. β. diapenid. ℥. β. specier. diatr. calid. diatreos, ana ℥j. pinearum recentium maceratarum in aqua ungula caball. contusarum ℥ij. pilul. sub lingua ℥j. syrup. de hyssopo, de liquiritia, ana ℥j. fiat eclegma. Pectus inungebat vnguento pectorali, adiecta dialthæa, & quia ex parte asthmaticus, utebatur inula condita. Modo per se utebatur loch sano & experto, modo eclegmate de pino: modo diatragacantho calido per se. Et sic tandem a tussi liberatus recte valuit.

SCHOLIA.

Quoniam vero neque vnum duntaxat habent tussis ipsæ generationis modum, nec causam vnam, propterea pro causarum diuersitate earum quoque curationem variari contingit. Cum enim constet symptoma esse & morbos sequi, illius nulla est curatio, cum curatio ad morbum referatur. Sed illius ablatio erit, auferendo causam, scilicet morbum curando, qui illius tussis causa est. Nam vt morbus non tollitur, nisi causa prius auferatur: sic neque symptoma. Nam, vt Philosophi dicunt, non tollitur effectus, qui fit, nisi auferatur causa; & ablata causa tollitur effectus, si morbus adhuc sit in generatione & in fieri, & a causa dependeat fiende vel conseruante. Interea, qui curaturus est hunc morbum, primum consideret oportet aliquando affectum

esse respiciendum, aliquando symptoma. Etenim tussis est ex his, quæ ad se aliquando vertunt curationem, etiam neglecta causa, non secus ac dolores: ideo quod rationem causæ obtineat aliquando & alia gravissima symptomata gignat & morbos. Ex tussi enim febres exasperantur, tum motione, tum & vigiliis, quarum ratione etiam vires debilitantur, ut & motione ipsa. Nam tussis vehemens caput replet: videmus enim & venas capitis intumescere & faciem rubere, non secus ac vomitione. Verum tussis, ut dolor & alia symptomata, si tantum sua vehementia molestant ægrum, tunc neglecta causa ad mitigationem veniemus, tãquam ad id, quod magis urget. Mitigatur autem, dolorem, id est, dispositionem minuendo, vel sensum partis auferendo vel stupefaciendo ne tussiant: qualia sunt pilulæ de arnoglossa & cynoglossa, & diaspermation: sed iis non utendum nisi cogamur: & cum cautione, ubi metus est, ne ex tussi rumpatur vena, ne vehementia præfocetur æger, ne acris catarrhus pulmonem erodat: Ideo nõ utimur iis nisi in molestissima tussi & perpetua vigilia, ut syrup. papau. cum decocto palmularum, quod tutius est, vel pilula vna de cynoglossa pondere scrupuli semissis: & horum usus tutior est repurgato iam corpore, & thorace non ita pleno. Aliqui vehementer commendant syrup. myrtillorum sedandæ & reprimendæ tussi: calidæ quidem cum iuleb rosato: frigidæ vero cum decocto passul. aromatizato cum modica spica. Sed hæc est cura coacta: alia vero propria, quæ morbi causam tollit. Morbi itaq; curatio pro causarum varietate varia quoque est. Quapropter si ex peripneumonia, pleuritide, empyemate, tabe aut simili aliquo affectu in spiritalibus instrumentis orto, (*veluti etiam dyspnœa seu asthma*) tussis fiat, ex eorum affectuum curatione (*ut in sequentibus etiam exemplis patebit*) curabitur & ipsa. Si vero a morbo instrumentario incipiat, id est, obstructione, si ea a re externa fit, sponte sua soluitur affectus: nam tussi causa eiicitur, nisi vehementer inhæserit: quando & præfocari metus est, & aliqui visi sunt (*ut historiis est proditum*) non adeo, quod via clausa esset spiritus tam exiguo corpore: sed tanta & tam vehemens exspiratio sine intermissione ad præfocationem adducere potest: quod ad cor aer inspiratus non perveniat (*ut recte dicebat Iacchinus*) & præoccupatus a pulmone extra feratur. Nonnunquam in his, qui aqua præfocantur, plenus est aqua pulmo, & ex syncope, amissio sensu, non proritur ad pulsionem. Si ex calida vel frigida sola intemperie nascatur, curationem eam duobus exemplis ostendimus. In frigida, calidis utendum extra admotis, fotu, vnguentis tum victu ex his, quæ actu & potestate sunt calida: contra vero in calida: & hic quoque utendum erit his, quæ hebetant sensum. Nihil enim obsunt materiæ, quæ non adest, & ex tussi periculum est in refrigeratis, ubi duriora vasa sunt affecta ne rumpantur: ideo admonebat hoc Hippocrates, cum frigidum disruptorum appellet. Epid. In calida aerem calidum fumosum declinabimus, somno & quieti indulgebimus, ac balneo

aquæ dulcis, modo absit febris: ianæ aqua hordei, syr. viol. pap. mucag. psyllii utemur. In frigida imperabimus, ut vigilia somnum superemus, aerem calidum naturalem vel arte paratum eligemus, somnumque moderatum, ventumq; frigidum & borealem vitabimus, iisq; præscriptis utemur, quæ ab asperitate, succum tragacanthæ dabimus cibosque lenientes, & potiones molles, ut diximus. Si ab acritudine, siquidem intrinsecus irruat, facile sedatur obtundentibus frigidis, & humidis abludentibus aqua, mulsa, lacte. In tussi, inquam omni, quæ fit ex causis primitiis, omnibus modis illæ amovenda sunt: & quæ ex sola intemperie, alteranda est. Et si etiam causa asperitatis statim tollenda, seu ex pulvere, seu ex fumo oriatur: interea & in exasperata arteria valent viscosa sine mordicatione: quale est tragac. gummi Arab. oui luteum sorbile, buryr. sem. cydon. lac per se, mel passulatur, succus iuiubarum, ficuum, dactylorum veterum non recentium, nam recentes exasperant: hordeatû, lac amygd. penidia, zach. violatur. Si vero tussis fiat ex destillatione multis modis communicat cum cura branchi. Primû enim, ut ibi, totum vacuare, & a capite reuellere oportet: siquidem copia humorum adsit in toto. Vacuatio autem molienda iuxta qualitatem copiarum: nam ubi sanguine æger abundat, præcipue circa capitis venas, & præsertim calida quoque fluxio appareat: expedit venam secare: mox purgatione uti pro qualitate humoris, ut iam sæpe dictum est. Mox capiti prospicere oportet, aliis præterea auertendi ingeniis: cuiusmodi sunt frictiones, quæ ab infernis incipiant, & semper ex supernis deorsum fiant: & cucurbitulis itidè. Mox, & si opus sit, utemur auersione ad posteriora per sinapismum facta, prius abrasis occipitii capillis iuxta eminentiores partes. Dehinc derivatione uti oportet & tralatione. Derivatio quidem ad nares fiat: tralatio autem ad cutim sincipitis per ea, quæ siccant. Hic tamen iam diversificantur remedia, pro natura materiæ & intemperiei. In frigida enim hæc acria sunt: in calida vero siccantia citra calorem. Post hæc ad partem affectam descendendum: primum vero prohibere oportet, ne in fauces materia descendat: mox pectus expurgare iis, quæ defluerunt. Primo igitur scopo satisfacimus si calida materia sit. Frigidis siccantibus, cuiusmodi sunt trochisci diaspermatum, de quib. s. method. Sunt enim in his semina siccantia & frigida vi; quatenus siccant, cogunt & densant: quatenus frigida sunt, caliditate mobilem humorem immobilem reddunt: huius generis est diacodion. Fit vero cum sapa & cum zaccharo: & confectio ex succo nucum, pinulæ de cynoglossa. Cû enim sistere oporteat, si prohibere volumus, id faciunt siccando & refrigerando: cum vero & astringere partem, quæ recipit, id astringentia faciunt: ideo & diacodion admiscere solemus, bolû Armenum & zaccharû rosatum, quousq; materia sensibilibiter influere a capite cernitur. In tussi igitur, quæ ab acri fluxione accenditur, proba victus ratio instituta, qualem in catarrho calido descripsimus, convenit: & in omni

Curatio tussis
ab asperitate.

X 7.

Curatio tussis
destillatione repleta.

8.

Quæ calida sunt
tussi conferant.

9.

Ex acritudine
destillatione
ratio.

tul

4.

Mitigatio tussis
si ac doloris.

5.

Curatio tussis
pro causarum
varietate non
una, sed diversis
existit.

Obstructio
curatio.

6.

Intemperie

10. tussi speciatim utilis est, Celsi auctoritate peregrinatio, navigatio longa, loca maritima & natationes. Sed in acri, iuxta Aetium, medicamenta conferunt, quæ vim refrigerandi, spissandi, acrimoniæque obtundendi habeant, quorum copiam & apud Aetium & Paulum, & præcipue Trallianum, (*cuius quintus liber nihil aliud, quam de tussi agit*) inuenies. Materia itaque incrassata cum syr. de papau. viol. & aliis, purgatio quoque adhibenda cum cassia, manna, zacchar. viol. vel syr. ex pluribus infus. viol. deinde antidota in ore detinenda ex pap. diatrag. diapenid. pilulisque bechicis refrigerantibus, tum aliis supradictis, quorum formulas a practicis mutuabimini, & thorax oleo violaceo inungetur: quibus adiunges ea, quibus nos *Obseru. 3. huius libri in tussi ex destillatione aeri*, vti sumus. Habes & pulcherrima remedia ad acres fluxiones, apud Trallianum libro iam citato. Verum, quantum ad fluxionem sistendam in frigida fluxione, quamuis non multus sit fluxionis plerunque impetus: aliquando tamen propter tenuitatem & aquositatem vehementer fertur. Ideo iis ingeniis quoque vti oportuit: sed erunt vi maiore siccandi prædita pharmaca, cuiusmodi sunt pastilli, quibus vtitur Iacchinus, ex thure, mastiche, croco confectis, addito glycyrr. succo & tragacanthæ. Similiter & theriaca noua vesperi exhibita id facit, vel sola, vel rosato zacch. admixta. Sequitur post, vt omni ingenio pectus expurgari iuueamus: impediri vero sciimus expurgationem visciditate, crassitie, tenuitate humoris: his omnibus contrariis insitemus, si visciditas sit, in quæ incidant, si crassities, quæ extenuent: semper vero detergendi vi est opus, ne inhæreant. Sed quæ incidunt, inquit Hipp. nimis sicca ne sunt, ne magis glutinosum faciant: ideo aquosum oxymel est optimū, & ad crassos aliquando mulsa iuuat humectando. Hic syrupi oēs ad calidum, vel frigidum, vel crassum, vel tenuem materiam, conferunt: sed parum valent, vbi non diu in ore detinentur. Modus vero applicandi communis erit omnibus faucium morbis, id est, vt diu in ore teneantur, & sensim dilabantur: ideo & consistentia glutinosa esse, opus erit, eclegmata vocat: aut aquea sensim dimittantur: semper enim aliquid in arteriam percolatur. 4. meth. Iam ergo hic multæ compositiones occurrunt, vt est compositio Iacchini de terebinthina & succo prassii & succo brasice. Quæ vero in officinis confectæ sunt, est lochsanum, de pino, de scilla in viscida materia: confectio ex iridis radice, & alia, quæ fortiora sunt, in capite de asthma proponuntur. Ex potionibus vero sunt, quæ ex hyssopo & marrubio & melle fiunt cum ficubus, & passis uis. Pectus vero inungendum butyro & croco. Quod si materia aquosa sit, si frigida, siccantibus & calfacientibus vtemur: sic enim crassescens a natura per tussim expurgabitur. Pectus ergo iuuat concalfacere, & cibis & potione actu calida vti, & pastilli illi iuuabunt, & demum quæ calorem innatum fouent: contra vero in calida, quæ siccant & acritudinem tollunt, quæ dicta sunt. Optimum vero est, quod glutinosum reddit, quod est fluidū, vt confectio ex tragacanth. & succus

Quibus modis
sistitur fluxio a
caussa frigida.

extragacanth. solus: & loch de zaccharo cadi, & q vulgo Sauoneam dicunt, delicatæ sane confectio- nes. Confectio vero ex radice tussilaginis prodest in omni humore. Sicigitur vbi crassus & viscidus fuerit affligens humor, per ea quæ extenuant & discindunt, medebimur, ex Aetii sententia, eodem victu vtentes, vt de catarrho ex causa frigida diximus, & decocto glycyrrh. carycarum ping. hyssopi & adianthi: & in crassiore pituita adiecta radic. irid. inulæ, & herba scabiosa, & marrubio, & melle: vel syr. e glycyrrh. adiantho, hyssopo, marrubio, melle ros. scyllino, & similibus. & humore repurgato cum pilulis de agarico vel similibus, vt in *Obseru. precedente diximus*. Cornelius Celsus laudat ouum sorbile cum pauco sulphure adiecto: alii vtuntur diahyssopo. Plurima attenuatoria tam simplicia quam composita habes apud Trallianum & Aetium, tum alios: qualia & præceptor meus Benedictus Fauentinus in sua magna Praxi scripsit. Tussi valida Cornelius Cannius sacerdos Alcmarianus afficiebatur, vna cum pectoris angustia & in genti dolore sub dextro hypochondrio, annos viginti quinque natus. Hic cum bolum sumisset, & syrupum sequentem, ab omni dolore leuatus simul & tussi liberatus est. *℞. cassia mundata ʒvj. diacathol. ʒij. seminis dauci pul. ʒj. s. agarici trochisc. ʒss. cum zacchar. albiss. fiat bolus*: quatuor inde secessus habuit, multis excrementis vna cum ventositatibus emissis, dolor statim sedatus est, sæpiusq; deglutito syr. de glycyrrhiza, multra deinde expectorauit, & tussis sedata fuit. In plurimis comode vti sumus loch de botryde, vel ficus aridas ad ignem parum tostas, vt roridæ tantum essent, sub noctem dum cubitum irent, deuorare iussimus: & hoc vnico remedio multa tussis liberati sunt. Conficiuntur quoque tabulæ ex botryde ad tussim.

Si ex crasso & frigido succo defluentibus tussis fiat, extra-rio.

13.

OBSERVATIO V.

De inueterata tussi, quæ per annum durauerat.

Gerardus ædituus Alcmarianus supra sexaginta octo annos natus, per integrum annum tussi validissima laborabat, homo admodum macilentus, vt vix per cubiculum incedere posset: subinde ventriculus etiam ructus emittebat: decoctum sequens cum sumisset, & purgationem, & eclegma, tussis ita sedata fuit, vt rursus in publicum exiret: *℞. rad. glycyrr. rasa, feniculi, petros. ana ʒj. hyssopi, capill. Vener. viol. bugloss. ana m. j. tussilaginis cum rad. flor. cord. ana p. j. radic. althææ, inulæ ana ʒss. ficuum ping. num. 5. prun. Damasc. num. x. iuiubar. sebesten ana num. vij. vuar. pass. detractis vinaceis, hordei mundati ana m. j. sem. anisi, carui an. ʒij. sem. 4. frig. maior. & minor. an ʒij. s. fiat decoctio in lib. ij. ceruissæ communis ad consumptionem medietatis: maneant per noctem infusa: fortiter exprimantur, addatur q̄r. j. zacch. cand. & rursus bulliant ad syrupi longioris consistentiam. Capiat bis in die mane & post meridiem hora quarta pomeridiana ʒv. Deinde ℞. diacatholici ʒvj. cassia recens tracta ʒij. dissol. cum ʒij. decoct. pector. addendo syr. de bugloss. viol. ana ʒss. misc. sexies alut creuit, cum facilis solutionis esset: & febris hæcti-*

quæ videbatur sublatitare, desuit, & tussis eclegmate sæpius repetito etiam cessavit: *℞. lo. h. de pino ʒ j. B. ar. penid. sine speciebus ʒ ij. syrup. viol. capit. vener. de liquir. ana ʒ ss. misce.* pectus inunxitur mane & sero cum butyro receti, & his sanus evasit præter mentem multorum, & bene se habuit: quanquam idem post tres annos anno ætatis suæ 71. pleuritide correptus est, cumque eo tempore non satis tempestive sibi consuleret, ea ipsa pleuritis in supurationem conuersa est: qua etiam, viribus paulatim destitutus, senex obiit.

S C H O L I A.

3. **T**ussis sicca vehementissime hominem urget: quam emollit syrup. viol. cum ptisana. Veteres medici (teste Alexandro, Benedicto, Veronensi medico; laferis optimi paulum deuorandum dabant: plebi fabam sine cortice coctam ex amygd. oleo. Prodest ex horto porrum, malua, vrtica in cibo sumta, aut allium ex lacte coctum: sed addendum, modo non adsit febris. Apud eundem plura habes: tum apud Aetium, ad veterem tussim. Plinius Secund. libr. 1. capit. 58. *ficus aridas coquit cum hyssopo.* iisdem fere, tum aliis, vititur Aetius libr. 8. capit. 54. ubi & syluam medicamentorum ad veterem tussim & diuturnam inuenies. Quidam in inueterata tussi, ob humorum qui influxerant rebellionem, etiam suffumigiis vtuntur ex foliis bechii. Inter Veteres Trallianus, ex resina terebinthina, auripigmenti, ætercoris leporis pares modos in collyrium, inquit, redigito, & carbonibus abiegnis & terebinthinis fumum excitato ad triduum, si vires permiserint, & affectus ex omnibus notis apparuerit frigidissimus, atque id, quod influit, tale ad amussim existat. Nam in quibus calidus est affectus, talibus vti periculosum est. Aliud ab eodem sæpe expertum: thuris, sandarachæ, medullæ ceruinæ paria pondera in pastillos leuigata. Cautione tamen opus est, vt materia in pectore vel natura, vel arte sit imminuta, reiteratis euacuationibus communibus & propriis: deinde quod absit febris: tertio viribus constantibus: quarto stomacho ieiuno: quinto, vt in minima quantitate prius attentetur: sexto, si sequatur constrictio anhelitus, aut febris, corrigantur cum humectantibus, pectusque dilatantibus & infrigidantibus, aut in actiuis temperatis. vt aqua hordei, glycyrr. passul. & similium cum iuleb aut zaccharo violaceo. Alii autem statim a fumigiis iubent ægros fumere aliquid quod egregie humectet, vt est aqua hordei cum butyro ouino. Fit autem fumigium per emborum aut cannulam ore aperto ter quaterue in die, prout æger tolerare potest. Hæc autem volunt esse medicamenta extrema, quæ conferre dicunt phthisi, asthma, empyemati, & proprie quando materia est subtilis & saniosa. Refert *Matthæus de Gradi. cap. proprio.* se feliciter vsum fuisse fumigio Rhasis in muliere 60. annorum, matre scilicet illustris Poetæ Maphæi de Vegiis Laudensis, quæ materiam catarrhalē quasi saniosam longo tempore in pectore cōtentam habuerat, cum aliis remediis curari non posset, hoc fumigio intra quinque dies sanitati præter opinio-

nem restituta est Descriptionem huius fumigii habes apud Rhaf 9 ad Almanforem c. de tussi. Ad omnem tussim prosunt pulmo ceruinus cum gula sua arefactus in fumo, deinde tussus ex melle, quotidiano eclegmate: cocta oua & trita cum melle. Ego ad tussim siccam & veterem ad tabidos pleuriticos, asthmaticos, & eos, qui valida tussi laborant, vtor hoc eclegmate: *℞. succi rusilaginis seu faruarae lb. ss. mullag. althææ extracta cum aqua hordei ʒ ij. cum zaccharo penid. q. s. fiat loch.*

OBSERVATIO VI.

De tussi puerorum.

Infans vnius anni, filiola Theodori Verhochii cereuisiarii Delfensis, cum valida tussi afficeretur, quæ & nullis præsidii mitigari potuit, tandem nescio cuius mulierculæ consilio mures coctos nutritrix masticabat, & pro cibo infanti dabat, quo remedio a tussi liberata est. At altera puella annos quinque nata, ex Persinorum familia, cum validissima tussi longo tempore (*quam vulgus idiomate vulgari die kinchoest appellant*) detineretur, nec ullis medicamentis curari posset, alterius mulierculæ consilio vtens, guttam vnā atque alteram sumsit aquæ destillantis a limace, exiguo sale conserpo (*hoc enim modo limaces in liquorem resoluuntur.*) quam cum cyatho ceruiciæ communis ebibit, & ex incontinenti curata fuit. Insulanus medicus quidam hoc eclegmate ad tussim puerorum commode utebatur magno experimento: *℞. rad. althææ bene mundatæ ʒ ij. coquantur in lb. j. lactis vaccini, vel melius in flore lactis ad optimam dissolutionem: tundantur, & cribro cremor excipiat, addendo zacch. candi, zacchari penidiarum ana ʒ ij. misce: tempore tussis vehementis detur cochlear vnum, deinde bis in die.* Hoc magna cū utilitate vsus sum, & raro me fefellit: quam subinde (*cum facile situm contrahat, ob lactis pinguedinem, neque diu eclegma durare possit,*) iubeo radices althææ in aqua faruara decoqui, deinde per setaceum, vt prius, extractis reliqua addo. Vtor quoque commode & vtiliter ad tussim non solum succo glycyrrhizæ vel radice ipsa recenti, verum etiam radice althææ zaccharo incrustata, quam pharmacopœi nostri in vsu paratam, vt habeant, iubeo.

S C H O L I A.

Multi (inquit Amatus) qui tussi veteri laborabant, experti varia medicamenta, hoc vno liberati facti sunt. *℞. sulphuris viui vel communis optime triti ʒ ss. beniuini ʒ j. in ovo sorbili excipito, & ieiuno stomacho in aurora sorbenda dato, vel post cœnam eunti dormitum:* Hoc n. remedio repetito, sani oēs facti sunt, vt sæpe experti sumus. Ceterū pueri qui absq; manifesta, aut procatactica causa, tussi ingenti cruciabantur, hoc alio sanati sunt: *℞. succi petros. vulgati ʒ ss. lactis mulieb. ʒ j pul. cumini ʒ j misce, & propina tepidum:* & ilico pectus pueri hoc inunge linimento: *℞. sem. lini, sœnug. rad. malua uisci an. parū, in aqua incoque, & postea muccaginem illam excolatam butyro excipe, & calida pectus pueri inunge, & fascia, breuique recte habebit.* His adde quæ Sebastianus Austrius ex Paulo, Rhase & Auicenna contra tussim,

sim, branchum & coryzam libello suo, de morbo 34. puerorum scripsit.

OBSERVATIO VII.

De Asthmate, per modum Consultationis, pro M. Adriano Goefio senatus populi que Hol. landici Aduocato.

1. **M**alum, quo tua dominatio laborat, vir doctissime, crebram efficit respirationem citra febrem, qualis est iis, qui citatiore fatigati sunt cursu, ob tenacium & crassorum humorum copiam pulmonis branchiis, cartilaginibusque infartam: conquestus enim mihi es de anhelitus difficultate, postissimum infestante, si per gradus vel scalas, altiora loca vel montes ascendere debeas. Hoc quidem vitium ad asthma pertinet: quod quidem senibus non tantum graue & molestum, imo vix curatur: verum nunc nondum eo processit malum, ut anhelosis euenit, qui vix procedere possunt, & interdum etiam corporis partes, quæ supra thoracem sunt, rectas habere coguntur, suffocari metuentes, nisi recta ceruice spirent. Et licet a catarrho, originem sumsisse videatur, cum destillationem prius senseris, & ob hoc difficulter etiam in sene curetur. Verum cum tantum in primo senio hæreas, recte facis, quod consilium tempori adhibeas: iacula enim præuisa (teste *Diuo Gregorio*) minus feriunt. Propterea neque ipsa curatio adeo leuis habenda est, neque omnino omittenda atque negligenda, tanquam omnia præsidia inutilia existerent: sed omnibus modis elaborandum, ut huic malo quantum possimus resistamus, ne incrementum recipiat, quod commode inprimis fiet optima victus ratione, & vitæ regimine probe prius obseruatis. Deinde iis medicamentis adhibitis, quæ asthmatis succurre-
2. rel solent, & id curare valent. Aer igitur vitetur frigidus & humidus, niq̄osus, pluuiosus, ventosus. Victus sit prorsus calidus & siccus: non tamen ita siccus, neque pharmaca ita sicca, quin eadem talia sint, ut viscositatem & crassitudinem humorum diffecare possint, quum talia & humiditatem quandam habere oporteat, Gal. auctor. 7. de compos. med. secundum locos. Cibi igitur sint leues, Celso teste, & sorbitiones. Utendum igitur carnibus perdicum, auicularum montanarum, gallinarum, pullorum, phasianorum, sternarum, caponum, potius assis, quam elixis: interea & elixis cum pauco hyssopo, oreoselino, thymo, calamintha, aut fœniculo, aut reliquis eiusmodi extenuantibus. Pisces vitandi omnes, quantum fieri potest, nisi saxatiles potius ad saporem concedantur. Vitabis in genere fructus, ac omnia, quæ crassos & lentos humores procreare possunt. Vini potus, iuxta Galenum, tibi conuenit substantia tenuis: nec exiguus eius potus tribuendus erit, imo multus, ut ipse inquit: nam humectatione multa opus habet, quo facile efferatur per tussim, id quod in bronchiis continetur. A ceruisia crassa abstinebis, sed pro potu si mulsa uti cupias aliquando, vel melicrato cum cinamomo clareti instar, concedo. Somno autem moderato, præcipue nocturno, vtere, caputque in lecto sublime habeas: id & Celsus iubet: & diurnum fu-

gias. Præstat autem anhelosos altioribus stramentis, thorace atque capite subleuato, loco lucido atque calido decumbere. Clysteriisque alius ducenda, vel glande irritanda. Præsertim ubi natura eadem humecta non sit. Prodest & ambulatio lenta, pene usque ad lassitudinem: frictio quoque multa, præcipue interiorum partium, vel in sole, vel ad ignem, & per se ipsum, & per alios usque ad sudorem. Exercitio uti quoque debes ante cibum, & nequaquam subito, quod complures hac ratione extincti sint. Animi perturbationes fugiendæ, maxime vero mœror, & ira. Præter cibos superius dictos, quidam commendant aliquas carnes a proprietate anhelosis conferre, ut bubonis, ericii, vulpis, ut habetur apud Gradum: sed nostratibus non sunt in usu. Quod ad medicamenta, breuiter me his quoque expediam: alia rationem habent materiæ contentæ in pectore, alia vero eius, quæ fluit, & adhuc fluxibilis est, & nondum fluxa. Et sic non minus capitis ratio tum catarrhi habenda, quam pectoris aut pulmonis, & membrorum spirituum, quippe cum curatio asthmatis quid commune obtineat cum aliis morbis: nempe ut redundantiæ humoris hæc vitia procreantis absumatur & cibo aboleatur. Secundo, cum proprium quiddam obtineat, ut si ab humoribus crassis ac tenacibus oriatur, malum per extenuantia & extergentia medicamenta curetur. Omnium primo igitur vniuersalem euacuationem instituemus. Sed quia crassa difficulter soluuntur, prius materia coaptanda ad expulsionem cum decoctis conuenientibus ex glycyrrhiza, marrubio, hyssopo, herbarum capill. scabiosæ, betonic. passulis, carycis, & similibus, adiectis syrup. de hyssopo, prasio, de glycyrrhiza, oxymelite, vel syrupi per se dandi. Deinde vniuersalis euacuatio administranda. Sed quia solstitium hyemale transit, & in hyeme sumus, & in sene, potius pharmaco utendum, quam venæ sectione: a purgatione leui incipiendo, ut hoc modo. ℞. agarici optimi ℥ j. rhabar. selecti (quia dominatio tua hepar calidum habet) ℥ ℔. zinzib. alb. ℥ j. schœnanth. ℥ ℔. infunde per noctem, facta prius leni ebullitione in ℥ v. decoct. pectoral. mane fortiss. express. adde syrup. de liquiritia ℥ j. electuarii lenituri, diaphœnici ana ℥ ij, misce: detur in diluulo. Vel si mauis pilulas, ℞. pilul. de agarico ℥ ij. rhabarb. optimi ℥ j. cum aqua fœniculi, fiant pilula vii. Præterea cum etiam adest catarrhus, vnde & asthma, duo præcipue membra in curatione respicienda, nempe cerebrum tanquam mandans, pulmo vero & pectus tanquam recipiens. Primo membro, nempe cerebro, debetur exsiccatio ac roboratio, ne humor catarrhalis generetur: mox & humoris incrassatio, vel potius suspensio, ne amplius fluat, postea ut humor diuertatur, & per aliam viam fluat. Si itaque catarrhum fluere sentias, fiat sacculus ex sale tosto cum furfure, & capiti imponatur, ad capitis exsiccationem & roborationem. Ut autem incrassetur, si opus est, detur pil. vna ex olibano in introitu lecti, alii ex olibano fumum recipiunt per os: illud tamē asthmaticis suspectum. Quæ autem auertunt humorem fluentem: sunt hæc: succus maioranæ vel betæ per nares attractus, vel radix

gentianæ naribus imposita, cucurbitulæ quoque
 icapulis admotæ. At suscipiens membrum trachea
 arteria, pulmo, pectus, præter communem pur-
 gationem etiam pectoris cum agarico, proprio
 quoque remedio indiget, quodque materiam in
 pectore existentem expurget, extenuet, tergat, &
 partim per sputum expectoratione educat, qualia
 sunt decocta rad. helenii, iridis, hyssopi, prassii, vn-
 gula caballinæ, scabiosæ, ficuum & vuarum pas-
 sularum. Eclegmata de pino, de botryde, loch fa-
 num, loch de caulibus, loch de pulmone vulpis,
 etiam scyllinum. Interea & pectus inunges cum o-
 leis calfacientibus, liliaceo, irino, vng. dialthæa,
 pectorali. Quibus cum usus fueris, cum in Hagam
 Comitis accessero, si malum non cesserit, reliqua
 medicamenta addam: cum ad alios euocamur, te
 quoque inuilem. Hæc pauca pro tuo affectu an-
 notasse sufficit. Ex nostro Musæo Delphis 23. De-
 cembr. anno 1559.

Petrus Forestus Alcmarianus, Delphenfis Rei-
 publ. Medicus.

SCHOLIA.

Asthma est affectus, qui respirandi difficulta-
 tem cum magno conamine præ se fert, Latini
 crebrum anhelitum, vel anhelationem dicunt. No-
 men est a symptomate sumtum, etenim species est
 vitii in respiratione: & est actio deprauata, non se-
 cus ac tussis, & sternutamentum. Mouet enim na-
 tura, sed irritata a causa præter naturam, & mor-
 bosum affectum sequitur. Qualis autem sit vitio-
 sa respiratio, describunt, quoniam creber est, instar
 eorum, qui vehementer sunt moti. Creber autem
 dicitur, ubi exigua quies interest inter vtrumque
 motum, dilatationis & depressionis pectoris. Ga-
 len. aphorism. 6. comment. 46. Multæ, inquit, sunt spi-
 randi difficultates, sed solam illam Hippocr. con-
 suevit Asthma nominare, in qua contingit satis cre-
 brum anhelitum tum fieri: estque difficultas re-
 spirationis, qualis iis, qui diu cucurrerunt, ex quo
 ἀσθμα, anhelare, id quod in cursibus & vehe-
 mentioribus exercitiis fit. Vide de his plura apud
 Galen. 7. de compos. medic. secund. locos cap. 6. Dicuntur
 autem tales, qui citra febrem dense respirant, di-
 cuntur tales anhelosi seu suspiriosi, Aetio & Paulo
 testibus, & Galeno auctore 3. de difficultate respi-
 rationis. Interea spirationis difficultas, si modica
 est, δύσπνοια Græce dicitur. vide Galen. libr. 4. de loc.
 affect. ubi δύσπνοια, quasi non spirationem dixeris,
 duntaxat a quauis alia spirationis oblatione se-
 iunxit. Sic & Galenus libr. De difficultate respira-
 tionis, tum etiam 6. de morb. vulgar. cum Hippo-
 crates δύσπνοια spiritum densam crebrumq;, licet
 non valde difficilem respirationem, intelligit, a re-
 liquis seiunctam, æsthmate videlicet & ortho-
 pneæ. At cum vehementior sit, & spirare æger si-
 ne anhelitu & sono non potest, tunc ἀσθμα voca-
 tur: si vero accadat in spirando, vt non nisi recta
 ceruice spiritus trahatur, tunc ἐξοσπνοια nomina-
 tur, estque hæc maxima, vt ægri iacentes suffo-
 centur. Hæc inquam tres differentie communicant,
 quod videlicet febre careant, vt pater 3. de morb.
 vulg. & 6. eiusdem. De his noster sermo est, & non

de eis, quæ cum febre fiunt, ad alias videlicet seu
 inflammationes spiritualium, seu reliquarum par-
 tium subsequentes, sic enim difficultas respiratio-
 nis fit & angustia quoque peripneumonics, sup-
 puratis, & pleuriticis, sed cum febre, a quibus faci-
 le distinguuntur prædictæ anhelationes difficiles,
 quæ sine febre fiunt, & ideo facile distinguuntur.
 In quibus etiam non facultas ipsa respirationem
 efficiens, neque usus per se afficiuntur, sed instru-
 menta ipsa, & inter ea aspera ipsa arteria, quæ in
 collo & thorace continetur, seu eius propagines,
 quæ in pulmones distribuuntur: id quod læpius
 accidit, sunt enim strictiores, & propterea prom-
 tius obstruuntur, ac constringuntur, seu angustio-
 res redduntur: quemadmodum liquet 4. de loc. af-
 fect. de compos. medic. secund. locos, & comment. aphor. 26.
 lib. 3. quamuis non semper huius symptomatis caus-
 sa, siue morbus ipse in fistulis aut cauitatibus pul-
 monis consistit, vt experientia constat. Anno enim,
 inquit interpretes Holerii, 1549. mense Septembri,
 monachus quidam in collegio vulgo de Arras, bre-
 uiasthmate interiit, corpore dissecto abscessus re-
 pertus est, in vena arteriosa & sine pari, integris o-
 mnino pulmonibus. In quodam (nomine Britio)
 asthmate mortuo pulmo tanquam spongia, imbu-
 tus multo humore piquitoso, inuentus est. Similem
 fere casum cum superiore refert Dodonæus de dif-
 ficultate respirandi cum suffocationis periculo, ca-
 pit. 19. in suis Observat. medicinalibus, de quodam no-
 bili defuncto, in cuius pulmonis inferiore sede ac-
 basi, qua septo transuerso incumbit, reperti sunt
 abscessus duo, vnus in dextra, alter in sinistra par-
 te, per meatus pulmonis purulentus ferebatur hu-
 mor, qui in scisso pulmone ex ipsis profluebat. At
 Beneuenius, de abditis morborum causis, cap. 61. cor-
 pus etiam incidit in orthopnoico, in quo inue-
 nit non parum atrabilis & sanguinis nigrioris in
 eius corde coisse: vnde etiam per venas diffusus,
 non est mirum si corrumpente eo spiritum ipsam,
 hominem ad festinam mortem deduxerit: quod
 etiam auctore Galeno alias contigisse nouimus.
 Interea quod quis difficulter spiret, tres causas
 ponit Galenus 4. de loc. affect. vel ex virium imbecil-
 litate, dum spiritus ex solis naribus emittatur, &
 narium pinnae manifeste per inspirationem con-
 trahi videntur: vel aucto in corde & pulmone ca-
 lore, calido frequenti spiritu exsufflante. Vel ob
 spiritualium instrumentorum angustiam, toto tho-
 race magna ex parte celeriter & frequenter dilata-
 to, sed nec spiritum efflant, nec calidum emit-
 tunt, vt illi faciunt, qui ob cordis vel pulmonis ca-
 lorem, musculis thoracis maxime agentibus, diffi-
 culter spirant. Hic vero agimus de iis, qui ex spi-
 ritualium instrumentorum angustia difficilem spi-
 rationem habent: ita vt cunctæ istæ affectiones, de
 quibus paulo ante diximus, ad symptomata refe-
 rantur functionis voluntariæ, respirationis in-
 quam, non quidem ablata, sed oblatæ, vt in apnœa
 quidem debiliter seu imbecille, aut interim quo-
 que deprauate, & in orthopnœa, licet raro. Sepa-
 ratur autem vna ab alia quibusdam propriis indi-
 ciis. Namque in ea, quam dyspnœam nomine ge-
 neris

Quæ pars in
 eisdem affectis
 fit.

II.

12.

Quod quis diffi-
 culter spiret, eas
 vna trium
 causarum pro-
 uenit.

Qui affectus
 præternaturalis
 sunt.

Quibus sunt
 vna trium
 causarum pro-
 uenit.

13. ne pellauimus, spiritus duntaxat densus, isq; me citra sonum & anhelationem apparet. In astate vero seu anhelatione, præter spiritus densum maiorem, æger sine sono & anhelatione, ait Celsus, spirare non potest. At in orthopnoea, cum spiritus crebritas maior percipitur, sed ita æti, non nisi recta ceruice spiritum trahere valet, & cum decumbunt, seu iacent, suffocari seu angulari videntur. Symptomata autem hæc ad morbum in via succedunt, quamuis interdum viæ ipsæ obstruantur, per quas aer inspiratur: interim constringuntur ac coarctantur pro causarum diversitate, de quib. postea agemus: atq; hæc omnia exemplis illustriora euadent.

OBSERVATIO VIII.

De viro pituitoso dyspnœa paulatim correpto.

Vir annos quadraginta natus, obesus, & pituitosus, cum in hyeme, tempore niuoso, iter faceret, paulatim anhelitus difficultatem incurrebat. Erat autem huic spiritus quidam densus citra tamē sonum & magnam anhelationē, ita ut potius dyspnœa laborare videretur, quam asthma: nam calido tempore hic iuuamen sentiebat, veluti theriacarum vapore, vel si in cubiculo paulo calidiore sederet, melius se habere fatebatur. Verū cum hic pituitosus esset, & non sine catarrho, ne in asthma aut grauius malum incideret, huic imperauimus, ut in aere calido & sicco versaretur, & exercitium leue, nempe ambulationem lentam ante cibum, ad assuetudinem fere concessimus, & somnum moderatum, & ut diurnum vitaret præcepimus, vix nocte tenui vel aqua mulla aut cinamomi, in qua aliquid prassii, vel hyssopi incoctum esset, loco positus viretur, mandauimus, & ad materiam frigidiorē concoquendam, ut oxymelle simplici compos. & syr. assu & hyssopi cum aquis hyssopi, betonica, prassii, vel decocto similiter vteretur, iussit atq; mox illum purgauimus cum diaphœnico. A venæ sectione, quia in hyeme ammus, nec sanguine abundaret, abstinuimus. postea vtens z. char. enulato, etiam theriaca veteri ad 3. cum vino, & victu calfaciente & exsiccante, etiam assumpsit. ij. aut quatuor guttis destillationis anisi cum vino, hoc symptoma probe curatus fuit.

S C H O L I A.

A Primitiua causa, nempe ab aere frigido, hæc dyspnœa cum habebat, postea etiam accessit catarrhocom pauco humore, pituitoso in pectus collapsos sed facile cessauit malum, sicut eundem dyspnœa, it & asthma & orthopnoea ab iisdem causis oriuntur: quanquam asthma a grauioribus, & orthopnoea leuioribus. vero dyspnœa. Asthma itaque, cum reliquis dictis affectionibus, multas causas habere possit, licet a Paulo vna tantum assignetur, quæque potissima existit. Potest namque angustia hæc citra febrem excitari, aut a tuberculo quopiam intra asperam arteriam orto, eamque coarctante, at a lentis crassissive, seu multis succis bronchiis ipsi existentibus, aut eisdem ab aliis prius ad aden delatis, ipsam asperam arteriam obstruentibus alii volunt causam esse tuberculum aliquod crutum in pulmonibus ge-

nitum. Nam & Galenus aphorism. 46. libr. 6. fieri significat aliquando a tuberculo nato in spina, ut in gibbis: quod si magnum est & durum siue crudum, asthma facit, si non ita durum & aliquid desudat in arteriam, tussim. Aliquando etiam suppuratur, & interimit. Si fuerit in collo, asperam arteriam contrahit, in dorso, pulmonem & vicina corpora, sub septo, & renes & lumbos, urinam quoque intercipit. Malum quoque hoc quandoque generat fumus argenti viui, aer cauernarum, a quibus metalla effodiuntur: ab iis enim vaporibus contingit pulmonem nimium exsiccare: ut & ex metallorum cuniculis, ex nauis carina, ubi multa corumpuntur: durum enim odorem emittit triticum, quo superuenientes multi suffocati sunt: etiam in nauibus occlusis cereuisia onustis aut in furnibulis, quibus cinnabaris factitius, aut similia confici solent, aut arsenicum, argentum viuum, vel reliqua metallica sublimantur. Si sit a resiccatione, ut in aurificibus, chymistis, fabris ferrariis, & similibus, quibus addi possunt, inunctiones & remedia a morbo Gallico. Rhaf. libr. 4. Continentis adiecit pectus strictum & paruum pulmonem: Qui natura talem constitutionem habet, iugiter (inquit) sit asthmaticus, vel si quid incaute in spiritalem fistulam, veluti in alienum tramitem, exciderit, ut refert Benedictus Veronensis, de quadam Lucretia Veneta, quæ nucem Ponticam in pulmonis fistulam imprudenter admisit. Victus quoque intemperantia, nec non corporis crassities. otio aut natura contracta, anhelosos subinde facit. Omnium autem frequentissime fit a pituita crassa & viscida, quæ in asperæ arteriæ ductibus inuiscata hæret, siue aliunde influat (quo tempore sæpe subito spirandi difficultas oritur) siue ibi generati sint: sæpe enim spirandi instrumenta (ut nunc diximus) sui mali principium habent, cum scilicet multæ superfluitates in ipsis generantur, quæ aliquando tempore, vi caloris, in pituitam vitream aut gypseam permutantur, hinc quoque tempore in grandinem atque calculos degenerant: tales enim aliquando calculos ex pectore tum pulmone expulsos esse diximus libr. 14. scholio Obseru. 26. cum & in asthmatico frustum carneum eiectionem vidimus, de quo eodem loco mentionem fecimus: quem & nos probe curauimus, qui & post carnem illam eiectionem melius multo spirare potuit. Neoterici vero causam huius procatartecam esse volunt, caliditatem vel frigiditatem aeris, casum, percussionem, nimium corporis motum, fumigium argenti viui, & quemcunque odorem pectus constringentem. Antecedentem vero dicunt esse malam intemperiem frigidam coarctantem vel obstruentem, vel materiam pituitosam in pulmone vel eius bronchiis infarctam: & causam coniunctam volunt esse humores infarctos in arteriis & venis pulmonis. Signa per se tum vniuscuiusque generis per se satis patent, tum ex iis quæ scholio præcedente diximus. At signa causarum probe sunt distinguenda, ob curationem. Si sit ex tuberculo, inter respirandum stertere videtur: nihil expuit, malum semper augetur, circa arterias pulmonis gra-

Signa causarum.

uitas sentitur, veluti Antipatro medico contigit: demum temporis diuturnitate asperas pulmonis arterias coarctans. spirandi difficultatem facit. Iam quoque sine manifesta a capite fluxione, sine sputo aut humida tussi illud patiuntur. Si vero sterrendo strepidum fecerit respiratio, lentorum crassorumque humorū pertinaciter impactorum, multitudinem pulmonis bronchia infestare indicium est. Sed nec generatim verum est, quod ex humore crasso aut viscido semper fiat, sæpe enim vidimus (*inquit Iacchinus quoque*) a tenui destillatione fieri, & ratio dicat: quoniam omnia corpora, quæ replent, spiritum impedire possunt: sic his fieri diximus, qui metallica tractant, qui etiam aliquando præfocantur, ut Galenus in Cypro accidere dicit circa chalcanti venas: sic & carbonum fumus præfocat. Videntur igitur hæc fieri potius qualitate attracti aeris, quam quantitate: ut autem externus aer hoc efficit, ita & vapor venenosus internus. Sed adhuc quæritur, qua ratione fiat hic creber anhelitus? An quia multum refugit eius respirationem, ideo crebro ad inspirandum reuertitur ob necessitatem? tandem vero præfocat, cum nihil inspiratur, vel cum cor refrigerare nequit, quia non admittitur? Hoc euenit etiam in aere cauernis incluso, & ita putrescente. Hæc facile habentur ex causis prægressis & sermonibus ægri aut astantiū. Iam quoque vehementissimo asthma prehenduntur laborantes ex vtero. De ea quæ mulieribus accidit causa, nihil forte inconuenit dicere: quod afficitur pectus per consensum vteri: etenim genitalia pectori multum consentire Gal. ait, 1. epid. 13. & causam ibi exponit: ideo ab vna parte ad alteram abscissus fieri ait facile. Cognoscitur autem ex propriis signis: si ex destillatione, quam primum ab angustia sensu quis difficulter spirauerit, id vel a cerebro, vel a vicinis sedibus in pulmonem irruentem fieri, portendit, idque sæpius ex manifesta causa accidit, propriis destillationis signis existentibus: pingui etenim (*ut inquit Theodorus Priscianus, libr. 2. ad Timoth. cap. 12.*) & frigido phlegmate pulmonibus adhærente, cauernæ vel meatus, quibus naturaliter spiritus redditur, & accipitur, concluduntur: & ex hoc impedimento suspirium, vel anhelitus molestissimus nascitur, ut sedendo magis, quam iacendo respirent. Verum si prædictæ affectiones ex aliis quibusdam præter iam dictas causas, interdū oriantur, ut ab hepate, splene, stomacho, vel diaphragmate inflammatis, vel pulmonem distendentibus, vel a ventositate, vel quouis modo per consensum, vel a vertebra dislocatis, vel gibbosis, vel a vaporibus, sanie, cruore, sanguine trumbofo, vel ab angina, peripneumonia, pleuritide, empyemate, aut ex tumore aliquo abscessui simili in pulmone genito, seu aliis eiusmodi, licet de his nunc non sit sermo, ex propriis tamen prædictorum affectuum notis interstinguendæ sunt, potissimum quod non citra febrem erunt, cum & de his postea acturi sumus in propriis quoque suis locis, ut de sanguinis sputo, pulmonia, pleuritide, & empyemate, &c. Nos nunc ægre spirantes intelligimus sine febre, cuius rursus exemplum adferamus.

OBSERVATIO IX.

De Asthma difficili, hereditario, antiquo & perios habente, ex succis crassis & viscidis.

Asthma plurimas differentias in se continet cum aliud nouum sit ac recens, aliud rursum sine periodis, aliud vero periodos habens, diuturnum quoque & antiquum: quale Iusta Teylingia vxoris meæ soror, matrona me hercule proba, patiebatur, per certas periodos, tempore potissimum pluuioso, niuoso magis & nebuloso, cum difficili anhelatione, adeo sonora, tanquam per fistulā aer cum magno conamine exsufflaretur, ut etiā extra cubiculum subinde sonitus exaudiretur. Insuper & hoc malum erat hereditarium: pater enim eius Augustinus Teylingius hoc eodem malo afficiebatur, uti & duo fratres Bartholomæus Teylingius Prætor Alcmarianus, & Augustin. Teylingius iunior frater. Filia quoque eiusdem Iustæ, virgo. Ideo peius malum erat, & hereditarium, & diuturnum: & quia iam ætate satis prouectiore, difficulter in talibus asthma curatur. Etenim de signis prognosticis difficultatis illud commune est, quod in ætate decrepita non sanantur, neque diuturnæ iam, propter magnam infirmitatem, quam viscus contrahit sicut nec diuturni dolores articularum, nec aliud malum vllum eiusmodi quod ad multam infirmitatem partem trahat: propterea in iis, qui male formato sunt pectore, ut angusto thorace, vel in iis qui natura ad hunc morbum inclinant, (*ut hic quidem, & morbo hereditario, viscus imbecillum fiebat & a leui causa ladebatur ob angustiam malo sapius repente & diuturno, ex frigidis humoribus orto*) ita in videri senibus si exciteretur, iuxta aphorism. 40. lib. 2. ecommendo Galen. eos fere comitari solet ad mortem. Hymem magis corripiebatur: nam, Cælio Apuliano teste lib. 3. cap. 2. magis grauat atque premittit passio mulieribus viros, & iuuenibus senes atque pueros, & durioribus corporibus natura terriora hyberno tempore atque nocte magis, quam die væstate. Omnes autem isti, de quibus diximus, asthma laborabāt ex pituita viscida & crassa, anterian tracheam, tum pulmonem cauitatemque pectoris implente, simul & tussi quandoque grauiore pituitosum quid exspuentes, modo difficili anhelatione tantum sine tussi. Fratribus vero, qui iuniores erant, vena tempore veris comode fuit acta, idque ex Pauli & Celsi, tum Jacobi de Cædo, cum vires venæ sectionem admirarent, quæ Cælio & Prisciano quoque laudatu. Reiquam crationem, quæ plurima cum tussi communis hæret (*ut in causis & affectus naturæ communica*) ost totius corporis prouidentia absoluitur am iis, quæ materiam viscidam & concoquunt, & deinde euacuarent. Interea rursus distinguenda aliam esse curandi rationem in iis qui iam accessione sunt, aliam in tempore medio, cuius malum periodos haberet. Ideo tempore medio accessione diligenter vitæ ratio instituitur, ut cibos concoctu faciles sumeret & qui tenues succos gignerent, & ut omnia cruditate vitaret: in ea enim capit pituita solui, vinumque

numque modice sumtum, tenue, aquolum, & palidum, quod minime caput tentaret, concessimus, & ut aerem clarum eligeret, mandauimus, a paludibus semotum, siccum, apricum, insolatum, & exercitium ante cibum. Per interualla pilulas ex hiera simpl. vel compos. de agarico & assaieret (*qua neq. diagridium neque myrobal. reciperent*) exhibuimus. Aliqui & hic singulis mensibus vomitum laudant, praesertim si facile vomant, alioqui praestat per aluum purgatione uti. Deinde etiam decoctis extenuantibus & expectorantibus (*capite prius quoq. expurgato & roborato ob catarrhum*) utebamus: & syrups pectoralibus, prius quoque auersione & diuersione facta cerebro: & post pilulas dictas etiam theriacā, cuius vsus (*uti & diacalamintbes & oxymelitis scillini*) eximius est pra omnibus, ut prorsus a periodo liberare queat. Dum extra paroxysmum esset, ad nares quoque materiam deriuare contende-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

melius dilatentur. At periculum maximum imminet, cum omnes muscoli intercostales, superiores scapulæ & omoplatæ trahuntur, virium imbecillitas, vehemens calor, angustia partium spiritalium conspicitur. Vbi omnes aut plures concurrunt, æger morti proximus est: vbi duæ, non facile seruari potest.

OBSERVATIO X.

De Orthopnoea.

OOrthopnoea adeo graui subinde laborabat M. Hieronymus presbyter Alcmarianus, & vxoris meæ auunculus, vt in ipsa accessione adeo difficilis fieret respiratio, vt etiam in platea, si exacerbatio contingeret, staret toto tempore accessionis parietati innitens, vt ita anhelitum traheret. Posteaquã accessio conquieuisset, melius respirare potuit, & quocunque libuit abire. Attamen cogebatur leuiter incedere, alioqui facile periodus reuertebatur. Hoc autem malo multis annis detinebatur: quem alius Medicus ante nos curabat. Malum aliquando adeo inualefcebat, subinde reuertentibus paroxysmis, vt cum parietati alicuius domus, primum obuiam factæ inclinans, erectus stare cogeretur, a pariete sese mouere non posset, etiam si domus fuisset combusta, donec accessio quieuisset. Multa huic remedia frustra adhibita fuere, cum tempore iuuentutis apud amicos crapulæ vtcumque indulgisset, tum etiam Veneri, concubinam domi alens: quam cum relinquere nollet, malum frequentius recurrebat, anno 1548. sub finem Decembris atrocissimo obrepente paroxysmo, ita vt per duos integros dies & noctes corpore erecto in pedes stare cogeretur, imo sustentari a duobus robustissimis viris: alioqui lassus si sederet, suffocationem incurrebat. Hic cum me antea cum medico alio in consilium adhibuisset, primo die cum hoc malo tam sæuo corriperetur, eundem alium medicum ad se vocauerat: cumque eo tempore ego apud dominum de Schagen ex hydrope periculose decumbentem agerem, ab eo reuersus ægrotum inuisens ita misere paroxysmo diurno detentum animaduerti, spirationemque tremulam adesse, pulsumque inæqualem ac valde inordinatum, & piusque intermittentem ac deficientem, tandem & languidum magisque tardum, ita vt subinde syncopen incurreret. Iam quoque spiritus paruus, tardus & frigidus ex ore prodibat: certum indicium, ægrum non diu superuicturum, pulsu quoque ex tardo in nimis crebrum, & valde languidum permutato: ita vt amicis astantibus mortem præ foribus adesse prædixirim, medico tamen altero spem salutis ægro pollicente, quod is breui sanaretur. Ceterum cum paroxysmus adeo violentus & atrox continuo ad quatuor fere dies permaneret, atq; ipse æger fatigatus, amplius ita erectus a viris sustentari non posset, mortem breui adfuturam pronuntiaui, ex præsagio doctissimi illius Leonelli practici, cuius verba ita habent: Anhelitus per os & nares exiens frigidus, mortale: & in asthma seu orthopnoea anhelitus tardus & paruus, vel frigidus, vel syncopis, vel si

cogitur super pedes stare, quia anhelitum habere non potest, mortale. Hac cum adesse viderem, vt si quæ agenda essent ægro hinc emigraturo, id consultum iudicabam, cum presbyteris curatio desperata esset: quare extrema inunctione peracta, lecto nunc incumbens cum amplius stare non posset, mox exspirauit: ex cuius augurio non minorem honorem habui, quam si ægrum curassem. Ita quoque Franciscus Guilelmus de Bodegem, cognomento Heerius, vir circiter octoginta annos natus, singulis fere noctibus hoc eodem malo pressus, recta ceruice spiritum trahebat difficile. Ab hac quidem molestia subinde per me & Cornelium Ericium anno 1559. subleuatus, quamquam per totam noctem prius sellæ insidere cogeretur, sæpe apozemate incidente sumto & pilulis agarico ad 3ß. tres pilulas conficiendo aliquot dies, miraculi instar orthopnoea cessabat. Attamen in sene, cum tempore paroxysmi vel pituitosum quid vel viscidum, modo etiam cruentum quid exspueret, citius accessio terminabatur: alioqui, si nihil exspueret, protrahabatur. Extra paroxysmum nunquam tale quid cruenti vel viscosi exspuebat. Hic tamen post aliquot menses paroxysmis reuertentibus cogebatur rursus sellæ insidere: & si se ad lectum componeret, mox redibat accessio. Quid multis? post annum vnum, post sonitum campanæ nocte indicantis, incendium in vrbe esse (scilicet noctis, 10. die April. anno 1560.) experrectus & territus, in paroxysmum vehementiorem incidit: adeo vt antequam ex lecto euocatus illum adirem, eundem (quod antea sapius de morte inopinata in sene prædixeram) suffocatum ac mortuum repererim. Libenter autem mortuum corpus secuissemus, cum causam mortis vel tuberculum, vel abscessum in pulmone arbitramur: sed amici id admittere volebant.

S C H O L I A.

Quid sit orthopnoea, iam antea diximus, cum non nisi recta ceruice in ea spiritus ducatur. Causas easdem habet cum asthma, licet efficaciores: estque symptoma multo periculosius asthma. Fernelius adeo lentum humorē habere quandoque putat, vt in grandinem concreseat, atq; hæc rursus in calculos veros, quibus interdum dissectos pulmones confertos deprehendit, alios præduros, alios solidos in casei substantiam concretos, incipientes, alios gypsea duritie, omnes quidē propria cysti obductos. Ita vir quidam Fernelio occurrebat, qui quoties exercitatione incalefcebat, concitata tussi calculos e pulmonibus edebat præduros, eosq; exscreabat hordei modo, modo pisi magnitudine. Bona tamen is valetudine fruebatur, præterquam quod paulo difficilius respirabat, & in medio thorace grauitatis cuiusdam pondus percipiebat. Apud Brielenes quidam per quatuor annos ex pulmone tabe laborans, quatuor vel quinque lapillos ad pisi magnitudinem fere albos induratos calcis instar exspuebat, vt nos vidimus. At vir ille apud Dodonæum, 36. plus minus ætatis annum agens, orthopnoea laborabat, cuius accessio subinde singulis mensibus, quandoq; rarius, & b. s. aut ter in anno, inuadebat, & per humidā frequentius, quam per

5
Causa orthopnoeæ.

Fernelii historia.

Lapilli e pulmone expulsi.

Historia Dodonæi de orthopnoea.

siccat.

6 siccam aeris constitutionem: cui & difficilis in accessionibus erat respiratio, stabat toto tempore mensæ aut tabulæ alicui manibus innitens: efferebatur, ac profluebat ex ore humor lentus viscidusque: cibum vix, potum ægre admittere potuit: sæpe toto accessionis tempore stans, absque cibo & potu complures horas transigebat, accessione finita libere spirabat, & quocunque libuit abibat: quatuor aut quinque miliaria quandoque vno die pedes perfecit, sed decumbere non valuit: quotiescunque enim iacere conabatur, mox omnia circa respirationem molesta. Noctu sedendum illi erat in sedili aliquo, nec aliter somnium capere aut conquirere illi integrum erat. Agarico purgatus, visus est melius habere, sed ad exiguum tempus. Profuit etiam subinde diar yminon & diaspoliticon. Vbi autem consenuisset, sponte & absque ullis remediis a molesta orthopnoea liberatus hic est: cessantibus multo tempore exarcebatibus, tandem periculum iacendi fecit: quod cum citra incommodum succederet, relicto sedili, in lecto per noctem decubuit. Tenax erat humor, asperæ arteriæ ramulos obstruens, ac meatus intercludens: quo super abundante, morbi accessio cōtigit, quæ tantisper duravit, donec portio eius per os expurgata esset. Sed cur intermissionis tempore iacere, aut in lecto decumbere non fuit integrum? An quia non omnis humor excretus, & decumbendo minus liberi sunt pulmonis meatus, atque coarctari sic contingit, & idcirco quoque a lento humore facilius obstrui? Decumbentibus enim pulmo (vt Gal. 4. de loc. affec.) in se concidit: erecto vero thorace non amplius seipsum gravat, tunc enim omnes asperæ arteriæ propagiæ dilatari contingit, & interiorē pectoris regionē augeri: vt in commentariis Prorrheticon idē scribit. Idem Dodonæus narrat de mercatore quodā etiam iuuenē, correpto simili orthopnoea, in quo nullum remediū genus intentatum relictuū est. sanguis sæpe detractus, & frequenter purgatus: bibe-
bat & aquā fontis Leodiensis, sed nullo succedente fructu, tandem calculo in renibus, doloribus ac podagra correptus, ab orthopnoea liber factus, decumbere potuit, cum antea, aliquot non paucis annis, in sedili somnum capere debuerat. Ceterū curatur orthopnoea, vt asthma: venæ sectio adhibetur vti in asthma, si vires admittant: materia deinde digeritur, prout tenax est. Verum licet ea sint adhibenda, quæ humorum crassitudinem ac viscositatem attenuent, incidant & detergant, ea tamen rursus tussim mouent, vt ex 7. de cōp. med. secundū locos & 5. de simpl. med. facult. constat. Bechicis etiā opus erit, sed non iis, quæ materiam incrassant, verū opus habent multa humectatione, vt melius expectorent: quale diximus esse melicratū, oxymeli, & ptisanam: & ideo etiam Aetius a multū calidis, tum Galenus, abstinebant, ne calore viscosiores & glutinosi humores difficulter auellerentur, vitādo & refrigerantia & astringentia. Ideo & scillā assam cum melle laudabant, nos syr. de hyssopo, glycyrrh. de prassio, mel. ros. antea laudauimus. Deinde purgationē ex cassia, agarico

trochis. & diaphœnico. Postea & clysteres validiores ad aluum eluendam: quales & Donatus commendat, mox & diapenid. diahyssop. diaireon. Extrinsecus cataplasmata, iuxta Paulum, Aetium, ex ficibus, hordeacea farina & loliacea cum resina & melle imponenda: vel vnguentis & vaporibus calidioribus vtendum: quorum copiam inuenies apud Guainerium cap. proprio. is iubet abstinere a fumigiis, quæ arsenicū continent. Non desunt, qui & vstiones & cauteria laudant: quale & ab Aetio describitur lib. 8. c. 57. de Asthmate. Si ex tuberculo, eadem fere conueniunt, quæ in cruda, viscida, pituitosa, vt Galenus Antipatro (4. de loc. affec.) præscripsit, qui grandines expellebat, quamuis tandem mortuus. Si per consensum, vt a materia venenosa vel vaporibus venenosis, curatio eiusdem est causa abscessio: vt si ab vtero, eidem succuratur. Si a causis externis, vel ab aere corrupto, amoueantur, excitentur: vinum sorbeant vel aquam cinamomi: si ab internis abscessibus, illi quoque curentur: si a ventositate, resoluatur: si ex gibbo, recurratur ad chirurgiam. Reliquum curationis apud alios auctores longo sermone inuenies:

OBSERVATIO XI.

De cruento sputione sapius recurrente.

1 Monachus quidam ex Diui Francisci ordine, iuuenis annum trigessimū agens, sputo cruento quorannis tere, tum destillatione, Alcmariæ afficiebatur. Huic statim, cum eum ad-
iissem, venam internam basilicam tundere iussi: Deinde aluo soluta cum cassia, cui pulueris rhabbari exiguum adiectum esset boli modo. Etiam per os decoctum herbæ acetosæ, plantag. polyg. portulacæ cum syrup. ex portulaca commode propinaui. Insuper eclegmata sapius gustabat ex syrupo myrteo, portulaca, holo armeno vero & terra sigillata, ac zaccharo penidiarum inspersis, capiti quoque ob destillationem, qua frequenter laborabat, quæque tussim incitabat, cucurbita imposita ex mastiche, ros. siccis, sandaraca. Quibus remediis hic probe curatus fuit: quem admodum & alter Alcmarianus, qui in vere potissimum solitus erat sputo cruento laborare, idque ex plenitudine quadam. Huic vere incipiente statim sanguinem detraximus, mox & aliis commodis remediis exhibitis, optime conualuit, cui & anno sequenti antequam sputum appareret, vere quoque incipiente, cum sanguis detractus esset, in posterum ab hoc malo præseruatus fuit. At valde cuidam tussienti, cum sputum sanguinis redderet, post venam sectam ad vncias quatuor, imperauimus, vt paulatim lambendo hunc linctum deglutiret, quod egregie profuit: *℞ conserua rosa. antiqua, electuarii diarrag. frig. an. ʒj. ʒi. boli arm. veri, lori cum aqua rosa. ʒij. amygd. ʒij. excipiantur cum syr. iuinibino & myrteo, & fiat eclegma.* Multis quibus sputum valde copiose reddebatur, neque medicamina iuuabant, drachma vna philonii Perfici cum aqua plantag. & portulacæ ante cibum propinata profuit: vti & ius frigidum decoctorum ziziphorum, in quo candens ferrum extinctum fuerit: omniaque actu frigide sumenda.

S C H O L I A.

3
αἱμοπτοῖς.
αἱμοπτύσις.
αἱματέπτυσ-
σις.

Sanguinis excretio quæ a Græcis αἱμοπτοῖς, & αἱμοπτύσις, & αἱματέπτυσσις, nūcupatur, a Latinis sanguinis exspuitio, seu reiectio, seu cruenta spuitio dicitur. Dicitur enim αἱμοπτοῖς, ἀνωφύγειν Græcis, quasi ἀνω φέροντες, sursum ferētes, qui ex inferioribus partibus per os sanguinem reiciunt. Et sic cum ad tussis genera quædā facile sanguinis sputū accidit, insuper & ad disrupta tubercula, ideo de hoc affectu quidam post tussim agūt: qui quidem affectus ineuitabilē saepe mortem inducit, non quidem subitam, sed diu misere contabescēte corpore. Et quod ad hunc affectum atinet, cum multiplex sit, ut de sanguine profluente narib. diximus, & cum symptoma sit potissimum in exeremētis, cum excernatur id, quod nō debet, & ea parte, qua non debet, ideo & hæc cruenta spuitio, nō modo inter alias sanguinis expulsionēs, verum etiam inter alios præter naturā affectus difficilior existit: nam pessimorum longorumq; morborum magna ex parte causa redditur, Alexandro teste capit. primo, libro septimo. Nam

4
Quis præter naturam affectus sit cruenta spuitio.

quælibet sanguinis eruptio toto genere præter naturam esse censetur, eo excepto sanguinis fluore, qui mulierib. ab utero defluit, cum videlicet, modum in quātitate non exceſſerit, ut 3. de caus. symptom. Galenus testatur. Nulla enim excretio sanguinis a natura est instituta, excepta ea, quæ per menses fit. Quod si 5. Aphorif. 33. solum profluuium e naribus laudatur, intelligit Galenus comparatione aliorum, quæ ex ore fiunt: quoniam ex eo, aut nulla, aut facile euitabilis noxa adest: neq; quātum in se est (ut etiam doctissimus Iacchimus medicus annotauit) noxam facit, sed fere multitudine excretionis. Sed de sanguinis profluuium narium prius dictum est. At hic affectus (de quo nunc loquimur) ex ore quælibet sanguinis excretio est. Sed rursus sanguis ex ore profluēs, de multis partibus euenire potest, unde & Prognosticon quam maxime euariat & curatio: hinc primum oportet distinguere, quæ sit pars quæ afficitur, & qua sanguis profluit. Partes igitur hæ sunt, iuxta Ga-

5
Partes affectæ ex quib. sanguis per os excernitur.

len. 4. de loc. affect. (quem & alii Græci tum Arabes ac Latini sectari sunt:) nam aut e gula, ventriculo, aut spiritalibus partibus, thorace videlicet, pulmone, seu aspera arteria, aut ex faucib. & gurgulione, vel ex ipso proprio ore, seu ex gingiuis expellitur: per narium etenim communes palati meatus in os descendere potest: secundo a faucium venis: tertio a lingua & gingiuis, ut lib. 14. Observat. ostēdimus: quarto ex pectore, vel pulmone, venis, arteriis: vel ab arteria ipsa: quinto e stomacho, qui etiam distinguitur, quoniam vel a lienē est, vel a iecore, vel a mesenterio. Vidimus nos & ab utero mensibus repressis sanguinem per os regurgitasse, ut suo loco sumus dicturi. Illud tamen animaduertēdam, ut inquit Cælius Aurelianus cap. 9. libro secundo. quod differt fluor sanguinis a sputo. quod neque fluor sanguinis sputus dici potest: parua enim materiæ significationem sputus refert, fluor plurimæ: neque sputus sanguinis fluor, supradicta ratione: Paruam enim mate-

In quo differt fluor a sputo sanguinis.

riam sanguinis ex gingiuis, aut venæ, aut faucibus emissam, sputum magis quam fluorem recte nūcupamus. Differt ergo fluor a sanguinis sputo, ratione plurimæ aut exiguæ quātitatis sanguinis ac partium diuersarum, ex quibus profluit. Hæc omnia exemplis infra dicēdis clariora euadent: etiam methodus distinguendi affectam partem illustrior fiet.

O B S E R V A T I O XII.

De cruenta sanguinis floridi spuitione ex vena raptā pulmonis per tussim validam.

Theodoricus de Loey, Regius consiliarius, annum 32. agens, cum apud Haghanos sanguinem floridum valida tussi exspueret, (Nieuenius medicus in curatione assistebat) me atque Cornelium Ericium collegam meum ad consultandum de huius sputi origine vocauit. Ex signis tunc presentibus vnanimiter conclusum est, hanc sanguinis spuitionem cum valida tussi originem suam habuisse a vena pulmonis disrupta. Ideo ter sanguis per vices exigua quantitate ex cubiti vena interna detractus est, iuxta Galeni decretum 5. methodi medendi. Verum cum non perpetuo, sed subinde talem reiectionem sanguinis pateretur, imperauimus, ut æstum, soles, ignem, puluerem, thermarum æstuationes, sulphuratas aquas, frigora, niues, septentrionum flatus vel Euri calidiores vnice vitaret: mororem præcipue, cum gener eiusdem Adrianus Leydius Pensionarius Delphensis tabe laboraret, in cuius ædibus hanc spuitionem contraxerat. Insuper consulimus, ut declinaret iras, iurgia, contentiones, clamores ac vigilias, minimeq; purpuram & coccum, ex Galeni sententia, intueretur. Acris quoq; omnia & salsa & amara & supra modum acida in cibis damnaui-mus: licet & concesserimus moderate vnam acerbam, citrea & mala punica mediisaporis. pruna & acris cerasa, similiter & thus Syriacum in condimentis, panem quoque similagineum, oryzam, far, punicum, milium, lentem, fabam & amy-lum: carnem agninam, vitulinam, veruecinam, hœdinam, omniumque intestina, iecora, pulmones, cerebella, perdices, coturnices, phasianos, atragenes, turtures, tardos, merulas, pauones, pullos, alaudas, & his similia, sed in parua quantitate: nam abstinentia hos iuuat in principio, ne abscessus immineat: præterea & cotonea mala, quemadmodum & pyra & sorbas, & mora admissimus: cum & alii mespila & palmulas, & myrti baccas extollant, & ex hortis portulacam, cucurbitam, endiuia, lactucam, cichorium sine aceto. Lac item decoctum, exempto butyro, quod & mancie confectis prodest: quidam & in eo commode candente ferro vtuntur. Dedimus & caseum recentem (nam sine sale valde efficax habetur) & oua sorbilia postea, triticeamq; pultem ex eodem lacte: alii ex vino austero dant, vetulum tamen minime prodest: quibus addunt & vinum rubrum in parua quantitate, modo febris absit, postea admixta aqua ferrata & cœlesti. Valde damnaui-mus & Venerem & crapulam & famem: somnum au-

tem lon-

tem longiorem concessimus, & ut erecta ceruice dormiret, aut in latus incolume, iussimus. Et ita proba victus ratione huic symptomati congrua præscripta, & adhibitis remediis incrassantib. sanguinem & refrigerantibus, ut syr. de portulaca, myrtino, ex pap. cum aqua plantag. & ungula caballina, & decoctis & eclegmato, ex syr. de portulaca, diatr. frig. & bolo armeno vero, prius repurgato ex ʒj cassia & ʒj. rhab. pul. in bolo, bene habere cepit. rotulis quoque paulatim in ore detentis & deglutitis, in hunc modum præscriptis: ʒ amygd. dulc. vitæ prius repurgatarum, amygd. an. ʒj. ʒ gummi eragac. ʒ ʒ gummi Arabici, boli armeni veri. an. ʒ ʒ. semin. plantag. portul. pap. albi an. ʒj. pulverizentur, solvantur cum aqua ungule caballina, equiseti plant. adiecto Zacch. q. s. fiat confectio solida in rotulis ʒij. penderantibus. Interim a melle & zacchari usu nimio abstinere iussimus: nam huius usum frequentem nocere auctores inuenere. Dedimus in maiori copia confer. rosar. Quibus cum usus aliquantisper fuisset, quæ sanguinem incrassant, infrigidant ac moderate restringunt, & glutinationem quandam habent, optime habuit. At post aliquot dies id victus genus pertæsus, dum & solibitiones ex hordeato amygdalato relinqueret, & liberaliore victu præter nostrum institutum vteretur, & minus conuenienti, rediit sputum eruentum, ita ut omnino relictis nostris remediis alium medicum, alioqui doctissimum, ad se vocauerit, qui cū Nieuenio (ut nobis postea relatum est) disputationem coram ægro iniit, & non venam sed arteriam pulmonis ruptam esse proposuit. Quod si ita res habet, inquit Nieuenius, æger procul dubio moriturus est. Ceterum de venis aut arteriis ruptis, licet copiosior sanguis erumpit atque spumofus, calidior ac reliquo sanguini similior, is clarus ac tenuis reicitur. At nos aliam differentiam in ipsis deprehendimus: ex arteriis dilucidior subito & leui causa effertur spumofus, antecedente quodam caliginoso vapore: qui licet in parte externa saliendo videatur exire. Id minus in pulmone cernitur: sed ex pulmonis materia vniuersus sanguis spumofus ex omni parte videtur subrubicundus. Sed cum nostra deinde & Nieuenii remedia relinqueret: sola alterius medici opera usus est. Verum cum & ille postea parum proficeret, sputo sanguinis sæpe redeunte, eundem quoq; reliquit, & tandem spretis omnium optimorum medicorum præfidiis, suo more vixit, ita ut tandem in tabem inciderit: tunc demum Amstelrodamum profectus, adiit quendam Empiricum valde famosum apud vulgares in lue Gallica curanda. Nobilibus quibusdam ex curatione cuiusdam Grandii, quem a morbo Gallico restituerat, innotuerat: hunc consiliariū iam tabe confectū hic curandum receperat, qui sibi (proh dolor) male cōsulens, breui admodū tēpore in huius Empirici manib. occubuit.

S C H O L I A.

12
Methodus
distinguen-
di affectam
partem.

Quoniam a diuersis partib. sanguis reicitur, diligēti methodo pars affecta erit distinguenda, ut egregie nos admonuit Galenus. Ideo operationes lætas primo cōsiderabimus, si quæ sint, quæ

sensibiliter lædantur, ut motus prauus, cuius sint, exempli gratia, respiratio: num concinna sit, & secundum naturam, an contra se habeat, si enim vitiosa sit, aliquid ex instrumentis illi seruientibus laborare est necessarium, arteriam scilicet vel pulmonem, vel thoracem, vel septum. Postea excrementa spectabimus, atque in primis excernendi modum, num cum tussi, an sine ea fiat. Qui enim cum tussi sit, ex membris spiritui deseruientibus educi videtur: & ratio est, quoniam vias spiritus ingreditur, & eas occupat, vnde irritatur natura ad propellendum, & hoc signum fatiscit quibusdā, ut Rhafi & Auicennæ, sed signū est inefficax. Etenim, (ut Gal. 4. de loc. affect. habet) is, quia faucibus sit, omnino a capite descendit, tussim facit: id etiam nos in praxi sæpe obseruauimus: vnde plurimi tum vulgares, tum medici frustra sunt perterriti. Idem præceptor meus Benedictus Fauentinus cap. proprio nos admonebat ex decreto Galeni, cum sanguis aliquando ex cerebro & gurgulionis partibus internis affatim descendat, & subito gutturi irruens (quod caput est aspera arteria) tussim moueat, & deinceps tussiendo per os educatur: quo fit ut sanguis is a spiritali instrumento cū tussi exeat, nullo disrupto in eo se, ita ut instrumenta spirationis primogenia affectione nō lædatur, sed solo defluxu materię a cerebro ad spirationis vias: id o diligenter nos adhortatur præceptor meus, ut illud diligenter notemus, cum viderit præstantissimos medicos, hanc eruptionē periculosissimam fore pronuntiantes, ut exesa vena in organo spirationis vel pulmone, prædicat inde phthisin ac mortem, cum tamen altero aduentante die æger sanus euadat, medici iudicio errante, ipsiq; in vulgi fabulā concidente. In contrarium & illi labuntur, qui sanguine a pulmone prodeunte, & cum aliquid sanguinis ad nares regurgitatur, sanitatem promittunt, nō diu post phthisi subsequente ac morte. Atq; is error peior est prior. Quare hoc vnico præcedente signo iam dicto non erimus contenti, considerabimusque affectionem, num per consensum pars aliqua sit affecta, ut caput, & num ex aliquo loco oris, aut gingivarū (ut antea ostendimus) simplici exspuitione exspuatur. Quod si quid per nares feratur, clarior res erit: caput vero vel cal factum, vel omnino dolens hoc mittere solet, & quamuis subito ex gurgulione in pectus irruere possit, ut nunc diximus, verum ex dicendis patebit, qua via id interstingui valeat, quāuis nonnunquā etiā accadat, ut plurib. ex ordine diebus (quemadmodum & antea meminimus) quispiam sanguinē excreet & emungat, idq; citra capitis vel dolorē vel grauitatē præsentē, siue præteritam, neq; aliquo præcedente ictu, propter deuoratā hirudinem, in ea oris parte adherentē, qua ad nares foramē tendit. Quare hanc partē, & o ū per nares meatū accurate, & sæpius considerare oportet: præterita quoque semper interrogando: namq; ex his rei ipsius veritatem facile conicies: eadem ratione ex ventriculo quoq; epota hirudine, cruor euomitur: verum is siue ex ventriculo, siue ex naribus, siue ex ore feratur, te-

15 *Tussis prae-
cipue conside-
randa in san-
guinis sputo.* nus erit, sanieiq; speciem referet, eodem Galeno teste. Ceterum si per consensum in pectus sanguis prolabatur, sicuti intuenti ad solem hirudo affixa faucibus inspicitur, ut & sanguinolenta fauces & gurgulio, si inde excidat: sed & tussis leuissima erit: solum enim leuis quaedam gutturis proritatio est: motus vero excernens scretus: cognoscimus aut, non posse ex tussi adeo leui quippiam ex pectore educi. Quod si sine tussi, ut scretu, vel vomitu, statim certo scimus, ex pulmone aut pectore non esse, & ita arguere negatiue est validius. Distinguere igitur, num ex faucibus, an ex pectore eueniat, coniectura certa non est: ideo saepe medicos inter se certare videas, ut Iacchinus referebat. Verum idem mox addit: Sed ex multis praecedentibus conicitur, praeter operum laesionem, quam diximus, puta ex affectibus capitis, partium oris & pulmonis vel pectoris, neque enim subito ex his fertur sine aperta causa. Ceterum ex faucibus & gurgulione (*ut libro praecedente ostendimus*) scretu effertur: vel ipsis primario affectis, aut per consensum a cerebro sanguine ad ipsas partes contingit. Verum si a capite (*ut & Donatus ex Galeno annotauit*) descendat, praeter id, quod scretu, seu tussi interim iniicitur, aderit ipsius palati titillatio, ac frequens excretio, irritantur aegri ad tussim, licet non valde tussiant: praesertim ubi quippiam subito gutturi irruat: aderitque capitis grauitas, aut calor, aut frigiditas, aut dolor. Ex dolore vero sedes affecta dignoscitur, ut circa fauces & guttur: dolor, pruritus, titillatio, si ex partibus capitis aderit & aurium sonitus, faciei rubor, venae frontis emicant, vertiginesque accedunt, praecessitque nimius capitis ictus, frigiditas vel calor, seu ebrietas, interim consueta per nares sanguinis excretio cohibita. At si absque his cum scretu sanguis educatur, faucesque seu gurgulione sanguinolenta inspexeris, atque veluti exulcerata, eas partes per se affectas esse non dubitabis: de quibus & antea diximus, de gingiuis sanguifluis, veluti si simplici exspuitione sanguis expellatur, ex ore seu gingiuis profluit, ut recensuimus, nec minus sensus diiudicat. Interim vero accidit, ut a capite per gulam, seu stomachum sanguis in ventrem defluat, vomituque reiciatur. Verum praeter id, quod cunctatam dicta capitis symptomata praecedunt, sanguis hic leuis, aequalis, atque immixtus erit, nec adeo crassus, & colore nigro, & cum excreatione statim se in linguam infert, rotundus, facileque reicitur per sputum. Sed de aliis partibus ad ventriculum facilis, & certa est agnitio. Nihil enim sine vomitu ex eo ferri potest. Si enim e stomacho educitio fiat, praeterquam quod vomitione excernitur, non magna erit sanguinis eruptio, graciles etenim sunt stomachi venae, ut inquit Aetius, & cum nausea quoque sanguis effertur, ac in deglutiendo mordacitas percipitur, maxime si adstringentia aut acris deglutiantur. Si vero ex ventriculo educatur, nausea plurime comitantur & vomitus: & si a cibo sumto educitio contingat, sanguis cibis permixtus, aliquando etiam pituita & bile efferetur, ac si hepate vel splene sanguis in ventrem deferatur, & ex eo demum vomitione expellatur: in alterutro viscere aderit

16 *Ex faucibus
& gurgulione.*

A Capite.

17 *Ex ore san-
guinis.*

Ex stomacho.

18 *Ex ventri-
culo.*

tumor, ac dolor, ipseque sanguis grumosus, ac niger erit, & magis si a splene, ac si ex pectore, ibi dolor aliquis erit. His ita spiritalia instrumenta (*ut paulo ante diximus*) distinguimus, sed adhuc certi non sumus (*ut recte dicebat Iacchinus*) quoniam pars laeoret ex his. Quod igitur ad actiones attinet, exiguam nota & obscura haberi potest, clarius vero ex excrementis: primum ex modo. Nam tussis minor multo ex aspera arteria; vehemens & diutina, ex pectore, medio modo quae ex pulmone; semper enim e longinquiore spatio motus quoque diuturnior est si eadem facultas moueat, maior etiam vis; quoniam per angustiores vias pertrahi sine debet, extremas scilicet bronchiorum scissuras. Deinde ex qualitate eorum. Nam spumofus sanguis efficacis coniectura est, quod ex pulmone proueniat, & est signum Hipp. 5. Aphor. 13. Ibi vero Galenus ait, non esse signum pulmonis absolute: Nam saepe, inquit, eductus est e pulmone, ob externas causas irruimpentes, bene coloratus & plurimus sanguis: unde eum e vase rupto educi est verisimile: sed significat, inquit, esse ulceratam veram pulmonis carnem. Et quidem in animalibus dissectis apparet, incidenti eius substantiam, eiusmodi sanguis emanare spumae similis, id est, bullis exiguis plenus, & albicans ex rubro. At 4. de loc. affect. dicit Galenus efficax esse signum: Ceterum esse efficacis signum est (*ut sentit Iacchinus*) si ex spuma de pulmone arguamus, sed non negatiue: quoniam a vasis pulmonis spumeus non educitur. Aliud vero ex colore sumitur, qui tamen obseruari debet, cum in praesenti educitur astante medico. Etenim, qui ex pulmonis vasis, bene coloratus est, inquit, Galenus 5. aphor. quo verbo & spumeum excludit & pectoris: spumeus enim bene coloratus non est, quoniam albicat: qui vero pectoris, bene coloratus non est, quoniam nigricat: At qui in pulmone, egregie sanguinis naturam refert, quoniam est maxime elaboratus, & florentem illam purpuram repraesentat: tali enim sanguine nutritur, ut 5. de usu part. habetur. Praeterea sanguinem a pectore latam, necesse est liuidum exspui, & admodum alteratum, quod a longinquis aduenit: etenim & extra vasa fertur, & in bronchiis diu manet, unde & trumbosus fit, & color mutatur. Ille vero tenuis, & floridus, quod cito educitur, & tali secundum naturam colore est. Attamen iuxta Iacchinum, dubitatur primum, num ex spumeo sanguine efficacissime significamus pulmonis vlcera, quoniam Auicenna dicit, etiam ex pectore talem educi, & ex arteria: unde multum laborant expositores: sed reuera nisi iungatur aliquando pituitosum sputum, non repraesentat spumam, neque undique quasi spuma quaedam visitur: magis tamen ex calore & colore distinguitur, ut Galenus quinto meth. & ratio distat. Propterea quod e vicinis vasis egreditur. Dubitat & de thrombis, & fabulantur multa. Etenim non cogulatur, nisi in bronchiis, ut querendum non sit, quomodo coagulatus subeat poros pulmonis. Ad excernendi etiam modum attinet considerare, num facile vel difficile, sic enim conicimus ex pectore, vel pulmone: ut si confertim

*Spiritalia
membra
affecta quomodo
distinguen-
dum.*

19

20

21

fluat, ex pulmone potius: contra ex pectore, mox ex doloribus, exiguus in pulmone est, aliquando nullus, ubi caro eius interna afficitur. In pectore dolor adest ob membranosam & musculosam substantiam. Sed huc vsq; concludimus, excludentes pectus: sed num ex arteria, vel pulmone? Signum primum erit ex modo excernendi; nam exiguus est, qui ab arteria & leui tussi educitur. Secundo ex doloris situ. Ex spiritalibus itaq; partibus, licet tussi eiiciatur sanguis, inuestigandū tñ erit, num ex thorace, pulmone aut aspera arteriaeductio fiat: namq; si thorax affectus erit, neq; multus, neque ruber sanguis erit, sed nigricans ac grumosus, ac minus calens, ceu e longinquo veniens. Dolores insuper circa eum intensiores sunt, cum ad ipsum multi adueniant nervi, quibus facile dolores percipi possunt: musculis præterea cossibusq; thorax abundat vt inquit Gale. Interim sanguis, qui ex thorace effertur, foetidū odorem de se præbet, & aliquando pure admistus est. Si vero spumās & subalbidus, floridus, feruēs, confertim, multusq; citra dolorem (vt Cypriano medico collega nostro, qui postea ad tabem deuenit & moriē) aut eo multo remissiore existente, cum tussi sanguis reiciatur, pulmonē affectū esse norū est, ex eiusdem Galeni sententia, tum 4. de loc. affect. tum 5. meth. medendi. Est namq; pulmo laxus & ab affectione tutus, a 6. dantaxat nervorum cerebri coniugatione duos per q̄ tenues nervos per eius membranā dispersos excipiens, qui haudquaquam per visceris profunditatem extenduntur. At si paucus sit, qui cū tussi sanguis effertur, ægriq; doloris sensum iuxta aliquam arteriæ partem percipiant, sitq; sanguis sic quodammodo pure permistus, aderitq; etiam paucitas sputi, ac tussis nō valida, aspera arteria affecta erit. Hæc prius considerata, antequam curationem instituamus. Quæ, inquam, omnia clariora euadent exemplis infra dicendis.

OBSERVATIO XIII.

De sputo sanguinis ex compressione & vena rupta in thorace.

Tribus modis, vt iam alias diximus, e vasis sanguis profluit, aut eorum osculo aperto, aut ipsis ruptis, aut erosis. Quod si ex vasorum ruptura fiat, ex multi sanguinis fluxione ac confertim facta deprehendimus; idq; ab externis vel internis causis: vt si quis ex alto, vel in ludo, vel certamine ceciderit: aut cum alter super alterum cadit, vel ex inanimatis corporib. aliquod graue, vel lapis vel lignum hominem offenderit; item cū ira cum exclamatione præcessit: citharædis quoq; ac tragædis certantibus acuta vehementiq; voce vasa interdum rumpuntur, ubi vehementer clamare conantur, nō præmissa pulmonis lenitione per præcedentes exclamations, vt testatur Galenus. Et quod ad causas externas attinet, quarum nunc v. num exemplū adferemus, facile ex his, quæ præcesserunt, & sermonibus ægri percipiūtur. Sic anno 1566. mense Maio cum currum regeret Leonhardus Nicolaus Delphagius rusticus, equis concitatis, ex curru excussus est, atq; intra murū circa thoracem compressus, vt duæ costæ quasi con-

fractæ ac compressæ fuerint, sputo sanguinis subsequente, eoq; nigricante satiq; grumoso & minus calente, vt quilibet facile conicere posset in thorace venam aliquam ruptam esse, tussi valida etiam superueniente. Chirurgus hanc primo tractabat. Verum cum circa tertium diem dolor ingens thoracē occuparet, & tussis satis valida esset, minusq; sanguinē cum sputo redderet, neq; venæ sectio facta esset, neq; vllū medicamentū exhibitum, & iam tertius dies esset, quod aluū non deposuisset, libenter clysterem iniecissem, & in eo statim venam secuissem, cum nunc prius ad illum accitus essem: quamuis id ab initio prius factum oportuerit. Clysterē noluit admittere. Ideo vt dimidium huius potionis statim a meridie, (cum eo tempore vocatus essem) sumeret, mandavi. ℞. canliū rubr. sanicula artemisia, vngula, caball. garyophyllata, an. m. j. capill. Ven. polytrichi, hordei mundat. an. m. ℞. sem. 4. frig. maior. seminis nigella, an. ℞. j. folior. senæ ℞. ℞. rhabarb. selecti ℞. j. schoenanthi ℞. j. uuar. passul. enucl. ℞. j. liquiritia rasa ℞. ℞. bulliant in aqua communi pro ℞. viij. huius fortiss. express. dimidiū capias, in quo dissolue elect. lenit. diacathol. an. ℞. j. mumiæ ℞. j. syrup. ex infus. ros. oxymellis simplicis (ne sanguis in pectore grumosus fieret) an ℞. ℞. misc. Fuit autem exhibitum statim a meridie; multaque excrementa putida & male olentia, instar sanguinis concreti, deiecit; dolore thoracis nōnihil sedato. Mane tamen (ne febris subsequeretur, & propter sputum cruētum) secta fuit vena ex vena basilica in brachio, e regione costarum dolentium. Si in principio aduocatus fuisset, statim post venæ sectionem, id quod sequitur dedissem. ℞. mumia ℞. j. rhab. torrefacti, boli armen. spodiæ, terræ sigill. an. ℞. ℞. syrup. cydon. ℞. ℞. aqua plantag. quer. ℞. misc. hanc potionem commendat vnice Guainerius cap. proprio in sputo sanguinis ex casu, offensione vel percussione. Ceterū die subsequenti cum dolor adhuc in pectore hæreret, reliquū potionis sumsit, ℞. j. senæ adiectis, & expressioni syrup. capill. ven. ad ℞. j. immixto, & ter plurima excreuit, & dolor sedatus est, sputo sanguinis cessante. Post inunctionem prius olei ros. & myrtei, postea & olei hypericonis, chamomillæ, costis in fine adhibuit chirurgus oxycroceum: & bene habuit.

SCHOLIA.

Haud noui (inquit Alexander Trallianus) an alius æque difficilis sit affectus, ac sanguinis excretio. Non enim ipsa per se, dum immoderatam vacuationē inducit, vitam adimere consuevit; sed pessimorū longorumq; morborum magna ex parte causa redditur. Quare incumbendum est, vt vitium hoc prius intus scamus, vnde causam traxerit, & quo in loco inciderit: atque ita curationem tentemus, neq; eam differamus. Quippe mora & dilatio cum in omnibus morbis nociua sit, tū vero magis in sanguinis educatione plurimum nocet. Scire hic ante omnia conuenit, sanguinis reiectionem tribus de causis palam excitari, vasorum ruptura (aliqui φησι μοχασμον Græce appellant) cuius nunc exemplum posuimus, aut erosione (Græci διάβρωσιν vocant) vel cum

22
Si ex spiritalibus partibus.
Signa ex thorace.

Ex pulmone.

Ex aspera arteria.

2

3

4
Sanguinis reiectio.

5
Si ex vaso-
rum ruptura
fiat, signa &
caussa.

ora referantur (Græci nominant αἰμασίμωτον) vel cum sanguis raritate sua transcolatur sudoris instar (Græci διαπιδνωτὶν dicunt) ut etiam antea de sanguinis narium profluvio annotatum est. Ruptura itaq; vasorum vel in pectore, vel in pulmone facile cognoscitur, ut nunc exemplo ostendimus, ex aliqua causa primaria seu externa præcedente, casu, ictu vehemēti, aut si pondus aliquod graue æger sustinuerit: aut etiam a causa interna, quā nunc hic addemus, ab ingenti frigore, in quo æger versatus fuerit, aut ex plenitudine sanguinis, aut ex flatibus distendentibus. Potest enim (teste Galen. 4. de loc. affect.) nulla ex prænarratis manifesta extrinsecus adueniente causa, vas aliquod, tum in ceteris corporis particulis, tum in pulmone dirumpi, ob sanguinis abundantiam, vel per se, vel una cum crudo & frigido & flatuoso spiritu venas extendente, cum videlicet vas ipsum extensioni resistit, aut ob frigus a vicinis partibus contractum, aut ob innatam intemperiem, quemadmodum & ipsa aqua frigida, Hippocratis auctoritate venas frangit. 24. Aph. lib. 5. verum non per se (ut doctæ etiam annotauit Altomarus) ruptiones facit, sed quia venarum tunicas frigiditate sua duras, & extendi contumaces reddit, & ut rumpantur paratiores efficit. Erit igitur ruptionis causa, aut externa, ut quiuis vehemēs motus, aut humorum abundantia, seu sanguinis copia, ut diximus: utrisq; vero comune existit sanguinis effusio repente. At quæ sanguinis reiectiones exeso vase eueniunt, diabrosin Græci vocant: Primū sane (inquit idem Trallian.) inde cognosces, quod excretiones paucæ fiant: deinde cum vasa magis exeduntur, multæ simul vacuentur: postea vero & quod præcesserit, aut destillatio aut salforum, & valde acrium esus, aut tristitia immoderata aut inedia. Idem Paul' ait, quod præcedat acriū prauorumq; ciborum usus, vel inedia. Quod si etiam (inquit Trallian.) cum sanguine carnosæ quædam particulae siue membranosa permixtæ appareāt, sine dubio sanguinis reiectionē particulis, quæ respirationi inserviunt, exesis fieri existimandum est. Exeso itaq; vase sputa eructa non confertim, sed paulatim per intervalla reiciuntur. Solent enim, teste Galeno, præcedere sanguinis exspuitionem exigua sputa, atq; acres in pulmonem a capite fluxiones, si ab eo sanguis profluat: temporis vero diuturnitate, multi sanguinis inter tussiedū eruptio fit, ut 5. meth. & 4. de loc. affect. & potissimū si nulla præcesserit ex prænarratis externa causa: quocirca diligenter considerare oportet, num quippiam spumofum simul educatur: id enim efficacissimū erit indicium, quod propriū pulmonis parenchyma fuerit exulceratū, haud secus ac si bronchi pars quædam aut arteriæ, aut venæ tunica eiiciatur, eedem ipsius pulmonis partes exesæ erunt, quemadmodū aph. 12. lib. 5. & prædicto 4. lib. de loc.

6
Sanguis ex-
eso vase e-
ruptus.

7
Si ex vasorum
resectione
fiat signa &
caussa.

aff. scripsit Gal. Sin aut ore vasis ad aperto sanguinis exspuitio venerit, primum sane inde notatur (inquit Trall. & Galen. ante illum quoq; meminit, uti etiam Paulus postea) quod nihil eorū, de quib. prius dictū est, præcesserit, sed potius calidi-

oris humidiorisq; victus, & frequentium balnearum abusus: item ex eo quod æger in calidioribus edificiis præter consuetudinem, aut loco calidiorē imoratus fuerit. Nam si horum prædictorum aliquod adfuerit, sputūq; sanguinis modicū & paulatim fiat, sanguinis cursum patefacto vasorum ore accidisse cognoscitur. Hac igitur ratione causam, vnde sanguinis educio initium traxerit, internoscere potueris: locum vero vnde profluit, iam satis scholio præcedente enarrauimus. Quod si plura de causis & signis desideres, perlege caput proprium præceptoris mei Benedicti Fauentini in magna sua Praxi. Nunc aliud exemplum interponamus, ut ita melius quid certi de hoc malo minime contemnendo prædicere possimus, antequam curationem vniuscuiusq; absoluamus.

OBSERVATIO XIV.

De spuitione cruenta ex acri catarrho, pulmonis vasa, deinde & substantiam erodente, cui in fine etiam bronchia asperæ arteriæ in peluim euehebantur.

Iuuenis Alcmarianus supra annos triginta natus, cum ex destillatione acri erodente vasa pulmonis, longa spuitione cruenta laborasset, & variis usus esset medicis, in fine etiam me vocauit, cum bronchia asperæ arteriæ una cum sputo cruento in peluim reiceret; aliquando particulas substantiæ pulmonis corruptas. Cui mortem prædixi: nam cum ad eum venissem, vix per octo dies superuixit.

SCHOLIA.

Recte dixit Galen. lib. 4. de loc. affect. cap. 6. ob ractam erosionem sæpe plurimum sanguinem inter tussiedū fuisse reiectum: atque non pauci sic affecti pulmonis quasdam particulas simul cum sanguine eiecerunt. Quocirca diligenter considerari oportet, an spumofum quippiam educatur: Id enim efficacissimum fuerit indicium, quod ex pulmone facta sit excretio. Haud secus si bronchi pars quædam, aut arteriæ, aut venæ tunica, aut etiam pulmonis ipsius caruncula eiicitur. Quæ cum viderem, mortem prædixi, præter id, quod reiectioni sanguinis vlcera pulmonis superuenire solent ac consueuerunt, ut idem eodem loco dicebat Galenus, quæ etiam plerumq; & per se lethalia sunt. Scribit Dodonæus pictori cuidam, cum valida tussi non ex vase aliquo rupto aut ex pulmonis vlcere; sed ab ipsa pulmonis substantia ac parenchymate sanguinem nigrū adeo spumofum esse reiectum, ut concretus & vndeque porosus spongiam aut pumicem referre videretur: in quo reperta fuit pulmonis pars nigricans & sphacelo corrupta, in qua magnus & profundus sinus. Et ichthyopolam quoque, tum ceruicis coctorem, eundem sanguinem exspuif. se narrat, atque pulmonem eodem affectu corruptum fuisse: pictoremq; plusquam mensem superuixisse; ceruicis coctorem bis euasisse, sed in tertia exspuitione subito periisse; veluti & ichthyopola, qui & in sanguinis sputo defecit. De huiusmodi sanguinis sputo sensisse videtur Hippocrates Aphorismor. 13. lib. 5. Quicumq; aut, spumo-

Branchiæ.]

3
Cap. 24. Ob-
seru. med.
apud Rem-
bertum Do-
donæum.

Prognostica.

spumofum sanguinem exspuunt, iis e pulmone ductio fit. Nam qui ex vase disrupto, aut ulcere profunditur, haud quaquam spumofus apparet. Fatetur Galenus in commentariis se sæpius vidisse sanguinem plurimum bene coloratum exspui, quem ratio, ait, dicitur ex aliquo pulmonis vase prodire. Sed hunc spumofum fuisse non addit. Spumofus sanguis, vel, ut Hippocrates dicitur, naturam ac figuram eius retinet, unde abscessit. Pulmonis substantia laxa, rara & porosa est; talis & sanguis, quæ cum tussi profusum scripsimus: cui parenchymatis partem coniunctam & comixtam fuisse apparet. Hæc Dodonæus. At iuuenis noster etiam vlcus in pulmone habebat, etiã brôchos exulceratos, quas cum tussi & pure & subinde sanguine admixto reddebant, & nō diu post superius bat. Considerare igitur oportet, ex qua causa sanguinis fiat reiectio, & qualiscumq; fuerit affectus, ut eiusdem curationem statim aggrediamur, propter imminens (ut Paulus admonet) ex immodica euacuatione, periculū: siquidē copiose euacuatus sanguis, quemadmodū in his, qui iugulantur, mortē infert præsentaneā: si affectus remanet, in tabe transire minatur. Ceterum prognostica signa, primū secundum Galenū, & alios recte ex natura affectus distinguem: erosio enim grauius malū est, quoniam minus glutationem suscipit: est enim necessarium cauum vlcus esse ac sordidum, quod erosum est; aliqua enim tunc carnosā portio, tum membrofa perit. Namq; sanguinis euacuatio (Paulo teste) quæ fit ex his vasorum tunicis, nunq̃ commode cadit, facitq; valetudini, etiam si ex pulmone non fiat; etenim grauius nocet, ut Celsus dicebat. Simpliciter vero affectus resudationis minus est periculosus: nam ascingentibus facile sistitur, Gale. auctore. 5. method. Et huic in salubritate proximus est affectus apertionis: nam vacuatio multo humore sistitur: quamvis sæpe multitudine ledere possit, & etiam, quod non conuenienti regione vacuatur a natura. Aggregari enim & vacuari per eas partes commodum non est: tum ob tussim, quæ necessario sequitur, tum ob partem, quæ facile afficitur, si mala qualitate aliqua sanguis sit præditus. At diuisio continui ex aliis causis mediam naturā obtinet: nec enim periculosa est, ut erosio, nec secunda ad eo, ut apertio, & exsudatio: Simpliciter tamē periculosus admodum est morbus; quoniam Galeno teste, non facile glutinatur vulnus in his partibus, ob perpetuum motum. Quod si vulnus iam inflammationem senserit: unde & pus contraxerit, tunc multis modis periculum augetur: nam expurgari pus oportet, idque tussi, unde & continue vulnus dilaceratur motu illo violento: ideo, inquit, exigua spes salutis est. At in cruento vulnere spes est aliqua sanitatis: ex sede quoq; affecta secundo magnitudinem periculi coniciemus. Ex pectore enim minus periculosum profluuium, ut Galenus affirmavit: primum quod venarum vulnus, quod parua sit, facile coalescit; neque enim impedit sanguinis copia: quod si non sanatur primum, ut dicebat Iacchinus, sed vlcus faciat; at hoc

periculum non adfert, ut vlcus pulmonis. Nam & magna quoque pectoris vlcera sanantur, & restituitur caro, ut nos multis exemplis vidimus: Vlcera vero arteriæ ob siccitatem facile sanantur: plurimum enim ex erosione fiunt. At erosio sanatur, vbi putredo facile sistitur. Sicitur vero facile, vbi siccum præualet, ideo 5. method. eiusmodi partis vlcera sanari ait. Hic autem cum bronchia tussi redderet æger, tabe obiit; vbi vero iam phlegmonem contraxit vulnus, coniectura est ex tempore, primum, ex quo laborauit, mox ex febre, quæ necessario ad phlegmonem sequitur, ob visceris calorem & cordis vicinitatem, præsertim si pulmo sit. Demum & quod sanguis paucus, non florens, saniebus admixtus effluit, utpote qui iam putrescere incipiat. Hinc Hippocrates dicebat Aph. 15. lib. 7. a sanguinis sputo, puris sputum malum esse: nam purulentum sputum (ut Galen. in commen. refert) non omne sputum sanguinis sequitur, sed quod malignum existit: tale autem omnino est ex pulmone, ex quo proueniente sanguinis reiectione, ea quæ intra tres dies nō curatur, phlegmone deinde adueniente, omnino incurabilis affectio erit, potissimum si ex erosione ortū ducat, eodem Galeno teste 5. method. Ideo difficilis est iudicanda curatio eorum, quibus a pulmone sanguis profluit, ex Sorano, nō impossibilis omnino: hoc intelligendum esse puto, quod statim curetur nō subsequente phlegmone. Veluti rursus cuilibet patere poterit, sanguinem ex ore & gingiuis profluentē e ceteris minimum periculosum esse, quæ admodum si ex faucibus, interioribusq; partibus processerit, & metus maior est, & cura maior adhibenda, Celso etiã auctore: at si ex thorace sanguis profluat (ut iam dictum est) minoris est periculi, quam ex pulmone, ut edocti sumus 5. meth. & 4. de loc. affect. ex Gal. Quo fit (ut etiam Celsus testatur) quod modo minus, modo plus periculi habet sanguinis exspitio: etenim ex capite veniens fluor generaliter est curatu facilis: ex stomacho vel ventre aut faucibus, curabiles fluores approbat vlceratione factos curatione difficiles: ita & grauior atq; difficilior, qui ex pulmone fluit, ob iuge spirationis officium; ut videre quoq; licet apud Cælium Aurelium, lib. 2. cap. 12. Cur vero a 18. anno vsq; in 35. vasa pectoris & pulmonis rumpantur & sanguinem fundant, vide ad longum Benedict. Fauentinum præceptorem meum de signis prog. hæmopticæ passionis: qui hanc causam tum alijs aphorismos ad sputi sanguinis reiectionem pertinentes, longo sermone explicat.

OBSERVATIO XV.

De quibusdam ex casu, sputo cruento laborantibus & curatis.

SIMON monachus, portæ Egmondanæ Abbatæ custus, qui a vulgarib. Griseus abbas vocabatur, eo quod Abbatem quasi regere dicebatur, ex curru equis concitatis prolapsus, rota per totū pectus circumducta, animam quasi agere videbatur, sanguinē ex pectore extusiciens. Medicus, qui primo accitus erat, venæ sectionem prætermisit: interpositis aliquot diebus, cum & ego accitus

esset, venam libenter aperuissim, sed quia valde debilis erat, neq; venæ sectionem admittere volebat, mumia & spermatis ceti, an. ℥ss. cum cereuisia butyracea propinaui, pectore inuncto oleo ros. & myrteo, pulvere myrtillorū asperso, vti & Amatus fecit in D. Alphonso Alecastrensi, supremo apud Iuliū Pontificem Maximum oratore grauissimo, qui intra domū, q̄ trans Tiberim habitabat, ex equo calcitrone ceciderat, ex casu in collis versus spinam dolebat: quem locum, etsi nullus in eo appareret tumor, aut liuiditas nigrætieluc; ex oleo myrtino, adiectis pulueribus myrtill. & ros. inungi fecit, ac fascia optime fasciari: sequenti vero die, simili modo, quum circa eundem locum doleret, internam eiusdem lateris, vbi erat dolor, aperire fecit venam, & ex ea sanguinis vñcias quinq; fluere permisit; a qua sanguinis missione paulatim conualescere cepit, donec integram consecutus est sanitatem. Sic iuueni Leonhardi Cornelii cereuisiarij filio euenit, qui cum ebri⁹ currū regeret, pede a temone gliscente, a curru prolapsus est, vtraque rota per ventrem ac pectus circūuoluta; ita vt in domum semimortuus deportaretur. Ad eundem cum nocte accitus essem, in ventre inferiore potissimū dolebat, & in hypochondrio dextro: sanguinem extussebat, qui proculdubio ex pectore prodibat. Ilico post casum biliosa vomuit: & ab assumpta ptisana, quam prębuerā, & cibum crudum, vt ebrius, & potum quoq; euomit. Locum dolentem inunximus oleo rosaceo, cum neque liuor exterius, aut quid luxatum appareret. Mumiam & sperma ceti cū ebibisset, non retinuit. At mane crapula edormita, & experrectus ad se rediit. Venam brachii dextri internam secari fecimus ad vñcias quinq; sanguine extracto; & egregie profuit. Venit mihi tunc in mentem ægrotus ille apud Galenum, qui in palæstra graui plaga accepta, fere duas cotylas sanguinis exspuit, qui statim secta vena & adhibitis istis remediis conualuit, & in posterum superuixit. Verū cum noster hic iuuenis etiam in ventre doleret, cōmode post venæ sectionē enema iniicere mādauimus: aliisque remediis aptis, etiam per os sumtis, hic, vt etiam monachus pręcedens, curatus fuit. Quemadmodum & alius rusticus diues, Ysbrandus Paingius dictus, años supra 56. natus, vir robustus: qui cū in pago Limensi dicto, non procul ab Alcmaria fecerit in horreū seu granaria, spicas eum aristis conderet, ex scala pręrupta cecidit supra pect⁹, & collisus syncopē incurrebat, quē omnes moriturū putabant. Ingenti dolore eum circa pectus afficeretur, & sanguinem exspueret, ad eum accitus: ilico hoc quod sequitur exhibui, ℥. mumia. spermatis ceti, an. ℥ss. decoct. pectoral. ℥ij. mellis rosar. oxymell. simplicis, an. ℥ss. pauco adiecto butyro. quam potionē cum retineret, vena quoque statim secta fuit in brachio: pectusq; inunctum oleo ros. & myrteo, & alia commoda remedia adhibita, & hic pristinę sanitati fuit restitutus: vti & Vincentius monachus apud regulares Alcmarianos portę custos, qui similiter ex scala in pectus ceciderat, & spuitione cruenta afficeretur, post sectam venam, puluere

quoque adhibito ex mumia & rhabarbaro, quo Guainerius utebatur. Elideus pręceptor meus Bononię sequentem puluerem dabat cum decoctione pullę nigrę in sanguine coagulato a casu aut percussione, vt vidimus. ℥. mumia. & rhabarb. selecti, an. ℥j. rub. tinctor. ʒj. misc. læpe enim obseruatione conspeximus periculosa signa in sanguine conglobato in pectore aut pulmone hærente, cum extrema frigore corriperebatur, & venarum pulsus interciperetur, anhelusq; creber fieret, anima exitialiter deficiente. Nec mirū hoc alicui videri debet, quod humor naturę familiarissim⁹, tam subito effusus speciem veneni gerat. Ideo in sputo sanguinis, siue ex casu, concussione, collapsione aut vulnere, aut etiam alio modo oriatur, quatuor semper timenda sunt: primum, ne nimis superfluat, secundum, ne sui multitudine subito suffocet: tertium, ne in aliqua parte coaguletur: quod maxime obseruandum est, si ex percussione fiat: Quartū, ne sequatur vlcus propter ipsi⁹ sanguinis constrictionē & putrefactionem, aut quia vulnus non consolidatū, fiat vlcus. Sed quia hæc etiam ad chirurgiam pertinet, de iis latius suo loco dicemus: quamquam hæc exempla hic potius ponere libuit, cum omnes isti prædicti etiam sputo sanguinis laborarent, & recte curati fuerint.

S C H O L I A.

CVM vero ad profluium sanguinis factum & ad cruentam exspuitionem accesserimus, & iam certi simus de affectu, quem variū esse diximus, atq; diuersam causam habere, non vnā & eandem curationem postulat, neq; vnā victus rationem, sed quodammodo diuersam: Nam aliter curatur sputum cruentum ex disruptione, cuius nunc exempla posuimus, aliter vero ex apertione vel reseratione vasorum: aliam quoq; curationem exigit erosio, de qua vltimo dicemus; cum priores duo affectus communem, quasi victus rationem desiderent, de qua pauca quædam adseremus. Aer itaq; frigidus, & ad siccū parū vergens confert, calidus & humidus declinandus: qua ratione & austrini flatus vitandi. Æstate ad frigidum inclinet, hyeme vel sinere vel temperatum eligere oportet: calidum enim qualecunq; fuerit, sanguinem fluere facit, Aphor. 18. lib. 5. Potius in obscuro loco degant ægri, & res atras inspiciant & fulco colore: lædit enim purpurę aspectus, præsertim splēdidæ. Somnus moderatus hic locū habet, præsertim nocturnus, diurnus vero fugiendus: caputque cubantis in sublime tēdat, præsertim, si ex spiritalibus sanguis profluat, neq; conclaue calidum & inclusum existat, aut mobile. Motus vero omnis interdicitur: non loquatur, respirationem cohibeant quantum possunt, quanto magis tussim? nisi vbi pectus expurgare opus sit. His enim magnopere cōuenit quies, securitas, ac silentiū, Celso teste. Idem & Gal. 5. methodi medendi vult, vt motum ac exercitium, præsertim vbi ex spiritalibus sanguis profluxerit, declinent, atq; vt magnam ac frequentem respirationem vitent, imo sensim respirent, semperq; silentium agant, ac reliquam omnem quietem eligant. Animi affectus immodicos omni-

Victus ratio

cos omnino fugiant, iram præsertim, pariter & Venerem. Nam omnes animæ vehementes motus nocent, quum & sanguinem & spiritus moueant, quæ conuenit esse immota. Quare (vt paulo ante diximus) somnus iuuat, ideo aliquando est prouocandus: non tamē ita, vt alie diu dormiant, ob sanguinis coagulationem in bronchiis, vnde postea non nisi multa tussi educatur. Alui quoq; excrementa quotidie natura aut arte, clysteribus præsertim lenibus, excernantur. Quod ad cibum potionemq; attinet, eligendi sunt, qui emplasticam vim habeant & refrigerent, eodem Galeno auctore. Atq; si valentior sit eger, omne fere nutrimentum circumcidendum erit; sin aliter, sorbitionis, quod satis est exhibendum, potissimum vbi pulmonis vas fuerit disruptum. Sit autem (inquit Alexand. Trallianus) omnis cibus, qui & leniter adstringat, & mediocrem vim obturan si habeat. Cremor igitur alicæ aut ptisanæ his est idoneus. Longe autem melior, valentiorq; erit sorbitio, si amyli frumentacei, & mali cotonei paulum cremoribus simul incoquas. Hoc namq; & obturabit magis, & leniter adstringere poterit: quod etiam maxime in iis requiramus, qui ob rupturam vasorum exspuunt. Inopia vero ptisanæ, etiam eo vtantur, qui apud Romanos vocatur farris cremor, vel eo, qui ex simlagine ipsa valenter decocta factus est. Item micæ panis tepida aqua imbutæ, & odorum luteæ, si quid aliud, his sunt accommoda. At neq; sorbitiones, neq; aliorum ciborum quippiam calidum offerre conuenit, sed omnia potius sint temperata, & ad frigidius declinantia; etiam actu, licet non vehementer (vt & Aetius admonet) neq; nimiam humectationem inferre debeant: pyro quoq; vel alio pomo austero incoctis, vel mali punici granis immixtis. Item placenta suminalis, iuxta Trallianum, non alienus his cibus est; sed & ipsa opitulari potest, si absq; sale & multo oleo confecta fuerit. Ex olerib. assumant ægri maluam, antea citra salē probe elotam; item lacteam decoctam, in poscam aquosam ipsam intingentes, similiter intybū & portulacam & arnoglossam, etiam Paulo hoc ipsum cum Tralliano iubente. Horum inopia post septimum diem etiam gallinas non admodum pingues sumant: quin & perdicum, attagenarumq; pectora comedant, nec non gallorum testiculos. Etenim præterquam quod valenter breui tempore nutriant, augeantq; vires, adhuc etiam laxigandi obturandiq; facultatem obtinent: Quod, si venter copiosiora excernit, assu quoq; citra salem sumantur: sic namq; comesti ventrem non perturbant, cum id, quod lerosum in eis est, inter assandum abiccerint: & præterea etiam suauiores redduntur. Iam anserum non adeo veterum alæ offerantur, nec non ventriculi ouæq; ipsorum, abiectis albiminibus. Etenim cum probe nutriunt, tum obturandi facultatem habent: sed non ægre concoquuntur, vt quidam calumniantur. Vbi sanguis etiam exspui desierit, etiam pedes suum, & pisces laxatiles, aceto inter coquendum adiecto offerantur: ex leguminibus autem halica, & chidron admodum decocta, eaq; ipsa ex longiore interuallo, & quum non ve-

hementer ægri febricitant. Nam vbi febris abest, etiam si lac simul incoctum ipsis dederis, nihil nocet; præsertim iis, qui etiam per sanitatē lac assumere consueuerunt. Ex fructibus pomaceis exhibeantur, qui modice adstringant, vt mala præcipue cotonea decocta. pyra, sorba, mespila, et si admodum siticulosi fuerint ægri, etiam pepones, & cucumciū medulla, vnaq; pensilis exhiberi debet. A sicubus, bellariis, pistacei, maxime amygdalis & malo punico abstineant: raro autem nec es pini & vuas passas simul assumant, eaq; ipsa post sanguinis reiectionē. Potui autem aqua tepida per totum morbi curriculum exhibeatur, eaq; non calida, sed temperata. Quod si diu tepidæ potioni insistere nequeant, imbecilles se ventriculos habere dicentes, concedendum ipsis etiam paulum omphacomelitis, aut hydrosati, aut hydromeli ex cotoneis, semel aut bis assumere debent; in aliis horis rursus tepidam, aut poscam aquosam. Hæc Trallianus de cibo ac potu. Eadem fere & Paulus habet, quamuis is pro potu, si febre careant, concedit vinum aquosum modicum, alioqui, si febris adest, dat hydromeli Sybariticum. Verum Iacchinus doctissimus, Quod ad victum attinet, non expedit, inquit, hic catalogum ciborum numerare: quod quidam faciunt: cum, dum symptoma vrget, & quousq; cesset, sapius integrā incediam seruare expediat. Multa ergo frustra inter se disputant de acribus, de aceto, de carnibus, quæ omnia præter propositum sunt. Vel enim nihil dandum est, si vires ferunt, vel sola sorbitione, & ea exigua contenti esse debent. Nec enim augere sanguinem, sed minuere expedit: & morbus maxime vrget ab initio. Extreme ergo tenui victu est vtendū, & sic Galenus facit, quando halicam vel ptisanam propinat. Potu vtetur medicam vim habente. Illa vero diligens ciborum disquisitio iuuabit forte in præseruando, forte etiā in aliis profluuiis. At in hoc est inutilis, præsertim, si ex ruptione fiat. Nam post priuatim de erosione dicemus. Hæc Iacchinus. Interea si malum non statim curetur, victum conuenientem, vt nunc diximus, adhibebimus. Et quod ad alia remedia attinet, cum sanguis ob rupturam vasorum sursum eruperit, vena cubiti iuxta Trallianum omnimodo secari debet, non quidē vna vice, verū duabus aliquando tribusue horis interpositis tentari: præsertim si primaria causa sanguinis copia fuerit, aut spiritus multi & flatulenti collectio, vel vas aliquod fuerit ruptum ex casu vel offensione. Sic & Galen. cubiti venam internam statim secare præcipiebat *lib. 5. meth.* & post ipsum Paulus & Aetius, bis terue gratia diuertendi. Si vena in conspectu non veniant, Alexander etiam ex talo commode mittit, cum ad longiores partes diuersio fiat. Hollerius vero viribus integris, internam brachii angusto vulnere mittit modica quantitate, sed bis aut ter vna die, aut duabus detrahi iubet: si plenitudo in causa est, largius, si suppressis mensibus, vena cruris aperienda: Vnde Rondeletius distinguit a qua causa fiat. Si ob rupturam venæ, maiorem quantitatem sanguinis vel vnica vice vel iteratis vicibus: Postea danda ea, quæ vim adstringendi habent. Causa quoque diuertendi, artus omnes

Potus sanguinem reiectis cibis idoneus.

II
Lib. 7. cap. 31
Lib. 7. ca.

12
Reiecti non
spu: ol n:
pturam cis-
ratio.

Vena secanda

Diversiones. 13. fricandi vinciendoq; imo vincula brachiis & coxis ad articulos, & in eisdem frictio adhibenda. Etiam aliqui cucurbitas hypochondriis affigunt, ilibus atque inguinibus: & sanguisugas pectori affigunt. Sanguine detracto iuxta Trallianum ægrum con- quiescere cogemus, compellemusque ne magnam respirationē edat: Vbi vero respiraverit, aquosam poscam ipsi superforbere præcipiemus, quo, si quis in viscere trombus, id est, cruor concretus latitet, resolutus exspuatur: atq; hoc nihil vetat bis ternis horis facere, ut idem Gal. asserit. Poterimus autem eiusdem posca 3 iij. vel iij. aut saltem ij. qualibet vice exhibere. Quod autem in bronchiis sanguis cogatur aliquando, manifestum est experientia. Quod etiam coactum apprime lædat, imo accidentia pra- ua efficiat, omnes norunt: & ponitur inter venena: igitur studendum est, ut educatur. Quoniam vero non facile educeretur, si trombus foret ob crassi- tiem, ideo medicamentum propinamus ex his, quæ trombos dissolunt. Etenim cum non nisi tussi educi possit, studendum est, ut quam minimus motus fiat. Poscam igitur dilutam & tepidam ex- hibet: dilutam ne acetum proritet; tepidam ut melius operetur. Patet autem, ut Iacchinus quo- que annotavit, quod & sensim dimittenda est, ut in viscus aliquid eius penetret. Avicenna dicit, & quandoque Galenus ponit, quasi semper eodem utendum sit. Hic vero in usu aceti contendunt auctores. Sed errant, inquit Iacchinus, ex Avi- cenna & Auerrhoe, qui poscam legunt acetum cum aqua: ignari esse eam missionem, quæ potui iucunda sit: unde experientia monstrat, quod tuf- sim non facit. Est autem necessarius usus ob ac- cidentia dicta. Mirum vero videbitur, si Auerrhoe- es non viderit. necesse est medico, ut contrariis si- mul indicationibus satisfaciat, præeligendo eam, quæ magis vrget, & alteram non negligendo, quod & hic facimus. Cauere enim oportet grumos, & si sunt, dissolvere, neque expectare, donec eorum evidentes notæ adsint, & symptomata graua infe- rant: quando etiam valentioribus uti oporteret, ut coagulo leporis, vel hædi, quibus vis inest ma- xime dissoluendi, ut omnes testantur, & acerrimum est viribus. At posca mitissima est, quod ma- xime sane experimur, dum bibimus. Et scimus eam in externis vulneribus ad glutinationem maxime facere: ita etiam bibita faciet: unde tantum abest, ut eius vim pertimescat Galen. quin potius etiam ad medicamenta glutinantia propter eius deductionē utatur. Est ergo tunc ea utendum, cum iā magna parte fluere cessauit, quod cognoscitur, quia rarius fluit, & iam colore non adeo floridus est. Hæc de pulmone. Nam si malum in arteria sit, vel in pecto- re, nihil obstat quin tuto utaris. Non ergo, ut A- uicenna ait, quandoq; utendum est, quo pectus ex- purgetur, ut Gal. voluit. Hæc Iacchinus. Nos vero ad sanguinem congelatum comode dedimus mu- miam & sperma ceti. Donatus etiam post poscæ as- sumtionem commendat pul. sequentem, ʒ. rhabar. sine spica ʒj. vel ʒiij. m. m. gr. v. vel vij. rub. tinctor. iij. vel iij. dabat cum astringenti vino rub. aut aqua plantaginis, exiguo aceto iniecto. Hoc medica-

mento non solum concretus sanguis resoluitur, sed foras propellitur atq; expurgatur, ruptumque vas seu reseratum sanatur. Quanquam mumiam & sperma ceti Langius lib. 2. epist. 31. his verbis vitu- perare videtur: Si (inquit) præcipiti ex abrupto, vel equo, casu vel violēta corporis successione, aut ve- næ in pectore, vel sub cranio ruptura, aut iugi san- guinis in ventriculū vel pulmonem destillatione, putridi cruoris, grumos in corpore coaceruari cō- ieceris; ne viroso cruoris habitu cor cerebrumque infestetur, operæ pretium erit, hoc pharmaco deil- cere grumos, ac per lotium aut aluum expurgare: non, ut vulgus chirurgorum imperitū affolet, car- bonibus tiliæ, aut Arabum mumia vel ignoto ve- teribus spermate ceti, sed subscripto pulvisculo, ʒ. rad. angelice ʒij. coaguli leporis ʒss. succini ʒss. farina orob. rub. ʒij. exacte confusa cribro excernantur, ac de illius pulueris farragine ʒj. d. solvatur in stillatio chæ- refolij, aut gingidij liquoris ʒiij. ʒ. & oxymeli. ʒj. fiat haustus. Oxymel quippe, ut Galen. expertus est per se absq; adiuncto haustum, sanguinem concretum dissecat, expectorat, vel per lotium prolicit: quem postquam oxymelite incideris, tum commode ex aloe & rhabarb. catapotis per aluum expurgabis. Quod Paulus quoque Ægineta his verbis suadet. Sanguine inquit, circa ventriculum concrecente, coagulum leporis potandum dabis: aut ex cinere ficus lixiui, addita aqua chærefolij aut thymum, vel thymbram cum aceto, quos lacte ʒiij. aut aloe quoq; etacuabis. Qui autem hoc pulvere uti ve- lit, potest; licet nos optimo successu in præceden- tibus agris spermate ceti & mumia vti sumus; quibus & præceptores mei in Italia vti sunt. Post hæc procuranda est omni ingenio glutinatio cum emplasticis & astringentibus: quorum prima illa siccant solum sine astringentibus, ut multa terræ gene- ra & lapidum, ut Lemnia terra, & bolus armenus, & alia eiusmodi. Astringentia & nota sunt, tum simplicia, ut symphyti rad. decocta ex Tralliano, portulacæ succus vel herba ipsa vel rubi fructus, tu- nica glandis putamini subiecta, polygonij succus, & alia infinita, tum quædam composita, ut troch. de terra sigillata, de spodio, & similia: nam astringen- tibus etiam emplastica adiungimus, cum sine morfu siccant. Trallianus quoq; tum Paulus ac Aetius, externis quoq; remediis utuntur; etiam superfusio- nibus thoraci extrinsecus accommodatis per lanas ex rosaceo, aut melino aut myrteo cum aceto mo- dico, alijsq; ut apud eosdem videre licet.

OBSERVATIO XVI.

De vena rupta & tussi in pectore.

Maxime verendus videtur casus, cum ex tussi vena rumpitur in pectore, magis vero & in pulmone: quod maxime euenit, ubi refrigeratæ sunt partes pectoris, & inde tussis: nam hic con- trariæ oriuntur indicationes, sistendi sanguinem, & tussis sedandæ. Quod equidem cum contigisset cuidam mercatori Delphensi, Philippo Vergoe- sio dicto, fratri Prætoris Delphensis, in foro fru- mentario habitanti, 5. Septem. die, anno 1571. cum nocte præcedente ex frigore contractio tussiret, vena in pectore rupta est, & semiscutellâ sanguinis extul-

Ioannes Lan- gius.

17

Lib. 3. ca. 31.

18

extulsiit. Vnde terrore perculsus, Cornelium Heydium collegam meum ad se vocauit: sed is cum in Hagam-Comitis ad alium agrum accitus esset, me vocarunt; & statim basilicam venam in brachio dextro aperire iussi, sanguine moderate extracto. 2. Deinde, vt sequenti condito vteretur, mandauit, cum & ego eodem tempore Hagam-Comitis accedere cogerer, *℞. confer. ros. ʒj. diatrag. frig. ʒij. boli armen. veri ʒj. cum syrup. ex ros. siccis, fiat conditum*, quo cum vsus esset, & post venę sectionem, cum ex Haga statim a prandio rediissem, melius habuit, sanguinis sputo non amplius apparere. At sub noctem hora 10. cū vehementius rursus tussiret, sputum sanguinis rediit; ita vt tunc Heydium ex lecto, tunc me quoq; vocarit. Cum etiā catarrho rūc laborare quoque videretur, & vrinam vtcunque tinctam haberet, cum renum calore, & aliquantulum biliosus esset, etiam melancholicus, & calorē quendam sentiret, licet non febricitaret, iuleb sequens ad sanguinem reprimendum & restringendum præscripsimus. *℞. aque bursę pastoris, plantag. portulacę, an. ʒiij. aque vngula caballine ʒij. lapid. hematit. subtilissime pula. ʒj. boli armeni veri pul. ʒss. syrupi myrtill. (qui etiam ad tussim facit) ʒiij. misce, fiat iuleb. capiebat frigide sept. 10. hlear vnum atque alterum in nocte*, quo remedio minus sanguinem expuebat. 3. Pectus vero inunximus linimento subsequenti, *℞. olei myrtill. ʒj. olei viol. ros. an. ʒss. olei amygd. dulc. ʒij. cereę albę medicum, fiat linimentum. 8. Septembr. diatrag. frig. in tabulis fuso cum aqua ros. sæpe utebatur pro tussi. Et quia sputum sanguinis tum vix apparebat, capiebat subinde myrobalanum vnum empeliticum conditum. Et glande sequenti, cum aluum non deponeret, eam irritauimus, *℞. pul. specier. hircapicrę ʒss. trochisc. albandal. ʒss. salis & mellis quan. suf. fiat glans. Renesque ac lumbos inunximus vng. ros. Cum autem ex glande stercora dura deiecisset, decimo die Septembris hanc portionem ebibit, *℞. folior. senę, myrobal. indor. (quia valde melancholicus erat, & ante a longo tempore lienosus fuerat) an. ʒij. myrobal. citrinor. rhab. selecti, an. ʒj. semin. anisi ʒss. schęnanthi ʒss. infunde in ʒix. aquę fumarie per noctem, facta prius ebullitione, deinde fortissima expressioni addendo syr. myrt. de epithymo, ana ʒj. clarificetur, & fiat potio pro ij. dosibus. vna adhibita, probe ventrem deiecit 13. die Septembr. Propter catarrhum, ne sputum sanguinis quoque rediret, sæpissime utebatur confer. ros. ad libitum. 14. Sept. tam ad somnum conciliandum, quam ad tussim ac catarrhi in crassationem, hordeato utebatur. Verum eodem die rursus in maiori quantitate rediit sanguinis sputū. Quo valde denuo perterritus æger ac multum melancholicus, sibi metuebat de phthisi. Quamobrem imperauimus, vt ex decocto sequenti sæpesumeret. *℞. rad. consolidę maioru ʒj. bursę pastoris, portulacę, sanicula, pyrolę, polygoni, an. m. j. semin. end. acetos. portulacę, vrticę, an. ʒj. fiat decoctio, vt artis est in aqua comm. pro ʒij. colatura addendo ʒiij. syr. myrtill. clarificetur, & fiat iuleb. Loco sem. vrticę ego libenter vltus fuisset succo vrticę, qui pro arcano habetur contra sanguinis sputū, vt collegę meo referebam ex Amati historia Gent. 6,****

curat. 4. Nam oēs, qui sanguinem ex pectore reiecerunt, & a medicis tāquam deplorati habiti sunt, solo vrticę succo ebibito conualuerunt: post multa enim machinata remedia, nullum remedium ita contulit, vt sanguis hic cohiberetur, ac succus vrticę, quem ad quinque vel sex dies ebiberunt. Singulis namque diebus, singulas quatuor vncias ieiuno stomacho bibebāt, imo & ipsam vrticam incoctam iure pulli aut veruecis sæpe comedebāt: ex iis alter prædicti Bucignolę nepos erat; alter vero Ragusęus, patritius quoq; Vrticę hoc munus conficere posse, difficile creditu est. Dioscorides tamē de ea ita inquit: Vrticę folia profluuiariorum cum succo sistunt (quod & nos experti sumus) trita imposita; & vltimo vrinę succus, gargarizatus vnam reprimat. Maluit tamen Erius semine vti; quāuis idem fatebatur se succo vrticę fluxum in vulnere restrinxisse. Seniori tamen hac in re nolui ita resistere: quamuis libētius succo vsus fuisset. Verum, cum ex præscriptis remediis sputū sanguinis nondum ex integro cessaret, & catarrhus ad pectus etiam deflueret cum tussi: vnde vena licet constrieta & consolidata de nouo aperiebatur, & sanguinem fundebat; ideo & hanc cucufam vna præscripsimus, *℞. flor. ros. rub. flor. nenuphar. an. p. j. semin. coriand. prepar. ʒj. ʒss. sandaracę, mastice, an. ʒj. santal. rub. citrin. an. ʒj. pulueris sentur omnia crassiuscule, & bōbaci inspergantur, & sindone rubra cooperiantur, & fiat cucufa rotunda intersuta, futura coronali applicanda. 16. Septembr. cum sputum sanguinis nondum cessaret, sequens eclegma præscriptum est, *℞. confer. ros. veteris ʒj. ʒss. gummi tragacant. albiss. soluti in aqua portulac. ʒj. boli armen. veri ʒiij. trochisc. de spodio, de carabe de terra sigill. an. ʒj. sem. portul. contusę ʒij. ʒss. cum syr. myrtill. fiat eclegma. capiebat cum baculo liquit. ad libitum: subinde & cochlear vnum syr. de portulacę, non qui fit ex succo endiu & sem. portulac. qui valde mucilaginosus est, neque illi tū aliis multis placet, sed qui ex solo succo portulacę & zaccaro clarificato paratus esset. Vicissim hoc syrupo vtens, tum confer. ros. & portulacę, in cibis etiam viridem masticando ac deglutiendo, tandem sputum sanguinis desiit, & optime habere cœpit. Hic tamen postea melancholicus, & rursus catarrho acri destillante in pectus, tabem incurrebat, ac phthisi obiit sexto Martii, anno 1572.**

S C H O L I A.

7. Sanguinis autem reiectio, quę ex apertione osculi alicuius vasis contingit perea, quę dilatatum os obturant, curari deberet, Galeno auctore 7. de compos. medic. secundum locos. Obturant autem osculum (vt etiam scholio præcedente diximus) dilatatum medicamenta, quę vim habent adstringendi: eius vero (vt etiam exemplis antea ostendimus) quę ex vasis ruptura fit, curatio per eiusdem conglutinationem perficitur: atqui conglutinatur ruptum per eadē medicamenta astringentia, & quęcunque ipsis in compositione miscentur citra mordacitatem resiccantia. & glutinosum quiddam habentia, vt & antea dictum est: quę idcirco, quod ex lenta, crassaque substantia consistunt, meatus obstruunt, & Græci *ἰμπλασιν*.

8.
Quid primo
animaduerten-
dum sit pro cu-
ratione seu
sanguinis.

vocant, vt *s. method. med. & 4. & 5. de simplic. medic. facult. liquet.* Id vero in vtriusque prius animaduertendum (vt *Donatus quoque admonuit*) numquid causa rptionem aut apertionem efficiens defuerit, vel adhuc maneat: namque si defuerit, primum sistere sanguinem expedit; post vero (vt inquit *Galen. eodem s. method. med.*) perruptum vas aut reaseratum, sanare eo conglutinato vel obstructo. Si autem permaneat efficiens causa, utpote abundantia, ea quidem primo vacuanda erit: etenim manente ea, vas etiam plus rumpitur, aut reaseratur: hinc sanguis reprimendus, moxque vlcus ipsum vasis, vel eius apertio curanda. Desinente igitur effectrice causa, primum sistere sanguinem expedit, *Galen. decretum*, post vlcus sanare: obturato quidem, quod perruptum est; auerso autem atque aliorum translato, quod per id ferebatur: quando si ideo, quod inter initia, impetu confluat, osculumque vasis parimodo pateat, citius plane moriatur animans, quod profluuium laborat, quam sanguis cesset effluere. Sistitur porro, qui e vasis profuit sanguis, aut propterea quod amplius non confluit, aut quod occlusa diuisio sit, seu conuineat id, quod reaseratum est, vel propter vtrumque, vt inquit *Galenus eodem lib. s. method. med. end.* id quod ipse dicit tutissimum. Hæ quidem sunt communes curandi indicationes cuiusvis cruentæ exspuitionis, ex diuisione seu apertione vasorum cuiuslibet partis: est insuper & aliud commune omnium internarum partium affectarum, vt idem *Galenus 4. meth. med.* asserit, vt ea eligantur, quæ animalis naturæ maxime sunt familiaria, siue ea cibi sint, siue medicamenta, fugiantur respuanturque huic contraria. Interea partes affectæ aliquo modo priuatim curationem variant. Si ex refrigeratis spiritus instrumentis sanguinem reiecerint, his e vestigio sanguinem vena secta extrahere conuenit, vt scholio præcedente diximus, bis eodem die, vt *Galenus s. method.* docuit; alioqui, modo ætas vel vires non prohibeant, paulatim euacuatio facienda, vt etiam *Aetius* admonet: deinde & ligationes, & frictiones peragendæ. Diximus autem hunc casum, si ex tussi vena rumpatur, partibus pectoris refrigeratis, ob contrarias indicationes curatu difficilem esse. Nā quæ tussim a frigore sedant, necesse est calida sint, vt inspiratio & ea, quæ extrinsecus calida applicantur ad intemperiem tollendam. Quanquam in hoc nostro agro etiam catarrhus aderat, neque intemperies ita frigida. Calida itaque sanguinem fluere faciunt, vt supra diximus. *Galenus* igitur historiam ponit iuuenis, qui tussiens ex refrigeratione pectoris sanguinem exscreauit. Cura vero fuit hæc: primū enim procurauit, vt sanguis sisteretur, quod magis virgebat, secta vena, & vinculis & frictionibus: mox medicamento soporante, diaspermation est usus: secunda itidem detraxit. Sed pectori mox emplastrum ex taphia apposuit, ad tollendam intemperiem pectoris, sed diu morari non sinebat, ne multum calfaceret. Noui ego medicum quendam alioqui doctum, qui cum agro suo ceratum calidum pectori applicuisset, & peregre profectus diutius cum reliquisset, pectus adeo exulceratum

9.
Quid 2. ani-
maduertendū.

Quæruenda spui-
do fiat refrige-
ratu instru-
mentu spiritus
curatio.

Histeria Gale-
ni.

10.

fuit, vt ad interiora vlcus pertransierit, & æger non diu post obierit, quo factum est, vt deinceps ille medicus omnem auctoritatem amiserit. Alio similiter die *Galenus* apposuit, licet etiam tunc nō diu morari sinebat: itaque per intervalla, & vacabat, symptomati tussis, & spatium naturæ præbebat, vt glutinaret; nec adeo calfaciebat, vt venam aperiret: & semper medicamentum diaspermation dedit vsq; in quartam diem. Sed dices, qua de causa? Responderet *Iacchius*, vt tussis symptomati occurreret, sensum hebetando, & ita profirationem; & vt sanguinis fluorem sisteret. Deinde ad *Tabias* misit pro siccanda magis cicatrice, vt firmior esset. Si ex aliis causis eadem vasa rumpantur aut reaserentur, etiam tunc vena incidenda est: ex mente *Galen. Pauli & Aetii* ac *Tralliani*, vt scholio præcedenti diximus: artusque fricandi & vincendi, atq; posca tepida exhibenda, mox medicamenta emplastica & astringentia. Illud tamen perpetuo seruari debet ex *Galen. decreto 4. meth. med. & 7. de Gal. comp. med.* secundum locos, quod congruenti mensura prædictis medicamentis, in his, qui ex pulmone aut thorace, aut aspera arteria sanguinem reieciunt, misceantur tum calida, tum tenuium partium existentia: quamuis vasorum rupturæ ac reaserationi sint infestissima, gratia scilicet distributionis ipsorum medicamentorum: etenim astringentia & viscosa, ac tenacia sibi ipsis vias præcludunt: quare opus habent facultate ipsis viam struente ac preparante. Quapropter omnibus medicamentis, quæ thoracis & pulmonum vlcibus sunt destinata, mel admiscendum erit: est namque ipsum veluti instrumentum quoddam digestionis eorum in corpus, ac celeris transitus, veluti vehiculum, vt patet eodem *4. lib. meth. med.* Quod si ex acri destillatione, vel ex catarrho vena aperiatur vel reaseretur, aliter curandum erit, & catarrhus prius tollendus erit, vt exemplum sequens docebit.

OBSERVATIO XVII.

De sputo sanguinis ex catarrho oborto, potius insipido quam acro.

Tussis aliquando ex catarrho descendente a capite in pectus vel pulmonem, sputum sanguinis inducit: quod equidem bifariam contingere potest: vel enim ex tussi fit continui solutio ob partium distensionem, vel quoniam catarrhus erodens sit, ideo vlcus facit. Si enim insipidus sit catarrhus, sola tussis causa esse videtur: uti istis diebus iuueni euenit, vt ex tussi cum catarrho tamen insipido, sanguinis sputo laboraret; & quia plenitudine hic iuuenis aliquo modo laborabat, & satis robustus erat, venā incidere iussi: moderate tamen sanguine extracto in cubito. Ad diuersionem quoque a capite, postquam leuiter purgatus esset cum pil. ex aloë & rhab. etiam cucurbitulas scapulis admoueri iussi: cum scarificatione, et vinculis membris extremis injectis, & adhibitis frictionibus. & capite mastiche & olibano inspersis. Præceptor meus et cauterium adhibebat capiti, eoq; sic roborato theriacæ *℞ij. dabat cum succo arnogloss. vel portulacæ.* Nos autem ad constrictionem dedimus *lapidis hamat. curiose lenigati. & in puluerem tenuissimum redacti ℞ij. cum aqua sola*

II.

Si ex aliis causis eadem vasa rumpantur, aut reaserentur, curatio.

Documentum Gal.

sola tepida, & egregie contulit: hoc enim modo Tral-
 lianus dabat in iis, in quibus sanguis copiose (*vs*
hic) non euacuabatur, alioquin in his, qui largius
 sanguinem reiciebant, cum succo mali punici &
 granis, vel cum succo polygoni dabat. Hoc enim
 modo sine theriaca aliisq; pretiosis antidotis mul-
 tos curauit, lenibus vtens medicamentis, & præ-
 fertim lapide hæmatite. Data autem ex eo ita læui-
 gato, vt sit aereus & ventro persimilis, *Diij. & paulo*
amplius minusve. Exhibuit etiam iis, qui pus exspue-
 re inceperant: ac mirum est, quomodo vlcus exsic-
 carit sanaueritq; vt non amplius pus generaretur,
 neque æger a tussi infestaretur. Ideo etiam in ca-
 tarrho acri corrodeute vtebatur. Spectauit autem
 & alium quendam ex his, quibus vas exesum erat,
 nō modo particulas quasdam ex faucibus, sed etiā
 asperam arteriam exspuentem: ac mirum quomo-
 do in hoc quoque lapis hic maximam efficaciam
 indicauerit: nam & hic curatus est, illo ipso nō ad-
 modum etiam sperante. Exhibuit autem ægro po-
 tui medicamentum frequentius, vt commodius
 distribueretur. Quare, cum crebro ipsum bibisset,
 tādē sumere ipsum fastidiuit. Excogitauit autem
 huiusmodi rationem: reductum in tenuissimum
 puluerem panniculo lineo imposuit, & diligenter
 ipsum vndiquaque constrictum, colligatumque in
 poculo, quod vinum odoratum modicum habe-
 ret, suspendere permisit, idque per totam noctem
 iam inde ab ipso vespero: extraxit autem tenuem
 aereamque eius partem, vt æger solam vini quali-
 tatem perciperet: ex hoc bibere, quantum mane
 bibere solebat, ei præcepit. Atq; hoc sane agendo,
 bibendoq; cōtinue, sanitatem recepit. Hoc autem
 morbo liberatus, idem præseruationis causa face-
 re pergebat, bibebatq; donec etiam corpore pro-
 be permutato, consueta agendo viribus se constare
 sentiret. Hæc de lapide Hæmatite, hætenus a Tral-
 liano visu & vlu comprobata, hic recensere nobis
 vtile visum fuit: cum & nos hunc lapidem contri-
 tum in tenuissimum pollinem cum aqua plantagi-
 nis vel bursæ pastoris sæpe transfusum, & deinde
 colatum, vt aqua rubedinē acquireret, accepimus,
 immixto syrup. de portulaca vel myrrillo: ac ita ad
 sanguinis sputum commode exhibuimus.

SCHOLIA.

4. SI itaque insipidus catarrhus sola tussis causa
 fuerit, facile cognoscitur, & etiam facilius cura-
 ri poterit. Si vero salus vel amarus, & flauum
 quid exspuitur, de erosionē suspicio est. Galen. au-
 tem posuit vtriusque affectus curationem, ac pri-
 mum eius qui ex sola tussi fiebat, vt in illa nobili
 Romana. Nec enim illa erosionē pulmonis reie-
 cerat. Nam hi, vt mox habet, insanabiles sunt, &
 curam nullam admittunt, nisi vt vita prolongetur.
 Et errarunt multi in hoc (vtriam Iacchius do-
 ctissimus annotauit) quia crediderunt historiam
 illam & curam conuenire erosioni ex catarrho: vn-
 de frustra de multis dubitāt circa eam curam, quo-
 modo apposuerit capiti calido, toties calidum em-
 plastrum. Et ego alias (inquit idem Leonardus Iac-
 chius) de hoc dubitabam: & respondi, labora-
 re Galenum contra symptoma. Sed reuera optima

est curatio, quæ tollit causam, nec lædit: quoniam
 siccat & calefacit: in capite laborante destillatio-
 ne, est vtile: vbi si esset arrodens catarrhus, profe-
 cto malum esset. Mirum nō considerasse hunc lo-
 cum Veteres, qui historiam referunt, quasi catar-
 rhi erodentis. Mesue & Rhases nullam historiam
 æque admirantur, & colunt: cui tamē morbo me-
 deantur prorsus ignorant. Vnde iuuenis ille, qui
 tuniculam gutturis exspuit, ex catarrho erodente,
 id passus est: neque in hoc hanc curam posuit, sed
 longo tempore curatum: nempe ratione, quam
 postposuit: quoniam succi vitium corrigere oport-
 uit purgatione, & alimentis, idque non potest, nisi
 longo tempore fieri. Quod historia mulieris sit ca-
 tarrhi frigidi & humidus, patet: primo: quia cito sa-
 nata est: ergo non erosionē. Præterea erosionem
 dicit esse insanabilem. Præterea etiam post agglu-
 tinatum vulnus, ad caput taphia vtitur, vt pateat nō
 aduersus symptoma pugnasse, sed aduersus causā.
 Quod si dicas, cum præcauet catarrhū acrem,
 & erodentem, adhibet capiti taphiam: Responde-
 tur, potest esse sine calida capitis intemperie: sed
 potius cum humida, cū reliquum corpus plenum
 esset vitiosis humoribus, qui caput petunt. Sed si
 esset ex capitis intemperie, hoc non fieret. Verum
 ad catarrhum prius accedamus: atque curationem
 ex Galeno ita instituemus. Primum itaque, vt in
 eiusmodi aliis affectib. sanguinem mittere decre-
 uerat, quod id morbus exigeret, tum ad minuen-
 dam materiam catarrhi, tum ad reuulsionem, &
 deriuationem a parte. Sed alia dissuadebant, nem-
 pe quatruidi inedia: forte vero & gracilis erat, &
 æstiuo tēpore, & alia aderant contra indicantia: sat
 nobis est affectum id exigere. Postmodū, qui eam
 dimiserat aliis reuulsoriis ingeniis vtitur, clystere
 acri, scil. & vinculis, & fricat calfaciente pharmaco,
 vt puta sinapi ex aceto. Hæc enim auersio maxima
 est. Huc vsque auersio: mox ad causam tussis pro-
 ximam accedens, raso capite emplastrum ex colū-
 bino stercore imposuit, ex recenti, inquam, in tur-
 ribus collecto, cui maxima vis inest calfaciendi &
 siccandi, & attrahendi catarrhum ad extimam cu-
 rem. Hoc vsus per horas tres est, ne scil. exureret ni-
 mium. Sed caput pro tempore idoneo operimēto
 contexit, hoc est, quatenus externo aere non læde-
 retur, mox in balneum duxit. Hic vero dignū con-
 sideratione est, quomodo in balneum ducat eos,
 quibus sanguis profluit, cum vniuersum calidum
 promoueat profluvia *s. aphor.* & priuatim balneum
 ea angeat. *i. ad Glau. c. de accid. & in historia Metonis 3.*
i. Epidem. ad sanguinis profluvium augendū caput
 lauat Hipp. Præterea in fine curę, dicit in balnei ab-
 stinentia eum continuisse, vt scil. siccaret. Respon-
 detur: Primum, q̄ reiecerat exiguum erat; itaque
 ruptum vas erat exiguum: sed potius timor erat fu-
 turi, quam præsentis affectus. Præterea inedia
 præuacuata ea, non videbatur timor fluxionis, &
 ideo resisterat. Vel dicito, non esse eandem ratio-
 nem laborantis pectoris, & capitis. Calidum enim
 balneum caput replet, ideo sanguinē e narib. pro-
 fluentem proritat. At a pectore reuellere videtur:
 non secus atq; alui profluvia ab intestinis. Hic no-

Error multu-
rum.

8.

ta, solum lauat, cum capiti emplastrum apponit. Et Auicenna dicit, propter medicamen, id est, ad tollendam acrimoniam eius, non ungit caput, sed lauat: quoniam unguenta plus morantur & humectant; & quia quod attractum est, exhalare non sinit, *6. de sanit. tuend.* Vt ergo frictione uti potuit, cur non & balneo? Ceterum hæc responsiones ad logicam quidem disputationem utiles forent, ad medica vero præcepta inutiles. Neque enim quid respondendum sit; & quomodo dicta auctorum, ut aiunt, saluanda, sed quid utile præceptum sit, exquirimus. Non igitur Galenus nobis id, ut præceptum statuit, sed visum illi est, utile esse eo tempore. Causas autem particulares, quibus motus sit, non refert: non lauat tamen caput, nec ungit pingui, ne humectet. A balneo nutrit sola sorbitione, quod in ediam ferre non poterat: postea austerum quid propinat, tum ad tollendam euaporationem ad caput, & ut alius probe concoqueret, & deiceret; sed & ad morbum id facit. Vespero dormituræ theriacen dedit novam intra menses quatuor, ut somnum induceret: quod tum sistit profluentem sanguinem, & fluxiones siccat, & crassat: unde non facile influunt ad pectus. Iam his catarrhus finitus videbatur: sed multa erat in pectore materia, quæ expurgari desiderabat, quod ex sonitu deprehendit, & ex respirandi specie, quæ angustiam vasorum monstrabat, sed timuit tussim concitare. Itaque quod ab initio fecerat, seruauit in taciturnitate & quiete pectoris; & iisdem reuulsoriis postridie usus, vesperi theriacen dedit paulo minus. Tercio die quietem etiam imperauit: sed mane mel coctum exhibuit, ut pectus purgaret: ac paulo largius cibum dedit, & frictione est usus. Quarto mane dedit theriacam verustiore, id est, in ætate vigente: & mel copiosum dedit mane: quoniam non erat ad soporem inducendum, sed pectus purgandum. Rursus quia feruor prioris medicamenti capiti impositi desierat, iterum admouit. Quinto ad purgandum pulmonem conuertit sese, scilicet cum eclegmatis, quæ tussim excitant; & capiti ceratum ex thapsia imposuit: mox conualescentium victu est usus: sed a lotionibus abstinuit: nempe ut siccaret corpus, nam & dum ægrotaret, solum prima die & quinta lauit. Hic nugatores suspectam habent maxime quatuor mensium theriacā: & quoniam glossare, id est, peruertere iis mos est scriptorum verba, dicunt intelligi ab eo tempore, quo incipit fermētari. Sed hæc nugæ sunt: imo & duorum mensium exhiberi potest. Debebant Galenum legere cur sic dabat, ut in ea vis adhuc opii vigeret. Et nos sic utimur. Hæc Iacchinus: cuius verba hic inferere commodum nobis visum fuit, cum hanc Galeni historiam egregie declarent: quam si legere libeat, habes eam *5. libr. method. medendi*: & alteram historiam de alio adolescente, cui non ex destillatione, sed ex refrigeratis spiritus instrumentis orta tussis fuerat, cum sanguinem & ipse ad dimidiam heminam reiecisset: cui statim venam Galen. incidit, & postridie bis, ut scholio præcedente dictum est. Habes & eodem lib. de altero adolescente historiam quoque, circiter decem & octo annos

nato, qui cum multis diebus ex destillatione laborasset, primum quidem sanguinem floridum cum tussi exspuit, non sane multum: postea etiam tunica ipsius partē, quæ tegens intrinsecus arteriam, in fauces & os per ipsum arteriæ caput (larynga vocant) ascendit. Videbatur autem Galeno tum ex crassitudine eius comestanti, tum ægri sensu ipsius laryngis esse interna tunica. Quin etiam læsa illi ex eo vox est, atq; hic quoque longiore quidem tempore, sed tamen sanatus est.

OBSERVATIO XVIII.

De destillatione acri a capite in pectus cum tussi, ex qua vena pulmonis corrosa fuit cum sanguinis cruenta sputione.

V Ir quidam annos circiter quadraginta excedens, cum longa destillatione acri laborasset, neque satis tempestive de remediis cogitaret, & tussis valida afficeretur, tandem sanguinem subito excreauit spumofum, rubrum, humiditati cuidā admixtum: quanquam ultimo paucus, viuidus, nulli rei admixtus exiuerit, quem ex vena pulmonis vel prope pulmonem existente, effluxisse existimabam: assidua enim humore is destillatione a capite in pectus vena quoquo modo corrosa ingenti illa tussi aperta fuit, unde sanguis ille effluxit: tunc n. prius me vocauit, cum iam macilentus & extenuatus ex longo morbo præcedente: sanguinem hic mittere ausi non fuimus, cum ad hecticam tendere videretur. Et quamquam destillante acri humore, præsertim ad pulmonem aut pectus, toti corpori consulendum sit, quo sistatur erosio, Galeni auctoritate *5. method. med.* Interea Paulus & Alexander præcipiunt cauere debere sanguinis missionem; præsertim ubi admodum acris fuerit destillatio. Nam magna ex parte corpus eorum, qui ex erosione sanguinem reddunt, gracile ac perficuum est, quale hic erat, cum & diutius male habuisset, ideo sanguinem non detraximus. Si autem ab initio iam prius sanguinem exspuisset, Galeni auctoritate fretus (*eod. 5. libr. method. med.*) ubi validus fuisset æger multique sanguinis, statim a principio sanguinem detraxissem: id quod nec Alexander nec Paulus negarunt. Et si parum sanguinis habere videbuntur, ut ad quandam succum probiorem victus ratione reduci debent, deinde sanguis detrahendus, si res ita suaserit. Verum hic cum sub noctem acciti essemus, ut sequens sumeret mēdaui: *syrup. pap. myrtini. an. ʒ. ʒ. boli armeni orientalis ʒ. ʒ. mist.* mane cum sputum salsum sentiret, atq; hic vitiosus succus corrigendus esset, atq; primo alterandus & contemperandus, licet omnino longo tempore opus sit, ut Galenus dicebat, quo succi huiusmodi temperentur, & corrigatur vitium. Cum & tales ægri sanguine decocto ab initio (quod nunc prætermisum erat, cum diutius laborasset) tum reficiendi sint, tum purgandi ac rursus post purgationem reficiendi. Quæ omnia tempus habent: Post exhibitum hunc syrupum, *ʒ. ʒ. syrup. violarum. papauer. myrtin. ana ʒ. ʒ. aqua decoct. hordei ʒ. ʒ. dedimus ʒ. ʒ. castie recens extracta cum sero lactis.* Deinde ad sanguinis sputum, *boli armeni veri ʒ. ʒ. cum lacte.* Postea etiam lac ca-

lac caprillum dedimus, cum de phthisi metueremus: nam tales maxime lac requirunt, qui maxime insanabiles sunt; præcipue ubi a capite aliquid defluerit. De quo Alexander in hoc Gal. imitatus. Omnes autem, inquit, lacte utuntur, molli recentique caseo, præsertim caprillo aut bubulo. Est valde accommodum a balneo aquæ dulcis sumtum. Gal. 7. meth. med. vult, ut calens a mammillis ab ægris sugatur: & ut mellis tepidi paucillum immisceatur, ne in ventriculo cogatur aut concreascit. Verum, licet multis & aptis remediis usi simus post semianum tandem mortuus est ex tabe.

SCHOLIA.

4. **S**lex acri destillatione cum tussi, cruenta spuitio contingat, medicamentorum copiam, ex cap. de destillatione tum de tussi, requiremus. Illud tamen perpetuo in eorum exhibitione seruandū, ut quæ magis familiaria ac leuia sint, eligamus, vitemusque acriora, calidiora, ac sicciora: quæ insuper non semel tantum propinabimus, quin imo bis & sæpius ubi oportet: nam longo tempore (ut diximus ex Galeni auctoritate) omnino opus est, ut succi contemperentur, & corrigatur vitium; potissimum si ex eo in pulmone erosio facta fuerit. Quapropter Galenus eos, qui plane deplorati non sunt, omnes seruari fatetur, per hæc tria, per sanguinis videlicet missionem & purgationem, & ea, quæ caput roborant: non enim in huiusmodi affectibus paruis auxiliis incipiendum est, veluti Erasistrato visum fuit: nam in morbis, in quibus periculum non imminet, a paruis auxiliis incipiendum est: quod si nihil profecerint, aggredienda maiora sunt. At ubi periculum maximum impendet, a maximis quoque auxiliis exordium est: Nam ad ultimos morbos ultima prorsus remedia maxime valere Hippocrates decretum reliquit. Ea de re non immerito statim circa initia venæ sectione (si nihil prohibeat, at hic in nostro ægro prohibebant diuturnitas mali, macies, & vires deiectæ) ac purgatione utendum, nec minus & capiti confestim prospiciendum, ne ex eo in pulmonem aut pectus aliquid defluat: in quem usum conducit si ꝑ in infra scripti pulueris, ex Donati sententia sumatur: ꝑ. sem. hyoscyam. & pap. alb. an. ꝑ. sem. coriand. preparati ꝑ. cort. thuris g. ꝑ. mastice g. 4. pul. hirundinis preparati ꝑ. ꝑ. sacchar. ꝑ. iij. Tempus autem sumendi est post duas vel tres horas ante somnum a cœna, vel pilulas duas deuorent ex pilulis de cynoglossa Nicolai, loco medicaminis, quod dialpermaton a Galeno prius appellatum diximus, quo is utebatur. Is quoque taphiam (ut scholio præcedente retulimus) capiti imponebat: alii sinapismo aut ignito cauterio utuntur. Sed aduersus Galenum Trallianus sentit, & Galenum redarguit: quanquam Donatus eundem contra Alexandrum Trallianum defendit, non ut temperiem capitis calidam curaret, sed ut humiditatem acrem, quæ a capite defluebat partim exsiccaret, partim etiam ex interioribus foras traheret, & per cutim euacuaret, idque etiam in principio, ne materia defluat ad pulmonem, & tussim excitet, ex quo maius periculum, quam propter reuulsionem & exsiccationem. Quam rem etiam docte
- 5.
- 6.

prius Iacchinus scholio præcedente, & ad amussim interpretatus est. Vbi vero hæc pericula non impendent, in calida fluxione post redundantium humorum vacationem, ea quæ infrigidant, pro eius alteratione capiti admouere hæsitaret nemo, & non calida; cum, si caput ex calida intemperie male habet, talia medicamenta noceant; Ut igitur temperamentum melius reddamus, præstat ipsum rosaceo perungere: atque æstatis tempore præstantius erit, eo quod ex crudo oleo, quod omphacinū vocant, componitur, uti: quemadmodum idemmet Galen præcipit 6. de sanit. tuenda, damnans medicamentum, quod ex thapsia & sinapi componitur, cum ex calida capitis intemperie fluxio fiat; eosque balnari iubet, frequenti balneo potabilis aquæ, quo & calidos vapores, qui in capite sunt, euocemus, & totum capitis temperamentum melius reddamus: nec minus balneum ipsum prædictis, lib. 5. meth. med. commendauit. Prædicti quoque sunt (eodem Gal. teste) qui maxime lac requirunt, neglectoq; eo omnium sunt insanabiles, præcipue ubi ex capite aliquid in pulmonem defluat. Alexander quoque de lacte imitatur Galenum, ut obser. præcedente sub finem diximus. Horum auctorum loca ipsa perlegere poteritis, cum Galenus & Alexander de sputo sanguinis curando nihil intactum reliquerint. Sit autem lactis quantitas ab ꝑ iij. ad vi. pro diuersa corporum natura, ætate & consuetudine, ac reliquis: mellis autem vel rosacei mellis, quo & ego uti soleo. quarta pars, aut medietas viciæ vini. Hoc modo & Donatus utitur.

OBSERVATIO XIX.

De quibusdam ex vasorum exesione sputo cruento laborantibus.

Godefridus Petrus Beaumontius cereuisiarius, annos (plus minus) 59. natus, cum aliquando diu asthmate laborasset, tandem tussi valida correptus, etiam febre continua satis, ut de phthisi metus esset, tandem & sputo sanguinis correptus est: quod cum in notabili quantitate cum febre prodiret, multum sibi metuebat etiam de tabe, quam prius sputum non purulentum, sed pituitosum vna cum sanguine extussiebat; postea vero subinde nigriusculum, ita ut ex erosione venæ pectoris prodiret, cum pure quasi tandem permixtū. Tale autem sputum cum febre solet esse semper suspectum: nam febris putredinem & corruptionem maiorem arguit: & quamuis maius periculum inducit sputum sanguinis arterialis quam venalis, etiam si sine febre fluxerit, suspectum habeatur: tamen omne sputum sanguinis, si cum tussi expectore aut pulmone erumpat, cum febre & sine febre, malum semper est: deterius tamen ex pulmone, ut mox alio exemplo docebimus; & magis ex substantia ipsius, cum ducat ad phthisin: quod ex pectore est, sanatur quidem velociter: sin minus, habet malitiam vlcis pulmonis, cum fiat fistulosum frequenter rediens cum sanguinis sputo. Ad hunc in principio accitus cum febricitaret & valde tussiret, & nondum sanguinem exspueret, sed materiam putidam pituitosam, & aliquandiu etiā lenta febre correptus esset, ut longo tempora foras

Quando a par-
ui & quando
a magni au-
xilii incipien-
da est.

Galenus de-
fenditur contra
Alexand.

prodiret: ubi enim magis cœpit febricitare, me vocavit mente Maio, propter febrem; & quia quotannis consuetus erat sanguinem mittere, quamvis paulo macilentior, tamen multi sanguinis. Post acceptum bolum ex cassia, aluo satis soluta, die subsequente vena basilica in brachio secta fuit, & pro tussi ac febre continuo lambebat ex syrupo viol. nam maciem cōtraxerat, & de tabe metuebamus. Deinde ex hoc decocto tam ob febrem, quam ad vitiosos humores contemperandos bis in die ciatum sumebat. *℞. corticum rad. cichorij, dentis leonis, glycyrrh. rasæ, an. ℥. flor. cord. p. j. vngula cab. seu bechij, folior. viol. acetosa, cichor. capill. ven. polytrichi, ana m. j. hordei mundati. p. j. sem. quat. frigid. maior. an. ℥. j. prun. damasc. num. 9. vuar. passul. enucleat. ℥. j. vuar. corinthiac. ℥. j. iuiubarum sebesten. recent. an. num. 5. fiat decoct. in aqua communi pro lib. j. coletur, & adiecto rursus saccharo cando dicto, ad meliorem saporem, denuo ebulliant ad modum iuleb.* Interea quoque pro tussi & calore febrili subinde capiebat ex tabulis diatra. frig. Sub noctem sumebat hordeatum in hunc modum cōcinnatum. *℞. hordei mandati p. j. amygd. dulc. depilat. ℥. j. ℞. semp. pap. alb. ℥. j. sem. 4. frigid. maior. mund. an. ℥. j. fiat hordeatum pro lib. j. saccharo parum dulcoretur, ut artis est.* Hoc multis diebus sub noctem sumebat: interea leuiter eum purgauimus cum syrup. rosæ pallidæ & sero lactis. Et rursus apozema, ut superius, adiectis scabiosa, pulmonaria & hyssopo, ut sputa melius exirent: & cum dormire non posset, tempora inunximus vng. populeo, & oleo pap. & mādragoræ simul mixtis, & utebatur suo diatragacantho. Et cum ad mensem Iun. peruenissemus, & in lumbis doleret, eos inungi iussimus vnguento rosarum. Postea sanguinem extussebat: primo quidem rubrum, postea pituitæ immixtum, deinde etiam purulentum, ut de corrosione venæ suspicio esset, sputo aliquot diebus perdurante: quamvis his tabulis frequenter utens tam pro tussi, quam pro sputo cruento, etiam subinde conferua ros. accepta cū exiguo bolo immixto & syrupo myrteo, tandem sputum sanguinis desit. Tabulæ tales erant: *℞. specier. diatrag. frig. ℥. j. ℞. boli armeni veri prius puluerizati ℥. j. postea ℞. dissolutis in aqua vngula caballina q. s. sacchar. albiss. ℥. j. admixtis. fiat confectio in tabul.* Interea si aluum non deponeret, glande tantum irritauimus, absque alia purgatione. Et ubi sputa minus prodibant, hoc syrupo longo sæpe utebatur, alioqui tabulis suis vel conferua iam dicta, si magis cruentum esset. *℞. glycyrr. rasæ ℥. iij. vngula caballina, pulmonaria, folior. viol. hordei mundati, an. m. j. semin. quatuor frigid. maior. an. ℥. j. ℞. vuar. passul. ab arillis repurg. ℥. j. vuar. corinthiac. ℥. j. daetyl. pinguium num. iij. iuiubar. sebesten recentium, an. num. 5. fiat omnium decoctio in aqua communi pro lib. j. col. dulcoretur saccharo candi, & fiat ad modum syrup. longi, rursus ebulliendo.* Continuabat & suum hordeatum sub noctem. Quibus tandem cum multorum admiratione, cū in fine pro tabido quasi haberetur, fuit curatus. Eodem modo fere Machtilda Alphonsa mulier Delphenensis, non tamen febricitans, tertio quoque anno incidebat, licet vetula, in sanguinis sputum ex corrosione venæ pectoris cum catarrho salso:

quæ & iisdem fere remediis fuit curata, magis tamen astringentibus, cum ex erosione hæmorrhagia profusior contingeret: tunc enim iis vtendum medicamentis vehementissimis, quo ad vehemens eius impetus frangatur: reliquo vero tempore iis utebatur, quæ celestissime erosionē lenire poterāt, & modice siccarent, & vlcera ad cicatricem ducunt: quare & puluere lapidis hæmatitis (de quo prius dictum est) utebatur, radice symphyti condita, & bolo armeno & terra Lemnia vera, quam & egregie iuuabant rotulæ sequentes. *℞. boli armeni veri ℥. iij. specier. diatrag. frigidi ℥. j. ℞. cum aqua vngula caballina & portulacæ, adiectis ℥. j. sacchari, fiant rotulæ ponderantes ℥. j. & quotidie tres pluresue rotulas capiebat, & fuit curata.* Quamvis hæc ipsa cum annos septuaginta attingeret, rursus ex catarrho salso incidit in venæ pulmonis rosionem; ita ut sanguinem rubrum ac purum & spumofum expueret, postea vero vna cum sanguine etiam purulentam materiam, idque longo tempore, ut tandem etiam tabe consumpta, ex eodem malo sæpius recurrente, vitam valde vetula finierit. Eodem modo Daniel Georgius longo tempore asthmaticus, diu in sella sedens, sputum cruentum extussebat valde nigrum: multis tamen adhibitis remediis, & hic quoque senex tandem obiit. Cyprianus vero medicus, & collega meus, qui post obitum Cornelii Ericii in eius locum successit in sputum sanguinis ex erosione venæ pulmonis incidit, & longo tempore laborabat, & aliquando floridum sanguinem & copiosum ac spumofum profundens, cum vsus esset multis ac variis remediis, aliquando vena videbatur consolidata, & cicatricem contraxisse: postea rursus ex tussi vehementiore particulam seu crustam cicatricis, cum in peluim expectoraret, denuo sputum sanguinis violentius subsequerebatur, & deuorato subinde diacodio, & aliis medicamentis aptis, paulo constitit sanguinis sputum: verum cum sæpius malum rediret & exasperaretur, materiam quoque purulentam longo tempore expellens, hic tandem tabe etiam consumptus, nullis remediis ad tabem valentibus illi conferentibus, extremum diem clausit.

S C H O L I A.

Qui vero ex erosione laborant, si quidem iam sanguinem reicere cœperint erosa vena, prorsus insanabiles esse videntur. Et quamquam prior noster æger curatus fuit, hoc Dei quoque beneficio factum existimamus, cum ab omnibus fere, qui illum inuisebant, pro deplorato haberetur: & quamquam mulier illa vetula bis per me curata fuerit, etiam ter, tamen in extrema senectute, cum malum ad pulmonem serperet, illa quoque licet in extrema senectute, obiit. Et alii duo reliqui ex vena erosa mortem quoque incurrerunt. Quod autem tales sint insanabiles, ratio dicitur: cū sanguis erodens & vitiosus sit, ex prauis saniebus admixtis. Eiusmodi autem corpora breui & facile attemperari nequeunt, quoniam temperatio non fit, nisi vacuatione & renutritione. *9. method.* Hæc autem longius tempus exigunt. Quare cum causa erodens cito tolli nō possit, opus omne medici frustra-

frustrabitur: plus enim proficiet ea exulcerando & erodendo, quam tu attemperando. Præterea cum catarrhus a bronchiis ad venas peruenire debeat, siquidem exulceret, & interim inter mediam pulmonis carnem, qua venæ circumdantur, exulcerasse verisimile est: sed nec ipsum venæ corpus subito quasi ictu quodam fecit, sed sensim erodit, itaque vlcus esse purulentum necesse est, & inflammatū.

8. Quare, vt impossibile fere erat talia sanare, ita & vlcera ex erosione non poterunt. Præterea resarcire carnem oportet, est enim cauum vlcus: id autem breui fieri non potest. Si qui vero seniores sunt, & sicco corpore, hi in longius tempus perdurant, vt euenit huic vetulæ, & Danieli Georgio Melissæo. Et, vt apud Arabes legitur, vitam multo tempore protrahere possunt: & quidem multos vidimus, præter hanc vetulam, qui vsque in extremam senectutem vixerint. Ita soror M. Iacobi Musei Dordraceni, cum sputum sanguinis ex vena pulmonis pateretur, ac quasi pro mortua haberetur, nec vllis remediis restringi posset, ita vt frequenter syncope incurreret, vt ex profusione sanguinis prodeplorata quasi haberetur, cum frustra medicorum quorundam opem experta esset, me tandem vocauit, ac Dordracum accessi 4. Iulii die, anno 1576. quam repperi vires plane habere exhaustas: ideo ad restringendum sanguinem hæc præscripsi: *℞ rad. symphyti conditi ℥j. sanguinis draconis, lapidis hamatidis. an. ℥j. boli armen. veri ℥j. β. terra Lemnia vera ℥j. pul. specier. Haly contra phthisin ℥j. β. diatragacan. frig. in tabul. ℥ij. conser. ros. ℥ij. β. pulueris anda puluerisuntur, vt alcohol. seu in tenuissimum pollinem, & radice pistantur, ac omnia probe simul misceantur cum syr. de portulaca, & syr. myrtil. q. s. & in eclegma coeant, sumat cum sput. liquir. ad libitum, modo sumat particulam vnam rad. symphyti. Atque hic puluis paretur: *℞ boli armen. veri ℥j. β. lapidis hamatidis ℥j. terra Lemnia vera. ℥j. β. corall. rub. gran. vij. fiat pul. subtilissimus ad modum alcohol, & diuidatur in tres partes, & vna pars exhibita fuit cum vino rubro vel ceruisia.* quibus eo tempore vena fuit consolidata, ita, vt ad tempus quasi videretur curata, ac deinde domum reuersus sum. Verum post mensem vnum atq; alterum redibat sputum sanguinis: sed iis remediis rursus deficiebat sputum, vt postea per semiannum deinde redierit, & tandem tabida & macilentā euasit: consulimus tunc vt subinde ℥j. pul. Haly contra tabem cum lacte sumeret. modo cum syr. viol. vel iuiubino: & præcepimus vt amygd. dulces recentes conditas sæpe comederet, & vt pro tussi subinde radices althææ zaccharo incrustatas sumeret: atque ita cum multis deinde & commodis remediis vteremur, ad vitam solum conseruandam, adhuc tabida per tres annos superuixit, & macie ac marcore tunc consumpta obiit. Et ita plurimos vidimus ad extremam fere senectutem peruenisse, quanquam aliquos etiam iam consistentes ætate periisse conspexerimus. Quibuscunque tandem partibus ex vase exeso reiectio sanguinis fiat, per renutritionem erosorum curabimus, Gal. auctore 7. de compos. med. secundum locos. Renutriuntur autem corrosa (vt ipse inquit) per cibos boni succi, & pharmaca carnem gignentia*

(sarcotica a Græcis appellata) ea de re (vt testatur Alexander) non amplius medicamentis, aut cibis admodum astringentibus, aut acidis, sed potius eis, qui contemperare & alterare humoris, qui erosionem excitant, acrimoniam possunt, vti oportet, nisi profusior hæmorrhagia fuerit: nam tunc iis, quæ vehementissime astringunt, vtendum medicamentis est, quoad vehemens eius impetus frangatur, vt auctor est Galenus quinto method. med. Quapropter prisana ægros alere conuenit, aut alica, seu reliquis cibis, quibus nihil adsit, aut salsum, aut acidum, imo nulla alia tenuis qualitas, sed e contra, quæ magis implentem obrurantemq; ipsam reddere queant, ex mente Alexandri: velut est amyli frumentaceum. Ex oleribus competunt intybum, cichorium, buglossum, lactuca: procedente vero tempore, vbi vires infirmas habeant, citra salem offerre expedit carnes gallinarum, pullorum, caponum, perdicum, phasianorum, starnarum, turdorum, ac reliquarum montanarum auium: interdum hædorum, seu castratorum, vt ita dixerim, aut suillorum pedes cum prisana decoctos assument, vt summatim dicam, cibis vtantur boni succi, vt antea etiam diximus, qui etiam humoris influentis acrimoniam obtundere, & crassiorem reddere possint: potissimum vbi ex acri destillatione pulmonis seu thoracis erosio fiat, ab acidis, salis, potissimum veteri caseo, præsertim caprillo aut bubulo (vt Alexander inquit) commode vti possint, tanquam vtili existente. Pro potu aqua vtantur decocta cum semine coriandrorum præparatorū, pauco cinnamomo, aut glycyrrhizæ radice: vino quoque (vbi assueti fuerint) vti aquoso, aut parum rubeo substringenti conuenit. Reliqua peragenda (quod ad destillationem acrem attinet corroden-tem) vt dictum est scholio præcedente.

OBSERVATIO XX.

De sanguinis sputo vehementiore & violento, cum copioso pure.

A Perus de Diick capitaneus, cum militiam diu sequutus esset, & intemperanter vixisset (vt milites solent) & præter id, qd multum vini sæpe ingurgitasset, sæpe scamno, nequaquam lecto incumbens, longo tempore sic pernoctasset, vt in lecto postea vix dormire posset. Homo procerus & alioqui robustus, circa 42. annos natus, cum sese otio dedisset, militiæ pertæsus, nunc & economi quasi officio functus (Galli concierge vocant) incidit ex tussi vehementiore (cum aliquandiu prius circa thoracē dolorem pertensisset) in enormē expuitionem cruentam, adeo copiosam, vt totā peluim sanguine impleuerit, cum pure admodū male olente, vt vix aliquis in cubiculo apud ipsum permanere posset, vt abscessus in pectore esse conicerem, ad eum in nocte accitus: ita vt quotidie fere peluim plenam cū sanguine, & pure expectoraret. Cui statim lorium medicamentū ex decocto hordei cōmunis cum syr. ex infus. ros. cōmuni exhibui ad deterfionem puris: & iussi vt hanc prisana p potu biberet: *℞ hordei mundati p j. glycyrrhizæ rasæ ℥j.*

10. Cruenti, sputi ex vasorum exesione curatio.

2. vuar. passul. enucleat. \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} j. d. lectio in aqua communi
 pro lib. j. & parum zaccaro candi dulcoratur, semel e-
 bulliens quo utebatur pro siti: plurimum enim si-
 tiebat, & non sine febre erat. Et quia valde tussi af-
 ficiebatur, sæpe capiebat frustum vnum ex dia-
 trag. frig. in rhombis seu rotulis concinnato, & ex
 eclegmate sequenti, ut sputum non solum cruen-
 tum & purulentum, sed & pituitosum subinde me-
 lius expectoraret: \mathfrak{z} syr. de liquir. \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} j. syr. capill. ven.
 \mathfrak{z} j. loch. sani \mathfrak{z} ij. syr. viol. \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} j. fiat eclegma, & sumat cum
 bacillo liquir. ad libitum. Cum autem alium non
 probe deponeret & hoc lenitium ebibit: \mathfrak{z} ele-
 ctuarii lenitii \mathfrak{z} vj. diacatholici \mathfrak{z} ij. dissolue cum \mathfrak{z} iij.
 aqua vngula caballina, syrupi ex infus. ros. capill. ven. an.
 \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} j. mis. & accepit in diluculo. Postea magis febrici-
 citavit sub noctem, eratque febris satis continua:
 & quia robustus erat, tam ob sanguinis sputum,
 quam ob febre, venam secum in brachio dex-
 tra ex basilica vena, sanguine utcumque extracto,
 & videbatur paulo melius habere. Decocto se-
 quenti utebatur: \mathfrak{z} hordei mundati m. j. vngula cabal-
 lina m. ij. gly. yerb. rasa \mathfrak{z} ij. vuar. passul. enucleat. \mathfrak{z} j.
 vuar. corinth. \mathfrak{z} j. ficum num. v. fiat decoctio in aqua
 3. communi pro lib. i. col. adde syr. iuiubini. pap. viol. an. \mathfrak{z} j.
 ad contemperandam acrimoniam, misce. Et semper bi-
 bebat ex sua prisana loco potus. Et pro tussi ute-
 batur diatrag. frigido in tabulis, & post aliquot
 dies etiam hoc eclegmate: \mathfrak{z} syr. iuiubini. \mathfrak{z} ij. syr. de
 liquir. \mathfrak{z} ij. syr. capill. ven. \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} j. zacc. penid. \mathfrak{z} ij. diatrag.
 frig. \mathfrak{z} ij. misce, fiat linctus, sumat cum baculo liqui-
 rit. ad libitum: & quia dolebat in pectore, totum
 thoracem inunxit cum oleo amygdal. dulc. &
 longo tempore sub noctem (ne ex acrimonia ma-
 teriæ & ex pure fieret vlcus cauum, & ad pulmo-
 nem procederet) utebatur amygdalato in hunc
 modum parato: \mathfrak{z} amygd. dulc. depilat. \mathfrak{z} ij. sem. quat.
 frig. maior. an. \mathfrak{z} j. cum aqua furs. fiat amygdalatum pro
 lib. j. dulcoretur parum cum zacc. perlato. Quibus re-
 mediis cum videretur euasisse, & melius habere,
 post mensem subito rursus incidit in sanguinis
 sputum copiosum floridum, ita ut suspicio esset ex
 vena pulmonis corrosa euenisse, cum maximo im-
 petu, ut totam peluim impleret. Quare coacti fui-
 4. mus astringentibus uti, & dedimus bolum arme-
 num verum bis aut ter ad \mathfrak{z} j. cum vino Gallico ru-
 bro adstringente, & utebatur continuo decocto
 astringente in hunc modum: \mathfrak{z} rad. symphyti \mathfrak{z} j. bel-
 lidis minoris, pulmonaria, vngula caballina, portulaca,
 plantag. an. m. j. sem. acetosa, portulaca an. \mathfrak{z} j. fiat deco-
 ctio in aqua communi. pro lib. j. colatura adde syrupi de
 portulaca, myrtill. an. \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} j. misce. continuo etiam su-
 mebat syr. de portulaca: & portulaca continuo in ci-
 bo suo utebatur, etiam conditis ex confer. ros. ve-
 teri, rad. symphyti conditi, adiuncto bolo cum syr.
 de portulaca: & tandem sputum sanguinis cessa-
 uit: hac etiam confectione in tabulis frequenter v-
 tebatur: \mathfrak{z} specier. diatrag. frig. \mathfrak{z} ij. boli armeni veri \mathfrak{z} j.
 dissolutis in aqua vngula caballina, adiecto zacc. har. al-
 biff. \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} j. fiat confectio in tabulis. Postea cum minus
 sputum cruentum exiret, & tamen adhuc valde
 tussiret, subinde tenuo capiebat solum ex diatrag.
 frig. in tabulis. etiam ex hoc syr. longo bis terue rei-

terato: \mathfrak{z} vngula caball. m. j. aulium rub. pulmonaria,
 veronica an. m. j. vuar. passul. enucleat. \mathfrak{z} j. vuar. corinth. \mathfrak{z} j.
 fiat decoctio in aqua vngula cab. pro lib. j. dulcoretur zac-
 charo albiff. & iterum bulliat ad consistentiam syrupi
 longi. Postea rursus parum sanguinis cruenti redde-
 bat & ne rediret, semper sub noctem utebatur hoc
 hordeato: \mathfrak{z} hordei mundati p. j. an. ygd. dulc. depilat. \mathfrak{z} j.
 j. \mathfrak{z} j. sem. quat. frigid. maior. mundat. an. \mathfrak{z} j. fiat hordea-
 tum pro \mathfrak{z} x. dulcoretur parum cum zaccaro perlato: \mathfrak{z}
 conferua borag. ros. an. \mathfrak{z} ij. manus Christi cum perlis
 ij. \mathfrak{z} j. syr. iuiubini, myrtini. ana. \mathfrak{z} ij. misce. sumat ad libi-
 tum. etiam post assumptam confectionem in tabu-
 lis ex diatrag. frig. cum bolo (& quia adhuc sangui-
 nem expectorabat) cochlear vnum atque alterum
 subinde sumebat ex decocto sequenti: \mathfrak{z} rad. con-
 solida maioris. \mathfrak{z} j. pyrola, bulga, vngula caball. polygoni.
 an. m. j. liquiritia rasa \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} j. fiat decoctio in ceruis. commu-
 ni pro \mathfrak{z} ix. Interea fuit idem decoctum reiteratum,
 & utebatur omni die ter aut quater \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} j. confer. ros.
 veteris: & pectus inungebat ac locum dolentem o-
 leo amyg. dulc. & myrteo: & sæpiissime sumebat
 particula in vnam rad. consolida maioris condita.
 Quibus intra duos menses (morti destinatus & ab
 omnibus pro deplorato habitus) curatus fuit.
 Quamquam postea post aliquot dies cum foras ex-
 iisset & bene se habuisset, Dordracum profectus
 est ad celebrandas filii nuptias, & cum rediret, ac
 curru Yselmondam peruenisset, flumine traiecto,
 pedestri itinere Delphos venit, defatigatus, & ite-
 rum in sanguinis sputum cum magno impetu hæ-
 morrhagiæ incidit: qui tamen, cum de eius vita alii
 ac ipse desperaret, iisdem remediis supradictis cō-
 ualuit. Et quia postea adhuc tussi afficiebatur, post
 eclegmata conuenientia, ut subinde lacte caprillo
 vteretur (ne in phthisim incideret) concessi. Atque
 his probe curatus, etiam nunc sane viuit, dum hæc
 rursus recolligeremus anno 1590.

S C H O L I A.

7. S Edandæ tussi, cui sputum sanguinis est admi-
 xtum, medici egregie commendant syr. myr-
 ril. quo & nos in hoc ægro frequenter vti sumus.
 Valet etiam syrupus de portulaca in sanguinis spu-
 to, ita & loch. de portulaca, quo frequenter præce-
 ptor meus Elideus Bononiæ utebatur, cum philo-
 nio persico: nam (ut memini) idem Bononiæ ad
 puerum quendam vndecim annorum vocatus e-
 rat, qui sputo cruento laborabat: cui (me & aliis
 studiosis præsentibus) ex vena hepatis cum san-
 guisugis extraxit vncias tres sanguinis: & postea
 eidem præscripsit, ut sæpius hoc electuario vtere-
 tur: \mathfrak{z} philonii persici \mathfrak{z} j. loch. de portulaca \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} j. dedit
 etiam diatrag. frigidum cum bolo. quibus remediis
 idem sanatus fuit. *Matthæus Gradius dat* \mathfrak{z} iij.
 philonii persici vna vice. Hispanus medicus insi-
 gnis Bononiæ dabat coralli rub. pub. \mathfrak{z} j. cum aqua
 arnoglossi. *Gibertus Horstius præceptor meus Roma in*
nosocomio Mariæ Consolationis dabat \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{z} i. \mathfrak{z} j.
 lapid. hamatitidis subtiliss. pul. cum succo granat. vel
 virga pastoris. *Benedictus Fauentinus præceptor meus*
dabat stercoris muris pul. \mathfrak{z} ij. cum aqua plantag.
 Hæc mirabilem effectum habent consolidandi
 venam

di venam ruptam, vel quando cum impetu sanguis erumpit. Vbi autem simul vlcus vel abscessus adfuit, vt in hoc nostro ægro præcedente prius erat, opus quoque absterfione, & vt materia ex pectore educeretur: quod etiam exemplum sequens docebit, cum etiam ex sputo etuente materia viscida adesse possit, vel etiam pus, quæ & expurgari & detergeri debent, atque postea rursus cum impetu fluens astringi debebat.

OBSERVATIO XXI.

De muliere sanguinem putridum, nigrum, & viscidum ab erosione venæ thoracis exspuente.

M Argareta Anna Suskenia dicta, mulier annos triginta quatuor vix excedens, quæ Almaria in platea Homilia vocata habitabat, anno 1546. in fine Veris in pectoris quandam angustiam ac dolorem collapsa est: & tandem longo tempore sanguinem putridum nigrum aliquando & pituitæ admixtum expectorabat, quæ proculdubio symptomata originem habuere ex vena in pectore corrosa, prius etiam catarrho vtrumque falso & corrodente prægresso, vt ab ipsa postmodum intellexi: verum cum ita misere vitam traxisset sine medico, tandem cum phthisin metueret, me accersiri iubet. Ad hanc cum intrassem, & eandem reperissem ex hoc diuturno malo progresso, valde debilem esse, venam non secui, sed leuiter omnium primo eam purgaui, cum cassia extracta in bolo, & loco venæ sectionis altero die ad materiæ catarrhalis diuersionem concurbitelis scapulis cum scarificatione applicari iussi, sanguine mediocriter extracto. Præterea cum copiosa materia in pectus illapsa esset, & valde tussiret, sputum sanguinis inhibere nolui, neque eius impetum impedire, & subito restringere: sed potius nobis visum fuit vtile, iis vt, quæ ad expectorationem facerent, & cum sanguis, quæ exspuebatur in pelui reservatus, crassus esset & niger, viscidus quoque non nihil cum pituita mixtus, non tantum opus erat mundificatione, verum etiam leui incisione ob pituitam: insuper & quadam leui lenitione, tum absterfione, vt sputum commodius exiret, & simul materia detergeretur, ne vlcus tantum ex ea oriri posset. Quare & hunc syrupum post ventris deiectionem ex cassia propinaui: *℞ syr. viol. iuiubini. an. ℥j. syr. de liquiritia, de hyssopo. an. ℥ss. aqua fœniculi, hyssopi. scabiosa. ana. ℥ij. misc. pro ij. dosibus.* & quia satis ex bolo aluum deposuerat, & aluus postea non ita dura resisteret, purgationem aliam non exhibui: sed vt melius sputa exirent & detergerentur, rursus & hunc syrupum ebibit: *℞ syr. de liquir. ℥ij. mellis ros. colati pro maiori absterfione, syr. de hyssop. ob pituitam tenaciorem) an ℥ss. aqua fœniculi, borag. hyssopi. ana. ℥ij. misc. pro duabus vicibus.* Vtebatur quoque inunctione vnguenti pectoralis, nostræ descriptionis. Erat autem in quotidiano vsu apud Adrianum Dodonæum pharmacopœum nostrum, quod ita conficitur: *℞ olei amygd. dul. ℥iiij. butyri sine sale. ℥ij. axungie gallinae, olei chamomill. viol. an. ℥ij. axungie anatis, medulla crurium vituli, vel bouis ℥j. cera alba. ℥jss. hic cera alba magis conueniebat ob aliquam roborat-*

tionem & astrictionem quam citrina, vt paulo post dicemus) *muccilag. seminis psyllii, lini, fœnogræci, althææ. an. ℥jss. gummi tragacanthæ; arab. an. ℥ijss. confice sic: gummi tragac. & arab. ponantur in s. q. aquæ viol. postea colentur per cribrum, & addantur vnguento post concussionem & permutationem mucilaginum & vsui reseruetur.* Valerius Cordus simili quodam vtitur, cuius hæc est descriptio: *℞ mucilag. sem. psyllii, tragac. gummi arab. sem. lini. fœnug. an. ℥j. adipis gallinae, medulla vituli, butyri recentis loti cum aqua viol. ana. ℥jss. olei viol. olei amygd. dul. ana. ℥j. cera alba. q. s. fiat vnguentum.* mitigat dolores pectoris & tussim, digerit, maturat, faciliat sputum & resoluit pleuritidem. Loco autem vnguenti pectoralis, cum Delphis in vsu non sit, vtimur commode vnguento rehumituo, quod apud eos ita conficitur: *℞ axungie porcinae recentis. ℥ij. axungie gallinae, anseris, anatis. an. ℥j. œsypi humid. ℥ij. olei viol. chamomilli. anethini. an. ℥j. cera alba ℥ij. gummi trag. sem. cydon. mucil. sem. lini, althææ. an. ℥ij. sem. fœnogræci. ℥ij. gummi arab. ℥ij. fiat vng. secundum artem.* At alii duo pharmacopœi seniores relinquebant gummi arab. & mucilag. cydon. quo & nos communiter utebamur. In istis vnguentis relaxantibus Rondeletius ponit ceram citrinam, vide plura apud eundem in sua Officina. Sed in hac muliere potius alba addi debuit. Ceterum inuncto pectore postquam & subinde bolo cum diatrag frig. vsa fuisset, sanguinem minus exscreabat: sed ob materiam mucosam quasi purulentam, ideo & hoc eclegma continuo, lambendum dedimus: *℞ diatrag frig. in tabul. zacchari candi ana. ℥ss. loch de pino ℥vj. loch sani. ℥ij. syr. de liquir. q. s. fiat eclegma;* deinde continuo utebatur tam pro absterfione quam consolidatione conseru. ros. duorum annorum: valet enim egregie, vt & zaccharum ros. quo solo mulierem tabidam Auicenna curauit. Quibus quidem remediis & hæc mulier, cum omnes eam tabe affectam & consumptam iudicarent, etiam victus ratione probe obseruata, quam descripsimus scholio præcedente, cum multorum admiratione curata fuit.

SCHOLIA.

Quod si adhuc non est factum vlcus, tunc cum catarrhus descendit, potest hic prouidentia adhiberi, sistendo catarrhum acrem, vt paulo ante diximus, vel eo modo, vt cap. de catarrho scriptum est. Quod si illa in principio fuissent perfecta in hac muliere, non ita diu laborasset, & malum eo progressum non fuisset: quamuis nunc cum maiori periculo euaserit. Nam & in catharrho & in erosa vena corpus purgabimus educantibus excrementa acra, siue biliosa sint, siue exusta: vel serum putrefactum, & temperabimus sanguinem, & in hoc purgatio ex sero lactis iuuat: & potus postmodum lactis, & balnea & cetera, de quibus dictum est, quæ temperant acritudinem. Aliquando tamen nec in pectore, nec in pulmone est malum, sed in aspera arteria sit vlcus ex catarrho, quod sane insanabile non est. Cur autem potius hac parte sanetur, caussa est, vt similiter annota-

uit iacchius, primum quod medicamenta facile applicantur, tum extrinsecus vlcus siccantia, tum intrinsecus, sensum delapsa: & sunt ea, quæ adduximus ad cruenta sananda, tum emplastica, tum linctus, vt consolidæ maioris radix, & portulaca, & terra lemania: si sordidum, extergente & siccante est opus. Secundo, quoniam pars natura sicca est, ideo leuiter putredinem suscipit. Sitis quoque facit lubricus, vt non facile ibi figantur acres humores. Hinc Galenus recitat multos sanatos libr. 5. meth. med. sed præcipue eos, qui ex febre pestilenti in hoc inciderant mali, quod erant sicca vlcera & scabiei similia, vnde exigua ope sanabantur. Hæc autem est vlceris curatio. Quod vero talia essent vlcera, ex sputo monstrabatur, quo crustulæ educebantur. Maxime vero ad horum sanationem facit, quod sane euenit iis, qui sunt corpore adhuc vegeti, siccare oportet, & curare cura catarrhi acris & erodentis, cum siccantibus & temperantibus sanguinem. Sed hos securitatis gratia, ad Tabias & lactis vsum demittebat Galenus, vt loco citato ad longum videre poteris. Videtur autem collem ralem describere, qualis ille est apud Iacchium in sua patria, S. Iuliani dictus, aprieus, non procul a mari, & herbis siccissimis confitus, vnde lac idoneum. Dicit autem Galen. Tabias in imo maxime sinu esse, qui inter Surrentem & Neapolim conspicitur: magis tamen in latere, quod ad Surrentem pertinet. Reliqua vide apud Galenum loco citato. Sic enim Galenus omnes, qui primo die se illi curandos permiserunt, sanauit: qui vero post duos aut tres, non omnes curauit: sed aliquibus eorum insanabile vlcus fuit. Quotquot autem phlegmone sic occupauit, vt iam febricitaret, horum nullus est in totum per sanatus. Sed qui postea sic per omnia præsidia rite transierunt, vt siccaretur vlcus, ii tantum saltem lucrifecerunt, vt illud nec vltra progredere, nec maius fieret, sed siccatum, ac callo duratum, longiore vita frui hominem sineret. Sed illi, qui vlcus in pulmone habebant, insanabiles eidem videbantur.

OBSERVATIO XXII.

De sanguinis sputo per periodos recurrente.

VIR quædam annos quadraginta, vel paulo minus habens, bona constitutione, minime febricitans, conquerebatur, se iam ter sanguinis sputo vere instante laborasse, absque tamen pectoris dolore, cum tussi exigua. Quem rogavi nūquid sanguine naribus fluere soleret, vel num aliquando hæmorrhoidū fluxione laborasset. Quod cum didicissem & ab eo intellexissem, cum nunc sputo laboraret, quando me accedebat, ilico sanguinem extrahere iussi ex brachii vena interna, & bene habuit. Venit mihi tunc in mentem similis casus apud Amatum cent. 2. curat. 13. descriptus de Angelo de Prato singularis doctrinæ viro: qui hæmorrhoides solitus erat habere, & copiosum sanguinem emittere: qui sanguis per remedia adhibita ex toto cohibitus fuit. Vnde veris statuto tempore sanguinis reiectio illi superueniebat, cui post venam internam brachii sectam, cum bene haberet, deinde imperaui, vt singulis sequentibus

annis antequam morbus ipsum inuaderet, venis hæmorrhoidibus dictis hirudines admoueret, sanguinemque traherent quoad deciderent: qua sane diuersiua euacuatione, homo absque sanguinis ex pectore reiectione, sanus & incolumis perseverabat. Idem quoque consului, vt noster æger faceret.

S C H O L I A.

ERat hæc anastomosis, quam euenire diximus. Vbi fusus sanguis, & ita ruens in venas, & replens tandem minores, ora aperit, vel natura proritata, sicut profluvia mensium euenire solent: quibus in mulieribus cessantibus, vt ait Hippocrates, mala euenire solent: ita & hæmorrhoidibus constrictis his euenit, & ita hæc anastomosis similitudine contingit, quod nos pluries vidimus. Curatio eadem est, qua vtimur in sanguinis profluviiis aliis. Primum igitur reuulsione valida vti licet, non adeo leui, vt in rupta. Sed si a multitudine fusio facta sit, vtemur ad remota valde. Fit autem reuulsio non modo, ne multus nimium vacuetur sanguis, sed & quia per regionem conuenientem non fertur: ideo tametsi vacuatione est opus, at ea tamen non facienda est via, sed alia vtemur. Vtemur etiam aliis reuellentibus, quæ dicta sunt. Dehinc & aperitioni medebimur, hoc autem fiet adstringentibus tum ebibitis, tum foris apposis, & sunt ea omnia, de quibus supra mentio facta est. Hic, & diapedesis curatur: poterit & æger simili modo purgari, vt de erosione dictum est, interea sanguis magis retinendus, glutinantibus & obstruentibus, quam obtrudentibus acrimoniam. Solet enim hoc fieri vel ob venarum raritatem, vt diximus, vel ob sanguinis tenuitatem, & ob id laudantur alimenta, quæ emplasticam vim habent, & obstruentem, vt polëa cum lacte, & omnia, quæ ex lacte & farina parantur.

OBSERVATIO XXIII.

De sanguinis sputo ex ore & gingivis profluente.

Sanguinem ex ore & gingivis simplici exspuitione diximus posse expelli, quod & sensus diiudicat, cuius exemplum posuimus obser. 17. libr. 14. Ita etiam mulier maniaca, quæ Delphis in ægero nouo habitabat, anno 1565. cum epulidas nigras tumidasque ac plumbeas haberet, ex ore, gingivis & palato sanguis continuo emanabat. Chirurgus carcinomate affici, & noli me tangere, affirmabat. At nos hæc infra scripta cum adhibuissemus remedia, mulier maniaca & melancholica curata fuit: ℞ flor. borag. summitatum lupul. cochlear. bekabungæ, nasturtii aquatici, fumariæ. ana. m. j. sem. anisi ʒj. β. rad. ferri petros. cichorii. ana. ʒj. glycyrrh. rasæ ʒss. foli. r. senæ ʒj. epithymi. ʒβ. polypod. querc. ʒvj. vuar. passul. enuclear. ʒβ. coquantur in aqua communi pro ℞. j. stent infusa per noctem, & colat. adde syr. de epithyme ʒij. syr. de fimo terræ. ʒj. misce pro iij. dosibus matutinis, quibus quotidie ad minus sexies valde melancholica & copiosa excrementa deiecit: ℞ plantagin. equiseti, bistorta, bekabungæ. ana. m. j. flor. ros. rub. cochleariæ. ana. m. β. coquantur in aqua ferrata pro ℞. j. β. aluminis. ʒiij. β. semel ebulliant & iterum colentur, addendo mellis ros. colati ʒij. β. syr. sceleris nostri. ʒj. j. misce. quo gingivæ fortiter abluantur, vt sanguis corruptus

3
Anastomosis
& eius cura-
tio.

Diapedesis.

ptus egregie defluat. Demum hoc linamento gingiuis sanguifluis inunctis non amplius sanguis effluxit: ℞. succi bekabunga (alii capream vocant) ℥ij. succi cochlearia (alii telephium esse putant) ℥j. succi fumaria ℥ss. balauft. ros. rub. exsiccatum & puluerizatorum. an. ℥ss. pul. salua sicca ℥j. aluminis vsti ℥ij. mellis q. s. fiat linamentum.

SCHOLIA.

3. *Curatio cruenti sputi ex gingiuis proveniat.*
Q Vanquam hæc ad Scurbutum malum pertinet, de quo suo loco dicemus, si idem malum fiat absque scurbuto, exiguum est: nam ubi ex gingiuis sanguis exit vel sputio cruenta sequatur, portulacam manducasse (Celsus auctore) satis est, vel os ad gingivas colluimus cum stipticis acerbis & gingivas roborantibus, ut decocto plantag. ros. gallar. portul. balauft. ex gargarismis, vel ex his linimenta parata adhibebimus. Si ex ore sanguis fluat, proderit continuisse eo merum vinum, si id parum proficit, acetum, quo & lingua secta, si sanguinem nimium profundat, iuuat, adiecta aqua. Celsus, si impetuose ab ore profluat, cucurbitulam occipitio admovent: si id mulieri euenit, incisus inguinibus admovent. Conueniunt & collutiones ex astringentibus cum vino rubro. alii sanguinem etiam mittunt ex vena humerali, alioqui in talo in mulieribus si menstrua non ferantur. Si vero ex locis circa fauces aut gurgulionem sanguis feratur aut per palatum, gargarizare iisdem oportet, & astringentia fronti & capiti admovent, & ea quæ ex naribus sanguinem fundentibus accommodantur, Paulo teste. Et si sanguis ex gutture fluat, sæpe ad rem fecit sola portulaca manducata, profunt & gargarismata constringentia, de quibus satis dictum est, cum de malis gutturis loqueremur, cum & de sanguifuga gutturi in hærente diximus. Si a capite sanguis feratur, multusque sit, qui defertur, euacuatione opus erit, ex Aetii sententia, vel per nares vel vena secta, deriuando ad propinqua, aut ad longinquas partes diuertendo, frontem quoque acacia & tempora illinemus; & cucurbitam occipitio, ex Cæli Aureliani sententia, apponemus. Et licet nihil periculi adferat, si tamen vires deiecit, cephalica incidenda, & gargarismis astringentibus vtendum, & cibis stipticis & vino rubro. Si autem defluat a capite ad pulmonem, curabimus ut prius dictum est de sputione cruenta ob destillationem.

OBSERVATIO XXIV.

De vomitu sanguinis.

1. **S**anguinem e iecinore aut liene quandoque per ventriculum vomitione reici, testatur Galenus libr. 5. cap. 5. A quocunque autem viscere, siue a quacunque parte in ventriculum influat, semper cum molestia, violentia, magna virium prostratione, ἀλεipoδυμία euacuatur: frequenter enim in ipsa vomitione, ægri deficiunt, veluti Guilhelmo Iohanni Prætori Alcmariano, auunculo vxoris meæ, contigit, qui cum vina calidissima in secundis nuptiis filii sui largius bibisset anno 1547. ipso D. Augustini festo subito sublatu est, cum ingenti impetu sanguinis, nescio quot heminas intra & supra deiecisset. Nos autem cum Oudt-

gero Medico seniore Amstelrodamensi ad eum ingressi, venam cauam ex multitudine vini acris rupturam esse existimauimus, cum tantum sanguinis profudisset, ut & integram situlam repleuisset. Facile quoque deficiunt ægri, præsertim si ex iecinore efferatur: veluti etiam accidit cuida M. Guilhelmo Brasserio Theologiæ licentiato Delpheni, cui sanguis ab hepate ad ventriculum deferrebat, & ex eo demum vomitu expellebatur. Huic enim dextrum hypochondrium dolebat, & tumor aderat, sanguinemque modo grumosum, modo purum euomebat. Hic bis a me curatus fuit, cum plus quam tres heminas sanguinis, tam supra quam infra deiecisset. Hic autem vino admodum calido & potenti delectabatur, cui valde indulgebat, quamuis per me admonitus, ut ab eiusmodi vinis abstineret. Ceterum his admonitionibus postpositis, apud amicos cum largius iis vteretur, tandem in idem malum cum tertia vice prolapsus esset, & per superna ac inferna sanguinem adeo copiose profudisset (non aliter quam bos iugulatus sanguinem effundit) & cum magno impetu indefinenter euomisset, mox e vita sublatus est. Ioannes Bokellus Delphensis vino repletus cum ex mensa saltasset, incidit in vomitum sanguinis enormem, ut plusquam sex vel plures heminas sanguinis euomeret, adeo ut pro mortuo haberetur: fuit hic tamen per me curatus, quanquam postea ex nimio illo sanguinis vomitu, cumque sanguinem copiose simul per anum excreuisset cum magno impetu, hepar debilitatum fuit, neque bonam victus rationem obseruans post vnum atque alterum mensem cepit venter intumescere, neque tunc mea opera, nec aptis remediis vtens tandem ad hydropem deuenit, & medicum quendam Paracelsicum ad se vocauit, qui ei sanitatem pollicebatur, variis & multis prædiis vtens, iisque vehementissimis, indies in peius vergebat, & venter quotidie in maximam molem increuit, ut iam ascites confirmata laboraret, viribus paulatim absumtis, tandem post sex menses alium medicum adhibuit: cum nec ille aliquid proficeret, me tunc in consilium vocarunt, etiam alio chirurgo præfente, qui vna cum medico altero paracentesim proponebant, qua & salutem ægro promittebant, quam ego tamen admittere nolui, certis rationibus adductus; cum vires iam prostratæ essent, & cum sanguis prius copiose & sine mensura effusus esset, unde postea ascites, & nunc vires deiectæ, ut æger ex lecto se mouere non posset, quin animo deficeret, validis medicamentis prægressis: & ideo nequaquam paracentesim fieri debere, nec tantam tyrannidem sufferre posse dixi, & si fieret in homine in partibus superioribus iam macie consumto, facie nigra, temporibus collapsis, quod intra 24. horas mortem subiret. Itaque cum paracentesim, nequaquam admittere vellem, me reliquerunt. Interea tamen abstinent ad tempus a paracentesi: quam postea apud ægrum vrgentes perfecerunt; sed cum vtriusque ignominia, adeo, ut cum aqua profusa altero die æger exspirauerit, ita, ut prædictionem meam veram fuisse, proh

dolor: parentes serius experti fuerunt. Qui vero a vomitione sanguinis in ascitem prolabantur, ex eadem pereunt. Ab hac autem neminem, etiam si sanguis ex liene fundatur, Dodonæus quoque seruatum nouit: cum idem referat mulierem quandam post frequentes vomitiones in ascitem incidisse, quæ licet sanitati restituta videbatur, & ab aquoso humore liberata; paulo tamen post, denuo sanguinis vomitione superueniente, extincta est. Ita & alius quidam vir ex frequenti vomitu sanguinis asciticus factus fuerat: per prominentem umbilicum laneo filo siue licio transmissio; aquosus humor sensim affluerat, sed nihilominus non multo post mortuus est. Quibus vero ex liene sanguis funditur, raro in prima vomitione deficiunt, sed vel recurrente subinde sæpius vomitione, pereunt, veluti cuidam accidit, cum tertia vice, vomitione sanguinis ex liene utcumque copiosa, laborasset, & hic quoque obiit. Qui cum vino Hispanico libenter vteretur, admonui illum, ut ab eo abstineret, alioqui eum, cum bis atque ter a vomitione curatus esset, ea redeunte, moriturum: quemadmodum eidem, non obtemperanti nostris monitis, contigit. Verum Andreas monachus in abbazia Egmondensi, anno 1550. mense Augusto iuuenis annos viginti tres natus, in vomitum enormem sanguinis cum incidisset, plus quam tres integras matulas sanguine purissimo repletas vomuit. Quod equidem multi mecum & famulus pharmacopœi Alcmarianus viderunt. Cum aluum non redderet, ad diuersionem glande indita aluum deposuit: & quum debilis esset, sanguinis vomitione violenta existente, ita ut nulla sanguinis detrahendi (quod nonnulli præcipiunt) occasio relicta esset, diuersiones, veluti brachiorum ac crurum frictiones, adhibuimus, & vnice laborauimus, ut vires conseruarentur & lapsæ repararentur: nam tales (ut iam diximus) creberrime in ipsa vomitione, & citissime deficiunt. Et hunc syrupum ebibit: ℞. syr. ex ros. siccis, de end. an. ʒj. syr. de cicchar. cum rhabar. ne in grumum sanguinis conuerteretur) syr. de portulaca. ana ʒj. aqua end. portul. plantag. an. ʒij. misc. pro ij. dosibus. Cum autem plurimum sitiret, capiebat ex syr. de ribes, & rob. de ribes, & syr. viol. Postea vero, cum & sanguinem concretum euomeret, & plurimum augeretur, nolimus subito sanguinem astringere: ideo aquam decoct. hordei communis dedimus cum syr. ex infus. ros. communi pro absterforio medicamento. Sed paucis horis interiectis, cum iterum copiose sanguinem euomeret, hanc portionem ebibit: ℞. syr. ex ros. siccis. syr. cydon. an. ʒj. mellis ros. colati ʒj. aquar. plantag. scabiosa, vngula caball. an. ʒij. misc. pro ij. dosibus. & pro paulatina restrictione ex hoc condito utebatur: ℞. conser. ros. antiqua ʒj. conser. bugloss. capill. vener. an. ʒj. pul. specier. trions. ʒj. trochisc. de carabe. ʒj. cum syr. myrteo, ros. ex ros. siccis. q. s. pro condito. Quibus cum sanguis nondum restringeretur, & rursus integram matulam euomeret, & animo fere deficeret, quasi iam moriturus, vltima inunctione munitus, ut hinc emigraturus, attamen hanc portionem infrascriptam dedit: ℞. mumia ʒj. succi equiseti ʒj. aqua plantag.

equiseti. an. ʒj. ʒ. totum frigide cum ebibisset, sanguis restrictus est, neque amplius vomuit: ventriculo quoque exterius inuncto cum oleo myrteo & cydon. aluo deinde ad quatuor dies adstricta remanente. Et cum debilis esset, neque ex lecto moueri posset, medicamentum aluum mouens aut leniens per os dare minime ausus fui, ne vomitus sanguinolentus denuo rediret, quare iniectione clystere, ter quaterque aluum deposuit, in hunc modum parato: ℞. iuris galli decrepiti. lbj. cassia mundata ʒj. olei amygd. dulc. viol. ana ʒj. ʒ. salis ʒj. misc. pro clystere. quo ter quaterque excrementa prius dura, mox mollia deposuit, cum maxima alleuatione, virtute roborata, vomitu non amplius subsequente. Ceterum cum parum tussiret, & minus dormiret, ne iterum in vomitum incideret, eclegma sequens ad libitum sumsit: ℞. syr. myrtini. ʒj. ʒ. (sedat tussim & vomitum compescit) syr. papau. syr. iuiubini. ana ʒj. ʒ. muccag. cydon. extracta cum aqua vngula cabal. ʒij. syr. viol. de liquir. ana ʒij. diatrag. frigid. in tabul. zacch. penid. ana ʒij. ʒ. probe mixtis: fiat loch. Interea in ore subinde tenebat modo zacch. candum, modo diatrag. frig. in tabulis, eaque paulatim deglutiebat. Pro somno inducendo tempora illinebat oleo pap. mandrag. granis tribus opii adiectis: & eclegma sequens sub noctem sumsit: ℞. succi flor. nenuph. albi depurati, syr. pap. an. ʒj. ʒ. misc. Quibus remediis tussis cessauit: neque vomitus rediit, fuitque miraculi instar curatus. Quamuis post duos annos pancreaticæ viuens, ut mihi postea relatum est, ex catarrho acris ad tabem tandem deuenit, & cum frustra a Gallo medico (nam ad eum illo tempore non accitus fui) sanaretur, phthisi obiit. Ar vxor Iacobi Schor mercatoris Delfensis, cum febre satis continua laboraret, & dolorē in hypochondrio dextro sentiret, sanguinem tandem euomit, modo concretum, modo magis purum, & per inferiora sanguinem quoque deiciebat, mulier valde obesa. Ad hanc vna cum Busennio doctissimo collega meo mense Decembr. anno 1584. accitus, cum satis robusta esset, ilico venam in brachio dextro ad diuersionem, & etiam ad febrem secari vna iussimus, mediocriter sanguine extracto, & satis contulit. Hypochondrio dextro ceratum admouimus ex vnguento santalino, cui paulillum olei chamomill. ros. & anethini: ob dolorem, admixtum esset; pauca cera alba, & exigua resina adiecta, ut melius adhereret. Et cum postea ex sanguinis reiectione valde debilis esset, sumebat ex his tabulis bis in die ʒj. ʒ. vel ter. ℞. specier. diatrag. abb. ʒj. ʒ. spec. trions. ʒj. spec. diamarg. frig. ʒj. dissol. in aqua borag. & portul. adiecta zacch. albiss. ʒj. ʒ. fiat confectio in tabulis. Postea & hypochondrio dextro solum ceratum santalinum apponebatur: & hoc condito (redeunte subinde vomitu, & cum per inferiora sanguinem excerneret) utebatur: ℞. conser. ros. antiqua. ʒj. diacydon. sine speciebus ʒij. specier. trionsant. ʒj. ʒ. spodi ʒj. margar. subtilissime tritarum ʒj. ʒ. syr. cydon. quan. s. fiat conditum: utebatur pullo cocto portulaca adiecta, & nodulo ex rhu obloniorum iniectione: ius potissimum sumebat, vel eiusdem colaticium. Cum circa flo-

ca stomachum etiam doleret. hanc mixturam capiebat, quæ & hepatis conueniebat. *℞ conserua ab-
sinthii Romani ℥j. conser. folior. acetosa ℥ss. specier.
diarod. abb. specier. trionf. an. ℥j. fiat mixtura.* Si-
militer & hanc postea capiebat: *℞ conser. fol. aceto-
sa, conser. absinthii Rom. an. ℥ss. conser. bor. ros. ana. ℥ij.
specier. diarod. abb. arom. ros. sine musco, specier. tri-
onf. an. ℥ss. fiat mixtura.* Et febris eam relinque-
bat & vomitus desit, tamē subinde tunc sumebat
ex syrupo menthaceo, & quia hæc valde obesa ef-
fet, ne in hydropem incideret, ad hepatis roborati-
onem & eiusdem deobstructionem fotu quoq;
vsi sumus, in hunc modum parato: *℞ mentha, flor-
ros. rub. an. m. j. absinthii Roman. p. j. seminis myr-
till. ℥ij. coquantur in aqua communi & vino rub. pro
℥ss. j. post colaturam adde aceti ros. ℥ij. misce.* su-
mebat & ad roborationem ventriculi syr. métha-
ceum & byzantinum, duo cochlearia bis in die.
Et cum postea adhuc dolore ventriculi afficeretur,
& toto ventre, cum lubricam aluum haberet,
ad roborationem ventriculi. *℞ unguenti stomac. ℥ss.
olei cydon. ros. an. ℥ij.* postea & huic linimento
guttas tres olei gai yoph. & olei cortic. limonis, ad
meliolem odorem adieciimus. Cum circiter men-
sem decubisset, cum multorum admiratione sa-
nitati fuit restituta. Ob debilem stomachum cera-
tum vltimo ex sola mastice vtriusq; nostrum con-
silio ventriculo impositum fuit.

SCHOLIA.

B Rassetio ac Ioanni Bokello, ac mulieri vom-
itus sanguinis & per inferiora eiusdē deiectio,
proculdubio ab ipso hepate originem habue-
re: nam in dextra parte (vbi hepar situm est) ad-
erat dolor & tumor, cum & sanguis ipse grumosus
subinde exsisteret, atq; in ventrem seu ventriculū
deferretur, cum etiam copiose & cum impetu ex-
pelleretur: sanguis enim si e stomacho educatur,
præterquam quod vomitione excernitur, nō ma-
gna est sanguinis eruptio: graciles etenim sunt
stomachi venæ, vt inquit Aetius: & cum nausea
quoq; sanguis effertur, ac in deglutiēdo mordaci-
tas percipitur, maxime si astringentia aut acrida de-
glutiantur, vt antea dictum est: & sanguis quoque
aliquando cum cibo, modo etiam cum pituita aut
bile permixtus, effertur. Hoc modo Theod. Fore-
stus frater meus (cuius mentionem quoque feci-
mus in lib. Obs. de febribus) sanguinem cum ci-
bo & pituita, sed in exigua quantitate, euomebat.
hic & melancholia hypocondriaca multis annis
laborans, a me curatus fuit. Alius sanguinem ex
liene, in ventriculum delatum euomebat, grumo-
sum & magis nigrum, qualis a splene in ventrem
fertur. Scribit Dodonæus, se multos cognouisse
sanguinem vomitione ex liene reiiciētes, qui pal-
lentes fuere, & in quibus sæpenumero sinistro hy-
pocondrio tumidus splen manifeste (vt in illo
qui sanguinem copiose ex liene euomebat) sen-
tiebatur, sed ante vomitionem: nam ex vomitio-
ne, exonerato iam splene, subsederat tumor, nec
deprehendi poterat. Plerique horum tertia aut
quarta vomitione, vel etiam frequentiore (multis
inter singulas mensibus, vt plurimū intermedis)

perierunt: sic & eger ille, de quo in obs. præceden-
te dictum est, post tertiam vomitionem: alii post
crebras vomitiones in ascitē lapsi, tandem & mor-
tui sunt. Refert aut idem Dodonæus vnum aut al-
terum suo consilio post vnicam vomitionē serua-
tum, & quidem frequēti absinthii quoquo modo
vfu, vt in suis Stirpiū historiis cap. de absinthio
scripsit. Verū Bokellus noster ex copioso vomitu
sanguinis asciticus factus: neque paracentesis vllō
modo profuit, cum statim post eandem peractam
obierit. ita neq; in viro illo, de quo meminit Do-
donæus, qui a frequenti vomitu sanguinis ascitem
incurrerat, per prominētem vmbilicum laneo fi-
lo transmissio, licet aquosus humor sensim efflu-
xisset, quicquam profuit, cum & postea mortuus
fuerit. Illius enim lien sanguini concreto similis,
substantiæ soliditatē haud retinens, facile in par-
tes soluebatur: quandoq; siquidem, cum venter
amplius distēdi nequit, vmbilicus foras irumpit,
& in tumorem attollitur, aquoso distentus ac re-
pletus humore: quod Græci *ὄδρημαλον* appellant. *ὄδρημαλον*
Et tunc quidem per hunc laneo filo transmissio,
vel etiam eodem scalpello aperto, humor effluit,
nullo subsequente fructu alio, quam quod ager a
distentione ventris paucō tempore liberetur.
Prius enim quam vmbilicus erumpat, iam interna
viscera corrupta ac putrida sunt: proinde sanitas
nec expectari nec sperari potest, multo minus in
nostro Bokello paracentesis auxilio esse potuit, nō
solum hepate corrupto, sed viribus ad extremum
collapsis: quare etiam statim ab effusione aque in-
tra 24 horas, vt prædixeramus, obiit. Nā, vt Hip-
poc. prorrh. lib. 2. Eum qui ab hydrope, siue aqua
inter cutem correptus est, & superstes esse valet,
bonis visceribus præditum esse oportet. Præterea,
vt omnes medici sentiunt, in talibus (multo mi-
nus in iis, qui vires prostratas habēt) utilis esse po-
test paracentesis: imo adeo periculosa est, vt mox
mortem inferat, vt huic nostro agro contigit, vt
prius prædixeramus: ex quo prognostico nos ho-
norē habuimus, alii vero infamiam. Qui aut san-
guinem ex iecinore reiiciunt, raro euadunt, & ij
multo minus, qui vino largiore, eoq; potenti vtū-
tur, vt iam exemplis constat: a splene quoq; raro
liberantur. Ita & Hadrianus Schoonhoueus Del-
phensis hypodidascalus, cum sanguinem grumo-
sum & nigrum per intervalla euomisset, postea
in tabem incidit, a qua euadere non potuit: quem
& collega meus Cornelius Heydius curabat. Qui-
cunque sanguinem copiose vomunt, etiam tussi-
endo, & largiore vini potu, raro curantur. Sic mi-
les quidam, iuuenis annos natus 29. cum integras
noctes diesque more militum vino calidiorē sese
impleuisset, & frequenti coitu supra modum se
fatigasset vena in pectore ei rupta est, adeo vt tussim
integram concham seu peluim tonsoriam sangui-
ne, quem vomebat, repleuerit, & simul in febrem
continuatam inciderit ac delirium, ita vt nulla re-
media, quantumuis apta adhibita iuuare potue-
rint: vnde non diu post mors subsequuta est, deli-
rio eidem ad finem adhærente. Ceterum, quod ad
curationem attinet: venæ sectionem ad ducere.

12
Vomit
sanguinis
ab hepate.

Ex stomacho

13
Ex liene.

15

16

nem in exigua quantitate, vel etiam repetitam valere diximus: his quidem vena incidenda est (modo vires ferant, vt in muliere fecimus) in cubito statim basilica dicta, si ex hepate in ventrem deferatur. Si a splene, incidenda erit vena, quæ inter paruum & annularem digitum in sinistra manu est: sic namque probe & proprie auxiliaberis. Hepati vero quidam etiam ventosam siccam imponunt ad sanguinis retractionem: sed in corpore plethorico non facile adhibenda: & præstat vincula partibus extremis iniicere. Primo ad inferiora, postea ad superiora, deinde ad styptica & adstringentia veniendum, de quib. satis dictum est: & prout vas magnum ruptum est, eo magis adstrictorii vtendum: etiam topica adstringentia membris ipsis adhibenda, tamen cum cautione, non ante diuersionem. Si ex stomacho sanguis feratur, venæ sectio quoq; ad diuersionem iuuare potest, tum alia iam sepius dicta. Interea considerandum, numquid sanguis in grumum concreascit & pessima accidentia inferat. Etenim non solum in ventriculo, sed etiam in pectoris cauo vel pulmone si cōglobetur, statim periculosa symptomata apparent: extrema frigore corripuntur, venarum pulsus intercipiuntur, anhelitus creber fit, anima extialiter deficit, mirumque quod humorum naturæ familiarissimus tam subito effusus specie in veneni gerat: tunc ilico dissoluendus erit sanguis in grumum congelatus, iisdem remediis, quæ scholio obser. 15. huius libri recensuimus.

OBSERVATIO XXV.

De menstrua purgatione vomitu proiecta.

MONACHA iuuenula 25. annum agens apud D. Ursulā Delphis, certis mensium temporib., vomitu menstruum sanguinem per superiora reiciebat. Ad eam cum accitus essem, virib. deiectis erat, circa lumbos valde dolebat, ac pectus intumuit, adeo vt vrina in totū fuerit suppressa, adeo, & dolor intensissimus in rene sinistro, ita vt astantes de futuro abscessu metuerent. Cum autem per plures dies aluum non deiecisset, & sanguinem euomisset, ad diuersionem & etiam deriuationem ex rene, clysterem iniicere iubeo. *℞ iuris pulli decocti, cui pruna, vna passa & seminis anisi exiguum incocta erant, ℥b. j. cassia mundata pro clysteribus. ℥j. olei oliuarum, amygd. dul. chamomill. ana ℥j. salis communis ℥j. salis gemma ℥b. vitellum vnius oui. misce pro clysteri.* quo aluus non solum soluta est, sed facta diuersione vomitus pro eo tempore cessauit, & menses ex vtero more solito fluxere: atq; hoc vnico remedio præter spem conualuit. Interea, cum antea singulis mensibus vomitio hæc sanguinolenta redire soleret, ne fieret recidua, consului, vt nouilunio instante, antequam vomitio contingeret, venam in talo seu saphenam dictam incidere iuberet, sanguine vtcumque extracto. Verum nescio qua ignauia illud ipsum sit prætermisum: ita vt post mensem idem vitium recurreret, adeo vt non solum sanguinem menstruum euomeret, verum etiam cibum nullum continere posset: &, quod peius fuit, vrina in totum fuit

rursus suppressa, ac aluus adeo restricta, vt per octo dies nihil excreuerit. Eo autem tempore eram vocatus ad ægrum Leydis decumbentem, atque hæc ipsa aliarum monacharum persuasione (vt opinor) medicum Empiricum & tonsorem ad se vocauit: is diaphœnicon per os exhibet, sed cum aluus eo medicamento non solueretur, sororculæ pharmacopœum accedunt, qui & clysterem prius a me descriptum iniicit, sed eundem per superiora & os reiecit. Transactis deinde duobus diebus me reuersum accersiri iubent: cumq; ad illam ingressus essem, & intellexissem vndecimum diem prægressum, quo aluū non deposuerat, statim balano indito eam frustra irritabā: quare de secundo enemate iniiciendo admonui. Hic mater monacharum ab empirico edocta clysterem admittere noluit, nam si eo vteretur, eam morituram prædixerat. Cui respondi, N. si illud fiat, veremur morietur, cum iam 12. dies esset, quod aluum non deposuisset, neque vlla medicamenta per os, neque cibum retinere posset. Quare fingebam me discessurum, cum apta remedia adhibere non possem. Quib. dictis, mater cœnobii admisit, & enema sequens iniectum est. *℞ decoct. superscripta (in qua bullierint parietariæ, folior. maluæ, florum chamomill. meliloti. an. m. j.) ℥b. i. cassia mundata pro clysterib. ℥j. ℞ zach. rub. ℥b. olei chamomill. amygd. dul. an. ℥j. olei anethini, oliuarum. an. ℥b. salis gemma ℥j. salis communis ℥b. vitellum vnius oui, misce pro enemate.* quo probe aluum deposuit, primo stercore duro reiecto, mox excrementis mollioribus subsequentibus: & rursus cessauit vomitus, ac aperti sunt menses: & egregie cum nostro honore conualuit: & ex nostro cōsilio, periodo mensium instante, vena tali cum secta fuisset, postea nunquam hoc fecit malo laborauit. Et nunc cum libertas religionis accessisset, viro nupta multas proles peperit. & adhuc superstes est, & bene valet dum hæc recolligerem, anno 1591.

SCHOLIA.

CVM hanc monacham curarem, in mentem mihi venit historia illa Beniuennii de muliere menles vomitione reiciente. quam lib. De abditis morborum causis cap. 41. in hunc modum recenset: Vrgebatur mulier acerbissimo capitis dolore, propterea quod menses non prouenirent: verum his demum vomitione propulsis ilico sublatus est dolor. Sed cum id iterum iterumq; ac sæpius factitasset, abhorrens tandem mulier ab huiusmodi vitio, auxilium nostrum exposcit: qui sola sanguinis missione ex venula, quæ sub talo est, & menstrua ipsa ex naturali loco rite profluere coegimus, &, quod sequens est, mulierem ipsam pristinae sanitati restitimus. Memorat & Dodonæus de quadam virgine in hunc modum: Ab vtero autem suppressis mensibus raro item sanguinis vomitio superuenit. Virgini vero cuidā mihi obseruatum, quæ in ipsa vomitione grauiter laborauit: postea vero idoneis adhibitis remediis, & sanguine ex interiore vena prope talū detracto, cū menstrua purgatio successisset, bene se habuit, quod apho. 34. sect. 5. Hipp. docet, Mulieri sanguinem euo-

4
Historia
Beniuennii de
muliere vomitione menses proticiemte.

Sanguinis
conglobati
symptomata.

Cornelius nauium confector, vt fortis & robustus, annos natus fere 36. mali regiminis, q. & subinde potabat, mense Aprili, cum paulo intensius naues reparasset ann. 1546. in pleuritidē lapsus est: ad quem 4. die prius accitus fui: costas superiores multum dolebat, dolore quidem pungente & acuto, cum quo multum tussiebat, & sputum sanguineum emittebat, continuo vero febricitabat, & vt paucis referā, omnia patiebatur, quæ in graui comperiuntur pleuritide. Quæ cum animaduertissem, cum eodem die aluum ex se deposuisset, ilico venam basilicam eiusdem lateris, vbi dolor erat, secare feci, sanguinēq; vncias octo extrahere, in homine sanguineo, qui procul dubio putridus, & omni corruptione affectus erat, ac ex phlegmone defluerat, a qua sanguinis missione dolor nonnihil euauit, qui tamen sub noctem ex parte redibat: sed fotu sequenti plurimum mitigatus est, loco affecto simul inuncto. *℞ flor. chamomilla, meliloti, malua, an. m. j. sem. fenugraci 3 ℔. fiat decoct. in aqua communipro ℔. j. pro fotu, cum spongis expressis. vt artis est: ℞ olei amygd. dul. chamomill. ping. gallina, butyri recentis. an. 3 ℔. cera citrina modicum, fiat ung.* Vnde & dolor ita sedatus est, vt si tussiret, minime, vt antea, dolorē persentiret. Interea vtebamur lambitio in hūc modum parato: *℞ syr. iunibini. viol. an. 3 j. syr. de liquir. 3 ℔. diatrag. frig. in tab. 3 iij. misc. fiat eclegma.* Die sequenti eum purgauimus cum 3 j. diacatholici, serē lactis 3 iij. quo quinquies aluum deposuit: & cepit melius habere, & facilius exspuere, lambitio ex syr. iunib. & glycyrrh. adiecto Zacch. penid. utens: & ita paucis dieb. hic sanus euasit. Pro potu pitisanā confectā ex hord. mund. passulis & glycyrrh. capiebat.

SCHOLIA.

Nullus est morbus adeo decantatus, vt pleuritidis. Etenim Hippocrates lib. De acutorum victu, fere huic vni dicauit priores, quando eo vtitur pro exemplo in instituendo libro primo: & rursus libro secundo priuatim curationem exponit ordine. Quod factum etiā Iacchinus putat, eo quod frequentissime euenit, multamque inuehit difficultatem symptomatum. Argenterius medicorum consultationem describens, pro exemplo pleuritidem ponit: in quo totam consultandi rationē comprehendit: nobis satis erit pauca hic adferre, cum & Galenus in libro De constitutione artis, inter omnes morbos pleuritidē pro exemplo sumit: in quo demonstrat, quonam pacto morbi & pars affecta cognosci & curari possint: quod ideo factum existimo, tum quod frequentissimus sit & insignis hic affectus, tum quod multas differentias, causas & symptomata obtinet: præbendique rationem difficilem ostendit, & denique plurima postulat præsidia. Nomen vero quamuis a costis deductum, quasi Costalem morbum dicamus, Latini tamen a situ partis dolentis lateralem morbum vocarunt. Vt fere sit nomen, quod per se nullum priuatim affectum significat, sed communem, institutione postmodum fit, vt

Denominē pleuritidis.

4

Errores quorundam medicorum taxantur qui omnem cruentam spuitionem in mulieribus ab utero inueni-
te existimant

nem euimenti, menstruis erumpentibus solutio. Idem affirmat Ioā. Langius epist. 40. lib. 1. Interea mulieres & virgines, quibus suppressi menses, minus a sanguinis vomitione periclitantur, quam viri, quibus a iecore aut liene effertur: neque enim viscera harum corrupta sunt, vt exemplis superioribus demonstraui, & superueniens menstrua purgatio, ab omni periculo eas vindicat. Attamen vbicunq; viderimus mulierem sputo sanguinis laborare, non tamē statim inferemus (vt nuper quidam Empiricus faciebat) ab utero efferri. quemadmodum contigit Alemarię mulieri cuidam, quę puerpera existens, post tres septimanas a partu dolore ingenti in pectore afficiebatur circa latus sinistrum, & sputū cruentum per tres quatuorve septimanas valida tussi eiiciebat. Medicus qui eam prius tractabat, ex utero venire dicebat: quamuis ille, cum ea a partu bene purgata esset, originem morbi non intellexerit. Vnde cum semper in peius vergeret, vt eo tempore agerem in Schaga oppido apud Dominum de Schagen ex hydrope decumbentem, me reuersum vocarunt, aderat huic & febris lenta: & cum mulier antea valde crassa & obesa, nunc ob dolorē gracilis euasisset, & in partu bene purgata, cum sanguis nigrior esset, conieci ex pectoris vena rupta euenisse, cum & secreto mihi relatum erat, eandem cecidisse, & percussione a viro passam, quod ob honorem subti-
cuerat. Cum autem dolor lateris ingens esset, & valde debilis esset puerpera, & sanguinis detractionem abhorreret, & iam tempus mali etiam progressum esset, a venę sectione abstinuimus: sed fotu sequente vli fuimus: *℞ florum meliloti, flor. chamomill. ana. p. j. sem. malua, lini ana. 3 j. ℔. semin. anethi, fenugraci. an. 3 ℔. coquantur in aqua communi, & fiat fotus,* & deinde inungebatur locus dolens infra scripto linimento: *℞ unguenti nostri pectoral. 3 j. olei amygd. dulc. chamomill. ana. 3 ℔. misc. quo dolor sedatus est:* & deinde optime dormiuit, quod ante plures dies noctesque minime poterat, & cruentum sputum minui cœpit, & melius expectorabat, & respiratio facta est liberior, dedimus etiam statim 3 j. cassia in bolo, etiam exhibuimus mummia spermatis ceti. an. 3 j. rubia tinct. 3 ℔. cum ceruissia, & post duos dies cessauit sputum cruentum, quamuis cum post vnum atq; alterum diem rursus rediret, cum sputo pituitoso admixto, decoxit flores chamomill. & nepitam in ceruissia communi, in qua nodulus rubia tinctorum, & mummia. ana 3 j. ℔. pendebat, quam bibebat bis in die: quibus egregie curata fuit: paucis postea sumtis expectorantibus, ob pituitam paulo viscidam, quam in fine expectorabat. Et ita cum tribus fere septimanis ab alio medico perperam curaretur, intra paucissimos dies a me sanata est. Totā itaque curatione cruenta spuitionis absoluta, nunc ad huic finitimos affectus accedamus, qui etiam per modum resudationis sanguinis sputi & cruentam spuitionem terminantur: vt est pleuritis & peripneumonia de quibus deinceps agemus.

particularem quendam morbum significet, quemadmodum phrenitis a phrenib. & nephritis a renibus, ita & pleuritidis nomen a latere sumtum, quoniam est in membrana succingente costas, & quia passio est in ea parte, propterea pleuritis a loco appellatur, & ut re breuiter explicemus, nihil aliud est quam inflammatio eiusdem succingentis costas membranae, *ut apud Galen. 3. de loc. affectis & 4. de causis pul.* videre licet; idem & 2. de crisi bus & sexcentis aliis in locis testatur Galenus: quem etiam sectati sunt Paulus & Aetius in propriis capitibus, ad quem lectorem relegamus. Constat igitur in exquisita pleuritide membranam, quae costas subtenditur affecta esse. Insuper cum notas habeat cum phlegmone, erit morbus in magnitudine, intemperie ac soluta continuitate: ea ratione ex necessitate symptomata habebit, tumorem praeter naturam, ruborem ac dolorem: quorum duo, tumor, videlicet & rubor, nunc sub sermonem non cadunt: relinquitur ergo dolor solus, qui ad costas firmatur pungensque fit. Cuius notas etiam nullo narrante, methodo ex natura affectus & partu affectae accepta, facile accipere est. Primum enim membrana necessitate quadam dolorem puncturum sentit, & hic dolor membranarum a materia in vno loco collecta, distenditur ad partes vicinas ob membranas, modo ad iugulum pertingens, modo ad infernas costas, quae hypochondria attingunt. Et ita primum signum sumitur a doloris specie: nam dolor affectum significat, species sedem. Rursus aliud signum ab accidentibus sumitur, spiratione scilicet: nam ea membrana quod annexa sit spiritalibus organis, ea quoque organa necessario vna afficit. Fit autem spiratio parua, quod aeger cohibet pro dolore multum pectus eleuare, atque ideo fit frequens: nam frequentia minimum percipit dolorem, multum vero, siue multum eleuet pectus, seu velociter eleuet. Superuenit & necessario febris ob affectus naturam: nam phlegmone (ut recte etiam annotauit Iacchinus) consistens in vicina cordis parte, praesertim ad aliquam magnitudinem aucta, febrem faciet acutam & vehementem. Pulsus quoque ad febrem sunt velociores, frequentiores, & maiores, & ob partis naturam quae nervosa est, duriores, & species pulsus est, quae veluti ferrat tactum. Tensio enim arteriis communicatur, unde species ea duritiei fit, quae tensiva dicitur, non quod vasa ipsa induruerint. De pulsu tamen 5. *de loc. affect. cap. 3.* ait Gal. pulsus paruos facere, & ratio dicat. Haec ergo est contradictio. Aperte enim de constit. art. dicit pulsant *μειζονος & ατλον*. lib. de caus. pul. ob tensionem, inquit, minor est, quam febre conueniat. Igitur sic solues. Sed maior est, quam sibi sano conueniret, non sic respiratio, quoniam voluntaria est, & ab animante prohibetur. Tussis quoque seiungi ab affectu non potest, quod aliquid necessario per membranam affluat ab initio, & ita pulmonem afficiat, unde ad tussim proritetur: sed non semper excreant: ideo quia dura membrana est, unde parum effluit, vel quia materia praua est, & contumax solutu: unde fit ut proritare quidem possit, sed nihil sensile edu-

cere: & tussis haec siccata dicitur. Haec itaque sunt propria & inseparabilia signa, quoniam ex natura rei necessario consequentia sunt. Ceterum, quamuis tussis ab affectu ipso separari non possit: creatio tamen post tussim inseparabilis quidem minime est, sed magna ex parte fit. Verum si excreet, colorabitur sputum necessario, licet non semper eodem colore inficiatur, sed pro diuersa natura excrementi in inflamata parte contenti, diuersus excreationis adsit color, ut in causarum dignotione dicemus. Nam cum in inflamata parte multa simul ac tenuis fuerit humiditas, & ipsa pars rara, plurimum ex ea foras effluit: cum vero contra fluxus paucus crassusque, & spissum corpus fuerit, minime ad tussim irritat, & nihil spuunt, veluti & cum prouenit copiosissimus, tussunt plurimum, nec pauca exspuunt, ut patet eodem lib. De constit. art. At cur modo dolor ad clauiculam perueniat & interdum ad hypochondria, inter assidentia morbi lateralis signa refertur: fieri enim poterit admodum parua inflammatio ad medium costarum, ut neutram ad partem efferatur: quandoque vero magna, in qua ad utramque perueniet (tum propter laesae particulae naturam, tum inflammationem, quae dolorem efficit extensiuum, ut prius dictum est) necessario tamen vnum quodpiam ex praedictis consequetur, ut vel sursum ad clauiculam, vel inferne ad hypochondrium dolor erumpat. Ad idem quoque genus assidentium pertinet, quod aeger facilius in latus patiens, quam in alterum decumbat: nam euenit interdum quod minus dolore afficiatur, si in non affectum latus decumbat, interdum vero, si in vtrumque decumbat, similiter dolor excitatur: licet vnum ipsorum necessario pleuriticos comitetur, *ut eodem lib. de constit. art. med. Galenus fatetur.* Namque cum duplex sit subcingens membrana (ut etiam a Donato citatur) si pars eius exterior circa ossa valentius phlegmone infestetur, facilius in oppositum declinant aegri: opprimuntur enim si super affecta cubant parte. Quod si pars altera, quae intus est (id quod magna ex parte fieri consuevit) affecta est, in oppositum magis decumbentes dolebunt: suspensa enim est ipsis pars phlegmone vitiata: si in latus affectum minus. non enim ad ossa comprimitur, nec pendet, sed ab horum utroque libera euasit, ac super inoffensa parte altera firmata est. At affectis ambabus subcingentis costas membranae partibus super latere utroque similiter decumbunt. Non ab re igitur inter assidentia signa haec a Galeno connumerantur, quorum natura est, non esse a morbo inseparabilia, sed aliquando simul inuadunt, aliquando superueniunt, nonnunquam autem neque omnino veniunt, ut patet Comment. *aphor. 12. lib. 1. & libr. De constit. art. med.* quoniam ex his sunt, quae saepe morbis accidunt, *ut idem Gal. inquit 3. de morb. vulg.* Ex his eisdem omnibus. (ut Altimarus refert ex Galeni mente) magnitudo praedicti morbi lateralis desumitur, magnitudo videlicet, seu paruitas in specie sua potissimum: nam si ingens fuerit dolor, isque pectoris valde, maxima anhelitus difficultas, valida febris, ac ingens quoque

Cur pleuritidis ei interim excreant, quandoque non.

7

Cur dolor ad clauiculam perueniat & interdum ad hypochondria.

Cur facilius in altero latere decumbat.

Signa assidentia.

Ex quibus magnitudo seu paruitas morbi lateralis arguitur.

que tussis, ascenderitque simul dolor ad iugulum, ac ad hypochondrium pertineat, decumbantque laborantes super utroque latere difficulter, nihilque cum tussi exspuant, maximam fore inflammationem indicant: sic, si exigua prædicta fuerint, dolor videlicet, febris, anhelitus, difficultas, ac tussis, cum qua aliquid exspuant coloratum: ac prompte statim, ad neutramque partem dolor efferatur, ac non ægre sub utroque latere decumbant, exiguam fore pleuritidem manifestabunt: nam species quidem morbi ex propriis accidentibus dignoscitur, magnitudo vero ex eorundem quantitate, Gal. teste 3. de crisi. Hæc omnia exemplis clariora euadent.

OBSERVATIO XXVII.

De pleuritide satis acquisita.

Virille qui cupas conficiebat, annos 32. natos, potui deditus, pleuritide satis exquisita detinebatur: difficulter enim spirabat, tussis aderat, & febris continua, dolor vehemens, in latere dextro vehementer pungens ad claviculâ ascendens, pulsus durus & serræ modo asper. Ad quem tertio prius die accitus cum aluum non deponeret, libenter hunc clysterem inieci: *℞ malua, viol. mercurial. parietaria. an. m. j. hirci mundati p. s. prun. damas. num. ix. fiat decoctio & huius accipe ℞ j. adde cassia, & acchari rub. an. ℥ j. olei viol. ℥ iij. satis parum, fiat clyster.* Verum cum eum admittere nollet, balneo aluum irritauimus: & statim eodē die ex vena iecoraria in brachio eiusdē lateris dolentis sanguinē extrahere fecimus ad uncias septem, & quia incipiebat exspuere sputum rubrū & cruentum (quod quidem indicium erat sanguinem exuberare) & quia dolor post sanguinis detractio- nem adhuc vigeret, licet parum mitigatus, hunc forum præscripsi: *℞ folior. maluar. cum radic. bis- malua. flor. chamomill. meliloti, viol. an. m. j. sem. lini ℥ ss fiat decoct. in aqua communi pro ℞ j. ss. & decoctum calens in vesicam impositum lateri dolenti admoveatur semel atque iterum: deinde inungatur vnguento infra scripto: ℞ olei amygd. dulc. viol. chamomil. an. ℥ ss pingued. gallina, caponis. an. ℥ iij. cera modicum fiat vnguentum: atque hoc modo dolor sedari cepit.* Interea ad sputi facilem excrea- tionem hunc syrupum bibebat, & eclegmate se- quenti utebatur: *℞ syr. viol. iunibini, de liquiritia an. ℥ j. aquar. scabiosa, buglossa an. ℥ iij. misc. pro ij. dosibus: ℞ acchari penid. diatrag. frig. in tabul. an. ℥ ss. syr. viol. iunibini, de liquiritia. an. ℥ j. misc. pro eclegmate.* Ad materiæ coctionem utebatur apo- zemate ex decoct. hord. mund. vuar. passul. glycyrrh. ad ℥ ix adiectis syr. viol. capill. ven. iunibini. an. ℥ j. ss. misc. Quinto die purgationem exhibuimus: nam solutiuum pharmacū hoc in affectu minime con- uenit, nisi ubi materia fluxit, quod die quarto ple- rumque factum est, quoniam solutiuū pharmacum humores mouet: ideo damus in principio lenien- tia, & etiam in quarto vel in quinto: nos vero se- quens dedimus (alii in septimo idem faciunt.) *℞ diacatholici ℥ vj. cassia recens ex cannis tracta ℥ ss. dissolue in iij. decoct. pectoral. syrup. capill. ven. ℥ j. misc. qua quinquies plurima excreuit, & deinde melius habere cepit.* Interea ad maiorem sputi

quoque & facilem excreationem, plus de syrupo li- quir. admiscuimus, & fuit curatus per expectora- tionem, sputo paulatim magis albido & concocto euadente.

SCHOLIA.

Exquisitæ pleuritidis causæ (Galen. teste, lib. de consti. artis medicae, 2. de crisi. ac 2. de loc. affect. & 2. de diff. feb. ac plerisque aliis in locis) affluens san- guis est, aut optimus, mediocremque crassitudinem habens, aut biliosus aut pituitosus, aut melancho- licus, quauis sæpenumero magis biliosus sit. Quā enim phlegmonē esse dicemus, necessario (ut etiam Iacchinus annotauit) nisi vox transmutatur, caus- sam esse sanguinem dicemus, id est, materiā in qua sanguis dominatur, quamuis modo sincerior sit, modo admixtus magis alteri humori, necessario tamen calido & bilioso, ut Gal. scribit: differentia eius a pulmone. quoniam causæ humores nequeunt membranam efficere. Quod si dicas, Gal. 5. de loc. affect. 2. de const. art. meminit pleuritidis pituitosæ, & melancholicæ: ergo non est verum, quod semper a sanguine puro, vel bilioso fiat. Respondetur, ut ipse ait in lib. De const. art. in medica, Cum materia illa, nempe vel pituitosa, vel melancholica, in musculos & venas vicinas infarcta est, tū ex putredine quam ibi acquirit, tum ex dolore, quam excitat, accersit fluxionē sanguinis, vnde afficitur membrana: non quod ab initio inflammatio ex eo humore domi- nante foret. Et hoc innuitur etiam 6. aph. 33. ubi ait Gal. Non valde pleuritide capiuntur pituitosi acidum eructantes, quoniam non est nata exten- di his membrana. Sed possumus dicere, musculos & venas vicinas illam humorem continere, vnde erit phlegmone illa diuersa in suis partibus, ut bi- liosior in membrana, in alia parte poterit pituita, vel atra consistere. Galenus tamen videtur hic sa- teri posse a quatuor humoribus fieri, id est, ex eo- rum mixture, dum naturam seruent phlegmo- nes, id est, sanguis superabundet. Neoterici vero in tres causas distinguunt: & sic pleuritidis pri- mitiue causæ esse possunt, casus, percussio pecto- ris, atque sedenudare post laborem in aere frigi- do, & anti Septentrionales, aquæ frigidae potus, & similia. Causæ antecedentes, ut humorum influ- xus, vel eorum iuperbundantia, vel retentio su- perfluitatum consuetarū exire. Causæ vero con- iunctæ læpius erunt sanguis & bilis, inflammatio- nem actu producentes, raro pituita, rarissime me- lancholia, quia quod densius, raro ad hæc mem- bra penetrat. Gignitur vero hic morbus, ut omnes aliarum fluxiones corporis, vel ex interna causa, cum natura refertas habet venas, & de parte in partem transfluunt. Fluxionibus vero gignendis occasio est, tum externus calor fundens, tum frigidus ex- primens: vnde & Vere fiunt maxime a calore, Au- tumno vero exeunte a frigore: utroque vero tem- pore leatior corpus, Vere quidem multitugine bo- norum acervata per hyemē, Autumno vero pra- uis acervatis per æstatem. Sic 4. de victu, meminit in angina facta. Plura si de causis pleuritidis co- gnoscere velis, lege Benedictum Fauentinum præceptorem meum capite proprio.

OBSERVATIO XXVIII.

*De iuvene post exercitum ex aqua frigida potu
in pleuritidem incidente.*

Iuvenis annos circiter viginti natus, apud Pithu-
ros in Gallia, cum ibidem praxim exerceret, in
sphæristerio reticulo ludendo cum impense se
exercitasset, & supra modum concallescens esset, in
gravam pleuritidem incidit. Hic cum biliosus esset,
& macilentus, & sputum postea vergeret ad flavedi-
nem, cum in principio ad eum accitissimus, secta
vena media, quæ magis apparebat in brachio eius-
dem lateris, sanguine vicumque extracto, qui & pu-
tridus & postea biliosus erat, clystere emolliente
prius injecto; deinde vena incisa dolor plurimum
mitigatus est. Locum affectum interea inungi ius-
simus, cum vng. resum. & oleo amygd. dulc. & ad ma-
teriz præparationem exhibuimus decoctum viol.
hordei mundati, ungule caballina, capill. Ven. unar.
passul. ab arillis repurgatarum & glycyrr. additis syr. in-
iub. viol. & capill. Ven. Et quia sputum subfluum erat,
ad eiusdem excreationem primum exhibuimus hoc
lambituum. *℞ diatr. frig. in tab. Zacch. penid. an. ʒ ss.
syr. in iubini, viol. an. ʒ ij. postea addendo syr. cap. ven.
materia parata post sextum diem hanc purgationem
exhibuimus. ℞ cassiæ recens extracta ʒ vj. elect. de
succo ros. ʒ ij. syr. viol. infus. ros. an. ʒ ss. cum ʒ iij. de-
coct. suprascriptæ fiat potio: qua quinquies alium
deposuit. Et quum quotidie magis magisque expe-
ctoraret, postea etiam concocta & alba; & quia hic
cito sputum apparebat, hæc pleuritis concocta ma-
teria, quæ paulatim per sputum educebatur, intra
decimum quartum diem finit. Voluit enim pleu-
ritidem quatuor vel quinque modis terminari: vel
enim resoluitur humor, vel per sputum educitur;
alioqui suppuratur aut induratur, aut in alias par-
tes transfertur, ut postea exemplis quoque doce-
bimus. Alii quintum modum addunt, quod vel
putrefiat vel corrumpatur.*

S C H O L I A.

Cum iam paulo ante brevius demonstratum
sit, quomodo pleuritis dignoscatur, scilicet
legitima, de mendosa & spuria postea dise-
mus. Nunc vero & illud addendum, quomodo e-
ius causæ distinguantur: huius distinctio præcipua
est ex colore, cum expuunt, eodem Galeno au-
ctore, cum color naturam humoris significet. Sed
& antea conicere ex victu est, & ambientis statu,
& modo doloris, & febris vehementia. Ita hanc
biliosam esse pleuritidem cognovimus ex dolore
admodum pungente, sed non perinde distenden-
te, pulsu duro, crebro, & febre vehementiore, ter-
tiana imitante, ex creberrima respiratione, ex
sputo & urina ad flavedinem tendente, cum & ta-
les facile delirent quoque; subinde, ut in aliis multis
observavimus. Ad hæc habitus corporis, ætas, vi-
ctus præcedens biliosus, iuvenes lædentesque; cau-
sæ & similitudines idem ostendent. Ita quoque si a
sanguine fiat, dolor erit vehemens, distendens, fe-
bris simplicior, vehemens tamen, & quæ nullas ac-
cessionibus habeat, sputum vero rubrum, & urina ru-
bra, citaque maturatio & expurgatio, ruber in cor-
pore color, & venæ tumidæ, habitus corporis be-

ne constitutus, carnosus, sanguineus, victusque præ-
cedens delicatus, valde corpus augens, quique san-
guinem plurimum procreandi vim habet, tem-
pus verum, regio humidior ac calidior, ætas iu-
nior, atque homo succi plenus, cui consuevit eua-
cuationes retentæ, ut sunt sanguinis narium flu-
xus, hæmorrhoides aut menses suppressi. Nec non
iuvenes, lædentesque; causæ & similitudines idem
docebunt. Si ex pituitoso sanguine, sputum spu-
mans & candidum erit: rarius tamen contingit, si
contingat, pituitosam pleuritidem sequitur remissio-
rior & humidior febris, quæ quotidie exacerbitur,
color non admodum pungens, sed potius cum qua-
dam gravitate hominem virgens, pulsus molliores
tardioresque, sputum spumosum, ut diximus, can-
didum ac viscidum, & quod non admodum tarde pro-
cedit, & non nunquam sopor & reliqua huiusmo-
di symptomata, quæ indicia sunt pituitæ redun-
dantis. At hæc causæ, quæ pituitam gignunt, iu-
vant, aut lædunt, & similitudines præbebunt sua
indicia. At melancholica omnium rarissime eue-
nit; melancholicam vero testantur, febris remissa,
sed maligna, & accidentia prava & magna, vigilia
ac animi corporisque male actiones. Expuunt & hi
parum & difficile, illudque vel nigrum vel liuescens,
dabunt & in hac pleuritide suas notas, causæ &
similitudines, ut in aliis. Sed hæc postea aliis exem-
plis clariora evadent. Quoniam vero quidam sunt
affectus pleuritidis admodum similes, ut qui multis
signis illi communicant, hinc fit ut notis quibusdam
distingui oporteat. Sunt enim dolores pectoris
multis modis, & apb. Dolores pectoris quantum
differant, perdiscendum: hoc enim tum ad cura-
tionem, tum ad præcognitionem facit. Primum er-
go accidit, ut musculos exteriores dolor occupet,
ipsis inflammatis, unde & spiratio similiter fre-
quens fit & parva, & febris adest, sed distinguuntur
tussi, & febris magnitudine (hic enim levis est)
& pulsu, qui hic durus non sentitur. Sepe vero do-
lor ad extima, & tangenti, & premeti dolet, & de-
mum suppuratio ad extima præparatur, & incidi-
tur, vel resoluitur. Est & alius affectus, ubi catar-
rhus cum febre multus est, & flatuosi sæpe dolores
circa latera fiunt, & tussis adest. Hi igitur pleuri-
tides, non sunt, & concocto catarrho cessant. Di-
stinguuntur sputi natura, quæ prorsus pituitosa esse
distinguuntur & febris magnitudine: nam non
est acuta, ut pleuritidis: quamvis hi periclitentur,
ne in veram incidant pleuritidem. Modum vero
Galenus posuit in lib. de const. artis medend. quod
ex dolore sæpe ad affectas partes materia trahitur,
& processu fit phlegmone. Hic tamen lectorem
admonere oportet: quod si non aderit inflamma-
tio, sed flatus inclusus in membrana, vel musculis
intrinsecis, videbitur, quod sit pleuritis: sicut
contigit D. Marco Antonio Genuz, qui labora-
vit circa latus dextrum dolore quodam: quem, cum
tractaret Montanus doctissimus medicus, cumque
considerasset ex signis, an vera pleuritis esset, anim-
advertens, quod neque pulsus neque febris, neque
difficultas anhelitus, neque tussis ita adessent, qua-
lia solent apparere in vera pleuritide, sed valde re-
missa,

*Pituitosa
pleuritidis
signa.*

Melancholica

*Quoniam
dicitur de
naturâ pleu-
ritidis ab aliis
affectibus.*

Affluens.

*Historia
Montani de
dolore lateris
ex flatu.*

*Signa pleu-
ritidis bilio-
sæ.*

*Pleuritis
sanguinea.*

missa, & quod febris per interualla rediret, dolore augefcente, illis quidem signis agnouit, non esse veram pleuritidem. Propterea eidem perpetuo vinum exhibuit, quia solus erat in curatione, & rexit eum, sicut reguntur illi, qui flatu affliguntur; & febris potius erat ephemera ratione doloris: quia illa remittebatur, & euanescebat ad remissionem & euanescentiam doloris. Ideo diligenter signa sunt inuestiganda, neque statim pleuritidem adesse iudicabimus, ut vulgus facit, ubi modo latus dolere videat: neq; etiam dolorem omnem ad vēcositatem referemus, uti vulgus iudicat, nobisque proponemus aliam quoque historiam Gradi de medico pleuritico, qui suo & aliorum iudicio putabat dolorem ventosum esse, cum vera esset pleuritis, utensq; calidioribus confectiōib⁹; Medioli exsistens, breui vitā finivit. Similis etiā est iecinoris phlegmone, habet enim signa omnia pleuriticis communia: nam & dolor circa spurias costas sentitur, quib. alligatur; & febris acuta adest & tussis, & spiratio vitatur ob distētionē diaphragmatis: tussis vero succedit, quoniam exsudat intra diaphragma nonnihil humoris, qua parte cōgit, distinctio est statim, ubi tussis humida adfit. Nam a iecinore humida nō fit, quia exiguum est, quod traducitur. Præterea & malus color corporis comitatur, & dolor infra hypochondria descendit, Gal. 2. de loc. affect. & Paulo testibus. Neq; in iecinoris inflammatione punctorius aderit dolor, neque pulsus adeo durus, qui & ferræ modo tactum fecet, velut in morbo laterali: & si aff. 8^o, qui proprie iecorari⁹ nominatur, cum iecinoris inflammatione aderit, erunt alui sedimenta similia aque, in qua nup̄ macerata caro fuerit abluta; id quod haudquaquam in pleuritide euenit: ab exigua quoque tussi irritantur, qui hepatis inflammatione laborant, eaq; perpetuo sicca erit. At thorace affecto tussis increfcit, & eo tempore omnino apparent, quæ tussiendo expuuntur, Gal. teste 2. de loc. affectio. nec non lingua, facies & vniuersi corporis color alteratur, iecore affecto: ac pallidi fiūt, decoremq; amittunt, Paulo & Tralliano testibus: aderitque dolor ad notas costas in dextro laborantis latere, grauati⁹ magis, ut interim ægri iugulum ad infernas partes detrahi sentiant. Sic itaq; loco, pulsu, dolore, colore, & tussi differunt: Loco, quia infra costas in dextra tantū parte sentitur durities, tumor: pulsu, quia in inflammatione hepatis vndosus est: dolore, quia non acutus, sed grauis: colore, quia facies male colorata: tussi, quia adest sine siccitate spirationeq; maiori, contra vero in pleuritide: hic cenoris inflammationem iecinoris a pleuritide interstinguere poteris, quemadmodum Galenus a Glaucone philosopho ductus ad Siculum medicum iecinoris inflammatione laborantem, cognouit, quem prius, tanq̄ pleuriticum, curauerunt medici, velut 5. de loc. affect. scriptum reliquit. Quidam tamen hic, ut Auicenna inflammationem diaphragmatis ad sæuissimā pleuritidē referunt: & tales quandoq; sentiūt dolorem in extremitatibus costarū, & in extremitate ossium pectoris, scilicet ubi finiunt spiritalia: & accidentia illa

quinq; suprascripta, quæ pleuritidi semper adesse solent (de quib. antea dictum est) dicunt fore valde sæua & intensa, ut ægrum ad insaniam ac mentis alienationē deducant. Membranæ (inquit Hælerius) thoracē quoq; distinguētes, si inflāntur, par negotiū vitæ faciunt, atq; verus lateris dolor. Sæpe etiam in inferioribus costis inflāntis, diaphragma atque hinc stomachus grauiter laborat, magno periculo. Morbus hic proximo vere (año 1551 ante pascha) plurimos, & eos maxime, qui vel temere vel negligenter curati erant, sustulit. Si vero in septo aut mediastino inflātio contingat, (tres enim membranæ continētur intrinsecus in pectore, ut ἀποζωόντες, id est, subcingentes Latine, inde diaphragma tertio quæ recta per mediū thoracis ad iugulum feruntur, διασπάρτοντες, id est, interspicientes, barbari mediastinum vocant) dolor communicatur antèrius vsq; ad ossa pectoris, & vsq; ad collum transit, plerumq; per medium pectoris in lōgitudine: aut dolor sentietur posterius communicans spondilibus pectoris, & accidentia quinq; suprascripta valde intensa sunt, & ægrum magna ex parte ad delirium trahunt, & mentis alienationem. Anno 1567. sub finem anni, tali septi inflammatione laborare videbatur Ioannes Godscalcus dictus, qui insigni viri ferrei, nempe in foro Delphis habitabat: nam per medium pectoris dolebat, aderat febris cōtinua, subinde delirabat, & omnia signa, quæ in sæuissima pleuritide apparere solent, illi aderant: in super & sputū cruentum expectorabat, pulsus erat ferrinus & minime vndosus, & dolor sentiebatur per medium thoracis. Quinto die, cum nihil esset actum, amici me ad illum deduxerunt, sanguinem in cubito copiose detrudere iussimus ex vena basilica: deinde adhibitis iis, quæ pleuritidi conueniunt, præter spem multorum 14. die curatus fuit. Non erat hæc peripneumonia, quæ a pleuritide distat: nam in peripneumonia, pulsus est vndosus, & genarum malæ rubent, ac si fuco delinearentur: neq; dolor punctorius adest, sed grauians tantum ob sensum exiguum, quem pulmo sortitus est tantum in membrana: pulsus quidē vndosus est, pulmone humido existente: difficultas spirandi quoq; maior, & anhelitus constrictio, & aer qui expiratur calidior, qui non euentatur, vel vaporibus calidis resolutis ex pulmonis apostemate. Habet & pleuritidis signa quædam communia cum phrenitide, in permixtione intellectus potissimum, iuxta Auicennam & eius sequaces, pleuritidis diaphragmatis, vel, si mauis, eiusdē inflammationis, & in alienatione mētis & anhelitus frequentia, in sitis vehementia, ac multitudine rixæ, & alteratione coloris faciei ad diuersos colores transmutati, & febris vehementia: ideo hæc dispositiones inter se distinguendæ. Primum signum id distinguens ex se manifestum euadit: nam mentis alienatio aut intellectus permixto in phrenitide statim ab initio adest, deinde succedunt reliqua signa iā dicta, & in processu vehementiora, ut anhelitus frequentia, sitis vehementia, & febris, & alia iam dicta. Contrario modo fit in pleuritide: nam prius

Signa inflammationis septi vel mediastini.

10

Quibus modis peripneumonia a pleuritide discernatur.

II

Signa pleuritidem a phrenitide distinguunt.

7 Historia Gradi de erroribus cuiusdam medici.

Quibus indicibus discernatur pleuritis ab hepatis inflammatione.

8

Signa inflammationis diaphragmatis.

12

incipit difficultas anhelitus cum dolore puncto-
rio & tussi. & tandem succedunt deliria: & hoc i-
psam quoque raro est, nisi in ea, quæ est in diaphra-
gmate: imo, ut dicebat Avicenna, hoc ipsum non
evenit, nisi morte instante. In phrenitide anhel-
itus quoque non æque difficilis. Propria quoque signa
rubedo & ad phrenitidam consequuntur, ut oculo-
rum superiora eorundem attractio. In phrenitide pul-
sus rarus est, & eodem modo ob falsas eorundem
imaginationes. In pleuritide ferrinus: & deliria,
quæ in pleuritide contingunt, potius paraphre-
nitides sunt, quam phrenitides veræ. Hæc de sig-
nis distinguendis pleuritidem ab aliis affecti-
bus. Propria eius signa & inseparabilia iam dicta
sunt, & quæ assistentia signa existunt. Si autem
copiosam tractationem de omnibus signis ad
pleuritidem spectantibus desideres, perlegas
Montanum, quæ de pleuritide commentatus est
supra Rhafem, & Argenterii libellum de ratione
consultandi.

OBSERVATIO XXIX.

De muliere pleuritica, in qua signa lethalia aderant.

SVb finem Iunii anno 1545. nempe in iuventute
mea atque primo anno cum praxim cœpisssem ex-
ercere, accitus sum ad mulierem quandam quin-
quagesimum annum agentem, in civitate Benna,
duobus miliaribus ab urbe Pitueriensi in Gallia,
(in qua tunc agebam, & praxim exercebam) diffi-
tam, & pleuritide gravissima correptam, ut ab astan-
tibus ex signis ab iisdem relatis intelligere potue-
ram. Erat iam decimus dies, quo graue hoc malum
mulier incurrerat: nihil, ut prius, exspuens, imo
sputum in gutture plenum feruere visum est, atque
multum intus strepitum in pectore edens, viribus
collapsis, ut illud exspuere non posset. Cumque vi-
te periculum adesse animaduertirem, incepti om-
nia signa diligentius inquirere: nam cum carpum
contingerem, reperi pulsus non iam ferrinum,
sed vermiculantem adesse, difficultatem anhel-
itus extremam, & ab ore anhelitus frigidum exe-
untem, nares quoque tum auriculas exsangues præ
frigidityte, insuper & sudorem frigidum mali-
dumque emanantem, frontem intensam, & uri-
nam vltro profluentem. At hæc longe post mor-
bi principia, infirmis iam viribus aluum fusam, ex
qua non corporis inquietudo, non ipse spiritus al-
leuiabatur: ita ut & nunc stercora ipsa sponte pro-
diderent. Febris vehemens erat, vires deiectionis, ad
interrogata vix respondebat, mente minime con-
stabat: nam materia translata ad cerebrum in hoc
morbo sola insania ipsa occidit: magisque cum spu-
ta in pectore cum murmure detinerentur. Hæc
cum animaduertissem, mortem ilico ad futuram
prædixi, & quod nocte subsequente cum plenilu-
nio, vndecimo die existente a morbi initio, mo-
reretur. Quod cum amici astantes audissent, iisque
prius obiurgatis, quod omnia sanguinis detracti-
one aliis remediis neglectis in principio, cum ex-
me rogarent, ut pernoctarem, & aliquid præsidii
adhiberem, respondi nullam spem esse reposti-
tam in arte medica, morte instante, cum tales pro-

gnosticis signis sint relinquendi, iuxta Hippocratem.
1. præfag. ut calumniam eitemus. Atque sic equum
ascendo, & vna cum famulo domum redeo, sacer-
doti, & præcipue Deo, cura relicta: cum eodem
hora vndecima noctis e vita decessit. Ex cuius
præfagio cum eodem tempore iuuenis praxim pri-
exercere inceperam, laudem haud exiguum con-
secutus sum, & vulgo magis innotui.

S C H O L I A.

QVam utilitatem signa prognostica præstent,
alias in Obser. de febribus declarauimus: Et ³ *Signa prog-*
ideo non satis est essentiam morbi dignoscere: sed *nostica.*
& mores ipsius. Qui enim vult profligare inimi-
cum, oportet prius ut ingenium eius ac mores co-
gnoscat, & quomodo is molitur illi insidias: ita
& nos qui contendimus cum morbo, idem facere
debemus, ut exemplo quodam docuit Montanus
medicus ille doctissimus, de pleuritide, cuius mo-
res varii sunt, ac penes tria consistunt, scilicet locum
affectum, materiam, cruditatem, & coctionem. Et
post mores idem considerat motum morbi, & ter-
minum considerat numquid resoluitur, vel sup-
puretur, vel in alium morbum mutetur, vel interfi-
ciat: quæ omnia ad signa prognostica faciunt, ut
apud eundem in lectione de pleuritide supra Rhafem
videre licet. Quæ vero motum morbi significant,
plurimum quoque faciunt ad temporum cogniti-
onem, quæ & viam prognosticis signis aperiunt,
cum & eadem mere signa prognostica sint. Hinc
sputum in pleuritide longitudinem & breuitatem
morbi significat, iuxta Galen. de crisi-
bus, & iuxta Hippocratem. 1. libr. Aph. 12. Si sputum statim appare-
at in pleuritide, morbum breuiat: si postea, pro-
ducit. Si circa initia appareat, intelligit per prin-
cipium non instantaneum, & circa latitudinem,
nec prout est vnum de quatuor morbi temporibus,
sed prout extenditur usque ad tertium diem: tri-
plici namque modo iam dicto principium ipsum
intelligi potest, ex Galeni comment. prædicti, aph.
12. li. 1. tum. 1. de crisi-
bus. Quapropter crudissimum
esse lateralem morbum idem ait Galenus, in quo
nihil exspuitur, quem & incoctam pleuritidem
nominant, ita ut celeriter hominem rapiat, vel
longo temporis spatio finiatur, ut 5. de loc. affectis
etiam liquet. Secundum ordinem (ut etiam Alti-
marus ex Galeno annotauit) obtinet ille morbus
lateralis, in quo sanies tenuis exspuitur: tertium in
quo crassior: & quartum in quo perfectam habet
concoctionem. Quod si apparuerit circa tertium
vel quartum diem, non contingit morbum tran-
scendere septimum: in aliis vero similiter necesse
est, ut pro concoctionis modo mensura tempo-
ris consequatur: quamuis magna ex parte termi-
num suæ iudicationis habeat, quartum decimum
iuxta Aphorismos. 8. lib. 5. Quicumque morbo laterali la-
borantes in quatuordecim diebus non repurgan-
tur, ii ad suppurationem vertuntur. Et iis quidem
terminis per exspuitiones pleuritidis est, non nu-
merando ab eo die, quo æger cœpit exspuere, ut
Fuschius putabat: tunc enim falsum esset, quod
Anaxionis historia 3. Epid. demonstrat, non e-
nim 14. die iudicatus fuisset, sed fere 24. quia 1. 1.
cœpit

4

5.

erit prius exspuere. Vnde & Altimarus dicit magna ex parte 14. diem pleuritidis terminum esse: & si non hunc, saltem omnino 20. vt eodem comment. *Aphor. 12. lib. 1.* patet: idque verificauit etiam in Anaxione, de quo Hippocr. 3. *de morb. vulg.* scriptum reliquit, quamuis ad 34. diem extensus fuerit morbus, quoniam ab initio non exspuebat, sed & octauo die tusses siccae subsequabantur, vt Hippocrates inquit eodem loco. Longitudo præterea & breuitas ex materia quoq; habetur: si ex pituita, longiorem, vt & a melancholia: si a bile vel sanguine, breuiorem: sic etiam ex velocitate motus vel eius tarditate. Si velociter moueat, vt ceteri acuti morbi, cito terminum attingit. Sin tardius, serius: motus velocitas apprehenditur ex eius veloce augmento in symptomatibus, quodq; cito appareant coctionis notæ, vt iam diximus ex Hippocr. de sputo cito vel tarde apparente: iam & coctio materiæ, vt & paulo ante meminimus, sequitur: & sicuti tempora ex materia seu sputo cognoscuntur, ita quoq; & ab accidentibus innotescunt: cum enim fluxio & dolor fieri incipiat, principium est, & cum nihil exspuitur, vbi symptomata augentur, & sputum melius procedit, augmentum est, dolore ad vigorem progresso, status: vbi remittuntur accidentia, declinatio; si etiam sputum simul totaliter remoueatur, accidentibus cessantibus. Et ideo sputum maxime in pleuritide considerandum est, cum ex eo cognoscamus principium, augmentum, statum & declinationem, coctionem, cruditatem, malitiam & malignitatem pleuritidis, & bonitatem ipsius, longitudinem atq; breuitatem. Ideo cum morbus materialis sit, & circa thoracem versetur, excrementa illa, quæ ex pectore educuntur, maxime considerata sunt. In quibus diligenter animaduertemus, ea quæ Hippocr. 2. *prægn.* enumerat: primum, vt promte, cito sciretur: promte inquam, id est, facile, & leuiori tussi & breuiore. Ita enim benignitas humoris significatur, vt qui neq; lentore inhereat, nec crassitie; quibus aliquando ægros præfocari contingit: cito vero, id est, non longe a morbi initio, vt *aphor. 12. lib. 1.* dictum est. Et ita si sputum statim appareat, & reliquæ conditiones bonæ non desint, non solum salus speranda est, sed & breui fore. Si cito eueniat, e conditionibus & hæc optima est: secunda equidem conditio sumitur ex calore: nam rubra admodum salutaris est 4. *Epid. & 47. text.* sincera omnia mala, excepto sanguine: tum quia humor benignus est, & simpliciora symptomata inuehere solet; tum quia cito coctionem admittit. Sed si biliosus humor multus adsit, si quidem sincerus sit, & non permixtus, & temperatus aliis, malam significat, vt si liuet, vel nigricat: prauis enim natura sunt hi humores, & cum sinceri exscreantur, magnum eorum dominium significatur. Contra vero si sint aliis temperati, præsertim vero niger, qui modis omnibus insalubris est, quia multo fluo peior. Scretio itaq; sine dolore promteq; facta, mitissimum quidem est pleuritidis signum, potissimum vbi permixta appareat cum scretio-

Quare spu-
tum in pleu-
ritide præci-
pua sit consi-
derandum.

ne admodum flaua bilis, Hipp. auctore 2. *prog.* At si quod exspuitur concoctum fuerit, adhuc magis mitissima erit, Galeno teste *de constit. art. med.* Nihil vero exspuere (vt etiam paulo ante meminimus) exitiale est, partim quod fluxum declarat a phlegmone deuinctum, partim quod totus (propterea quoniam intus maneat) corrumpatur. Ex diuerso ite exscreationis colore, prout diuersam indicat inflammationis causam, possumus indicia prognostica assumere: nam perniciosissimus est melancholicus humor præpollens, id quod indicabit sputum nigrum aut liuidum; tum quod & præditus sit ipse moribus pessimis, & maxime erodant, coquoquaturq; egre, nec facile expurgetur, vt constat apud Galen. eodem libro; tum quod plurimæ sit caliditatis index, a quo assatus, genit⁹ est. At æquissimus (iuxta eundem, & citatur ab Altimaro) omnium est sanguis per cruetum sputum, ac rubrum iudicatus, vtpote, qui dulcissimus existat, & concoctu facilimus. Reliqui vero duo humores inter hos medii sunt, quod ad simplicitatem malignitatēq; attinet. Tertio etiam prognostica signa habentur ex modo substantiæ: crassa enim & glutinosa omnia, mala. Contra vero, quæ mediocritatem habent in crassitie & tenuitate, bona sunt. Sed quibus notis coctionis signa distinguantur, vel in nullas, vel latentes, vel obcuras, vel manifestas & perfectas, iam quasi diximus: reliqua vide apud Iacchinum: quamuis cruditas signum sit neutrum, eo quod merito sui neq; salutem neque mortem significat. Coctiones vero, vt Hippocrat. ait, certam citamq; sanitatem annuntiant. Sed de his vide alios auctores, & Galenum 1. *de crisib.* Ceterum quod ad pulsum attinet, si in pleuritide pulsus fuerit magnopere durus, paruus etiam atque creberrimus, indicum erit lethale, ita vt pleuriticus cum tali pulsu nemo fuerit seruatus, ex Galeni decreto, 4. *de præsa. ex puls.* Maximum quoque signum prognosticum ipsius pleuritidis, præbet pulsus ferrinitas. Nam si ea remissa sit, mollem & prope maturandam inflammationem indicat; si vero magna, difficilem & admodum crudam: quæ si cum imbecilli facultate coniuncta fuerit, periculum; si cum firma, aut tarde concoquetur, aut ad suppurationem deflectet, aut tabidus eam excipiet marcor, ex Galeni *sententia lib. de puls. ad tyrones. & 4. de causis pulsuum.* At hic quaeritur numquid vrina aliquid faciat ad temporis cognitionem, an sit mala, vel cocta vel incocta. Si fuerit bona cum suis conditionibus & in substantia bene cocta, in residentia, colore ac liquore, quod ad pleuritidem refert, nihil prorsus facit, quum in pessima pleuritide & in inflammatione rebeli, vrina bona existere possit, licet æger moriatur. Equidem fieri potest, vt totum corpus bene habeat, & inflammatio pessime sit naturæ. Interea si vrina malas in se condiciones complectatur, pessimum signum est. Si enim tenuis & subtilis fuerit, nec habens aliam malitiam, indicat materiam raptam esse ad locum inflammatum, quemadmodum in pleuritide, cum vrina talis apparere cōtingat, etiam mortem notari. Si vero fuerit crassa, indicat aliquod dominium

Signa ex
pulsu.

De vrina in
pleuritide.

11

humoris maligni. Mala est, quia indicat cacochymiam esse in corpore, quæ sub ratione causæ antecedentis nocebit, fluet ad locum inflammatum; ideo semper malum dum vrina est mala: tum etiam si sit bona, quoad inflammationem, bona non existit, si ea ipsa inflammatio pessima sit naturæ, ut iam dictum est. Ad prognostica etiam pertinet *Aph. 23. lib. 3.* Hyeme vero morbi laterales, &c. Et *aphor. 33. li. 6.* Qui acidum eructant, non valde morbo laterali corripiuntur, Item morbo laterali, si pulmonis inflammatio superuenerit, malum est, ex *Aphor. lib. 7.* Causam reddit Galenus in commento: quo etiam loco asserit, quod non admodum consequi solet morbus lateralis ad inflammationem pulmonis. Quibus autem pulmo costis affigitur vel adnascitur, atque illud quidem rarissimum est, & semel tantum vidi in corpore dissecto, pulmone plûbeis maculis infecto ac corrupto, utrinque costis affixo: alii tamen id quoque ante me viderunt. Tales plerumque vel ex asthma, vel ex tabe tandem commoriuntur: pulmo enim (spirandi organum existens, ut in præfatione diximus) tunc quidem afficitur, ut nec aerem inspirare, nec libere expirare possit, corde etiam tam per distensionis motum, quam contractionis, minus officium suum obeunte. Hi quoque si in pleuritidem veram incidunt, præter illud quod difficulter curentur, facile in peripneumoniam eamque lethalem dilabuntur, cum pulmo membræ costas succingenti ex parte adnatus vel affixus, facilius in se virus recipit, & minus a se propellere potest, citiusque inflammatur. Sed & *aph. 16. libr. 6.* dicit Hippocrates: A morbo laterali vel pulmonia habito, alui profluuiû adueniens, malum: quod quidem intelligendû est de fluxu non regulato (ut ita dicam) a natura: Nam qui a virtute regulante fit etiam in principio, bonus esse potest, nisi aliud accidens accesserit virtutem prosternens. Sic & Auicenna fluxum in principio bonum esse existimavit. Quicumque vero ex morbo laterali suppurantur, si in 14. diebus purgantur, a die, qua fit eruptio, liberantur, si minus, ad tabem transeunt. Refert Auicenna pleuritidem propinquam cordi deteriorem esse, & parti sinistra, sed maturationi convenientiorem, at remotiorem a parte sinistra, salubriorem quidē, sed ex parte resolutionis & maturationis magis inobedientem. Pleuriticis quoque sanguinis fluxus narium eueniens pro optimo signo habetur: non tantum a naribus, sed ab hæmorrhoidibus quoque & matrice, ut sæpe experientia vidimus in communi praxi, quod equidem & a Galeno 10. method. capit. 5. laudatur.

OBSERVATIO XXX.

De pleuritide in pregnantibus.

1

SI pleuritis prægnantibus contingit, valde perniciofa est, ut Auicenna pronuntiavit, quemadmodum & decrepiti: Solet enim hominem interimere, vel ex præfocatione, vel ex symptomatum vehementia; ob quam causam prægnantes præcipue moriuntur: decrepiti vero, ob debilitatem virium in spueno. Senes vero cum frigida

sint naturæ, morbos concoquere, etsi diuturnos, non valent: cumque sanguinis & prægnantes pleuritica & decrepiti missione egeant, & tenuissimo victu; hæc neque prægnantes, neque decrepiti ferre possunt: unde sæpe in vtrisque ad mortem comitatur pleuritis. Nos tamē aliquas prægnantes magna cum industria curauimus. Ex quibus mihi occurrit quædam nomine Remula, mulier si quæ altera, pulcherrima, viginti quatuor annorum, Alcmariæ decumbēs, año 1549. ad quam 18. die Octobris accitus fui. Quæ cum sanguinea & boni habitus esset ac robusta, & in nono mense gravida, & partum quasi nunc expectaret, sæuissima pleuritide correpta, sanguinem exspuebat, & circa mammam laeuam in latere, insigni dolore afficiebatur, qui ad claviculam ascendebat cum tussi valida & continua febre. Ad quam cum intrassem, plurimum hæsitabam de venæ sectione, ob *aph. 31. lib. 5.* Hippoc. sic dicentis, Mulier utero gerens sanguine missio ex vena, abortit. Ab altera parte venæ sectionem urgebant febris continua vehemens, & inflammatio vigens, dolor insignis, virtus fortis, mulier bene habita & sanguinis missioni consueta, quæ & ipsa petebat: itaque alio prius per balneum expurgata, venam secari iussimus ad uncias quatuor, ex eodem, in cubito nempe basilicam. Adeo autem profuit, ut dolor magna ex parte sese remiserit; adhibitisque denuo decoctis pectoralibus & aliis remediis aptis post septimū diem pleuritide curata est, cum optime exspueret per eclegmata præscripta. Septimo die oborta est exterius inflammatio mammillæ sinistrae cum intensa rubedine: cumque per externā inflammationem terminaretur pleuritis, nolui manū inflammatæ repercutientia adhibere: sed inuncto loco affecto cum oleo viol. & exiguo populeo, inflammatio cessauit, & perfecte conualuit. Deinde post duas septimanas, cum optime valeret, peperit feliciter filium optime sanum & robustum. Ad alteram eodem tempore accitus etiam in ultimo mense imprægnatam accessi, debilem, pituitosam; ob quam causam sanguinem extrahere non audebam: septimo die abortum patiebatur, & 14. die obiit. Quamquam Pithueriensis mulier cum prope nonum mensem gravida foret valde debilis, venæ sectionem non admittens, adhibitis optimis remediis, etiam fotu ad dolorem sedandum, circa quartum diem melius habere visa est, cum in principio nihil exspueret, nunc quædam concocta exspuens, dolore lateris nonnihil consopito. At sexto die febris accessit, & in septimo omnia vehementiora, ita ut vi infantem pepererit, cum in nono mense esset, sed non superuixit infans ad tres dies. A partu vero dolor lateris omnino sese remisit; quamuis sub noctem intensissimus dolor pectus occupauerit cum ingenti angustia & anhelitus difficultate vehementiori, ut suffocatio immineret, ac prodeplorata haberetur. Octauo die delirauit & tandem obmutuit, sacra inunctione, ut sacrifici solent, munita. Nono die delirium increuit. Postea melius habere visa est, ac concocta exspuere, & sub noctem, post symptomata maligna sedata, incidit in somnum

Si pulmo costis adnascitur, periculum sum.

4 in somnum profundum, & per noctem ac diem integre dormiuit. Vndecimo die compos mentis facta est, bene & concocta exspuebat, & melius sperabat. Vnde magna salutis spes emergebat: nā si somnus delirium sedat, teste Hippocra. bonum est. Post vndecimum diem, qui erat quartus dies a partu, purgationes per se magis subsequebantur; plurimaq; crassa & rubra, postea & pituitosa biliosaq; per vterum excreuit, vsq; in 14. diem ab initio pleuritidis: atq; tunc crassam vrinam mingens & pituitosam, conglobatam, inuiscatam, & in partu bene repurgata, sputo albo & concocto apparente, hæc quoq; sanitatē cum admiratione multorū consequuta est. Verū in alia muliere, quæ Delphis comorabatur, duos supra viginti annos nata, cum prægnās in octauo mense esset, in asperrima hyeme (cum multæ aliæ, tum viri pleuritide corripiebantur, añ 1565.) comode quoq; in pleuritide seuissima (quemadmodū & aliis multis prægnantibus) vena secta fuit in brachio, e directo loci dolentis: aliisque deinde aptis remediis adhibitis ad pleuritidem conferentibus, tum decoctis, eclegmatis, inunctionibus & fortibus conuenientibus præscriptis, etiam & hæc sanitati restituta est.

S C H O L I A.

5 Quid in prægnantibus venam secare possimus, id quidem multis exemplis alias docuimus, ut lib. 2. obser. 28. de continua tertiana in prægnante, in cuius scholiis ad longū ex diuersis auctoribus, nūquid prægnantib. euacuatio & venæ sectio conueniāt, illustrium medicorum sententia, tum rationibus eorundē adiectis docuimus. De qua re etiam obser. 29. eiusdem libri, & in scholio pertractauimus: etiam obser. 22. lib. 15. quomodo etiam in angina mulieribus grauidis sanguis demitti possit. Ad loca citata lectorem relegamus, ne opus sit hæc eadem hic repetere. Quamobrem cum de causis & signis pleuritidis satis egerimus, nunc ad actionem ipsam seu curationem deueniendum est; quæ recte institui nequeat, nisi certis scopis propositis, in quos omnia referantur, & nisi certa adhibeamus instrumēta, quorum beneficio singulos scopos assequi liceat. De scopis ipsis alias diximus, qui ab auctoribus variis modis sumuntur, ut in lib. 3. de incerto vrinarum iudicio ostendimus, a quib. denuo indicationes sumantur. De quibus quidē loco exempli de pleuritide egregie pertractat Argenterius in libello suo de consultatione: uti etiam facit Montanus de pleuritide in lectionibus suis supra Rhalem. Quibus si lector ipse, tum iuniores sese exercere velint, habebunt latissimum campum, quomodo pleuritidem curabunt. Nos autem breuiter (cum alii hanc curationem longo sermone tractarint) in primis vitium comodum instituemus. Duo autem apud veteres, iuxta Hippo. erāt cibi genera, ptisana integra, & cremor. Si sine periculo videatur, inter initia ptisana vtemur; alias, si adsit periculum, & morbus magnus est, cremore vtemur: cibus enim maxime tenuis & levis, præcipueq; sorbitio, Celso placuit: potissimum sorbitio ex ptisana; nihil vero detur (ut inquit ille) quod aut refrigeret corpus,

aut fauces asperet: qua ratione acria, acida, salia, & astringentia vitanda sunt. Ita & Alexander ptisanæ cremorem largiter decoctum, donec id, quod flatuosum est, deposuerit, pro cibo commendat. Nos etiam si humor ægre ducatur, an ygdala purgata leuigataq; ptisanæ incoquimus, quo humor magis educationi pareatur: ac commode vtimur subinde & hordeato: & sic mane, iuxta Alexandr. ptisanæ cremorē; vespere amygdalarum succum offeremus. Si sit ex pituitoso sanguine, paululum mellis adiicit idem Alexander. Quoties vero dandum sit, & quantum in ea, consuetudo seruanda, tam ad ægros & sanos, ut habet aphor. 18. lib. 1. inter initia tamen exiguum & tenuem non tanti alimentum seruare oportet. At nostræ regiones tam exactam inediam, ut Itali & Hispani, non ferunt. Et sic in nostris agris aliquando amygdala expurgata & contusa & emulsa cum aqua exhibemus, vel panatam (ut parant Itali) & si vires imbecilliores fuerint, in gallinarū iusculo panis micæ decoctas pro cibo commode damus. Interea olera vitamus, nisi lingua scabra, siticulosaq; & febris ingens appareat; tunc etiam Alexander ante maluæ aut intybi decoctū exhibet. Possunt & pleuriticis mala dulcia cocta exhiberi, apia dicta. Initio igitur aqua hordei & hordei pulicula; principiis liquidior, post etiam crassior: deinceps mixtis amygdalis, tum amygdalogaia: post etiam eadem ex pullorum iusculis dissoluta: tenellæ pullorum carnes in fine, vbi vires deficiunt, intrita madida, quæ & infriatas carnes & synterimata appelles licet, vulgo collyria & collaticia iuscula dicta, expressiones quoque, quibus defectis viribus vtimur; alioqui integra satis virtute tenuius nutrimus. De quib. ad longum quoq; videas Benedictum Fauentinum præceptorem meum cap. proprio de curatione pleuritidis. Pro potu vtimur aqua hordei, vel radicem glycyrrhizæ seu paucum cinnamomum in ea decoquimus. Quidam (teste Alexandro) aquam tepidam propinat; alii aquam nullam in pleuritide ex pituitoso sanguine. Vbi paulum morbus sese remisit, alimenta pleniora exhibent. A vino tamen abstinendum censeo, nisi viribus admodum imbecillibus: etiam vini aliquid Celsus dat. Præceptor meus Benedictus Fauentinus nō dabat, nisi extrema indicatione pleuritidis transacta, quæ 14. die fit, idq; aqua permixtum: quod si pleuriticus nō fuerit iudicatus 14. die vinum non exhibet; rationem loco citato explicat. Huc etiā pertinet aer, qui temperatus eligendus est, parum tamen ad calidum inclinans: nam frigidum nervosis partibus, eisq; affectis est inimicum, teste Hippocrate Aph. 18. lib. 5. dolorem quoque insuppurabilem facit. Somno quoq; potius longiori vrantur quam vigiliæ. A motu omnino abstineant, iniungendaque quies erit: ideo a coitu abstinendum, cuius habemus exemplum apud Amatū de pleuritico, qui post venæ sectionem & sputi reiectionem sanum se dicebat; quāvis sequenti nocte cum vxore cum rem habuisset, facta recidua & dolore reuerso intra biduū in fine sexti diei, obiit: quicumq; enim recidiuam pa-

Synterimata.

8

Histeria da-
mati.

tium.

Historia
Rhasis.

10

tiuntur, etiam ex victu inordinato, tales quoque iuxta Auicennam commoriuntur. Hinc quoque sumopere cauendum a stypticis, cum & Rhases 4. Continētis narret historiam de quodam medico imperito, qui cum pleuriticum præ manibus haberet, & videret pleuritidem iam perfecte in declinatione esse, ac ægrum iam quasi sanatum, crassiore dicta utebatur: atq; ægro suo exhibuit, lenticulas cum aceto confectas, vnde ilico cessauit sputum, ob impedimentum illius nutrimenti, ita vt errore medici miser ille nocte subsequente e vita discederet. Sic ego quondam cum haberem pleuriticum præ manibus, & iam quasi curatus es-
set, me in scio salsamentum piscium ebibit: vnde denuo suborta tussis, dolor lateralis reuersus est, vt astantes illum moriturum existimarent; & nisi ego statim adhibuissem eclegmata dulcia. tum alia remedia expectorantia, æger succubuisset. Veteres, vt paulo ante diximus, pro potu dabant mul-
sam aquosam, vel aquosum oxymel, vt sputum fa-
cile educeretur. Nos commodè vtimur aqua hor-
dei mundati, in qua radices gly. yrrhizæ, & vuar
passulæ ab arillis repurgatæ, in coctæ fuerint. Sed
a frigida aqua abstinendum, quæ sputum incru-
descere facit; & subito (vt vidimus) suffocati sunt
quidam ex hominibus plebeiis, qui cum sitirent,
frigida bibissent. Hæc obiter de vitæ instituto.
De medicamentis (alio interiecto exemplo) post-
ea dicemus.

OBSERVATIO XXXI.

De pleuritide legitima.

VXor Magistri Henrici cognomento Raba-
annorum 43. mense Iulio, anno 1549. Alc-
mariz pleuritide vera corripit: aderat enim
dolor punctorius in latere sinistro ad clauiculam
ascendens, supra modum tussiebat, sputum erat
rubrum pituita mixtum, difficilem anhelitū tra-
hebat, continuo febricitabat cum capitis dolore,
pulsus durus atq; ferrinus erat. Quarto die ad eam
primo ingressus, iubeo vt in loco lucido medio-
criter elato collocaretur, & vt molli culcitra ca-
pite ac thorace subleuato decumberet, cumq; in
pedes decideret, lignum aliquod, aliudue corpus
pedib. obiciebam, vt in ea figura persisteret. De-
inde cum nostri inediā ita non ferāt, & iam quar-
tum diem attigisset, quod ad vict' rationem atti-
net, poma assata dulciora concessi, & hordeatum,
& amygdalatum, & panatam cereuisiariam vulga-
rium more paratam, absque vino, quod quoque
interdixi, eo quod nostri rustici statim in omni-
bus pectoralibus morbis ac tussi vino dulci vtun-
tur, apud nos Romano dicto, existimantes a fri-
gore tales affectus semper oriri: vt istis diebus mi-
hi euenit, cum extra urbem in pago Diui Eligii di-
cto, colonum pleuriticū præ manibus curandum
haberem, atq; eidem omnia vina interdixissem:
cumque is nostris præsidis melius haberet, post
nostrum discessum stupidi homines etiam præter
vinum, aquam vitæ ægroto propinarunt, vnde fe-
bre denuo accrescente, & sputo ob calorem retē-
to, intra quatuor pluresue horas miserrime ex-
stinctus est. Ita & sartor quidam Delfensis prope

nosocomium decumbens ex grauissima pleuriti-
de, cum aquam vitæ ebibisset, etiam grauissimis
symptomatis obortus, & ventris proluuie, nono
die sua incuria obiit. At in hac nostra ægra, cum in
quarto die acciti essemus, & sponte per se aluum
deposuisset, ex vena basilica in brachio sinistro
sanguine copiose extracto, dolor mirum in mo-
dum sedatus est, loco affecto etiam linimento in-
frascripto inuncto. *℞. unguenti nostri pectoralis,
diatheæ, olei viol. amygd. dul. an. ℥ij. misce: similiter
et hoc decocto, vel huius amuloter in die utebatur.*
*℞. foliorum viola. scabiosa, malua, buglossæ & borag.
cum toto, an. m. j. florum papau. sylvestris rubros flo-
res habentis p. j.* Volunt autem quidam hos flores
propriate quadam pleuritidem curare; & ita
medicos quosdam noui, qui syrupum præpara-
tum habeant, & confectum ex succo papaueris
floribus rubris sylvestris, & zaccharo partibus æ-
qualibus) quem exhibent cum decocto pectora-
li, scabiosæ, vngulæ caball. vel cum aquis iisdem
destillatis. Refert autem Rondeletius a tota sub-
stantia decoctum papau. rub. in aqua scabiosæ vel
pimpinellæ conferre, vel cineres priapi tauri cum
vino, vel cum aqua hordei in hunc modum. *℞.
flor. pap. rub. m. ℔. aqua scabiosa ℔ ℔. aqua pimpinel-
læ quart. j. concoquantur leniter, adde sacchar. pa-
rum, fiat ad formam inieb. dentur a principio bis vel
ter in die.* Vel, *Recipe cineris priapi tauri ℥j. de-
tur, si febris sit remissa, cum vino, alioqui cum a-
qua hordei.* Memini enim (vt etiam in scriptis
Gisberti Horstii medici Romani & nosocomii
Mariæ consolationis, cum Romæ agerem, legi)
quendam pleuriticum derelictum a medicis &
pro deplorato habitum, cum sumisset pimpinel-
℥ij cum tribus ℥ aqua flor. pap. rub. sylvestris, & ca-
uacubuisse, sudore euocato, conualuisse. Sed re-
uertentes ad nostram decoctionem, adieciuius
capill. Ven. vngulæ caball. an. m. ℔. glycyrrhic. rasæ
℥ ℔. prun. damasc. num. ix. iuiubar. sebesten recent.
an. num. v. semin. malua ℥j. vuar. passul. ab arill.
repurg. hordei mundati, an. p. j. coquantur in sero
lactis ad ℔ ℔. ℔. misce. Interea & eclegmata sume-
bat in hunc vel similem modum. *℞. syrup. viol.
iuiubini, capill. Ven. de liquiritia, an. ℥j. dia-
tragac. frig. in tab. ℥ ℔. zacchari candi, zacchari penid.
an. ℥ij. fiat linctus: postea relicto diatragacar th. et-
iam adiunximus loch sanum.* Sexto die hoc solu-
tium cepit. *℞. cassiæ recens extractæ, diacatholi-
ci, ana ℥ ℔. diaprunis lenitui ℥j cum ℥ij. decoct.
suprascriptæ, fiat haustus: quo quinquies aluum
deposuit, & dolor sedatus est, ac melius & magis
concocta exspuebat; febre etiam inclinante, ita
vt vndecimo die fuerit curata.* Quanquam po-
stea levis dolor in capite remanserit, qui leuissimo
remedio cessauit ex decocto simplicium herba-
rum, videlicet *betonica m. ij. viol. borag. bugloss.
scabiosa* (propter tussim leuem, qua adhuc deti-
nebatur) *hordei mund. p. j. fiebat decoctio in cer-
uisiâ communi* (cum apozemata in officina postea
abhorruerit) & post colaturam zaccharo dulcora-
batur. Ex quo decocto bis in die bibens, 14. die ex
integro fuit curata.

SCHOLIA.

5 **P**ROBA victus ratione descripta, statim etiam de aliis remediis cogitandum est: maiora vero remedia, quæ adhibentur, ut sæpe diximus, sunt purgatio, & venæ sectio. Sed hic statim celebriores medici inquirunt, num perpetuo insigni vacuatione morbus lateralis curari debeat, quæ aut per ventrem aut venæ sectionem fit: quidam volunt, si levis sit pleuritis, & sanguis per halitum digeri possit, & extra corpus educi, frustra auxilia fortiora tentanda, ubi in toto corpore non sit abundantia humorum: tales Hippocrates fomentis calidis curat. Sic nos puerum 13. annorum apud Henricum Iunium pædagogum anno 1560. cum post columellæ inflammationem & tonsillarum in morbum lateralem incidisset, curauimus fotu infra scripto, cum debilis esset, & per quatuor dies nihil edulii prius transglutire potuisset: bifariam enim foci iuuant, teste Galeno, & quia partim rarefaciunt & molliunt, & quia sanguinem in halitum ducunt. Fotus hic erat. *℞ florum chamomilla, meliloti, an. m. j. folior. malua, summitatum anethi, an. m. ss. rad. althææ ꝑ. ss. seminis lini ꝑ. ij. coquantur in aqua communi, & fiat fotus cum spongia expressa: quo solo puer a dolore euasit, & a pleuritide curatus fuit: qua curationis ratione ipse quoq; Galenus se quendam ægrotum meminit citra venæ sectionem curasse, cum miti pleuritide laboraret, ut videre licet 6. de morb. vulgaribus. Cuius sententiæ & Celsus & Alexander Trallianus existunt, quos & Paulus & Actius sequuntur. Alii volunt hanc curationem esse tentatiuam, ut Barbari quidam; quod rursus alii negant, cum Hippocrates idem faciens minime ignorabat exacte morbum lateralem fuisse, priusquam calida fomenta adhibuisset, id quod de tanto viro haud quaquam asserendum erat. Hæc simul pat. faciunt eorum incertitiam in curandis inflammationibus, in quibus momentum omne ex mente Galeni consistit in vacuatione sanguinis, qui in parte ipsa continetur; & extra corpus educunt sanguinem, ut sunt eiusmodi fomenta tenuantia, ac per halitum digerentia. Interea spectandum nunquid indifferenter in omni morbo laterali, nulla præcedente insigni vacuatione, possimus calidis fomentis uti, nondum habita adhuc notitia distincta; quod in toto corpore humorum redundantia non adsit: quibus respondet Alexander, quod iis uti possemus, cum ea ratione maxime copiam manifestabunt, utpote si fomentis dolor non mitigetur, ab iis abstinere vltimus, ne dolor augeatur propter attractionem: idem sentiunt & Hippocrates & Galen. 2. de rat. vict. in morbis acutis. Et tunc ubi dolorem non dissoluant fomenta, diutius non erit calefaciendum: quoniam in toto corpore humorum redundantiam adesse indicant; & propterea corpus totum insigni aliqua euacuatione præuacuabimus: si vero dolor his moderatior fiat, cum fiducia adhuc fomentis utemur, Alexandro etiam iubente; & ideo medici celebriores securissimum esse volunt, & in omni pleuritide fomentum esse adhiben-*

Nunquid perpetuo insigni vacuatione morbus lateralis curari debeat.

Fotus.

Nunquid indifferenter in omni morbo laterali nulla præcedente insigni vacuatione possimus calidis fomentis uti.

7

dum, tanquam omnino aliquam adferens utilitatem, vel ut causa sanitatis, & auxilium corpore non existente pleno, vel tanquam signum ad dignotionem (nec minus eo tempore aliquod adferens mediocre leuamen) ex quo nos dispositionem comprehendentes, ad totius corporis vacuationem peruenimus, ut Donatus ait: quemadmodum pro curatione doloris oculorum, *commento aphor. 31. lib. 6.* decretum quoque reliquit. Recte itaque dicit Hippo. non absonum esse tentare, an dissolui possit, quasi velit, non semper spem esse, ut iis dissoluatur: quin potius aliquando a fortibus deterius æger habet, & aliis remediis est opus. Curationem igitur doloris lateris a fomento orditur; siue statim inter initia sit ortus, siue postea superuenerit. Tentandum igitur, ut sic curetur pleuritis: scimus enim phlegmonem *ex 13. method.* qua phlegmone est, curari his, quæ resoluunt, & materiam per halitum digerunt: quod est tentandum primum. Sic Galenus, ut iam modo diximus, *6. aphor. 31. & in lib. de venæ sectione*, phlegmonas oculorum fouet, tentando an posset dissolvere. Si sit multa copia & malum increscit hoc in usu, ad alia remedia se vertit: scilicet, curatione causæ antecedentis utens, a qua phlegmone augetur & fouetur. Quam utilis sit fotus, id etiam experientia sæpe vidimus, non tantum in principio, dum vocemur, sed etiam postea. Sic memini me in curatione habuisse Almaria abbatisam satis vetulam Clarissarum graui pleuritide affectam: quæ cum venæ sectione & leui purgatione, cum aliis aptis remediis, curari non posset, extremo dolore lateris permanente, & cum eidem proposuimus fotum esse adhibendum (quem ratione religionis suæ admittere nolebat, cum vestes ex huius ordinis decreto exuere non posset) tandem post duos vel tres dies dolore semper increcente rogauimus, nunquid vestes circa locum affectum discindere possemus, vestimentis non exutis, cum & post fotum facile iterum suendo coniungerentur, quod cum annuisset, fotu adhibito, præter aliarum monacharum opinionem, cum morti destinata videretur, a dolore & pleuritide sana euasit. Ceterum exempla fotuum quatuor sunt: primum morsu prorsus caret, & tutissimum (ut etiam Iacchinos doctissimus annotauit) esse videtur, ex aqua calida, nos commode anodyna & emollientia, ut in puero præcedente, adieciimus. Modus vero applicandi ex ventriculo aut bubula vesica, est commodissimus: vel cum spongia, ut nos feliciter utimur, prius expressa & calide admota: quo etiam ad acutissimas & biliosas valde pleuritides utendum Galenus ait: quoniam a siccis, & calentibus proritaretur humor ille, qui contrariis temperari debet; ideo humescere & mordentes humores morsu carentibus mitigari. Sed & quia tutissimum est, quod mitissimum: tutius eo in omnibus vteris, inquit Galenus, cum coniecturam de humore, qualis sit, certam facere non poteris, mox ad alia te transferes. Admodum quoque applicandi attinet, ut circumuestiatur linteo, quo calor plus perduret, neque halitus ad laborantis pulmonem feratur vna

8

9
Quatuor exempla fotuum.

10 cum aere inspirato. Alia vero fomenta primum cruo, posca, cocto vel hordeo, vt Galenus notat, humori glutinoso & contumaci vtile erit; vt si flatus adsint, & dolor ex phlegmone, cui multum pituitæ sit, quoniam secat, discutit & siccatur. Alia vero sicca sunt, id est, sine humore admota, ex milio & sale, quæ ambo siccant; sed hoc differunt, quod sal vim acrem habet, & plus discutit, vnde & humori contumaciori conuenit; cuiusmodi est pituitosus. Milium vero solum siccatur, sanguineo magis vtile. Plura de fomentis, quæ scripsi. Benedictus Fauentinus, cap. proprio de Pleuritide, videas: tum alios auctores, qui hanc rem copiosius tractarunt. De vene sectione (quæ statim est adhibenda, si dolor non sedetur in principio cum fomentis) & de purgatione, scholio subsequente dicemus.

OBSERVATIO XXXII.

De fabro lignario ter in quatuor mensibus pleuritide vera correpto, & curato.

1 **A**ugusto mense anno 1545. faber lignarius Pithenriensis, annos natus triginta sex, satis robustus, & mediocris habitudinis, cum in pleuritidem veram incidisset, & per duos dies aluum non deposuisset, me vocauit. Statim communis clysteri iniecto, cum bis ex eo aluum deposuisset, mox secta vena cubiti dextri e directo loci affecti & sanguine utcumque copioso circiter uncias decem extracto, deinde syrupis pectoralibus ebibitis, & leniente postea medicamento assumpto ex cassia & diacatholico. an. ʒ ss. cum sero lactis soluta, paucis localibus remediis adiunctis, tum eclegmatibus aptis ad sputum educendum, post septimum diem egregie curatus fuit, ac sanus vixit. Post mensem tamen denuo in pleuritidem suam & acutam cum grauioribus accidentibus prolapsus est: & quarto die ad eum accitus, rursus cum phlebotomiam adhibere instituissem, amici ægrotantis refragabantur, cum vix mensis præterisset, quod sanguis illi detractus esset: ratione tamen persuasione, venæ sectionem admiserunt. Ita denuo sanguine detracto ex vena basilica eiusdem lateris ad uncias octo, mox rursus conualescere ccepit, & ad consueta munia demum reuersus optime se habuit. Sed, quod miratu dignum videtur, post duos menses iterum in pleuritidem relapsus, denuo sanguine demisso ex cubito lateri dolenti correspondente, ilico & præter spem conualuit: ita, vt hic æger inter quatuor menses ter legitima pleuritide laborauerit, & semper sanguis detractus fuerit ex latere eodem: cuius venæ sectionis beneficio, adiunctis & aliis præsidiiis commodis, mox sanitatem recepit. Quo quidem exemplo manifestum euadit, auxilium citius sanguine ex latere eodem demisso, quam ex opposito contingere.

SCHOLIA.

3 **O**mnes quidem medici in hoc consentiunt in omni pleuritide, existente humorum redundantia in toto, semper curationem exordientem esse a venæ sectione; quamuis in dubium vocant, ex qua vena id fieri debeat, numquid etiam

ex eodem latere vel opposito. Et de hac controversia non solum Arabes cum Græcis, ac ipsi met Græci auctores inter se, verum etiam iuniores medici, etiam hi, qui Galeni doctrinam profitentur, magnopere digladiantur; ita vt adhuc sub iudiculis esse videatur; & si auctoritatem ac numerum spectes, vix scias, penes quæ sit victoria; num penes Græcos, Arabes, Barbaros Latinos, veteres aut iuniores victoria consistat. Hinc tot concertationes, tot Apologiae, tot libelli conscripti de venæ sectione vsque ad iurgia fere & obiectationes. De qua quidem re disceptarunt celeberrimi quique medici nostri temporis, vt Petrus Bristotus vir in vtraque lingua doctissimus, & Leonardus Fuchsius, & ante illum Matthæus Curtius vir integerrimus, qui questionem de hac re non spernendam scripsit; & Manardus Ferrariensis medicus eruditissimus, & Campegius, qui in hoc negotio defendendo partem Græcorum non parum temporis consumserunt, dum venam secandam esse volunt ex eodem latere, contra Arabum partes, qui ex opposito latere sanguinem promunt, validissimis rationibus ac auctoritatibus non spernendis defenderunt: vt Dionysius medicus Lusitanus, Hieremias Thriuerius quondam præceptor meus Louanii: Dominicus a Melguia medicus Romanus, Andreas Turinus, qui aduersus Curtium scripsit. Neque hæc noua hæresis est, sed per multos etiam ante annos agitata quæstio: ita vt Auenzoar ille gloriosus medicus lib. 1. Theysir. tract. 16. cap. 3. taxet medicos nouos sui temporis, qui secabant venam ex eadem parte ægritudinis. Huius quoque opinionis sunt & Auicenna, Rhases, Haliabbas, Mesue, Auerrhoes, & omnes Auicennistæ & illi potissimum medicinam barbaram sectantes, & qui in Rhasem commentati sunt atque scripserunt. Hi omnes a latere diuerso sanguinem demunt. Et inter Græcos Archigenes ipse inquit, Si latus inflammatur circa mammam, & ad clauem dolor peruenerit, in opposito cubito venam secabis, & sanguinem detrahes citra animæ defectum; tum per pneumoniam, inquit, non extimesces; pulmo enim, qui rarus & calidus est, laterique vicinus, facile virus contrahit: at expedit per internalla extrahere. Eundem & Aetius sequitur. Alii Græci, vt Hippocrates & Galenus, & post eos Oribasius, ab eodem latere miserunt: & Cornelius Celsus inter Latinos præcipuus lib. 2. cap. 9. taxat medicos, qui in dolore pleuritico faciunt diuersionem a longinquis: & Constantinus ille Cassianensis medicus, ex mente Isaac lib. 3. Viaticæ cap. 12. in pleuritide venam, quæ ex directo loci affectu est, secandam docuit: quamquam & is Arabs non deuiavit, ab opinione Græcorum: quamuis alii quoque non desunt, qui nituntur Arabes cum Græcis concordare, vt Nicolaus Monardus Hispalensis medicus. At nos etiam in sequendo præcepta præceptorum nostrorum, comode semper in principio quoque ex latere eodem sanguinem missimus, non solum in hoc fabro, sed in aliis fere omnibus. Idem Amatus in multis exemplis peregit; vt in Angelo Ferreto nobili Anconitano, præmisso clystere basilicam eiusdem lateris

6 lateris dolentis secare fecit, ad uncias octo sanguinem extrahens, idq; primo die, ut videre poteris, cent. 1. curat. 59. & in mercatore Ariminenfi ad uncias decem in eodem latere cent. 3. curat. 68. Et in puella annos 17. nata iniectione clystere, eodem die bis axillarem venam secuit ad uncias viginti sanguinis, centuria eadem curat. 69. idem iussit fieri in alio, centur. 4. cura. 88. Et in textore ad duas libras, ubi & in scholio se cum Br. sotto Gallo, Mathæo Curtio & Fachsio convenire testatur, rationemque ibidem addit longo sermone, cur id faciat. Interea neq; illi audiendi sunt, qui docent semper faciendam esse in parte dextra, quod vena azygos magis ad partem illam vergat, quam ad aliam. At Donatus & Agenterius magis quoque inclinant ad illos, qui ex latere eodem sanguinem demendum esse tradunt, quamvis uterque illud tamen non vult perpetuum esse præceptum, quod nunquam in latere opposito fieri deberet: de qua re vide prædictos auctores, & præcipue Donatum. 7 Sic istis diebus etiam memini me secuisse laphenā in iuencula octodecim annorum, cui cum menses fluere, & subito adstricti essent, & in pleuritidem collapsa esset, mox aliis remediis hæc ipsa sanitati restituta fuit: nam ubi facta fuit laphena, aperti sunt menses, & melius pleuritide euasit: & quamquam in hoc casu iuuebat, si tamen menses non subito fuerint restricti, sed forte longiore tempore, vix video in tam vehementi malo, quomodo tam longinqua diuersio prodesse possit: licet Holerius eam laudat, sic scribens: Suppressa aliqua per partes inferiores vacuatione, ubi malum inde ortum est, in insigni plenitudine, in materia virulenta, cumq; statim in initio materia in caput rapitur, ac mentē commouet, e venis cruris eiusdem lateris, sanguis demendus est; alioqui e basilica eiusdem lateris: & ideo debet fieri (ne hic multa verba profundamus) secundum rectitudinem, quod Hippocrates, & deinde Gale. appellat *ἡγρὸν*: & ita eligit Hippoc. venam internam eiusdem lateris, quod hæc, ut Galenus ait, reuellit, & celerrime, & vacuata partibus pectoris superioribus. Cum ergo in acutis morbis celerrima auxilia exigamus, hinc eam præeligemus, & ea non apparente mediam. Nam quæ ex opposita vena fit, aut exiguum præstat auxilium, aut non cito sentitur, sed serius. At nos velociter iuvari ægrum volumus in morbis acutis. Sed antequam reliqua explicemus de venæ sectione, aliud exemplum proferamus.

OBSERVATIO XXXIII.

De pleuritide valde periculosa in sena, & de muliere pleuritica, in qua non ante octauam diem fuit secta vena.

1 Iason Langius Hyperanus, vir insigniter doctus, Scholæ Delfensis Rector, familiaris noster amicus, annum agens 64. anno 1589. mense Octobri in pleuritidem sæuissimam incidit: ad quem prius tertio die accitus fui, nempe 23. die Octobris, cum sputum crudum, viscosum, cruentum, subinde & biliosum expueret, cum ingenti lateris sinistri dolore, ut morti vicinus videretur,

glande vix aluo soluta cum tribus diebus nihil excreuerat, neque vena secta fuerat, & iam tertius dies esset, venam in brachio sinistro, nempe basilicam, secari præcepi, sanguine ad uncias septem, vel paulo plus in sene extracto: interea hoc decocto utebatur. ℞. rad. liquiritia rasa ℥ ss. hordei mundati p. j. viol. bechii, scabiosa, capill. Ven. polytrichi, an. m. ss. sem. anisi ℥ j. ss. uuar. pass. enucleat. ℥ j. iuiubar. recent. numer. v. j. fiat decoctio in aqua communi pro ℥ ix. colatura addendo syr. capill. Ven. ℥ j. ss. misce: locus inungebatur linimento sequenti. ℞. olei amygd. dulc. ℥ ss. olei chamamel. buri recentis, axungia gallina, an. ℥ ij. misce. Pro expectatione hoc eclegmate utebatur. ℞. syrup. capill. Ven. ℥ j. syrup. de liq. viol. an. ℥ ss. zacch. penid. ℥ ij. fiat ioch. 14. Octob. cum aluum non deponeret, glans acuta iniiciebatur: sed nihil effecit: & rursus assumpsit hoc lenne medicamentum laxans. ℞. syrup. ex infus. ros. pallid. cum foliis senæ ℥ j. ss. elect. lenitum ℥ j. ss. aqua ungula caball. seu bechu ℥ ij. ss. misce: sed nihil effatu dignum eduxit: ideo hoc apozemate utebatur. ℞. hordei mundati p. j. folior. malua, viol. ungula caball. capill. Ven. polytrichi, an. m. j. flor. cordialium p. j. prun. damascen. numer. xij. uuar. passul. ab acinis repurgat. ℥ j. iuiubar. recent. numer. vij. folior. senæ Alexand. a stipitibus repurgat. ℥ j. sem. anisi ℥ j. ss. polypod. quer. ℥ ss. fiat decoctio in aqua communi pro ℥ ix. fortiss. express. adde syrup. violar. syrup. ex infus. ros. comm. & pallid. an. ℥ j. misce, fiat apozema pro tribus dosibus matutinis: cum vnam sumisset, ter aluum deiecit: dedimus 26. Octob. altero die rursus dosim cœpit. At dolor non mitigabatur. Quare & hoc foru utebamur. ℞. rad. alibæ mundat. ℥ ij. folior. malua, violar. flor. chamamel. meliloti, an. m. j. seminis malua ℥ ij. semin. lini ℥ iij. coquantur in aqua communi pro ℥ j. ss. fiat fons cum sponsia, ut artis est: & rursus cum vng. supralcripto cœpit dolor mitigari; & nono die sputum melius exibat: sumens quoque ex linctu syrupi capill. Ven. & liq. antea quoque ex syrup. iuiubino de liquiritia, adiectis tabulis diatrag. frig. eo quod sputum biliosum erat. Sed 27. Octob. syrup. capill. Ven. de liquirit. Decimoquarto, sputo bene exeunte iam melius habebat, utens hordeato: & post 14. diem sputo magis exeunte in sene, circa 20. diem, perfecte curatus est a pleuritide sæuissima, cum omnium admiratione, cum pro deplorato habitus fuerat. Interea in dubium vertitur a quibusdam, numquid post quartum diem sanguis demendus sit in pleuritide: quam quæstionem mouet Valescus lib. 3. cap. 8. de pleuritide: & auctoritate Rhasis & aliorum, ac Auicennæ concludit, cum tunc adsit augmentum & materia incipiat digeri & expelli sputo apparente & melius exeunte, quam prius, venam minime esse secandam, ne impediat apostematis maturatio. Neq; propterea id fieri iubet, nisi aliorum medicorum præsentium consensu; idq; admonens ut opinor, ut calumnia declinetur, modo vires admittant. Hippoc. tamen in Anaxione octauo die venam secuit, ut etiam ex commento Aphor. 12. lib. 1. apud Galenum con-

stat. Et huius historiam ad longum habemus 3. de morb. vulgaribus, licet etiam tunc medici (referente Galeno in eodem *comment. 3. Epid.*) quasi certa lege ultra quartum diem venam non secabant. Sed quod octavo die prius venam secuerit, aliquæ referuntur rationes a Galeno, vel quod Hippocrates citius non esset vocatus, vel quod materia esset cruda: quæ tamen rationes Montano non satisfaciunt, ut ad longum explicat in commento supra R. h. de pleuritide: sed & hanc rationem meliorem esse putat: non misit in quinto, quia erat dies maioris afflictionis, neq; in septimo potuit; quia hi dies erant maioris afflictionis, cum pleuritides plerumq; habeant accessiones de tertio in tertium: in sexto quoq; non misit, quia tunc delirabat, & habuit sæva accidentia; ideo necessarium fuit in octavo mittere. Reliqua vide apud Montanum. Quod Hippocrates hoc prius in octavo die fecerit, oportet, ut aliquam ex his dictis causam habeat: Cum enim magnitudine morbi & viribus indicatio mittendi sanguinis sumatur, (ut 9. *methodi habetur*) optimum igitur factum est, id quod nos semper (inquit Galen.) facere vidisti, statim non numero dierum, sed vni virium robori in febribus eius generis (Synochos præcipue intelligit, sic & acutas, ut est pleuritis) attentum esse: quippe quod si servatum est, non solum sexto septimove, sed etiam sequentibus diebus sanguis est mittendus: & ita si tardius vocati fuimus ad pleuriticos, etiam post quartum diem, & omissa fuerit venæ sectio, sanguinem demitteremus, modo vires adsint, ac dolor ac febris urgeat, & sputum nondum maturuerit; & sic ego aliquando in mulier pleuritica & vidua annos quadraginta nata (quæ in aggere tinctorio Delphis decumberat) octavo prius die venam secari feci, cui facies pustulis repleta erat, pulsus utcumq; fortis, idque ex eodem latere; quæ postea aliis quoque adhibitis remediis, & eclegmantibus ad sputum facilitandum utens, per modum resolutionis sputum commode expectorans sana euasit, cum aliis nonnullis, cum anno 1565. mense Ianuario vsq; ad Martium, cum aspera hyems esset, quam plurimi ex pleuritide decumberent. Venit & mihi tunc in mentem Oliuerius pleuriticus apud Amatam, cui in principio tantum uncia quatuor sanguinis detractæ fuerant: & postea Amatus ad eundem accitus 10. die, uncias octo detraxit: deinde rursus 13. die uncias sex: qui tandem euasit 27. die, ut apud eundem videre licet *cent. 1. curat. 21.* Hoc tamen exemplar non semper imitari oportet, cum & vires considerandæ sint, quæ non semper toties repetitam venæ sectionem ferunt: sed potius in principio, cum vires adhuc fortes sunt, & exitus sputi non impediatur.

S C H O L I A.

^I De mensura sanguinis. **Q**uam ad sanguinis detractionem, postquam Hippocrates, quando sanguis sit detrahendus, & ex qua vena docuisset, mox de quantitate agit, dicens: tantum sanguinis auferendum, ut color permutari cœperit ipsius effluentis. Est autem permutatio hæc, ut si prius albidior colore sit, ut

in pituitosiore habitu contingit, rubidior euadat, id est, pleniore purpuræ colore: si vero calido sanguine eger sit & purpureo, loco eius liuidus exeat. Iam enim hoc signum est, detractionem eo peruenisse, ut euacuaret sanguinem circa partem impactum in exilibus venis, qui etiam eo modo alteratus est a calore phlegmones. Nam calor ita colorem alterat exurendo; quod aperte in febricitantibus videmus, & æstate exercitatis euenire: sed contra quam hic; in illis enim sæpius mutatio coloris fit ad melius, propterea quod sanguis in extimis venis manens exurit, qui vero in visceribus, benignior est, (ita procurante natura in febribus, ut excrementitius ad cutem tendat, contra viscera potiore fruatur) præterea quod exiguus est, & in exiguis venis facile exurit. Ignari vero medici cum eam mutationem vident, Hippocratis exemplo sistere volunt. At non eadem ratio est, ut etiam doctissimus Iacchinus annotauit. Hic enim plurimum educetur, priusquam educio ad locum perueniat: itaque bonum erit ibi sistere. At hic vacuare plenitudinem volumus, & non solum, qui in extimis est, sed qui in visceribus: itaque non statim sistere oportet. Horum autem dictorum Hippocratis Galenus reddit rationem in 2. de *rat. victus*, & in *lib. de curandi ratione per venæ sectionem*. Non tamen, secundum eundem Galenū, sanguis semper mittendus in pleuritide ad caloris mutationem, ob infirmas vires, quæ tantam copiam vacuare prohibent, aut ob phlegmones prauitatem. Quibus & Galen. *in eodem loco*, & 1. de *art. curat. ad Glaucenem*, adiungit laborantis temperiem calidam & humidam: nam suapte natura talia corpora diffillantur, uti & pueris. Et licet Græci in pueris usque ad 14. annum a venæ sectione abstinerent, Arabes (ut alias diximus *lib. 1. scholio, obseruat. 21.*) etiam in pueris eam aliquando non reliquerunt. Sic nos in pueris 9. annorum pleuritide laborantibus venam secimus, etiam in quodam 13. annum agente. Quidam medicus Bruxellensis felici successu quarto anno venam secuit: Galenus ubique prohibet, usque ad 14. annum Amatus venam secuit in puero obefulo, sanguineo, quatuor annorum. In pueris tamen pinguiusculis (ubi venæ angustiores sunt) quidam sanguisugis vtuntur, decurtata harum cauda, ut vacationis modus certo finiatur. Ideo & mensura obseruanda: in pueris partius, in adultis copiosior adhibenda: & tantum, ut alias diximus, detrahendum sanguinis, quantum postulat vehementia affectus & copia humoris redundantis; sed non ad synopen, ne sputum retineatur, aut humor postea regeratur in affectam partem; præstatq; sanguinem, (ut alias diximus) in peluiculis demissis spectare, & eius colorem & consistentiam considerare. Atque hæc sectio fienda præsentem medico, ut & colorem spectet, & vires ex pulsu metiatur. De tempore iam paulo ante diximus, & latius *lib. 1. Schol. Obseruat. 12.* Sed hic aliquis dubitare posset, quod aliquando non tantum ob imbecillitatem virium sanguinis missio fieri non debeat, sed etiam ob aliam causam, ut si natura euacuet satis per hæmorrhoides

Vide cent. 1. curat. 17.

rhoides vel sanguinis fluxum enaribus aut men-
 4 strua purgatione. Sic ego quondam in nobilif-
 sima domicella Terlongia, iuuenula quindecim
 annorum, quæ ex pleuritide in Campo regio de-
 cumbebat, eo scilicet tempore, cum publicæ pleu-
 ritides grassarentur, ad quam quarto die prius ac-
 citus eram, quo tempore menses aperti erant, &
 largiter fluebant, a sanguinis missione abstinui:
 quæ postea (mensibus apertis sanguine satis co-
 piose profluente, sputi expectorationem nõ pro-
 hibente) adhibita leui ventris lenitione, & ecleg-
 matibus ad sputum facilitandum & linimentis,
 absque venæ sectione conualuit. Quod si tamen
 non satis profluant (vt alias fecimus in quadam
 famula iuxta Aetium, cum non satis videretur
 purgari per menses) commode venam in brachio
 e regione dolentis secamus. Sed hæc de venæ se-
 ctione dicta sufficiunt: cum integri libri de eadem
 re, de pleuritide curanda, conscripti sint. Sed nunc
 de purgatione etiam quid adiciamus: & primo a
 medicis doctissimis quæritur, num ea vtendū sit?
 Num vten- Hippocrates solum ea vtitur, vbi dolor inferna af-
 dum sit pure fligit. Galenus huic non repugnat, & fatetur vsui
 gation em esse, sed non esse rutum propter febrem, propterea
 pleuritide. quod nõ nouimus semper ægri naturam, vt se ha-
 beat, ad purgationes & alia incommoda, quæ ibi e-
 narrat: ideo prælegit & hic venæ sectionem, quem
 5 sequitur Rhases. Hinc quoq; Rondelerius potius
 clysteriis contentus est, cum viderit aliquos perire
 ob medicamenta laxantia; cum & Hippocrates a-
 libi dixerit, inflammationes internas laxantibus
 medicamentis non esse curandas, quia nihil a par-
 te inflammata euacuent, & sanas colliquefaciant,
 & ideo in solo morbo pituitoso, qui per catarrhū
 siue deflaxionem fit, laxans medicamentum alibi
 exhibet Rondelerius. Nos tamen dicimus cum
 Iacchino, ex communi methodo 4. method. & 13.
 in cura phlegmones patere, quod si æger vitioso
 succo abundet, esse etiam adhibendam purgatio-
 nem; sed quæ minime angat: cuiusmodi sunt le-
 ues purgationes, quarum multa sunt exempla: &
 multi iis vtuntur; præsertim, si morbus non pror-
 sus constiterit, sed adhuc semper augeatur. Ali-
 quando igitur ea vtemur, aliquando sat erit clyst-
 mate vti. Galen. autem prælegit phlebotomiam
 respectu purgationis acrioris, quæ fit a peplio &
 helleboro. Hippocrates vero, etsi sub septo trans-
 uerso partes doleant, per inferiora ventrem pur-
 gare præcepit 2. derat. viēt. & 4. quam sententi-
 am etiam post Hippocratem sectati sunt Paulus,
 Aetius, Alexander, quod quidem seruari duobus
 duntaxat prius consideratis perpetuo potest, mo-
 do non sint correpti validissimis febribus: nam iis
 6 medicamenta purgatoria dari non debent, donec
 febris remiserit. Vnde & (eodem teste Aphor. 24.
 lib. 1.) in acutis morbis raro, & in principiis tan-
 tum medicamentis purgantibus vtendum. Iam
 quoque ex Gal. 2. derat. viēt. ipsius laborantis na-
 tura cognita esse debet, vt paulo ante dictum est: si
 eius naturam cognouerimus, & dolor inferiores
 partes thoracis infestet, & febris non fuerit vehe-
 mens, medicamentum purgans iuxta Hippoc. &

Gale. dari poterit. Sed quia sæpiissime febris vehe-
 mens pleuritidem comitatur, etiam dolore partes
 inferiores infestante & natura incognita plerum-
 que sit, Galenus ea ratione tutius semper venam
 secari iubet: quam opinionem ad longum etiam
 Donatus explicat. Hinc & quidam raro vtendum
 purgantibus voluere, iisque leuibus in principio,
 morbo pituitoso per defluxionem, & si materia
 fluat ab hepate: sed tutius adhuc clysteribus a-
 gitur. Sed quia nostra medicamenta multo tutio-
 ra sunt quam veterum, lenientium purgatio etiā
 ab initio non erit metuenda, quæ leniendo pur-
 gant, & tussi non aduersantur; qualia nostro æuo
 sunt cassia, manna, syrup. ex infus. ros. aut viol. solu-
 tiuus, & diaprimum simplex, aliquando, adiecto dia-
 catholico vel electuario leniente, vt exempla curato-
 rum ostendunt. Sic ventrem lenimus & materiam
 minoramus, digerimus cū syrupis & decoctis &
 purgamus cum leuibus iam dictis. Sed a vehemē-
 tioribus solutiuis abstinemus, & non vtimur pi-
 lulis, vt quidam ineptus medicus (vt Guainerius
 refert cap. 12. de pleuritide) qui nobili pulcerrimæ
 iuuenulæ pleuritide affectæ dedit 3j. pilularum
 foetidarum cum gr. iij. diag. quibus in syncopen
 læpius prolapsam Guainerius restituere non po-
 tuit, ita vt in brachiis eiusdem exspirauerit misera.
 Sic & quidam alius pleuriticus cum pilulas acce-
 pisset, postea curari non potuit. Vomitus hic quo-
 que nullo modo confert, nimis etiam pectus ex-
 agitat, & sua commotione malum auget. Ideo &
 vulgares pessime faciunt, qui in pleuritide semen-
 cataputia exhibent. At clysteres emollientes vti-
 les sunt; & statim iniiciendus emolliens, si tempus
 pariat; deinde fiat sectio venæ, vel post. Formu-
 las habes apud Rondelerium & alios. Hæc de eua-
 cuatione. De aliis remediis, quæ sputum promo-
 ueant, & intus & exterius adhibentur, mox dice-
 mus: quæ inquam dicta, & iam dicenda exemplis
 multa illustriora erunt.

OBSERVATIO XXXIV.

De pleuritide miti benigna, quæ factissime
 fuit resoluta.

A Leida, Petri Opmeri filia, puella 14. anno-
 rum plus minus, gracilis & biliosa, ac raræ
 constitutionis anno 1565. 16. Ianuarii die; cū
 ingens gelu esset, & venti boreales flarent, Delphis
 apud patrē habitans, vera pleuritide correpta est.
 Ad quam secundo die accitus, cum parum colora-
 tum exspueret, atq; omnia signa pleuritidis veræ
 adessent, sed benignioris, atque dolor latus dex-
 trum contorqueret, cum balano aluum deposuif-
 set, ac bis stercore licet dura excreuisset, post duas
 deinde horas, cum dolor clauiculam ascenderet,
 venam basilicam in cubito eiusdem lateris tunde-
 re feci, sanguine ad uncias quinque vel paulo plus
 extracto. Plus vero extrahere ausi non fuimus in
 puella 14. annorum, tempore valde frigido exsi-
 stente, & in gracili corpore. A sanguinis detractione
 mox dolor mitigatus est: & post inunctionem
 loci dolentis cum vnguento resumptiuo, & a san-
 guinis detractione sudauit, & plurimum febris
 mitigata est: & tunc sub noctem hordeato proci-

bo vfa est. Die vero subsequenti anhelitus liberior & dolor ex toto fere sedatus. Sed quod omiseram, a venæ sectione eodem die hoc iuleb ebibit. *℞. decoct. pectoral. ℥ iij. syr. viol. iuiubini ℥ β. misce.* Tertio die ab initio morbi melius spirabat, ut dictum est, & sputum optime procedebat, licet paucum & sine dolore, cum & materia admodum exigua videretur, & minime rebellis. Sed cum ventrem non bene deiceret, dimidium huius potionis sumsit: *℞. foliorum senæ ℥ vi. bulliant in ℥ i x. decoct. pectoralis, & fiat fortis expressio, addendo syr. viol. capill. ven. iuiubini, an. ℥ β. misce.* Cum dimidium huius ebibisset, bis excreuit liquidiora. Interea ad sputum facilitandum hoc lambitino continuo utebatur. *℞. diatrag. frig. in tabul. syr. viol. iuiubini, an. ℥ β. zaochar. penid. ℥ ij. postea & syr. capill. ven. adiectus est.* pauca exspuebat, sed mediocriter sudabat, & cum inunctione insensibiliter materia resolvebatur. Quinto die reliquum decoctionis senæ sumsit, & bis denuo excreuit: sexto die nisi cum glande. In septimo cum sudasset, continuando eclegmata dicta, cum syrup. capil. ven. liberata est, & febris eam reliquit. Præsanapro potu utebatur, & pro victu, solo hordeato, postea & panata cereuisiaria. Quibus præsidis, & hæc commode restituta fuit.

SCHOLIA.

QUamuis autem hæc pleuritis mitis esset, hoc tamen tempore a mense Ianuario vsque ad Martium, continuo pleuritides grassabantur, etiam sæuissimæ; nonnullæ quoque peripneumoniæ, quæ in senioribus magis lethales erant, & multæ pleuritides in peripneumoniâ lethalem conuertebantur. Atque hæc omnia videbantur euenire ob aquiloniam constitutionem, cum & per totam hyemem & ultra decem septimanas continuo gelu erat & glacies, & ante natiuitatem Domini gelu atrocissimum vsque ad secundum diem Martii perdurans, quale tempus hybernium neque ipse vix in vita viderim. Quod tunc erant pleuritides & peripneumoniæ, nihil miratu dignum, cum antea ex Hippocrate dixerimus ex *Aphorism. 23. lib. 3.* Hyeme morbos laterales & pulmonis inflammationes fieri: eoque magis, cum venti frigidissimi spirarent, nam & versus orientem & aquilonem flabant, hinc dolores lateris & pectoris increcebant, iuxta *Aphorism. 17. lib. 3.* cum aquiloniæ constitutiones pectoris dolorem augeant, quod & *Aphorism. 5. lib. 3. ostendit.* Plurimi tum temporis suamet negligentia perire, cum non satis tempestiuè medicum vocarent, alii vero nimis nasuti sibi ipsi medentes medicamentis calidioribus (cum tamen febre acutissima afficerentur) necem quoque intulerunt. Ceterum (quod ad curationem attinet) de euacuatione iam dictum est, & de maioribus remediis, nempe purgatione & phlebotomia; interea alia præsidia non erunt negligenda, quæ ad facilem excreationem, & ad thoracis expurgationem valent, quæ etiam diuersa esse debent, prout humor quoque varius sit, qui pleuritidem intulerit: sic in biliola confert syrup. viol. iuiubini & adianthi, etiam in sanguinea: ita

& syrup. de glycyrrhiza, de hyssopo, de præssio si ex crassioribus succis originem traxerit. Huc pertinent & decocta pectoralia, & eclegmata, & epiglottida dicta de tussi & catarrho: quorum medicamentorum copiam habes apud Rondeletium, Hollerium & alios practicos: uti etiam de vnguētis, linimentis, fortibus, & aliis, præsertim apud eos, qui Arabum decreta quoque sequuntur. Et sic in vera pleuritide curanda, quæ per sputum vel resolutionem terminatur, curationem certis quibusdā intentionibus absolunt, victum commodum describentes, materiam diuertentes, & digerentes, mox euacuantes & sputum facilitantes & materiam ultimo resoluentes: ut apud Galenarium, tum alios videre licet. Et sic omnibus modis augmentum apostematis inhibent, & secundo quod fluxum est resolunt. In his tota curatio consistit. Si vero per collectionem terminetur, supradictis quatuor intentiones addunt, maturationem, ruptionem, absterfionem, consolidationem. De quibus videas Valescum & Arculanum; & quamuis in numero discordare videantur, in re ipsa satis concordantes sunt. Per exempla hæc ipsa manifestiora euadent.

OBSERVATIO XXXV.

De pleuritide sanguinea per sputum, deinde & per menses critica expurgatione finita.

Puella succi plena, annum 25. agens, sanguinea, famula apud cereuisiarium cum eodem tempore hyeme quidem asperrima, lintheamina extra urbem lota (ut fieri assolet) abluisset, domum reuersa cum incaluisse, 12. Februarii die horrida febre correpta, postquam inhorruisset, pleuritidem incurrebat, cum febre continua, & dolore sinistri lateris ad iugulum tendente. Primo die nihil exspuebat: secundo vero eruentū quiddam. Chirurgi opera vfa est: is sanguinem detraxit in brachio lateris oppositi, aluo plus æquo restricta, ita ut pessime habuerit; & per totam noctem subsequentem dolor valde increuit. Lotium ad me mittit, quod rubicundum erat, & quæ acta essent narrantur: lenitium præscribo, cum tribus diebus aluū non reddidisset, quamuis libenter prius illam inuisssem. Ex medicamento leniente quinquies aluum cum deposuisset, me vocari iussit: insequentem diem venæ sectionem in brachio e directo loci affecti distuli, ob medicamentum assumptum. Secta vero vena basilica ad uncias sex, iterum in loco affectui correspondente; qui cum in diuersis vasculis reseruatus, primo niger & corruptus fluxisset, & postea rubicundior, manifeste dolor lateris sedatus est; adhibito quoque linimento ex vnguento resumtuo: & bibens præsanam confectam ex hordeo mundato, vis passulis ab arillis repurgatis, & glycyrrhiza: & continuo sumens ex hoc eclegmate. *℞. syrup. iuiubini, viol. capill. ven. an. ℥ j. conserua viol. ℥ β. misce,* ita ut sputa melius procederent. Sub noctem reuersa fitebatur dolorem lateris omnino remissum; sed iam caput dolere, & minus dormire posse: frontem inungo vngu. popul. & oleo nymphae. Præscribo similiter diatragac. frig. in tabulis. Et ut continuo

3 **I**n uero eclegmate superiori vteretur. Quarto die vrina melior & sputa cōcocta exhibant, dolore circa imum ventrem apparente, & circa lumbos, ita ut menstruam purgationem expectaremus, venisq; vteri apertis menses copiose fluxere, dolore lateris amplius non apparente, & sputo mediocriter exeunte. At quinto die dum lectus componebatur, & diutius sella sine foco infedisset, rursus horrere cœpit, & in lecto febris eam inuasit. Ad illam reuersus, cum neglectim illam habuissent, calidis pannis ut tegetetur mandavi, & euocato sudore, ac latere rursus parū dolente inuncto cum vng. resumptiuo, dolor mitigatus est, & ex lyr. capill. ven. denuo sputum excreuit, & mensibus satis fluentibus in septimo die decretorio, hæc curata fuit, ut eam amplius non inuiserem.

SCHOLIA.

4 **S**anguineam pleuritidem minus biliosam lethalem esse prius diximus: quamuis considerandum veniat, quod aliquando una cum pleuritide purus sanguis exspuitur, venam ruptam significans in pectore. cuius curatio, teste Rondeletio, insaniabilis quasi habetur, cum & iuxta Auicennam in phthisin mutetur. Sed & Bertrarius de huius curatione meminit, dū prescribit ea, quæ partim leniter sputū educant & simul conglutinent: de quibus dictum est de sputo cruento. Verum in sanguinea pleuritide, in quā etiā albedo quædam una cum sputo apparet, liberalius sanguinem mittimus, alio respondēte, alioqui clystere emolliente præmissio. Deinde cum sanguis non digeratur, sed sua ebullitione facile in bilem transeat, in crassantibus syrups utimur, uti & in biliosa pleuritide, sed minus tamen in crassantibus in sanguinea quam biliosa. Ventrem cum cassia lenimus, adiecta pulpa thamarindorum, & in principio utimur decoctis detergentibus & lenientibus aluum, ex passulis, prun. dulcibus, iunib. & sem. 4. frigid. maior. malua & glycyrrh. ungula caball. viol. adiecto syr. viol. postea addimus syr. capill. veneris. purgamus cum syr. ex infus. ros. pallid. & decoct. pectorali immixto, ita & in materia calida utimur elect. diatrag. frig. diapensid. sine speciebus, ex quibus etiam eclegmata paramus, adiectis syr. viol. & iunibino, & si maiorem in crassationem desideramus, etiam adiicimus syr. pap. adiecto syr. adianthino, ne nimis in crasset: de quib' videas Rondeletium & alios. Potus, vnguenta & alia hic ita calida esse non oportet uti in pituitosa, & fortius magis humidi conferunt, ut dictum est prius: atq; tale vel simile vnguentum. ℞. olei viol. amygd. dulc. ana. ʒj. b. butyri recentis ʒj. misce. alia tamen magis conueniunt in principio, alia in statu & declinatione: de quibus omnibus vide iam dictos auctores.

OBSERVATIO XXXVI.

De pleuritide biliosa.

1 **V**ir qui ad pontem auenarium Delfis pleuritide biliosa correptus erat, post vini ingurgitationem febre, validissima affligebatur, cum ingenti lateris dextri dolore ad superiores costas descendente, sputum subflauum vix sanguine tin-

ctum huicaderat, plurimumangebatur, inquietus erat, & subinde paraphrenitidem incurrebat, capite dolebat, vigilabat, manus tremulas habebat, ideo & venæ sectionem nolebat admittere, quamuis alia vice per venæ sectionem simili pleuritide laborans per me curatus fuisset. Secundo die cum ad eum accitus sum, venter illi satis copiose ex sero lactis soluebatur, decocta pectoralia præscripsi, adiectis syr. viol. & iunibino. locum dolentem in unguento resumptiuo, & ad sputum promouendum zacch. viol. exhibuimus, & diatrag. frig. At in quarto, cum venæ sectionem nollet admittere, & dolor non sedaretur, eundem cum vellem relinquere, tandem sectionem admisit: & vena secta ex brachio e directo loci dolentis, & sanguine copioso effluente, ad uncias fere octo satis nigro, melius habuit: quinto die peius. Sexto delirauit. Sed eadem postea copiose venter fluxit: plurimum & tunc augebatur, ut astantes agrum moriturum existimarent. Septimo tamen die facta est crisis periclitum, & totus croceus euasit: at post sudores & copiosas deiectiones vrinæ, cum sputa satis commode exirent, decimoquarto die sanus factus est.

SCHOLIA.

3 **Q**uod septimo die ictericus & postea totus croceus euaserit, bonum fuit signum: Nam & Hippocrates (ut etiam a Celso citatur libro tertio, capite 23.) pronunciauit post septimum diem febricitanti agro Regium morbum superuenire, tutum esse, mollioribus tantummodo præcordiis subsistentibus. Diocles ex toto, si post febrem oritur, confirmavit etiam prodesse: si post hunc febrem, occidere: Hic autem pleuritis, cum materia esset biliosa, citius terminabatur, cum eius terminus iuste sit 14. dies, ut alias dictum est, quamquā in Anaxione ad 34. prius soluta. Quod ad curationem attinet pleuritidis biliosæ, si feces sint induratae, molli clystere utimur, ex decoct. sa-
malua, beta, viol. hordei ad lb̄ j. cui adiungimus cassia, zacchar. rubr. an. ʒj. olei viol. ʒij. fabis. ʒj. misce. alioqui si enema abhorreat, ʒj. cassiæ propinamus, cum decoct. viol. borag. hordei mund. pass. & iuniba & sebesten, venam secamus, sed non copiose, ob bilem: hic autem, cum sanguis nigrior afflueret, ad ʒij. In pleuritide a bile post cachexiam, si ob imbecillitatem vel ætatem sanguis mitti non possit. Rondeletius leuiter purgat cum decocto aliquo vel iam dicto, adiecto syr. ros. solutiuo. Damus & syr. viol. cum aqua hordei, melonis aut cucurbitæ. Syrupus ex succo viol. magis lenit: & de cucurbita biliosi sanguinis feruorem exstinguit. Eclegmata quoque inspissantia in principio conueniunt supradicta, vel in hunc modum parata. ℞. syr. iunibini. viol. ana. ʒij. diatrag. frig. ʒij. zacchar. pensid. ʒj. misce. Topicis quoque remediis commode vumur, ut fotu ex decocto clystere, vng. resumpt. vel pectorali ex adipibus, adiectis oleis viol. & amygd. dulc. In statu vero quæ magis resoluunt, & in declinatione quoq; ut ad longum videre licet apud Arcula-

num & alios auctores. Nunc ad exemplum pituitosæ pleuritidis accedamus.

OBSERVATIO XXXVII.

De pleuritide pituitosa.

Mulier utcumque pituitosa, hyeme quoque asperissima, pituitosam pleuritidem experta est, cui dolor lateris sinistri paulo remissior aderat, non ita pungens, ut in præcedente, febris quoque mitior, quamvis continua & quotidie affligens: pulsus aderat paulo tardior ac mollior, sputum spumofum, viscidum atque album. Ad quam vocatus primo die, cum aluum non deponeret, clysterem iniiciendum præseribo, in hunc vel similem modum. *℞ foliorum malua, beta, parietar. mercuri. al. summitatum caulium. ana m. j. flor. meliloti. p. j. fiat decoct. pro ℥ j. in qua dissolvat cassia. ℥ j. Sacchari rub. ℥ ss. hiera picra ℥ ij. olei communis. ℥ iij. salis ℥ j. ss. fiat clyster.* mox fecibus eductis, eodem die per chirurgum venam secari iussit ad uncias sex ex vena media, cum basilica minus appareret in brachio sinistro. Postea & hunc syr. propinaui: *℞ syr. capill. ven. de liq. an. ℥ j. syr. viol. oxymel. simpl. ana ℥ ss. cum ℥ ix. decoct. pectoral. fiat iuleb. pro ij. dosibus.* purgavi holo sequenti. *℞ elect. lenitiv. ℥ vj. diacatholici ℥ ij. agarici trochis. ℥ ss. fiat bolus asperso sacch.* Ad expectorationem hoc ecligmatate prius utebatur. *℞ syr. capill. ven. ℥ ij. syr. de liq. ℥ j. Sacch. penid. ℥ ss. misce.* postea etiam utebar, *loch. de pino, & loch. sano, addito syr. de liquir.* Postea etiam ob materiam viscosam, syr. de hyssopo ad maiorem incisionem. Fotu quoque usus sum ad dolorem sedandum (qui potius grauior erat quam pungens) ex decoct. althææ, malua, flor. chamæmel. meliloti & scenugræci. commodè utebar postea & hoc linimento. *℞ olei amygd. dulc. chamæmelini, anethini, liliacei. an. ℥ ss. oxungie gallina. anatis, butyri recentis. an. ℥ ss. cera q. s. fiat ung.* quibus remediis hæc probe conualuit.

SCHOLIA.

In pleuritide curanda, ut iam ostensum est, aliter præcedimus, si ex sanguine bilioso vel aquoso fiat, aliter si a crassiore & viscosiore sanguine vel pituitoso. Ab his duobus humoribus pleuritis frequentior fit, rarissime vero a melancholico humore: a quo si fiat (ut etiam dictum est prius) raro aut nunquam curatur, & fere semper in tabem transmutatur, ut cuidam Petro Guilhelmo cuparum fabro Roterodamensi euenit, ex cuius ædibus, cum foris cupas igne torreret (ut moris est) sub tempore ventoso, ingens incendium ortum est anno 1563. 10. Iulii die, ut tertia fere pars urbis Roterodamensis conflagrata fuerit, unde coactus Delfos accedere: cui, anno 1566. mense Maio ad aqueam fossam decumbenti ex pleuritide a melancholia contracta, debili existenti, sanguinem ex vena basilica e directo loci dolentis extrahere feci, sed minus copiose ob debilitatem. Die vero sequenti cum ℥ j. elect. lenitiv. in bolo exhibuissem, aluum mediocriter deposuit: & locum dolentem inunximus vng. resumpt. & eclegmata ex conf. viol. borag. syrup. viol. & borag. & capill. veneris sumebat, quibus sputa, sed nigra, expe-

torabat, & statim bene habere coepit, ita, ut amplius mea opera sese minime indigere diceret. Quamvis nonio die rursus oborto insigni dolore me reuocauerit: qui cum nullo modo neque fomentis, neque aliis remediis sedari posset, iterum sanguis tractus est, sed niger & valde corruptus, idque in mediocri quantitate: a qua venæ sectione iterum melius habuit, & febris multo mitior facta est, & dolor fotu conuenienti post venæ sectionem sedatus: adhibitis etiam ecligmatibus, ad sputi facilitationem. Sed cum per decimum quartum diem non ex toto per sputum solueretur pleuritis, nullis deinde remediis iuuantibus, & cum melancholicus indies debiliior fieret, suppurationem metuebam, & tandem tabem. Et ita circa 20. diem purulenta exspuebat, & paulatim in tabem mutata est pleuritis, & tandem ad hecticam deuenit febrem, & mortem multo antea prædiximus, sub finem suborto vomitu bilioso ex atra bile fluxu ventris subsequente: & postquam sex septimanis decubisset, viribus consumptis, vitam finiit. Sed inter curandum præcipua quoque ratio habenda est symptomatum: qualia plerumque in pleuritide solent esse: vehemens dolor, sitis molesta, fluxus ventris, vigiliarum instantia, subeth, seu caros, anhelitus difficultas, mentis alienatio, aluius sicca, syncopis, calor ingens, fluxus sanguinis narium, alcola. In principio dolor lateris aliquando fotu tollitur, qui si non iuuat, sæpe venæ sectione prodest. Sic ego memini textoris cuiusdam Alcmariani, cui agnomen Spanckius erat, viri, si quis alius, voracissimi: qui circa annum ætatis suæ trigésimum sextum, in pleuritidem sæuissimam incidit, cum febri acuta putida, ita ut etiam vermes deiceret. Cum dolor ingens esset, quarto die prius accitus sum, & sponte aluum deiciebat, & tonsor, cum plenilunium esset, & luna in Geminis denoueretur, venam minime secare audebat, nos tamen sanguinem extrahere iussimus in magna copia: a qua sectione venæ dolor sedatus est: & aliis præsidiiis vtens commodis, 14. die curatus est: quanquam ad tempus a sectione venæ brachium rigidum permaneret, quod tonsor putabat factum ob lunam brachium respicientem. In morbo vigente, Astrologia locum non habet. Verum post ea rigiditas illa fotu cessauit. Quidam etiam hic utuntur cucurbitula, sed post septimum diem, si eodem modo dolor persistat: Et sic Aetius cucurbitulam lateri affigit: manifestissima enim in pleuriticis (ut ipse refert) utilitas ex cucurbitula appositione apparet. Celsus vero ubi lenior siue ventustior fuerit lateris dolor, ad cucurbitulas confugiendum esse (ante summa cute incisa) præcipit. Verum, ne in errorem incidamus, in cucurbitularum adhibitione, seruanda erit Alexandri sententia: qui dixit commodius & tutius esse hac vti curatione, in quibus parua copia est vacuanda, nam per eam, quod in affecta parte continetur, ex alto extrahitur: atque hoc facto mirari licet, quomodo inde etiam dolor, qualiscunque fuerit, licet vehementissimus, conquieuerit, ut neque fomento neque alio præsidio indiguerit. Sic ego in alio

5
Symptomata, qua in pleuritide oboriri solent.

6
Cucurbitula.

7
Sanguis e
naribus flu-
ens quando
restringen-
dus quando
non.

8
Dolor late-
ris tussis &
difficultas
anhelitus
quando per-
seuerant ex-
purgata ma-
teria, pessi-
mum est.

Siti, vigilia
& paraphre-
nitidi quo-
modo suc-
currendum.

9
Cavos.

Aluus astri-
cta.
Aluus nimi-
um fluens.

in alio quodam textore, octauo die prius accitus, non in loco affecto, sed in naribus cucurbitulis, cum scarificatione vsus sum: cui in principio vena secta fuerat per alium medium in brachio opposito, & nunc in debili viro existente cucurbitulas admoui, qui & in ii. concocta exspuebat, & in i. sanguis e naribus fluxit, & curatus fuit. Is quidem sanguinis fluxus criticus cum esset, nullo modo erat restringendus, nisi admodum excessisset: idem, etsi non sit criticus, sed propter exuberantiam sanguinis confert: imo si non satis excerneretur, venæ sectio utilis esse posset. Propterea si in die critico fiat, post signa coctionis, ut hic, bonum presagit, nec inhibendus, nisi vires ad extremum deiceret, tunc restringi potest: & quando fit ex vehementi abullitione, cum exstringentib. & ebullitionem sedantibus inhiberi poterit, ita tamen ut non compingatur materia, & sputum inhibeatur. Si in principio contingat, ex multitudine materię a natura regulatę, & anhelitus inde minoretur, & febris vehemētia cesset, utilis quoque esse potest, ut non sit inhibendus: si contrarium eueniat, & symptomata non alleuientur, contingit plerumq; ægrum mori in quarto. Verum quod ad dolorem lateris attinet, si is, tum tussis, & difficultas anhelitus, cum expurgatur materia, vel cum iam ad maturationem deuenierit, & ad saniem reducta fuerit, perseuerent, vel augeantur, pessimum signum est. Nam in principio minus timorem incutiunt hæc: neque in generatione puris aut sanici, quando dolores & febres magis accidunt, ut Aphorism. Hippocrat. habet. Sed in aliis temporibus declarant materiam esse corrosiuam, & valde prauam ac malignam: & tunc festinandum est ad mitigationem horum symptomatum in causis calida, cum syr. viol. & aliis, quæ ad tussim valent. & embrochis, & fotibus dictis, cum oleo amygd. dulc. viol. & ping. gallinæ & similibus in frig. addemus aliquid olei lilior. prout causa exigit, cum anodynis quæ dolorem mitigant. Sitis exstinguitur cum aqua hordei, citrulli, melonis, cucurbitę, peponis, ut de siti dictum est: Vigilię cum syr. viol. pap. nenuph. & inunctionibus sape dictis: cauendo tamen stiptica etiam in paraphrenitide: & sic potius vtemur iis, quæ materiam auertunt: ut sunt frictiones extremorum, & lotiones: de quibus vide Mesuem. Caro seu subeth occurritur odorando acetum, vel tempora & frontem aceto liniendo, clysteres quoque & frictiones fortes, & vincula iniecta, & ventosa scapulis appositę profunt. Si aluus stringatur, lenientibus clysteribus mollienda: aluus si nimium fluat, considerandum nunquid in principio morbi sit: quod duobus modis euenire potest, aut ex multitudine materię natura fluxum regulante (ut ita dicam,) neque tunc ut de fluxu sanguinis narium dictum est, restringi debet: nam ex tali fluxu sequitur anhelitus facilitatio & febris delitescētia, & ideo non est malus. Aut est propter multitudinem materię, præter hoc quod regulatur a natura: imo est (dicente Arriano) sicut regurgitans, & malus est, præ-

sertim cum non sedatur per ipsum difficultas anhelitus, & febris inflammatio: tunc enim forte superuenit mors in quarto vel ante: neque hic est restringendus, nisi modum excedat, sed potius obuiandum erit malę qualitati humoris, siue occulte siue manifeste impediētis naturam, ut regulare non posset: & natura seu virtus ipsa fouenda ut non cadat. Si vero acciderit fluxus in fine morbi, aut morbo procedente, talis quoque secundum alterum dictorum modorum, aut criticus expellens id quod noceat, vel separans id quod bonum est post debitam coctionem: & subsequetur ægri salus ac incolumitas, neque est restringendus, nisi mensuram excesserit. Vel accidit ex debilitate membrorum naturalium, videlicet contentiuz & digestiuz virtutis deiectione atque prostratione, quem & mors subsequitur. Cui subueniendum roborando vtramque virtutem per interius assumpta & exterius admota: ita tamen ut hæc ipsa non inhibeant sputum, & ita conuenit syrupus myrtinus, & topica adstrictoria super ventrem. Si in principio contingat, & magnus sit, præscribemus portiones, quæ neque ventrem irritant, neque expectorationem impediunt, ex decoct. hordei, ex sem. 4. frig. maior. anisi cum syr. capill. ven. & myrtini. Et ita quoque in principio, si vires debiles sint, neque sanguis demissus est, abstinēbimus a potionibus, & topicis remediisq; ventrem roborabimus. Quod ad syncopen attinet, diligenter considerandum, qua ratione contingat: nam potest euenire, quod rupto apostemate vel abscessu nondum maturo, acuitate materię, vel eius multitudine rumpatur, ubi sit collectio, & ad cor materia subito ruat: ac tremorem & syncopen inferat, & æger ille intra diem moriatur, ut aliquando scetauimus, quemadmodum etiam narrat Guainerius, duabus nobilissimis matronis euenisse, sed hæc ad transmutationem pertinent, de quibus suo loco. Vel contingit ex virtutis debilitate: cui subueniendum exhibendo modicum vini dulcis lymphati, cum aqua hordei vel cum iure restaurante. Si vero fiat raptus humorum aut vaporum ad cor, auersiones imperandę, frictiones, vincula, tum alia superius dicta: & cor roborandum, ac spiritalia membra odoribus bonis reficienda, quæ & propriis capitibus de syncope desumenda. Si materia ad caput repat seu nervos, adhibendę frictiones in latere contrario, clysteres iniiciendi ad auersionem. Si nervi dolere incipiant, vel contrahantur, inungendi sunt oleo chamęm. lilior. vermium terrestrium, & lana succida inuoluendi. Si aleola ex vapore febrili & humore putrido, vel ex pectore membrisque spiritalibus sursum sublatis vaporibus, vel ex pulmone contingat, iisdem vtere, quę capit. De aphthis dicta sunt: valde stiptica interim cauendo, ne iis sputum impediatur, quod multo aphthis deterius esset. Lac in ore detentum, vel gargar. statum, quo nos vtimur, conuenit & gargar. iuxta decoct. iuiubar. diamor. & similib. quę & aphthis profunt, neque sputum retinent. Hæc satis dicta sint de accidentibus corrigendis in pleuritide. Nunc ad alia eiusdem morbi exempla progrediamur.

10
Syncopi qua-
modo suc-
currendum.

11
Si materia
in caput vel
nervos irru-
at, quod fa-
ciendum.
Quibus ale-
olis prospici-
endum.

12

OBSERVATIO XXXVIII.

De pleuritide in prægnante curata.

I Idum est prius, morbos acutos in prægnantibus esse periculosos: attamen præter prægnantes paulo superius dictas, Maria Theodori, vxor illius Isbradi Chirurghi loripedis Alcmariani, mihi familiarissimi ac coætanei, in quarto mense prægnans, pleuritide sæua correpta, per me in hunc modum curata fuit. Hæc cum sub finem mensis Septembris, anno 1555. pleuritidem veram incurrisset, antea per duos dies, cum puerum e terra subleuasset, in dorso dolorem patiebatur: maritus dislocationem in lumbis esse suspicabatur, quamquam dolor paulo post euasit, licet ab eo tempore urinam tinctam meieret sine febre, neque decumberet. At peractis duobus diebus, febre acutissima cum dolore lateris dextri admodum pungente corripit. Atque omnia illa aderant, quæ in vera & sæua pleuritide adesse solent: difficultas anhelitus, dolor punctorius, tussis valida, & pulsus ferrinus. Ad eam ingressus, oleo amygd. dulc. chamamel. & anethino locum affectum inunximus, & sacculum ex floribus chamomillæ & sale tosto apposui, cum & ipsa tam maritus ventositatem esse existimarent. Verum cum iis dolor non sedaretur, secta vena basilica eiusdem lateris in cubito, scilicet dextro, ad uncias fere sex, cum niger efflueret, & inter fluendum dolorem mitigari diceret, dolor plurimum sedatus est: ita ut deinde post tres horas in suauem somnum inciderit. Secundo die, cum reuersus essem, dolor lateris ex parte sedatus: parum exspuere cepit: unde ego morbi breuitatem expectabam, ex Aphorism. 12. lib. 1. Si sputum statim appareat, morbum breuiat. Quare & ad sputi facilitationem, & febre, decoctum sequens præscripsi, cum satis per se aluum deponeret. *℞. violar. borag. bugloss. hordei mundati, an. m. j. scabiosæ m. β. rad. bugloss. liquir. an. ʒj passul. ab arill. repurgat. p. j. coquantur in aqua communi pro lb j. Zaccharo dulcoretur.* Interea & ex hoc eclegmate sumebat. *℞. syrup. in iubin.* (erat mulier imbecillis, propria natura biliola, & raræ texturæ) *ʒj. syrup. de liquiritia, Zacchari penid. an. ʒβ. misce.* & in ore tenebat, sæpius deglutiendo, ad tussim, Zacchar. candi dictum. At cum post meridiem reuerterer, rursus dolor lateris auctus est, ac febris inualuit: nec aluum deposuit, nisi glande irritata. Fotum pro loco affecto præscripsimus cum spongia. *℞. rad. althæe mundat. ʒj. β. folior. viol. malue cum toto, flor. chamomill. meliloti, ana m. j. coquantur in aqua, & fiat fotus:* quo dolor iterum egregie sedatus est, & melius exspuebat. Nutriui eam pomo affato dulci, zaccharo aspero, sub noctem ne fœtus deficeret. Optime habuit ad mediam noctem; sed deinde inquieta, parum dormiuit. Tertio die sputum, quod in paropside reserpatum erat, album & quasi coctum apparebat, & bene exibat. Sed mox agitationem quandam circa præcordia pectusque & angustiam sentiebat, cum anhelitus difficultate & calore intenso. At urinam copiosam sed croceam instar ictericorum emisit, pannum lineum

valde tingentem, ex hepatis calore & bilis ebullitione (de qua relatus in scholio:) ideo tabulæ præscriptæ sunt. *℞. specier. diatr. frig. absq. camphora ʒij β. specterum trionfan. ʒj β. dissoluta in aqua cicbor. & vngulæ caball.* (tam pro hepatis calore, quam sputi facilitatione) & aqua viol. adiecto zaccharo albiss. q. s. fiat confectio in tabulis. Quarto die melius exspuebat. Mane iterum fotum utebamur; post meridiem eo abstinens, cum calor febrilis vehementior esset. At nocte præcedente quartum diem decretorium (licet dolor lateris cessaret, sed dolore magis crescente circa pectus) & circiter horam decimam noctis cum angustia & sputi incrassatione, symptomata adeo increuere, ut astantes illam morituram putarent, atque me in scio sacra inunctione eam more solito munirent, licet antea prædixeram, noctem illam, diem decretorium præcedentem, grauiorem fore. Ceterum post mediam noctem sudor irrupit per pectus primo, deinde per totum corpus, quasi vniuersalis; a quo alleviabatur, ita ut mane optime dormierit, & melius habuerit. Quinto die plus tussiebat, sputo non nihil retento ob sæuora accidentia pregressa: sed pectore inuncto vnguento pectorali, & sæpius exhibitio syr. de liquir. melius exspuere cepit & concocta. Verum cum aluus non responderet, balneo feces emisit, & decoctum sequens sumit. *℞. glycyrrh. rasæ ʒβ. folior. viol. malue cum toto, borag. bugloss. hyssopi, ana m. j. sem. anisi ʒj β. prun. damasc. dulc. num. ix. vuar. passul. ab arill. repurg. p. j. fiat decoct. in sero lactis, & colatura Zaccharo candi dulcoretur.* quo sumto bis excreuit liquida. Sed cum ob serum lactis, ut illa existimabat, nauseam haberet ac vëtris tormina, metuebat abortum: ideo amplius non exhibuimus. Post secessus dictos melius habere cepit. At a meridie, me in scio, comedit tria vel plura cochlearia lactis cum oryza. pectus inde constringebatur: sed eius usum inhibentes, sorbitiunculas & poma affata concessimus; & denuo sputa melius exhibant. Sexto die copiose minxit urinam croceam, febre magis inclinante. Dietam auximus ob fœtum, & syru. liq. lambibat, pectore inuncto cum vngu. pectorali; & vrina postea minus tincta videbatur. Septimo melius adhuc habuit, & vix febre sentiebat & cessauit difficultas anhelitus, mox & lateris ac pectoris dolor. Tunc ad ius veruecis, cum pulli ius abhorreret, deuenimus, optima hypostasi in vrina apparente, etiam minus tincta. Octauo die febris, quasi nulla fuit, vrina minus tincta, valde crassa & subsidens: bene exspuebat, & sponte aluum deponebat, & excrementa naturalia spectabantur. Nono die sanitati perfecte restituta est.

SCHOLIA.

Pleuritis in prægnante, ut ante dictum est, non sine periculo est, quamuis hæc euaserit: cum & Hippocrat. prædixerit mulierem vtero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, lethale esse. Causam huius declarat Galenus in Commento. Sed sanguine emisso (qui tamen, Hippocrate teste, Aphorism. 31. lib. 5. facile abortum facit) melius habuit

habuit, cum & secundum eundem, & in quarto mense purgatio, imo magis sine periculo (vt alias ostensum est) missio sanguinis cōferat. Et quamquam hic vrina crocea in tertio iſteritiam notabat, non tamen illam, quæ totum corpus inficit colore croceo, sed tantū vrinam ex calore hepatis, non tamen ex inflammatione aut apostemate hepatis, nam nullus tumor durus aderat, & ideo hæc iſteritia non fuit ita iudicatoria, cum totum corpus non tingeret, sed potius ex calore hepatis: neque fuit ex tumore aut obstructione, quia subito venerat, cum nec tumor exterius sentiretur, neque grauitas aliqua circa hepatis regionem. Dolor enim lateris, qui aderat, ad mammillam dextram tendebat, deinde ad partes superiores. Vnde quoq; non fuit tanta inflammatio in hepate, aut apostema, sed potius ebullitio caloris, quæ vrinam tingebat, vel si velimus vrinam illam fuisse criticam, id quidem potest esse: nam nos alias diximus in obs. nostris de febris, etiam iſtericos ante septimū in febr. euasisse. idem testatur & Amatus centur. 3. cur. 49. Ideo neq; ille Aphorif. 62. libr. 4. superficiei tenus intelligendus est, quod ante septimum iſteritia accedens mala sit. De his vide loca citata. Sed hic aliquis dicet: quomodo vrina flaua, & sputū album? potest pleuritis commixta esse cum calore hepatis & ebullitione bilis in ipso fonte: vnde vrina solum tincta. Sed sputū in pectore non flauum erat, cū ibi bilis non multa esset, vt sputum suo colore inficeret. At mulier cum videret lotium ita citrinum, metuebat sibi mortem, cū pater iſtero obiisset, & mater pleuritide, & duo fratres ex phthisi. Sed sputo bene exente, illam optime sperare iussimus, & ita nono die absque abortu quoque, de quo etiam metuserat, fuit curata.

OBSERVATIO XXXIX.

De pleuritide in peripneumoniā conuersa: & quomodo ea fuerit curata.

PVella famulā agens, annos 23. nata, admodum robusta, nigriuscula & bene carnosā, febre cū horrore correpta fuit, quæ quidē acuta & continua erat: in latere sinistro cum doleret cū tussi, & vix pauca exspueret, & pulsus duriusculus esset, & primo die dolor neq; vehemens esset, sed secundo die magis & punctorius, accitus secundo die cum per se excrementa deposuisset, in cubito sinistro basilicā tundere feci, sanguine ad vnica octo extracto: quo & dolor, cū vera pleuritide affecta esset, non nihil sedatus est, & anhelitus paulo liberior factus. Interea & vnguento resumpto locus affectus inungebatur, & commoda lambitiua sumebat. Tertio die accidentia dicta magna ex parte fuere sedata, quāuis capitis dolore afficeretur, & minus dormiret. Tempore inuncta fuere vnguento populeo, & oleo nymphae commixto: & hordeatum ad nutritionem exhibitum. Quarto die dolor lateris iterum vehementior, febrisque validior cū maximo aestu totius pectoris. Sed rursus latere inuncto, dolor non nihil mitigatus est, qui & pectus magis inuasit. Tunc & liquida per se exercebat. Quinto dolore lateris pectorio cessan-

te, & cum parum exspueret, pituitosum quid ac subflauum in principio vix cruentū: febris postea aucta est, & anhelitus difficultas increbuit, malæ ac oculi rubere incipiebant, & dolor grauans totum pectus occupauit. Sexto die in pectore grauiora omnia sensit, pulsu vndoso, vt pleuritidem in peripneumoniā conuertendam conicerem, cum & cogeretur in dorso iacere, minusq; in latere materia ad pulmonem reperet, cum & sputum cum murmure quodā ex pectore prodiret. Quinto die lenitiuū medicamentum cum decoct. pectorali exhibitum: quo satis aluum deposuit. Septimo die, vt prædiximus, pleuritis in peripneumoniā commutata est: & cum aluum non redderet, balano imposito excreuit. Octauo die pessime habuit, grauissimis accidentib; oppressa: vigilabat, noctem inquietam egit, non nihil delirabat: pectus inunctū oleo amygd. dulc. & liliaceo, eclegmata sumta & decocta pectoralia ebibita. Nono die quamquam sputum vtcunque expelleretur, post meridiem pessime habuit, sacram synaxin sumit, & pro deplorata habita est. Sub noctē tamen, cum redirem, pulsum altum reperi & valde inæqualem: horrorem quoq; sentiebat in lumbis & circa inguinā & imum ventrem: delirabat, plurimum angustia afficiebatur. Ego vero sperabam crisin futuram (vrina concocta apparente prius, nunc perturbata & nigriuscula, qualis pleurique meitur cum menses expectantur, sputo quoq; concocto exente, quāuis cum maiori molestia) per merstruas purgationes, quod equidem euenit: nam nocte subsequenti aperti sunt menses, & largiter fluxerūt, & paulatim anhelitus difficultate cessante, ac tussi delitescente, & febre emanefcente, 14. die, magno cum nostro honore, sanitati restituta est, non solum a pleuritide maligna, sed etiam a pulmonia, mensibus largiter profusis, neq; minus miratu dignum erat, cum etiam sanguine per nares effluente, præter mentem medicorum, quædam lethales peripneumoniæ (teste Aetio) sanatae fuerint.

SCHOLIA.

Pleuritis quandoq; in peripneumoniā transit, modo subito, vt in hac puella contigit, quum scilicet humor facilis est ad motum, & pulmo ad sceptionem aptissimus, modo paulatim id fit, quando scilicet contraria ad sunt, vbi vero transit pleuritis in peripneumoniā, ex Galen. quarto de causis pulsuum, dolor cessat lateris. Et licet pulmo sit insensibilis, sentit grauitatem quandam æger circa pectus, & durities & serrinitas pulsus cessat, & fit mollis, & inæqualitas maior euadit, quia materia colligitur in membro magis cordi propinquo: & ideo magis opprimitur virtus, constrictio anhelitus angetur, febris increfcit, & accidentia peripneumoniæ succedunt, de quibus etiam latus capit. proprio, D. pulmonia dicemus. Et quamquam hæc nostra puella euasit, plurimos ægros vidimus succumbere, vnde etiam recte dixit Hippoc. Aphorism. 12. libr. 7. a morbo laterali inflammatio pulmonis, malum. His enim didicis, inquit Galen. in commento, Hippocrates

4
Quomodo pleuritis transit in peripneumoniā eius nota.

Peripneumonia ex pleuritide succedens mala.

5 innuere voluit, peripneumoniam vehementiorem & maligniorem morbum esse pleuritide: nam morbo lateris recedente inflammatio pulmonis malum: fit enim transmutatio ad maiorem & periculosiorem morbum, quia pulmo propinquior cordi locum obtinet quā pleura, & maiorem colligatiam habet pulmo cum corde, cum magis spirationi deseruiat, & ob hanc causam pulmo inflammatus magis lædit cor, quam pleura, dicente Galen. 4. de prasag. ex puls. cap. 2. Celerrimā cordi & omnium maximam noxam dat pulmo, & maiorem difficultatem spirandi efficit, & maiorem angustiam inducit, teste Galen. 4. Aphor. comment. 34. & ita siue pulmonis inflammatio laterali morbo superuenerit, siue laterali morbo abeunte, ipse in pulmonis inflammationem transmutetur, semper malum est: quamuis peripneumonia in pleuritidem minus mala est. Difficulus tamen Galenus admittit peripneumoniam in pleuritidem conuerti, quod priusquam materia a pulmone in costas transeat, æger strangulatione pereat, attamen fieri posse, quamuis difficulter, idem admittit 7. Aphor. 11. de qua re ad longum videas Benedictum Fauentinum præceptorem meum. Ceterum quomodo peripneumonia curetur, postea dicturi sumus, cum de pulmonia & inflammatione ac peripneumonia agemus: volunt autem quidam eodem modo curari ut pleuritis, nisi quod magis sputum subtiliantia sint exhibenda in pulmonia, & maior sollicitudo in mūdificando sputum: & medicamenta, iuxta Auicennam, quæ exterius admoventur, magis in profundum transeant: de qua re, vide Arculanum & alios auctores, & sic si ad pulmonem pleuritis transeat, peripneumoniam curationi intendendum. Interea, quod ad advenæ sectionem attinet, si peripneumonia ex pleuritide accidat, si in principio pleuritidis sanguis sit detractus, & timeatur magna debilitas, tunc venæ sectio non erit iteranda, vel si ab alio chronico morbo, vel ab angina aut pleuritide fiat iuxta Rhas. 4. Continentis, & Paulum & Gradum supra Rhasem, & commendant tunc potius clysteres & cucurbitulas cum scarificatione supra pectus, de quibus videas Arculanum, Valescum & alios auctores, quamuis, ut alii sentiunt, si in principio non sit demissus sanguis, & vires adhuc constent, vel in principio non satis extractus sit, in sanguinea extrahi poterit. In hac famula abstinuimus a secunda sectione, debili existente, & in affectu frigidiore, & hyberno tempore. Quod ad reliquam curationem peripneumoniam attinet, postea dicturi sumus. Nunc & pleuritidis exemplum adferamus, quæ ad suppurationem peruenit, & quomodo illa ipsa curata sit.

OBSERVATIO XL.

De pleuritide conuersa in suppurationem.

1 Scribit Fernelius doctissimus, ex destillatione quæquam in veram pleuritidem posse incidere: quod equidem filiæ Iodoci Berendrechtii annuū 14. agenti euenit, admodum gracili, extramurum habitanti Delis, cum septimus dies esset, quoq; laterali morbo correpta esset, antequā ad eam

accitus essem, & sputa vix exirent ob debilitatem, sanguinem in puella prius valetudinaria & longa tussi laborante, mittere non ausi fuimus: & cum dolor neque fotu, neque linimentis & aliis commodis remediis non recederet, neq; resolveretur, & in loco fixo maneret, mihi suspicionem præbuit futuræ suppurationis, cum febris ac dolor augerentur, & etiam in aphthas incideret. Quare ad promouendam suppurationem, emplastrum præceptoris mei Benedicti Fauentini ad maturationem faciens, in eius Empirica descriptum, ut loco affecto apponerent, consului, quod ex foliis maluæ cum radic. viol. & radice althææ ac lilior. alb. & enulæ ac flor. chamomill. & meliloti constabat, bullitis ac colaris, & adiectis farina scænuæ græci, frumenti, & in fine exiguo fermenti. pingued. porci, butyro, & oleo communi ad impingandum emplastrum & decocto ficuum, vuar. pass. liq. rad. maluæ, althææ, intus vtens, zaccharo adiecto: tum aliis commodis remediis post quatuordecim diem: dein aliquot diebus interiectis, dolor coepit sedari, & erosa membrana ac perrupta sanies non admodū multa in pectus collecta est: tandem cum aptis remediis saniem expurgantibus ante quadragesimū diem curata est, pure paulatim per bechica medicamenta & eclegmata excreto, ut in tabem non transferit, consului statim ab eruptione, ut ter quaterue in die naturali aquam hederæ terrestris (post decocta hordei, mellis ros. syrup. viol. & infus. ros. communium, & alia eclegmata pectus repurgantia) ad 3 iij. pro vice sumeret, id enim, iuxta præceptorem meum loco citato, disruptum apostema pleuriticum a sanie repurgat, ne ex empyemate in tabem æger incidat.

SCHOLIA.

DICTUM est prius, si pleuritis in 14. diebus non resoluatur in sensibilibiter, vel sese mūdificando per sputum, tunc transit in suppurationem, iuxta Aphor. 8. lib. 5. Quicumq; morbo laterali laborantes in 14. diebus non repurgantur, ij ad suppurationem vertuntur: materia enim artis beneficio vel nature si non absoluat, in pus vertitur, atque erumpens pelliculam intrinsecus costas tegentem in thoracis cauitatem intrat, & aliud genus morbi gignit. ut Galenus tertio, De caus. pulmonum, cap. 7. & 5. De locis affect. cap. 2. & constit. artis medica. & 1. Aphor. 12. plenius enarrat: licet rarius materia forte ante collectionē vel melius post collectionis ruptionem, de fluens per vesicam vel ventrem exoneretur: quemadmodum etiam enarrat Amatus centur. 3. curat. 64. de quodam mercatore Arimensi, qui pleuritide affectus per lotium saniem quinto die emisit, & in septimo a pleuritide euaserit: Idem Beniuenius narrat de abditis rerum causis. cap. 43. de quodam Antonio, in quo cum pleuritis ad maturationem peruenisset, euacuato per vrinam pure, penitus sanatus est. Sed hæc in suppuratione raro contingūt, cum potius per sputum expurgentur. Ideo pleuritici post collectionem membrana dirupta, nisi in 40. diebus (iuxta Hippocrat. libr. 5.

Quomodo pleuritis transeat in suppurationem.

4. *Signa suppura-
tionis futuræ.*

*Quæ pleuriti-
des magis sup-
purantur.*

5.

lib. 5. Aphor. 8. & Galen. locis iam citatis) per sputum repurgentur, in tabem transeunt. Ideo diligenter signa notanda, quæ suppurationem futuram indicant: si enim dolor fixus in loco manet, (vt in hac nostra puella continebat:) vel etiam incendatur vna cum febre, haud exiguum indicium est futuræ suppurationis: sputum præterea non ita procedit in pleuritide, quæ suppurari debet, aut pauca omnino est, quod excernitur, illudque maxime sanguineum, nequaquam vero malignum: & ita magnæ pleuritides & proprie sanguineæ magis suppurantur, & pituitosæ minus. Non desunt tamen alii, vt Gradus, qui etiam volunt in frigida sæpe suppurari. Vnde hæc pleuritis a destillatione orta, licet magis ab humore pituitoso: credo id euenisse ob falsedinem in pituita admixtam, & acrimoniam habente. Vnde corrodibat membranam, & licet materia pauca, citius rupturam fecit: nam circa septimum diem a collectione, ex signis prædictis, suppurationem metuimus: & huius coniecturam fecimus ex Hippocrate 2. prognost. tex. 52. sic dicente: Si dolor perdurat, & nullis auxiliis sedatur, nec etiam naturæ ope per sputum, expectanda est suppuratio. Intellige, si nihil exitiale appareat, puta nec vires inuvalidæ, nec alia signa praua: sic enim mors esset expectanda. Ratio est, quoniam collecta est plurima materia in parte, quæ etiam, cum non posset a natura educi per conuenientes vias, abscessum per faciliores partes molitur, discumpitque membranam, nisi dicas dirumpi multitudine & acritudine humoris distendentis, & eam erodentis. Nam in ea, quæ ite solui debet pleuritide, semper excernitur, & excretio multo amplior fit indies, adeo vt multo plus excernatur quàm influat. At in hac, seu nihil excernitur, seu exiguum præ multitudine, necesse est multum colligi, & tandem dirumpi. In hac nostra puella 7. die a collectione, facta est: neque mirum, cum & Iacchinus meminerit se vidisse aliquando in tertia factam præ influxus multitudine, & cum in præcedente morbo vis esset inuvalida, præfocatus cito periit. At nostra hæc puella licet prius destillatione affecta facilius in tabem transisset ex suppuratione, tamen ante 40. diem repurgata, aptis præsidiiis curata fuit, neque in tabem transit. Ideo non reseruatur tota materia, quæ ad collectionem deducitur, ad vnâ criticam expulsionem, vt quidâ putarunt: verum aliquando pars materiæ per tempus sensibilibiter resoluitur per sputum, postea alia pars collectionem facit: & ubi iam rumpitur abscessus, paulatim etiam per sputum excernitur, & repurgatur intra 40. dies, & si non perfecte repurgetur, tunc fit tabes. Quum vero iam fit suppuratio, certa adsunt indicia ex rigore, qui necessario omnes internarum partium suppurationes comitatur. Pulsus præterea suppuratorum in his apparere incipiunt, qui prorsus conspicui sunt, dum facta suppuratio est: quam monstrant & dolor qui minuitur, & febris & respiratio, & virtus. Principium autem collectionis habetur ex vehementia doloris & difficultate anhelitus, & con-

6. *Qualia signa
adsunt cum fit
suppuratio.*

*Principium
collectionis.*

strictione eiusdem ac febris vehementia, & vigiliis, mentis permixtione, & grauitate, quæ in loco sentitur, & adest tunc tussis sine sputo, ob materiæ inobedientiam, & velaminis spissitudinem, & virtutis debilitatem. Eadem fere habent & Hippocrates & Gale. 2. Prognost. & Alexander Trallianus cap. De purulentis. Nam dum pus conficitur, dolores, ac febres accidunt, magis quam iam confecto, ex eiusdem Hippoc. sententia, Aphor. 47. lib. 2. Adest & tunc grauitas pectoris, tussis valida & sicca cum dolore, vt in hac puella erat, aliquando etiam cum humiditate, ob quam releuari quoque videntur, vt Paulus refert. Verum licet confecto pure & febres mitiores & dolor fierent, tamen instante tempore disruptionis ipsius vehementius cum horrore iterum febricitant, ac in sermonis proprietate conturbantur, offendunturque spiritu (quod huic puellæ 11. die circa noctem fieri astantes narrauerant) adeo vt difficilius quam antea spirent, ex eiusdem Pauli testimonio. Sic & Auicenna inquit: Cum rumpitur apostema, accidit tremor diuersus, & dilatatur pullus cum diuersitate sui, scilicet fit tremor diuersus ab eo, qui communiter in principio paroxysmorum fit: nam qui in principio paroxysmorum euenit, totius corporis communis est: qui vero sequitur rupturam, fit solum circa membra vicina abscessui, ad quæ materia saniosa effunditur: aut fit propter punctiorem & acuitatem materiæ, & eo tempore cadit virtus, & debilitatur anhelitus, & multoties accidit febris vehemens, & hoc propter dolorem aut materiæ mordacitatem. Et hæc ruptio fit vt plurimum in pectoris concauitate: vnde sæpe fit empyema, de quo postea: nunc autem aliud exemplum pleuritidis in suppurationem conuerſæ adferamus.

7.

*Signa disrup-
tionis abscessus*

OBSERVATIO XLI.

*De pleuritide in suppurationem lethalem con-
uerſa, cum variis symptoma-
tibus.*

PLEURITIS quæ in suppurationem tendit, quam periculosa sit, iam diximus, & quibus notis deprehendatur, si 14. die non resoluitur, etiam enarrauimus, & signa quoque eruptionis in pus conuerſæ enucleauimus, & quod ad tempus eruptionis attinet, illius suppurationis, quæ fit a natura & non arte, plerumque fit septimo die, scilicet, a principio collectionis, vt in puella præcedente euenit. Sed est ex iis, teste Auicenna, & qui eum sequuntur, quæ raro euenit: & addit, quod plurimum vsque ad 20. & 40. & 60. tardetur: quod & neoterici sequuntur. Idem voluit Hippocrates 2. Prognosticorum textu 57. cum ita dicat: Aliæ suppurationes fere rumpuntur 20. die & 30. & 40. & ad 60. diem deueniunt. Sed de his latius in scholio. Sic istis diebus, anno 1587. 23. Iulii ad mulierem prægnantem in septimo mense accitus sum, sæuissima pleuritide correptam, annos circiter 30. natam in foro Delphis habitantem, cui cum chirurgus purgationem fortem adhi-

2. buisset, adeo aluum deposuit enormiter cum torminibus & vomitu, ut abortus metueretur: ad quam post octauum diem, cum pleuritide sua correpta esset, accitus, adeo debilem eam inueni, ut ilico illam morituram astantes putarent, & abortum subsequuturum. Sectio venæ in hac prætermissa erat, neque nunc ob fluxum & debilitatem ea uti nobis tutum videbatur. Dedimus autem amygdalarum, ad foetus nutritionem & virium refocillationem, & syrupum myrtinum, qui pectori conuenit & sputum non impedit, viribusque paulatim refocillatis, sputum utcumque exscreabat. Sed dolor lateris neque lii inuentis, neque aliis anodynis sedari potuit, & cum fluor alui aliquo modo cessasset per amygdalata, semper tamen peius habuit, febre magis crescente, & dolore aucto: ita ut cum post 14. diem pleuritidis non resolueretur, de suppuratione metus fuerit, cum vehementius semper febricitaret & siti afficeretur, noctesque insomnes ageret, postea similiter & deliraret, ac in aphthas incideret, & sputum minus exiret, collectionem faciens. Varia remedia, prout accidentia postulabant, præscripta sunt. Pro siti enim & febre bibebat ptisanam vulgarem ex hordeo mund. glycyrrhiza confectam: & pro somno utebatur hordeato cum semin. 4. frig. maioribus mundatis concinnato, zaccharo perlato addito ad saporem delectabiliorem: & pro febre iulebos accepit ex decoct. hordei mundati, adiecto syrup. de limonibus & iuiubino, & viol. & pro inflammatione gutturis, cum aphthæ metuerentur, lingebat syru. granat. & diamorum cum baculo glycyrrhizæ & gargarismata apta, ex decoct. viol. bellid. minoris, & hordei communis ad maiorem absterisionem, & visus pass. & semin. coton. præscripta sunt: quibus & syrup. granat. adiciebatur, & latus inungebatur vng. resunt. & oleo viol. primo: postea, cum ad collectionem tenderet, adieciimus magis maturantia. Pro sputo, quia valde febricitabat, syrup. iuiubinum, & viol. lingebat frequenter, & cum aluum non redderet, hac leni purgatione, vel potius lenitione, vti sumus, ne sublequeretur abortus. *℞. diaprun. lenitiui, seu simplicis, ʒ ij. pulpa thamarind. recentis extracta cum aqua malua ʒ ij. syrup. ex infus. ros. ʒ ss. aqua cichorii ʒ ij. ss. misce*, quo probe aluum deponebat. Et quia valde dolebat in lumbis, ne fieret abortus, inunximus vnguento ros. Si aluus paulo durior esset, & nihil excerneret, glande ex hiera, melle & sale irritabatur. Pro dolore lateris, præscriptimus forum ex rad. althææ mund. foliis maluæ, viol. florum chamomil. meliloti, semine maluæ, & similibus: sed antequam apponeretur, horrore affecta & valde delirans & febricitans, facta est eruptio collectionis in nocte, circa 20. diem a collectione, cum tanto metu, ut omnes illam morituram putarent: nam & in syncopen incidit paulo post, cum materiam plurimam purulentam post eruptionem subito tussiendo expueret: solet enim materia plurima aliquando, quæ subito a vomica euomitur, facta eruptione subito effundi

4. circa præcordia, & cum virtus tunc debilis est, sæpe inducit mortem per viam suffocationis: & sic aliquando pleuritis ad syncopem permutatur, quod etiam cognoscitur a tremore cordis, seu palpitatione vehementi, a pulsu & a syncope subito adueniente & suffocante. Verum hæc per frictiones a syncope relenata (quod mirum est) non passa est abortum: sed quia valde debilis erat, cōditum sequens præscripsimus. *℞. conserua boraginis, buglossæ, viol. ana ʒ ij. corticum citri conditi ʒ ij. ss. manus Christi cum perla ʒ ij. syrup. de succo boraginis ʒ ss. misce*. Interea dolor lateris remissus est, rupto abscessu, & effuso pure inter thoracem ac pulmōnem: & quanquam tunc febres quiescere solent, & magna ex parte dolor quoque licet indefinenter febricitent habituali quadam febre, vti & huic nostræ mulieri euenit, atque indies debilior fieret (licet tunc operam daremus, ut paulatim reliquum puris expurgaretur, ne in tabem incideret) semper debilior facta est, & tandem etiam in octauo mense existens, valida tussi subinde etiam correpta, cum quotidie plurimum puris pessime olentis expueret, partus conamina accesserit, & peperit infantem quidem viuum, sed diem non superuixit. Et sic etiam pure in concavitate pectoris collecto, grauitatis autem sensus remanebat intus in profundo thoracis: simulque aliquando aliquid transfluere apparebat iuxta multiplices reclinationis permutationes, & maxime cum ab vno latere in alterum decumbunt, tunc sane multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpe sensibilibus in reclinationibus ipsorum auditur, prout legitur apud Galenum libro quarto, De locis affect. & Aetium libro octauo, capit. 65. Sed hoc notatu dignum, cum suppuratio sit puris in thoracis capacitatem collectio, in cuius illuue pulmo totus immergitur. Eo autem influxit, vel ex angina, vel ex peripneumonia, vel (quod frequentius contingit) ex pleuritide, de qua nunc loquimur: his enim tussi non expurgatis, al scellus exoritur, e quo tandem rupto, pus sæpe vniuersum in thoracis capacitatem influit: eoque etiam diu postea e sordido vlcere stillat, dum tandem ingens ac pene suffocans copia cumuletur: interdum ex abscessu pus sursum in os irrumpit, exspuiturque, ac rum suppurationis periculo liberat, ut sæpe in quotidiana praxi obseruauimus. Ceterum febre magis incrucescente, & non desinente, & siti accedente, tum sputo nigro & liuido apparente, talia signa (ut postea de suppuratione & empyemate dicemus) lethalia sunt, si febris denovo recalescat. Quæ omnia nostra mulier experiebatur: nam aliquando & pus per tres dies vel plures retinebatur: mox rursus peluim plenam extulnebat cum tanto foetore, ut perdurante nemo apud illam posset, unde rursus ex putredine febre crescente, & aphthis deinde oborientib. & purulenta foetida ad tempus cum expuisset, viribus consumtis & ad extremam maciem redacta misera, postquam duobus mensibus decubisset, & quo-

& quotidie purulenta fœtida male olentia expectorasset, etiam ab initio facto prognostico, tandem obiit.

SCHOLIA.

6. **M**Ultis quidem ingeniis suppuratione rumpi potest tardius vel citius. Sed de ea ruptione hic non loquemur, sed postea: verum de ea, quæ a natura fit vel septimo, vel 20. vel 30. & 40. vel 60. ex Hippocratis mente. Sed harum differentiarum omnium communes habentur ex commento. *Galenus lib. 2. prognost. text. 57.* ob quas spacio temporis euariant inter se ex affecta sede, & item nocuo humore: sedes enim calidior ac mollior, citius suppuratur, frigidior vero durior ac glutinosior, tardius: item ex humoribus, calidior citius, frigidior tardius. Hæc igitur rei ipsius differentiarum sunt. Porro accedunt extrinsecus ea quæ ab ætate ducuntur, natura, tempore, terræ conditione, ac viribus ægri. In omnibus his calidus humor citius, frigidus tardius suppuratur. Hæc igitur vniuersim scire (inquit Galenus) de omnibus suppurationibus bene est: sed mihi (idem ait) videtur operæ precium nunc quoque scire de iis, quæ in thorace ac pulmone fatigent. Eadem fere Auicenna ex loco Galeni desumpsit, quæ & Gradus longo sermone explicat. Sed aliquis verum & præfixum tempus eruptionis definire non potest, quanquam in pleuritide post 14. diem, si non resoluatur, postea sequitur collectio puris, deinde eruptio, temporibus iam dictis, prout materia sit multa, calida, acris, erodens, vel frigida & contumax. Et ideo hæc non sunt quasi absolute intelligenda, sed quod plerunque istis temporibus fiat eruptio, facta cõputatione a die collectionis, quæ tamen tardius vel citius aduenire poterit, secundum occursum causarum eruptionem facientium: & ideo illud principium considerandum, quo tempore collectio fiat, quod facile dignoscetur cum infirmus diuerso modo se habere cœperit, modo magis frigere videatur, modo plus calere, & quod dolores punctionesque intenduntur, & quod antea fiebat excretio, nunc vero retentio, rum alia iam ante dicta. Ideo auctores cū videant pleuritidem non terminari 14. die, amplius resolutionem non sperantes sed collectionem & suppurationem, ex signis iam dictis, statimurationi intendunt, & vbi abscessus maturus est, ad ruptionem deueniunt, & abscessu perrupto ad absterisionem & repurgationem, & vltimo consolidationi & quartæ intentioni animum adhibent.
8. **M**aturationem complent res temperate calfacientes & communiter humectantes cum viscositate quadam, inhibente tamen fortem resolutionem: & ita puris confectio seu concoctio iuanda, iuxta Paulum. Nam concoctio vnum quid ex naturalibus operibus existit, estque ea, (iuxta Galenum 5. De simplic. facult. medic. & primo, De different. febrium) in pus conuersio. Hæc vel intus sumuntur, vel exterius applicantur. Intus iuuant

Maturatio quo modo perficitur.

decoct. rad. bis mal. liquir. scabios. hordei mund. passulæ, dactyli, ficus, & cremor ptisanæ, & eclegmata ex mucag. ficuum ping. butyr. recent. & oleo amygd. dulc. & saccharo candi & penid. adiecto: qualia habes apud præceptorem meum Benedictum Fauentinum & Rondelium, ac alios descripta. Cibi quoque adhibendi tempore maturationis molliores, vt iura ex malua, beta, spinachia, ex oleo amygdal. & butyro confecta, ius caulium, aqua hordei crassior: ficus sicca, passulæ, dactyli, poma dulcia. Exterius valent fofus ex decoct. malua althææ, fœnugr. semin. lini, emplastra ex viol. mal. farina hordei, fœnugr. butyro, axungia porci, & cataplasmata ex radic. liliorum, ficubus, farina lini, fœnugr. & similibus: inunctio dialthææ, olei lilior. ex dyachylo, & alia infinita apud auctores iam dictos, cum alios practicos descripta. Sed hic quaeritur numquid venæ sectio conueniat tempore maturationis: quam quaestionem longo sermone Gradus explicat, cum dicat nõ esse iterandam phlebotomiam, cum sit intentio ad suppurationem, ne congeletur materia, quod equidem intelligi volunt, virtute iam debilitata, vel propter euacuationes præcedentes, & sectionem venæ vel victum tenuiorem, & accidentia progressa quæ virtutem deiecerunt. Sed constante virtute, & in corpore robusto, ex quo in principio collectionis accidentia, augeantur, dolor scilicet ac febris, reiterari poterit modica detractio sanguinis ad diuersionem & in frigidationem: hoc enim modo magis, quam alio vilo ingenio mitigabatur dolor, cum & Auicenna dicat phlebotomiam plus conferre doloribus vincentibus: attamen cum cautione hoc faciendum, prout vires ferunt, & venæ sectio copiosa præcesserit. Sed vbi vires fortes sunt, aliquando iuuiffe experti sumus statim in principio collectionis, vt in famulo quodam annorum quadraginta, robusto, stante dolore vehementissimo, & febre valida, vt anhelitum vix ducere posset, exiguo detracto sanguine dolor imminutus est, & melius ad suppurationem deuenit, aliis apertis remediis: idem intelligendum de ventris solutione cum lenitiuis, etiam si antea præcesserit. Ceterum vbi iam maturatum cognouerimus apostema ex remissione doloris & febris, & grauedine existente in loco collectionis, tum omnibus modis ruptionem promouebimus, vociferatione, clamore, & forti locutione, motuque in ordinato. Deinde & medicamentis id efficientibus, nempe calidis lenientibus, subtilitatibus, tam intus sumtis quam extra ad motis, vtemur, sed non, nisi præcedente maturatione & signis eiusdem, vt est syrup. de hyssopo, de prassio, in causa magis frigida, in calida oxymel propinant. Auicenna succo scabiosæ vtitur, vel eiusdem aqua & theriaca, modo non fuerit febris nec debilitas aut extenuatio. Exterius emplastra, apponunt ex supradictis, adiecto fimo columbino, vel ex butyro, adipe antiqua, melle & fermento, fimo columbino, vel rad. althææ ireos, axungia veteri, sem. lini, fœnugræc. olei lilior. & pauca adiecto fermento & fimo columbino, formulas vide apud auctores iam dictos hoc

9. Vtrum vena sectio possit fieri tempore maturationis.

10. Ruptio quomodo perficiatur.

tempore, quod ad cibum attinet, dentur sorbitio-
nes cum melle, panis fermentatus, passulæ, ficus,
dactyli, aqua mulsa, & oua sorbilia: vomitus va-
let & sternutamentum. Volunt quidam, si circa
20. diem a collectione hoc modo non rumpatur, ægrum desperatum esse: alioqui si per syncri-
rica medicamenta non rumpatur, volunt phle-
botomo vel cauterio aperiri, priusquam corpus
contabescat: de quibus videas Rondeletium, &
Arculanum. Sed quia difficile est inuenire locum
saniei, id nequaquam faciendum, nisi aliquis tu-
mor aut qualitas mutata manifeste exterius appa-
reat, cuius postea exemplum dabimus. Quod ad
tertiā intentionem attinet, facta eruptione o-
porteret abstergere, lauare, mundificare, & repur-
gare. Sed considerandum, num sanies expellatur
per pulmonem cum tussi, vel magnam venam in-
grediatur, & resudet ad hepar, & expellatur per
renes: vel ad locum concavum hepatis transiens
ad intestina pus effluat, cum hæc omnia posse e-
uenire, antea dixerimus. Quod si in concavitate
pectoris coarceretur, post eruptionem tandem
rarem inferet, ut dictum est, si in 40. diebus non
repurgetur. Ideo quæ detergent conferunt, ut a-
qua zacchari, aqua hordei & mellis, syrup. de li-
qu. & decocta in asthma & tussi descripta, &
lambitua ex penidiis, melle rosæ, succo enulæ, &
pulmone vulpis; tum alia apud præceptorem me-
um in sua Empirica descripta, & apozemata, &
syrup. apud Rondeletium tum alios relata, & ex-
terius adhibita fomenta, quæ resoluunt, tum alia
topica Si pus ad vias urinæ decumbat, decocta ra-
dic. apii, asparagi, fœniculi, alkekengi, & cicerum
iura profunt, vel cassia dissoluta in eodem deco-
cto. Si ad intestina pus defluerit, valerius galli
antiqui & decocta hyssopi, caulium, & radic. ire-
os, & clysteres leniter lauantes & abstergentes.
& in fine syrupi aliqui astringentes, quibus inte-
stina exulcerari prohibeantur, ut decocti plantag.
3 iij. syr. ex ros. sicca 3 j. β. Si diutius pus per sputum
expurgetur, aliqui theriacam dant: alii 3 β. diasul-
phuris, ex quo si sequatur exsiccatio, corrigunt
cum humidis, ut Mesue docuit. Quod ad cibum
attinet, eo tempore dandi cibi abstergentes pus,
utius cicerum, pisorum, caulium galli antiqui, &
cibaria zaccharo & melle condiantur. Si ad vias
urinæ transfluat, asparagi, ciceres, pineæ crustatæ
zaccharo, aqua mellis, hordei, vel passul. Post re-
purgationem sequitur consolidatio, cum lacte a-
sinæ, capræ. Sed cautio adhibenda, quod subinde
incarnantibus vtendum, mox rursus detergen-
tibus, prout affectus postulet, vel simul mixtis.
Lac igitur plurimum casei continens, plus conso-
lidat, e contra plus feri habens, magis detergit &
mundificat: cibi tunc conferunt, pedes vituli, par-
tesque viscosæ, & porcellorum, & caseus recens
non salitus, farina hordei, orizæ. Prodest & syru-
pus myrtinus. At si in putredinem pleuritis con-
uertatur, vel pus ad corruptionem tendat, tunc
augentur lethalia signa, abeunt vero, quæ salu-
tem aliquam promittebant, apparetque subinde

latus liuidum aut nigricans, aut virescens: nam
cum ad mortem tendit, & in corruptionem mu-
tatur, quia perneat, calorem innatum suffocat,
& gangrænam efficit, & sphacelum, syncopam,
& defectum. Si in cancerum transit (addit Arcu-
lanus) augebitur febris, aut saltem non minue-
tur, & sequitur dolor quidam fulmineus, id est,
exurens cum grauedine, & si idem vlceretur,
emitteretur per sputum virus valde fœrens: &
vbi terminetur ad putrefactionem, sputum ap-
parebit liuidum & tandem viride ac nigrum, val-
de fœrens, cum reliquis malis signis, & magno
anhelitus fœtore, ut in hac nostra muliere postea
euenit, ut ipsamet fœtorem, dum sputum egre-
deretur, ferre non posset. Sed tales semper fere
succumbunt, quamquam nonnulli scribant in
hoc casu prodesse oxymel sua acredine corru-
ptionem inhibens. In cancro opus est tantum cu-
ra blanditoria, cum tandem moriantur. De pleu-
ritide, quæ induratur, pauci mentionem faciunt,
excepto Arculano, cum raro contingat, neque
ego vidi: si contingat, caliditas & febris paula-
tim declinant, ira & anhelitus difficultas, donec
in totum auferantur: nam sputum diu retinetur
& aboletur remanente grauitate in loco affecto.
Tunc procedendum emollientibus intrus assum-
tis & extra admotis, qualia ad scirrhum scribun-
tur conferre. His alii etiam addunt conuersio-
nem ad phrenitidem, quæ habetur ex vigilia præ-
ter consuetudinem capitis caliditate, vigiliis, do-
lore, & delirio, sputo desinente, urina tenui,
subtili & anhelitus paruitate & frequentia, pulsu
raro & intermittente, & alui exsiccatione: ea
adhibenda quæ phrenitidi, delirio, & vigiliis con-
ferunt, abstinendo tamen ab iis, quæ sputum
retinere possent. Si ad nervos, apparebit aliquis
nervorum affectus, stupor, tremor, spasmus,
paralysis, dolor pectoris & lateris desinit, &
manifesta euacuatio. Curatio petenda ex pro-
priis locis. Ita quoque si permutetur ad mem-
bra exteriora, collum, axillas, inguina, quæ per
se patent, materia iuuanda est cum attrahenti-
bus, tum reliqua absoluenda, quæ auctores de
curatione apostematum exteriorum ponunt: si
ad pulmonem, curationem iam ex parte diximus,
& latius dicemus, cum peripneumoniam aliis ex-
emplis declarabimus: & si ad tabem, eius cura-
tionem instituemus de phthisi. Et ita absolui-
mus omnem curationem de vera & legitima pleuriti-
de: nunc etiam vnum atque alterum exemplum
addemus de pleuritide mendosa.

OBSERVATIO XLII.

De pleuritide mendosa ex statu.

Quibus modis pleuritis vera discernatur, non
solum ab aliis affectibus, verum etiam ab il-
legitima & mendosa, satis superque diximus
scholio obseru. 23. cum & sæpe fiat dolor lateralis
a destillatione, qui & prægressam habet causam
& ma-

Abstergio &
repurgatio.Si pus ad vias
urinæ decum-
bat.

consolidatio.

signa permuta-
tionis ad pu-
tridinem, cor-
ruptionem, can-
cerum & mor-
tem.

14.

Si induratur,
quomodo curan-
da.Si ad phreniti-
dem conuertitur.

15.

Si ad membra
exteriora.

& manifestam, dum in ceruice vel scapula primū afflixit, deinde in latus delapsa est destillatio, in quo pressu contractuque exacerbatur, tales sæpe in praxi habuimus: qui dolor non tollitur fomentis, sed potius iis remediis, quæ ad destillationem faciunt: atque horum dolorum nulla febres comæ est, nisi aliunde fortasse accersita: quanquam ex diuturna destillatione aliquando vera pleuritis subsequuta sit, ut prius ostensum est obser. 40. huius libri. Fit etiam pleuritis mendosa in musculis externis, ut scholio citato enarrauimus, ipsis inflammatis, cuius etiam exemplum postea adferemus: iam quoque a flatu dolor lateralis & pleuritidis mendosa oriri potest, ut Montani exemplo recensuimus in Marco Antonio Genuensi. Sic istis diebus, cum vir quidam ichthyopola intenso dolore lateris laboraret, ceruicia epota, in qua flores chamomillæ incocti erant, prius colata, ex nostro consilio ebibita, in sudorem incidit, oleoque rutaceo & anethino loco affecto inuncto, sine sanguinis detractioe statim miraculi instar curatus fuit. Hac enim via citissime & pueros & senes curauimus sine aliqua purgatione vel sanguinis missione, qui ita restituti sunt; etiam grauidas sola inunctione vel sacculis aut fomentis, sed intus non dando decoctum florum chamomillæ, cum illud menses euocet & facile abortum faceret. Curantur tales sine venæ sectione: nam & Aetius in mendosa pleuritide sanguinem extrahere periculosum esse voluit; eo quod ab humore pituitoso & flatulento eueniat sanguine, & virtutis robore pro ipsius discussione opus sit: quo detracto humor magis crudescit, & dolor intensior fit, qui pro sui ablatione venæ sectionem exposcit: proinde & Amatus scholio curat. 13. centur. 1. ubi agit de tectoris telæ bombicin puella, quæ pleuritidē mendosa laborabat, cui bis sanguis demissus eras, pleuritidē mendosam ob hoc vera periculosiorē esse voluit. Is tamen dolor taneū ventosus est absque febre, de quo nunc loquimur, quales nos multos habuimus: a flatu enim vagus est, nec diu eadem sede persistit, sed calore & fomentis mitescit, atque etiam sæpius discutitur.

S C H O L I A.

3. SI dolor lateralis in illegitima pleuritide sit ex frigore, aut ab aliis causis flatulentis atque euidētib; tunc vtendum est carminantib; ventositatem. In quibus & hic vel similis sacculus p. derit. ℞ florum chamomill. meliloti, sambuci. ana. p. j. summitatum anethi, vna cum sem. ʒ β. sem. feniculi, malua. ana. ʒ ij. (in materia frigida vel ventosa, addi potest semen rutæ, cumini ʒ j. & erit efficacius) fiat sacculus intersutus, & calefactus super patellam ardente vino irroratam, & parti affectæ applicetur. Valent & alia linimenta, & vnguenta & cataplasmata calfacientia & resoluentia, quorum formulæ ab aliis auctoribus petendæ. Sed hic etiam notatu dignum existimamus, quandoque dolorem lateris phthisicis superuenire, qui tamen non est vera pleuritis, cuius etiā meminit Dodonæus

cap. 22. in suis Obseruationibus: Phthisicos, inquit, diuturnitate malieriam extenuatos, lateris dolore quandoque corripit accidit: qui subinde valde molestus & respirandi libertatem impedit, febrilem tamen non multum intendit calorem. His pulmo membranæ costas subcingenti ita firmiter adglutinator adhæret, ut sæpenumero non absque violentia auelli queat. Concepto aliquo spiritu frigido, dolor superuenit: tollitur ac curatur calorificis, ut fomento ex floribus chamæmeli, & cumino, quod multis benefecit: sacculo hæc insuere oportet, qui deinde vino candido rigatus, calens dolenti loco imponitur. Venam secare qui temere audent, quantum sanguinis demunt, tantum vitæ detrahunt. Non modo autem istis sanguis perperam detrahatur, verum & aliis, ex crassis viscidisque humoribus, latere dolentibus. Ingerunt enim quandoque sese crassi viscidique pituitosi humores in thoracis spatium, tum & in ipsos pulmones, qui multitudine sua subcingentem membranam distendentes dolorem adferunt, & vias spirituum intercipientes, spirandi difficultatem inducunt. Nam & his sanguinem, præsertim copiosum, detrahere, est mortis causam ægris præbere, ut Aetius scribit Tetrab. 2. lib. 4. capite vltimo.

O B S E R V A T I O XLIII.

De pleuritide spuria, ab externa membrana costas succingente, tum musculis intercostalibus exterioribus inflammatis.

VIR quidam apud Clarissas sorores pleuritide non exquisita, sed mendosa & spuria dicta corripiebatur: inflammatio costas succingentem externam membranam & intercostales musculos exteriores infestabat. Exterior pars thoracis dolebat dolore extensiuo & pulsatorio, aderatq; tussis exigua vel nulla, nec respiratio admodum difficilis, quanquam in expiratione æger maius percipiebat nocumentum, quam in inspiratione: pulsus non admodum durus erat, & supra idem latus affectum decubitus difficilis erat, obtinuo febricitabat. Venam statim huic secui ad uncias fere sex, cum bonæ habitudinis esset forique adhibito ex viol. malu. flor. chamomil. flor. ros. rub. & meliloti, oleoque rosaceo, amygd. dulc. chamomill. & anethini, dolor sedatus est, facta resolutione, ut aliis remediis opus non fuerit.

S C H O L I A.

Similem quoque curationem fere ponit Amatus centur. 3. curat. 67. in qua axillarem venam dolentem locum respicientem secare fecit, uncias sanguinis octo extrahens: deinde secundo die vltro admoovit fomentum ex ros. malua, parietaria, chamomill. anethi, sem, lini, fenugrec. decocto, in fine adiectis ʒ iij. olei ros. mox loco affecto inuncto hoc vnguento. ℞. axungie gallina, butyri recentis, ana. ʒ j. pul. chamomilla ʒ β. olei ros. amygd. dulc. ana. ʒ β. cera q. s. ad ignem misce,

3. & fiat vng. melle, & cucurbitulis loco affecto affixis extoto intra octo dies inflammatio resoluta fuit. Solet hæc inflammatio ad cutem aliquando deuenire, adeo vt necessum sit tumorem aperire, vt *5. de locis affect. capit. 3. Galenus refert*, id se semel obseruasse in quodam Lusitano, idem Amatus ait, quem tumorem scalpello incidi fecit: idem & Zoar gloriosus se fecisse narrat in muliere quadam, vt *libr. 1. sui Thesis, cap. 4. tractat. 16. videre licet*. Rondeletius omnia fieri in mendosa pleuritide vult, vt in vera, si dolor vehemens urgeat, omnibus consentientibus venam scire iuberet, nisi ætas & cruditas materiæ obstiterit, vel aliud impediatur, apponit ventosas super nates sine scarificatione, si materia omnino frigida sit, vel cum scarificatione, quando est permixtio sanguinis: additque curari pleuritidem iisdem fere remediis vt vera, nisi quod in parte externa fortiora remedia sunt adhibenda, vt emplastra, sacculi, vnguenta, quorum formulas, apud eundem descriptas videre poteritis. In hac pleuritide idem laudat cucurbitulas supra affectam partem positas, prius vero natibus admotas, ante lenito ventre & misso sanguine. Si vero ad partem externam trahatur: & vertatur in saniem, (quod patet ex inundatione, & partis inflammatae pulsatione,) aperiat locus, vt in aliis abscessibus: vel vtendum emplastro de meliloto, vel alio digerente, vt materia potius per insensilem transpirationem: quam per manifestam euacuationem educatur. Si muscoli pectoris externi circa latera dolent, & adsit inflammatio, curetur vt aliarum inflammationes, & si in abscessum terminentur, curetur, vt alii abscessus in locis externis, visu, & tactu apparentibus. Solent aliquando lateris dolores in peripneumonia apparere, quamuis non sit vera pleuritis. Sic nostra ætate peripneumoniam populariter grassatam aliquando vidimus, vt in libro nostro 6. Obseru. De febribus epidemicis & peste recensuimus. Memorat Dodonæus, sua ætate bis quoque sæuisse, & in memoria multorum adhuc esse, semel anno 1557. Octobri: deinde iterum anno 1565. Ianuario mense. Ab initio Iulii mensis anni 1557. sicca præcesserat constitutio, & mediocriter pro temporis ratione calida, præsertim Iulio ac Augusto. Sub finem Septembris tertio ac quarto Kalendas Octobris, supervenit validissimus a Septentrione vëtus, admodum frigidus, mox destillationes plurimæ sunt natæ: unde cito validæ vehementesque tussis, & lateris cum febris, & respirandi difficultate dolores præcesserunt. Lateris dolores non vehementes, non punctorii erant, sed clementes admodum: tertio die vel prius sputum prodiit cruentum: quinto, aut sexto, aut septimo, ad summum octavo mortui omnes sunt latere dolentes, quibus sectio venæ prætermisssa, aut tempestive non facta. At quibus sanguis vel primo vel altero die detractus, euaserunt, quarto aut quinto die sanitati restituti. Quarto vero aut quinto sanguinem detraxisse nihil profuit, morbo iam confirmato. Humores de-

stillantes tenues admodum, & nonnihil acres fuerunt. Eclegmata idcirco vtilissima, quæ inspissandi vim habent, acrimoniam retundunt, & aspera leniunt: quale est ex ziziphis (iuiubas vulgo vocant) serapium, quod tenues destillationes inspissat, acrimoniam obtundit, aspera obliniendo lenit. Altera peripneumonia dissimilem occasionem habuit. Decembri mense anno 1564. gelu admodum acre exstitit, quod non modo omnia reliqua flumina vbique, sed ipse Scaldis in portu Antverpiæ (quod admodum raro contingit) adstrictus fuit. Decidit per id temporis nix admodum crebra. Post Kalendas Ianuarii anno 1565. Hyems frigida, sed exigua admodum, sic vt neque nix, neque glacies dissoluerentur. Per hos dies vapores multi eleuabantur, qui cum interdiu dissolui ac discuti non potuerunt, nec altius ascendere, nocturnis frigoribus densati, inferiorem & quem haurimus aerem inficientes, crassum humidumque eum admodum reddiderunt. Ab huius autem tam crassi aeris, & vaporibus infecti inspiratione, morbi circa pulmones, atque in ipsis etiam pulmonibus exitiales nati sunt: quibus infinita hominum multitudo mox correpta fuit. Nulla autem citius aut grauius affecti, quam qui hora vna aut altera post solis occasum aeri sese exposuerunt. Nā interdiu, præsertim ipso meridie, aut paulo post, aer minus crassus exstitit, nec ita cito aliquem offendit. Multis profuit focus elegans ex quernis lignis, qui hos in sanitate continuit, aere in cubilibus ac cœnaculis resiccato ac puriore reddito. Morbi per hos dies erant tussis, raucedines, respirandi difficultates, & plurimi vna laterum clementes, non punctorii, cum febris dolores, hoc est, peripneumoniæ. Fuit autem hæc peripneumonia non minus quam superior exitialis: necessum quoque erat in hac mox primo aut altero die sanguinem detrachere, quando cessatum est, nulla salutis ac vitæ spes reliqua erat. Sputum in hac processit crassum, sanguini permixtum, nonnullis biliosum, quorum nemo seruatus. Eclegmata desiderabantur, quæ pulmonis meatus expurgarent, & ab infarctu liberarent, non tamen valde calida, vt serapium ex capill. veneris, & quod ex dulci radice paratur: ex hyssopo quoque quandoque profuit. Vtroque autem tempore morbum hunc non pleuritidem, sed peripneumoniam fuisse, mortuorum quorundam corporum dissectiones ostenderunt. Istis exemplis fit manifestum (vt idem asserit) non semper pulmonis inflammationem citra lateris dolorem accedere. Nam licet parenchyma eius sensu sit destitutum, vt satis in phthisi apparet, non tamen membrana, quæ ipsum ambit, sensus & doloris, si distendatur, est expers: quando enim inflammatio ad vnā aliquam exteriorem pulmonis partem consistit, dolor in latere distenta membrana sentitur: vbi vero interius accenditur, grauitatis sensus quidam circa sternum & dorsi spinam tantummodo percipitur; nisi simul & pelliculam siue membranam, qua dorso sterno-

De pleuritide non vera eius curatio.

Peripneumonia populariter saeuens cum lateris dolore.

6.

Hyems frigida.

7.

8.

que adhæret, inflammari contingat; tunc enim dolor circa sternum etiam adest, Aetio teste. Hætenus Dodonæus. Ceterum pleuritide nunc absoluta, ad peripneumoniam maiorem enucleationem accedamus, ab ea incipientes, in qua plurimum pituitæ prædominabatur: tum aliis exemplis adductis, quæ non a pleuritide, sed per se ipsa ortum habeant.

OBSERVATIO XLIV.

De peripneumonia, in qua pituita plurimum prædominabatur.

Mulier Hornana, quæ fratrem visendi causa, Alcmariam accesserat, annos triginta octo vix accedens, asthmate subinde tanquam morbo familiari laborans, satis pituitosa, fluxioni ac catarrho obnoxia, anno 1550. Ianuario mense, in peripneumoniam incidit. Quam magna spiritus difficultas urgebat; ac oculos tumidos habebat, aderatque præcordiorum pectorisque angustia, simul & grauitas summa, sternum dorsumque contrahens, & febris acuta, sed non admodum vrēs, tussis valida, sputum crudum, pituitosum, vix aut parum cruentum: ita ut a sanguine pituitoso, pituita plurimum prædominante, hoc malum originem traxisse existimarem, in muliere asthmatica, pituitosa tempore quoque hyberno. Ad quam vocatus, cum aluum non deponeret, balano sequenti feces communes deposuit. ℞. pul. specier. hieræ pic. ʒj. mellis ʒj. diacrid. gran. iij. salis exiguum; fiat suppositorium. Eodem die post aluum solutam statim ex vena basilica in brachio dextro sanguinem extrahere iubeo ad uncias sex: qua detractio angustia pectoris nonnihil sedata, multo melius spirare potuit. Interea hoc decocto bis in die utebatur. ℞. radic. sæniculi, malua, glycyrrhiza, ana ʒj. capill. vener. scabiosa, hordei mundati, hyssopi, vngula caball. an. m. j. flor. cord. p. j. seminis anisi ʒj. vuar. passul. detractis vinaceis p. j. iuiubar. sebesten recent. an numero vij prunor. aliquo modo dulc. num. xij. coquantur in aqua communi pro ℥b. j. ℞. colatura saccharo dulcoretur, & hunc syrup. lambebat. ℞. syrup. viol. capill. ven. an. ʒj. & syrup. de liquir. de hyssopo, an. ʒj. ℞. misce. pectus inungebat vnguento pectorali, oleo chamæmel. & amygd. dulc. adiectis. Post duos dies, ad expectorationem & maiorem incisionem, utebatur sequenti eclegmate. ℞. loch. de pino ʒj. ℞. loch. sani & experti ʒj. misce. Quarto die materiam magis coctam hoc modo expurgauimus per vices. ℞. hordei mundat. vngula caball. hyssopi, scabiosa, capill. vener. an. m. j. flor. cord. p. j. cort. rad. sæniculi, liquir. rasa an. ʒj. sem. anisi ʒj. ℞. folior. senæ Alexand. ʒj. prun. damasc. dulc. num. viij. vuar. passul. mundat. ab arillis p. j. iuiubar. sebesten, ana nu. v. coquantur in aqua communi pro ℥b. j. saccharo dulcoretur: modo bis, modo semel ex hoc decocto capiebat, & quotidie modo bis, modo ter excreuit cum maxima pectoris alleviatione, febre non crescente. Sed cum aliquo modo cor doleret, cochlear vñ syr.

borag. propinauimus. Lingebar quoque ex electuario ex pulpis prun. damasc. parato cum succo liquiritiæ, & speciebus diarragac. confecto, pro febre & siti. Post tres dies a decocto purgante difficilis spiratio cessare cœpit, sed oborto in muliere satis crassa lateris dolore, quem ex ventositate contractum coniecimus, & fotu decoctionis flor. chamomillæ, meliloti, & semin. lini, sænugræci, anisi cessauit, & liberius extussiebat, expectorabat concocta vñdecimo die: & quia per sputum peripneumonia tendebat ad resolutionem & declinationem, syrup. sequentem lambebat. ℞. loch. sani & experti ʒj. syrup. capill. ven. de liquir. de hyssopo, an. ʒj. ℞. ita ut tandem 14. die a peripneumonia satis periculosa euaserit, a febre in totum ac tussi liberata; solum relicta appetitus deiectione, quam ob dulcia medicamenta stomacho refragante euenisse existimabat: sed hoc condito sumto subinde ad magnitudinem fabæ maiusculæ, appetitus quoque rediit. ℞. conserua borag. ʒj. diarod. abbat. ʒj. ℞. specier. aromatic. rosa. sine musco ʒj. corticum citri conditi ʒj. iij. conseru. capill. ven. ʒj. ℞. syrup. menthacei & zacch. parum, ne tussis rediret, fiat conditum. Interea cum sanitatem consequuta esset, ac iam discederet & domum reuerteretur, consului, ut subinde vteretur inula campana condita & saccharo incrustata, ad asthma morbum sibi familiarem.

SCHOLIA.

CVM pleuritis aliquando in peripneumoniā mutetur, ut prius dictum est, deinde quod parum a curatione pleuritidis distet, solent medici statim post pleuritidem de peripneumonia agere, quæ quidem variis nominibus decoratur. Nam alii περιπνευμονίαν seu πνευμονίαν, (vel ut Celso visum est cap. 7. lib. 4.) περιπνευμόνιον Græci vocant, Latini vero & peripneumoniam appellant. Et hæc inter eos morbos connumeratur a Galeno 2. method. meden. quibus a læsa particula nomen fuit inditum. Estque ea (teste Celso) vehemens & acutus pulmonis morbus, quam & Paulus lib. 3. cap. 30. inflammationem pulmonis esse ait, cum febre acuta, ut etiam Galenus confirmat 2. & 4. de locis affect. & lib. de puls. ad Tyrones, & 4. de causis pulmon. Aetius lib. 4. cap. 66. Non desunt, qui in veram & legitimam & notham distinguunt: vnde & Fernelius raram admodum veram peripneumoniam esse asseruit, cum & tenuis & acris multaque destillatio cerebro confer-tim in pulmones illapsa, interdum ardore præter naturam incenditur, æstum ac febrem inferens: ac plerique eam affectionem peripneumoniam nomine designant, in qua & tussi & spirandi difficultate & lenta febre sensim conficitur æger, sine vlcere, sine exspuitione cruenta. Hæc si peripneumonia dicitur, ab exquisita profecto plurimum, cum causa, tum symptomatum magnitudine diffidebit. At nos nunc loquimur de vera peripneumonia: Potest enim hæc inflammatio, ut in sequentibus de causis latius dicetur, nedum

3.

4. *Varia peripneumonia nomina.*

Peripneumonia quid sit.

5. *Peripneumonia nomina.*

ex sanguine optimo ac laudabili, mediocremque crassitudinem habente initium sumere: verum etiam ex eodem pituitoso, aut bilioso, aut melancholico existente (quamquam quidam hoc ultimum de melancholico vix admittunt, & nonnulli in totum negant:) ut patet apud eundem Galenum 2. de loc. affect. & comment. aphorism. 36. libr. 6. ut etiam a Donato Altimaro citatur, cum dicebat pulmonem aptum natura esse, cum raræ ac laxæ substantiæ particeps sit, ad omnes humores percipiendos: non obstante 4. de caus. puls. vbi Galenus potius a pituitosiore & crassiore sanguine inflammari vult, cum subtilis biliosusque fluat fere, nec cum viscere vlla ratione coalescere possit. Quibus respondetur, intellexisse quidem promptius hoc fieri ex pituitoso sanguine; non tamen negavit utrasque partes ab utrisque inflammari posse, licet in laterali morbo sæpenumero magis biliosum, in peripneumonia vero magis pituitosum sequi consuevit. Pars affecta hic facile cognoscitur pulmonem esse, & compertum affectum præter naturam vitium hoc esse inflammationem, & ideo morbum in quantitate, subsequente immodica spirandi difficultate atque angustia; adeo ut suffocari laborantes videantur, ut sæpe recte sedere cogantur: hoc enim modo sentiunt thoracem magis dilatarı: quippe decumbentibus in sese cõcidit, idque magis si inflammatio particeps fuerit erysipelatis. Quocirca, vbi plurimum efflant, iuari videntur: ac multum aerem frigidum attrahere concupiscunt. Thoraci quoque gravitatis sensus adest & dolor spinam contingens, ob membranas ambientes: vehementi enim dolore pulmonum quam cruciatur, nisi ob dictas membranas & earum extensionem. adest & acuta febris: incendium vero magis in erysipelate; sed tunc angustia & gravitatis sensus minor. Si igitur erysipelas, aut phlegmone erysipelatodes sit, haut difficulter deprehendetur; si vero inter tussendum sputum exspuunt, id (ut in pleuritide dictum est) modo hoc, alias alio colore infectum videbitur, pro ratione diuersi humoris inflammationē causantis. Proprium item in peripneumonici signū est (eodem Galen. teste 1. de loc. affect.) quod maxillæ rubræ apparent, pulsusque magnus, languidus, mollisque atque inæqualis & vndosus est, interrim quoque dicrotus: & cum acute omnes febri-citent peripneumonici: nonnihilque comatis habeant, vtrum horum excellat, maxime ratione crebritatis pulsus inuenitur: nam vbi ardentior febris fuerit, pulsus abunde creber erit; si comatosior, minus creber. Et huius causas requiras apud Galen. 4. de causis pulsuum. Sed & alia symptomata peripneumoniam comitantur, ut anxietas, impotentia, iactatio, lingua flaua, licet temporis progressu nigrescat, lib. 3. de morb. vulg. & delirium atq; oculi intumescences, teste Paulo, & nasus in summa firmus, & venæ temporum eleuatæ, iuxta Aetium, & prostratus appetitus. Simili autem via, ex quo humorum ortum duxerit, indagabimus, quā de pleuritide docuimus, licet sæpenumero expi-

tuitosiori sanguine gignatur, & aliis quoque humoribus fieri poterit, ut prius dictum est: idque potissimum percipiemus ex eiusdem sputi colore diuerso: ex rubro sanguinem, ex flauo & rufo seu pallido biliosum sanguinem, ex spumoso albo atque candido pituitosum; ex liuido & nigro melancholicum sanguinem, ut 2. de loci affectis, & 2. prognost. a Galeno scriptum reperitur. At si nihil exspuant, ex aliis id coniectabimus, ex maiori vel minori calore, seu incendio in thorace percepto, ex maiori minoriue angustia, respirationis difficultate, ac gravitatis sensu, temperamento, ætate, habituque diuerso, regione, aeris constitutione, anni tempore, ac præcedente victus ratione. At de causis & signis plura videas apud præceptorem meum Benedictum Fauentinum in Praxi cap. proprio, & Gradum, tum alios, qui longiore sermone hæc prosequuntur: quæ exemplis subsequētib; adhuc clariora euadent.

OBSERVATIO XLV.

De peripneumonia ex sanguine magis predominante, cum mediocri pituita portione.

Matrona honesta ac iuuenicula, annos plus minus octodecim nata, & nuper nupta, veris principio subito peripneumonia sanguinea correpta fuit: genæ enim plurimum rubebāt, sputum sanguinolentum erat, mixtum cum exigua pituita, febris acuta erat cum inflammatione & venarum omnium extumescencia, cum pulsu vndoso pectorisque gravitate, habitu mediocriter carnosio, victu satis lauto præcedente, ac ætate iuuenili, & tempore verno respondentibus, cum vrina rubra, modo clara, modo crassa, venis apparentibus ac per totum corpus satis repletis, cum tanta anhelitus difficultate, ut suffocari videretur, ita ut facile, cum ad eam subito vocatus essem, intellexerim pneumoniam esse ex sanguine magis prædominante, & cum dolor grauis pectus occuparet, ad mammillam sinistram tum humerum sinistrum tendens, cum aluum intra duos dies non deposuisset, libenter ante venæ sectionē enema molliens inieciſsem. Sed cum non admitteret, balano id tentauimus: quo nihil vel vix effatu dignum excreuit. Angustia pectoris magis crescente, precibus amicorum eo perducta est, ut clysterem emollientem admitteret, hoc modo descriptum: ℞. radic. altheæ mundata ʒj. B. malua cum toto. viol. parietaria, mercurialis, an. m. j. flor. viol. meliloti. chamomilla, an. p. j. semin. lini, fœnugrac. an. ʒij. sem. anisi ʒj. B. sem. 4. frig. maior. an. ʒ B. prun. damasc. nuan. 15. coquantur in aqua cor. muni, & in ʒj. huius decoct. dissolue cassia mundata ʒj. diacatholici ʒij. olei viol. amygd. dulc. an. ʒj. olei anethini ʒ B. salis ʒij. misce pro clystere: quo bis aluum deposuit, dolore & difficultate anhelitus parum diminuta. Sed cum post meridiem rediremus, & malo crescente, cum versus mamillam magis sinistram doleret, vena lienari in manu se-

cta,

3. Ita, cum in brachio minus appareret, ad uncias sex, optime tulit, & anhelitus liberior processit, sputo melius quoque exeunte, pectore inuncto oleo amygdal. dulc. & amar. viol. & anethino, & lambirino saepius deglutito, ex syrup. viol. ℥j. β. syrup. capill. vener. de liquir. ana ℥j. β. & hoc iulebo ebibito ad materiae præparationem. ℞. syrup. de liquir. iuu-
4. bini, capill. vener. ana ℥j. aqua vngula caball. scabiosa, ana ℥ij. misce pro ij. dosibus. Quinto vero die ita eam purgauimus. ℞. cassia mundata. ℥j. diacatholici ℥j. agarici trochiscati (quia leuis aderat portio pituitæ) ℥ss. zaccharo candi asperso, & granis tribus pulueris cinamomi & hyssopi adiectis, fiebat bolus; quo ter aluum excreuit. Vbi enim morbus venæ sectione & clysteribus non cedit, solent medici ipsi, præsertim in primis quatuor aut quinque diebus, purgante medicamento aluum subducere, & hoc paulo amplius, quo & febres obtusiores sint, & dolores leuiore, ut Hippocr. iussit lib. 3. de morb. Ad hoc opus eligunt urea, quæ leniendo purgant, cuius generis sunt nostris temporibus, manna, cassia fistula, diacatholicon, diaprunum non laxatiuum, & medicamentum lenitiuum dictum, in bolo vel cū decoctis pectoralibus. Oportet autem infernam aluum ex eiusdem Hippocr. mente neque valde suppressam esse, ne febres sint acutæ, neque valde egerere, quo salua atque sputum sursum educi possit, & æger viribus valeat.
5. Interea & ad diuersionem vsi sumus frictionibus: eiusmodi diutissime non parum conferunt, si bis quotidie fiant in scapulis; proxime ab his in brachiis & pedibus & cruribus, leuiter contra pulmonem, ut testatur Celsus. Interim neque syrupis neque eclegmatibus abstinuimus, ut promte ac celerrime pulmo expurgaretur: quare & sequenti ad expectorationem vsi sumus. ℞. syrup. violar. (ob calorem) ℥j. syrup. de liquir. capill. vener. ana ℥j. zacchar. candi pul. ℥ss. misce. Sexto rursus die, cum durioris alui permaneret, ut hoc decocto vteretur, mandauimus. ℞. folior. viol. boragin. ana m. ij. radic. liquir. ℥ss. semin. 4. frigid. maior. semin. anisi, ana ℥ss. folior. sena ℥j. prun. damasc. ad dulcedinem tendentium num. xv. hordei mundat. p. j. capill. vener. hyssopi, ad magis incidendum, ana m. β. iuu-bar. sebesten recent. ana num. v. fiat decoct. in sero lactis ad lb. j. zaccharo parum dulcoretur. Ex eo decocto, cum semel ℥ iij. cepisset, quatuor secessus in die habuit cum alleviatione. Quare amplius non sumsit: quotidie melius expectorabat. Interea topicis digerentibus & resoluentibus minime relictis, bis facta pectoris inunctione ex vnguento nostro pectorali, septimo melius habere cœpit, & cum minori molestia extussiebat sputa magis alba, & concocta. Eclegma continuabat syrupo postea a violaceo relicto, addito eius loco syrupo de hyssopo. Octauo die iterum aluum non nisi balano deposuit. Nono die suborto dolore cum quadam inflatione circa inguina, & quadam grauitate circa vterum, pectinem, & lumbos, motum per menstruas purgationes finituum expectauimus; cum neque grauida es-

set. Et cum per superiora, calidis (quæ febrem augerent) uti & menses euocantibus non ausi essemus; ideo cum vteri dolor vigeret, per obstertricem mandauimus, ut digito oleo sequenti inuncto collum matricis intus confricaret: atque hoc modo ora venatum matricis aperta sunt, & menstrua copiose fluxere. Oleum verum tale erat. ℞. olei lilior. ℥j. croci orientalis pul. ℥ss. misce. Menstruis itaque fluentibus, morbus, eo modo signis coctionis antea in sputo, tum in vrina apparentibus, ad salutem terminabatur, ut decimo quarto die perfecte sanata fuerit. Victus huic idem, qui pleuriticis confert, nisi quod magis attenuatorius esset, iuxta Aetium: a salis tamen abstinendo, tum ab acris atque amaris: neque aluum astringentibus, ut Celsus admonebat, vsi sumus; sed leuioribus; dando in principio, vel primis diebus sorbitionem ptisanæ, aut ptisanam ipsam cum melle, vel butyrum recens cum ptisana, ut Paulus facit: in qua recens adeps iuxta Celsum incoqui posset: primis enim diebus, ex Hippocrate tercio, de morbis, sorbitiones dulciores dat. Quarta autem die & quinta, & sexta non amplius dulces; sed pingues dat: nam ad sursum exscreandum dat, ut ptisanam cum iure galli pinguis vel gallinæ. Nos commodè in principio hordeata exhibemus, deinde & sorbitionculam ex pane, zaccharo & butyro exiguo cum ceruisia leuiter coctam, vel panatam. Sed a succis frigidioribus abstinere, & aliquid hyssopi incoquunt, & panem ex aqua mulsa, subinde cum melle exhibent. Celsus etiā oua sorbilia concedit. Porus erat ptisana parata ex hordeo mundato, liquiritia & passulis, detractis vinaceis. In fine etiam victum auximus, exhibendo colatitium cum emulsione hordei, zaccharo adiecto.

S C H O L I A.

8. Decimo quarto die in totum morbus solutus fuit, & nono iudicatus, menstrua euacuatione subsequente, qua & terminum suum compleuit. Iudicatur autem hic morbus (Hippocr. teste 2. & 3. de morbis, & lib. de affectibus.) breuissimus quidem in diebus septem, aut quatuordecim; longissimus vero in duobus de viginti. Pauci autem hunc morbum effugiunt: verum postquam trigessimum diem transgressus fuerit, non amplius moritur, sed pus spuit, & pectus dolet & tussit: nam ex hoc morbo fiunt etiam pectore suppurati, si non in iudicatoriis diebus pulmo fuerit purgatus. Iisdem modis vero terminatur, ut pleuritis: vel enim per sputum, & eadem signa aderunt, ut in pleuritide, si sputum bene exeat & bene coctum. Sed quod ad breuitatem attinet & longitudinem, solet esse aliquando longior pleuritide, cum a materia crassiore pendat; citius tamen a bile quam a pituita. Et ideo si post decimum quartum diem non resoluitur per sputum, transiit quodammodo in suppurationem; & tunc aderunt eadem signa, quæ de suppuratione

6.

7.

8.

Signa prognostica.

diximus, & postea dicemus, cum de empyemate agemus: & si non repurgatur, etiam in 40. diebus, ad tabem transit multo facilius quam pleuritis: & ideo si in septem diebus non curatur peripneumonia, plerumque interficit vel suppuratur, vel in tabem transit. Interea aliquando inflammatione in pus commutata, si per urinarios meatus aut ventrem pus excernatur, omni statim molestia liberantur. Si vero acervatim in pulmonem irruerit, aut suffocat, aut in tabem permutatur. Terminatur etiam in alios morbos, in pleuritidem (quod rarius fit) & minus malum est; licet tamen non semper illud tutum est: & licet peripneumonia ex pleuritide transmutata securiores sint his, quæ ab initio fiunt ex se, non obstante tamen, etiam si superuenerint, sunt malæ, ut patet *11. Aphorism. lib. 7.* a morbo laterali inflammatio pulmonis malum: quia pulmonia, ut ante quoque dictum est, pleuritide periculosior est, quia malum magis vicinum cordi, & maius impedimentum in anhelitu. Siue igitur sit a pleuritide, siue ab angina, vel ab alio morbo, non caret periculo, uti quælibet peripneumonia etiam ab aliis causis prægressis, ut contusione, casu, vulnere, a valida frigiditate aeris ambientis. Hæc omnia externæ causæ peripneumoniæ esse possunt. Et sic quoque pulmonis inflammatio, quæ fit per materiam ex angina & pleuritide delatam, periculosior est, & difficilioris curationis, quam quæ ex defluxionibus a cerebro in pulmonem fit: ab acuto enim morbo maior fit læsio. Et sicuti cerebri defluxio (ut præceptor meus Benedictus Faentinus censebat) gignere valet pulmonis inflammationem, ita pulmonia phrenitim gignere valet, teste quoque Galeno *7. Aphorism. 12.* cum a calido humore fit inflammatio pulmonis, quæ multos vapores transmittit ad caput, cerebrum implet vaporibus, & facit phrenitidem: in quam si permutetur pulmonia, pessimum est, iuxta eundem aphorismum a pulmonis inflammatione phrenitis malum: ratio est, quia mutatio fit in peius. Verum ad parotidas conuersam post aures, vel sub alares abscessus excitasse, hoc innocentiore malo, ac augurio magis tuto accidit. Sed si prolongatur peripneumonia, ut quidam volunt, inducit pedum tumorem & hydropem, ob hepatis nocumentum communicatum: quod aliquando & in suppuratis euenit. Si induratur (quod rarissime contingit) ut quidam volunt, paulatim accrescit anhelitus difficultas, & tussis siccior, frequens, calor exiguus, dolor grauis, anhelitus constrictio modo alleviatur, modo redit. At si in pulmonis fistulis caro paulatim excreuerit, febricula aderit, cum quodam pulso in medio scapularum, & vocis pariter raucitas, cum oris, narium graueolentia, odore piscium: quæ si exulceratur, foetidioris erit odoris, & sine salua tussis, & cum corporis interdum pruritu: illa tamen peripneumonia non est, quanquam hæc ipsa pulmonia, vel dissoluatur, vel in vomitam transeat, aut paulatim quidem indurescat in carbunculos,

ut Benedictus Veronensis ex aliis annotauit. At si aquositas pulmonis fistulas vexat, differt plurimum a materia pituitosa; mouetur enim in diuersa latera, & æger fatetur sonitum sese percipere. Ex huius vapore continuo febricula excitatur, cum difficultate spirandi. At hæc legitima peripneumonia non est, cum & his salua tenuis aquosa & plurima ex ore prorumpit, & in ceteris hydropem imitatur. At inter reliquas species peripneumonia biliosa, reliquis aliis malignior est, & quando magis ad erysipelas pulmonis accedat: cuius exemplum nunc adiungemus.

OBSERVATIO XLVI.

De peripneumonia biliosa.

Pulmonia grauissima & biliosa, Procurator in monasterio (cui Sion nomen erat prope Delphos) laborabat, annum quadragesimum agens, vir biliosus, ac satis raræ constitutionis, & plus æquo vino deditus, quemadmodum tales ocio dediti apud amicos præsertim esse solent: salua huic rufescebat, & sputum citrinum subtile spumosumque erat, sine grauitatis molestia, oris amaritudo aderat, pulsus celerior, vrina valde tenuis & citrina, dolor acutior pectoris sine grauitate, linguæ asperitas cum nigredine spectabatur, febrisque continua & satis ardens. Hæc enim bilem prædominari notabant. Ad quem decumbentem prius quinto die accitus fui, cui & in manu prius vena secta fuerat per chirurgum, nullo adhibito medico, & a coquo, qui medicum agebat, sed empiricum, electuarium de succo rosarum exhibitum: ex quo præter rationem multa excreuit sine alleviatione: nam quinto die cum illum accessissem, vigilæ accrescebant, & sitis valida erat: parum cruentum cum flauedine exspuebat: prius tamen magis flaua & biliosa in pauca quantitate. Pro siti decoctum hordei mundat. & flor. violar. & liquiritiæ præscripsi, & ut sub noctem hordeatum, cum sero lactis concinnatum ei daretur, mandaui, & ad expectorationem sequens eclegma. *℞. syrup. viol. syrup. iuiubini. ana ℥j. syrup. de liquir. ℥ss. loch de succo farsara, zaccari, viol. penid. an. ℥ij. diatrag. frig. ℥ij. misce, & diatragacan. frigid. in tabula saepe capiebat.* Sexto magis expectorabat. Sequens decoctum præscriptum. *℞. viol. malua cum toto, hordei mundati, ana m. j. semin. 4. frigid. maior. ana ℥j. semin. malua Diij. seminis anisi ℥j. liquiritia rasa ℥ss. fiat decoctio in aqua cucurbitæ, (sed quia non habebat pharmacopæus, in aqua vngulæ caballin.) prius adiectis iuiubis & sebesten recentibus, scilicet num. viij. pro ℥ss. colaturæ addendo syrup. viol. ℥ij. & syrup. iuiubini, capill. vener. ana ℥ss. misce.* pectus inungebat ad refrigerationem oleo viol. & amygdal. dulc. pauco adiecto olei de semin. cucurbitæ, vel melonum, modo ad manum esset. Septimo die delirauit, & metus erat de phrenitide: nō dormiebat, astantes illū pro deplorato habebāt. Hic rursus coquus me ignorare male in die decre-

decretorio electuar. de succo rolarum propinauit: & quamquam tantum 3j. exhibuerat, ter alium deposuit. Vnde & peius habuit, materia commota, & non omnino educa: nolui tamen aliquod medicamentum adhibere in die decretorio: sed tantum tempora sub noctem, cum vigil permaneret, inungi feci oleo papaveris; & syrupum violar. per se lambendum dedi, & subinde partem vnam diatragacant. frigid. in tabulis. At in octauo dedi decoctum ex sero lactis ex prunis paratum, viol. malua & hordeo mundato, liquiritia, cum zaccharo dulcoratum. Quo potu etiam prius quotidiano vltus fuerat, quo probe etiam aliis soluta fuit, & magis cocta coepit exspuere, etiam hordeato sub noctem assumpto, & prunis suffocatis & coctis in aqua utebatur ad oris siccitatem. Postea poma allata cibi loco sumfit. Decimo die bene expectorabat, minusque delirabat, paraphrenitide magna ex parte sedata. Interea & hunc linctum sumebat. ℞. syrup. de liquir. iuiubini, viol. zacch. penid. ana 3j. b. misce. Vnde decimo vero die 13. concocta magis expectorabat, & in 11. delirium ex toto cessauerat, & mente constabat. Decimoquarto die ab initio morbi plurimum sudauit per totum corpus, bene lotium reddidit ac excrementa, sputo sine molestia quoque exeunte. Nocte sequente bene dormiuit, & magno nostro honore sanitatem consecutus est, neque amplius febricitauit, ac cum optime se habere diceret (nisi quod adhuc quandam caliditatem in pectore sentiret) idcirco, vt colophonem huic curationi imponerem, hoc conditum illi praescriptum est. ℞. conferva violar. boragin. buglosse, ana 3j. b. zacchar. viol. drachm. ij. pulueris diatragacant. frigid. recenter parati 3j. syrup. viol. iuiubini, ana 3j. b. misce. Quibus remediis pristinae sanitati restitutus est.

SCHOLIA

4. **H**ec inflammatio pulmonis biliosa erat, proinde accedens ad pulmonis erysipelas, quod & sitis & deliria, tum alia in obseruatione dicta indicabant. In erysipelate magis vruntur; & saepe in phrenitidem mutatur, vt euenit Ioanni Henrico Statori Alemariano, qui & perpetuo delirio moriebatur. Non solum haec, sed & biliosa exitialis habetur; quamquam hic procurator euaserit, cum in 14. egregie sudasset: solet enim hic morbus magna ex parte solui sudoribus, vt iuuenibus fluxu sanguinis narium, larga & frequenti exspuione; & ita in muliere illa iuuenicula quoque (de qua egimus obseruatione XLV. huius libri) menstrua purgatione pulmonia finiit. Ita & puto etiam solui haemorrhoidibus fluentibus, signis coctionis prius in sputo & vrinis apparentibus, & debite in diebus decretoriis contingentibus. Ex quouis igitur redundante fiat succo id genus morbi (inquit Celsus) plus periculi quam doloris habet. At si creatio flaua non mul-

to permista sanguine inter initia excernatur, salutaris admodum pulmonis inflammatio est; si 7. die pigriusue, minus secuta est, eodem Hippocrat. auctore 2. prognost. Quae vero peripneumonia cum virtutis imbecillitate fit, perniciofa est, Galeno teste 3. prorrh. & 10. method. medend. namque vna salus, tum pleuriticis (vt ipse refert) tum peripneumonicis, adde etiam synanchicis, ipsum virium robur. Harum etiam partium, vt etiam citatur a Donato) inflammationes, veluti etiam ventriculi, & iecinoris, non modo iis, qui tam imbecillis sunt viribus: sed etiam iis, qui valentiores ipsis sunt, mortiferae esse solent. Si vero quid per tussim efferatur in peripneumonia, spumolum ac biliosum est, & aliquando cruentum, & floridum vehementer, vt Aetio placuit, quod etiam pessimae significationis existit: & si mortale quidem malum fuerit, vigilae amplius aderunt, aut somni breues, stuporem ac delirium inducentes, & imaginatione mentem vicissim perturbante, non sentiunt valde praesentia mala: extremitates frigidae, vngues limidi incuruantur: quarta aut ad summum septima die hi moriuntur. Verum si ad salutem permutetur morbus (vt idem fateretur Aetius) sanguinis eruptio ex naribus abundanter sequitur, aut alui exturbatio, multis exeuntibus biliosis, & spumosis humoribus. Verum licet Aetius dicat pulmoniam fluxu sanguinis narium terminari, Galenus 3. de Crisibus contrarium videtur docere, cum dicat: Contingit aliquando propter sanguinem e naribus fluentem phrenitidem fieri: non tamen lethargus aut peripneumonia fluxum sanguinis amat. Sed si quis attente dicta Galeni inspiciat, intelliget eum loqui de peripneumonia, quae a pituita fit, in qua sanguinis fluxio e naribus non conuenit. Sed in biliosa & sanguinea, prodest, vt in phrenitide; & argumento est Galenum de pituitosa intellexisse, ex eo quod lethargo coniunxit: lethargus enim pituitosa est inflammatio, in qua sanguis non ita euacuari debet, cum in deterius vergit post fluxum sanguinis pituitosae inflammationes. Sed in peripneumonia biliosa & sanguinea saepe fluxu sanguinis finitam vidimus. Preterea cum Aetius scribat pulmoniam terminari alui perturbatione biliosis multis excrementis, id videtur esse contra Aphorism. 16. lib. 6. vbi Hippocr. pronuntiauit a morbo laterali vel pulmonia habito, alui profluuium adueniens malum esse. Et licet ita se habentibus id soleat aduenire (Galeno dicente in eodem comento) non potenter hepate ad se trahere alimentum, neque conuertere in sanguinem, & quandoque ventriculo idem alimentum corrumpente: idem tamen Galen in mediocri morbo laterali atque pulmonia affirmat prodesse posse ratione euacuationis, & magis cum signa coctionis apparuerint inesse passionibus: neque adest timor, sed morbus est citra periculum. Sed in morbo vehementiori, nullo signo coctionis apparente, neque in sputo, neque in vrina, & cum venerit vi morbi, pessimum signum est: &

Qua inflammatio pulmonis perit, & quae magis salutem promittit.

6. Aetius cum Galeno de sanguinis narium fluxu in peripneumonia conuenit.

7. Quando alui profluuium malum sit signum in plenitudo aut pulmonia, quando vere non.

quando perseverat, pessimum quoque est, ratione curationis. Nam illa, quæ aluum retine, re debent, cum constringant sputum in pectore, retinent quod pessimum est: cum enim dulcibus & eclegmatis opus est, quæ expectorant, aluum magis fluidum faciunt, quæ in his morbis facile vires prosternunt, & minus conveniunt, fluxum irritantes. Quod si alia ex causa veniat, ut cibo aut potu aliquo, & non vi morbi, tunc eiusmodi profluviū alui non ita malum est: at malignæ peripneumonix superueniens, aut pleuritidis, lethalis esse solet: ut in muliere illa asthmatica & pituitosa valde crassa, quæ extra portam, qua Schidamum itur, decumberet, plusquam 50. annos nata, quæ in hyeme anno 1562. pleuritide pituitosa correpta esset, cui & portio bilis & atræ bilis admixta erat, ut ex sputo modo nigriusculo, modo flavo & subalbo, parum sanguinis mixto, constabat, cui vena secta quidem fuit in brachio e directo loci dolentis, & cum sanguis nigriusculus & valde corruptus fluxisset & limosus, pessimum signum erat, & plerumque mortem prælagiens, cum aliis signis malis: quod quidem ego longa experientia in praxi quotidiana animaduerti, præcipue vero in pleuriticis, pulmoniacis, & aliquando in inflammationibus hepatis & lienis, & in phreneticis, si sanguis demissus e vena corruptus, niger, limosus, tenuisque in fundo, & in parte superiori aquosus, corruptus, pituitosus, ac non nihil liuidus cernatur, neque ab aere externo congeletur, sanguine nullas fibras habente, qualis in lue Gallica subinde apparere solet. Talis enim sanguis in diuersa vascula receptus arguit maximam corruptionem, & humorum putrefactionem haud exiguan, & tandem caloris naturalis extinctionem, & in multis mortem ipsam. Est autem talis sanguis limosus in fundo, qualis est atramenti limolitas, & non congelatur aut crassescit sanguis, vndique liuiditatem & nigritiem habens, quæ non spissatur. Eodem tempore & alius pleuriticus extra portam habitans, qua in Hagam Comitum itur, cui similis sanguis e vena dimissus fluxit, & quinto die etiam sanguinis multitudo e naribus erumpebat, morbo nondum concocto, & vrina cruda existente (idque in die non decretorio) pessime sputo crudo vix exeunte, septimo die fluxu quoque ventris oborto, morbo crudo permanente, nono die obiit. Ita & alteri mulieri similis sanguis fluxit; etiam in nono obiit: quemadmodum & huic mulieri, (de qua paulo ante diximus extra Schiedamam portam habitanti) contigit: Quinto enim die febris aucta, sputa nigriora, vrina cruda in sexto: septimo vero die lateris dolor in totum evanuit, sed pectoris auctus; atque obtusi sensus, malis rubentibus in peripneumoniam pleuritide conuersa, superueniente fluxu ventris, cum foetida nigra, quasi partes pulmonis excerneret, viribus deiectis, in vndecimo facto prognostico obiit: Ceterum pulmonia tamen, si ex phlegmate fit, minus pe-

stifera est; verum diuturnior, sicut & exatrabile: biliosa vero, ut ante meminimus, exitior habetur, quoniam ocysus ad cordis penetralia pertingat vius: tum remedia foris intusue imperata minus proficiunt, frigiditate ante penetrationem fere evanida: nam hæc, sicuti erysipelatoides phlegmon, ex feruente oritur materia; & ideo inter acutos morbos enumeratur, qui quinto vel septimo die hominem interimit: quemadmodum euenit vxori lanionis Delfensis, quæ cum anno 1598. mense Februar. in biliosam pulmoniam incidisset, & me quinto die prius vocasset, cum nulla remedia admodum anno-

Historia mulieris peripneumonica in sexto occumbentis.

sa tentasset, & astantes putarent illam peste laborare, cum plurimi hoc tempore morerentur: hæc sexto die, cum prætermissa esset venæ sectio, & vigilæ tum deliria eam vigerent, mortua est. At Auicenn. ex mente Hippoc. testatus est, si in pulmonia appareant pustulæ circa mamillas & crura, & rumpantur, bonam esse significationem; materia ad exteriora conuersa. Sed intelligendum, modo minuantur accidentia maligna, & tales vel similes abscessus fiant circa aures vel inguina, modo post signa coctionis cum bonis signis appareant: at delitescantibus carbunculis febre acuta perseverante, pessimum pronuntiavit Hippoc. 2. prog. Vide egregia & plura de his 2. progn. alex. 64. donec perueneris in textum 69. in commentariis, quos Benedictus Fauentinus præceptor meus edidit. Sed & hoc his adiungendum, quod aquilonia tempestate pleuritides & pulmonia, iuxta apho. 5. lib. 3. magis oriantur: nam hoc tempore cum hic procurator, de quo diximus in obser. præcedente, decumberet, passim lethales pleuritides & pulmonia oriebantur; eiusmodi temporis constitutione per duos fere menses perdurante: quo tempore etiam euocatus Alcmarium ad Mariam sororem mihi carissimam, cum eam a pleuritide & aphthis curassem, in pagis vicinis vulgus referebat nouum morbum grassari, nempe pulmoniam & pleuritidem, ex quibus multi non satis tempestiue medicos consulentes, non nouo, sed veteri morbo, nempe pulmonia vel pleuritide, exstinguebantur. Si igitur a calida causa pleuritis eueniat, sanguis liberior detrahendus in sanguinea quam biliosa: attamen hæc ipsa neque in biliosa statim in principio negligenda: valent & clysteres secunda & tertia die lenientes & alterantes, vel in debilibus etiam glandes, si aluum non deponant: atque in hac opus est maiore extinctione, quam in pleuritide ob membri caliditatem & cordis vicinitatem; non tamen constringentia, ne sputum retineatur: ut est aqua melonis, cucurbitæ, & eclegmata ex muccag. sem. cotoneorum extrac. cum aqua viol. ʒj. & emuls. sem. 4. frigid. maior. ʒj. & zaccharo candi, penid. cum syrup. violar. q. l. ad formam loch, tenuissimo quoque victu vtendum (qui humectet moderate, refrigeret sine astrictione:) & quo acutior est morbus, eo magis ad tenuitatem debet accedere. Quare sint contenti cremore hordei,

Calide peripneumoniam curatio.

Sanguis dimissus, qualis in pleuritide, pulmonia & aliis inflammationibus magna ex parte mortem prælagiat.

6
Frigida &
pituitosa cu-
ratio.

hordei, aqua bullita cum syr. viol. vel de cucurbita in biliosa. Aluus si constricta sit, sollicitanda clementibus: sed solutius fortib. non irritanda; nam si fluxus ventris superueniat, mortem significat, & leuiter refrigerantibus & constringentibus sistendut cum iis quæ etiam sputum non impediunt, vt de pluritide quoque prius dictum est. Sed in biliosa exterius non applicentur emplastra, quia diu immorantia calefaciunt: sed potius vnctiones ex oleo violaceo conueniunt. Arculanus tamen in puro erysipelate ad epithemata confugit, ex aqua viol. cum pauco aceto. In frigida vero & præcipue pituitosa, magis incidentibus opus est; & sanguis in minori copia trahendus; & in senibus si mirior est, & post alios morbos, potius cucurbitalis secundum alios in emunctoriis inferioribus vtendum, ne sanguis ad partem affectam descendat: nam si pituitosus affectus sit ex morbo præcedente, frigidior redditur; neque concoquere neque expellere, ob virium imbecillitatem, possunt, iniiciendi & clysteres & decoctiones lenientes in principio. Valet decoctum hordei cum syr. capill. ven. aque multa, hyssopi decoctum cum ficibus, postea & pro cibo ius pulli: & topica debent magis esse attenuantia quam in calida ex oleo amygd. amar. irino. Postea & aliis topicis vtendum; de quib. vide Paulum & Aetium, & quæ Donatus commendat ac alii; & quæ Benedictus Veronensis cap. 40. lib. 8. scripsit valere in materia phlegmatica & melancholica.

OBSERVATIO XLVII.

De peripneumonia ex catarrho præcedente.

1 PETRUS BRONCKHORSTIUS, in Haga Comitum habitans, diu catarrho laborauit: quem parui faciens, febris acutissima cum horrore eum inuasit, & subito inflammatione pulmonis oborta, sputum cruentum magna cum molestia & anhelitus difficultate ac pectoris grauitate expuebat. Hugo Nieuenius Haganus medicus cum eidem assisteret, lectuarium linitiuum exhibuit ad feces communes expellendas: die sequenti venam secuit, & sanguis valde corruptus fluxit. Tercio die ego accitus sum: decoctum pectorale præscriptum, & eclegmata apta ad sputum facilitandum. Septimo die pessime habuit, & dolor latus occupauit: sed sacculi adhibiti ex milio, statim profuere. Die octauo accessit & alius quidam medicus Amstelredamus, cum autem in sudore esset, & melius haberet, nihil innouatum, quamuis decoctum agarici, rhab. & coluteæ cum pectoralibus propinandum proposuerat alius ille medicus: sed satis fecit colutea cum pectorali decocto; & secessum habuit. Nemo melius habuit, sed non satis purgatus: nodulum ex agarico, rhab. sene cum suis correctoriis in ceruisia infundendum per noctem, & expressum, libenter alius ille propinasset: sed quia debilis erat, & calor febrilis vehemens, cassia ab Hugone & a me proposita in bolo ad ʒj. deuorata est; & quinquies multa biliosa & pauca pituitosa excreuit cum alleuiatione. Duodecimo die cum eam rursus expeteret, denuo exhibita; & o-

ptime eduxit, & ita profuit, vt a febre liberaretur; & sputa sumtis ecligmatibus magis concocta procedebant, alba neque cruenta: & vrina cocta cernebatur. Decimotertio die & decimoquarto bene sudauit, & ex integro curatus est, cum a multis pro deplorato haberetur. Hinc in principio diætæ tenuis erat: & solo hordeato contentus fuit ad septimum diem: deinde ad panatam ceruisariam & poma deuentum: primo pro potu vtens ptisana, postea inclinante morbo ceruisia tenuiori: & post vndecimum diem victum auximus, & ad ius pulli, deinde ad oua sorbilia venimus; & per totum morbi decursum a vino abstinuimus.

S C H O L I A.

3 CVRATUR tamē peripneumonia, vt iam dictum est, vt pleuritis, missione sanguinis & alui deiectione & expectoratione. atq; hoc quidem interesse volunt (vt Rondeletius) quod in pleuritide rectitudo seruanda; in peripneumonia ex vtraque parte fluit sanguis. Differt etiam (eodem auctore) quod in peripneumonia prima detractio minorem copiam, secunda maiorem requirat: & si in aliquo morbo, in hoc copiosa facienda est detractio sanguinis, quia affectus magnus est & circa cor positus. Fit tanta defluxio vel attractio sanguinis, tum ob cordis calorem, qui De vena sectione. trahit, tum ob venarum frequentiam, tum ob sanguinis tenuis copiam, quæ in cordis sinibus esse solet. Ob partis affectæ dignitatem, & interni affectus magnitudinem, trahendus est sanguis, si fiat a sanguine vel bile naturali; in pituitosa, vt dictum est, minus. Ita & Celsus & Paulus dicunt, statim venam secandam esse, ex quacunque causa ac quouis modo genita sit peripneumonia; idque in cubiti externa ac ex vtroque brachio, si vires admittant: quamquam Paulus ex aliis morbis si obrepat & diu in statu fuerit, & sanguis in principio dimissus sit, detractioem dissuadeat; ita vt videatur Aetii ac Celsi sententia discordare: minime quidem, cum Paulus non prohibeat, si diuturnus morbus fuerit & inter initia sanguis dimissus, sed quod vires imbecilliores prohibeant; vbi enim valent, id etiam licet. Sic ego quondam feci in peripneumonia, quæ ex se ipsa incepit, in quodam lictore, qui faciem rubram pustulosam ob crassæ ceruisiæ potum habebat, & ex nimia ingurgitatione in eam inciderat, & ex suis combibonibus quendam empiricum ad se vocauerat, & potionem infra supraque multa deturbantem acceperat, tum alium tonsorem ad se vocauerat, prætermissa venæ sectione, nescio quæ medicamenta ebibens, cum res ad restim deuenerat, vndecimo die ad illum accitus sum; viribus mediocriter adhuc constantibus, cum sputum cruentum esset, venam secari iussi: deinde aptis remediis 17. die sanitati restitutus fuit. Quidam Cucurbitula vero si quid venæ sectionem prohibuerit, thoraci cucurbitulas ad mouere iubent, ac lateribus defigunt, quibus tantum sanguinis eliciunt quantum vires ferunt, vt Paulus facit: vel acri clysteri aluū subluūt, melius in principio emollient: quibus si morbus non cedat, leuiorib. purgationibus

Quomodo
aquositas in
pulmone vel
thorace con-
servata edu-
cenda.

Quomodo
bothor in pul-
mone cure-
tur.

vtuntur, & ecligmatibus & decoct. ad expuitionem, adhibitis topicis digerentibus & discutientibus, de quibus satis dictum est, tum de pleuritide, tum paulo ante. Sed aquositas illa, de qua prius pulmoniam, quæ in pulmone vel thorace collecta est, iis remediis educenda quæ aquositatē educūt, uti est succus ierosolymitanus ad 3 y. cum aqua mellis exhibitus. Si autem in pulmone bothor vel alia pustula parva vel apostemata generentur, ut alia apostemata & uti peripneumonia vel pleuritis sanguinea curatur: interea propter paucitatem materiæ & paruitatem eiusdem est facilis curationis & citæ terminationis: quanquam ut plurimum eiusmodi apostemata parva, vel tumores suppurētur: & ideo ipso erupto regendus erit æger diligenter cura ulceris, ut prius de pleuritide diximus in suppurationem versa: & accuratissime sunt repurganda, ne aucto ulcere ad malignitatem conuerso in tabem transeant: quod neq; mirum alicui videbitur, cū ex eiusmodi parvis tumoribus in abscessum transmutatis phthisis subinde orta sit; imo ex variolis pulmonem occupantibus tabidos quosdam factos vidimus. Et ideo magis ad honorem medici, tum ægri utilitatem pertinet, tales morbos plus periculi posse adferre, neque eos parui facere, ut & ipse diligens ac prouidus, quo suis sinistros euentus præmeditans, omnib. symptomatibus succurrere possit; ne id quod stolidis cōtingit, ubi mala subito irrepunt, dicant se hoc non putasse: est enim homo omnium animalium præstantissimus, quæ sunt infra concavum orbis lunæ, qui semel occumbens denuo non reuiuiscit, nisi in nouissimo die. Ideo omnibus modis operam dabit peritus & pius medicus, ne pleuritis aut pulmonia (de qua nunc agimus) in suppurationem tendat; omnibusq; modis resolutioni operam dabit: si tamen suppuretur pulmo (cum facile in vomitum transeat) ilico iuuanda erit, ut cito rumpatur vel aperiatur, ut rupto abscessu citius repurgetur, ne in tabem transeat: quod etiam prius dictum est de pleuritide ad suppurationem tendente & in eam conuersa.

OBSERVATIO XLVIII.

De empyemate seu suppuratione.

Adolescens Hornanus, nomine Ioannis Garbrandi insignitus, cum annum 23. ageret, vulnusq; illi anno 1551. 29. die Mensis Maii inflatum in parte pectoris anteriori, eoq; vulnere nō satis repurgato & nimium cito consolidato, puris collectio paulatim facta est in pectoris concavitate, ut aliquot mēsisbus quotidie pus, ad extremam maciem reductus, exspueret. Circa 12. diem Septē. materia copiosa in vnum latus magis collapsa, dolorem & angustiam inferebat; duobus medicis tū chirurgus præsentib. falsa opinione deceptis, pleuritidem esse iudicantibus. Sed secta vena & fotu adhibito, tum aliis remediis nihil profecerunt, dolore magis augescēte & anhelitus difficultate. quare pro deplorato ægrum habuere, quem & eucharistia & extrema inunctione muniendum esse duxerunt. Cumq; ob purulentiam etiam hæctica

febre consumeretur, & vigiliæ vrgerent, semper in lecto erectus manebat; alioqui præ nimia copia puris suffocari videbatur. Decimoquinto Decembris die ipse Hornam accitus, toto pectore nudato iuuenem inspicio; & animaduerti cicatricem ex vulnere inflato, & ut locum mihi affectum monstraret rogo: & cum tangerem, repperi etiam foris tumorem (qui quatuor aut quinque digitorum crassitudine in eodem loco distabat a vulnere in tempestiue curato) intra costas apparentem, ut simul etiam puris fluctuationem per sentirem. quare hoc totum malum a vulnere ortum habere dicebam, nulloque modo pleuritidem esse: neque posse curari nisi locus ille tumidus inter costas latim scalpello aperiretur; alioqui pure non effluente, agrum suffocatum iri, neque ægrum per tres dies posse superuiuere. Prima vice neque æger neque astantes vel amici hoc genus operationis admittere volebant, medicis præsentibus nimium meticulosi id etiam primo dissuadentibus: sed rationibus explicatis, cum Paulus, Aetius, & ante illos tum Hippocrates, tum Galenus hoc suadeant, antequam pulmo corrodat, nullum aliud quam hoc superesse remedium, tandem admiscere, & idem mecum faciendum censebant. Facta tamen prius inter nos consultatione, num id uestione vel cauterio aut scalpello peragendum, cum prædicti auctores, & præcipue Arculanus, de his omnibus mentionem faciant, quāquam tutius & citius eorundem auctoritate, tum Auicennæ, posse fieri scalpello, oratione satis longa demonstraverim: ita ut in hanc meam quoque sententiam irent, cum & Benedictus Veronensis *ib. q. cap. 26.* idem probet. Tumorem itaque scalpello aperiri iussimus, pure per vices albo (quod bonum erat) effluente, ne vires deficerent, præscriptisque decoctis quæ pus intus repurgarent, reliquam curationis, ut tandem vulnus occluderetur, Chirurgus reliquimus; & ita his optimis præsidis sanitati reueritus fuit: quanquam postea Chirurgus longo tempore, cum vulnus occludere non posset, tanquam in fistulam vlcus propter longam puris fluxionem & ob debilitatem partis mutatum est: nam per semi-annum & ultra pus ex vulnere fluxit antequam consolidaretur, cum diuersi chirurgi frustra consolidationem tentarent. Quare cum denuo me accederet, consului ut victu exsiccante vteretur, & decoctis etiam ad fistulam facientibus, ex agrimonia, pilosella, centaury minore & capillaribus aliisque remediis aptis ad fistulam; de cuius curatione videas Arculanum & alios auctores: his probe conualuit; cuius quidem curatione haud exiguum adeptus fui honorem, cum ab omnibus pro deplorato haberetur. Deo habenda laus, qui suis gratiam impertit sanandi.

SCHOLIA.

Similem vero casum ponit Amatus cent. 1. curat. 61. de muliere nobili, empyemate laborante; pro cuius salute cum in consortio doctorū hominū esset, consultū fuit, ut inter tertiā & quartā costā sectio fieret: a qua mulier bene habuit. in qua Arculanum reprehendit, qui præcepit, quod

quod inter quartam & quintam fieri debeat. Neque hoc nouum genus est curandi: cum Rondeletius cap. altero de purulentis, sub finem, de iuvene quodā a se liberato narret, qui per annum pus in thorace collectum post pleuritidem gestauit, & quasi absumtus erat; qui tamen vltus fuit, & per vltus pus purgatum: Adhuc, inquit, superest, & dicitur Salomon: sicuti & multi quorum nomen supprimo. Et hoc de suppurationis vnum theorema addens: Omne pus factum & in quacunque parte collectum expurgandum esse. Quod per emissarium a natura institutum expurgandum, siue trahendum & faciendum, vt in abscessib. partium, aperitione facta, vel ruptura, vel phlebotomo. Si sub craneo, trepano; in ventre, punctura. Si in thorace punctura vel vltione: punctura melior est, vel, vt nos fieri iussimus, scalpello. Quod si hæc pati quis noluerit, tanquam deploratus (vt idem ait) prognosticis relinquendus est. Ita & Æmilius quoque medicus insignis Alcmarianus, Alcmariæ ante me praxin exercens, quendam Nicolaum Dellium ex vomica in pectore laborem & in thorace suppurationem habentem facta incisione curauit. Hanc formam curandi describit Gal. comment. Aph. 27. lib. 6. & eam fortuna inuentā esse aliqui putant: nam miles quidam cum de sua salute desperaret, ad bellum accessit, & ab hoste punctim læsus est in thorace: pus fluxit, & liberatus fuit. Ceterum *Purulentos* vocant Latini, quos Græci ἐμπύους, communiter eos, in quorum corpore vniuerso pus est conditum: proprie vero medici solent vocare eos, qui in thorace & pulmonibus pus habent; ex quo tabidi fiunt, nisi cito excernatur. Morbus qui a Græcis ἐμπύημα, a Latinis Suppuratio, seu Purulencia dicitur (& propterea qui hoc morbo laborat. ἐμπύκοι καὶ ἐμπύοι Græce, Latine vero Suppurati & purulenti appellantur) non vno duntaxat modo in Hippocratis & Galeni doctrina intelligi debet: nam interdum significat omnem transmutationem, quæ fit ad pus, in quacunque parte fiat; vt patet Aphor. 8. 5. & 45. lib. 7. & 2. & 1. Prognosticon: interdum vero solos eos, qui in thorace ac pulmone vniuersū pus cōtinentum habent (prius tamen prædictis partibus inflammatione affectis) *Purulentos* nominant: vt dicatur suppuratio hoc modo transmutatio seu alteratio prædictarum inflammationum ad pus, vt antea quoque dictum est; vt etiam liquet Aphor. 8. lib. 5. & 2. Progn. Tertio significat illam quæ proprie dicitur Suppuratio; non siquidem conuersionem inflammationis lateris seu pulmonis ad pus, sed collectionem seu effusionem puris in spatio, thoracis atque pulmonis intermedio post prædictæ suppurationis disruptionem. De ea igitur agemus, non de primo, sed de iis, quæ pus in spatio thoracis inter thoracem & pulmonem habent: etiam per transennam de altera, licet non proprie dicta, suppuratione, aliquo modo faciemus mentionem, quamuis de ea diximus scholio obser. 40. huius libri, cum de pleuritide loqueremur in suppurationem conuersa, quæ tamen non præcipue suppuratio aut purulencia proprie dici possit. At

in vere purulentis perpetuo thorax afficitur, præsertim secundum eius cavitatem, hoc est, inter mediam regionem, quæ inter thoracem atq; pulmonem est: quapropter angustiam sentiunt laborantes loci illius, pure repleta intermedia ea regione: Pars affecta. acciditque eis anhelitus & difficultas ac tussis; & in imo thoracis grauitas quædam sentitur. Verum si nondum pus in idem spatium effusum sit, sed vniuersum constiterit in parte prius inflammatione affecta, pulmonem, aut subcingentem membranam affectam esse dignoscet, ex præcedente peripneumonia, aut pleuritide, quæ haudquaquam adhibitis præsidiiis discussa fuerint. Præter hæc si in pulmone pus contineatur, & in vtraque parte potius, quam in altera, dextra scilicet & sinistra, pus colligitur, in vtriusque incidens, veluti quoddam onus persentiscit æger, & æque calidæ ambæ partes sentiuntur, neque ægrus, aut promptius in vno latere, quam in alio cubabit: si vero in altero latere tantum fuerit suppuratio, in altera quoque parte thoracis, dextra scilicet aut sinistra, potius quam in vtraque, pus collectum erit: neque in dextra parte existens, in sinistram; neque contrario in sinistra, transire in dextram potest. Ceterum pars affecta cognoscitur, quia calidior est, quam reliqua, & in eadem quoque duntaxat dolorem seu grauitatem sentiet æger: & in eo incolume latus cubante, veluti onus desuper aliquod illi pendere videtur, vt apud Hippocratem atque Galenum *Suppuratio legitur 2. Progn.* Suppuratio itaque præcipue dicta, prius dicta quæ nihil aliud est, quàm collectio puris inter thoracem & pulmonem, vt prius diximus, morbus est in numero, toto genere præter naturam, ac in excessu, vt lib. De diff. morborum patet. At ea suppuratio quæ transmutatio est, seu conuersio inflammationis lateris aut pulmonis ad pus, cum eodem tempore fiat abscessus dictarum partium, morbus possit dici in magnitudine, velut quoduis aliud genus abscessuum ex Gal. sententia 14. Meth. med. Vtraque tamen morborum genera in numero scilicet, & magnitudine, sub vno prædicamento genere continentur, vtpote sub Quantitate, velut patet eodem lib. De diff. feb. Sed vt harum prædictarum suppurationum dignotio clarior fiat, eas separatim distinguere oportet; & quod ad suppurationem attinet, quam abscessum nuncupauimus, de ea satis dictum est scholio obser. 40. huius libri, cum signa huius suppurationis seu inflammationis, cum in abscessum vertitur, ibidem explicauimus, & principium collectionis & signa disruptionis eiusdem abscessus. Si longiorem sermonem de iisdem desideres, lege Donatum cap. proprio de suppuratione, & præcipue Benedictum Fauentinum præceptorem meum cap. 7. de suppur. in sua magna Praxi & paragrapho de signis demonstratiuis, qui hanc rem longiore sermone pertractat. At rupto abscessu, ac effuso pure in thoracem, ac pulmonem, tunc signa suppurationis proprie dicta apparent; vehementes febres quiescunt, & magna ex parte dolor quoque, licet indefinenter, vt prius quoque dictum est, febricitent, habituali quadam febre: grauitatis

Quot modis dicatur suppuratio.

De qua suppuratione hic tractetur.

Quis affectus præter naturam.

Suppurationis proprie dicta signa.

autem sensus remanet intus in profundo thoracis, si illic; transfluere aliquid apparet, iuxta multiplices reclinacionis permutaciones; & maxime cum ab uno latere in alterum decumbunt: tunc sane multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpe sensibiliter auditur, prout legitur apud Galenum lib. 4. *De locis affect.* & apud Aetium lib. 8. cap. 65. totusque thorax in eodem attollitur: & si neque calidus sit ipsorum spiritus, neque ex sufflundo emittatur, nisi adurens fortasse febris accesserit, ut idem testatur Galenus, potissimum ubi magna quantitas puris collecta sit. Educitur quoque eisdem pus nunc purum, nunc fæculentum, ut inquit Paulus. Ex pulsu item poteris diuersa suppurationis tempora interstingere (ut etiam a Donato citatur:) nam initio suppurationis statim suppurati pulsum habebant, qualem habere solent in vigore inflammationis; nam hoc tempore initium est suppurationis: erit itaque pulsus durior quam antea, & vibratus magis; sed minor, quam dudum, non tamē languidior, quin etiam crebrior, ac celer: nonnunquam etiam erit inæqualis & inordinatus: verum omnibus erit hecticus; quoniam perpetuo est illa in motu arteriarum agitatio, donec fiat eruptio; licet cum pus prope maturum sit, æqualior sit pulsus; cum vero eruptio fiat, languidior, latior, tardior & rarior pulsus redditur, ut lib. de pul. ad. tyr. & 4. de causis puls. scriptum est. Hippocrates vero eodem 2. lib. Prognost. omnes purulentos dignosci his indiciis fatetur: nam principio febris non dimittet, sed interdum tenuior, noctu vero vehementior est. Copia sudoris elicitur, ac tussendi cupiditas adest; quamuis nec quicquam commentatione dignum exspuant. Oculi caui redduntur, genæ rubent, ungues curuantur, digiti vero, potissimum summi, calescunt, atque in pedibus tumores existunt, procedente videlicet tempore; neque cibum appetunt, ac pustulæ circa corpus erumpunt: quorum omnium Galenus eodem loco causam reddit, ut apud eundem ad longum videre poteris.

OBSERVATIO XLIX.

De suppuratione ex catarrho prius orta, deinde in tabem lethalem conuersa.

Cum suppurationum diuersæ sint differentiæ, ideo & plures quoque causas habet, ut Galenus 2. Prog. comment. 57. docuit: nam ex inflammatione in pus versa & demum disrupta, siue subcingentis, aut alterius thoracis membranæ, siue pulmonis, fieri potest, ut de pleuritide & peripneumonia in suppurationem conuersa diximus; veluti etiam ex iam dictis liquet; ac etiam Galenus, Paulus & Aetius ac alii auctores testantur. Sed & propter sanguinis eruptionem, vlcere ad cicatricem non perducto oriri poterit, ut idem Paulus asserit. Sed & ab externis causis alterantibus, ut ictu, contusione, percussione, casu ab alto facto, vel ab obuiatione rei duræ, cum impetu & violentia membra thoracis lædente, fieri potest: & cum quæuis alia dolorem excitant, horum ratione humores toto corpore & potissimum a vi-

cinis membris ad thoracis locum læsum conflunt, teste Gal. 5. Aphor. comment. 53. & 3. qui ob membri læsi debilitatem relinquuntur ab opere nature membri, illicque inflammationem gignunt in putridum versi: qua inflammatione disrupta a die ruptionis incipit pus sensim aceruari in medio spatio inter thoracem & pulmonem. Et hic inodus est, quo suppuratio ab externa causa gignitur, quæ in thorace & pulmone fatigat: sed ab ea non sumitur indicatio curandi, nisi firmet causam præcedentem, cuius sunt actus & intentiones modorum curandi. Ex angina quoque (ut antea de angina diximus) cum ab ea ægri liberantur, & ad pulmonem vertitur, si non in septem diebus pereant, sed eos effugerint, suppuratio fit; quemadmodum Aphor. 10. lib. 5. ab Hippoc. & Galeno scriptum est. Sed hic meminisse oportet, quod ab angina & a peripneumonia suppuratio in utrumque fere capacitatis latus influit; a pleuritide in alterutrum duntaxat, in id quippe quod dolore vexatum est. Quandoque etiam per consensum a pulmone disrupta vena (ut sæpe in praxi vidimus,) exspuitur enim sanguis primo, & inde pus, iuxta Aphor. 15. lib. 7. a sanguinis sputo, pariter sputum; indeque suppuratio fit. Quæcunque vero prædictarum causarum suppurationem excitauerit, haud ægre dignosci poterit ex propriis eorundem affectuum signis: ut si pleuritis, aut peripneumonia, aut sanguinis eruptio, aut vulnera, offensiones, seu angina præcesserint. Ex confluxu etiam e capite ad thoracem manante (ut Paulus asserit) ortum ducit quandoque suppuratio; seu (ut inquit Aetius) ex seroso aut pituitoso humore, ex reliquo corpore in vacuum thoracis delapso isticque putrefacto: id quod confirmari videtur ab Hippocrate simul atque Galeno Aphor. 38. lib. 7. cum dixit Hippocrates: Destillationes in ventrem superiorem suppurantur intra viginti dies; & lib. 1. De morbo ab eodem Hippocrate, dum asseruit, suppuratos interdum fieri, cum pituita de capite copiosa & acernatim in superiorem ventrem fluxerit, quæ ibi putrescit & in pus vertitur: nec minus huius causæ notitiam habebis, si præcedentem destillationem considerabis, ac eiusdem signa pernotabis. De delapsu pituitosi præsertim & serosi humoris, multi dubitant, cum pus generetur ab inflammatione ex effusione aut collectione puris in thoracem & pulmonem; aut ubi contusa caro fuerit, aut ex humore, qui phlegmonem produxit (ut 5. de simp. med. facult. & 1. de diff. feb. de generatione puris per inflammationes & phymatoses) tumores omnes superante quidem natura, quemadmodum in humoribus intra vasa putrescentibus, id quod subsidet in vrina, proportionem puri correspondet: respondent similis puri reddi, & non in pus verti. Vel erit non immediata, sed mediata causa suppurationis, destillatio. Sic nouimus mulierem & uxorem cuiusdam ceruicarii, ex catarrho subito in pectus collapsa ibique putrefacto tandem (cum statim non adhiberet apta remedia) ad suppurationem deuenisse, & per aliquot annos quotidie magnam copiam puris

10
Quales sint
suppuratorii
pulsus.

2

3

4

puris in concavo pectoris diu morantis tussiendo expulisse, & tunc varios medicos consuluisse, nihilque confecisse, donec per octo annos pus continuo extussiret, pulmone quoque corrupto & exulcerato; ut ita miseram vitam trahens ex tabe obierit. Hanc autem suppurationem ex cararho cap. proprio De causis suppurationis præceptor meus Benedictus Pauentinus fieri dicebat per consensum, magis autem senibus asthmaticis tussi & destillationibus obnoxius, cerebri vitio etiam consentiente.

S C H O L I A.

5 **Q**uidam vero fieri suppuratos volunt, si pituita ex capite distillat ad pulmonem, ex qua temporis progressu exasperatur pulmo, & intus exulceratur a pituita inhaerente, ac putrescente, ut visum fuit Hippocrati lib. De morb. 1. quos tamen aliqui potius tabidos vocari volunt, quam suppuratos. Ceterum in suppuratis diligenter signa prognostica sunt examinanda, cum aliqui ex suppuratione vel paulatim vel subito pereant ac suffocentur, & quod plurimum suppurati pereunt, & nonnulli eorum supersunt: Potissimum vero hi supersunt (ut inquit Hippocrates secundo Prognosticorum) quod febri eodem die dimiserint post eruptionem, ac cibum citius appetunt, & si liberati sunt, & venter exiguae ac consistentia deiecit, & pus album leni, concolorque est, ac vacans pituita, & absque labore ac valida tussi expurgatur: tale enim pus, quoniam optimum est, futuram suppurationem indicat valetudinem, & quod valida tussi pus expulsum, id indicat thoracis facultatem expultricem supra morbum & causam validam fore, & materiam eidem obedientem, & vias ad propulsionem patentes & paratas; & ij quoque supersunt, quorum spiratio & reliqua accidentia mitigantur. At horum quibus alia adueniunt, alia non, ij partim in malo tempore incolumes euadunt: verum ex iis iudiciis omnibus, quæ in iis existunt, de ceteris quoque vniuersis coniecturandum: nam qui prioribus iudiciis omnibus tentatur, procul dubio celerime liberatur. Ita optime quidam sic ac celerime vindicantur, quibus ad hæc proxime accedunt: moriuntur vero ij, quos febris non deserit, aut cum videatur delerere, denuo recalescens, innotescit, & siccant, nec cibum appetunt. Alius humida est, pus viride liuidumque spuunt, vel pituitosum spumosumque: pereunt ergo si hæc adsint. Quod autem pus nigrum ac viride 2. prædict. tex. 63. malum sit, eo quod natui caloris est inctionem, & offensæ partis corporis mortificationem significat. Seniores quoque suppurati ob facultatem expultricem debilem non restituuntur. De iis vero suppuratis, ac purulentis, qui ex pulmonia fiunt, eodem 2. Prognost. Hippocrates sic scriptum reliquit: Quod si maiores natu fuerint, potius intereunt: per alias vero suppurationes, minores natu potius moriuntur. Etenim (ut inquit Galenus in commento, & citatur a Donato) purulenti ex pulmonia, quia propter excreationem sanari debent, viribus propterea egent validiori-

bus; & ob id potius minores natu, quam maiores seruantur. In ceteris vero suppurationibus iuniores natu antea moriuntur, propter vehementiores dolores ac febres, quæ magis dum suppurationes fiunt, illis accidunt: quo fit, ut propter magnitudinem febrium ac doloris, morte præoccupentur. De iis vero qui ex morbo laterali suppurantur, talem protulit sententiam Hippocrates, ut prius quoque dictum est, Aph. 15. lib. 5. Quod si in quadraginta diebus purgantur, a qua fit eruptio, liberantur; si vero non, ad tabem transcunt. Conuersa autem inflammatione lateris aut pulmonis in suppurationem, rumpitur nonnunquam sursum versus, quando etiam periculosior est, Aetio & Paulo testibus: aliquando vero deorsum, ut antea quoque diximus: si sursum, & non quam citissime pus per sputum reiciatur, tabidi fiunt, Aetio teste; & Paulus id idem confirmat, nisi eisdem summa adhibeatur diligentia, protinus purulenta illa collectio tabem accersit, pulmone exulcerationem contrahente. Quæ vero suppurationes inferius tendunt, rumpuntur, non adeo periculosa existunt; cum in aluum & intestina (ut antea quoque diximus) aut in vesicam transfundantur per vasa quadam, transmissione ad eam membra facta, ut differtissime Galen. 6. De locis affect. & comment. Aphor. 30. lib. 7. docuit. At suppurati, quibus propter magnam puris copiam inter thoracem & pulmonem collectam totus thorax in respiratione attollitur, celerime suffocantur ex Galeni testimonio. 4. De locis affect. Tum ob affectum ipsum, ut ipse refert, tum quod vires omnib. suppuratis defessæ (siquidem propter pugnam ex necessitate) imbecilliores redduntur. Quod ad curationem attinet, quomodo illi curentur, quibus suppuratio incipit, diximus prius si holiobser. 41. huius libri, & quomodo puris confectio seu concoctio sit iuuanda, & ita fomentis per spongas natura, ex Paulo, adiuuanda, nempe hydrelæo; etiam farina triticea pura aut pane puro modice cocto cum hydrelæo, adeps suillus, vitulinus, gallinaceus, seu anserum cum malua seu althææ radice permixtus: vel cataplasma ex caricis decoctis in retardantibus suppurationibus, hordeacea farina, althææ radice, columbino stercore, & modica resina therebinthina, ex Paulo & Aetio: & cerata ex butyro, ruta, uide, bacis lauri, & Aetius iubet, adiectis radice malua althææ, & adipe, prædicta farina hordeacea, triticea, oleo communi, amygd. dulc. chamæmel. & cera adiecta. Formulas horum & cataplasmatum & emplastrorum vide apud Rondel. cap. altero De purulentis, & alia quæ intus dantur hoc tempore & decocta & eclegmata. Quæ autem pure genito competant, eodem scholio obs. 41. Quæ compant purigenito.

Signa prognostica.

Quæ puris i generatione opitulentur.

rubio, idque crebrius. Conducit quoque non parum ad abscessus rupturam, super sanum latus decubitus. Pluribus cibis & falsis ac pinguius & vino austero utendum, & tussis inducenda ex Hippoc. lib. De locis in homine, & excretionem facere oportet. Extra, iuxta etiam confert cataplasma ex solo stercore caprino praesertim ubi ruptura tardaverit. Verum rupto abscessu adiuuare oportet puris excretionem, quocumque repere cognoscatur, ex decreto eiusdem Aetii: si ad alium, magis emollientia danda; si ad vesicam, ea quae urinam ciunt: si per tussim puris repurgatio fiat, ut loco citato antea diximus. Valet ptisana cum melle mixta, & iuxta Paulum hyssopi, iridis aut dulcis rad. decoctum in mulla diluta, & Aetius quoque sentit, & radicis dulcis succus commanducatur. Aetius ea quae urinam ciunt, cibis commode mista laudat: contra Galenus nimis acria medicamenta urinam cientia, aduersa scribit puris ex thorace exspuitioni, lib. 5. de simpl. medic. sed intelligendum quae minus calida, & acria sunt, etiam in cibis administrata, nempe humidis, iuxta Aetium prodesse, & cum potionibus & sorbitiunculis. At ubi diuturnior affectus & vires imbecillae, & calor febrilis moderatior euaserit, neque thorax multum puris contineat, iuxta Alexandrum lac dandum, asininum praecipue, ubi sordidum, ac foedi odoris pus expurgatione indigens existat; post ipsam, equinum; & tertio loco bubulum & caprillum, calculis fluuiatilibus candentibus iniectis coctum. Sed de his plura, cum de ulcere pulmonis ac phthisi agemus. Reliquam victus rationem quae suppurationis conuenit, apud Paulum & Aetium inuenies, & praecipue apud eundem Alexandrum Trallianum, qui copiose de hac rescripsit.

OBSERVATIO L.

De suppuratione a sanguinis sputo.

Dictum est prius ex Aph. 15. lib. 7. ex sanguinis sputo puris sputum malum. Dicit Galenus in commento, neque omne sputum sanguinis sequens habet sputum purulentum: sed quod malignum existit. Tale autem omnino est ex pulmone: tales vix euadunt, cum omnes, ut saepe in praxi vidimus, ad tabem perueniant & moriantur. Et quanquam Galenus dicat ex pulmone id fieri, non negat tamen ex vena thoracis perrupta vel erosa posse euenire, & intus erosa vena vel perrupta, sputo sanguinis postea succedat empyema vel suppuratio. pure in concavitate pectoris coacernato. Nouimus enim quendam annorum circiter 35. ex sputo sanguinis, ex vena pectoris exesa, in tantam suppurationem deuenisse, ut subinde, integram peluim puris foedi odoris, ac sordidi exspueret: qui tamen nostra industria euasit, praeter omnium hominum opinionem, qui eundem salutandi causa inuisebant. Iubebam ut aeternum sic in calido & frigido temperatum inhabitaret, vel paulo ad calidum vergentem, quem & in quiete diligenter custodiui: cui & imperavi ne motum aut exercitium iniret, sed potius somno temperato uteretur, ac singulis diebus excrementa ex-

cerneret natura, vel arte, si per aliquot dies dura maneret, clystere praesertim leni: namque exonerata natura ab eiusmodi excrementis, promptius suppurationi vacat, expurgando. Deinde ut immodicas animi affectiones vitaret, consului; praesertim vero metum & tristitiam. Pro nutritione, cum debilis esset, ptisanam succum dedi, & mullam, non vniuersim sed paulatim, & totam ptisanam & cremorem cum iure gallinarum seu pullorum gallinaceorum, phasianorum, aut perdicum, & columbarum, ut vlcer magis detergerent, ventrem humidiores efficerent, modo thymo, hyssopo aut feniculo adiecto, brassica subinde aut asparago: & ut carnes eorundem animalium ederet, concessi. Potus erat aqua hordei vel mulla: aliquando vinum (licet febris habituali laboraret, sed non valida) ad dulcedinem declinans, lymphatum cum aqua hordei, vel admixto saccharo candi, si dulce non adesset. Iridis radicem, hyssopum cum melle decocta & ficibus, adiecto syr. capill. ven. hyssopi, & marrubio ad magis abstergendum dedi. Nam ad pus foedi odoris & si sordidum exspuitur, fenugraeci cremorem cum palmulis pinguibus decoctum Aetius propinat, & horum inopia ficus siccas modicas incoquebat. Lac asininum etiam ut daretur consului, quod & sordidum ac foedi odoris pus (ut ex Tralliano antea diximus) egregie expurgat: sed cum deesset, eius loco caprillum dedimus, cum febrilis calor moderatior esset. Atque his & similibus praesidiis curatus fuit.

SCHOLIA.

Hic tantum copiam puris (ita ut in aliis suppurationibus saepe vidimus) saepe extulsi, ut singulis fere diebus diuidiam peluim impleret. Imo multos vidi tantum puris effusse, ut tota peluis ad puris exspuitionem vix sufficeret. Quod miris quis mirabitur si locum Galeni 5. de locis affectis, de suppurationis aduersus Erasistratum perlegerit, cum velut non paucos perire, ita & alios complures seruari viderit Galenus: quorum si quis per singulos dies reiecti puris quantitatem collegerit, interdum sex aut octo heminas, interdum quindecim, atque interdum plures totam summam aequare inueniet. At suppurationum per exspuitiones purgationem eodem loco Galenus explicat: namque exspirationis tempore, inquit, vniuerso thorace vehementer constricto per validam tussim (si ne qua fieri nequit,) pus quod inter ipsum, & pulmonem continetur, comprimendo cogit, atque pulmonem ipsum impellit, concedente pulmone membrana, eiusdem puris, ac similiter cuiusvis alterius excrementi penetrationem. etenim thorax vehementer admodum hoc tempore pulmonem omni ex parte comprimit: & demum cum & maiores sint in earum extremitate asperae arteriae partes, quam venae & arteriae lenes, ac multo ampliora habeant ora, nec ita concident, neque omnia concludantur, propterea quod cartilagineae sint, in asperas ipsius pulmonis arterias recipitur, & non in lenes, ac venas, & deinceps exspuitur. Hac satis de curatione suppurationum: plura de his vide apud

Quae compo-
sant medi-
camenta sup-
purationi
propriis di-
stributa.

10

2

3

Cur tanta
copiam puris
suppuratis
reiciatur.

4

de apud Bened. etum Veronensem lib. 9. cap. 22. & 23. De remediis quibus veteres medici ad purulentia usi sunt, sic et cap. 25. addit curationem quæ manu fieri solet. Inter costas, inquit, scalpello infixæ vomica subito aperitur (ut nos fecimus obser. 48. huius libri) idque a medicis laudatur plurimis. Hippocrates inuri docuit, tuto experimento: sed cauendum est, inquit, ne plurimum puris subito effluat, ne anima deficiat; atq; id remedium tempestiuum esse debet, antequam pus pulmonem erodat: sed si latus sinistrum ferendum est, cordis vicinitas cauenda. Si in utroq; latere vomica fuerit, utrumq; latus, non tamen eodem die, perforamus: ab eo tamen incipiendum est, quod magis tumet. Idem in pectore medio fieri quidam iubent, & deinde quæ ambustis profunt, imponenda sunt. Demto pure, vomica eluenda est mulso aut hydromelite, donec perpurgetur. Hæc ab Articulano mutuatus est.

OBSERVATIO LI.

De suppuratione seu vomica totius pulmonis.

Pulmonem exulcerari nouum non est, sed totam eius substantiam in pus conuerri, & nihil aliud quam pus esse, & sola membrana succingente pulmonem contineri, ut in cavitatem ea minime rupta defluerit, id rarum esse existimo. Id equidem euenit Domino de Abbenbrouck æconomo tunc existenti Regis Hispaniæ ac Angliæ, qui cum longo tempore catarrho acri in pulmonem collapsio, tabe consumtus in domo Regia in Haga Comitum decubisset, variis affl. & symptomatibus, potissimum arthritidie & gonagra, renum calculo, & pulmonis vomica: varia sunt præscripta remedia per duos medicos Haganos: atque iis nihil proficientibus, dum & hectica febre consumeretur, ego tunc Almaria habitans, ad eundem accitus, primo Ianuarii die, anno 1555. perueni. Tunc nihil nisi ossa pelle circumducta restabant: cum nulla medicamenta iuuant, dudum facto prognostico quod moreretur, ultra mensis apud eum hæsi. Cum alium medicum ablegasset, & alter ipse morbo detentus illum non amplius iuisset, solos in curatione permansi. Sed paulo ante eius mortem lotum ad quendam medicum transmissum, cum ex hepatis debilitate potius quam ab abscessu per vnum aut alterum diem sanguinem per alium reddidisset, quod cum medicus intellexerat; quare iudicabat apostema in hepate latere: ita ut Domina de Abbenbrouck filia Domini de Bergen; merum alios medicos, qui paulo ante me egrum tractassent, ignauia accusauerit, quod apostema illud in hepate minus agnouissimus. Ego vero inquit bā (cum alii non amplius egrum accederent) Id autem post mortui incisionem minime reperietur, sed tantum malum esse in pulmone, & calculos aliquot nos inuenturos renibus ipsis infarctos: quod & postea incisionem demonstrauit. Nam 10. Februarii die mortuus est, ægens 48. annum: & cum Domina de Bergen, & uxor Domini de Abbenbrouck filia eiusdem Domini de Bergen, mihi cum chi-

rurgo iniunxissent, ut cadauer prius incisum a nobis balsamo (ut moris est) condiretur; corpore dissecto inuenimus pulmonem nihil aliud quam vomicam esse, & renes calculo infarctos: hepar quidem integrum esse, sed flaccidum, nullo abscessu corruptum, ita ut forte ante mortem organum sanguinis ex debilitate sanguinem retinere non potuerit: pulmo enim plane suppuratus & putrefactus, membrana integra existente, maculis tamen plumbeis & cæruleis interstincta: quam ipsemet digitis cum attingerem, perrupta membrana tanquam vomica magna, pus instar olei amurcæ erumpebat valde fœtidum & corruptum; adeo ut totus pulmo nihil aliud quam purulentia esset: quæ & mortis causa censenda erat.

SCHOLIA.

Hæc vomica totum pulmonem occupabat: sed vomica illa pulmonis, quem abscessum Lib. 5. cap. 1. exiguum pulmonis vocat Fernelius, ab hac plurimum distabat: nam Fernelius ita appellat puris in pulmonis parte aliqua collectionem, quod membranula propriaque cysti arcte adeo concluditur, vix ut quicquam de se tetrum in cor exspiraret. Hæc frequens est in tabidis; sed & plerumque sine tabe fit, quum sanguis ex aperta, rupta, aut exesa vena, in paruam quædam pulmonis regionem secedens, illic putrescit, sensimq; mutatur in pus, ac per summa siccescens, sibi cystim efformat. Latens profecto & in primis abditum vitium, sæpe nec laboranti nec medico notum, quo laborans ipse nec consueta munia intermittebat, nec se morbo teneri putat, causamq; interitus sui nesciens intus gerit sub pectore. Adole-

Historia Fernelii de vomica pulmonis.

5 Sed hæc quidem signa aliorum quoque affectionum communia sunt. Hactenus Fernelius. Sed vomica, de qua nos nunc loquimur, non erat in aliqua regione pulmonis, sed in ipso toto pulmone; quæ etiam ad suppurationem pulmonis referri potest: dicitur enim Vomica ab Alexandro Benedicto Veronensi a vomendo, cum virulentum quid vomat: & sub empyemate quoque continetur, uti aliæ omnes abditæ collectiones in aliorum viscerum partibus, pectore, iecore, liene, ac vulva, ut tradit Ægineta; quamvis proprie (ut ante dictum est) suppuratio collectionem in pectore notat. Differebat igitur a vomica ipsius Ferneli duplici modo, cum neque cystim haberet, neque tam exigua esset, neque sine tabe: imo hic phthisicus erat, non sine ulcere ipsius pulmonis, cum etiam pus cum pituita quotidie exscrearet, quod quidem vlcus suppurationem totius pulmonis induxit, manente intra pelliculam ipsius pulmonis pure: sed dissecto corpore, pellicula perrupta nil nisi pus effluxit olidum, ut quis in loco, in quo sectio fiebat, vix permanere potuerit. Atque hæc causa mortis fuit.

6 Sicut nec vl-
cus pulmo-
nis, ita neq;
eiusdem sup-
puratio per-
fecte curari
potest.

Siue igitur velitis vlcus appellare in pulmone purulentum, vel suppurationem pulmonis, mihi perinde est. Et quavis in principio, dum nondum quis febris in habitu laboret, qui purulentum vlcus habet, neque insibilis sit extenuatio, aliquando Galenus tentaverit curationem, tamen non semper perfecit. Est enim difficillima, nec de glutinatione spes est, ut aliqui somniant, qui ægrum eo curatione, quam imaginantur, deducunt, ut vlcus purgetur, & glutinetur, quasi id fieri possit sine tussi, & tussis non dilaceraret partes pulmonis, ut dixit Galenus. Si tamen siccemus id, unde & putredinem sistamus, tunc facile præservabimus corpus illud, ne interius labatur. Callosum ergo & siccum quo ad labra vlcus fiet, & velut sicca quædam labra habens, unde neque sanguis profluat, neque sanies, nisi recrudescat accidente aliquo. Quod si eius providentia semper habeatur, poterit sic diu perdurare; perfecte sanari est impossibile: quavis enim vlcus semper aliquid tenuis saniei transmittat, ut vetusta, & callosa vlcera facere videmus; id tamen exiguum est, neque tale, ut febrem accendat: & quidem vidi sæpe diu sine febre perdurasse. Tales autem priusquam magna accederet putredo & febris, imò cum vlcus purulentum sit, seu eius sit suspicio, Galenus ad Tabias mittebat omnes, cum a mari non longe absit hic mons, & modice editus sit, nec ventis nimis sit expositus, & humidis nebulis irroretur, nec e paludibus fluviisque proximis id accipere possit: ideo Galenus aerem eligebat siccissimum, quod maximum auxilium adferre putabat, cuiusmodi describit eum, qui ad Tabias erat: nam hic collis Tabiarum etiam hoc commodum habebat (ut & Massetanus collis qui Pisas Lucamque interiacet, & Florentiæ Vesulanus mons) quod consitus esset fruticibus & herbis siccis & odoratis, quæ ad sananda vlcera multam vim habent. Secundum remedium erat lac, vlcus abluens & detergens, ad

8 siccandum prævalidum, ex herbis depastis, quæ sunt rubi, arbuti, lentis, myrti, abrotani, cysti, hederæ, cytisi; quibus nullæ sunt, quæ æque siccant, & partem adstringant & roborent: ideo ad eiusmodi lac sunt mittendi. Et hoc primum quoque remedium est, quo vitur Rhases. Galenus præfert asininum, mox caprinum, cuius usum exposuimus, 4. lib. obser. nostrarum De feb. hecticis: facile nutrit, eo quod natura familiares succos celeriter vincat & trahat, & ob id illo ad extenuatos commodè vitur: & ideo veteres mulierem lactantem his, qui tabe consumerentur, astare voluerunt. Tertium remedium erant medicamenta vehementer siccantia, ut Theriaca, mihydrium, & laudant quidam zaccharum rose purpureis confectum rosæ: Vetus enim illud siccant, extergit, astringit, & non est calidum: unde potest aliis dictis admisceri ad contemperandum. Hic tamen multum obsuit has curationes miscere: neque enim omnia in omnibus laudantur; sed & multa prioribus nocerent, quæ subsequentes iuvabunt: de quibus etiam diximus de feb. hecticis. sunt enim quibus fibræ iam adest, & extenuatio, sed non confirmata, ad est, perfecta, quæ solida invaserit. Hic enim non modo vlceri attendere oportet, sed & fibræ hecticæ & extenuationi: quam obrem lactis vlus exquisitissimus hic esse debet, de quo satis superque diximus 4. lib. obser. nostrarum De febrib. hecticis. Sed & lactis vlus abunde est expositus 7. methodi & loco iam citato. Verum cum vlcus pulmonis tabem inducat seu phthisim, atque ea ipsa sit vlcerosa dispositio in pulmone existens, de ea nunc exempla quædam adducamus, quæ ad maiorem huius affectus explicationem, tum etiam curationem, plurimum iuvabunt.

OBSERVATIO LII.

De ulcere pulmonis & phthisi, ex sanguinis sputo prius male curato.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

scribit Rondelerius magna ex parte phthisim (quæ fit a sanguinis sputo, cum sanguis remanet intra pulmones, & illic putrefactus acquirit acrimoniam, qua erodit substantiam pulmonis, unde & vlcus eiusdem) evenire ob medicorum imperitiam sanguinis sputum curantium, qui nulla facta diversione, vel per sanguinis missionem, vel per ligaturas aut cucurbitulas, aut alio modo, statim dant potiones adstringentes, quæ sanguinem defluxum ibi retinent; cum debet potius aquam mulsam, aut poscam dare, & postea quæ constringant. Quod istis diebus evenit cuidam mulieri, quæ cum ita perperam per empiricum curaretur, in phthisim postea incidit, adeo ut nullo modo curari potuerit, cum tardius ad eandem ingressi essemus. Ideo quoties timeamus phthisin a sputo sanguinis, debemus ea usurpare (ut antea quoque de sputo sanguinis docuimus) post sanguinis distractionem & diversiones, quæ venam consolidant, vel sanguinem supprimunt, cum facultate dissoluendi sanguinem coagulatum; vel quæ per sputum pulmones expurgant, vel contraria commiscentes, tale medicamentum conficientes, quod vtrumque possit tum abstergere, tum venam consolidare:

solidare: cuius exempla antea posuimus, cum de sputo sanguinis egimus. Habes alias formulas huic rei accommodatas apud Rondelletium *ca. 12.* De ulcere pulmonis & phthisi: ubi etiam ad vlcus pulmonis curandum tum phthisin egregia habes medicamenta.

S C H O L I A.

3
De nomine.

Quamuis Cornelius Celsus (*ut ostendimus schol. 10. obseru. 97. De crurum atrophia libr. 10.*) tabem in tres species distinxerit, in atrophiam, cachexiam & phthisin; nos hic de tertia specie longe omnium periculosissima loquemur, quam Græci (ut idem Celsus inquit) *φθίσις* nominauerunt; quemadmodum Hippocrat. nonnullis in locis, præsertim *Aphor. 16. 7. libri*; licet hanc etiam Græci, potissimum Athenienses, (ut Galenus in commento refert) *φθολω* appellant; *φθούρι* quidam scribentes, per *υ*, a *φύσις*, quod est sputo, deducunt: alii melius (ut Iacchinus censebat) per *υ* deducunt a *φθω*, quod est absumo & corrumpo, quod vniuersos corporis habitus in his corrumpatur. Latini Tabem dixere, & Tabescentes & Tabidos. Quæ autem melior etymologia sit, patet. Non enim solum phthisis ad sputa cruenta & purulenta sequitur, sed ad alias causas, ut febres ardentes, & siccitates quarundam partium, quæ multam vim altricem tribuunt vniuerso corpori. significat igitur id nomen, morbum in magnitudine, & ab obeso distinguitur. Adest vero vna & alius affectus, nempe corporis siccitas; & erit similitarium sicca intemperies; atque his affectibus phthisis describitur: Est enim siccitas corporis. Sed pressius tum sumi videtur a scriptoribus, ut solum dicatur de ea siccitate, quæ vlcus pulmonis consequitur: alias vero Marasmos solos appellauit; ut marasmus genus sit, hæc vero species quædam, licet nomina id significant. Possumus & definire tabem vniuersam, ut Galen. facit. quod sit animantis vel etiam viuentis interitus ex siccitate, *lib. de Tab.* Tale enim quid his contingit, qui sic laborant, quale per naturam senis contingit: quæ etiam arefactio, inuitabilis est, ut Gale. docuit. *De sanitate tuenda.* Solidæ enim partes arefcunt; quarum humiditas propria restitui nequit. Est hæc siccitas modo sola & simplex tabes, cum actiue qualitates mediocriter se habent, modo cum alteri qualitati iungitur, idque bifariam: si calori, tunc torrida tabes appellatur; si frigori, ex morbo senium, quoniam sic afficiuntur, ut senes refrigerati, secundum partes omnes, & siccantur. Dicitur autem iuxta Iacchinum, secundum partes omnes: nec enim tabes de vna parte dicitur, sed totius est morbus: vnde necesse est, necessario principem partem, scilicet cor, affici. Neque enim potest vniuersalis aliqua intemperies euenire vniuerso corpori, nisi cor afficiatur, ut sæpe ait Galenus. Potest tamen hic morbus primo a corde ipso oriri; vel ab aliis partibus, quæ cor in consensum trahunt, ob vicinitatem, vel multam colligantiam, quæ partes a Galeno numerantur *10. meth. & 7. vti iecur, mox & venter, tum hoc, tum vicinitate.* Iecur autem citius siccatur in

consensum, trahit alimentum ratione: reliquæ partes, ut septum, renes, vicinitate vel colligantia similiter. A pulmone hoc modo tabes fieri non solet, inquit Gale. quod humida pars sit, nec facile ariditatem sentiat: quamuis id prorsus non neget, cum & vlcus patitur pulmo; & eius ratione potest facere, quod cordi calorem impartit, & tempore hecticam febrem facit. Ex istis iam dictis habemus morbi naturam, & causas: nam siccatio hæc totius habitus, modo solum affectum cordis sequitur, ut in febre hecticâ; modo ab aliis partibus siccitas cordi communicatur, ut in sicca ventris & iocinoris intemperie. Febris vero illa hecticâ alias insequitur vlcus pulmonis, ut Hippocrates inquit, A sanguinis sputo, puris sputu; a puris sputo tabes. Sed num ex aliis quoque vlcibus pectoris? Profecto ex fistulis pectoris diuturnis non sanatis id fieri vidit & Iacchinus. Sic & nos vidimus in milite in nosocomio Delfensi vulnerato in pulmone sæpe per fistulam in pectore multis annis pus regurgitasse, & ad extremam maciem deuenisse, & postea in tabem & mortem. Tum alium vulneratum in pulmone (*de quo mentionem fecimus lib. 2. obs. De feb. scholio obs. 27. de febre typhode*) etiam spectauimus, qui deinde vlcus obijt. Post eius obitum facta sectione, causam mortis inuenimus mediam partem pulmonis consumptam a pure. Et in altero vulnerato in eodem nosocomio qui ultra annum cum dimidio ibidem decubisset, etiam facta sectione post eius mortem, totam substantiam pulmonis (siue *παρέγχυμα*) in pus conuersam & paulatim excretam, membranæ pulmonem succingentibus in globum solum relictis, cor denudatum, sine pulmone, (dictum mirum) spectabatur. Quod paulatim ita per vlcus in pectore pus euomere vidimus, non solum ex fistulis pectoris eiusque vlcibus non sanatis & diuturnis; id quoque sæpe spectauimus ex fistulis aliarum partium, superueniente his hecticâ febre, quæ viscus ipsum exsiccat. Et 5. Aphor. 15, non alia ratione Hippocrates videtur dicere, quod ex empyemate post quadraginta dies tabes succedat: nisi quia pectus exulceratum est; & cum sordidum & insanabile sit vlcus: quamuis Galenus dicat in eo casu pulmonem quoque exulcerari ex putrescente pure: cum vero multis modis tabes contingat (ut longiore sermone diximus lib. 4. obser. nostrarum de febribus hecticis) non de omni, sed de phthisi solum loquimur, id est de ea, quæ ad purulenta e pulmone sputa succedit, vel etiam quacunque parte pectoris: Non obstante quod *φθίσις* seu tabes non vno modo iuxta Galenum dicatur, quum & tabidos nominat omnes, quomodocumque extrema macie confectos, & illos, quibus pulmo vlcus est, & eos, qui prompti ac prони seu apti sunt ad hunc morbum; velut videre licet *comment. 10. & 13. 3. lib. & 8. 4. ac 1. De morbis vulgaribus & sexcentis aliis in locis.* Nos vero per tabidos audiri volumus, non eos, qui extreme emaciati sunt quomodocumque; nec eos, qui parati sunt ad hunc morbum, utpote angusto & restricto thorace existentes, ut a tergo in morem

6

7

8

alarum promineant operta scoptula, quos proprie Græci *πτερυγίδες*, quasi alatos vocant, & quibus a capite ad pulmonem fluxio defertur: (namque hi quoque facile tabescunt, cum caput facile impleatur, spiritusque organis multas destillationes demittat, *Galeno teste eodem lib. de morb. vii. g.*) Verum nos eos duntaxat, quibus pulmo exulceratus est, Tabidos; veluti per tabem intelligi volumus ulcerosam dispositionem in pulmone existentem, quam idem Galenus describens comment. præcitati Aphor. 16. lib. 7. totius corporis extenuationem esse dixit, cum febre tenui, seu exigua, consequentem ad insanabilia pulmonis ulcera. Huius itaque rursus exemplum adferamus: nam satis nunc de nomine egimus.

OBSERVATIO LIII.

De vera phthisi & ulcere pulmonis.

Matrona nobilis, vera & exquisita tabe cum ulcere pulmonis laborabat, ut ex sputo purulento cognoui & totius corporis macie. Videbatur enim complicatus affectus; etenim in toto siccitas aderat, & erat affectus magnitudinis & intemperies solidarum partium, & pulmonis ulcus, & febris hectica. Interea cum hic ulcus esset, cum erosione, & cum erosione insanabilem esse (quibusdam amicis id indicantes) sciremus; attamen non erat plane dimittenda, cum nondum ad extremam tabem transmigrasset, & tales diu detineri in vita possint, cum nondum magnitudo ulceris eo peruenisset, ut mortem ilico vel brevi futuram significaret, uti illa cum qua valorum frustula expuuntur; vel etiam arteriarum iam erosa: hoc enim ulcus siccari pro magnitudine nequit. Sic enim putris pulmonis portio Claræ Adriani uxori Augustini Teylingii sororii mei contigit, quæ antequam tabe moreretur, per sputum eiciebat: etiam duobus fratrib. tanquam ex morbo hereditario laborantibus, similiter contigit, qui & bronchia pulmonis & asperæ arteriæ corrosa & putrilagine infecta paulo ante mortem excernebant, quibus & sputum carbonibus iniectum aut etiam per se graue olebat: nam & illud sæpe halitus contagione imprudentes inficit, ut quidam volunt. Hinc & nonnulli sunt, quos imaginatur occultas causas habere, tanquam hereditaria consequentia ex principiis generationis; propterea & commisceri cum talibus coniugio cuitant. Quod igitur filii parentibus similes sint, & ut quo ad externa lineamenta sunt similes, nihil obstat etiam quo ad internas similes partes: quoniam formativa vis naturalis extensa est per seminis corpus: ideo iuxta seminis partes, potest & partium oriri varietas. Sic & elephantici tales sæpe gignunt; & debili cerebro debiles; sic & articulis. Attamen cum formationem & temperamentum longe distare viderimus a parentibus, quid prohibet etiam longe a periculo morbi distare? At inter initia vitæ fere manifestatur iis expositi (ut paulo ante diximus) ex capitis temperamento, & figura: & similiter pectoris, & corporis totius temperamento & habitu. Quod vero & contagione quadam ij, qui vna ver-

santur, affici soleant, fama est apud omnes, & Galenus fatetur. Causa etiam prompta est (quam & laechinus adferebat) quoniam putridum spirant. At putredo illa vaporum si per aerem trahatur, male potest pulmonem afficere. Et sic Iacchinus quoque nullam vidit contagio perisse. Ceterum istis tribus cum & capilli defluerent alimenti inopia, inualecente febre, & ungues in manibus curuarentur, malæque liuescerent, tetro vapore eo sublato, mors non diu post sequuta est. At matrona nobilis, de qua nunc agimus, longo tempore superuixit, bona victus ratione utens præcipue. Aerem commendauimus purum, ad siccum vergentem; in calore vero & frigore temperatum, cum nobis locus ille desit, cuius meminit Galenus, Tabiæ scilicet inter Surrentum & Neapolim, 5. method. medendi ab eodem Galen. descriptus. Nos autem ut solè tum frigus viaret, consulimus; & austri flatum caliginosumque aerem, vel pluuium, qua ratione autūnus phthificis inimicus est: nam & septentrionalis flatus acerrimus obest, si sine pluuiâ fuerit: siccitas enim iuuat hunc morbum: montana propterea laudatur, e contra paludes ac plana damnantur: & propterea imperavi, ut pluuiis diebus in conclauicalidiusculo sese contineret, in quo largius respirandum: vtilissime enim iuuat attractus perseveranter spiritus ex Galeno, asseuerante tota medicorum schola. Et quia frictiones ac deambulationes vel gestationes initio morbi valent; ideo si vires ferret, iis ut vteretur concedebam. Hinc medici quoque illustres longas navigationes & cæli mutationes laudabant: ideo aptissime Alexandria ex Italia iri Celsus dicebat, potissimum ubi destillatione Tabidi fiebant. Nunc etiam cymba vehi molli ac delicata iuuat, quali Venetiarum vrbs ætate nostra inclyta (ut nos vidimus cum Venetiis ageremus) inter delicias vititur. Ad decem enim millia (ut refert Benedictus Veronensis) nauicularum singulis diebus peraguntur innumeros canales, civium delicia; præter onerarias & traiectionibus distributas: multum enim viriū adiicit hæc navigatio, & corpora implet. Interea a cibo quietem imperavi, nec nisi post duum horarum intervallum ægra dormiret, & ut somno potius indulgeret, nocturno tamen, eoque moderato. A vigiliis abstinendum & modicis exercitiis, sed potius ambulationibus lenibus utendum, præsertim ubi febris sese remiserit, vel lenibus frictionibus ante cibum. Iussi quoque ut ab ira, tristitia, aliisque immodicis animi affectibus, tum a negotiis omnibusque rebus, quæ sollicitare animum possunt, abstineret, & ut omnem cruditatem vitaret, & ut sorbitionibus ex ptisana, alica, amylo vel oriza, lacte adiecto, vteretur; vel ut eiusmodi sorbitiones cum lacte amygd. gallinarum seu pullorum iure, caponum, perdici, phasianorum conficeret: aut simul cum pedibus vitulorum, hædorum aut castoreorum decoqueret: vel prædictas carnes contusas, aut earum succum sumeret, quem ius consummatum appellant; adiecta ptisana aut eius cremore exiguo. Amygdalas quoque amaras ut cum ptisana

De qua tabe hic tractatur.

3

4

5

pitana decoqueret, imperavi: eo enim vititur & Aetius: nam & ea eligenda, quæ maxime nutriunt, ut iecora gallinacea, gallorū testes, perdices, attagenes anniculi, columbacei pulli non altilles, merula, tardi, alaudæ, hœdus, ac vitulus, omnia assa potius quam elixa (ut vlcus magis exsicceetur) ex succo arantiarum aut mali granati siue vuz acerbæ succo laudantur. Aluo vero præcipiti (quæ imbecillis ægris periculosa) convenit caseus recens, & panis ex vino mali punici acri, aut cydoniorum succo. Alioqui aluo nimis astrictæ, atriplex, beta, asparagus, & quod spinachium a spinoso semine, dicitur, dari potest, ac melopepones, in esca enim cucumis ac cucurbita laudantur. Interea aluus lenis licet conferat, non tamē hic immodice cienda erit. Sed & cancos fluviatiles, crudos, tritos & cum lacte potandos concessi, aut coctos in cibo: nam ius eorum insuper absorbere laudat Aetius. Admittuntur & cuniculi, leporesque iuniores, aut capreoli: oua forbilia, ius brassicæ & amygdalinum ferculum. Laudantur & saxatiles pisces, & cochleæ in cinere coctæ; testudines item, aut ranarum crura; mire enim recolligentibus vires conveniunt: ex quibus etiam moricelli & in formam pignolati parantur in hunc vel similem modum: *℞. carnis testudinis, & cancorum ana ℥j. nucleorum pini maceratorum in aqua rosæ vel ungula caball. ℥j. s. pul. diatrach. frig. pul. Haly contra tabem ana ℥j. diatreos simpl. ℥s. Zacch. albiss. dissoluti in aqua capill. ven. & ros. perfectæ cocti q. s. fiat ad formam pignolati, remanentibus pineis integris; vel adde amygd. contus. q. s. fiat tarta.* Plures habes eiusmodi compositiones apud Guainerium de hectica febre, de quibus etiam nos mentionem fecimus, cum de hecticis & tabidis ageremus. Aqua etiam ex cochleis, testudine, cruribus ranarum, ex sublimato vapore collecta efficacissima ad hunc morbum perhibetur. Quidam & psittacum miris laudibus præferunt, incerto tamen auctore. Inter præcipua remedia quæ præcipue a Galeno commendantur (*lib. De marasmo, de cibis bonis & malis suocis, & 5. & 7. methodi medendi & sexcentis aliis in locis*) & ante ipsum ab Hippocrate Aphor. 64. lib. 5. quem sequuntur vno ore medici omnes, lac optimum in hoc morbo censetur: eo quod omnium fere, quæ mandimus, lac optimum, ac optimi est succi ac multi alimenti, & prompte concoquitur ac distribuitur: tale quidem exhibuimus secundum modum quem Galenus docuit *7. methodi medendi*, & nos latius de huius usu & modo exhibendi egimus *lib. 4. obseru. de feb. hect. c. scholio obseru. 5.* Matrona hæc nobilis iisdem quoque medicamentis vtens in eadem obseru. descriptus, tum lacte, licet hæc ipsa non conualuerit, tamen istis tum supradictæ victus rationi insistens, etiam lac e mammillis cum sugere nollet, statim multum & calens sumens, (quod & ab Herodoto, Euryphone & Prodicō ac aliis medicis celerioribus commendatur) longo tempore vitam traxit; quamvis paulatim omne corpus consumptum tabefieret, calorq; naturalis exhausto pabulo interiret: & sub finem alui

fluxus accederet, qui plerumq; lethalis esse solet: vnde cum multis mensibus decubuisset omnino, in viuis esse desit.

SCHOLIA.

Quamquam Hippocrates præter eas species tabis, de quibus diximus, *lib. 2. De morb. & li. De internis affectionibus*, tres alias quoq; posuit, quarum primam a pituita scribit fieri, e capite ad pulmonem fluente, secundam a latere; tertiam a spinali, seu dorsali medulla, quæ maxime corripit recētes sponso, & venci deditos: sed his posthabitis, tum aliis iam dictis, de tabe illa, quæ vlcerosa pulmonis dispositio est, loquimur: nam & hanc exquisitam tabem esse dicimus, quæ est corporis consumptio, seu colliquatio cum febre lenta, ex pulmonis vlcere: quamvis auctor libri *De diffinitionibus medicis per tabem propriam dictam*, nendum pulmonis vlcerationem, verum etiā thoracis, vel faucium subintelligi voluit, quam & tussicula, & debiles comitantur febres atq; in eis corpus conficitur: & licet dicamus, in exquisita vna cum pulmonis vlcere adesse & corporis consumptionem; improprie tamen ac non exquisite, tabes nuncupari possent ea quoq; totius corporis demolitio, seu extenuatio, quæ thoracis, aut faucium, seu asperæ arteriæ vlcera comitatur, præsertim ubi non exactum adeo sermonem occasio requirat; licet re vera, qui hoc modo laborant, tabidi non sint; eandem tamen curationem exigunt: Tabescit siquidem & in his temporis progressu corpus totum, veluti in proprie dictis tabidis; præsertim si in thorace aut aspera arteria exulceratio fit; propterea quod cor ipsum similiter eisdem scari oporteat: absq; enim principis membri passione fieri non potest, ut animal in toto afficiatur, ut libro de Marasmo decretum reliquit Gal. quamvis non æqualiter singulæ corporis partes tabescant: verum cor & iecur minus quam partes aliæ attenuantur in tabidis: cor siquidem, quoniam facultate trahendi vehementer pollet, ea propter sanguinem vehementissime attrahit, & non prius quam vltima sit membris omnibus inopia, ipsum alimento caret; iecur vero, quod sanguis totus inde initium habuerit, *ut apud Gal. legitur præcitato, lib. De marasmo.* Id vero quod in singulis partibus, & præcipue in corde (ut diximus) per tabem primo deperit, est humor in eisdem insitus, ac per loca media partium similarium dispersus, ex quo membra primum aluntur: verum quousq; in corpore cordis aliquid ipsius seruetur, licet propius verā tabem accedant, tabidi reuera appellandi non sunt. Cum vero ad carnosum genus consumptio pertrahit aut ad fibrosam, seu membranousam substantiam, omnimoda facta consumptione, ob ebullitionem iam dicti humoris insiti, exquisitus tunc marcor existit, *ut legitur apud Gal. 7. & 8. meth. ac primo De differ. feb.* Nos vero vna cum Donato, qui adeo exacto sermone de extenuatione nunc loqui nō intendimus (nam longiore sermone de ea diximus *lib. 4. De feb. hect. c.*) etsi de ea loquamur, quæ vlcera pulmonis, asperæ arteriæ aut thoracis consequitur, quoniam exsiccatio humoris

Tabes vlcerosa dicta dispositio pulmonis huiusmodi potest.

Observationum Petri Foresti, Med. Alcm,

du. Ataxat dispersi per loca media partium simila-
rium, cordis precipue ac totius corporis; eiusdem
corporis exsiccatio quedam, ac extenuatio fit, ad-
huc tabem eam esse dicimus; nam licet perpetuo
exulceratio procedat, non tamen ex ea confestim
carnosarum partium, aut fibrosarum seu membra-
nosarum consumptio sequitur, sed prius nuper di-
ctus humor consumitur. Ex tussi itaq; ac anhe-
litus difficultate aliquam predictarum partium
affectam esse conicere poteris: quæ autem earum
sit, percipies ex aliis signis postea dicendis, nūquid
pulmo sit exulceratus, vel aspera arteria vel tho-
rax. Affectus vero hic cū exulceratio sit, morbus
plane erit in soluta continuitate. Sed antequam
de signis agamus, prius quædam de causis adiun-
gamus, quamvis causæ & morbi natura ex præce-
dentibus iam fere nota sint. Phthisis itaq; ex vari-
is causis oritur, ictu vel ex alto lapsu, vulneribus
que per sanatis, forti ictu, aut percussione: nā eius-
modi causæ alterant corpus extrinsecus, & exci-
tant præcedentes; sicuti vulnus in thorace factum
in partibus pulmone vicinis, aggregat in se paula-
tim materiam, quæ sensim intrans pulmonem, in
eo ulcerosam inducit dispositionem: ita & fortis ictus
seu percussio, aut calus ab alto supra easdem
partes, a quibus soluta unitas in pulmone fit, & inde
dolor, qui rursus attrahit multitudinem super-
fluitatū ad pulmonem; quib; & putredo accedit,
& sui putrida acrimonia pulmonem corrodit, &
dispositionem ulcerosam inducit; uti & fortis calor,
sub radiis solis canicula æstuante cerebri hu-
miditates colliquans, quæ in pulmonem defluen-
tes putrescunt, & acrimonia sua pulmonis substan-
tiam ulcerant. Et ita fere oritur a capite tabes, inde
in pulmonem destillat; huicque exulceratio acce-
dit ex Celsi decreto: etenim quæ capitis destillati-
ones tussim primo concitant hominibus, & rau-
cedinem, neq; tandem consistunt, tabem gene-
rant, *Galen. teste 1. De morbis vulg.* Cuius duæ ma-
xime sunt differentiæ, ut ipse refert: una ex illis quos
caput demittit, fluxibus constat; altera, quæ ab i-
pso pulmonis malis proficiscitur; omninoque
postquā exspuitur sanguis, potissimū vase rupto;
sæpenumero etiam fluxione impleto viscere hoc;
alia de causâ ex partibus aliis non ex capite. Et si-
cuti ex calore, ita & ex forti frigiditate per viam
expressionis superfluitatem, quæ ad pulmonem
deuenientes intrantesq; eius substantiam, in eo
generat ulcerosam dispositionem, atq; hæ causæ
externæ phthisis appellari consueverunt, ut Gale-
nus inquit, 1. De procatarcticis causis, & lib. De
causâ morb. cap. 2. Causæ vero præcedentes sunt
quæcunq; intus corpus alterant, ut catarrhus, qui
sub tenuitate penetrat in pulmonem sui acrimo-
nia mordens, vlcus in eo gignit: & ita fit ex destil-
lationibus acutis, abscessibus peripneumoniacis
pleuriticisve aut synache, aut vomica introrsum
erumpentibus, vel ex propinquis pectoris parti-
bus, diaphragmate (ut quidam volunt) nobilissi-
ma membrana, vel altera quæ mediū diuidit pul-
monem, Dissepito dicto, & in ipsa quoq; pulmo-
nis substantia hæc pestis oriri potest. Aliqui ad

hanc etiam contagium referunt. Vel possunt hæc
ipsa vltima, ut pulmonia (tū reliqua dicta, ut præ-
cedentes causæ phthisis) cū putruerit & in sani-
em versa est, & ulcerata, causâ continens esse ipsi-
us phthisis, ut Benedictus Fauentinus præceptor
meus ca. proprio declarabat. Ab aliis igitur parti-
bus quoq; euenire potest hoc malum. Sic & Ae-
tius pulmonis exulcerationem ad sanguinis spui-
tiones consequi fatetur; cum videlicet sanguinis
eruptione suppressa, vlcus non fuerit conglutina-
tum, neq; cicatrix inducta. Paulus quoq; & ante
illum Hippocrates, Ex vomica, inquit, si ex toto
non perpurgatur, in phthisim protinus ager rapi-
tur, tabescere pulmone. Quo autem modo inter-
stinguendæ sint prædictæ tabis causæ, facile patere
poterit, si quis eas, quæ prædecefferunt destillatio-
nes, sanguinis reiectiones, suppurationes, vo-
micas, peripneumonias, & pleuritides ac anginas,
ex his quæ in propriis earum affectionum capiti-
bus hætenus retulimus, considerauerit. Nunc ad
alia signa progrediamur, primo adferentes exem-
plum pulmonis ulcerati.

OBSERVATIO XL.

*De ulcere pulmonis ac tabe, modo cum sanguinis
spuito, modo sine eo pus exspuente.*

Cyprianus medicus doctissimus, collega meus
melancholia diu affectus, longa & diuturna
tussi & catarrho, tandem in sputum sanguinis,
mox & in tabem & pulmonis ulcerationem inci-
dit, licet longo tempore vitam protraheret, ante-
quam decumberet: tandem prædiis nihil iuuan-
tibus vix 47. annum excedens, vera tabe ac pulmo-
nis ulceratione obiit: nam signa, quæ perpetuo
illi aderant, vlcus esse pulmonis & tabem signifi-
cabant, tum ex frequenti tussi per quam pus ex-
screabatur interdum & cruentum aliquid; quod
& Celsus ad animaduertit. Hæc enim incipiente
frequens tussis molesta est, qua cruentum aliquid
sine sensu doloris extunditur: hoc interdum sub-
sistit etiam, dicente Fernelio, tussique sordidum
quiddam editur, deinde purulentum. Tussi per-
petuo perdurante dum subinde sputum cruen-
tum esset, subinde purulentum; rursus vero cru-
entum, denuo vero purulentum, non dubitavi-
mus hunc vlcus in pulmone pati: cumque febris
fixa, licet pusilla, semper sui similis eueniret, eo
certius signum habuimus huius affectionis, mul-
toque magis, cum prius præcessisset sputum san-
guinis, & nunc etiam saniem exspueret: & ideo
cum sputum cruentum subsisteret, & tussi sordi-
dum quid ederetur, & febricula leui adorta, cuius
nulla fiebat intermissio: quæ tandem etiam hec-
tica facta est, mox a cibo aliarum more inualescen-
te, & sensim vniuerso corpore liquecente, certius
adhuc indicium huius mali habuimus. Comitatur
enim necessario affectum hunc totius corporis
extenuatio, ac carniū consumptio, & febris quæ-
dam lenta seu exigua, ut patet commentario *Aph.*
16. lib. 7. potissimum vbi pulmo exulceratus fue-
rit: nam &, iuxta Celsum, febricula leuis, etiam
cum quieuit, tamen & repetit. Sed quod modo
cruent-

Causa continens.

II
Partes affectæ.

Quis affectus sit præter naturam

Causa.

Procatarctica.

12

Præcedentes.

13

2

cruentum, modo rursus purulentum exscreabat, id idem & Fernellius refert in hunc modum: Vlcere magis magisque serpente & sordescente pus exscreatur, fitque, quod dixit Hippocr. a sanguinis sputo puris sputum. Hoc quum syncerum est, aquæ iniectum minime alterius ritu innatat, sed (si purum est) in imum descendit subfiderque. Ac nihilominus quoties vel labore, vel ruffis impetu, vel excandescencia vlcus puris lentore obductum refricatur, cruenta exscretio redit. Vti & nostro collegæ eueniebat. Confirmato ac iam inueterascente vitio, putris pulmonis portio tandem exhibat (vti & Laurentio Adriano Alcmariano contingebat, de quo antea diximus) & sputum carbonibus iniectum, aut etiam per se, graue olebat; sæpe etiam halitus contagione id imprudentes labefactat. Quod cum in aliis quoque ægris spectauissemus, pulmonis parenchyma iam ulceratum esse cognouimus, quod ex eiusdem pulmonis essentia proprietate percepimus, cum ipsius pulmonis caruncula per tussim reiceretur, haud secus quam bronchii pars quædam tussiendo ab ipso Laurentio Adriano reiciebatur, vt exulceratio pulmonis secundum asperam arteriam procefferat. Hoc enim proprium pulmonis ulcerati indicium erat (vt ipsi Galen. 1. & 6. De locis affect. docuit) si vocarum ramentum, seu crustula quædam eius particulæ, a qua excernitur, Græcis ephelcis dicta, spiritalium instrumentorum, tussiendo excernatur; proprietas vero essentia eiusdem affectæ partis proprium indicium est. Quod de sputo carbonibus iniecto diximus, plurimi hoc modo discernunt purulentum liquorem, vt ex Cælio Aureliano liquet 2. lib. cap. 14. Phlegmata carbonibus imponentes, quo exusta probentur: nam tetri odoris esse necesse est, omne quod natura fuerit mutatum, velut ex fluxione carnis veniens: item in aquam mittunt agrotantium sputamina; etenim naturalia facile solvuntur, vitata vero atque mutata persenerant, quadam tenuitate coacta, & subsidunt, siquidem sint grauia, & contra naturam ex defluxione carnis venientia.

4. Verum tunc prius confirmatam tabem cognouimus præter carniū consumptionem, quod genæ liuescerent, tetro vapore eo sublato, & inualescente febre vngues in manibus curuarentur, & exalbidi & pallidi euaderent: & malo iam vincente capillie capite profluebant, idque alimentū penuria, aluique profluium superueniebat, quæ pessima signa ab Hippocrate quoque numerantur: iam & præcordia sursum conuellebantur; cum & costarum extrema siccitate (vt Fernellius refert) sursum quandoque conuelluntur, dum tandem corpus omne consumptum contabescit, calorque natius exhausto pabulo intereat. Sitis quoque illum magis tandem conficiebat, & fastidium urgebat, & id, quod sursum vergebat, ac per sputum reiciebatur, vehementis ac fædi odoris erat, quale & Paulus extreme laborantibus adesse scribit; pulsusq; eidem, vt omnib. tabidis, languidus erat, ac paruius, propter imbecillitatem virtutis seu facultatis; non nimium celer, vt pleriq; febricitan-

tes habent, quod non detineantur vrente febre. Aderat & pulsus hecticus, talem enim tabidi pulsū habent, hoc est, vnde quaque similem: quoniam & febrem habent hecticā; sic enim a febre, quæ vniuersum corporis habitum occupauit, appellatur pulsus, vt libr. 4. De causis pulsuum Galenus scriptum reliquit.

SCHOLIA.

5. Signa igitur pulmonis ulcerati, ex hac observatione satis cognita sunt. At signa hecticæ febris habenda sunt ex capite proprio, & de marasmo & eius, tum hecticæ, speciebus, vt longo sermone 4. lib. obser. De febribus hecticis, in quibus & diuisiones febrium hecticarum posuimus & marasmi, per gradus quosdam, vt horum signa non opus sit denuo repetere. Verum quod ad signa asperæ arteriæ exulceratæ attinet: sicuti enim in vlcere pulmonis carunculam pulmonis per tussim aliquando reici diximus; haud secus, si bronchii particulam reiciant secundum asperam arteriam, pulmonem tunc exulceratum existimamus: ita quoque, si arteria quæpiam aut vena in ea exulcerata fuerit, ipsarum quoque portionem aliquam (præsertim vbi frustum valis haud paruum fuerit) tussiendo exspui oportet. Orto vero in aspera arteria vlcere, præter hoc, quod sputum purulentum apparet, dolorem quoque in loco affecto, laborans sentire consuevit: ipsum vero per ea, quæ screantur, quia exigua sunt, ab vlcere, quod in pulmone natū est, discerni potest; quippe ab vlcerebus pulmonis plurimum reicitur. Ita quoque videmus interdum per exulcerationem exscreari ex guttore corpusculum aliquod a ligula (Græci: ἀνγλωττιδæ vocant) cum pars ipsa afficitur; id vero non solum hoc indicio deprehenditur, verum etiam ex eo, quod in vlcerato loco doloris sensu laborans infestatur, veluti de aspera arteria dictum iam est. At si nullus in prædictis partibus dolor sentiat, nec aliquod iam dictorum signorum adsit, verum cum purulento sputo in thoracis parte aliqua manifeste sensus doloris adsit, thoracem affectū esse censeto. At hic medicus non sine cruenta exscreatione tabe resolutus est. Magna autem inter scriptores controuersia est, possitne quis citra cruentam exscreationem tabe resolui? Nonnulli post solam exscreationem humoris liquidi & subflauī, leui febricula correpti tabescere cœperunt, ac multo post tempore cruoris exiguum quiddam cū pure reiecerūt: ita & alius quidā flauam bilem exscreauerat, & exili vel minori febre correptus, ac tussī purulentum exspuit, deinde cruentas exscreationes: inualuit subinde febris, ex qua membra tabescebant: demum sanguinem reiecit; vnde tabefactis membris, & deficientib. viribus, mortuus est: vlcus enim, vt tradit Galenus, occultum, irremediabilem morbū reddit. Alius quidam sex mensibus sic affectus obiit: quidam vero plurib. vitam miserā traxerunt, donec morerentur. Sed nō paucos animaduertit etiā Fernellius tabe sensim sublatos, in quibus omnino nihil cruoris toto morbi decursu comparuit: & nostales quoque in praxi quotidiana vidimus phthisi enecatos, solum pus

Aspera arteria exulcerata signa.

Signa exulcerati thoracis.

*Pus seu sanies,
quibus modis
differat a pitui-
ta.*

exspuendo. Volūt quidam hoc fieri vix posse; neque ex catarrho, qui in phthisin labuntur, quin prius aliquid sanguinis exspuant. Vide de his lachinum. Potest tamen fieri citra sanguinem, ut in externis vlceribus, quæ citra sanguinem pus habent sæpe. Tunc ergo aliis notis inuestigare oportet, num vlcus adsit, sputum considerando quale sit. Etenim cum id ex catarrho accidat, color concocti in pectore catarrhi, & pus adeo sæpe inter se similia sunt, ut peritos quoque fallant colore & consistentia; sicut & fallit vrine hypostasis, quæ saniem referat, aut crudū succum. Primum igitur febris ipsa aderit necessario, hectica in processu, quæ signa euidentia referet, quæ de hecticis alias diximus. Deinde sputū considerando, quoniam saniem refert: nam in globum & rotunditatem multam se colligit sputum pituitæ: vnde & talia damnantur in prognosticis: At saniosum dispergitur, utpote minore visciditate, & crassitie iunctum; vnde & minus albicat ex incluso aere, quantumvis coctum sit, secundo lib. 46. vbi candida, glutinosa ac rotunda sputa appellat: ut vero facilem diuisionem agnoscant, in aquam spuere iubent. Nam materia facile mediū diuidens descendit; quæ vero non descendit, crassa & glutinosa est. Sæpe tamen admiscuntur, & impeditur agnitio: tunc ego sputa in aquam calidam fundi iubeo; atque baculo aliquo concutiendo, puris partes dissoluuntur & subsidunt, & pituitæ superius natant & cohærent. Aliud purulenti sputi signum est (*etiam a nobis dictum precedente obseruatione, quod ex 5. Aphor. 12. etiam describitur*) ex fœtore, qui tum alias, tum maxime sentitur, cum supra carbones proicitur sputum effumando. Sic fœtorem annotauit in vesicæ vlcere. Nec obstat quod dictum est, optimum esse pus album, & minime fœtens. *1. progn. ultimo.* Neque enim sine fœtore est pus, cum sine putrescentia non fiat, & vestigia habeat putridi caloris: sed sicut graueolentia, ut Galenus sibi ait, est putredinis, non coctionis indicium; ita & modice fœtere bonum signum est: ideo non simpliciter pus eiectum vult esse olidum, sed tunc sentiri, cum exurit. Sic enim maxime odores terri, & boni quoque sentiri solent. Præ omnibus vero saniem significat colligi facile, & dissipari in aqua: quod pituitæ ob viscositatem non potest contingere: nam pus residuum est eius, quod est exustū in phlegmone partis, ut 3. prælag. ex pulmone dicitur, & ita vrine hypostasis vera, non crudus humor. Illud tamen indicium ex sputo & pure, non semper significat verum, ut quidam annotarūt; cum ex empyemate & aliis vlceribus pectoris & non pulmonis tussi reiici possit. Illa tamen sanies, quæ expectoratur cum vehemēti tussi, phthisim veram designat: & quando sputum saniosum sequitur sputū sanguineum proprium signum vlceris corrodentis: sicut & contra quādoque ad sanguineum sequitur saniosum. Sed vbi cum pure simul crustæ (quas in collega vidimus) vel aliud ex pulmonis substantia excreatur, tūc minime dubitandū est de vera phthisi. Iam quoque falsedo arguit vlcus corrosiuum. De differentia vero puris & pituitæ, eadem fere refert

Gradus, quæ superius attulimus; quem legere poteritis. Et ita signa demonstratiua phthisis satis enucleauimus: quæ etiam triū sunt generum, ut in locis diuersis ex Galeno colligitur; & per ordinem a Benedicto Faentino præceptore meo in sua Praxi declaratur: quum primum sit indicantium eos, qui inclinati sunt, ut sua natura apte ad phthisin perueniant: secundum autem eorum, qui iam facti sunt phthisici: tertium vero, a quibus generantur causis & humoribus ipsi phthisici, uti ad longum ipse explicat; quem consulere poteritis. De quibus quidem signis quoniam satis nūc egimus, ad prognostica signa progrediamur; sequenti tamen exemplo prius interposito.

OBSERVATIO LV.

De quibusdam phthisicis longo tempore superuiuentibus & tandem mortuis; & de quibusdam præter spem curatis.

Refert Gradus cum loqueretur cap. proprio De phthisi & vlcere pulmonis, de induratione & exsiccatione vlceris, se mulierem quandam cognouisse Mediolani, quæ tamen non vtebatur medico, nisi regimine communi, sed quasi continuo igni adsistebat, & in locis valde siccis, cū furnaria esset; fuitque phthisica plus 28. annis ambulabat per domum & laborabat, atque perpetuo clibano aderat, cum panem coqueret; vnde siccitas plurimum indurando & exsiccando vlcus, vitam multis annis prolongauit. Atego etiam mulierem Dordracenam noui, uxorem illius Petri Gualtheri cereuisiarii Delfensis, pro cuius ædibus ciuitas Dordracena pro insigni erat; quæ octo annos phthisica superuixit, continuo quid pituitæ aut purulenti quid exscreans, licet tandem tabida obierit. Sunt & alii, qui ad 15. annos vel plures, eodem Grado teste, vitam protraxerint; sed de iis latius in scholio. Non desunt quoque Historiæ, quosdam phthisicos esse curatos: sic Arculan. suo tempore egregius medicus, dicit: Vbi phthisis parum impresserit, neque fiat vlcus ambulatorium, neque pendeat a causa incorrigibili, sanari potest: sed nō apud negligentem neque stolidum aut imperitum: vbi vero maxime processerit, ut plurimum curacassa est & vana, nisi iussu Dei omnipotentis id contigerit; quemadmodum euenisse Mediolani monacho cuidam Franciscano scribitur, qui post annum quartum, quo phthisi correptus fuerat, ex sanguinis sputo, pluries reiterato, tandem peruenit, post multam corporis tabem, ad impotentiam exspuendi cum oregmone: & cum crederetur ipsum esse morti proximum, miraculo quodam euasit impinguatus. Refert etiam Valescus cap. proprio. se quendam monachum etiam phthisicum verum curasse cum puluere Haly contra tabem (quo & nos vsi sumus in fratre meo Theodoro Foresto ex tabe & hectica laborante; & etiam curatus fuit, cum pus longo tempore subinde exspueret; cuius historiam, tum aliorum etiam a marasmo curatorum, posuimus lib. 4. obseru. nostrarum De febr. hectica) cuius ægritudo per annum durauerat, qui videbatur interdum partem pulmo-

3. pulmonis cum sputo eiicere: cui & tantus fœtor aderat, ut nullus monachorum, neq; in refectorio neque in mensa auderet illi approximari; ita ut perfecte adessent signa veræ phthisis; qui etiam per me (*inquit Valescus*) & multos alios, fuit indicatus de proximo moriturus. Sed cum illi esset amicus, curationem diligenter inuit, atq; remedia ibidem descripta cōtinuando, Dei iussu (*inquit ille*) curatus fuit. Auicenna quoque ponit historiam de muliere phthisica, cuius iam parabantur funeralia: & frater eius (*ut etiam citatur a Gradu*) cum eidem superuenisset, eandem curauit cum zaccharo rosaceo.

S C H O L I A.

4. Vtrum omnis phthisicus hec-
ticus sit, &
vtrum sic ex-
stent, diu viue-
re possit.

Q Væritur nunquid omnis phthisicus hec-
ticus sit, ut magna ex parte medici celebriores
sentiant. Id tamen quidam contendunt, ut
Gradus, non semper verum esse; cum aliqui vixe-
rint x. aut xii. annis, imo pluribus, ut iam diximus:
licet Gentilis de xi. annis meminit de iis, quæ vl-
cus pulmonis habebant cum hectica adiuncta:
quod vix fieri nonnulli credunt, inde colligentes
ulcerationem pulmonis hecticam non sublequi,
nisi ulceratio illa fuerit admodum magna, praua
& saniosa. Sed Gradus potius respondendum
putat etiam hecticos antequam ad gradum debi-
tum siccitatis perueniant, vsque ad 15. aut 20. an-
nos posse superuiuere, vtentes victu restaurante.
Sed ubi hectici ad illam siccitatem peruenierint,
quod capilli defluant, & aluus profluat, mors, iu-
iuxta Hippocrat. proxima est; quia adeo sunt sic-
cata solida, ut nutrimentum pilis non adsit. Quod
aluus vero profluit, id contentricis ventris imbe-
cillitate fit: intestina grauata facile depellunt, ut
nec alimentum in corpus distribuatur. Cum igitur
vlcus præ magnitudine siccare nequit, tunc
magnitudo ulceris mortem significat, licet iam
diutius superuixerint, ut cum vasorum frustula ex-
spuuntur, vel etiam arteriarum iam erosa, tunc
moriuntur. Diu autem viuere possunt, antequam
eo res deueniat. Ita in rustico quodam vulnerato
in pulmone, in pago Scermerio dicto, ad quæ ac-
citus, cum etiã tabidum & in vlcus pulmonis ma-
lum conuersum signis præsentibus intelligere, nec
curari posset; nostra tamen industria vita ad semi-
annum protracta est; ita ut filius, qui patrem vul-
nerauerat, veniam sollicitaret, ac cū minori mul-
cta a principe gratiam inierit. Sed vtrū vere phthi-
sici curari possint, multi hæsitant: quamquam id
fieri exemplis & auctoritate medicorum illustriū
posse, ostendimus. Constat autē (teste quoq; Be-
nedicto Veronensi) innumerabilibus exemplis,
phthisicos cura & diligētia a medicis sanatos fuisse,
& zacchari rosacei (ut scribit Galenus) auxi-
lio: abdita enim eius remedii causa est, nec nisi
experimento cognita. Attamen non desunt qui-
dam, qui curationem ulceris pulmonis nequaquā
admittunt: alii rursus dicunt difficulter curari, ut
liquet 4. De locis affect. tum 5. meth. medendi: nam &
ipse Galenus difficilima sanari pulmonis vlcera
esse fatetur, ut quæ nec citra tussim expurgari pos-
sint; & si tussim excites, laceraueris: itaque quasi

Cur pulmonis
ulcera sint cu-
rati difficili-
ma.

per mutuas operas, malum iis in orbem redit: tum
etiam quod ea, quæ idonea vlcerib. medicamen-
ta sunt, contingere vlcus, sicuti in vetriculo, non
possunt; adeo ut per medium interuallum, fere
vim suam amittant; & præterea quod præter id, quod
tussiendo lacerantur, respirando etiam mouentur.
Et proinde concludebat eodem 5. meth. med. quod
cum in pulmone ruptum vas est, scire aperte licet
(nisi protinus antequam phlegmone exciteretur,
glutinarum sit) id postea insanabile fore: quod si
aliquando curetur, relinquitur tamen in ipso res
quædam callosa fistulosaque, quæ tractu tempo-
ris a leui occasione expelli solet, ut 4. De locis affect.
liquet: quamuis si exanthemata quædam in pul-
mone sint orta propter vlcerum siccitatem, sanari
possint; præsertim ubi aspera & scabiola fuerint,
ut idem Galen. testatur libr. 5. meth. medendi. quem-
admodum & omnino insanabiles sunt, qui ex suc-
ci vitiosi erosionem vlcus in pulmone habent, cum
longo tempore omnino opus sit, ut succi corrigatur
vitium. Interea pro notitia specierum phthi-
sis (ut Arculanus medicus insignis dicebat) sciend-
um est, vlcera membrorum spiritaliū aliquan-
do fieri in pleura; quod & prius ostendimus, cum
pleuriticum non resoluitur, sed ad suppurationem
verruntur: nam si illi in quadraginta diebus, ut
dictum est, non repurgantur, teste Hippocrate, in
tabem transeunt: quamuis idem Arculanus re-
fert se in duobus ægris vidisse vlcus pleuriticum
non repurgatum in quatuor annis, nec tamen ad
phthisin peruenisse. Quod licet forte contigerit
rarum est, imo rarissimum. Verum hic loquitur
de pleura, ex qua fit, dum in ea suppuratio contin-
gat, phthisis: modo etiã in musculis intrinsecis pe-
ctoris & ossibus eiusdem cum eorum corruptio-
ne; aliquando in diaphragmate, aliquando in me-
diastino, aliquando in canna pulmonis; quandoq;
in pulmone ipso. In quibus omnibus & phthisin
& vlcera fieri contendit, quæ etiam ad tabem seu
phthisin referuntur. Attamen deteriora, inquit,
ceteris paribus, sunt illa, quæ fiunt in pulmone,
deinde in diaphragmate, deinde in mediastino,
deinde in pleura & partibus ei continuis: ita ut
quidam arbitrentur, numquam vlcera pulmonis
posse consolidari, eo quod est in continuo motu:
quibus Gal. 6. De ingenio sanis. contradicit, motum
non impedire consolidationem, cum vlcera pe-
ctoris & diaphragmatis, quæ sunt in cōtinuo mo-
tu, possint consolidari. Sed materiam limitando
dicit, quod vlcera munda siue pura superficialia in
pulmone consolidantur; putrida vero corrosiua,
apostemosa, valde sordida aut virulenta, & huius-
modi, non possunt consolidari. Cui sententiæ Me-
sue consentit: hinc & Conciliator (quem & Gra-
dus sequitur) voluit vlcus factum ex vulnere, ut ex
ruptura, præsertim in canna pulmonis vel in par-
tibus vicinis canna, posse consolidari; licet Aui-
cenna testetur se tempore iuuetutis quendam cu-
rasse, in quo caro pulmonis plurima dissoluta es-
set. Quamquam tales (vtr etiã mulier illa, quæ licet
22. annis vixit, tandē tamen rabe obiit) ut patet ex
5. de locis affect. omnes fere tandem extincti sint.

6.

7.

Quidam volū-
tatem quædam ulce-
ra pulmonis pos-
se consolidari.

8.

Quod si de confirmatis dicatur cōualuisse, id potius monstruosum esse quidam voluerunt. Sed tātum solutione facta in venis & arteriis, Auerrhoes id fieri posse credit; & assentit quidem posse fieri, eo quod filii Auenzoaris simile illi narrarunt, & retulerunt; scilicet quod in pluribus hominibus idem viderunt. Interea etiā credimus quosdam esse curatos, cum ex pure thoracis tabem paterentur, & pus longo tempore exspuerint, cum medici etiam illos veros phthysicos esse putarent. Sunt etenim aliquando eo progressi ægrotantes, ut euidentissima signa extremæ maciei & tabis præ se ferrent, & tamen præter medicorum illustrium opinionem sanati sint: ita ut in iudicio quandoq; expertissimi medici sepe aberrent, quod & doctissimus Iacchimus medicus de se ipso fateatur ingenuè, id sibi euennisse in filio egregio equitis, Cæsaris nobilis, qui præter spem est sanatus. At quæ in thorace vlceræ fiunt, non omnino, veluti iam dicta, curationi resistunt, etiam si diuturna fuerint, ut eodem 4. de loc. affect. liquet. Etenim, quæ ex pectore educuntur, triplex compendium, præ iis, quæ ex pulmone educuntur, habent: nam & vasa ipsa multo sunt minor, & sanies in spatiū interius effluit, & in summa magis carnosum est pectus, quam pulmo, ut patet eodem 5. meth. medendi. Sic etiam refert Arculanus, Vlcera pectoris & immunda siue impura consolidantur multis de causis: Primo, quia pectus est carnosum. Secundo, quia est cum paruo motu. Tertio non habet substantiam mollē, propterea in corrosionem & putredinem. Quarto non habet carnem spongiosam, in qua sanies retineatur; imo quod ab vlcere pectoris resudat, aut per aliam viam expellitur, super diaphragmate colligitur, si non exspuatur; postea paulatim expellitur secundum plurimū. Quinto non est multum subiectum catarrhis. Sexto, non nutritur sanguine calidissimo, multę cholere admixto, impediēte cōsolidationem. Septimo non habet venas magnas & amplas sicut pulmo. Octauo, non ita cordi inseruit sicut pulmo. Causas vero declarauimus antea cur pulmo difficulter curetur: addit Arculan. præter id, quod medicamēta exterius admota pulmonem non attingunt, & intus sumta si transglutiantur, multum transmittantur, & vis earum diminuitur, antequam ad pulmonem veniāt, etsi in ore vel lambendo sumantur, parū de ipsis ad pulmonem penetrat: ita & calida febrem augent; frigida sputum impediunt, & tardius penetrāt. si sicca, idem præstant & nocent heceticæ febri; humida vlceri obstant. Si vlcerus ad membranā transeat, dolorem auget, & rursus dolor impedit consolidationē, humores attrahendo: quare raro & ob motum & alias causas superius ex Gal. citatas, vlceræ pulmonis consolidantur, nisi fuerint munda, & superficialia, & non valde antiqua: quæ tamen exigunt medicum prudentem & diligentem. Profundiora vero, ad substantiam pulmonis penetrantia, difficilime curantur; & si ad cartilagine perueniant, curationem non recipiunt. At crustosa superficialia & pauca saniei facilius rectificantur; & si non perfecte liberentur, longissimo tempore du-

rant, antequam egrum ad interitum deducant; ita ut tale vlcerus, iuxta Auic. tempus prolonget ipsius phthisis circiter 23. annos. Ceterum vlceræ, quæ in asperæ arteriæ interiore sunt tunica, & potissimum quæ summæ eius parti, quam *ἀσπυγία* vocāt, sunt vicina, aut etiam ipsa; hæc & curationem recipiunt, & nos non paucos (ut Galenus præcitato loco inquit) eorum, qui ita sunt afflictī, sanauimus: quorundam autem eorum historiam ibidem conscripsit, potissimum ubi interna eiusdem asperæ arteriæ tunica exulcerata fuerit: namq; ea sanari est facilima, ac omnis, qui in ea ortus fuerit affectus, facile sedatur, nisi forte aliquando a putredine aliqua magna ipsius portio corrosa cartilaginem nudam penitus destituerit. Verum si ipsius cartilagine exulcerata sint, aut insanabiles, aut sanatu difficillimæ erunt: namque cartilagine affectus (ut Galen. testis est, lib. 7. De vsu partium) omnino insanabiles sunt, aut sanatu quam difficilimi. Quæ de re priusquam malum ad cartilaginem peruaserit, asperæ arteriæ vlceratio protinus etiam ut sanetur, laborandum erit. Vlcera vero diaphragmatis in parte carnosa (inquit Arculanus) rectificantur, nisi vtriusque penetret; sed in parte nervosa, si sint aliquantulum profunda; raro vel nunquam curam recipiunt. Vlcera vero mediastini facilius rectificantur, quam vlceræ diaphragmatis; & adhuc facilius vlceræ pleuræ & musculorum intercostalium, & costarum, etiam si sint corruptæ; sed opus est sectione aut cauterio in parte extrinseca, ut perueniatur ad costam corruptam. Sed de his prius dictum est, quomodo sectione aliqui curati sint, antequam phthisin veram incurrerent. Sed hæc iam dicta etiam ad signa prognostica pertinent, sicut illa quæ etiam sequuntur.

OBSERVATIO LVI.

De sacrificulo vlcere pulmonis lethali laborante, & ex pilulis mercurialibus sumtis subito vitam finiente.

Sacrificulus quidam apud nos Alcmariæ, cui a puero facies combusta erat, facie admodū pallida & macilentus, & propria natura debilis; ex continuo catarrho falso in vlcerus pulmonis incidit: ad quem, cum diu decubuisset, accitus sum; & pus odidum exspuebat, cū totius corporis extenuatione, imo ut iam crustulas spiritalium membrorum, nempe pulmonis, exspueret. Quæ cū vidissem, & sorori prædixissem, fratrem non posse ab hoc morbo sanari; illa cum hæc audiuisset, me statim ablegauit, atq; in mandatis dedit, ne amplius redirem. Postea tamen minus prudens soror tonsorem empiricum quendam ad fratrem vocauit, qui se discipulum Paracelsi iactabat, atq; sacrificulum lue Gallica infectum dicebat, ob faciem deturpatam (ut existimo) quam ex combustionem ignis cum puer esset, ut paulo ante diximus, contraxerat; atque iactabundus, ut hoc solet hominū genus, ilico ægrotantem se curaturum pollicebatur. Cū enim videret sacrificulum pallidum esse, & quod pili e capite fluere (quod tamen inopia alimentī ex tabe lethali contingebat, de qua re latius in scholio) pilarellam (ita enim vocāt defluuium capillorum ex lue

9.
Cur non omnino curationi resistant thoracis vlceræ.

10.
Cur pulmo vlceratus raro curatur.

11.
Vlcera aspera arteriæ modo sanabilia, modo incurabilia.

12.

Vlcera diaphragmatis.

Vlcera mediastini & pleuræ.

1.

2.

2. ex lue Gallica) esse existimabat, certū morbi Gallici indicium, homo insulsus ac ineptus medicus, quamuis medicinam sibi falso arrogabat, ignorās quod malo vincente in tabe confirmata capilli de capite defluunt, cui & alui profluuium succedit, auctore diuinissimo nostro Hippocrate, vt mox latius dicturi sumus. Verū quid de prædictionibus Hippocr. dicam, cū eiusmodi Theophrastiani oēs prædictiones contemnant, ac suo malo, (signis omnibus aliis posthabitis & neglectis) omnē morbum etiam quantumuis lethalem se posse curare apud miseram plebem iactant, vti hic Empiricus sibi persuaserat, & constanter agro promiserat: hinc deprompta vna pilula mercuriali, ex sua chymica officina, ex argēto viuo parata, quam omnib. aliis ægrotantibus indifferenter præbebat, adeo illam extollens, vt illa sola, omnibus aliis prædiis relictis, sufficeret ad quosuis morbos curandos. Quam cum suo ægrotanti obtrussisset, aluius supra ac deorsum adeo perturbata est, vt iam pro mortuo æger haberetur, ac extrema inunctione munitus ad superos remeare crederetur. Sed postquam paululum quasi reuiuiscere cœpisset, vt colophonē curationi adderet, post octo dies iterū bis misero sacrificulo extrema macie cōfecto pilul. obtrudit: quam cū deglutississet, enormi subsequente & vomitu & euacuatione, eodem die expirauit.

SCHOLIA.

3. Mittamus istos Paracelsistas, qui egregias prædictiones Hippocr. rident: quas si hic Caccurgus intellexisset, nō ita hallucinatus fuisset in cognoscendo morbū hunc fuisse lethalem, & ideo minime curandum, sed prognosticis relinquendum, vel saltem iis prædiis prorahendum, qui vires tantum restaurarent; quas ad extremum debiles, ipse suis pilulis facile exstinxit, & mortem maturius attulit. Cū enim hic duo præcipua mala adessent, vt sputum graue olens, iuxta Hipp. aph. 11 lib. 5. deinde capilli defluentes, indicium certius, ex decreto aph. 12 lib. 5. facile perceptu erat, huius tabidi mortem fuisse in ianua (vt dicebat præceptor meus Bened. Fauent. c. proprio. De phthisi & ulcere pulmonis.) Quod si hōc intellexisset insignis ille Paracelsista, tertium indicium non opus fuisset suis pilulis concitare, cum & alui profluuium accedat, & tanquam tertium indicium mortis esse soleat; etsi illa duo supradicta in diuturno ulcere pulmonis & confirmato, & in homine plane extenuato vera tabe, ad significationem necis phthisici suffecissent: vbi autem citra hæc alui profluuiū comitatur vel contrigerit, occisimæ mortis indicium existit; quoniam alui profluuium (vt idem præceptor meus aiebat) comitatur dolor, & assiduus labor subsidendi, timorem ingerit defectionis animi. Quæ multo vehementiora hic fuere ex perturbatione illarum pilularum, syncopa vera accedente, cui ilico mors subsequuta est: & ideo recte dixit Galen. in commento 14. aph. lib. 5. a tabe habito, profluuium alui superueniēs, lethale: multoq; magis morti propinqui sunt, si tria hæc in vnum conueniunt, videl. male olētia spura, & alui profluuium, & capillorum de capite casus. Tabe itaque labo-

Signa lethalia.

rant si sputum, quod extrussunt, graue oleat iniectum carbonibus, & capilli a capite defluunt, lethale: & iis alui profluuium superueniente, moriuntur, vt aph. 11. 12 & 14 lib. 5. patet. Verum idem Hippoc. de tabidis scriptum reliquit 16. aph. lib. 7. a puris sputo phthisis & fluxus; cum vero sputum retinetur, moriuntur: modum siquidem ostendens in hisce verbis, (vt Gal. in commento refert) illorum qui ex tabe moriuntur: eo vsque enim extenuati viuunt, donec pereat quæ exspuunt, possunt pulmonem expurgare: cum vero intus manent, obferantur quidem viæ spiritus, patientes vero stangulantur. Motituris vix anhelitus auditur, & qui non suffocantur, inter colloquia moriuntur; quib. vngues incuruantur, cum cibi radio, difficultate anhelitus nulla prope salua, vētris profluuium, & pedum tumore, subito moriuntur. Et quāuis in principio aliquando tuti videantur, postea tamen moriuntur, vt patet exemplo apud Gal. cum sic dicat: Phthisicum curare ausus sum vel curiosus: odoramenta primū, quale spicatum vnguentum est, & alia pariter exsiccantia naribus indita sunt diu noctuq; Ac in potu Mithridaticam aut Theriacā & Athanasiam antidotum obtulimus: agro vitam per annum prorogauimus; sed tandem phthisicus interiit. Vide etiam exemplum apud eundem de Antipatro medico Romano, qui annos quinquaginta excesserat. prius ephemera laborans, ob tuberculum in pulmone per sex menses tādē difficilima suppuratione oborta resolutus statim obiit Ita & nos phthisicam mulierem Brielensem quandam habuimus præmanibus, quæ cum per intervalla pus exspueret, & subinde tanquam calcem induratum in calculos, licet diu superuixit, tamen postea & hæc tabe obiit. Quanquam & inter exempla monstrificam pulmonis naturā Gal. refert, quod ægrotus quidam russiens viscosam primum materiam exspuebat; deinde per aliquot dies in duritiem coacta, in calculos durescebat, qui grandinis modo eiciebantur. Hunc Gal. veluti asthmaticum curauit, qui de cetero erui duntaxat magnitudine ac rarenter eiecit. Ceterum Hippocr. lib. 2. Prædictionū, hæc de tabidis quoque scripta reliquit: Oportet enim eum, qui probe liberari vult, facile sputum per tuissim reiicere: & id esse album & æquale, & eiusdem coloris, ac ab inflammatione alienū: quod vero a capite defluit, ad nares conuerti, febrem autē non inuadere, vt ne a cœnis prohibeatur, neque siliat: venter autem egerat quotidie & id quod egerit sit durū: copia pro ratione ciborum ingestorum. Hominem vero quam minime tenuem esse oportet: pectus autem laudare conuenit quadrangulum & hirsutum; & os ipsius paruum sit & robuste carnosum: quicunq; enim hæc omnia habuerit, maxime superstes erit; qui vero nihil horum habet, interitui proximus est. Ideo considerandū num naturæ ad tabem prone sint: tales autem sunt (vt paulo antea diximus) quorum humeri eleuari, & pectoris partes deprimiuntur: ita vt a qualibet occasione pectus egeat dilatatione, ipsum in motu illo alioqui violentiam patitur, ob oppugnantiam, quam inducit

5.

6.

7.

Qui prorsus sunt ad tabem.

*Asthmatici
subito in platea
mortui.*

8.

9.

pectus per sui depressionem: quo fit, ut cogente violentia, aut in pectore aut in pulmone vena aliqua disrumpitur, facile sanguinem exspuere faciat, inde pus, & postea tabes, ut ex Gal. 1. *Epi. comm. 18.* colligitur: ita & asthmaticos plurimos noui ad tabem deuenisse, & multos cognoui eo non progressos, subito tamen extinctos etiam in platea: uti contigit M. Adriano Vventio Consil. & Hugoni Grotio, utrisque in platea subito extinctis: quos saepe admonueram hoc illi seuenturum, si tempori sibi non prospicerent. Ceterum in tabem quoque maxime incidunt iuuenes, auctore Hipp. *aph. 29. lib. 3.* in eam tamen & potissimum (ut Gal. in *comm. inquit*) quæ ad spurum sanguinis consequitur. Illud vero non ob ætatis imbecillitatem, sed ob incontinentiam, seu intemperatum victum. Hoc idem confirmavit Hipp. *aph. 9. lib. 5.* cum dixit: Tabes fiunt præcipue ætatibus a 18. usque ad 34. an. & Celsus morbum hunc ætate firmissima maxime oriri censuit, id est, ab an. 12. ad an. 35. ob id quoque iuuenes tabem incurrunt, disrumpito pulmonis vase; quoniam in vita & eius functionibus male morigerari existunt, ita ut male regantur. Interea tamen licet maiores natu difficilius quam iuuenes in tabem concidant, ob siccitatem tunice vasorum, eorum disruptioni obstantem, difficilius quoque restituuntur, ob inopiam humidi glutinosi, quo solita sunt membra solida & densa disrumpita consolidari; ut elicitur ex Gal. 5. *meth. med. & 3. & 4.* eiusdem. Minores natu iuuenibus, difficilius tabescunt, facilius vero suo habitui naturali restituuntur. Difficilius inquam, ob humidum in iis abundans, tunice vasorum cedens: facilius autem restituuntur, ob abundans humidum glutinabile in iis vigens, ob vicinitatem quam obinent ad prima semina, ut colligi potest ab Hipp. in *lib. de genitura, & Gal. in lib. 2. de semine.* Infantes itaque ac adoluscentes ad pubertatem usque facile phthisi liberantur. Mulieres quoque ac viri robustiores, senesque durioris substantie haud difficulter sanantur. Diutius perdurat phthisicus, qui materiam bene maturando exspuit, Gal. auctore. Verum non omnes, inquit, quibus trium mensium spatio exulcerantur, pulmones sanari possunt; quoniam alius in sedem vitium. Acuti humores erodentes, vlcera magis exasperant; pari modo vlcus irremediabile, si in ore marina salugo adfuerit. Quicumque, tabe molestantur, si eorum febris parue, biliosa febris acuta superuenerit, malum: tum quoniam ex ardesciente febrili calore (ut præceptor meus Bened. Fauent. dicebat) & sicco eius, vehementer tabidus exsiccabitur: ita ut alimenti inopia phthisicus pereat. Et qui tabidi facti sunt cum lenta febre, & si iis accidat quartana febris, ut aliquando contigit cuidam matronæ nobili, deterimum est: tum quoniam ex abundanti sicco ab humore melancholico prodeunte, tabidus ocysus perimetur, ut eidem matronæ euenit; vel eius siccitas augebitur, & tabes in longum prorogabitur: tum quoniam tabido acquiritur intemperantia frigida & sicca, cum qua vita hominis diu stare nequit. Quicumque vero tabe corripuntur, si iis pituitosa febris acciderit, minori cum periculo est:

quoniam ob pituitæ frigiditatem in iis remittitur calor habitualis factus, & in eisdem siccum humido infringitur: periculum tamen est ob pituitæ humiditatem, ne a debili calore phthisici in putredinem vertantur, sub qua vires corporis perimuntur. Atque hæc ipsa satis de signis Prognosticis esse puto.

OBSERVATIO LVII.

De pleuritico suppurato, qui cum non repurgaretur, in phthisin incidit, qua etiam postea obiit.

PRætor in portu Delfensi pleuritide correptus, cum in principio neglectum haberetur, neque tempori remedia adhiberet, cum tandem medico adhibito, frustra remedia adhiberentur, neque pleuritis resolui posset, facta est suppuratio: & cum illa non repurgaretur inter 40. dies, ad tabem deuenit. Tunc & secundus medicus eum tractabat, vlcere tamen pulmonis semper in peius vergente, ac febre habituali magis accrescente, autumno iam magis appropinquante. Inter anni tempora autumnus grauissimus est, auctore Hipp. commoriantur enim ægri, quum plurimum decidentibus arborum foliis: eo tempore plerique etiam phthisi corripuntur: & autumnus tabidis malus, iuxta 10. *aph. lib. 3.* tam pulmone ulcerato, ut ait Gal. in *Commento*, quam omnibus aliis quomodo cunque tabe factis. Ad hunc quoque sub finem accitus fui: cumque viderem in homine extreme extenuato, & viribus iam dudum lapsis, atras viridesque excreationes, & quæ colore fuscarentur, procul dubio mortiferæ erant, cum & carbonibus iniectæ grauiter olerent, & cum capillorum præterea & barba ac superciliorum defluuio, mortale pronuntiaui apud amicos astantes; eoque magis cum & ventris fluxus accederet. Et ita facto prognostico, tantum illa esse adhibenda dixi, quæ vires restaurarent, ut sunt martii panes, pignolata, hordeata, amygdalata, & iura restaurantia, & confectiones ex carnibus cancrorum, consummata & colatitia, de quibus satis superque diximus in *nostris lib. obs. de hectic. & marasmo affectis*: & cum ita discederem, paulo post hic obiit.

S C H O L I A.

Hic malo inter initia, prout occurrere necesse est, ex Celsi decreto: neque enim (ut ipse inquit) facile is morbus cum inueterauerit, euincitur. Ceterum quomodo suppurati tam ex pleuritide quam ex peripneumonia curetur, iam prius dictum est; & cum de sputo sanguinis verba fecimus, cruentorum adhuc vulnorum, tum pulmonis, tum aliorum instrumentorum respirationi deseruientium, curandi modum docuimus, & quomodo pleuritici curentur, si ad suppurationem conuertantur. In eis igitur, qui pus iam excreant, & in via sunt ut tabidi fiant, aggredi curationem oportet. Nam spes est siccato debitis remediis vlcere, prius tamen repurgato, cessare febrem, & ita consumptionem, ut multis euenisse Gal. testatur. Sed eos qui iam ad tabem peruenerunt, stultum est aggredi. Et cum neque in illis integram sanitatem restituere possimus, neque id polliceri, sed solum vitam præstare, sistendo causas siccationis, ideo semper continua præcautione uti oportebit, ut in his, qui dubia sanitate fruuntur, & perpetua egent medici opera. Quibus autem modis vl-

cera

4. cera in eisdē partibus orta curentur, iam ex parte diximus: & quicquid ea, quae in pulmone haeruerunt, vel difficiliora ad curandum sunt, vel eorum curatio perfici omnino nequeat, propter iam dictas causas; ne tamen tanquam deplorati destituantur. Quomodo hi tractandi erunt, ac reliqui, qui in aliis partibus iam dictis ab ulcere sunt oblecti, curandi sint docebimus; id tamen prius commonefacientes, quod etsi nonnullae traditae sint pulmonis, thoracis, seu asperae arteriae ulcerum causae, de ipsis haudquam sermo faciendus erit, cum in praecedentibus singularium causarum curatione et exemplis quibusdam ostenderit. Quare si qua earum adhuc permanserit, ex iam dictis curatione petas: nunc autem de tabe duntaxat quaedam addemus, quatenus ulcera pulmonis, thoracis, seu asperae arteriae consequitur; de quibus ipsis ulceribus agemus. De victus ratione satis superque diximus *obs. 35. praec.* hoc semper commemorantes, quod generalis curatio ulceris sit exsiccatio, iuxta *Gal. 4. met. med. c. 5.* siquidem ulceris, qua ulcus est, sanatio, mediocris siccatio est, *2. art. cur. ad Glau. c. 2.* Ad quam intentionem exsiccationis perueniemus, teste *Gal. 3. & 4. meth. med.* exactis duabus communibus intentionibus, mundificatione videlicet & abstersione; ad eas non sequitur exsiccatio ulceris. Post exsiccationem ulcus propensius fit, ut consolidetur & in cicatricem vertatur. Itaque initio abstergendum siue repurgandum atque resiccandum: ubi iam satis detersum est, atque iam nihil saniosum repurgatur, glutinare oportet. Sed dum haec fiunt, extenuatio corporis restauranda est. Utitur ergo quidam mulsam initio ex aquae potabilis *lib. j. mel. lib. 3. j.* per omnia, ubi detergendum, melle crudo quidam utendum volunt; ubi glutinandum, mel coctum. Aliqui hic questionem mouent, mulsam non conuenire hecticae feбри: sed diluta non nocet, cum abstergat ulcus, & marcori nec feбри obstat. Hanc quoniam longius persequitur Altimarus, quem perlegere poteritis; et de lacte exhibendo, cum pauco zacch. & mel. ros. ut minus in ventriculo cogatur; maxime caprillum. Initio dat *3. iij. vel iij.* procedente tempore quantitatem augemus, de lacte dictum est prius, etiam *lib. 4. obs. nostrarum. De febr. hec.* Lac dandum est vacuo ventriculo, & mundato ventre. Quamobrem non sunt imitandi illi, qui lac praescribunt non purgato ventre, cum sua natura lac facile acescat, maxime in ventriculo. Ergo si opus est, ventriculus purgetur decocto galli antiqui, addita aliqua parte hordei mundati, vel integri iam semicocti: vel detur manna cum decocto galli, & ideo si alius resistat, possumus tunc quidem uti leui purgatione, cum materia adhuc fluat, ut manna cum iure pulli, vel cassia, cum sem. anisi, vel decocto galli antiqui, in hunc modum parato. *℞. passul. mun. p. j. prun. iurubar. an. num. 9. sebesten. 5. medulla sem. carthami 3. j. coquantur in aqua com. q. s. utatur illo iusculo mane,* & si satis non leniat, adde manna *3. i.* potest quidem capere, modo venter non sit supra modum latus & solutus: nam ubi corpus consumtum est, tunc omnino omitrenda sunt medicamenta purgantia, qui exsiccant corpus, & ad tabem perducunt: his non fluxus contrarius est, ideo iis tantum utendum, si duriores sint alui, quae solum leniunt, & vires non deiciunt. His igitur qui sunt parati ad hunc morbum, & qui inci-

piunt laborare, summum est remedium, hordeatum mundatum dare, cum zac. ros. post tres horas post cenam in introitu lecti. Nam qui obnoxii sunt huic morbo, calido sunt hepate, vel ventriculo vel corde, a quibus eleuantur fumi acres ad cerebrum, qui commixti pituitae, penetrationem addunt, & ad pulmones demittunt. Hordeatum mundatum obtundit acrimoniam vaporum, & eos increffat, & prohibet ne aliquid sursum ascendant: nec minus pulmones absterget, & corpus vniuersum humectat. Vel utatur conserua ros. antiqua a cibo, maxime post cenam, aut aliqua alia conserua, quae consimilem effectum praestet. Tota enim cura medici esse debet, ut paulo ante diximus, in praecauendo, ne morbus fiat, vel si factus sit, ne crescat, nec citissime augeatur. Nam illos perfecte curare, difficilimum esse diximus. Pro curatione ulcerum utimur lacte asinino, ut prius diximus, quod quidem absterget ulcus, & corpus tabidum reficit: sed si fieri poterit, citissime mulsam accipiat. Alteratur facillime lac & corrumpitur. Lac etiam praeparare oportet: nam interdum maior est intentio abstergendi, interdum consolidandi, alias refrigerandi. Cum refrigerare volumus, capram vel asinam nutrimus herbis refrigerantibus, ut salice, foliis vitis, lactucae: si autem abstergere, damus eis horde. integrum: si magis nutrire volumus, damus hordei farinam, vel tritic. si plus consolidare sit intentio, nutriatur oryza, & halica, & carnibus viscosis, & nutriatur capra foliis quercinis, pyrorum, rubi, & similibus, sic etiam magis constringet. Quinum quoque & vaccinum, quia crassiora, magis nutriunt & consolidant, ut Auic. testatur. Statim mulsam vel repidum dandum eo modo, quo dictum est, neque superdormiant, vel alium cibum sumant, donec sit concoctum: quod cognoscetur: si stomachus nihil eructet. Imo quidam ita lac commendant, ut solo eo quasi utendum sit, etiam cum pane filigineo, modo febris vehemens, & putrida non prohibeat, & torrida; tunc prorsus sanam praebent, & febre remissa denuo ad lac redeunt. Alii ad deterfionem imponunt parum mellis vel zacchari, ad consolidationem boli arm. momentum. Sed vinum nunquam cum eo miscendum, more Anglorum, qui vinum cum lacte coquunt, & serum huius febricitantibus omnibus dant. Lac vero cum amylo vel tragac. magis glutinat. Aliqui & oxygala utuntur, si valde sitiant & febricitent, ad caloris extinctionem. Cum tussis valde subinde molestiam adferat, in ore semper detineat diatrag. vel diapednatum, vel saccharum candi: & noctu zacchar. ros. tabulatū, quo non est aliud praestantius in hoc morbo. Alii vero in principio post mulsam dilutam exhibitam, fenugraeci decocto, loti subinde, abiecta priori aqua utuntur, in qua octaua pars vel zacchari in calidiore conditione, vel alioquin mellis dissoluitur, & ubi magis detergendum est, conficiunt eclegmata ex succo marrubii & caulium, cum melle: vel man. j. marrubii decoquunt in *lib. 6. aqua ad dimidium*, colaturae addendo *lib. j. mellis plus minusve*; idque totum decoquunt ad crassitudinem. Similiter e butyro, melle, & terebinthina duobus horum aut tribus mistis, eclegmata conficiunt: nam varianda remedia eiusdem

7.

8.

generis ne fiat satietas, diuersi vero generis sumenda, cū mutantur indicationes Sed vt summam re cōplectamur medicari pulmonis vlcerib. oportet (vt Aet. refert) eo apparatu, quo facile sursum efferrantur humores; cura simul adhibita, ne alii congregentur. Excogitata aut a medicis, pinde sunt, vbi expurgandum ex pectore & pulmone pus est fortissima, vt inquit Gal. *s. met.* (quæq; maxime dissecant) pharmacas in quæ vsum summopere cōducit, præter iam dicta, aqua mulsa per se, & cū amylo, aut iride, & rad. dul. in ea decoctis, vel hyss. marrubio, aut tostum hord. nō decorticatum, si in ea coquatur, ita & syr. ex glyc. ex adiantho, hyss. aliaq; ecligmata, e pulmone vulpis & pino, tum alia de tussi & asthmate dicta, & præcipue de suppuratione. Atque dum hæc fiunt, hordeatis cum sacch. aut melle lacte amygd. vino albo tenui & subdulci, aliisque rebus q̄ vires refouent, vtendum. Iam purgato vlcere in tauratis virib. alimentis partim mediæ materiæ, partim resiccantibus & glutinantib. vtendū est. Cōsolidant hæc, caseus recens, lac vstulatum, restæ cancrorū fictili vase crematæ; ita n. glutinando seruatur, bol. arm. terra sigil. carabe, gum. arab. corall. rosæ: dantur ex vitellis ouorum, & alia quædam ex lacte vstulato, & ppter tussim conficimus ex iisdem elegmata, adiecto aliquo syr. ad tussim, quale est iuiub. vel myrtinū, vt de sputo sanguinis dictum est. Iam quoq; p vlceris exsiccatione, quæ quidem eorum cōmunis finis est, valida non existente febris, veteres tabidis per interualla Mithridatis antidotum aut Theriacā exhibeant; q̄ & posteriores quoq; fecerunt, Aet. nimirum & Paulus, nec non & Ambrosiam & Athanasia: quib. omnibus, pro forti pulmonis exsiccatione, vltus fuit Gal. *vt patet 4. de loc. aff.* qua via tabidi id saltem lucrificiebant, vt vlceris nō ultra pgrederetur, nec maius fieret: sed siccatum, ac ceu callo duratum longiori vita eos frui sinebat, si omnia præsidia rite fuissent administrata. Extrinsecus quoq; p initia, vbi conqueuerit malum, Paul. & Aet. applicant cataplasmata ex althææ foliis & sem. lini, tritis in tenuissimum pollinem, cū decoct. fœnugr. & althææ vel maluæ oleo ac melle permista. Et post temporis intercapedinē ad cerata transeunt, ex butyr. oleo laurin. ac cera. & rēpore repurgationis ex Aetio, ex terebinth. oleo cyprino, butyro, medulla ceruina, & adipe taurino, iridisque farina, & ælypo, æqualib. omnibus partibus cōmixtis: loco aut cyprini olei, si desit, irino vel violaceo vtendū. Tempore aut quo cicatrix obducitur, ol. myrtinum aut ros. extrinsecus thoraci inungendū, adiectis acacia, alumine, malicorio, & aliis apud Aet. descriptis: etsi tussis molesta grauer affligat, thymus tritus & hyssopum, cum succo rad. dulc. ac melle cocto excepta, formataq; sub lingua tenenda dantur, vt iidem auctores sentiunt. Verum tum medicamentum hoc, tū & quodvis aliud humidum, q̄ ad eiusmodi curanda vlcera faceret, ægro supino cubanti exhiberi dēt. & iubent id in ore cōtinere, paulatimq; permitttere in asperā arteriam defluere, ex Gal. decreto *4. & 5. met. med.* Qua rōe nō solum pulmonis vlcera, sed & thoracis, asperæ arteriæ ac gutturis curari debēt: influit n. sic sensim, ac

paulatim de medicamento aliquid subtiliter & manifeste in ipsam asperam arteriam, & per eam ad pulmonem ac pectus. Alioqui veteres, desperatos vrebant aut relegabant ad mare seu Tabias. Attamen in tabidis non est vtendum cauterio ex his quæ actu, neq; ex his quæ potentia inurēdi vim habent, nec capiti vllum adhibēdum, nisi malum a fluxu acrim humorum ex capite factum sit: his tantum, ex Gal. doctrina *s. meth. med.* capiti admo- uendum, præsertim qua parte sagittalis futura coronali committitur; aut occipitio, inter primam & secundam verream, quo loco tutius fiet, nō exiguo commodo, reliquis vero nequaquā vtetur, cum extenuationi eorū nullo modo profint, imo maxime absint: & ideo ab eis abstinendum.

OBSERVATIO LVIII.

De monacha phthifica, pro deplorata habita, & quomodo euaserit: & de altero monacho quoq; euadente.

Monacha quædam phthifica pro deplorata a medicis relicta, vt Romæ nobis relatū est, cū ibidem agerem, sequenti remedio intra 2. menses sanitati restituta dicebatur: Pullum exenteratū capiebat, ac in ventre 3. iij. sacchari rosati ponebat, ac demū aqua lento igne in olla cooperta coquebat: illoq; decocto supra cineres per totam noctē ollā relinquebat: mane vero ex pullo contuso cum suo iure manens in lecto sumebat, superdormiēs, quo q̄dē remedio sana euasit. Alius monachus, cui ossa præ macie crepitabant, vt postea lecto decumbere coactus fuerit p singulos dies: is quoq; a medicis, p deplorato habitus, duo oua recentia igne aduerso assabat in foco calido tantum, vt albumina vix coalescerēt, albuminib. reiectis, vitella in scutella ponēs: addebat puluer. sulphuris viui ad fabæ quantitatem maiusculæ, saccharo cando asperso eadem mensura, & salis momēto: quæ simul mixta cum vitellis ouorum capiebat hora vna ante cibos alios; & de super bibebat vini optimi dulcis cyathum vnum: modo sumebat aquā rosis solis vna cum vitellis ouorum: interim & pro tussi vtebatur syr. de liq. viol. diatrag. frig. ecligmatis modo; interim & aliis confectionib. distillationem inhibentib. Idem destillabat limaces teneros ante ortum solis in vinetis collectos; cuius & cochlear cū duobus vitellis ouorum subinde capiebat: ita vt macie consumtus, pinguis paucis mensibus euaserit, & præter spem quoque sanus factus sit.

SCHOLIA.

Scribunt veteres medici, sulphur lindis pdesse suffientib. purulenta, hinc & huic monachæ profuit cum vitellis ouorum. Easdem purulentias pulmonis pectorisq; & ab eo graueolentiā halitus, butyrum efficacissime iuuat, cum pari modo mellis Attici decoctum, donec ruffescat, & matutinis horis insumtum ad linguæ mensurā: quidā & laticis resinā, vt ante dictum est addunt. Sed hic puluis descript. Haly contra tabē, valde commendatur, quo & monachus ille, de quo dictū est prius, a Tarantano curatus fuit: *℞. pap. albi 3 x. gummi arab. amygd. trag. an. 3 iij. sem. portulacæ, sem. althææ, mal. an. 3 v. sem. cucum. melon. sem. cucurb. citrulli, sem. cydon. mun. an. 3 vij. spodiū, succi liq. an. 3 iij. peni ad pond. omnium, fiat pul.* Felicissime ego & diuerso modo

Cauterium.

I.

IO.

Curatio tabidorum cum exsiccantibus.

Topica.

II.

2.

Pulvis Haly contra tabem valens vlceri pulmonis & tussi.

Pulvis Rondo
dij.

3.

Spodium.

Sylui error.

4.

Benedicti Fa-
centius laus.

hoc puluere in multis usus sum, modo cum vitel-
lo oui, modo cum syr. pap. vel iuiub. inde et confi-
cio morsellas & cōfectiones in tabulis, qui pulvis
complet omnes intentiones: phibet n. descensum
pituitæ ad pulmones, incrassando, ob sem. pap. al-
bi admixtū in magna quantitate: & quatenus in-
uatur a gum. arab. & tragac. lenit pectus, & mate-
riam humectat, vt facilius per tussim extrahatur,
exsiccat aut pulmo a spodio. Fieret autem pul-
uis hic præstantior iuxta Rondel. *℞. sem. pap. albi ʒ
j. ʒ. gum. trag. & arab. farina orobi an. ʒ j. ʒ. sem. althæe,
portul. cucum. melonum, citrulli, bombacis an. ʒ ij. ʒ. cin.
caner. fluuiat. corall. alb. vʒi, succi glycyrr. an. ʒ j. ʒ. sacch.
ros. tab. ad pondus omnium, fiat pulvis: dentur ʒ ij. cum
syr. de pap. vel iuiubino.* Hic pulvis est efficacior alte-
ro, quia semen bombacis recipit, ac alia, quæ ma-
gis humectant, vt semē citrulli, cucumeris. In mi-
nori quantitate recipit pro spodio (q̄ conficitur
ex ossib. equi vel alterius animalis) cineres cācro-
rum, qui multum laudantur, in cancro & in mor-
su canis rabidi; & in hoc affectu; ob exsiccationem
& similitudinem, q̄ habere eorum caro cū pulmo-
nibus: ob id eius decoctū multum laudatur. Co-
ralli & cineres cancrorū abluantur leuiter cum a-
qua hordei, post adustionē. Nec oportet accipere
astaces fluuiorum (vulgo *escriuices*) qui habēt simi-
litudinem cum cancris: cancri tamen non sunt (vt
dicebat Rondolet. vt ex Arist. constar, qui inquit
solos cācros carere cauda, inter ea quæ tenui testa
integuntur. Sed adhuc astaces p̄staret capere, quā
leporem marinum, vt facit Syluius in suis Succe-
daneis: Est n. prorsus venenum, & sua natura pul-
monem lædit. Ob id, qui obnoxii sunt huic mor-
bo, loliginem non edant, quia lepus marinus istis
cōmiscetur, ita vt vix ab ea discerni possit, nisi te-
tro suo odore. Sed pro cācris fluuiatilibus, qui pas-
sim reperiuntur in Italia, capiemus cancrōs mari-
nos, vel stagni, qui eandē habent facultatem, quā-
uis imbecilliorē, vt docuit Diosc. *c. 10. lib. 2.* Neq;
reiiciantur ob falsedinem: nam ea adustione de-
ponitur. Cum aut in cibo vel iusculis apponuntur
vel assumuntur, debent prius ablui aqua hordei,
& caro & iusculum assumenda sunt. Valent etiam
contra venenum leporis marini potum. Non me-
latet (inquit idem Rondolet.) in exemplarib. Gre-
cis p̄ cācro marino, legi leporē marini; sed corruptus
est codex, vt patet ex Diosc. *c. de cancris li. 2.* & ex
Plinio: & pro lepore legendum *cancrum*. Vtimur
quoq; vt iam diximus, non sola aqua cochlearum
terrestrium, sed & decocto eorundem, & testudi-
num nemoralium. Vide de testudinum nemora-
lium & cancrorum condimentis ap̄ auctores & ap-
ud Benedict. præceptorem meum in sua Empi-
rica, de vlcere pulmonis & sputo saniei: quibus
ego felicissime aliquando usus sum, vt de hec-
ticis febribus diximus. In sua vero magna Praxi
ad phthisin peruenerat, sed vita defunctus, non
potuit vltra procedere, cum Bononiæ in celeberrimo
gymnasio in Italia per 30 an. & amplius, pu-
blice docendo floruit: cuius & ego auditor fui, cū
Bononiæ agerem. Is & plura edidit cōmentaria, &
in Aph. Hipp. & in prædictiones, quib. clarissimū

tanti operis testimoniū nobis reliquit: ac velut id-
eam cū ipsa ratione medendi: cuius & iucunda fa-
miliaritate vʒi sumus: quē nos apud Deū nūc mul-
to celebriorē esse speramus, cum & p̄fatio eius in
Empirica pietatem hominis erga Deū verū decla-
ret. Verum quantum ad curationem attinet ipsius
phthisis seu vlcere pulmonis, quāuis nunc satis de
ea dixerimus, si hæc nobis nondū satisfaciant, po-
teritis illos adiungere, qui in Rhaf. scripserunt, &
potissimum q̄ longo sermone narrantur ab Arcu-
lano, vel breuius a Gatenaria: Primo victū p̄scri-
bunt conuenientē, qui & causā phthisis relinquit: &
hinc primo abscindunt causā, q̄ ægrū ad phthi-
sin deducere possit, curando catarrhum, vel et an-
ginā, pleuritidem, pulmoniam, sputum sanguinis,
empyema, vel similia, si in causā fuerint. Sed horū
curationem iam diximus. Interea ista curando, et
habent rationē phthisis, sed rationem causæ ali-
quando habentes et ventrē solvunt, & aliquando
sectionem venę adhibent, vt videre licet apud Ar-
culan. Sed vlcere iam facto, nullo modo conueni-
unt, neque phlebotomia; nisi noua fiat exspuitio
sanguinis, aut venę alicuius recēs apertio merua-
tur, & vires ferāt, sed iis deiectis & extenuatis, neq;
solutiva neq; venę sectio cōueniunt. At vbi vlcus
est pulmonis, duas p̄cipuas intentiones ponunt,
nempe absterfionem seu mundificationē; & con-
solidationem; quib. & tertiam adiungunt, corre-
ctionem accidentium. Vlcus in pulmone abster-
gunt cum syr. facilitantibus sputū, vt est syr. de li-
quiritia, hyssopo, marrubio, cum decoctis pecto-
ralibus, echinatis, potionibus. Deinde conso-
lidant, quamuis magis studium esse volunt, in ab-
stergendo, cum postea natura ex seipsa sapius in-
carnet & consolidat; ideo præcipue vtuntur zac-
charo ros. Interea pro consolidatione vtuntur
pulueribus iam supradictis, ex terra sigillata, bolo,
& aliis apud Mesuem tum Arculan. & alios descri-
ptis, cum lacte, aqua pluuiali vel chalybeata cum
syr. e miua coroneorum, & succo myrti, & simili-
bus: cautionem tamen adhibent, quod, si ex eius-
modi astringentibus sputum retineatur, exhibent
cum syr. de hyssopo, de liq. vel cum decoct. pecto-
rali & similibus. His & alii adiungunt adhuc in-
tentionem exsiccandi & resoluendi cum iis, quæ
lambuntur & suffumigantur: de quibus vide Ar-
culanum capite de tussi. Huius etiā fumigii men-
tionem facit Rondel. Hic tamen canonem obser-
uari volunt, et cum de tussi loquerentur, q̄ nō sint
administranda, nisi cum febre careant, vel exigua
sit materia. Quare cum cautione istis vtendum, &
videndum nunquid sputum retineāt. Habes for-
mulas descriptas ad vlcera pulmonis apud Rond.
De medicam. internis fol. 141. & ad alios affectus. Vo-
lunt tñ quidā, ne iis vtamur in vlcere pulmonis, &
vbi multa est materia saniosa in pectore, vti Gra-
dus admonerat *c. de tussi.* ideo & Arculan. cum ea
suspecta sint, nolebat vti nisi leuiorib. ex gummi
cedri cum melle, adiecto exiguo galbano; & licet
et ad hanc intentionem Galen. vtēbatur theriaca;
eadem, vt suffitus, illi suspecta erant ob hecticam.
Sed Galenum Theriaca vsum fuisse credendum,

Curatio eorum
qui Arabum
decreta sequun-
tur.

6.

7.

8. febre nō admodum valida existente. Vltimo addunt correctionem accidentium, & præcipua duo ponunt, nempe fluxum v̄tris, & extenuationem: quibus alii addunt tussim validam, sputum sanguinis, constipationem ventris, fastidium, febrem putridam, vt Arculan. facit; nonnulli & sitim addunt, fluxui ventris occurrunt cum pul. descripto apud Rhaf. c. proprio, qui fit ex pul. gum. arab. spodii, boli armen. sem. myrtini, an. p. equal. vel 3j. contritis in farinae modum: ex syr. myrtino vel pap. saluberrime datur drachmā pōdere. In phthisi igitur rationem accidentium habere oportet. Sic pater meus carissimus Iordanus Forest. vir nobilissimus, p. m. cum senex annum 65. fere attingens, ex tabe moreretur, licet toto morbi decursu nihil cruoris exspueret, circa finem vitæ guttur quasi inflatū erat, per abscessum, vt videbatur; sed eo iterum delitescente, in alui profluuium incidit, cui statim occurrebamus, cum iure restaurante, ex capone & perdice, adiectis pyris, & pomis cotoneis & semine berberis, adiecta pauca aqua ros. & sumach. (& his similibus) vt magis constringeret, & exiguo vino cotoneorum, vt illum simul restaurare possemus, etiam ventrem inunximus vnguentis restringentibus: nā fluxus ventris, vt recte admonebat Rondeletius, magis inuatur ad extra astringentib. ventrem, vel remediis infusis per sedem: quæ si per os sumantur, faciunt anhelitus difficultatem, & tussim excitant; vel sputum retinent. conserua tamen ros. cum terra sigillata vera, vel bolo cum syr. myrtino, minus nocet. Sed cum talis fluxus plerumq; lethalis sit, præcipue in fine, vt diximus, parum in patre meo carissimo iuuerunt, ita vt vir senex admodum pius, anno 1559. vlt. Febr. die in Domino quieuerit, postquam benedictione vltimo habitam filios suos cum filiis Deo commendauisset Abrahami modo. Extenuationi vero occurritur restaurantibus, de quib. iam satis dictum est, quale illud est, quod habet *aliquid carnis restudinis mundatæ, & cancrorum fluuiatiliū in aqua hordeacea decoctorum, nucum pinearum, pistaciorum, amygdal. dulc. passul. mundat. seminis cucumeris satiuī & melopeponis purgati: singula separatim conterito, penid. addito & sacchari perpurgati albissimi q. s. ex aqua cochlearum destillata ad vnitatem redigito. Quidam adiciunt superstitiosius, vt putant aliqui, gemmarum quarundam farinam, porphyrite marmore tritam, vel aurum: sed diligenter videndum ne aliqua fraude officinarum lapides illegitimi pro veris & pretiosis immisceantur. Sed de nutrientibus & roborantibus antea dictum est, & auctorum libri his scatent. Tussi autem subuenimus, vt cap. proprio de tussi dictum est, ita & sputo sanguinis: de quo prius satis egimus. Si igitur in vlcere pulmonis denuo sputum sanguinolentum appareat, vel superueniat, vel præcedat, ad caput de sanguinis sputo recurrito. Constipationi ventris, quæ tamen non est adeo timenda in hoc malo, facillime occurrimus cum enemate leniente infrigidante & humectante, vti ex lacte, saccharo, vitello oui, & oleo viol. &, si necesse est, cassia adiecta, vel melle viol. idem præstat lac sumtum cum multo saccharo,*

& iure gallinarum cum saccharo. Fastidio autem & deiectioni appetitus obuiant exhibitione cotoneorum & miua, & emplastris ex cotoneis & vino ac aceto rosisque, momento galliæ muscatæ adiecto (modo non sint mulieres, quæ morbo vterino laborant) ventriculo appositis: ego vtor solo cerato ex mastiche ad ventriculum roborandum. Febri subuenitur aqua hordei & prisana hordeacea. Si inualescat febris putrida, constante virtute, digeratur humor febrem faciens, & euacuetur secundum exigentiam, sed leuibus ob extenuationē. Et si adsit hectica sine putrida febre, succurratur balneo, eo modo quo de febribus hecticis ad longum docuimus. Vigiliis subuenimus emulsione papauer. & syr. eiusdem, qui optimus est in hoc morbo, modo non retineatur materia intra pulmones & crassitiem: nam tunc vbi sputum retineretur, ab eo abstinendum, & potius linimentis soporiferis circa tempora vtemur: vel syr. viol. cum aqua hordei dabimus, si sputum retineatur, & relaxantibus vnguentis pectus inungemus, & eclegmatibus sputum expectorantibus iam superius dictis. Nunquam adeo attentum esse oportet ad id, quod magis vrget, vt omnino negligatur morbus aut aliud symptoma minus. Siti occurremus cum iis, quæ de siti diximus in febr. & pilulis sub lingua ex mucagine cotoneorum, psyllii. semin. 4. frigid. maior. mund. & succo glycyrrhizæ, & diatr. frig. quæ omnia etiam ad phthisin & tussim ac exsiccationem faciunt. Si vlcera sint in aspera arteria, vel, vt alii scribunt, in canna pulmonis, curantur vt vlcera pulmonis cum medicamentis abstergentibus & consolidantibus, quæ potius vt eclegma lambendo diu in ore detinenda, & paulatim deglutienda, vt in asperam arteriam descendant tunc tussi, vt diatr. cum pauco melle vel syr. convenientibus ad consolidationem, diatr. cum bolo vel terra sigil. cum syr. myrtino, ita & in vlcere pectoris procedendum, vt de pulmonis vlcere dictum est, si nec ita sanetur, sed in fistulam transeat (quales nos multos annos superuixisse vidimus) nulla alia est via in curatione, vt antea dictum est, nisi aperiatur exterius, vbi tumor est, vel cauterio vel scalpello aut phleboto-mo, vt antea dictum est; & egresso pure & repurgato vlcere, consolidetur. Quod si aliquid costæ sit corruptū, pars eius corrupta medicinis vel cauterio actuali euellenda, postea rursus repurganda, & consolidanda. Nouimus tamen in multis post apertionem, exterius vlcus non potuisse consolidari, & perpetuo viruse pectore euomuisse & diu ita vitam protraxisse: imo noui quosdam ita fistulas in pectore habentes, alioqui bene valere (vt in quodam Cornelio Ioannu apud Delfenses puerorum magistro) præterquam quod fistula tale virus modo plus, modo minus euomat vsque ad vitæ finem sine incommodo viuentes, quanquam misere vitam trahunt ob virus & pus, quod ita perpetuo euomitur & effluit. Et ita absoluius omnia thoracis ac pulmonis vitia ac morbos, tum partium vicinarum, quibus hunc librum finiendum esse duximus, & ad cordis mala accedendum.

II.

Ulcera aspera
arteria seu can-
na pulmonis.

Ulcera pectoris.

LIBER DECIMVS SEPTIMVS,
De cordis ac quibusdam mammilla-
rum affectibus.

OBSERVATIO I.

*De cordis palpitatione, variisq; exemplis eiusdem, &
de quodam vulnerato vehementissimam
palpitationem cordis incurrente.*

1.



Alpitationem cordis (quæ nihil aliud est quam immoderata cōcusio, vehementi diastole ac systole molesta) veteres vel in sanguinis exsuperantiam retulerunt, vel in

2.

3.

humorem copiosorem in pericardio infixum, vt Fernelius censebat; & secundum eundem etiā re-
torrida bilis aliquando eandem peperit, quæ alias sponte vacuari consueuerat, in arterias effusa. De hac meminit Fernelius, duos a valida pilæ exerci-
tatione repentina morte sublato, cum in illis de-
prehenderit bilem in tophi nigri speciem concre-
uisse. In ceteris vero causam animaduertimus bilem esse perassatā, interdum in præcordiis, sæpius in liene congestam. Quamobrē in hoc symptoma plurimum propensi sunt, qui hypochondriaca melancholia laborant, vt sæpe animaduertimus: atq; his dieb. iuuenem quendā nobilem Mansardum nomine, valde ingeniosum, doctū, sed melancholicum, præ manib. habuimus, qui frequenter palpitationē cordis incurrebat, idq; sæpissime ex tristitia. Vehemēter exasperatur hoc malum immodica exercitatione, æstu, balneis, venere, crapula, excandescencia, meraciorē vino. Is enim si præcipue vinum Rhenanū (quia subtile, vt arbitror) sumeret, magis hoc malo tentabatur; & præcipue ex metu & tristitia: & quamuis sæpe per me curatus fuerit, ex leui causa in melancholico hoc malum redibat, aptis autē hic remediis eo tēpore a me curatus fuit; quanquā idem postea hinc discedens, vt audio, non sine melancholia viuat, etiam hoc tēpore anno 1590. cum hæc rursus colligerem. Frequentissime cōtingit a flatuosis, fumosis, malignis, crassis vaporib. atq; spiritib. in pericardio magna ex parte, aliquando etiam in sinibus cordis conclusis qui aut in corde generantur, aut aliunde inferuntur, nimirū ex hypochondriis, in hypochondriaca melancholia (vt nunc diximus) & in iis quibus lien bilis atræ copia turgescit. In his etiā circa lienem & pancreas cōspicua & molesta percipitur arteriæ palpitatio: ex eoq; loco per arterias, quibus multis lien perfusus est, teter aterq; vapor promte in cor vicinum subit, cuius vi & malignitate irritatum, vehementiori pulsatione nititur q̃ noxium est excutere; haud secus atq; cerebrū in epilepsia. Iam etiā hoc malum oritur subinde ab vtero, ventre aliisq; corporis partib. male dispositis: ex partibus enim prædictis facile multi sæculēti fuliginosiq; vapores per arterias in cor subeunt. Sepe quoque fit ab aquoso putridoq; humore, vrinæ simili, a quo malus odor quoq; efflorescit, qui maiori copia pericardio concluditur, quā vt cor libere se dilatare possit. Et licet ab ira, exercitio, tum supradictis sæpe irritetur, animi & corporis quiete remit-

titur: contingite quidem cor a prædictis causis irritari, tuncq; nititur (vt iam diximus) id quod noxium est valida pulsatione expellere. Potest idem malū nasci ex tumore aliquo aquoso, sanguineo vel carnosio in pericardio enato, vel a tuberculo, abscessu, vermibus, cor vellicantibus, subita euacuatione, imprægnatione, vt postea exemplū ponemus, inflammatione, item ab aqua tunicæ inclusa, & humore putri ac male olēte, lapillis, venenosa qualitate in illa tunica hærentib. aliqui addunt & a veneno, quod tamā negat Iacchinus: Ego, inquiens, omnes naturas venenorum legens, lynceopas quædam facere audiui, cordis palpitationem non audiui. Ab halitu tamen & vapore flatuoso educto ex vitioso humore fieri volūt ob eandem causam & ictericis & spleneticis, melancholicis fere omnibus, & cachexia laborantib. puellis & similib & qui in aquam intercutē incidunt. Sed & interpretes Hollerii etiā a venenosa qualitate & spirituosio halitu tum aliis omnib. iam dictis oriri asserit, siue ab externis, siue ab internis, siue in ventriculis cordis, siue in substantia, siue in pericardio, siue in arteriis causa subsistat, siue accadat extrinsecus, vt vtero, liene, hepate, ventriculo. Quæ omnia iam supradicta ab Hollerio obseruata sunt. Sic archidiaconi, hoc malo interemti, corpore dissecto abscessus in substantia cordis inuentus: in alterius pericardio, aqua: in Britone quodā inflammatione cordis: in alio abscessus in vena arteriosa: in multis pericardium flatu distentum, qui tandem in aquam solot concrefcere, nisi cordis calore dissoluatur. In muliere quæ quatuor mensium spatio incredibili vrinæ cruciatu laborauerat, duo calculi reperti in corde cum multis abscessibus, integris renibus & vesica. Sed notatu dignissima historia Præsidis primarii Rhotomagensis, nomine Remon, qui ab ineunte ætate ad annum quinquagesimum quintū, quo obiit, cordis palpitacione corripit solebat, præsertim a somno meridiano, & vbi arctius tibias constrictas habebat. Sensus quidam tremulus erat ad carotidas: huic pulsus vel nullus, vel paruus, & sine ordine. Soluebatur paroxysmis edito crepitu, ruptu, clystere, dolore in mediis clauiculis excitato, deinde in frōte, vel tussi satis violenta sponte mota. Relictis tibiarum vinculis, & somno melius habebat. Eadem symptomata in muliere nobili apparuerunt. Vtrisque hepar calidius, ventriculus frigidior. Hinc multa fuliginosa excrementa, spirituosusque vapor & crassus, in arteriis interceptus, continebatur, qui in cor exhalans, incutiebat tremorem vel palpitationem, donec motu, attritu, aut calore (quod ad id non sufficeret facultas vitalis) dissolueretur, aut aliunde exitum haberet. Eodē modo & ob eandem causam paulo ante & ictericis, spleneticis & melancholicis fere omnibus & cachexia affectis euenire diximus: eodem modo & Galenus, ex balneo & vitiosis lignis accensis mulierem solitam animo deficere & palpitacione cordis laborare, scripsit: alteram ab vteri affectibus idem pati: cui-dam, si vel per horam lauaretur, idem accidere, nisi prius panis aliquid assumsisset: hominem,

6. dum exsolueretur, & cor fortiter palpitaret, repente interiisse. Sed omnibus neq; eadem causa, neque eadem pars affecta: modo enim in ore stomachi, modo in corde fit principium defectionis animi. Palpitatio quoque non semper causam habet in corde, sed pars affecta est, cum qua mutuum habet consensum, ut pericardium, & arteria, praesertim maiores & viciniore, inde vterus & similia. Causa autem modo per se morbum efficit, ut tuberculum, lapillus, aqua, inflammatio, de quib. paulo ante dictum est; modo aliquid commouet, quod morbum efficiat, ut balneum & ligna succensa in muliere, cuius meminit Galenus, & hepar ac ventriculus in praeside Rhotomagensi, quam causam Hippocrates manifestam appellat aphorismo adducto, sicut priorem non manifestam, a qua periculum mortis repentinæ imminet, non ab altera, licet tandem quoque interficiat. Ob idque vitam praesens ad 55. annum produxit, cum ceteri eodem morbo, sed causa dissimili, breui perierint. Verum hæc euenisse compertum est: sed quod nunc referam rarissimum & minus a multis visum, quod iuueni cuidam accidit robusto, vigesimum octauum annum agenti.

7. Hic in pago Schaga dicto, an. 1549. mense Iunio vulneratus fuit in dorso sub scapula sinistra, vulnere thoracem transeunte; qui mox febre valida continua acuta correptus est, & in cordis palpitationem adeo vehementem & violentam incidit, ut etiam extra domum, in qua æger decumbebat, a transeuntibus (potissimum, si fenestrae occlusæ aures admouerent) palpitatio cordis exaudiretur: ut in vita similem casum neque audierim neque viderim, neq; a præceptoribus meis obseruatum compererim: quamquam Fernelius, medicus, si quis alius, clarissimus & doctissimus, scribit huius tantam vim esse, ut sæpe sit animaduersa thoracis vicinas costas effregisse; sæpe & eas, quæ supra mammam sunt, de propria sede depulisse; sæpe etiam arteriâ foras dilatasse in aneurisma, contracti pugni magnitudine, in quo & tactu & visu conspicua erat pulsatio. Ita quidem affecto corde arteriæ omnes vehementius pulsant ac interdum dilatantur, præcipue vero, quæ supra iugulum sunt. Ad hunc iuuenem cum ingressus essem, hanc grauem palpitationem animaduerti ortum habere ex sanguine intus remanente, vel ibidem concreto: quanquam chirurgus (ut ii homines solent) omiſſa venæ sectione potiones vulnerarias & sanguinem dissoluentes exhibuerat: cum tamen venæ sectio in recenti vulnere facta (nisi in ventre consistat) statim fieri debeat, & expediat quoque ex ipso vulnere statim sanguinem plus minusve effluere: quippe phlegmone sic minus tentabitur, tum vlcus ipsum, tum quæ circumposita ei loca sunt: & ideo etiam statim venæ sectionem adhibere oportet. Male igitur tonsores nostri, vel qui chirurgi esse volunt, in vulneribus magnis interiora penetrantibus ab initio sanguinis missionem omittunt, statimque tanquam ad sacram anchoram confugiunt ad suas potiones vulnerarias consuetas, easque subinde admodum

calidas propinant, quibus amethodi perpetuo vtentes febrem ac phlegmonem inducunt, mortis causam inferentes. Siue igitur mulrus sanguis defluerit ad cor (nam & a multo sanguine obstructionem faciente palpitatio otiri potest) semper & ratione febris & potissimum palpitationis conueniebat venæ sectio, idque in iuvene robusto, licet vulnerato, in quo sanguis non satis ex vulnere fluxerat: cum & vulneris quoque ratione venæ sectio ineunda erat, ut 4. methodi mendendi Galenus ex Hippocratis decreto docuit. Iam quoque multoties Galenus subito palpitationem cordis sine alio accidente, aut vulnere euenientem detractione sanguinis curauit: imo omnes palpitatione correptos (ut 5. de locis affectis habetur) venæ sectione sanauit: & quendam quotannis verno tempore incidentem in palpitationem eodem modo præseruauit, cum tales, si ab ea abstineant, magna ex parte subito quandoque intereant. Memini non ita pridem rusticum quendam vulneratum in pago Scermerio dicto etiam in palpitationem fere similem incidisse. & ob sectionem venæ prætermittam subito interiisse. Quare venam sinistri brachii tundere feci, sanguine satis pro viribus extracto; & ilico a detractione sanguinis, inscio chirurgo, melissam viridem & boraginem accepi, contritas inquam herbas, ne ab astantibus cognoscerentur, easque supra regulam mundam ignitam posui, aqua rosacea & aceti momento irroratas: quas cum cordis regioni admouissem, miraculi seu incantamenti modo, ilico cessauit cordis palpitatio, omnibus admirantibus, qui praesentes erant; adeo ut vix aliquis vulneratus in eodem pago (cum tunc Almanę in patria praxin exercerem) si postea decumberet vel male haberet, me non vna cum chirurgo in curatione admiserint, & tempestiue, ad quosuis vulneratos vocauerint. Hoc autem arcano, nulli nisi viro Pythagorico reuelando, aliquando uti videram præceptorem meum Elideum Forliuensem, vel Paduanum, in praxi versatissimum; in nosocomio Bononiæ vulgo appellato Viræ. Verum is solo melyssophyllo utebatur; nos boraginem hoc tempore adiecimus. Ceterum licet palpitatio curata foret, nec amplius rediret: attamen ratione febris tum vulneris, cum postea aluum non satis deponeret, sequens leniens medicamentum propinaui: ℞. diacatholici ℥vj. electuar. de succo ros. ℥j. ℞. dissolue cum ℥ij. decoctionis infra scriptæ: ℞. vngulae caballinae viridis, consolida vtriusque & maioris, & bellidis, scabiosæ, buglae, saniculae, capill. veneris. agrimon. viol. ana m. j. radic. feniculi, bugloss. glycyrrhizæ rasæ, ana ℥j. cicerum rub. ℥ij. fiat decoctio in sero lactis pro ℔j. ℞. saccharo colat. dulcoretur. sumsit autem in diluculo lenitiua iam dicta cum ℥ij. huius decoctionis: altero die post venam sectam optime aluum excreuit, febre cessante nec palpitatione cordis redeunte. Interea pro vulnere reliquo decocto bis in die utebatur ℥j. interebullendum rubia tinctorum adiecta, & pro tussi, quæ tunc leuis aderat, modo ex syr. sequentibus, modo ex diatrag. in tabulis exiguum quid sumebat: ℞. syr.

9.

10.

11.

℞ syr. viol. glycyrr. an. ℥ ij. borag. ℥ j. postremo & his herbis in ceruisia decoctis & colatura facta bis in die pro vulnere repurgando & consolidando utebatur: ℞. caulium rub. sanicula, bugla, ungula caballina, artemisia rubescentis, melissa an. m. j. incisa in ceruisia communi coquantur: quibus remediis vulnere intus repurgato, opera deinde chirurgi, breui vulnus sanatum est, ac nutu Dei æger conualuit.

S C H O L I A.

12

Hic quidam antequam ad cordis affectus descendunt, cordis naturam describunt, eiusque structuram & situm, ac cordis & cerebri opera. de quib. quia nos in præfatione non nihil diximus, deinde etiam, quia Galenus, De usu partium abunde de iis egit, & post eum alii auctores, ut Arculanus & Iacchinus, tum alii plures, eos perlegere poteritis, & Benedictum Veronensem. Sed quia hic breuiter de cordis affectibus agere institutum est; Cordis igitur mala hæc plerumque sunt, palpitatio cordis frequens, animi defectus, cardiacus morbus, habitudinis corruptio, sicut est hæctica dispositio, de qua satis dictum est in libris nostris, De febribus hæcticis & marasmo. At vlcuscula non patitur membri nobilitas, nedum vulnera aut abscessus: protinus enim, teste Paulo Ægineta, subducuntur spiritus, & extrema sudore profluunt, & frigore corripuntur exitiali: imo auctore Plinio quouis modo læsum mortem adfert. Mulier tamen quædam Clara nomine & genere, apud Beniuenium cap. 35. cordis dolore interdum vexabatur, quem medici a malo ipsius cordis habitu fieri arbitrabantur. Sed cum pluribus iam annis connubio iuncta non conciperet, & sterilitatis causam quæreret, ac tollere conaretur multis præsidiiis, ita demum dolor ille cordis increfcere cœpit, ut perpetuus fieret. Ex quo sæpius etiam mulier ipsa deficiens, recreari vix poterat, donec, eo iam magis magisque inualecente, e medio sublata est. Ceterum mortuæ corpore inciso, & frustulum nigrioris carnis in sinistro cordis ventriculo supra arteriam, quod mespili formam haberet: & vulua a medio infra verius imam eius partem iunctis oris obcalluisse reperta est, quare ut tuberculum illud mortis, ita hoc sterilitatis causam fuisse cognouimus. Callum quoque cuiusdam in arteria magna, loco cordi proximo, natum obseruauit Dodonæus medicus mihi familiaris. Multis hic annis cordis palpitationi obnoxius crebro fuerat; sex vero ante mortem mensibus in sinistro carpo pulsum tam exiguum habuit, ut nullus frequenter apparuerit, ac sæpe sentire non potuerit. Fuit quoque, palpitante corde, difficile admodum huic potum admittere, ita ut vix vnciam simul bibere potuerit. In pectoris huius spatio sublutei coloris humor collectus quoque fuerat. At vulnus cor penetrans statim lethale est: uti meo tempore euenit in iuvene illo, fratre cuiusdam chorauli Alemariani, qui a quodam Venæo dicto vulneratus in pectore iuxta mammillam sinistram, protinus sanguine effluente mortuus est. Galenus hoc ipsum confirmauit, necesse esse hominem mori, idque præcipue si sinistra partis cordis ventriculus vel venter fuerit vulneratus. Si

vero non ad ventrem vsque pertingat, sed in cordis substantia consistat vulnus, ex ita affectis aliqui non solum ea die, qua vulnerati fuerunt, sed sequenti quoque nocte viuere potuerunt, qui oborta deinde inflammatione extincti sunt: ut vir ille in Scermerio pago, de quo diximus obser. præcedente, etiam mortuus est. Sed ii quam diu vixerunt, mentis compotes inuenti sunt: unde euident sibi testimonium sumit Galenus: & eiusdem cordis substantia secta, negat rationalem animæ vim in corde consistere. Mirabile tamen quid refert Beniuenius, de abditis rerum caus. cap. 42. De cordis parte patefacta: Inciso inquit, abscessu, qui supra septimam vertebra innotum longo temporis intervallo sinum fecerat, intimamque membranam sua sanie prorsus eraserat, minima ipsius cordis pars oculis cernentium patefacta est. Verum cum hominem summa & diligentia & sollicitudine curarem, in pristinam redactus est sanitatem. Hic tamen cor læsum non videbatur, licet aliqua pars ipsius oculis cerneretur: nam sicuti cor vulnera non sustinet, ita nec eius membranæ inuolucrum, cuius aquosus humor effluit: eo quoque abundante macies subsequuta fuit in simia secta apud Galenum, ut de Marasmo diximus in 4. lib. febrium hæcticarum scholio obseru. 10. quæ cum ad extremam maciem deuenisset, vitam cum morte mutauit, cum & palpitatio cordis ex eadem aquositate abundante fieri possit. Refert tamen idem Beniuenius ictum in cordis tunica conualuisse in quodam iuvene a fratre læso, in quo signa lethalia aderant; quem idem ad sanitatem perduxit, cum eius cordis tunica tantum leuiter fuisset ex vulnere perstricta. Huius videas historiam eodem lib. cap. 65. Verum hæc ad vulnera pertinent. Sed nunc de cordis palpitatione agamus, prætermittis iis vitiis, quibus, ut Ægineta refert, etiâ cor afficitur, nempe ex phlegmone, erysipelate, ceteris vehementissimis distemperantiis, acutissimis febribus, de quibus in libris nostris obseru. de febrib. egimus: cum multi ex animi mœrore, terrore & subita ingenti & insperata lætitia animo defecerint, & extincti fuerint. ideo utile est ex quibusdam notis qualitates cordis prius dignoscere; de quibus Gal. in primis consulto in libello, qui titulo Artis Paruæ circumfertur, & de calidi, frigidi, humidi & sicci cordis signis; quæ ad longum etiam a Ben. Alex. Veronensi, lib. 10. cap. 3. referuntur. Sed illud valde admirandum, quod Beniuenius refert de quodam Iacobo latrone, qui e patibulo, quo suspensus fuerat veluti iam mortuus, cum tamē adhuc viueret, depositus atque curatus conualuit. Verum ut erat homo ingenio malo prauoque, ad eadem statim scelera reuolutus, quib. antea extremum promeruerat supplicium, iterum capitur atque suspenditur. Quare hominis admirati (inquit Beniuenius) nequitiam, mortui cadauer incidendum curauimus: & inuentum est cor eius ob eximiam caliditatem vndique pilis refertum. Hoc idem inuentum est in corde Aristomenis Græci, qui solus perhibetur integras acies pugnando infugam vertisse. Est ergo non tantum scelesti ingenii signum

14

Historia Beniuenii, De cordis parte patefacta.

Historia tuberculi supra cordis arteriam.

13

Cordis ventre vulnerato statim mors sequitur.

15

Eiusdem historia de leui cordis tunica læsione.

16

De latrone cor pilis refertum habente.

sed quandoque etiam raræ fortitudinis. Ita & alius quidam Iacobus apud Amatum *cent. 6. curat. 65.* pilos in lingua genitos habebat, satis longos. Sed & Ferrariæ idem vidit alium confectum, cor pilis circumseptum habuisse, eumque in signem quoquelatronem & grassatorem. Verum quod ad pal-
 17 *Vtrum pal- pitatio cor- dis veniat a sola intem- perie & a ca- lida, medici inter se non satis conue- niunt.*

pitationem cordis attinet, cuius iam causas fere omnes retulimus, hanc Galenus a frigidis tantum causis euenire putat; & ideo, uti veteres medici quoque, calefacientibus ac extenuantibus reme- diis, cum attenuante victu curabant. At Arabes, & iuniores medici quidam, etiam qui Galeni doctri- nam profitentur, ex calida posse oriri contendunt. Vtrinque inter se digladiantur. Sic alii priorem partem defendunt ex frigore solo oriri; ut longo sermone videre licet apud Altimarum, & etiam Iacchinum, & alios non paucos. Alii & ab intem- perie calida fieri contendunt, ut Rondeletius, qui & contra intemperiem calidam, si ab ipsa oriatur, diamarg. frig. & diatrag. frigidum præscribit. Ho- lerijs quoque ab utraque intemperie posse fieri, ut & omnes, qui Arabum decreta sequuntur, au- tumat. Medici quoque etiam illustriores quidam confundunt palpitacionem cum tremore. Dixi-
 18 *Tremor quid sit.*
Palpitatio quid.
 18 *Tremoris & palpi- tationis conue- nientia & differentia.*
 19 *Modus gene- rationis tre- moris.*

musculis, postremo ventriculo, vesica, vtero, intestinis, iocinore, liene, septo transuerso ac arte- rijs & corde, de quo nunc loquimur, quod affici- tur per se vel ex locis vicinis, ut iam diximus. Tre- mor autem est impotentis symptoma, cum imbe- cillitas sit virtutis motuæ corporis; neque vna causæ species, quæ tremorem efficiat, reperitur, veluti papitationum, ut quidam volunt: quarum ortus est a nebuloso, crasso, vaporosoque spiritu. Neque remediorum vnum genus tremoribus & palpitationibus, ut lib. citato apud Galen. constat de palp. trem. quo item loco ac lib. 2. de caus. sym- ptom. & de morbis vulg. diuersas tremoris causas conscriptas discere poteris. Ideo errant, qui palpi- tationem cum tremore cordis etiam confundunt, licet nonnulli de iisdem vno capite tractet: & qui- dam etiam volunt, tremorem ex leui causa fieri, palpitacionem vero ex grauiori. Differt quoque palpitatio cordis a pulsu, cum palpitatio nihil aliud sit, quam ipsius eleuatio & depressio, ut dixi- mus, præter naturam, vel ipsiusmet cordis dilata- tio præter naturam. At in pulsu est secundum na- turam diastole & systole. Palpitatio itaque est sym- ptoma deprauati motus pulsantis cordis præter naturam, sequens morbum consimilem, nempe malam & inaequalem temperaturam cordis essen- tialem, vel ipsi aliunde communicatam. Altima- rus vero ait sequi intemperiem frigidam cordis: alii & calidam, & ex lib. De palp. dicit etiam ad vni- tatis quodammodo solutionem cõsequi, cum vel tumor præter naturam in eadem ambiente cor tu- nica, dura siquidem, fieri posset, aut humorẽ in le- cõtinente, qualem pustulæ, quas Græci hydatidas vocat, emittere solent. Facile autẽ cognoscitur ex agri relatione: namque cor ipsum præter pulsum palpitare sentiunt, quem proprium motum cor- dis appellamus: insuper & medici ipsi manu adhi- bita supra thoracem, loco quo cor ipsum situm est, tum tangendo sentiunt, qui adeo grauis fuit in nostro vulnerato, ut etiam exaudiretur, ut dictum est. Adest quoque spiratio exigua & rara, & pulsus inæqualis, ex eo, quod cor affectum est per se vel per consensum, ut iam satis in obseru. præceden- te declarauimus.

Quarum partium sit affectio pal- pitatio.

20

Quib. differe- rat palpitatio a pulsu.

Quis præter naturam affectus, & quem cordis morbum seque- tur. Signa.

OBSERVATIO II.

De palpitatione cordis ex sanguinis multitudine.

1 *I*VVENTIS quidam tempore veris, integra vale- tudine vtens (licet antea, ut ab astantibus intel- ligere potui, multis alimentis multum sanguinẽ gignentibus vsus esset, etiam copioso vino, & carne multa) cum subito in cordis palpitacionem incidisset, atque ad eum acciti essemus, statim mihi in mentem venit illud Galeni dictum, libro 5. De loc. affect. capite 1. quod palpitatio cordis, plu- ribus integra valetudine degentibus, tum adole- scentibus, tum adultis, subito sine alio manifesto accidente euenire visa est, atque omnes eos san- guinis detractio iuuat. Atque hoc accidente plane liberati sunt, qui post missionem sanguinis tenui victu, medicamentisque similibus vsi sunt: quos vero rursus huiusmodi accidens infestauit, eadem

via

via curati sunt. Ceterum noui quendam (inquit idem Galen. eodem loco) quotannis, verno tempore huiusmodi palpitationis accidere vexatum: qui cum per tres annos a sanguinis detractioe se adiutum intelligeret, anno quarto, antea quam accidens ipsum inuaderet, sanguinem misit: idq; plurib. deinceps annis faciendo, illa quæ post sanguinis missionem facere oportuit, diligenter obseruauit. At nihilominus hic quoq; ante senectutem morte præuentus est: sicuti & reliqui omnes, quorum alii quidē per acutas febres, alii vero cum sani degerent, affatim syncopo intercepti, interierunt: quamuis vnus vel duo, eitra syncopam, alia quadam mortis specie perierint. At vero sic affectorum magna pars, ætatem agebat quinquaginta quidem annis inferiorem, sed quæ quadraginta annos excederet. Hæc Galenus: cuius verba diligenter animaduertens, statim in iuvene carnosio, (virtute ac ætate, seu alio quopiam non inhibente) venam internam dextri cubiti secari iussi, cum totius corporis plenitudo adesset, quæ si non adfuisset, in sinistro misissem: & quia hic sanguis in bene valente satis multus esset & crassus, sua copia obstructionem faciens coarctatoriam, victum attenuantem & medicamenta deinceps attenuantia & cordialia præscripsi; & mandauit vt in aere mediocriter calido & sicco degeret, grauisque odoris experte, quoniam vt suauiter oleret arte id pararet. Omnia odorata cordi familiaria sunt. Somnū vero moderatum amisi, iubens tamen vt vigilias immodicas vitaret, & maxime immodicos animi affectus, præcipue mœstitiā & metum atq; etiam lætitiā immodicā, motumq; vehemētiorem & Venerem præcipue: & si leui exercitio uti vellet, illud quidem temperatum concessi; & vt aluum leuem seruaret arte vel clysteribus aut balanis, & vt cibos eligeret immodicę humiditatis ac flatu expertes, sed boni nutrimenti facilisq; concoctionis: vt sunt carnes pullorum gallinaceorū, starnarum, gallinarum, phasianorum, perdicum, merularum, turdorum, cuniculorū paruorum, ac aliarū auium paruorū montanarum, vitulorum, leporum; eiusq; vteretur præcepti modo assis, modo elixis, hyssopo, serpillio, satureia, & præcipue melissa, borag. bugloss. pimpinella, & similibus adiectis, & in carniū iure garyophyllis vel macere aut cinamomo & exiguo croco iniectis, quæ cor refocillant: & ad recreandum vires vino exiguo vteretur tenui & dulci mediæ ætatis, cum aqua boraginis, melissæ diluto, vel subinde iniectis floribus boraginis, buglossæ, vel ipsa pimpinella, si virides haberi possint. Deinde exhibui syr. de pomis, de epithymo, de corticibus citri ex infus. ros. cum decocto melissæ. Leniente medicamento deinde utebar, fumendo ꝑ. lib. vel ij. syr. infus. ros. pallid. cum foliis senæ cu. n. ꝑ. lib. aquæ melissæ. A purgationibus fortib. oportet abstinere. Adhibui quoque medicamenta attenuatoria, vt diambra, diamos. dulc. & amar. subinde & diacynamomum. Postremo etiam theriacam dedi ad ꝑ. lib. superbibendo parum aquæ melissæ. Exterius etiam epithema hoc vel simile cordi apponebam: & aqua

melissa, florum citrangularum, modo haberi possit, vel eius loco aqua borag. an. lib. s. aqua ros. ꝑ. lib. maceris, garyo. ph. cinamomi, ligni aloes, corticum citri an. ꝑ. lib. seminis ocymi ꝑ. lib. croci gran. v. adorsiferi ꝑ. lib. ambræ, mosci an. gran. ij. (modo non sit mulier vterino malo laborans, tali etiam vtimur, maxime in viris) fiat epithema cordiale. Quibus remediis vel his similibus non solum hic iuuenis, sed alii multi conualuere.

S C H O L I A.

Signa demonstratiua palpitationis per se nota sunt: at causarum & specierū quibusdam notis indigent. ita hic a sanguinis quidem copia, crassioris scilicet, nō adeo calidi (alioqui febrem intulisset,) hoc malum originem habebat, eratq; similis casus a Galeno iam descriptus. Vbi enim sanguis valde calidus est, æger maiorem æstum sentit, respirationem vitiatam ac magnam & velocē. Sed hic erat potius crassus, utpote sæpius eueniens & in sanis, non præcipiti periculo, ita vt curam suscipere possit: nam altera, quæ sit ex sanguine admodum calido, periculosior est. At præter hæc, quod a sanguine obstruente contingeret, monstrabat anni tempus (quemadmodū & apud Galenum, eo quod vere euenit, cum funduntur humores, & per corpus mouentur. Sed & copiam animaduertimus in venis, quæ potius cruditiorem sanguinem significabat, etiam ex ætate, temperamento, victus ratione, colore corporis, symptomatibus somni, inappetentiæ, & aliorum, de quibus in lib. De plenitudine agitur. Si vero a melancholia, vel ab humore melancholico, aderunt & symptomata melancholica, tristitia, sollicitudo, metus & alia, quæ de melancholia diximus. A frigore vero & humoribus frigidis & pituitosis, causæ præcesserunt, quæ calorem innatum extinguere solent, ut aer frigidus, & alia, quæ etiam per accidens calorem innatum extinguunt, vt euacuationes excedentes, cibi frigidi: aderunt & pulsus tardi, rari, prauis, & anhelitus similis etiā extra paroxysmum; frigoris sensatio. & alia signa ad sunt, quæ frigidus, crudos, pituitososq; humores abundare notant. Qui autem etiam a bile fieri volunt, causæ præcedentes exsiccantes calfacientesque & ægitudines biliosæ id demonstrabunt, pulsus, anhelitus magni, veloces, frequentes & duri, inflammatio, sitis, & reliqua, vt anni tempus, habitudo biliosa, æstas, qui & fame sitique & exercitio lædantur, vi pituitosi ab iisdem iuuantur. Aliquando ex aquositate in pericardio contingit: neq; enim mirum videri debet, tantam humoris multitudinem cumulari aliquando (vt Galenus dicebat lib. 5. De locis affect. cap. 1.) in ambiente cortunica, vt ipsum ne attollatur, impedire possit. Quippe in animalibus affectis vidimus plerumq; plurimum humoris, vna speciem referētis, in eo, qui ipsum inuoluit, panniculo contineri. Etenim tunica quædam, quum emaciari indies videretur, eam tamen necessariis nostris negotiis impediti, secare in tempore non potuimus; post mortem vero, reliquis corporis partibus omnibus illa sis, inuentus est in ambiente cortunica tumor præter naturam, hu-

Signa a copia sanguinis crassioris, vel calidi.

Signa ab humore melancholico.

Signa frigoris & pituitosi humoris.

Signa aquositate in pericardio.

Similia.

morem in se continens, qualē pustulæ, quas Græci hydatydas vocant, emittere solent. Atq; in gallo quoq; vidimus cordis tunicam, huiusmodi tumore, & quidem duro, affectam, perinde ac si plures crassæ membranæ inuolutæ altera alteri fuissent: verum in eo nihil humoris cōtinebatur. Unde verisimilis coniectura elicitur, homines etiam similibus posse affectibus infestari. Quod autem de simia dixit Galenus, id quoque de aliis aquositate habentibus in pericardio intelligi potest, nempe hominibus, quoniam & sine manifesta causa emaciantur & tabidi fiunt. Sed cur id eueniat, Galenus non dicit. At causa emaciationis est, quoniam succedit hæctica febris: nam ex cordis angustia febricula fixa necessario oritur: nam supercalferi est necessarium, si non libere attrahit aerem. Alii & hoc signum addunt ex ægrorum relatione, quod ipsis videatur quasi cor aquæ innatet, & inde comprimatur, & deterius pulset. Gignitur vero & aceruat auctis causis naturalibus, ut scilicet densa admodum tunica sit, multaq; humiditas circa viscus, ut in mulierib. plus aggregari accidit, & animalibus humidis, sicut patet ex dissectione. Si vero consumitur humiditas existens in capsula cordis seu pericardio, corpus exsiccatur, ut Arculanus vult, & arefit indies absq; febre: ubi enim fit a caliditate superflua, id per inflammationem in corde perceptam notatur, modo nō fuerit fixa: si autem fixa per inflammationem sanata ante fixationem, pulsus anhelitus sunt magni, veloces, frequentes etiam extra paroxysmum, ac causæ præcesserunt calfacientes, ut febris, motus fortis & similia. A flatu vero fieri indicant: repentina accessio, asthma, motus tremulus in genis aut palpitatio in genis oculorum, vel in aliqua parte, aut dolores repentini, qui statim cessant sponte sua: oculi etiam quodammodo obtenebrantur, sonitus aut sibilus aurium his solet accidere: excitatur enim leuissima corporis motione, & tādē asthmatici fiunt. Si ab obstructione, per diuersitatem pulsus magni, parui, tardi, velocis dignoscitur. Ita & a debilitate non facit pulsus fortem, estque cum priuatione signorum repletionis. Si ex malo situ aut compressione, cor suffocari & cōstringi videtur: ita & solutio continui per proprias causas nascitur, vel apostemate præcedente vel abscessu aut vulnere, quod & dissectio immediate demonstrabit. Si per communitatem totius, ut in febribus, id febres indicabunt: nam iis decrecentibus discedet. Si per consensum aliorum membrorum, ut a ventriculo fiat, id nausea, bilis vomitus, & similia facile aperient, & circa stomachum dolor. Ita & de aliis membris censendum. Et si a crisi signa critica aderunt. A vermibus, punctiones id quoque indicabunt. At signa, quæ prælagiunt futuram palpitationem, habentur ex causis occurrentibus, & malum cordi imprimantibus, atque cordis temperamenti excessu, & aliis causis disponentibus. Prognostica quoq; nunc fere patient ex prædictis in obseruat. præcedente: nam licet quidam videantur ab hoc symptomate liberati per venæ sectionem, victumque extenuantem,

ac medicamentorum ope, nihilominus permulti, (ut ex Gal. ostendimus) post annū vel plures menses eodem malo rursum correpti, ante senectutem morte præuenti sunt: alii per acutas febres, alii sani degentes, syncope correpti & extincti sunt; periculum enim repentinæ mortis impedit, si diutius superflueq; affligat, crebroq; repetat. Hoc malum quoq; familiare est syncope correptis: quā ægritudine & antecedere, & in quā etiam mutari solet. Et iis quoq; quib. lien tumidus est atro sæculentusq; sanguine, & qui hypochondriaca melancholia laborant, meticulosi metusq; quoq; hoc malo familiariter perturbari solent. Et licet adolescentibus tum adultis euenire possit, magis tamē accidit iis, qui ætatē agunt quin quaginta quidē annis inferiorem, sed quæ 40. annos excedat. Si quoq; in pericardio multam generet materiam, vel humiditatem cōsumat, vel apostema adsit, subitas mortes infert. At ea, quæ ex flatu vel vaporibus fit, aut per consensum, minus periculosa est: sed quæuis confirmata periculo non vacat, & quouis modo fiat, circa initia curatio non est negligenda: nam aucta vel perdurans in syncope (ut diximus) permutatur. Sed hæc, quæ de signis diximus, clariora exemplis sequentibus euadent.

OBSERVATIO III.

De palpitatione cordis a frigore & materia pituitosa.

Diximus frequentius a causa frigida & pituitosa, iuxta Galenum, palpitationem fieri, ut ex eiusdem curatione liquet, cū medicamēta potius attenuantia & dissecantia quā frigida præscribat: ita istis diebus mulier valde pallida, si aliquo frigore tentaretur, in palpitationem cordis incidebat: caputq; huic graue erat, frigebat, crudisq; humoribus frigidis abundabat, eratq; hystms valde pluviosa & nebulosa, cum ad illā accessus essem, & cordis palpitatione afficiebatur, quæ & antea quoque correpta fuerat, ut ipsa met narrabat, præcipue si frigore aliquo modo obrueretur. Pulsus huic valde tardus erat: cui & hoc epithema statim præscripsi: ℞. aquar. bugloss. melissa an. lib. ℥. v. vini maluatici ℥. iij. pul. specier. electuarii de geminis, caryop. hyllor. an. ℥. j. ℥. pul. diambra. (cum fateretur morbo uterino nunquā se obnoxiam fuisse) ℥. ij. ℥. sm. curi; behen albi & rubri, ossis de corde cerui an. ℥. j. croci ℥. ℥. fiat epithema; quod calide cordi cū panno rubro scarlato applicabatur. Cum parum frigeret, iubebam etiam tum manus, tum pedes panno calido calferi; quo paroxysmus ad tempus cessauit. Verum, ne rediret, materiam pituitosam, adiectis etiam cordialibus, hoc modo vel simili digerendam esse, proposui: ℞. syr. de bugloss. mellis ros. colati. syr. de byzantiis ana ℥. j. aqua melissa betonica, hyssopi an. ℥. ij. misce fiat syr. pro ij. dosibus, utatur cum syr. ℥. ij. pro vice elect. diambra. in tabulis. Syrupum adhuc semel cepit, deinde illam purgavi hoc modo: ℞. syr. ex infus. ros. pallid. cum foliis sena ℥. j. ℥. aphemici ℥. j. aqua melissa, borag. & rosemarini ana ℥. j. misce; fiat potio: quibus optime aluū depoluit: postea dedit theriaca optima ℥. ij. conserua florum borag. ℥. ij. capiebat postridie mane lex horis ante passum, & melius

A flatu.

9
Ab obstructione.
A debilitate.

A solutione continui.

A communitate totius, vel aliorum membrorum.

Signa prælagientia.

Prognostica.

melius habere coepit: quamuis post mensem iterum eo malo apprehenderetur, sed non ita fortiter. Iussit ut singulis mensibus caperet has pilulas: *℞ pilul. de hiera simplici, pilul. alephang. agarici trochiscati an. ʒj. cum syr. conseruat. citri, fiant pilula viij. mane sumende.* Interea quoque praecepi, ut ex hoc condito omni mane sumeret: *℞ corticum citri ʒacch. conditi, conserua summitatum melisse, conserua borag. an. ʒj. conseru. flor. anthos ʒβ spec. latificantium Gal. pul. diambra, diamosci dul. an. ʒj. seminis citri, ossis de corde cerui ana. ʒj. myrobal. unum empeliticum conditum. fragment. omnium lapid. pretios. ʒj. cum syr. censer. corticis citri q. s. fiat electuarium moderate liquidum.* De quo sumebat mane & vespere tribus horis ante pastum, ad magnitudinem paruae castaneae: quo deglutito, ut parum vini maluatici minime diluti biberet, consului. Interea etiam si vellet, & si magis delectaretur solido electario, ut modo hoc, modo praecedente vteretur, mandavi: *℞ specier. elect. de gemmis, specier. latific. Gale. diambra an. ʒj. dissolut. in aqua meliss. adiect. ʒacch. a biss. ʒj. singaturq; electuarium solidum in test. illa: um figuram; fiatque singulae ponderis ʒij; & sumatur vna mane, altera vespere, duabus aut tribus horis ante pastum; mox cochlear vnum vini maluatici superdeglutiebatur. Quibus haec optime se habuit: interim ei praecepi, ut optimo victu attenuante (de quo superius dictum est) vteretur, ne recidivam incurreret.*

SCHOLIA.

4 **H**vic autem mulieri, cum in hyeme essemus, Venam non secumimus. Attamen instante vere, cum morbo hic magnus esset, venae sectio, ut fieret, imperauimus, saltem ratione partis affectae, etsi intemperatum ad frigidum in hoc affectu sit cor, tamen quia princeps viscus est, & cum ipsa venae sectio secundum Galenum saltem reuulsione gratia conferat, prohibens ne ad ipsum excrementa confluant, tum quod imbecillum sit, tum etiam ne propter hunc praeter naturam palpitationis motum excrementa quoque trahat, ideo ut fieret venae sectio iussimus, ex sinistri cubiti vena lienari dicta, eo quod plenitudo totius corporis non adesset: interea tamen iubebam (ut etiam aliquando in principio facere consueuimus) ne multa sanguinis copia per venae sectionem vacuaretur; cum & alias, si opus fieret, potius iterandum esse ducimus: nam quanto maiorem in numerum particulas a xeris detractiones, tanto reuulsione efficaciorum efficeris, ut a Galeno decretum est lib. De curat. per venae sectionem. At in valde debilibus, frigidis & exsanguibus, ut valde senibus, a venae sectione aliquando abstinuimus. Ita frater meus carissimus, Nannius Forestus, supremi Senatus Consiliarius, cum anno 1589. palpitatione cordis in hyeme afficeretur, iisdem fere remediis supradictis sine venae sectione, cum annum 62 superauerat, uti mulier praecedens, curatus fuit; vir exsanguis, debilis & melancholicus, ita ut a venae sectione, cum facile in syncopen incideret, eo tempore abstinuerimus. Sed huic mulieri tantum semel, instante vere, ut sanguinem, non tamen mul-

tum, detraheret, consului. Facile enim tales deficiunt, si plus a quo detrahatur: imo & pituitosos & melancholicos vidimus, si eis tres aut quatuor unciae auferebantur, praesertim si paulo debiliores essent, animo deficere. Sic cum Mansardo nobili melancholico (de quo in 1. obs. huius libri mentio facta est) in vere palpitationi cordis sepius obnoxio vix parum sanguinis detraheretur, ilico animo deficiebat, ut statim vena occlusa in palpitatione cordis & syncopae satis frigidam incurreret; a qua frictionibus & aqua in faciem conspersa, magna cum difficultate ad se redierit, etiam vertiginosus. In quibus, tum palpitantibus, maxima huius ratio habenda est, ut pulsus tangendo, si is minuatur (ut nos hic fecimus) venam occludi iubeamus. Si itaque cum frigida intemperie, frigidorum quoque humorum sit abundantia, antequam ad valde attenuantia medicamenta perueniamus, a venae sectione, ea quae iam dictos succos concoquendi praeparandique vim habent, tribuenda sunt; & deinde purgandum: & sic in pituitoso conueniet *mel. ros. oxymel. simpl. compositum, aut scillinum, cum syr. e cort. citri. aut de hyssopo, & decocto sampsuchi, pulegii, origani, melisse, additis syr. cordialibus, de bugloss. de borag. capill. ven. & similibus: deinde purgandi cum myrobal. empel. vel infus agarici. aliquo cordiali addito; abstinendo a colocynthide, quia cor laedit; aut hoc modo: ℞. agarici trochis. in vino albo infusi ʒj. exprimat fortiter, & cum decoct. pass. & flor. cord. in aqua borag. decoct. fiat potio; addendo manna ʒj. vel ʒij. β. & si non sufficit, adde decoctioni iummitatum thymi & seminis carthami contusi an. ʒβ.* A purgatione vero, ut usus postulat, medicamentis castificantibus & attenuantibus, ut xyloaloe, diacalamentho, dianiso, tum aliis supradictis, utitor. Etiam electaria vel opiata ex diamarg. calid. de gemmis & de hyacintho, confect. alkermes, confer. rad. bugloss. borag. & florum roris, bugloss. & helenii, conueniunt: quae etiam valent in humore melancholico. De quo postea etiam exemplum dabimus.

OBSERVATIO IV.

De palpitatione cordis a materia calida biliosa

PALPITATIONEM quoque fieri a materia calida & biliosa, non solum Rondeletius & Holerius admittunt; verum & Fernelius, & multi alii, de eadem exempla posuere: nos autem vnum tantum adiciemus. Iuuenis quidam biliosus, cum circa caniculam lusu pilae incaluisset, in syncopen quasi incidit cum cordis palpitatione, qua & postea ex leui incandescencia aut animi motu vehementiore corripiebatur. Hic autem consulendi causa me accessit: erat admodum rara constitutionis, qui aegre sanguinis detractionem ferebat: nam cum illi vena aliquando secta esset, animo deficiebat; quare sanguinem detrahere nolui. Nam recte Rondeletium dixisse arbitror: Sunt qui (inquit) in omni palpitatione laudant missionem sanguinis; qui laudandi non sunt, si fiat iis, quibus non competat phlebotomia, sed tantum euacuatio. Cum igitur a bilis copia

6
Si pituitosus
redundavit
humor, quo
modo is praeparandus, &
deinde purgandus sit.

Vena sectio
ad reuulsio-
nem tantum
quomodo in-
stituenda.

huius mali origo fieret, cōsultius mihi videbatur, primo syrupis vii, & refrigerantibus & alterantibus; deinde leuibus medicamentis; cum cor fortia laxantia nō sustineat. Quare vt hunc syrupum vel similem per triduum biberet, mandauī: ℞. Syrup. de succo acetosae, de acetos citri, de ribes ana ℥j. B. aqua cicchorii, borag. bugloss. ana ℥ij. misc. & ieiunus per triduum in diluculo bibat. Postea hoc infuso rhabar. illum leuiter purgaui: ℞. rhab. selecti ℥j. B. spica ℥ss. infunde per noctem facta prius leni ebull. in aqua cicchorii ℥v. mane huius fortiss. express. accipe ℥ij. addendo syrup. ex infus. ros. pall. d. ℥j. pulpa thamarind. cum aqua borag. extracta ℥v. misc. fiat potio, detur in diluculo; qua satis bene excreuit. Vacuato corpore cōsului, vt quotidie matutinis horis vteretur electuar. sequenti iij. horis ante pastum, ad paruē castit. nē magnitudinem: ℞. conserua ros. vnius anni, conserua viol. conserua ros. bugloss. ana ℥ss. B. conserua summitatum melissa ℥ij. pul. specier. diarod. abb. trionfant. diamarg. frig. ana ℥ij. offis de corde cerui, sem. citri ana ℥j. marg. frig. lapid. pretiosi commun. ana ℥j. B. corallirub. ℥ss. cum syrup. de acetos. citri, fiat elect. molle. Sed & hoc epithema vel huius amulum similiter praescripti: ℞. aqua ros. ℥ss. B. aqua borag. buglossa ana ℥ij. aqua melissa ℥ij. coralli vtriusque, omnium santal. specier. diamarg. frig. ana ℥j. caphura gran. ij. croci ℥j. aceti vini optimi exiguum; fiat epithema cordi mane & vespere ante pastum tepide admouendū. Consului quoque, vt sacculum pyramidalis figura de serico pannotaro, cui & pulueres sequentes insuantur, cordi apponeret: ℞. florum ros. rub. exsiccat. florum bugloss. borag. etiam siccorum. flor. viol. siccorum ana ℥j. folior. melissa exsiccat. ℥ss. omnium santal. ana ℥j. B. coral. rub. offis de cord. cerui pul. ana ℥ss. beben albi & rub. ana ℥j. misc. & fiat pul. qui saeculo, vt dictum est, insuatur. Irigetur cum aqua ros. & buglossa. & regioni cordis applicetur. Talia, vt etiam epithemata in materia frigida obseruatione praecedente descripta, aliquando adhiberi possunt, urgente palpitatione cordis, exsistit secus, corpore etiam nondum vacuato.

S C H O L I A.

4
Materia frigida cordiales.

Materia, quae cordi conueniant, praecipue in palpitatione & in syncope, alie frigidae sunt, calidae causae conuenientes; aliae calidae in frigida, quae & medicamenta cordialia appellantur. Ex frigidis vero, viola, nymphaea, rosa, santali, caphura, accium, omphacium, berberis, cerasa, pruna acidula, acetosa, succus malorum granatorum, citri, limonum, citrangulorum, pomorum odoriferorum, persica, carabe, coriand. praeparata, cydonia, pyra, lac acetosum, diarod. abb. sine speciebus, diamarg. frig. irionfantal. condita ex his, conserua & syrup. Ambigua, aurum, argentum, margarita, coralli, os de corde cerui, unicornis, fragmenta hyacinthi, smaragd. blatta, byzantia, spodium, doricum, melissa, borag. buglossa. Sed horum quaedam ad calida referri possunt, Hollerio teste. Ex his trochisci comparantur; sunt epithemata, poma odorifera, stragula & vestes suauis odore imbuuntur, potionesque & elect. solida, quae & palpitationi & cordi conueniunt.

At calida, vt ambra, storax, calamintha, muscus, gnum aloes, caryoph. cinnam. cortex citri, & citrangulorum crocus, nux muscata, macis, sem. maior. basili-ci, vinum aromat. odoriferum, enula, feniculum, petrosel. galanga, Zedoaria, amomum, cardamomum, cubeba, rosmarinus, mentha, polium, calendula, cheriaca, mithridarium, elect. latific. Gal. & Rhasidiambra, diamarg. calidum, diarod. cum speciebus, alipta moscata, gallia moscata, pliris sacroticon, capus, perdic & volatilia. Similes vero cordiales medicinae descriptae sunt ab Auicenna, cuius catalogus recetetur ab Arculano; & harum rationes adduntur, & qua ratione ita dicatur, vel quod sint temperate aliquae ex iis, vel quod confortent virtute secunda, vt stipticitate vel odore, vt rosa & muscus; & a proprietate occulta, adiuta a qualitate manifesta, vt spica, crocus, per aromaticitatem (vt medici loquuntur, & caliditatem, & temperamentum & stipticitatem, vel per proprietatem occultam adiuta vt hyacinthus, & similes. Veraeque cordiales sunt temperatae medicinae, aliae theriacales vel bezoarticae dictae. De quibus ad longum videas Arculanum supra Rhas. cap. 73. De passionibus cordis.

O B S E R V A T I O V.

De monacho melancholico saepe ex inani metu palpitationem cordis incurrente.

MONACHVS quidam ex ordine Carthusianorum, & is, quem Procuratorem vocabant, natura melancholicus, & etiam ordinis ratione (cum & solitarii fere omnes tales melancholici euadant) ex inani metu subinde palpitationem incurrebat. Hic enim cum tempore pestis peregre proficisceretur, domum forte ex improviso accedens, in qua nonnulli peste exstincti essent, adeo horrore corripiebatur, vt statim in accederet, seque ex metu pelle infectum conquirebatur, qua tamen minime laborabat; & vthanc imaginationem quamuis falsam ab eo depellerem, remedia quaedam apta, tum euacuacionem leuem per pharmaca ad praecautiōem facientia praescripti: quibus licet bene habere coeperit; inanis tamen ille metus per multa tempora, etiam menses illi adhæsit, vt si solummodo de peste cogitaret, melancholia etiam laborans, statim horrere concutiebatur, & palpitationem cordis etiam grauem postea incurrebat & tandem totus melancholicus euasit: ita, vt si vel stramina praeforibus aeri exposita ad euentilationem cerneret, aliquem ibi mortuum esse ex peste sibi persuadebat, & imaginabatur, neque ades transire audebat; & nunquam a longe tantum stramina per plateam dispersa videret, quin mox palpitatione cordis corriperetur. Cum itaque succus melancholicus huius palpitationis causa esset, vt humor concoqueretur, pro huius mali curatione praescripti sunt sequentes: ℞. syr. de pomis, de corticibus citri, de succo borag. an. ℥j. B. decoctionis melissa, borag. lupulorum ℥ix. misc. pro iij. dosibus matutinis. Cocto humore praeparato purgatiuius cum decocto senae & syrup. de epithymo. Postea etiam sanguinem in moderata quantitate, cum in Aprilis hoc symptome afficeretur, & in vere essemus, extraxi-

extraximus ex vena basilica cubiti sinistri: & postea eadem adhibuimus remedia, quæ ad melancholiam hypochondriacam valere scripsimus. Eodem modo & curationem instituiamus in nobili quodam iuvene Mansardo, diu melancholico & palpitatione cordis affecto, de quo prius diximus. Post syr. exhibitos ex succo borag. bugloss. de pomis, de epithymo, & betonica cum decoct. melissæ, cardui benedicti, borag. bugloss. & summitatum lupul. eundem purgauimus hoc modo: *℞ syr. ex infus. ros. pallid. cum foliis senæ ℥ j. aqua melissæ ℥ ij. ℥. elect. leuicini ℥ y. misce:* reitauimus sæpe syr. supradictos, & e corticibus citri, cum decoctis cordialibus; & iterum illum purgauimus in hunc vel similem modum: *℞ syr. ex infus. ros. pallid. cum foliis senæ ℥ j. confectiois hamech ℥ iij. aqua melissæ ℥ j. ℥. misce.* qua portione quinquies vel sexies alium deiecit. Dedimus condita ex confer. borag. buglossæ, melissæ, betonice, adiectis diamarg. calid. diambre, diamofci, cum syrup. de limonibus, & corticibus citri: & ad sacculos cordiales, & elect. solida superius dicta commodè deuenimus: quib' subinde palpitatione cordis cessabat, licet sæpius recidivam pateretur, ob diuturnam, & longam melancholiam confirmatam. Aliis quoq; simili malo affectis consulimus, vt aliquando pilulas caperent de lapide lazuli ad ℥j. in paulo robustioribus: deinde vt ad attenuantia medicamenta superius descripta deuenirent, cordialibus medicamentis semper adiectis.

S C H O L I A.

Sicutem palpitatione cordis fiat ab humore melancholico eodem fere modo curatur, vt melancholia hypochondriaca, adiectis semper iis cordialibus tum attenuantibus, quæ etiam ad pituitam valere diximus, interim humorem melancholicum prius concoquendo & expurgando. Si fiat a flatibus, cuius signa antea posuimus, prima ventriculi concoctio perfecta procurari debet, & flatus qui in ventriculo & intestinis sunt collecti, discutendi: idque duabus intentionibus perficitur, & materiam illam pituitosam expurgando, & aqueam, ex qua flatus gignuntur, pilulis aromaticis, de hiera & syrup. materiam concoquentibus cum syrup. dictis in decoctis, adiiciendo aliquid anisi: & rursus euacuando cum pilulis fortioribus, vt sine quibus, vel aggregatiuis. In erasinum danda theriaca antiqua vel confect. arom. ros. vt causa illa efficiens corrigatur, nempe calor diminutus. Hæc referenda omnia illa remedia, quæ dicuntur capite, De inflatione ventriculi. Si sit ex melancholia flatuosa, etiam illa adhibenda, quæ de hypochondriaca melancholia diximus, additis semper flatus discutientibus in maiori quantitate: & si fiat ab obstructione, addenda deobstruentia. Eæ eadem ratio erit curandi hunc affectum ab obstructione, cum illo qui fit a pituita: sed istis decoctionibus addenda erunt, anisi, fœniculi & alia flatus discutientia, vt galanga, garyph. macis. Nam magna ex parte morbus hic ex generantibus flatus accidit, illis hominibus qui patiuntur obstructions hepatis & lienis, vt licet videre in

puellis patientibus cachexiam, vt antea meminimus. & male coloratis. Derur etiam theriaca, cum aqua buglossæ & melissæ. Post purgationem conueniunt & electuaria vel condita superius descripta, & epithemata etiam in melancholicis, & alia topica, vt olea, nempe costinum, nardinum, quibus & pulueres addendi, vt ligni aloes, cinamomi, maceris, croci momentum, & cera, vt in vnguentum coeant, pauco addito vino odorifero. Quibus regio cordis inungenda statim post epithemata; eodẽ modo & sacculi supradicti ex cordialibus compositi. Rondeletius optimum medicamentum parat & alimentum ex corde porci (in quo inditi sint garyophylli) in vernasato, vel super prunas prius cocto in aqua, vt caro tenerior fiat, alioqui dura est, quia fibrosa: vt *℞ cordis porci n. ij. cordis cerui vel bonis, n. ij. garyophyl. galan. g. maioris & minoris sem. basiliconis ana ℥ iij. macis ℥ iij. florum bugloss. borag. ana. p. j. florum anthos. p. iij. temperentur in vino maluatico per noctem, & distillentur omnia in alembico.* aqua vsui seruetur: *℞ aqua prædicta ℥ iij. sacch. parum, fiat in leb.* Aqua illa valet in omni passione cordis, a materia frigida, flatuosa, vel a vaporib', & in melancholica passione: sed in materia non frigida adde aqua ros. partes æquales, & vtatur cum aqua buglossæ vel boraginis. Dosis huius aquæ est ℥ ss. superbibendo vini hypocratici ℥ ij. Sacculi ad fatus cordis, qui etiam ab eodem magis laudantur quam emplastra vel epithemata, fiunt hoc modo: *℞ garyophyl. ros. flor. anthos ana ℥ j. cortic. citri sicci, macis, ligni aloes, santali albi, & rubri & muscati, liq. senæ n. ocym ana ℥ j. spica celtica & lauridula, foliorum m. laur ana ℥ ss. contundantur, & fiat puluis, & ex eo sacculus intersuus, vt artis est, pro corde paratur: irroretur cum vino albo, & aqua buglossæ vel melissæ; applicetur calfactus.* Est & hoc optimum: *℞ florum cordial. ana p. j. caryophyl. mauris, id est anthophylli ℥ j. decoquantur leuiter in aqua buglossæ & melissæ. in lb. j. decoctionis, adde vini albi vel clari lb. iij. caryoph. ℥ j. cardam. ℥ ss. sacch. q. s. fiat syrup. aromatizetur cum ℥ j. cinamomi.* Si a serosis humoribus anctis fiat palpitatione, danda est opera, vt euacuentur, qui in venis continentur. Nam id, quod collectum est in pericardio, si nil amplius in illud refudarit e venis, calore cordis absumetur. Serosi autem humores, iuxta eundem Rondeletium, euacuantur vsu feri caprini, vel asinini, vel succo ros. decocto, brassicæ marinæ, seminis cathami foliis, senæ, & aliis medicamentis capit. De hydropo & cachex. In hoc tantum differt, quod hæc remedia sunt imbecilliora & magis cordialia, & ea, quæ minus cordi aduersantur, vsurpantur: *℞ rad. graminis, rusc. asparagi an. ℥ ij. rubia maioris ℥ j. galæ & cyperi an. ℥ ss. herb. capillar. fumar. cich. end. an. m. j. sem. anisi, apu. porros. an. ℥ ij. medulle sem. cathami. polypodii querc. senæ orient. ana ℥ ij. cicerum rub. p. j. sem. hederæ, rad. iridis an. ℥ j. sol. brassicæ marinæ 3. part. m. j. florum anthos, bugloss. ana p. j. fiat decoctio in sero caprino ad lib. j. cui adde succ. ros. & syr. ros. lax. an. ℥ iij. sacch. solidi ℥ vj. fiat syr. medic. decoct. capiat ℥ vj. pro dosi, alternis dieb. vel*

Topica.

6

Aqua mirabilis ad cordis palpitationem.

7

A serosis humoribus curatio.

Curatio a flatu.

Ab obstructione.

5

quotidie, prout magis vel minus operabitur. Si paretur tempore calido, paretur sine sero, quia facile acescit, & syrup. corrumpit. Præter illa remedia, describenda cap. de cachexia, sunt adhibendi sacculi supra pectus, qui vim habent siccandi: *℞. cort. citri, santal. omnium, galangæ, cyperi ana. ʒij. pul. de gemmis, & diamarg. frig. ana ʒj. caphura ʒj. ʒ. bombace excipiantur, & fiat sacculus interbafatus, qui irroretur vino & aqua melissæ.* Idem etiam potest apponi, si a causa flatulenta fiat affectus, addendo tantum anisum vel cyminum, vel aliud flatus discutiens. Opiatæ etiam cor magis respicere debent, quam quæ in supracitatis capitibus describentur: ut *℞. cort. citri conditum, Zacch. ʒ. ʒ. confer. anthos ʒj. confer. stæchad. & florum cichorii an. ʒij. confect. aromatici ros. ʒj. pul. diagalang. & diamarg. calidi, vel de gemmis an. ʒj. cum syrup. conseruationis corticis citri, fiat opiata.* Ille aduertere oportet, quod neq; conseruas violarum, neque buglos, vel borag. addimus, quia nimis humectant; & hic potius siccandū quam humectandum. Caphura in hoc morbo magnā vim habet, etiam in collo suspensa, a quacunque causa proveniat. Optima victus ratio in hoc morbo est maxime necessaria, quæ magis exsiccans sit. Rhasæ autem etiam, si ex aqua in pericardio fiat, siccis & calidis curat, sed non quibus suis, sed aromaticis, ut trochiscato muscato, quem in potu exhibet, & diamoschum pretiosum ad syncopen valens & ad tristitiam cordis & tremorem. Sed horum usus utilis quidem priusquam marasmus inuadat, nam tunc alia ratione hic affectus curandus. Refert A-matus pulcerrimam historiam cuiusdam monachæ Florentinæ, palpitatione cordis ab humore aquoso laborantis, & curatæ, cui & assueti menses fluebant. Sanguinem detraxit ad librā semissem, & syr. propinauit ex succo melissæ, *Zacch. puri ʒj. syr. de pomis Saboris, de mentha an. ʒvj. decoct. senæ, cum additione pomorum camassorum optime redolentium, ut Antuerpiæ inueniuntur, vel eorum vice Apianorum in Italia reperiuntur ʒv. cum albumine oui, clarificetur & ʒj. ligni aloes opt. aromatizetur.* per aliquot dies continuauit. Victus ratio huic erat exsiccatoria, attenuatoria, sed optimi succi. Porus vinum meracius. Materiam per octo, dies præparatam expurgauit pharmaco ex *Rhab. & agar. concinnato: & si alium sponte non redderet, clystere vel balano soluebat: & post duos dies a purgatione cucurbitulam vnam magnam cū multa flam. ma ignitam regioni cordis affligi fecit, & cuti, post parua vulnuscula incisa, sale resperfit sub finem, ex quibus humor multus ad aliquot dies exsudauit: interim epithematis cordialibus saepe admotis in hunc modum descriptis: *℞. aquar. florum arantis, melissæ ana lib. ʒ. specier. diamoscei, diambra ana ʒij. croci optimi grana ʒij. vini maluatici ʒij. gallæ muscatæ Mes. ʒj. caryophyl. corticum citri, ana ʒ. ʒ. florum arantiorum, pseudodiptami ana ʒj. omnia in olla noua, ut decet tractentur, & ad ignem admota, in iisdem pannus ruber de cocco vel charmusino infectus immergatur, & pululum expressus sic calidus cordi admoneatur, & se-**

pe innouetur. Vsa est & conseruis ventriculum & cor corroborantibus: etiam hoc sacculo cordi admoto, quem semper deferbat: *℞. specier. diamoscei dul. ʒ. ʒ. diambra ʒj. florum arant. meliss. buglossi an. m. j. xyloaloes ʒ. ʒ. cinnam. opt. & veri, caryophyl. an. ʒ. ʒ. corticum citri ʒ. ʒ. omnia in puluerem redacta, sacculo insuantur, fiat sacculus serico interceptus. Quibus remediis hæc intra mensem ex toto sanata est.*

OBSERVATIO VIII.
De palpitatione cordis ab utero orta.

Mulier macilenta, procera, nigriuscula, atrabiliaria, quæ Delphis in interfluvio Portus Delfici habitabat, vteri suffocatione subinde detinebatur, cum magna cordis palpitatione. Empiricus puluerē (ut nos postea conspeximus) contra luem Gallicam ex argento viuo mixtū & cinabari, carbonibus ignitis inspergebat, fumigio facto ad nares. Quo malum ita auxit, ut etiam mulierculas medicastras in consilium adhiberet, quæ & puluerem succini nigri (nostri *suerie ameren* vocant) propinarunt, ita ut circa ventriculum ita angeretur, ut se veneno intoxicatam clamaret, palpitatione cordis plurimum aucta, vna cum vteri præfocatione, ut pro mortua ab assistantibus haberetur. Ac tunc prius me vocarunt. Frictionibus partium infernarum per me statim adhibitis, & vinculis circa femora iniectis, ad diuersionem globulum infra scriptum odorandum naribus obieci: *℞. assæ foetida ʒij. castorei pinguis ʒj. cum panno lineo, fiat globulus. inferius quoque caueris subiectis, vmbilico emplastrum apposui. ℞. emplastri contra matricem ʒ. ʒ. ducatur supra auram rotundam, paulo ampliore daleto, & in circuitu galbano obducatur.* Quibus remediis ad se redire coepit. Sed & tunc pro palpitatione cordis, usus sum iis, quæ vapores dissiparent; & licet aliquid aromaticitatis haberent, interim & amara essent, cum vterus vix aromata ferat, si dulcia sint. Repurgato corpore & vtero cum pilulis masticeis & de hiera, dedi decoctum florum chamomillæ in cerenisia decoctorum. Ructibus autē emissis plurimum iuuabatur. Exhibui quoq; conseruas florum rotis marini, puluere zedoariæ ex quo adiecto; postea etiam theriacam circiter ʒj. cū aqua melissæ. Quibus bene se habuit. Rursus etiam purgaui cum infuso sequenti: *℞. filior. senæ ʒij. ʒ. rhab. ʒ. ʒ. agarici trochisc. ʒj. seminis anisi, fœniculi, carui an. ʒ. ʒ. cinnamomi ʒj. infunde per noctem; facta prius leui ebullitione in ʒv. decoct. communis cum flor. cordialibus; & mane fortissima expressioni adde syrup. de artemisia, syrup. absinthii ana ʒ. ʒ. misce & quinquies aluū deposuit, quia debilis & facilis solutionis optime tunc habuit, ut per multos dies malum non fuerit reuersum: ita ut amplius illam non inuiderē. Postea vero, cum iterū sentiret cor palpitare ac tremere, mulier ignaua nec sui rationem habens, ex muliercularū consilio decoctum fœni putridi, granorum myrtillorum, & aliarum herbarum fœcentium in vna valde olida, subius*

vaporem

9
Centu. 3. cura. 43. De monacha curata a palpitatione cordis ab humore aquoso in pericardio contento.

10

vaporem excipiebat: unde iterum ad illam ingressus, olidum illum vaporem & foetidum sentiens, rogavi, quæ circa illam acta essent: quæ vix eloqui potuit; respondit se ex iam dictis rebus foetentib⁹ sedentem in sella perforata, subtus vaporem illum excipere. Stultam autem mulierculam increpans, quæ sibi necem ex insperato intulisset, ea omnia amoveri iubeo; rursusque præstidiis supradictis adhibitis, a paroxysmo ac vteri suffocatione tum cordis palpitatione liberata est. Mox illam refecimus cordialibus medicamentis, & iterum ceruisia ebibita, in qua flores chamomille incocti essent, ructibus emissis recte deinde habuit. Interim cum malum hoc ab vtero originem habuisset, & nunc in hyeme existeremus, consului, ut instante vere vena malleoli pertusa sanguinem, moderate tamen, extraheret, ne idem malum incurreret.

SCHOLIA.

4
Curatio si in febribus fiat

Si palpitatio cordis per consensum fiat, considerandum nunquid per communitatem totius fiat, ut in febribus, curatur tunc febrium curatione, & roboratione cordis, & resistendo malitiæ intemperiei, impressæ, vel a febre aut causis eiusdē, quæ secundum plurimū est calida, & indiget frigidis cordialibus intra assumtis & extra admotis: licet aliquando sit frigida, sicuti in syncopali humerosa; cuius exemplum posuimus lib. 3. observat. 29. De febre syncopali humoralis, de muliere syncopen & palpitationem cordis incurrente. Si autem fiat per crisin, eius finem attendere oportet; tamen cor tuendo secundum quod expediat. Curatio vero a membris particularibus, duabus intentionibus perficitur, habendo rationem membri communicantis; euacuando materiam, & diuertendo eandem vel vapores, & remouēdo malam intemperiem in ipso membro existentem, vel alterius cuiuscunq; nocuenti, roborando, ut sit minera laudabilium humorum. Secunda intentio debetur cordi, ipsum confortando, & resistendo nocumento impresso, & imprimendo in ipsum, secundum quod est expediens. Referi Rhases carnem accipitris a proprietate valere ad cordis palpitationem, ex historia viri cuiusdam ex Syriz. Si igitur a ventriculo, vtero, liene, vel hepate, aut aliis membris fuit, horum nocumenta prius curanda: & roborētur membra, ne transmittant, & necor recipiat. Sic de ventriculo, & aliis propriis locis dicitur: ita quoq; (ut quidam volunt) si fiat a peste, aer alteretur, & curetur, ut de peste scripsimus. Et si a venenis assumtis, curetur educatione eiusdem per vomitum aut pharmacū, exhibeantur antidota propria & bezoartica, & infistatur cordis roborationi. Si a vermibus, interficiantur sem. zedoarie, & educantur, ut capit. proprio De vermibus dicitur. Si ab aliis causis primitiuis, remoueantur, & cor roboretur. Si a rarefactione pororum & sudore diaphoretico, balneo, aut exercitio vehemente, fiant inunctiones refrigerantes, cordiales & modice astringentes, ut vng. ros. adiectis ros. fantalis puluerisatis ad maiorem constrictionem, inuncta spina, dorso, pectore,

A Crisi.
Curatio si per consensum aliarū partium.

A peste, veneno.
A vermibus.
A causis primitiuis.
A rarefactione meatuum, & sudore diaphoretico, balneo & exercitio.

pulsa, & hypochondriis. Cum cautione tamen, etiam zacch. rosaceo exhibito. A solutione cōtinui vel cordis apostemate nō curatur, nisi in principio inflammationis, cum sang. detractione, euacuatione, & diuersione. Si a dolore cordis, per remotionē causarum doloris curatur, ita si & a sensibilitate fiat, danda aromatica frigida, prohibendo omnes causas potētes ledere cor, & ipsum cor roborando, & iis, quæ sensum remittunt. Sic etiam a debilitate remouendo causas debilitatis, & cor quoque roborando. Sic matrona nobilis de Loo, vxor Pensionarii Delfensis, cum diuturno fluxu menstruum laborasset, cordis tremorem passa est; sed restaurantibus medicamentis, & iure restaurante & cordialibus recreata & constringētib⁹; etiam cucurbitula sicca mammis apposita, iuxta aphor. 50. lib. 5. ad tempus resstingebantur: quamuis hæc per annum eo malo laborans, viribus prostratis, hecticam tandem & marasimum incurrens, frustra medicorum excellentium ope vtens, vitam finit mense Octobri, anno 1562. E contra si fiat ex vapore sanguinis corrupti, ut menstruum aut hamorrhoidū retentione, prouocentur, & vena ex talo incidatur. Domina de Merode, soror Domine de Somerdyck, cum afflaret sorori morienti, ex tristitia me præsentem in animi deliquium incidit, & vteri suffocationem, ac cordis palpitationem, & vnius brachii tremorem; vt astantes, tum ipsa, apoplexiam metuerent: statim dedi exiguum theriacæ optimæ, cum oxymelice scyllino; & hunc puluerem cum ceruisia: ℞. rad. gentiana, seminis ostrutii ana ℥j. semen dauur ℥ss. misce: coque assumpto, miraculi instar ad se rediit. Fuera tñ antea iisdem symptomatibus obnoxia, vt referebat Domina de Cornes, vxor Domini de Asperen, quam Dominam de Asperen, alias cum prægnans esset, a dysenteria & vrinæ retentione curauimus. Frequenter etiam & hæc prægnans, & alias cum grauida non foret, cordis palpitatione vehementiori afficiebatur, ita vt in apoplexiam, vertiginem vel epilepsiam incidere metueret. Maritus cum apud Dominum Principem Auricum ageret, consultādi causa pro hoc malo me accessit. Conditum sequens per me descriptum vxori misit, quo omni mane utebatur ad magnitudinem castanæ; cuius vsu, vt postea idem ille Dominus de Asperen mihi retulit, ab illa palpitacione cordis in totum liberata fuit: ℞. conserua borag. buglossæ, conserua foliorum melissæ, (nam hæc vltima sepe ad cordis palpitationem sola nobis sufficit) ana ℥j. corticum citri conditi ℥. viij. myrobal. empelit. conditorum ℥iij. spec. larificandis Galeni ℥j. manus Christi cum perlis ℥ss. syrup. conseruationis corticum citri, syrup. de limonibus ana ℥ij. misce, fiat electuarium molle. Quod prægnantes aliquando palpitationem cordis incurrant & syncopen, forte sit a vaporibus ex vtero delatis; cum eo tempore ob foetum mentes retineantur. Sic memini matrem meam carissimam, Margaretam Nanniam, ex familia Baierorum, cum prægnans esset, facile syncopotentatam fuisse, si modo alius sederet: sed sale ori imposito

6
A solutione cōtinui, & apostemate.
A dolore cordis.
A sensibilitate.

A debilitate.

7
Historia aliquot mulierum nobilium cordis palpitacione ex diuersis causis laborantium curatarum.

ad se redibat, quo mulieres nostrę passim vtuntur, magno iuuamēto, forte ideo quod sal dissipat vapores tetros ex utero eleuatos. Et ita omnem curationem palpitationis cordis absoluimus, iuxta veteres & neotericos medicos: quanquam aliqui, vt ante diximus, palpitationem nō velint fieri ex causa calida, vt Altimarus quoque sentit, licet alii ex verbis Galeni, *Aphorism. 65. lib. 4.* velint ex maximo incendio vitalis facultatis, quę in corde consistit, palpitationem oriri posse; vbi Galenus ponderans verbum καρδιωγμὸν ab Hippocr. positum, ipsum bifariam intelligi posse indicat; vno modo, vt idem significet, quod καρδιαλγία: secundo modo, vt nonnullis visum est, motum quendam, cordis palpitationi similem per καρδιωγμὸν intelligunt, hoc est, crebrum & velocem cordis motum, & præcipue similem palpitationi. de hoc quoque malo agit Paul. *lib. 3. c. 34.* Sed de forti cordis palpitatione vult Altimarus Paulum loqui, nihil aliud intelligens, quam crebrum & velocem cordis motum, similem palpitationi existentem, & non de vera palpitatione. Et sic idem, atque alii nonnulli, hunc morbum cardiacum, & cardialgiā, & cardiogmon, ad oris vētriculi morbum referunt, de quo postea. Quamuis & hic morbus cardiacus etiam a doctissimis medicis cōfunditur cum cordis palpitatione; vt ab Alexandro Benedito Veronensi fit, qui *lib. 10. cap. 5.* De cardiaco morbo modo refert ad palpitationē cordis, cum ita scribat: Cardiacus morbus, etsi sine dolore, tamen periculosissimus est; præternaturalis est: supra modum enim cor palpitāt, contremiscere exinde sentitur, tum diffatur spiritus, ac in totum subducitur, & paulo post asserit fieri ex causa calida modo frigida: vocatque cardiacam calidam, modo frigidam: quibus adiungit cardiacam diaphoreticam, quę in febris cum sudore iungitur; de febris diximus. Vocat & aliam capit. sequēti cardiacam stomachicam ob vicinitatē oris stomachi euenientem: quam paulo ante ad Cardialgiā retulimus: de ea nos exemplum posuimus *lib. 7. De symptomatis feb. obser. 12.* Nunc ad syncopen progrediamur, quę subinde palpitationem cordis sequitur, vel aliam ob causam fit: de qua licet longiore sermone egimus *lib. 7.* iam citato, de symptomatis febrium, & multa exempla ac varia in medium adduximus, & licet ea tyronibus medicis sufficere videantur, tamen pauca hic adferemus, ad maiorem huius mali enucleationem.

OBSERVATIO VII.

De syncope ab utero orta, ventriculo etiam simul patiente.

MVLIER admodum prolifica, ita vt 23. proles ab vno marito suscepisset, cui anno ætatis suę quinquagesimo, etiam menses non deficiebant, illis subito restrictis, post aliquot dies in stomachi dolorem incidit, valde nausæabunda, & præcordiis simul dolentibus subito syncopen passa est. Frictionibus & ligaturis partium infernarum, a paroxylmo leuata, loqui cœpit. Verum cum hæc syncopis mox a cibo assumpto illam apprehendisset, & ad vomitum procliuis videretur,

hordei decoctum tepide cum saccharo & exiguo butyro adiuncto adhibui. Quo postquā plurima pituitosa vomisset, post horam vnā alius quoque per se soluta fuit, atque ab omni dolore subleuata. Quamquam inter auctores quidam quæstionem mouent, num in syncopi vomitus cōpetat, tandemque concludant competere quidem, his conditionibus, si æger ad vomitum facilis sit, vel materia syncopen efficiens in motu sit, & nausæam & subuersionem (vti hic fiebat) inciret: quo & dolor ille circa ventriculum & præcordia cessauit; quamuis altero die, sed leuior, rediret absque syncope. At exhibita 3j. pilul. hierę simplicis Galeni, cum huic matronæ alius facile moueretur, quinquies & pituitosa & pauca biliola deposuit, ita vt dolor amplius non redierit: quamuis & huic postea semel menses fluxere; idque naturali modo. Ab eo tamen tempore defecere, nec amplius visi sunt, defectu naturæ, illa ipsa deinde valida ac sana permanente.

SCHOLIA.

DE syncope acturi, si omnia denuo excutere vellemus, quæ de hac ipsa diximus in *lib. 7. De symptomatis febrium*, magis hic occurreret campus disputandi, quam in alio quocumque affectu. Primum propter causarum varietatem, quas in pauca capita non facile esset reducere; & tamen est necessarium, siquidem summa causa quærenda est apud Aristotelem. Remotæ enim propriæ naturam rei non aperiunt, neque ab illis indicatio curandi sumitur, cum sepe recte essent, vt in ea quæ ex ira, vel æstu balnei fit. Præterea neque exacte declararunt scriptores (teste Iacchino) quid per eam vocem intelligant, & qualis sit ægristatus, & quo modo differant ea nomina *ἐκλυσις, λειποδυμία, λειποφυξία, συγκοπή*. Nam si hæc confundamus, magnam ambiguitatem faciunt. *ἐκλυσις*, Latini nominant Exsolutionem: non desunt qui velint neque ipsam *λειποδυμίαν*, ab eo affectu quam Græci *ἐκλυσις* nominant, Latini, Exsolutionem, dissentire, auctoritate quadam freti ipsius Galeni, *lib. 1. De arte curat. ad Glauconem*; et si eo loco aliorum medicorum auctoritate loquatur: nam quod inter se discrepent, ab Hippoc. decretum est *aph. 8. li. 7.* cum dixit, *ἐπὶ φύματι τῷ εἴσω ῥήξεως ἐκλυσις, ἐματὸς, καὶ λειποφυξία γίνεται*. Similiter a Paulo *cap. 34. li. 3.* qui inter syncopes indicia cum exsolutionem, tum animi defectum connumerauit: *λειποδυμία* verò nomen compositum est a verbo Græco *λείπω*, quod Latine sanare Linquo seu Deficio; & *δυμός*, Latine animus, Deliquium, seu Defectionem animi significat: qua ratione quidam putarunt aliud esse *λειποδυμίαν*, a *λειποφυξία*: cum *λειποδυμία* animi defectum, *λειποφυξία* autē non animi, sed animę defectionem significet: compositum etenim nomen est a verbo *λείπω* & *φυξία*, quæ non animus, sed anima Latine dicitur. Verum quamuis nominum significata insipienti dissentire videantur, reperitur tamen Hippocratem interdum vno, quandoque altero vsum fuisse, volentem in re idem intelligere, vt patet 23. *aphorism. lib. 1. c. 8. lib. 7. quod & Galenus*

Cardiacus morbus iuxta Alexand. Beneditū Veronensem

10

1

3

4

lenus primo, De art. curat. ad Glauco. & 12. meth. meden. Nam in primo præcitato loco, verbo Leipothymia vtitur, & lib. 12. meth. *λεποθυμία*, idē per vtramq; intelligens: ideo prædicta nomina haud quaquam dissentiunt, sed inuicem confunduntur, ex Hippocr. & Galeni sententia: nam eadem pars, quæ afficitur in vtrisque, idem symptoma ac easdem dispositiones seu causas consequuntur; & ita quicquid de vno dicitur, de reliquo dictū putato. Nam nihil aliud per ea significare volumus, quam animi defectum; per animum intelligentes, animam ipsam animosam, quæ ex Galeni decreto sedem in corde habet. Cum itaq; deficit animositas, tenor ac promptitudo hæc animæ, ex quacunq; causa ortum habet *λεποθυμία* aut *λεποθυμία* appellatur. At quod Græcis *συνκοπή* nominatur, a verbo *συνκόπτω*, Latine Ferio, verbero, seu concido, deriuatum est, ita vt etiam animi concisionem, latine significare possit, licet Latini proprio nomine careant, etiam syncopen appellant, licet cum aliis dictis affectibus magna ex parte communice, & quasi similis sit animi deliquio, ab eo tamen discrepat. Nam (vt Galenus inquit) defectus animi præcedere consuevit syncopen ipsam; vt patet eodem *primo, De art. curat. ad Glauconem: & lib. 12. meth. medendi* inter lipopsychiam & syncopen differentiam tradit, cum maiorem causam syncope requirat, quam lipopsychia, etsi eadem possit vtriusque esse; tamen prout maior, aut minor existit, vnam vel alteram affectionem efficit. Idem refert Aetius, *lib. 5. cap. 96.* Nam animi deliquium (*vt ipse inquit*) repente incidit, sensu & motu hominem priuans; & omnino non sudant: syncope vero & vigilantes & dormientes inuadit, & omnino cum sudoribus, qui *συνκοπτικοί* appellari solent. Cum igitur ex eadem causa proueniant, & non alia ratione curentur, ideo etiam cum de syncope verba faciemus, quamuis maius sit malum, patebit quoq; & defectus animi curatio. Syncope igitur nihil aliud est, quam præceps virium lapsus, & animalium, quoniam sensu & motu præstatur homo, cū syncope afficitur; ac primo omnium vitalium, cum & cor ipsum legetur, vel per se, vel per consensum: nam pars affecta est ipsum cor; id, quod patet ex præcipiti omnium virium lapsu, ex imbecillitate paruitateque pulsus; ab extremorum frigiditate. Est autem symptoma pertinens ad actionem læsam omnium facultatum; omnium tamen primo vitalium, est enim syncope præceps virium lapsus, malumq; morti finitimum, cum sit solutionis initium ipsius naturæ: lipothymia autem præcedens syncopen, significat animi quidem defectum, absq; sudore tamen, frigescentibus tantum extremis corporis partibus; suntq; tunc spiritus dissoluti, vel aliqua ratione vitati, facultate vitali non omnino dissoluta existente. At in syncope lapsus grauior est, quod etiam Galen. significauit per vocem *ἄννη*. Nos enim multos vidimus, dum longo tempore (*nam sunt iam 46 anni*) praxin exercuimus, qui nihil a mortuis differre videbantur, quamuis postea reuiuiscunt: nam

pulsus sunt modo insensiles, vel exigui, vt plurimum, languidi, inæquales, vt 4. *De caus. pul. 12.* sæpe intermittentes, quod mortis aliquando signū existit: debilis quoque respiratio, aliquando & frigida. Vbi vero acutissima est, & morti proxima, motus deficit, sepe & sensus, vel valde obtusus fit. Abit & omnis flos faciei, tum in figura vultus, tum in colore, quem statum describit *Galen. 10. meth.* in illo iuvene, quem sciuerat syncopen incidere, qui prorsus sine pulsu erat: vix sentiebat impellentem: refrigeratus totus non loquebatur. Sed vt rem melius complectamur, lapsus hic magis minusque suscipit. Quamuis enim quilibet subito fiat: at multa est differentia, maioris & minoris, quod experientia sæpe visitur. Nam alii hæc accidentia omnia habent; & inter hos, alii mitiora, alii vehementiora, alii quædam horū tantum, quæ symptomata a prioribus plurimum grauitate vincuntur. Igitur syncopen auctores grandem affectum esse significare voluerunt, terribilem, & qui mortis speciem multum referat: & ideo leuiiores affectus vel dissolutiones, vel animi deliquia dixere Græci suis vocibus. Nam & gradu ab his differt syncope. Quod non aduertentes quidam, vt Auerroes, arbitrati sunt vacuatione Galenū ducere ægros ad syncopen: quod nunquam dixit ipse vel Hippocrates: sed *μέγας λεποθυμίας*; & sic rationes Auerr. contra Galenum inefficaces sunt. Interea (vt diximus) cor laborat aliquando per se, cum videlicet nullus alius affectus antecessit, nullumque signum præcessit alicuius alterius partis affectus. Id autem accidit aut propter magnam eius intemperiem, tunc autem subito non perit animal: aut propter vitiosum venenosumque aliquem humorem. Subinde quoq; fit propter inflammationem tumoremque ab alio quo alicui humore excitatum; tunc plerunq; subitanea comitatur mors. Alias laborat pro consensum, quem habet cum ore ventriculi, diciturque tunc syncope stomachica, & tunc vomitus, nausea, aut dolor eiusdem partis, seu morsus quidam præcessit: sic quoq; affectis primo reliquis partibus, vt vtero, vel aliis, corde vero consentiente, dicendum erit. Ex quibus etiam facile constat, ad quos cordis affectus consequatur syncope, nepe cordis intemperiem vel cum vitio seu venenoso humore, vel erysipelas, vel inflammationem, aut quempiam præter naturam tumorem, si per se fiat, vt patet *lib. 5. De locis affect.* & simplex intemperies minus nocet: sed ea, quæ ad instrumentales partes pertinet, subito enecat, ad similes minus: instrumentales subito id præstant, prius tamen præcedentibus quandoq; signis quibusdam, quorum vnum meminit Hippoc. *Aphorism. 41. lib. 2. sic dicens:* Qui sæpe & multum exsoluuntur, sine causa manifesta, ij repente moriuntur.

OBSERVATIO VIII.

De syncope, ab immodico mensium profusio oborta.

CVm syncope sit præceps virium lapsus (vt diximus) idq; ex insigni spiritus euacuatione, alteratione, interceptione; euacuatur spiritus,

*Syncope
quid significet.*

6.

Quibus syncope a lipopsychia seu lipopsychia differat.

*Syncope
quid.*

Pars affecta.

7

8
*Auerroes
deceptus
contra Galenū
temere
invehitur*

quia subtilior factus est, quia corpus rarius est in acri vehementiq; calore. In vehemēti animi motu, cum iis, quæ excernuntur immodice, doloris gravitate, morbi magnitudine, fame, abscessus eruptione, & maxime in parte principe, aut quæ arteriis plena est: neruo aut nervosa parte, affectis longo labore, ore ventriculi insigniter affecto. Iam etiam virium lapsus, qui ad solidorum corporum digestam substantiam succedit causam habere potest longissimos præcedentes morbos, extenuato ægro ex atrophia, id est, nutrimenti defectu: præterea ex febribus acutis, quæ corpus liquant, excitari contingit. Sic Galenus magnum caussarum chaos ponit *1. ad Glauc.* & ita fieri quotidiana experientia monstrat. Nam ad immodicas omnes excretiones succedit (vt a caussis manifestis ordiamur) seu sanguis euacuetur, seu quivis alius humor; tametsi aliquando noxia materia sit, vt de his quibus aqua extrahitur per paracētesin. Sic nos aliquando vidim⁹ in iuvene quodam Delfensi, cui Ioānes Bokelli nomen erat, qui cum ex nimio vomitu sanguinis, incidisset in syncopen, per nos tñ recreatus, post aliquot menses, idem in hydropem ascitem incidit: de cuius curatione cum desperarem, multis deinde aliis adhibitis medicis & empiricis, semper peius habuit, ita vt habita consultatio fuerit, nunquid paracentesis fieri posset: quam minime admittere volebam, ob certas rationes, cū eo debilitatis deuenisset, vt illam ferre non posset. altero vero medico tum chirurgo eam suadentibus, a curatione excludor, ob veritatem quam prætulim. Post duos itaq; menses facta paracentesi, & aqua copiose effluxa, mox syncope æger hic magno cum prædictorū ignominia exstinctus est año 1579. Ian. mense. qui præmacie niger erat, plane exsanguis, & viribus deiectis, antequam in hydropem incidisset: quam curationē homo extreme debilis & macilentus, spiritibus iam dissipatis, ferre non potuit. Ita quoq; contingere potest in iis, qui vtūtur in empyemate, *6. aphor. 27.* etsi abscessus rumpatur: vt Bellarmato, & vxori Boethi accidit. Qui autem in syncopen inciderunt ex dolore, eorum exempla posuimus *obs. 1. & 3. & 4. lib. 7.* & qui ob calorem febrilem animo defecerunt, *obs. 7.* & qui ex fluxu, vomitu enormi syncopen incurrere, *obs. 8. & 9.* ex sudore nimio in febricitante, & *obs. 10.* ex sanguinis detract. & *13.* de muliere, quæ in syncopen incidit ob exsiccationem in febre hectica; *lib. 7.* iam citato. quibus exemplis euacuationum facile causæ syncopis & deliquii animi innotescunt, ac eorundem curationes. Sic etiam ab hæmorrhoidibus, tum mensibus nimium fluentibus contingunt syncopes & animi deliquia; cui⁹ nunc vnum exemplum proferemus. Sic mulier quædam Alcmariana, cui nomen Cornelia Cannia erat, anno 1547. mense Octobri, cum filia eiusdem in carcerem detrusa esset, & ibidem detineretur; hoc per nuntium ad eam delato, statim passa est abortum, cum grauida foret; & subsequutum profluvium adeo immoderatum, vt in syncopen grauissimam lapsa fuerit, cum loquelæ ablatione & sudore fri-

gido, astantes eam pro mortua habentes, vltima inunctione tanquam hinc statim emigraturam munierunt. Interea & ego ad illam accitus sum: & factis frictionibus in partibus superioribus, nempe brachiis, & vinculis iniectis ad diuersionem, ad se rediit, ab orco quasi in lucem reuocata: & cum iam loqui cœpisset, submisit tamen, vt vix intelligi posset, confectiōē manus Christi sum sit, & ex hac mixtura sequenti, ad fluxus inhibitionem & virium restorationem: ℞. *conser. rosa. veteris ℥ j. manus Christi perlat. ℥ iij. fragmentorum ℥ ss. pulu. sem. myrtill. ros. rub. an. ℥ ij. conser. bugloss. ℥ ij. cū syr. cotoneorū fiat mixtura. superbibebat ℥ iij. vel v. vini Gallici rubri & styptici.* & linimento subsequenti ventrem & lumbos inungebat: ℞. *olei myrini, ros. mastichini, cotoneorum an. ℥ ss. misce.* quibus præstidiis virtute roborata fluxus cessare cœpit, simul & hoc electuario solido vtens. ℞. *sem. plantag. exsic. sem. sanguinaria, trochis. de carabe an. ℥ ss. pul. frag. lapid. pretios. gr. x. species. diarod. abb. trionf. an. ℥ j. dissol. in aqua plantag. adiecto saccharo albiss. q. s. vt artis est, fiat confectio in tabul. dos. ℥ iij. superbibendo cochlear unum vini rub. styptici a syncope liberata, & fluxu plane constricto, perfecte curata est, vt eandem amplius non inuiserem.*

S C H O L I A.

Sicuti quosdam ex insperata lætitia scimus mortuos, vt etiam apud Valerium legitur, sanguine & spiritu subito ad exteriora retractis: sic etiam ex tristitia, sanguine & spiritu cor opprimente, syncope fieri potest, vt ex omnibus animi vehementib. affectibus. Et sicuti fit ab euacuatione nimia, vt nūc diximus, ita fieri potest a multitudine ventrem grauantē, seu sola multitudo sit, vel etiā materiei prauitas: vt in eo qui bilē æruginosam euomit; & omnino ex prauæ substantiæ cibis, vt fun-
 5 *Ex gaudio quidam mortui.*
 6 *Causa vna.*

gis, fiunt, vt aliquando contigisse nobis relatum fuit nobili cuidā, & ex venenis sumtis fere omnibus. Fiunt quoq; vt iam diximus atq; exemplis ostendimus in lib. 7. obs. nostrarum, ex doloribus vehementibus, non in intestinis solum, & ileo, sed & circa alias partes valde sensitivas, vt in vulneribus quoq; circa capita musculorum. Præcedunt & comitiales morbos, & apoplexias: vteri quoq; strangulatus comitantur. Accidunt & in paroxysmorum initiis, vt etiam exemplis ostendimus in lib. nostris, de febribus: & in statu quibusdam, etiam inclināte febre, & in febrib⁹ acutis malignis, citra manifestam causam: vt quibusdam adhuc sanis statim irruunt, & prægnatibus, vt sæpe conspeximus. Comitantur quoq; crises laboriosas, præcipue prauas, quæ ad necem finiuntur, vel periculum inducunt. Accidit & ventris inflammationibus, ileo affectis, vt *obs. 3. & 4. lib. 7.* retulimus, & validis intemperaturis stomachi, cordis etiam; & post longas palpitaciones, vt iuueni nobili Mansardo contingit, & fratri meo Nañio, consiliario, a me curato; de quibus & antea dictum est. Ex immodico æstu vel frigore, etiam eueniunt iter agētibus, ex vigiliis, inedia, exercitiis fortibus: vt qui fugati sunt in bello, cum currebant, quod his nostris temporib. (proh dolor) nunc per viginti annos

7 annos bello grassante sæpe visum est. Eadem porro genere causæ faciunt, si leues sint, leues affectus; si vero graues, grauiore, ut modo liporhythmiam, modo syncopen facere dicantur. Omnes autem hæ causæ non primo agunt, sed necesse est (ut Iacchinus supra Rhafen dicebat) aliquo vno genere vel pluribus comprehendî, quibus primo cõuenit id efficere: eruntq; ille primæ & summæ causæ, quas quærere opus est. Videntur igitur vires concidere, vel quia grauantur nimium, & opprimitur vel suffocatur calor innatus, vel quia eius vehiculum, spiritus scilicet, absumuntur & pereunt: vel quia inepti fiunt ad actiones propter alterationem; quæ alteratio, aut est in qualitate euident, quia calfacti nimium sunt, vel si cæci, vel refrigerati, aut in occulta, quoniam venenosa qualitate inficiuntur: vel aliter vitiosus est sanguis, e quo generari debent: ut si ex prauis succis cibis sit genitus, vel in corpore corruptus, quod contingit in humorum corruptela. Igitur ad præfocationem pertinet, quæ in principio peroxysmorum euenit, ob id, quod calor omnis & sanguis in viscera confluit: quod si crudus sint & frigidi, ut non cito, sed sero incalescant, præfocatio talis fieri potest, ut prorsus opprimat, si leuior, syncopê faciet. De hoc vide Gal. 3. de crisib. Similiter accidit hoc, ubi magna phlegmone interna fuerit, ut in lipyris dictis, ut dicit Galen. de influm. iocinoris vel stomachi. r. ad Gluc. Ad hoc etiam genus pertinent, quæ per principum partium obstructions fiunt: nam calor innatus, ubi ventilatio prohibita sit, suffocatur & perit. Sic apoplexiam comitatur, & comitalem prauum, id est, qui ad apoplexiam tendit, & illi est proximus: opprimitur enim copia obstruente calor innatus. Huius generis est, qui ex humoribus frigidis os ventris grauâtibus euenit: infrigidatum enim & molestatum ab his, molestiam quoq; communicat. Omnis autem molestia communicata cordi, potest syncopen facere, ipsum debilitando. Venter autem communicat adeo (dixit Auicenna) ob vicinitatem, etiam ob sensus acritudinem, unde valde molestias sentit. Alia causæ est, spiritus resolutio; de qua obseruat. præcedente ex parte egimus: resoluitur enim nimium tenuitate cum raritate corporis. Et hinc fit syncope, in quibusdam febribus, digesto a calore febrili spiritu; præsertim si sit æstas, & æstuosus ut quibusdam exemplis in libris nostris, de febribus ostendimus. Resoluitur & nimio motu, primum corporis, ut in exercitiis, etiam in Venere nimia, ut in syncopen quosdam compertum est hac ratione incidisse; præsertim quibus molle corpus est & rarum. Vnde delirantes sæpe incidunt in id malum. Resoluitur & ex animi affectibus, qui motus quidam sunt, sed ex ira non proueniunt, nisi præfocatio accadat ex conferto motu, vel ex bile mota os ventris mordeatur. Resoluitur, ubi paucus est spiritus in lætitia expansus: in consternatione vero metus intro latus, & frigidus factus opprimitur; ideo ad primum genus pertinet. Non mouetur igitur ad externa, sed intro cogitur, & suffocatur, vel ab affectionibus animi vehementio-

ribus, ut ingenti tristitia, anxietate, mœrore, dolore, cura, & similibus, unde sæpe syncope & interitus, ut Galenus docet de symptomatum causis. Vel fit a corpore, ut respiratione prohibita, multitudine & crassitie crudorum humorum exiguos meatus obstruentium; unde syncope: aut si non obstruant neque onerent, λεπτοφυχία oritur, ut Galen. docet 12. method. Huc referri possunt tumor aliquis præter naturam in corde vel pericardio, ut in dissecto, cuius ex Galeno meminit Philotheus, tunica inclusa in ventriculo cordis, plena humore putri male olente; tum alia, quæ aliquando obstruunt. Resoluitur quoq; ex doloribus, dum natura multo motu mouetur, ut opem ferat, vndiq; sanguinem & spiritum perpetuo mouens impetu: sic ex morsu ventris. Resoluitur quoque in vacuationibus (ut iam diximus) immoderatis omnibus, quia vna vtile quoq; excernitur, siue sit vacuatio per naturam, seu per artem. Quod si sit per naturam, ut in crisi, si laboriosa sit multum, resoluit commotione multa, & agitatione spiritus. Sic in sudoribus, alui profluuiis, sanguinis fluoribus, etiam in partu, euenit. Sic & motu e corde affatim & repente aliquando foras dissipatur spiritus, & euanescit, eodem modo, quo intro cogitur; vel ab affectu animi vehementiore, ut in gaudio, voluptate, ira, vigiliis, risu: vel causâ in corpore contenta (ut iam diximus) nempe insigni euacuatione, purgatione per medicamenta, quod sæpe vidimus a Paracelsicis fieri, qui antimonio, turbitu minerali, tum ex iis alii colocynthide, ventri inaniunt, non purgant, syncopen sæpe & mortem inducentes, vel concurrentium ad aliquam partem dolore affectam vehementi, aut erosam, ut os ventriculi valde sensile, supuratione, aut ruptione apostematis vel tuberculi, siue intro sum facta, ut in ventriculum, siue extrosum, ut in aqua in hydropicis educenda, ut paulo ante diximus: simul enim exhauritur spiritus, & vna cum ruptione euanescit, ut aph. 27. lib. 6. & 8. lib. 7. in partibus quoq; exsolutionem fieri, ut vacuatione sanguinis, ita & puris, 2. Epid. Sic & Hollerius testatur se vidisse syncope mortuos in huiusmodi ruptione e liene. Dissipatur etiam spiritus (ut modo diximus) pluribus motibus, tenuitate, raritate corporum ipsos continetium, tenui humore & calido, sudore nimio. Alia vero & tertia causæ erat, spiritus alteratio: unde vel ineptus fit ad opera naturæ, vel etiam inimicus; ut qui venenosam qualitatem acquisiuit, ex ebibito veneno, vel ex mala aeris infectione. Ad hoc genus pertinet euaporatio facta ex odoribus malis, ut cadauerum & aliarum putredinum, ut eorum, qui in fœuicis tritici præfocantur: sic & euaporatio a matrice sublata: praua enim putredo in ea gignitur, & per multitudinem arteriarum multum cordi communicat. Ita & alterantur spiritus, tum ex vitiosis abundantibus succis, tum ex ambientis malitia, qui alias alia de causâ in hunc est mutatus, utpote ex metallis, caminis, aut barathris, aut ex leguminibus & eorundem putredine, olerum vel animalium, aut si halitum ex stagnis, vel pa-

ludibus, vel fluminibus recipiat, & ex venenatis facultatibus, aut animalium, quæ virus reieciunt, venenis. Cum itaque vires sint in spiritu calori natio iuncto, & temperamento solidarum partium calore insito & humore primogenio siue radicali constante; ergo in tam præcipiti virium lapsu, vel spiritus vitalis, vel temperamentum, vel vtrumque collabitur. Spiritus autem vitalis cum sit in corde, duplicemque motum habeat, vel intro, foras: vel foris intro (vt iam ostendimus,) deficit, vel non generatur, vel corrumpitur a proprio receptaculo, propter intemperiem fortem cordis, vt scribit *Gal. 1. lib. 5. de locis affectis*: vel defectu alimenti, vel alteratur, vel non mouetur, vel dissipatur, vt iam ostendimus. Cunctæ igitur causæ, aut cordis spiritus vel solidum eius corpus offendunt: quæcunque enim causæ syncopen excitat, aut prædictorum corporum solidorum, aut spirituum essentiam corrumpit, vel saltem eorum temperiem mutat, quemadmodum apud *Gal. legitur 12. meth. med.* namque in his duabus substantiis virium essentia consistit: quæ insuper sic custodiendæ sunt, vt tum qualitate, tum quantitate (quoad fieri licet) naturaliter se habeant. Iam vero quomodo alterentur spiritus, ex vitiosis succis, vel ambientis vitio vel veneno; & quomodo corrumpantur, iam etiam diximus, ex ingenti dolore, crebris motibus, vigiliis, & defectu alimenti. At quibus causis digeratur solidorum corporum substantia, id quoque ex parte dictum est, ob longissimos præcedentes morbos & agro extenuato, ob atrophiam & defectum nutrimenti, ex feb. acutis corpus colliquantibus, cuius exempla etiam posuimus *in lib. de febrib.* Alterantur autem intemperie mutata, immodica vètris inanitione: de quibus omnibus vide *Gal. de causis syncop. lib. 1. ad Glauc.* & Martinum Acakiam, qui in eundem librum commentaria egregia scripsit. Morbi enim tam diuturni quam acuti temperamentum partium solidarum destruunt. Et hæc plusquam satis dicta sint de causis syncopis.

OBSERVATIO IX.

*De syncope ex nimio sanguinis fluxu e naribus:
& de alia post medicamentum purgans oborta.*

Pvella cum vehementer sanguinem funderet e naribus, nec villo modo restringi posset, ad eam cum intrassem & syncope corriperetur; crura, iuxta doctrinam Galeni 1. ad Glauconem, pluribus & valentibus ligaturis stringere iussi; iecori, cum e nare dextra cruor emanaret, ventosam magnam affixi; quibus præsidia a syncope liberata, etiam sanguis, qui affatim profluebat, restrictus est. At iuueni valetudinario, cui medicamentum vehementissimum ab empirico propinatum erat, ex nimio alui profluio & fluxu concitatiores syncopen patienti, supra lectum posito, faciem aqua irrorabam, vel potius conspergebam, vt ita excitaretur. Brachia tum crura vinciebam, manibus etiam pluribus & vehementibus vinculis iniectis: talia enim ad se humores reuocant. Interea & frictionibus partium supernarum utebar, & exiguum

theriacæ recentis propinaui: hæc enim (vt Rondelétius vir doctissimus asserit) valde confert syncopi obortæ post medicamentum nimis purgans: quod si non adsit recens, antiqua exhibet, addendo opii gr. ij. cum vino: sed cum recentem haberemus, annum vix excedentem, dedimus ʒij. cum vino. Interim oleo quoque sequenti ventriculum tum ventrem inunximus. *℞. olei cotoneor. myrtil. an. ʒj. olei absinthij ʒij. aceti parum.* Alteri dedi ʒj. terra sigillata vera, & micam panis vino intinctam, cum viderem ex nimia purgatione signa animi deliqui futura, ex faciei pallore, ac pulsus varietate & deficientia: nam signis præsagentibus syncopen, vel eam præcedentibus (de quibus latius scholio sequenti,) apparentibus, statim animum intendere oportet ad remotionem causæ syncopis futuræ, ne ea ipsa confirmetur.

S C H O L I A.

Inter signa vero (de quibus nunc agendum, cum omnes causas enucleauerimus) syncopen præsagentia, non erunt omittenda ea, quæ deliquium præcedunt; nam hæc ad præcautionem valde utilia censentur, priusquam quis graui syncopeprehendatur. Hæc quidem cognoscuntur ab excessu temperamenti ipsius cordis, & a strictura viarum ipsius cordis & pectoris, & raritate totius corpora etenim calida, rara, facillime resolvuntur, & sicca, & qui subtiles humores habent, latosque poros, & acuti sunt sensus; tales enim facile syncopem incurrunt: macilenta quoque corpora & extenuata, & sudoribus, & euacuationibus resoluta, & ex infantibus & senibus, qui difficulter famem ferunt, tam ægri quam sani, & maxime in ætate, potissimum macilenti, extenuati, aut longo morbo consumti, cum id malum peculiare existat pueris senibusque; micropsychis; omnibus, & conualescentibus, & fame laborantibus, & firmioribus quoque, nimio sudore profusis. Deliquium quoda repentina causa non oritur, languidos prius arteriarum pulsus reddit, facies pallescere videtur, palpebræ resolvuntur, extrema frigescent, frigido sudore rorescit cutis, tremulum redditur cor, ac languet cervix, oculorum debilis adest motus, & liuor, imaginationesque non consuetæ, visui obiciuntur, ex motu spirituum inordinatorum ex vaporibus ad ipsos eleuatis, impotentia loquendi accidit. Signa ipsius syncopis præsentis, ex se nota sunt, tum ex illis, quæ diximus, ex facie homini mortuo simili, pallida, cineritia, cum sanguis intro ruat, frigent extrema & sudor frigidus erumpit, anxietas suboritur & animi perturbatio, & tandem animus deficit, ita vt corpus resolutum sentiendi mouendi; vi destituatur, in tantum, vt stans cadat: pedes, nec non manus, plicabiles manent. Hoc etiam mihi semel in lecto contigit, cum nocte lotium in lecto existens reddere, & genibus incumberem, subito lapsus in syncopen, matula manibus cadente, lotio profuso & corpus vxoris meæ attingente, atque ita ipsa experrecta, me syncope affectum sine loquela arripit, vnde excitatus reuiuiscere cœpi. Bene dixit omnium nostrorum parens omnipotens, hominem solum existere non

3
Signa præsagentia syncopen.

4
Deliquium præcedens.

5
Signa præsentis syncopis.

5 non esse bonum: si enim Eua mea & nomine & re
 ipla, mihi non adfuisse, syncope ita extinctus
 fuisset. Spectra quoque noua, malo inuadente,
 visui offeruntur; impotentia sequitur ad loquen-
 dum, & pene respirandi facultas intercipitur,
 palpebrae concidunt, pulsus fit rarus, obscurus
 & quasi abolitus, nec non formicans. Signa vero
 caussarum, & quae causa syncopen inferat, & quo
 modo affligat, saepius in promptu cuique sunt. Nam
 si causae vacuantes praecesserint, scimus ad inani-
 tionis genus pertinere, seu profluvia, seu dolores,
 vel animi affectus, vel laetitia, vel metus, vel inedia,
 vel vigilae, vel ambientis aestus. Si immanif. stae
 sint & non praegrassae, statim suspicio incidit, esse
 succorum tenuitatem, & corporis raritatem: ideo
 naturam corporis contemplaberis: hoc enim tibi
 statim aperiet; ut si gracilis sit, calida & sicca praeter
 modum temperies: quamquam nec sic syncopen
 faceret, nisi aliqua dissolvens causa iungeretur,
 ut febris, vel ambientis aestus nimius. Sed e-
 runt haec tales, quae in alio corpore id non facerent;
 ideo in eas occasiones referuntur, ex habitu scili-
 cet corporis. At si quis adeo praetenuis succos &
 spiritus habeat, utocyssime exhalent, adeoque
 imbecillum habeat per vniuersam corporis mo-
 lem retentricem facultatem, expultricem autem
 immoderatus concitatum, ut propterea in syn-
 copen incidat in eiusmodi affectibus; mortifera
 illa species in facie celeriter apparet, nasus videli-
 cet acutus, oculi caui, astricta tempora, & reliqua
 quae deinceps ab Hippoc. 1. prognost. sunt conscrip-
 ta: quamuis alius non multum excreuerit, neque
 vigilauerint, aut tristes faciant, aut fame affecti
 aegri ipsi: ex his namque minus malum est, quam-
 uis absque his emaciati fuerint, eodem Hipp. au-
 ctore, & Galeno cum 1. prognost. tum 12. meth.
 medend. quem sectati sunt Aetius cap. 98. lib. 5. &
 Paul. cap. 37. lib. 2. Si vero ex grauatione, pulsus
 monstrant: habent enim proprias inaequalitates:
 sed si iam premitur multum aeger, & pulsus, affe-
 ctus ratione, fiunt inaequales, coniciebat copiam,
 & copiae qualitatem, scilicet cruditatem & frigi-
 ditatem humorum: praeterea & multa stomachi
 nausea praecessit, & cibi fastidium; & color cor-
 poris, ut ait Galenus, id monstrat. Si itaque ex ma-
 gna humorum crudorum copia ex cruditatibus
 vel alia quapiam occasione congesta syncope ex-
 citetur, una cum oris ventris (quod stomachum
 vocant) offensione, his namque & praecordia in-
 flata, & totum corpus ampliori mole, quam pro
 naturae modo cernitur: tum color alius ad albidu-
 us, quam pro naturali habitu, & aqua intercute
 laborantium magis simile, est mutatus; nonnul-
 lis etiam ad nigrius, aut luidius, quos medici
 plumbei coloris appellant. Omnes vero pulsus
 minores sunt, quam pro caloris ratione, si febrici-
 tauerint: praeterea obscuri, omninoque inaequales
 saepe ea inaequalitate, quam systematicen Graeci
 vocant; semper vero ea, quae in vno est ictu, ut le-
 gitur apud Galen. 12. method. medend. & Aetium
 cap. 96. lib. 3. ac Paulum cap. 36. lib. 2. Eos vero,
 quibus ex flaua bile, quae os ventriculi infestet,

syncope incidit, cum ex reliquis, tum etiam ex: f-
 lidua oris ventriculi mordicatione, anxietate vel-
 ligatione ac dolore cognoscet. Si itaque ex vitio
 stomachi, nauseae antecedunt, ac varii oculos co-
 lores subeunt: ex cerebro, vulua & iecore vitia aut
 offensiones antecedunt; & aderunt horum pro-
 pria signa: ita ex tinea seu vermibus eadem ade-
 runt, quae de vermibus dicuntur: praeter dolores
 & crebras punctiones, etiam dentibus strident,
 importuneque clamant, & ii per superna vel infer-
 na quandoque emittuntur. Quod si ab apostoma-
 te, signa eius quoque aderunt: si ex obstructione
 principum partium, hi vero subito concidunt, ut
 ait Hippocrates, & in accessione signa habere non
 potes: sed si releuantur, ex pulsibus hoc digno-
 sces, ut Galenus in medico illo sensit. Si ex alte-
 ratione spirituum, si ab externa causa, ex come-
 sta nota erit: si ex euidenti aeris qualitate, simili-
 ter: sed si ab occulta, si ab aere, communis erit
 multis Prognostica autem haec sunt, inquit Pau-
 lus, ut etiam Iacchinus annotauit: Si affectus ve-
 hemens, si magna syncope, omnino peribit, nec
 est remedio locus: neque decipiaris, quia aliquan-
 do ex conatu naturae rursus reuerti videntur; sta-
 tim enim leui motu facto concidunt. Significabit
 prauitatem, quod licet leuati sint, pulsu carent,
 vel exiguum & obscurum habent; praeterea neque
 color viuendus reddit, neque sani facies: frigent quo-
 que vehementer. Quae vero significant prope ad-
 uentare (praeter illa signa, quae superius diximus)
 pulsus sunt, ut Galen. docet in lib. de venae sect. ad
 ad obscuritatem & inaequalitatem tendit. Praeter-
 ea antecedunt crebra animi deliquia vehementes
 illas syncopas, dum e lecto assurgunt, dum caput
 attollunt; sensus quoque hebetantur. Mortis et-
 iam signum est, si calor non reuocatur. Ex specie-
 bus vero, quae per consensum salubriores esse vi-
 dentur, ut omnis per consensum affectus genera-
 tim. Verum si syncope valida, medicinae locus
 non est, ut idem inquit Paulus cap. 34. lib. 3. ut etiam
 Altimarus annotauit. At si vires adhuc tantillum
 constant, aliquando ad sanitatem recursus est, ut
 ipse refert: Ceterum ubi cor proprio affectu la-
 borauerit in syncope, valido existente animae ro-
 bore, ex quibusvis animi affectibus, ipsa excite-
 tur, numquam aeger succumbet, Galeno teste 5.
 de loc. affectis. Si vero propter eius intemperiem
 syncope eueniat, perniciosior erit, quam ex cere-
 bri intemperie; quemadmodum haec periculosi-
 or est, quam si iecur primum affectum fuerit, ut
 testatur Paulus cap. 38. lib. 2. & Aetius, cap. 94.
 lib. 5. quamuis non ita subito syncopes necare pos-
 sint, quae ex cordis intemperie oriuntur, quam il-
 lae, quae instrumentales eius morbos sectantur, ut
 patet eodem lib. 5. de loc. affect. Pestifera autem est
 syncope illa, quae extenuato spiritu ac sanguine o-
 riginem trahit; potissimum ubi imbecillitas adsit
 retentricis facultatis totius corporis, ac expultrix
 immoderatus concitata fuerit. Prorsus autem
 exitiosa syncope erit, si corpore succis crudis re-
 ferro generetur; aut ex redundante flaua bile os
 ventriculi infestante: siue ex extenuatis succis, ubi

Si vitio sto-
machi & a-
liarum par-
tium.

A vermibus

9

Ab aposte-
mate.Ab obstru-
ctione.Ab altera-
tione spiri-
tuum signa.Signa pro-
gnostica.

10

11

iecur vel ventriculū phlegmone obfederit, quem admodum scriptum reliquit Gal eodem 12. *meth. med.* Verum si citra phlegmonē stomachicæ syncopes fiant, ventriculi ore affecto primo ac consentiente corde, curationem magna ex parte admittunt: nam minus periculosa sunt; quam si exsiccata fuerint ex aliquo trium principiorū; quē admodum colligi potest ex Gale. *verbis præcatis, lib. 2. meth. med.* Arabes vero confirmatam syncopen ex causa confirmata incurabilē constituunt, quæ ad ultimam malitiam (vt illi referunt) deuenit, in qua facies viridis apparet, calore inflato extincto, vna cum colli connexionē, virtute motiua iam debilitata, vt caput eleuare non possint ad inspirandum aerem, ita vt constricto pectore mors subsequatur. Sed ab utero licet frequēs sit, vt plurimum salua; & ab aliis membris, modo causa ad extremum fixa non adsit. Omnis vero, quæ frequens est, & vehemens, damnatur, quoniam ocyfime interimit. Longo quoque morbo consumptis frequenter animus deficit, ac lethalis est is morbus, & apoplexiam quandoq; denuntiat. Ex febribus, (vt etiam in libris de febribus egimus) maxime acutis, periculosa animi defectio, sicut ex carbunculis vel phlegmonibus pestiferis, sub principib. membris, vt in peste Delica sepe obseruauimus, de qua egimus *lib. 6.* nostrarum observationum. Pueri quoq; & imbecilles, præparci animi, ex animi mœrore vel leui deficiunt: & iis euenit, qui in maioribus musculis, vel genu præcipue, vulnerati sunt, & qui ex causa tacita interna oritur, hominē frequenter rapit, magisque si certo ordine ac sæpius redit. Cor præterea, quo magis angustum est, eo magis ab ea peste tutum est. Animæ quoque defectiois conclamata indicium faciunt, vana stertentoria naribus indita; pulsus formicans, exigua præfagit spem. Quibusdam tamē senibus pulsus penitus conciderat, quo exinde reuocato, diu postea vixere. In vndis submersi post octo & quadraginta horas recreati reuixere. Fœminæ aliquando in vuluæ cruciatu elata in sepulcris ad vitam redire: quo pro alterius mortui sepultura detecte locum mutauere, atq; ita miserrime mortuæ inuentæ sunt. Septuaginta propterea & duas horas antequam humentur decreuere: paria quoq; intervalla debent iis, qui animo deliquere sine manifesta causa.

OBSERVATIO X.

De syncope ex nimio sudore.

Quidam cum cursitando valde laborasset, sudore largiter e corpore emanante, animo delinquebat: cui neque frictiones adhibui, nec vinum propinaui, cum talia magis sudores moueant, cum potius sint meatus cutis obstruendi, vt sudor sistatur. Faciem irrorari iussi aqua rosarum etiam frigida, & apertis fenestris, vt aer intraret. Sicuti olim valde febricitans ex nimio sudore nobilis quidam syncopen incurrebat. Imperaui, vt leuiter operiretur & euentaretur, atque vt per cubiculum herbæ frigida spargerentur, vt folia salicis & vitis: quibus præsidis & hic quoque ad se rediit, aqua quoque frigida in faciem consper-

sa. Huius & aliud videas exemplum a nobis positum *lib. 7. obs. 9.*

SCHOLIA.

CVM causa sint diuersæ, propterea non vnus modus curationis cuiusuis syncopis est, sed singulæ earū propriā curam desiderant, vt ad longum docuit Galen. 1. ad Glauc. pro diuersitate causarum, ex quibus excitantur. In vno tamen omnes communicant: quod si deprehensus syncope cubans est, omnis sollicitudo medentis ad symptoma vertitur: si necdum premitur, vtriusq; curam habebit, vt & symptoma non incidat, & vt morbus paulatim discutatur secundum Galen. *lib. 12. meth. med.* Nec minus & in alio quoq; conueniunt, quod siue per essentiam fuerit orta syncope, siue per consensum affecto corde, semper ipsi prospiciendum erit, cum & principalissimum viscus sit, saltem quo ad vitam: & propterea robur eius perpetuo seruandum erit; nec syncope aliqua gigni potest (vt prius diximus) nisi & ipsa cor afficiatur. Hanc etiam ob causam alii curationem in tria capita distinguunt: velenim imminet accessio syncopis, vel actu incidit, vel releuatus est ab accessione, sed non perfecte, vt facile relabatur: & in his omnibus quoque diuersam curam exigit. Nam si imminet, solum affectum summo-uebimus, a quo incipit: & ita hic incipiendo de resolutione, si sit ex euacuatione nimia, sistemus, cum primum aduentare ex signis iam superius dictis sentiamus. Si ex calore, educemus ægrum; hoc sæpe fit in febricitantibus, cubiculi ratione nimis calidi, cuius exemplum posuimus *lib. 2. obseru. 30.* de domino de Lockhoul: ita vbi ex distemperantia calida contigerit membrorum principalium, contrariis occurrimus remediis. Si ex odore malo, hunc tollemus bonis, & in vniuersum aerem alterabimus. Si corpus quia rarum est, & tenuibus succis resoluitur, non sinemus, quin ante accessionem cibemus, vt possit sufficere, idq; cibus, qui non facile dissoluantur; qui enim ob prætenues succos syncope opprimuntur, accedente quoque corporis raritudine, diuersa ratione curantur, quā illi, qui ob crudorum humorum copiam laborant. Huius curationē quoq; explicauimus *lib. 2. obs. 41.* de febre syncopali continua a bilioso humore, & *lib. 2. obseruat. 19.* de febre syncopali intermittente, a bilioso humore orta. & *obs. 5. lib. 7.* de febre continua cum syncope ex acri & tenui humore, ventriculum vellicante, vbi & in scholio huius curationem, tum ex Galeno & Aetio exposuimus. His frigidus aer astringensq; conuenit ex rosas, aut myrti foliis seu vitium pampinis, in domo substratis, corpusque rarefactum densandum. Vngendi quoq; si opus est, vnguentis astringentibus, rosaceo, omphacino; & refrigerantia, præcordiis & stomacho apponenda, cataplasmata ex ros. palmulis, hypocistide: & cibi dandi, qui non admodum promte effluant, vt est sorbitio ex allica, fructus austeri, vt cydonia pyra, mala punica (de his vide Galenum, Paulum & Aetium) & vitellum ouorum 12. *method.* & testes gallinaceorum, qui lacte sunt aliti. Et si syncope sit ex flaua

2

In quibus
communicat
omnes synco-
pes pro earū
curatione.

3

4

Qui non sta-
rim sepeli-
di.

flaua bile, quæ os ventriculi infestet, contrario modo curanda, quam illa, quæ ex crudorum copia fiat. Aer frigidus adhibendus, vt in obseru. citatis ostendimus; somno liberaliori indulgendū; cibis frigidis & potu frigido vtendum, pituitæ cremore, pane nō multo sed modico, ex vino aquoso frigida dilato: bilisq; quæ ventriculum lancinat, calida aqua vel exiguo aceto adiecto, aut syr. acetoso simplici, vomitu leuiter expurganda, vel alius cienda thamarindis, vel manna, aut rhab. cum cautione, si opus est, cum exquisitas euacuationes nō ferant, vt in obser. citatis latius docuimus. Ventriculum roborabimus syr. grana. acidorum, ex acetos. citri, oxyzacchar. quidam hic post purgationem exhibent decoctum absinthii. Sed videndū, si vna febris adest, ne nimium calefaciat. Si ex animi affectibus, hos & contrariis mitigabimus, nimium latos tristi nuntio, dolore animi afflictos, consolatoriis, & amicorum præsentia. Timor, qui syncopen facit, quod insperato eueniat & casu, præuersionem habere non potest, vt forte nec animi affectus. In summa, quibus ex resolutione syncope imminet, scopi sunt causas tollere, & dissolutionem, quæ facta est, resarcire cibis: quod facile fieri adhuc poterit, quia vires infirmæ hætenus non adeo sunt. Si ex ingenti dolore, curanda causa doloris erit. Huius syncopis posuimus exemplum libro 7. obseruatione 4. de muliere ex ilei dolore syncopen grauissimam incurrente: ideo si ex dolore affectus, summouendus, si id facile possit, si periculum instet syncopes, etiam neglecta tantisper causa, Symptoma respicientes, solum stupefacientibus utemur; cum cautione tamen: hoc enim est proprie aduersus symptoma pugnare, non aduersus causam symptomatis. Hæc lib. 12. method. Fugimus hic præsens periculum resolutionis, quam per se facit dolor ob commotionem in spiritu, per accidens vero vigilia, quam inducit; quæ & ipsa motus quidam est. His omnibus obuiam hæc eunt: nam & dolore leuant, & somnum conciliant. Quod si dolor a causa calida sit, vt bile mordente, nihil oberit etiam affectui, vt eodem lib. Galen. testatur: nam temperat sua frigiditate bilis acrimoniam. Sed cum dolores diuersi sint, & diuersam causam habeant, ea semper erit tollenda quoque, vt latius docuimus scholio obser. 4. lib. 7. Si sit ex fame, sæpe paulatim nutriemus, & leuibus cibis: contingit hoc in obsidionibus aliquādo, quod nostro tempore in his bellis (quibus pro dolor) affligimur, contigit in obsidione Harlemensi & Leydana. Restituimus vero, quod antea resolutum est, tum alimento, tum aeris temperie, tum alterando hunc prout oportet, tum etiam gratos odores adhibendo. Nam & aere spiritus alitur. Hanc enim prouidentiam exigunt (vt etiam Iacchinus docte expressit) qui mox a syncope releuati, in periculo tamen sunt, ne leui momento recidant. Nam & in his causas summouere oportet, dissoluentes, & resarcire quod est amissum, tum cibo, tum aere, qui inspiratur. Sed maiore negotio instare oportet, quod maior est motus; & exquisitiore diligentia,

quod vires imbecilliores. Primum igitur si ex vacuatione resolutæ sunt vires, cum primum releuatur: si cessauit (quod in multis euenit) vt sanguinis fluore & ventris, tunc nihil circa hoc erit negotii: sin persistent, tentandum est propriis ingeniis succurrere; primum auersionibus, non per vacuationes, quia non ferunt; sed frictionibus (vt paulo ante docuimus) contrariarum partium, & vinculis. Iuuat & ad auertendum, cucurbitulas affigere contrariis, quæ recta respondeant, vt in sanguine e naribus, hypochondriis eas applicare; in eo, qui per vterū fertur, mammillis; si ex hæmorrhoidibus, non dicunt, credo, ratione bona, quod hypochondriis: nam ad superna traducere oportet, & in principia, vnde est fluxionis origo. Sed quomodo sistere oporteat, priuatim diximus, & aliis quoq; exemplis ostendimus lib. 7. obs. nostrarum de symptomatis febrium. Sed vt subita & prompta remedia habeamus, si sit e naribus, astringentia & frigida fronti & temporibus admoenda, & per nares traicienda; & facies frigida sæpe spargenda: & si adstringens sit, melius erit, vt ex myrti floribus, vel ligustri, vel rosar. etiam syluestrium, quæ sunt canis rubi. Medicamentum quoque Galeni 5. method. optimum est ad sanguinem sistendum, ex aloë, thure, albo oui, & pilis leporis. Ita & in sanguinis missione (huius quoq; exemplum posuimus obseruat. 10. lib. 7. De animi deliquio ex sanguinis missione in febre acuta eueniente) ægros præseruamus a deliquio, si supinis mittitur sanguis, ac naribus odorata subdita fuerint, rosacea, vino & aceto permixtis: vino quoque granato madens panis, si deuoratur, salutaris est. Si sit ventris profluuium, ea quæ capite proprie scribuntur, nempe adstringentia, adhibenda, & fluxus cohibendus: si vero ex sudore & digestionem multa insensili (quæ euenit in febribus, his qui tenuissimum sanguinem habent, & continenter spiritum, & raro admodum habitu sunt) tunc similiter profluuium sistere oportet, idque adstringentibus, & vna frigidis, aerem alterando, tum aqua inspersa, & sæpius aere flabellis innouato, & admisto aceto, & aqua rosacea: etiam proderit stratum sternere germinibus frigidis adstringentibus, vt & cubiculum irrorare iisdem. Similiter & vnguentis eius corporis habitus densandus, quæ astringant. Vomitionibus exhausti, vino aqua frigida permixto recreandi: verum febris & capitis ratio habenda est. Si animæ defectus ex vomica aperta, aut hydrope soluta oriatur, quæ spiritus recreant, prout danda sunt. Tales omnes & sudore resolutos non oportet mouere, sed iacentes in omni quiete retinere. Iuuat vero & his sæpe extremis refrigerantia adhibere, & pectori frigida epithemata, & vnguenta, maxime ad cordis regionem in iis, qui sudore diaphoretico resoluuntur: frigus enim densat & sistit, & crassiora reddit, quæ tenuia sunt. Quomodo vero resarciatur, quod resolutum est, patet, quoniam prima materia spiritus generandi est sanguis bonus; ideo vt hic restitatur procurandum est. Qualis debeat esse cibus, Galenus exponit, id est, qui non promte diffluat,

10

hoc est, a quo sanguis ille adeo tenuis, & diffilabilis non generetur; & dat exemplum de alica, quæ sit ex zea, cibarium ex farre. Et cibi adstringentes, vt fructus & panis. Contra ea, quæ tardas habent excretiones, sero quoque nutriunt. At hic veloci nutritione opus est. Respondetur, Non est hic tanta necessitas, quando releuatus est, sed datur spatium concoquendi interim, vnde hoc est interim mederi affectui, qui est succorum tenuitas: sic enim crassior redditur massa sanguinea, vt optime dixit idem Iacchius. Aliud est, cum syncope accessit. Cum vero iam validior redditur, etiam validioribus vtetur. De vini potu Galenus dicit, his vinum aquosum dari: ipse vero paulo ante eodem libro vniuersim in omni syncope vult dari flauum, & quod celerrime nutriat. At hoc exiguum nutrimentum præbet (*ἡνίκα τρέφει*) & non ita celerrime ducitur, vt tenue flauum. Auicenna his dari vult vinum nigrum, crassum, austerum: ratio esse potest, ob quam Galenus quoque his austera poma dedit, vt languidas partes firmaret, & adstringeret corpora. Paulus in hac cura vinum aquosum accipit. Respondeo, aliud est in accessione, vbi solum contra symptoma pugnamus: aliud extra, vbi etiam causam respicimus. Loquebatur prius Galenus in omni accessione, hic vero extra eam. Quoniam vero communiter in his affectibus celeri nutritione est opus, ideo & aqua carnis vtitur, quam quidem grauissimam conficimus, capos non saginatos capientes, & irrorantes, dum affantur, aqua rosata, & aceto ros. vel succo granatorum: postea exprimimus. Si etiã febris absit, loco aceti vinum flauum admiscemus. Quantitas 3 ij. cum modico vino. Huius generis est vitellus oui. Vino austero crasso vtitur Galen. in fluxu sanguinis e naribus: quoniam tenuior calore & fusione potest affectui nocere: in ceteris calidum & tenue præligit. Hic quoq; extra synopen intelligit: nam in ea est alia ratio. Si enim vinum dandum, tenue & calidum dandum. Sed num actu frigidum? Gal. in hoc respicit consuetudinem & aeris temperiem, & corporis naturam calidam vel frigidam: & sic calidum vel frigidum propinat: vbi nota quod veteribus mos fuit temperare vinum calida: vt Horat. Quis aquam temperet ignibus, &c. Britannicus in calida venenum hausit. Nota etiam ex Galeno condiciones, quæ faciunt abstinere vino, scilicet feb. ardens, cruda, quia concoquendis succis iuuabit, *in meth.* lædet aliter calore, fusione, etsi adsit apostema, quoniam auget illud: sic si delirium instet, vel capitis dolor grauis: Auicenna addit, & si resolutio ex inedia non sit; lædit enim merum iuuenes, ob id, quod nervos lædit, vnde spasmus, vel delirium: eius loco aqua carnis semper & in syncope, & extra vel simul admista. Si ex morsu ventris, vbi affectum curaueris, iisdem vtitur. Debet enim interim causa tolli. Concludendo igitur, in euacuatione nimia reficiendus æger, vino diluto, theriaca recenti, irrogatione aquæ frigida in ipsa accessione, extra & ante, ventriculi linimento, frictione partium superiorum: & excretio, vt in ceteris, retinenda.

Quoniam syncope extraordinarium malum est, ac sæpe præsentissimum, omissa sæpe morbi origine, deficientes excitandi sunt protinus remediis, & spiritus reuocandi ad extrema, modo aqua frigida, modo rosacea, aceto mixta, vel, vt alii volunt, aqua rosacea moscata, si ad manum sit, alioqui sola aqua frigida in faciem sparsa, de qua latius in scholio. Odoratus ad nares, frictionesq; adhibenda, prout ratio dicit, & pro varietate causarum. Sic mulier nobis vicina, ex violento partu, & foetu mortuo dum vi pareret, sanguine etiam per inferiora copiose profuso, in synopen validam incidit, vt omnes illam morti vicinam iudicarent. Ad hanc subito ingressus, cum nihil capere posset, factis frictionibus digitorum, vinum pro odoratu naribus obiciens, & digito instincto in aquam frigidam, cum nihil ad manum esset, & in faciem conspersa ea aqua, & temporibus confrictis cum vino & aqua rosacea, quæ tunc adferebatur, oculos aperuit: mox cum videretur aliquid posse sumere, dedi cum cochleari exiguo parum aquæ cinnamomi, quæ fuit excitata, & ad se præter omnem opinionem rediit, vino atq; odoribus gratis, cum nodulo caryophil. Postea etiam aqua carnis & vino refocillata, optimis aliis præsidiiis adhibitis, non amplius redeunte syncope fuit probe curata. Cuiusdam, qui ex fame in obsidione, spiritibus resolutis, in synopen inciderat, aquam frigidam non inspersi in faciem; sed vino & odoribus bonis naribus ad motis quieti permittebam, panisque frusta, tum cum ad se non nihil rediisset, vino diluto immersa exhibui, quod cum adhuc ex syncope nondum perfecte releuatus, comederet non posset pulchius forbendum exhibui, & aliarum recentium carniarum cum vino. Et hic quoque deinde leuibus cibis, tum vino vtens, diluto etiam cum pane, firmam sanitatem consequutus est. At sororcula apud Clarissimas, quæ adhuc viuit, cum mammillam cancerosam chirurgus funditus excideret, me & Cornelio Heydio collega meo presentibus, tam ex fluxu sanguinis, quam ex ingenti dolore animo defecit: sed odoribus vini, & temporibus ac fronte cum aqua rosac. & aceto dilutis, irrigatis leuiter cum leui frictione, tandem excitata, & emplastro restringente mammillæ appposito, optimis deinde aliis præsidiiis adhibitis, & alimentis bonis ac lenibus refocillata, etiam ad sanitatem peruenit, carcinomate quoque egregie curato, eadem adhuc viuente anno 1591. mense Octobri, dum hæc in ordinem redigeremus.

SCHOLIA.

Ad syncopis accessionis & irruentis curationem deueniendo, statim præsidia optima, quæ ægros reuocent & excitent adferre oportet, ratione id dictante, ne statim succumbant. Hi ergo bifariam se habent: vel enim adeo oppressi sunt, vt nihil possint capere, vel vt possint; qualis erat æger ille iuuenis apud Gal. lib. 10. meth. medendi,

Quomodo
excitandi.

dendi, cuius historiā legere poteritis: primo modo erat Boethi vxor. Hic vero primum generalia quædam proponant medici, & vt Iacchinus doctissimus annotauit in omni scilicet accessione: & sunt excitatio (est enim velut torpor quidam facultatum) prohibitio resolutionis, & quanto citius fieri potest restauratio. Galenus ita eos tractat: primum frigida faciem spargit, & est remedium mulieribus vſitatissimū, quo passim in quaque syncope vtuntur, & illud experientia videmus excitare. Non desunt tamen aliqui, qui volunt, vt in syncope si ex causa frigida aut immodico alui fluore, non fiat, quem frigida intus compri-mens auget, & in fame quoque ab ea abstinere volunt. Sed in aliis, vt demittatur in faciē iubent, vt sopiti spiritus excitentur, & si qui adhuc in partibus externis remanserint, resolui prohibeant: & hanc præcipue imperant, in iis, qui ab æstu, aut febris incendio, aut alia causa calida oriantur. Sed expositores hoc præsidium cum legerent apud Auicennam, non excitandi gratia fieri credidere, sed densandi, ne scilicet exhalent spiritus, sed detineantur: facies enim ea est, ad quā multi concurrunt. Sed prior ratio sanior est, quoniam maxime sensibilis pars, & nervosa, ideo subito illo occurſu maxime commouetur, & spiritus ad eam vertuntur, siquidem omnino his desitutum cor non sit, aliter peribit. Assiduare igitur vult Iacchinus, donec excitetur. Secundum remedium est, eos nomine compellare ad aures, donec excitentur. Nam ex sono feriente vis sensitiva aurium excitatur, & reuocat spirituum mensuram, & caloris. Subdit Galenus & nares apprehendere similiter ad excitandum, in cura vxoris Boethi. Alii & os & nares, vt comprimantur iubent, vt inspiratus aer interiora petens, & paulo mox egredi volens, calefactus ad cor redeat, ipsumque calfaciat, spiritusque reficiat & excitet: id forte in causa frigida magis conducit. Addit Galenus & odorata naribus admouenda: quæ ea sint, non scribit. Hæc vero tum ad vim euigilandum, tum ad spiritus restaurandos faciunt: quæ tamen hoc casu eligi debent, quæ grata illi esse solent, vt vim animæ alliciant, nec refugiat. Vinum ergo maluaticum, aut aliter maxime odorum conuenit. Auget vero vim eius, si tostum panem assumas calidum, ac perfundas: quod si fortio-rem odorem velis, etiam acetum acerrimum rosacea temperatum, & garyophyllis, & santalis similiter offeres, & in faciem irrorabis: quod si camphoræ grana iij. addas, vehementer erit odor & gratus. Sic & aerem totum cubiculi odoratum reddes ex rosacea, & garyophyllis. Componuntur quoque poma ex speciebus epith. cor. cum ladano, sed reuocatis deseruiunt magis. Hic alii in causa frigida spiritus instaurant aluntque, qui non solum naribus ægrotantis admouent, vt olfaciant, sed etiam inflando naribus immittunt odora-menta in tenuissimum puluerem redacta: algalia, meſchus, styrax calamita, ladanium, & id genus alia permulta boni odoris, ad hanc rem sunt idonea. In causa calida odoret santala, præsertim citrina, rosas, caphuram. Interea

cautio habenda, si a præforatione vteri fiat, vel mulieres (vt ex interrogatione astantium discere licet, si non loquantur) ei sint obnoxie, a iucundis illis odoribus abstinendum, quin grauius olentia naribus quidem iniucunda, ac vultu & suauiter olentia admouenda. Quidam altis vociferationibus & clamoribus spiritus circa cor sopitos excitant. Prodest quoque ad excitationem artus confricare & ventrē: artus quidem vt calor rursus ad externa redeat, qui ob paucitatem in cor erat retractus, idque si ad brachia fiat, vino calente odor, optimum erit. Sic & in historia Boethi Galen. facit. Ventrē vero odoratis confricat, vt erat quondam nardinum vnguentum: ego potius nostro spicaceo vterer: nam iuuare sæpius vidimus ventris affectus. Hoc fit, vt ventrem roboret, qui sæpe lædi solet in syncopes affectu ex confluxu bilis, & sine ea affligi cordis consensu: præterea cum valido sit sensu, eius contritatio ad euigilandum facit. Sed quid iubet, vt vomat? an quasi humor in ventrem confluxerit? At hoc accidentarium est, neque enim ex ventris morſu, vel dolore statui-mus syncopen euenisse. An similiter vt excitet, nauseam excitando? Nam nec vomitiua dat Galenus, hoc casu, sed proritat solum: similiter ad excitandum postrema sunt, quæ sternutationē mouent, vt zinziber & piper: illa vehementiora sunt. Sed quibus modis curetur syncope ex bile flaua, iam prius quoque diximus: sed quando ea tentantur, vinum etiam flauū tenue, vel aquosa & antiqua vina propinat Gal. alii & panem in vino granato madentem dant. Et ita prohibere ne amplius resoluantur, fiet remouēdo causam (vt etiam de febricitantibus diximus) etiam externā, si adsit, vt calor aeris, & alterando: præterea & auersiones ac vacuationes faciēdo ad contraria, quamuis suffi solcāt, sudore excepto, imo hic augeri ex debili contentrice naturali corporum, vel etiam raritate. In sudore igitur vtetur his, quæ ad præuisionem dicta sunt. Cum vero a syncope releuatus est æger, causam, si adsit, respicere oportet. Habes exemplum apud Iacchin. de dolore, si causa exsistat, a quo æger leuari debet, alioqui recidet. Causa tollitur aut mitigantibus, aut lenientibus, aut stupefacientibus, cum cautione, vt 5. simpl. 18 & 12. meth. 8. & 5. meth. reliqua vide apud Iacchinum, & quæ nos de dolore diximus lib. 7. obser. De febr. Auicenna, si sit materia dolorem faciēs ipsam vacuat, causam tollendo, vomitu, clysteri vel sectione venge, cum a syncope est releuatus æger. Verum id videtur fieri nō posse: nam virtus necessario est debilis, ideo vacuatio nocet: si ita debilis manet, tentanda non est, sed cum a symptomate reficitur: at non nisi sedato dolore, semper enim dissoluetur spiritus. Quod si dicas, quomodo debilis stante sanguinis copia in venis? a sanguine enim vires. Respondetur, non esse necessarium, sed primo a spiritus copia (non enim semper vires augentur) vt in lib. de plenitud. Vnde & Gal. cum de synocha loquitur, quā fieri ait in bono habitu, & multi sanguinis, cum sanguinem vult mittere, addit, si vires ferant: stat enim cum sanguinis copia

Vomitum.

Quando a
syncope rele-
uatus est æ-
ger, quid fa-
ciendum.

8

spiritum multum vacuatum, vel alteratum, unde vires labant. Si stupefaciendum, utuntur philonio, vel pilul. de cynoglossa, vel theriaca noua sex mensium, modo robusta sint corpora natura & colore. dant theriacam fere ad 3j. pueris vero ciceris forma, Sed Philonis antidotum fortius est, cum restinguat, sistat, somnum faciat. De aliis causis, ut vacuatione immodica, certum est, quod retineri debeat, si sequatur: sed de his suo loco. & cap. De dysenteria, cum & quasdam sponte deficere diximus. Sudores quoque prosequuti sumus. Si animi affectus, ut paulo ante admonuimus, contrariis sedandus, aut monitoriis præceptis utendum: ubi vero timor, ne eueniat ad causam maxime respiciendum, eam tollendo: tollitur vero propriis remediis, qui in his affectibus enumerantur. Sic etiam Auic. dimittit, & dolor si est similiter sedandus, primum tenrando causam remouere, aut p. paregorica, alioqui stupefacientibus. Si ex febris vehementia, ad ipsam refrigerandam accedemus, ut de febribus diximus. In resolutione itaque spirituum, alimenti optimi succi, facile & cito nutrientia, humectantia. Diogenes Laert. scribit, Democritum multos annos effluentem spiritum retinuisse medulla panis albi intincta vino optimo, ut Cretico, & conspersa puluere mēthe, appositamque stomacho & naribus. Ita quoque si ex crebris & inordinatis motibus fiat, quies iniungenda, ex respirato prohibito, respiratio procuranda, ex animi affectibus statim ab eo affectu reuocandi. Si vero ex aliqua trium principiorum intemperie fuerit excitata, per contrariam intemperiem (moderate tamen vindicatam) syncope curabitur. Si ob inflammationis magnitudinem, aut vehementis febris malignitatem, syncopes generentur propriis curationibus, inflammationis scilicet, aut febris, curanda sunt, tempore quo syncope deprehensi cubantes non sint: quouis enim modo fiat ob defectus spirituum post labores, vel morbos, vel medicamentum, nutriendus erit æger alimentis optimi succi, cito nutrientibus, & humectantibus, de quib. vide auctores. Ad causarum genus pertinet ea, quæ calorem suffocant, ut si copia solum in viscera irruat, aliquando & ea frigida sit: aliquando non quod copia sit, sed quia exilis est calor, ut æger lib. 10. meth. Causæ vero sunt, quod vel ex victu in visceribus acervata est, ut iis, qui crapula utuntur, & in otio degunt vitam: sæpe vere & intempestive exercitantur, ut humores fundantur crudi, & viscera petunt: sæpe ex recentis vacuationibus. Causas copiam videre licet lib. proprio De plenitudine. Ad hoc genus pertinent obstructions factæ in membris principalibus: sic quidam in iocinore tales obstructions habebat, & crebro exsoluebatur, quem & Iacchinus curauit. Fit ex confluxu etiam confertim facto, ut in timore, & febrium principis: vel ob prauitatem, vel caloris inopiam in resolutis, vel apostema. Ex apostematibus autem magnis, ut 4. Aphorif. 48. Eadem intentiones in eiusmodi generis curatione, causam remouere, nempe multitudinem, & euigilare & calorem extinctum restituere. Primum

Si ex suffocatione caloris syncope fiat, quomodo curetur.

10

autem & secundum scopum explent, quæ euigilare faciunt: retrahunt enim ad externa humores, qui in viscera ferebantur, & qui manent. Id facimus per eadem ingenia: aqua tamen non inspergimus, ut monet Auicenna, sicut in superiori, sed extra vehementius fricabimus (nam sæpe crudorum copia in eo est) & ventrem odoratis inungemus, & nares, ut oleo iasmino, bet zoino, styracino, sunt enim hæc acriora. Hic quoque sternutamenta magis iuuant. Sic & cordi calida epithemata adhibemus, ut melissæ, cardui benedicti, & sampsuchi aquam, cum vino aromatico & speciebus diambra, & calide actu apponimus. Tertia intentio calorem extinctum excitat & restituit. Quod si sponte sua fiat, ut in febribus, laborandum non est, sed febris curanda remediis propriis. Si non fiat, sed adhuc langueat, ut in timore, & causa tollenda est, & cibo & potu calido sanandus æger. Sic si sit oppressus calor ex debilitate: quanquam præstabit antea id fecisse, ut 10. meth. med. Gal. ait. Si vero ex inflammatione, vel febris malignitate, Galenus abstinere iubet prorsus, & euigilantibus uti: nam si dederis (inquit) necabis, quanquam exitialis affectus non debeat a medico tractari. Si vero ex crudorum copia, hic varius esse videtur, illorum artus plurimum fricat, calfacit ac ligat. Ceterum a vino & cibis temperare iubet, atque etiam a balneis, si febris adsit, & ut contenti sint mulse potu, in qua thymum, organum, pulegium, vel hyssopum concoctum sit. Confert autem & acetum mulsam. Mulla varie apparatus: vide Acakiam in commento supra Gal. ad Glauco. Abstinere igitur cibo & vino Galenus, potat incidentibus medicamentis. At lib. 12. vinum & cibum dat, quo periculum in presens euitet. Si tamen vehementer non febriçent, aquosum vinum statim exhibet, & in eo panem dilutum, modo in aliquo viscere non adsit phlegmone. Vide de his ad longum Altimarum, quæ ipse tum ex Galeno, Aetio, Paulo, ad syncopen ex crudorum humorum copia refert. Dubitatur & de inflammatione: nam perpetuo accidentibus vires præseruantibus utendum est, & dandus cibus. Respondetur, cum dicit abstinendum, in copia recte dicit, indicans causam medelam, non symptomatis. Itaque distinguendum est, prout in accessione est vel extra. Signum quod hoc velit, quoniam subdit dandum oxymel, & mulsam cum herbis illis incoctis. Et sunt remedia, quæ ad hunc affectum Galenus affert, quæ causam respiciunt (ut recte dicebat Iacchinus) & ita utilia sunt quando a syncope est excitatus. At in accessione ubi aliquid offert, si potest, & vini, 12. method. Contra, affectus eget detractione. Imo errat, inquit, grauiter, qui his, qui ex dolore, & morbi magnitudine deliquium patiuntur, cibum offerunt, sed potius detrahendum est. 2. de vi. 48. Respondet ipse, Concedo, sed id facimus, ut periculum euitemus: & hoc auctorauit Auicenna, cum ait: & non cogas sumere cibum, nisi vinum, quoniam a syncope cogimur: & recitat curam affectus, itidem ut Galenus, & Galeni verba, quod multi ab ignavis medicis pereunt, dum

11

Cauti.

12

13 dum robur addere viribus volunt, & præfocant. Patet autem quod vinum calida mistum dari debet, nisi æstus impediatur. Quæ autem sit integra affectus crudorum curatio, in lib. De feb. diximus, *lib. 3. obseru. 26. De feb. syncopali humoralis.* vbi & egregium exemplum habes de muliere egregie curata. Et lib. 7. obser. 6. de muliere pituitosa febricitante, in syncopen incidente, ex collectione humorum pituitosorum in stomacho. Si vero absit febris, horum curatio dum adhuc modum non creat magnum, ad 4. lib. sanitat. spectat: si syncopen affert, ad hunc locum: contra si accidentia vires deficiant, dandus est cibus, 1. Aphor. 8. Respondetur, tantum ut remedio sit, non ut sanguinem & copiam augeat: & vbi euitauerimus periculum, ad abstinentiam reuertimur. Contra cur non vbi inflammatio? An duplex est periculum a cibo, & ratione inflammationis, & ratione principii febris præfocantis? Vnde si oneretur virtus, prorsus præfocabitur: hic vero non nisi cruditas: nam si esset motus principii, prorsus non daremus, etiam in hoc, sed enenit his syncope, etiam sine retractione, quæ fit in principio. Contra cur his syncope affectis tribuis, non illis? quomodo viuificabis vires? Respondit Galen. 12. meth. cap. 13. quod si destituuntur alimento, quoniam crudi succi non nutriunt priusquam concoquantur: ideo noui aliquid damus in præsens. At in illis non est alimentum inopia, sed copia. Sat est ergo reuocare ad extremum spiritum, & calorem: habent viscera quod alantur. Præterea nisi detur aliquid, stomachus languet, & in afflictio alias corpore, & debili virtute, facile syncopen accersit, hoc prioribus non accidit. Nam & in cruditaribus maxime a ventriculo offenso, & ita imbecillo facto eius ore, syncopas euenire innuit Gal. 12. meth. 8. Quærendum etiam est, num quod vulgo suadet, faciendum, ut in timore, postquam animi affectus ablatum est, vacationem aliquam moliamur? Respondetur, visum est, ne fiat, sæpe magna euenire mala, ut in quartanario vidit Iacchinus, subita spirandi difficultate, & palpitatione, & syncope mortuo. Sed quid potest facere timor, ut hæc exigat? An ex confluxu illo aliqua obstructio in valis, vel phlegmone, vel abscessus aliquis fieri potest, quamuis multæ copię nota non appareat, est faciendum. De causis vero quomodo obuiam eundum, ne rursus in syncopen decident, ex propriis capitibus habendum, quomodo tollantur.

OBSERVATIO XII.

De syncope ex utero.

1 PVella nubilis, octodecim annos nata, cum vteri suffocationi sæpius obnoxia esset, in grauissimam syncopen incidit: huic enim crura potius quam brachia, iuxta Galenum 1. ad Glauconem, deligauimus, atque præfricauimus, & quia sursum reuulsus retractusque in latus vterus esset, cucurbitulas femoribus apposuiimus, & naribus obieci-mus grauissimos odores, ex castoreo, ex assa foetida, vtero vero suaves: atque circa vterum olea relaxantia & calfacientia adhibuimus, quibus præsidis mox restituta fuit, & a syncope releua-

ta. Vterum repurgauimus cum pilulis mastichinis. Sed hæc postea viro copulata, ex nostro consilio, amplius hoc malo, admodum prolifica, non corripiebatur.

SCHOLIA.

A Nimo destituuntur mulieres (ut de causis diximus) quibus vel sursum, vel ad latus re-²trahitur vterus, & quibus large menses fluunt. In priore affectu crura deliganda sunt, ac perfricanda, ut humoris copia, quæ hos affectus parit, foras euocetur. Communitatem enim vterus, per venas, per quas possit is humor deriuari, cum cruribus habet, hac ratione inguinibus & coxis admoenda cucurbitulae sunt, quibus potenter trahendi facultas inest. Naribus quoque obiecienda sunt, quæ grauiter olent, vtero vero quæ suauem spirant odorem. Natura enim ad id, quod obieciunt, si iucundum familiareque est, mouetur, si triste alienumque, auersatur: a tetro odore naribus obiecto, inferius depellitur in locum suum, ad suauem vero inferius admotum sese conuertit. At in largo vteri proflauio, ut obseru. 8. huius libri diximus: brachia liganda, & vinculis constringenda, & mammis cucurbitulae affigenda sunt. Ita & in alicuius partis sympathia, topica,unctiones, cordis roboratio, partis affectæ curatio, ex stomachi quidem imbecillitate, imponenda, iuxta Galenum, quæ roborandi vim obtinent, emplastra ex palmulis confecta, vino, polentis, croco & aloe, & mastiche, oleo absynthino, mastichino, nardino inungendus. Aestuante stomacho aliquid refrigerans admiscendum, ut cucurbitam, lactucam, portulacam, & vire acerbe succum. His vero, qui alicuius frigoris sensu afficiuntur, diatrion piperon exhibendum, aut absinthium in potu. Si vitiosi humores os ventris mordeant, aqua calida epota vel hydrelæo vomitus imperandus. Si non facile vomant, prius partes stomacho adiacentes, & manus & pedes calfaciendi sunt. Quod si nec sic vomant, immisis in os pennis vel digitis, stomachus irritandus est: si nec sic, rursus oleum calidum adhibendum, quod non solum vomitum prouocat, sed ventrem quoque emollit. Postea absynthii coma, aqua mulla incocta, in potu danda, deinde vinum, modisque omnibus roborandæ partes sunt, tum medicamentis forinsecus impositis, tum absinthii potu. At non per initia sed repurgato ventre, quando succos continet, non adstringendus, sed calfaciendus, ut prius dictum est. Si pituita in ore collecta, mullam dabimus, in qua vel hyssopum vel id genus aliud maduerit, & acetum mullum & piper, & postea diatrion piperon: plurimumque stomachum fouebimus oleo, in quo absinthium decoctum sit: victumque attenuantem adhibebimus. Plura vide 1. ad Glauconem. De arcecurat. apud Galen. cum ibidem ad omnes causas præsidia vtilia ad syncopen ad longum referat.

OBSERVATIO XIII.

De syncope a veneno assumpto.

1 MVlier quæ pisces in foro Delfis vendebat, ex animi desperatione misera, ut se ipsam interficeret 3 ij. auripigmenti in ceruisia sumsit, quæ

2
Animi deli-
quium ab
utero.

3
Si ex stoma-
cho.

post grauissima symptomata, vt ventris torsiones, conuulsiones, tandem in syncopen incidit: sed frictionib. a mulierculis adhibitis a syncope quidem releuata, pessime agebatur. Hoc tempore cum in Haga Comitissæ esset, accersit^r est pharmacopæus, qui oleo oliuarū propinato vomitū prouocabat, & mox theriacam potandam dabat, quam me in simili casu recte vsum fuisse viderat. At me reuersum meridie ex Haga vocant, quæ tunc prodeplorata habebatur, tam ob continuū spasmum, quam ventris torsiones, supernas quoque atque infernas deiectiones: sitibunda æstu se præfocari clamabat: ideo decoctum sequens propinaui. *℞. folior. malua, viol. hordei mundati. an. m. j. sem. malua, cotoneor. an. ʒss. seminis lini ʒss. coquantur in aqua communi pro libr. j. colatura adde syr. viol. ʒij. quo iulebo & ventrem deiciēbat & vomēbat, syncope non amplius reuertente. Dedimus etiam lac calidum. Illud enim, iuxta Aetium, lib. 13. cap. 40. si assiduo vomitu reiectionem, valet his, qui calcē, sandaracham & auripigmentum potarunt: nam hæc dolorem ventris, & intestinorum, cum vehemēti morfu, inducunt. Iuuantur etiam, eodem Aetio auctore, succi malua potu, aut seminis lini, aut oryza, aut halicæ, pinguib. iusculis potatis & aqua mulla. Ceterum symptomatis dictis cessantibus, decocto iam dicto, pro corroboratione & siti continuo sumebat ex diatrag. frig. & subinde syr. violar. omnia enim lenientia hic valde commendantur, vt oleum amygd. dulciū expressum, quo non solum in hac, sed in aliis (vt de venenis dicturi sumus, si Deus me superstitem fecerit) commodissime sæpe vsum sumus: propinando quoque indefinenter butyrum cum ceruisia, huic negotio admodum conueniens. Quibus quidem præsidis hæc mulier euasit, quanquam postea post annum vnum atque alterum ad cachexiam deuenerit, & postea obierit.*

S C H O L I A.

HOc genus syncopis a veneno vel ab aere infecto, vt in odoribus, seu cibis, vt esu fungorū, ex praua hortorum putredine, pertinet ad caput de alteratione spirituum: siue prauitatem in corpore acquisierint, & qualitatem venenosam, vt cum corrumpuntur succi aliqui, vt de hysteris quoque Galenus habet 6. De locis affectis: vel etiam venenum potatum sit, vel morfu relictum: ferre enim omnibus superuenit hoc symptoma. Fit etiam maxime in frigiditate, vnde ad frigidū distemperantur, vt in vsu stupidorum euenit. Nam a calore potius resolutio multa esse videtur: ab aliis qualitatibus longi potius morbi fient, quam syncope, quod tardæ sint actiones. Cum igitur de natura causæ certus fueris (quod hic facile est) quod quidem ad eius lūmotionem attinet, dum æstu est implicitus æger ad frigidum affectum, calidis vteris, aere, epithematis, odoribus, frictionibus, fouendo ventrem, & omnibus modis hos excitando: mox vino maluatico, & aqua carnis, & ouis restitues. Si vero venenosa qualitas sit (si quidem ab vtero) eisdem modis reuocanda erit, pessis, suffitu, odore tetro ad nares, infernorum

frictionibus, cucurbitulis ad coxas & pubem, vinctulis, vt scholio præcedente, docuimus. Cum vero resipuerint, causæ spectanda, & ei obuiandum. Si materia venenosa, vt in vomitu æruginoso (de quo etiam mentionem fecimus in lib. de feb.) ea quæ abluunt propinanda: et si adfueris antequam incidat, quæ temperent exhibēda, vt aqua & oleum dulce, vel amygdalinum, mulla, lac potare debēt. A vomitu, terra sigillata exhibēda, & theriaca: nariibus odores, cordi epithemata. Si vero iam incidit in syncopen, exigua spes est, si sit valida: tentandum tamen iisdem, facto prognostico, ne remediis vacui videamur, ob artis honorem. Si extrinsecus accesserit ex odoribus malis, communibus auxiliis vtemur, excitando, & odoribus gratis instando, & cibo & alteratione temperando. Nam & præfocatos ex fumo carbonum nos restitimus, qui robustiores erant, etiam nautas in nauibus conclusos, ceruisia ebulliente: quosdam subito extractos e naui reuocauimus: quamuis & hoc modo subito extincti sint quidā in naui permanentes. Si ebibita venena, proprias habet notas & curationes, de quibus suo loco. Rondeletius in syncope ab hausto veneno, statim vomitum prouocat, eoque prouocato dat theriacam, aut mithridatium, & postea si sentitur ardor & acrimonia ventriculi, vel punctura, exhibet lac, butyrum vel pul. cord. ex refrigerantibus & acrimoniam obtundentibus, vt *℞. diamarg. frig. ʒj. trochisc. de camphora, cōfect. de hyacinth. an. ʒss. aqua ros. nymphae, bugloss. an. ʒj. syr. de acetos. citri. vel de limonibus, ʒj. misce, fiat potus, detur pars media & altera post aliquot horas. Si autem venenum frigidum sit, vel affectus frigidus inducat, fiat sic. *℞. cōfect. de hyacinth. ʒij. pul. de gēmis ʒj. aquarū melis. beton. bugloss. helenij. an. ʒij. syr. de bugloss. ʒj. dentur ij. vicib.* Si deprehendatur quale fuerit venenum, dentur propria antidota. alioqui zedoaria in omni veneno valet, vti & tormentilla ad omnem syncopen. Quib. modis excitentur a syncope in paroxysmis febrium, de febribus diximus.*

OBSERVATIO XIV.

De paralyysi satis vniuersali, animi deliquio leui, & asthmate.

Iacobus Iunius quæstor Domini de Wafanaer, apud Haganos, senex annum sexagesimū octauum iam attingens, alioqui vir minime melancholicus, hilaris & facetus, subito incidit in paralytin quasi vniuersalem, cruribus tum brachiis ac manibus resolutis, loquela etiam nonnihil impedita, valde debilis, vt animi deliquium quasi incurreret, cū asthmate subinde ac pectoris angustia. Ad quem primo accitus est Antonius Schinkelius medicus Haganus, qui aqua lauendulae tempora & membra paralytica irrorari & confricari iussit, & vt eidem syrupus infrascriptus aliquando exhiberetur. *℞. syrupi estœchade. de betonica, rosacei solutini. ana ʒj. olei vitrioli guttas novem, misce.* Hæc præscripta fuere 16. Augusti. Altero die me vocarunt: cumque eundem reperissem in hoc statu, & debilem, neque aluum deponeret, visum mihi fuit vt glans statim iniiceretur, ac diuer-

ad diuersionem & alui subductionem, quod cum medico presenti quoque; vtile videretur, hæc glans iniecta fuit. *℞. pulueris specierum hierapicra, trochiscorum albandal. an. ℥j. salis parum, mellis q. s. fiat glans seu suppositorium*, quo bis terue aluum deposuit, atque hæc glans, cum facilis solutionis esset, secundo vel tertio quoque die reiterata fuit, vt 20. Augusti. 27. & 31. & 6. & 14. Septembris. Deinde reliqua subsequencia medicamenta, vna præscripsimus: statim quoque a ventris solutione, cum prima glande, inunctionem sequentem. *℞. olei sampuchini, olei costini ana. ℥j. ℞. misce.* inungatur mane & vespere tota spina dorsali, a nucha incipiendo, vsque ad os sacrum. Inter ea cum paulo melius medicamenta ferre posset, has pilulas vna præscripsimus. *℞. pilul. cochlear. ℥j. pilul. aurear. ℥j. fiant pilule viij.* (maiores deuorare difficile poterat.) & deurentur. Habuit inde viij. sedes, cum admodum facilis solutionis esset, vt paulo ante diximus. Postea 20. Augusti etiam & hoc solutium exhibitum fuit. *Recipe syrup. ex infus. ros. cum folis senæ ℥j. ℞. agarici trochisc. specierum beneactis laxat. ana. ℥j. aqua salina ℥j. ℞. misce*, qua potione ultra lex habuit secessus: tunc etiam imperauimus, vt crura & membra paralytica hoc linimento inungeret, saltem bis in die. *℞. olei sampuchini olei costini ana. ℥j. ℞. aqua vita ℥j. misce.* 21. Augusti hoc apozema præscriptum est. *℞. corticum radic. cichorii. peonia, ana. ℥j. florum stœchados, rorismarini. ana. p. j. herbe paralytis, betonica, maiorana, salvia, origani, foliorum lauri. ana. m. j. prun. damasc. num. xij. vuar. passul. ab arillis repurg. ℥j. semin. carthami parum contusi ℥j. ℞. folior. senæ a stipitibus repurgatorum ℥vj. poppodi quercini ℥j. seminis anisi ℥j. ℞. coquantur in aqua communi, pro ℞. j. colatura addendo syrup. de beton. ex sol. betonica confecti: oxymelitis simplic. ana. ℥j. ℞. misce. pro quatuor dosibus.* deinde & hoc quod sequitur. *Recipe conserua florum betonica, salvia, borag. rorismarini. ana. ℥j. ℞. nucis muscata condite ℥vj. confectionis mithridatica ℥j. oxymelitis simplici, syrup. de succo betonica. ana. ℥j. ℞. misce. fiat conditum: ex quo capiebat bis aut ter in die, ad magnitudinem castaneæ.* 23. Augusti sequens etiam conditum præscriptum. *℞. conserua boraginis ℥j. conserua betonica, salvia, ana. ℥j. ℞. manus Christi cum perlis, propter leue deliquium animi, ℥ij. misce.* erat autem valde exiguum illud deliquium, vti & asthma, quo subinde afficiebatur, vt prius dictum est, cum pectoris angustia: pro quo accidente lingebat aliquando syrupos sequentes. *℞. syrup. capill. ven. ℥iij. syrup. de hyssopo. ℥j. misce.* pectus inungebat cum oleo amygd. dulc. Quibus remediis dicta symptomata cessabant. Sed rursus ad paralytin, quæ omnium grauissima erat, 24. Augusti decoctum infrascriptum in officina fieri iussimus. *℞. corticum radic. cum cichorii, dentis leonis (cum breuiter febricitaret) ana. ℥j. ℞. florum cordialium p. j. cichorii. boraginis, betonica, capil. ven. polstric. herba paralytis, ana. m. j. sem. 4. frigid. maiorum. ana. ℥j. passul. ab arill. repurgat. ℥j. coquantur in aqua com-*

muni pro ℥ix. colatura adde syr. capil. ven. (obtusissim, licet leuem, quæ aderat) syr. de beton. ana. ℥j. misce, fiat apozema, pro iij. dosibus. Postea & hoc decoctum sumsit, cum adhuc febricitare videretur. *℞. corticum radic. cichorii, dentis leonis, ana. ℥j. florum cordial. p. j. herba paralytis, betonica, cardui benedicti, chamaed. an. m. j. sem. 4. frig. maior. ana. ℥j. seminis carthami parum contusi ℥j. ℞. vuar. passul. ab arillis repurg. ℥j. fiat decoctio in aqua communi, pro ℞. j. colatura adde syr. rosacei solutioni. ℥ij. misce: fiat apozema pro 4. dosib. matutinis, semper ad minus ex eo bis in die excreuit.* Et cum aliquando dormire non posset, hoc hordeato sub noctem aliquando vsumus. *℞. hordei mundati ℥j. amygd. dulc. depit. ℥j. ℞. sem. quat. frigid. maior. mund. ana. ℥j. seminis lactuca. ℥j. ℞. fiat hordeatum pro ℥viij. dulcoretur Zacch. perlato, vt artis est.* hoc hordeato tantum bis aut ter vsumus, cum paralytis magis calidiora requireret, & sicciora & attenuantia, vt est diambra, diamoscus, confection mithridatica (qua prius vsumus erat) & theriaca. Quamobrem cum iam bene dormiret, & febricula eum non amplius apprehenderet, & supradicta symptomata cessassent, ad paralytin omnino curandam magis attenti fuimus. Et sic 28. Augusti pilulas suprascriptas iterum exhibuimus: & 30. Augusti, vt magis sudaret, accepit mane ℥ij. theriacæ optimæ, cum paucis vino Rhenano, & egregie sudauit, alioqui rursus exhibuissimus ad ℥j. Deinde continuando inunctiones suprascriptas, manus iam ad caput mouere poterat, & simul sustentatus a famulo per cubiculum leuiter inambulabat. Septimo Septembris ad paralytin & maius robur membrorum paralyticis inducendum, hoc quoque apozema præscriptum est. *℞. radic. peonia. ℥j. florum rorismarini stœchados ar. p. j. salvia, betonica, maiorana, herbe paralytis, folior. lauri, cardui benedicti. an. m. j. vuar. pass. ab arill. repurg. ℥j. sem. coriand. preparati ℥j. cubebæ. ℥j. coquantur in aqua communi pro ℥ix. stent. infusa supra herbas, manæ colatura adde cinnamomi selecti ℥j. pro aromatizatione, addendo syr. de stœchade, de betonica. an. ℥j. misce, fiat apozema ad modum clareti, pro iij. dosibus.* Hoc apozemate bis terue reiterato, & conditis supradictis, & istis omnibus remediis cum vsumus esset, continuando inunctionem quoque iam dictam, ad membra paralytica destinata, non solum loquela, sed omnia membra paralytica intra mensem suo robori restituta sunt, adeo vt hic senex miraculo quodam perfecte sanatus, non solum recte incedat, & omnia membra moueat, sed quouis modo, quo velit, ambulet & proficiscatur, nullo vestigio paralyseos relicto, & nunc anno 1592. 2. Iulii, cum hæc rescriberem atque colligerem, optime ac pancreaticæ valet. Hic autem inter curandum fuit obsequentissimus, & stricte quæ ad victum tum potum probe extenuantem & exsiccantem conueniebant, & vt sitim toleraret, imperauimus: quod hic maxime vtile est. Hæc inquam omnia quam diligentissime obseruauit, ne latum quidem digitum ab amborum nostrorum præscripto discedens: quæ equidem maxime ad cu-

rationem iuuerunt, & cum venter per se satis solubilis esset, & leuibus quoque pharmacis adiutus, topica remedia & continuæ inunctiones membrorum paralyticis eo magis robur addiderunt.

S C H O L I A.

7 **Q**uantum ad animi deliquium attinebat, valde leue erat, & vix effatu dignum, a quo facile euasit remediis ad asthma valentibus, vt syrupo de hyssopo & similibus vt filius Procuratoris Regii apud interpretē Hollerii, de quo ante dictum est, qui asthmaticis remediis quoque curatus fuit: quibus & hic asthma, quod similiter leue erat, facile discussum est. At paralytis omnino vniuersalis multo vehementior erat, quanquam & hæc magna cum nostra laude in senecurata a nobis sit. Ceterum licet *libr. 10. Observationum nostrarum*, aliunde diximus de paralyti, tamen, cum & hic senex nobis familiarissimus, aliiq; viri non minus graues quam docti, me instigauerint, vt hunc casum hic infererem, quiq; hunc virum ita laborantem, & viderunt & norunt, voluerunt vt hac curatione eximia librum meum quoque condecorarem. Quod nullo modo omittendum duxi, cum in vita nunquam expertus fuero curationem feliciorē hac ipsa, licet 47. annis nunc medicinam fecerim. Imo id ipsum libenter egimus, idque in laudem medicinæ, & potissimum omnipotentis Dei, cui non solum hæc, sed omnia alia nostra debemus. Hoc enim casu, licet difficilimo, mecum & alii omnes medici docentur, ne statim animum abiciant in morbis difficilibus curandis, qui & continuam ac indefessam diligentiam & maiorem, quam ceteri morbi, qui minus contumaces sunt, requirunt. Quod etiam infra scriptus casus, non minus admirabilis & rarus quam iam dictus, indicabit.

OBSERVATIO XV.

De pragnante, quæ peperit infantem sine osse coagulato a cubito vsque ad humerum, qui infans egregie curatus fuit.

Aleida de Renes, matrona nobilis, vxor Ioannis de Oestrum, viri nobilitate clari & quondam vrbs ac arcis Wordenæ præfecti, anno 1587. Delfis habitans in ædibus Adriani Ioannis Ichthyopolæ in platea Frandrica, dicta. Quæ quidem pragnans mane ancillis suis absentibus audiens ploratum infantum, subito ex lecto surgens, per scalas admodum præcípites inferius descendens, inopinato cecidit supra latus dextrum, & dextrum cubitum versus humerum, & circumuoluta etiam in caput prolapsa est, non sine contusione eiusdem cum vulnere. At paulo post restituta sanitati 8. menses cum dimidio in Haga Comitum tunc agens in domo Præposituræ, añ. 1588. 13. Iulii die peperit puellum, cum brachio dextro a cubito vsque ad humerum non tantum resolutum, sed omnino osse non coagulato, vt brachium instar lori in omnem partem flexile flaccidumq; concideret, ita vt in brachio a cubito vsq; ad humerum os abesse videretur. Ad infantem ego accitus vna cum magistro Ioanne Quattellario & Iacobo Timanno Capitone dicto, chirurgis. Ex

2
communi consilio adhibuimus medicamentum defensiuum & conglutinans (*vt in ossum facturis communiter fieri solet*) ex bolo armeno, farina volatili, puluere myrtillorum, oleo rosaceo, & albimine oui concinatum, mox superimpositis ferulis, primo ligneis (*quas infans ferre non poterat*) deinde chartaceis, ex charta paulo duriore & crassiore, (*quas nos magis laudamus*) insuper superinductis debite fasciis a cubito vsque in humerum, vt ita os paulatim coagulari posset. Quibus remediis præter omnium hominum opinionē hic infans (*cui Brynninc de Oestrum nomen erat*) miraculose intra tres septimanas sanitati restitutus est, non solum osse coagulato & paulatim indurato, tum brachio etiam valido existente, verum etiam belle puellus nutritus, si quis alius, inter multos infantes & robustissimus & pulcherrimus euasit, adeo, vt ad libitū etiam quo velit brachium moueat in omnem partem, non sine admiratione eorum, qui puerum viderunt & nouerunt.

S C H O L I A.

3
Casus hic apud omnes Haghanos celebris ac notus, certe dignus est, vt tyronibus medicis & chirurgis, nec non & aliis omnibus innotescat. vt sciant quid medicina & chirurgia præstare possint, etiam in illis morbis, qui in vtero materno originem habent, modo opitulante Deo ab artis exercitatis recte & debite tractentur. Hic autem omnes puerum nunquam ad sanitatem posse peruenire censebant. Attamen Deus opt. max. suam benignitatem in puello restituendo demonstrare voluit, qui semper laudandus in mirabilibus suis, & qui medicinam cælitus ad nos demissam ad sanandos ægros eum colentibus, liberaliter concessit. Sed mirabitur hic aliquis, vnde puer in vtero tale vitium contraxerit? Cui facile respondebimus (*cum aliam causam ignoremus*) non aliter quam ex metu vel imaginatione, vt in pragnantibus subito metu percussis, ex improviso diuersa stigmata pueris in vtero materno existentibus imprimuntur, vel alia vitia in vtero contrahunt. tantum valet imaginatio subito impressa, vt longiore sermone dicturi sumus, *libr. 28. nostrarum Observationum, de mulierum morbis*, si Deus me superstitem fecerit. Placuit igitur hunc casum hic interferere, quamuis proprie ad illa loca, vbi de pragnantibus & purpuris agemus pertineat, ad quæ etiam transferri poterit, cum ex professo de iisdem impressionibus tunc agemus. Ita huic puellæ ex casu matris in vtero existenti tale vitium in brachio inflictum fuit, vs os a cubito ad humerum vsq; non recte nec debite coagulatum fuerit. Sed rursus alius inferet: Cur non etiam in capite puello aliquid vitii relictum est? an hoc ex metu primo & subitaneo per imaginationem factum, cum mater prius caderet in latus dextrum supra cubitum, postea circumuoluta in caput, ita vt primus metus & subitaneus, vel prima imaginatio vehementior fuerit secunda, cum in caput prolaberetur: Nam & alia stigmata quam plurima ex momentaneo metu vel subita imaginatione contingunt pueris in vtero matris existentibus, quæ

bus, quæ & natis in diuersis partibus corporis per totam vitam permanent: quanquam hic puellus a tam insigni malo recte curatus fuerit. Deinde cū puerpera, scilicet mater ipsa, recte habens & bene valens puellum optime lactauerit, & cōmoda victus ratione vsa fuerit, cibisque boni succi & optimi nutrimenti, iisq; quæ & lac augmentare solent, vnde quoque magno cum successu, etiam adhuc bitis remediis ad hoc aptis, puellus citius sanitatem consequutus fuit, cum & domi quoq; nutrix adesset, vt infans modo lac matris, modo nutricis sugens, debite nutriretur, & ita robustior eualerit, & attracto nutrimento ad os ipsum, admodum breui intra tres septimanas (vt diximus) debite & recte coagulatum fuerit. At omnib. morbis & symptomatibus cordis paulo ante absolutis, nunc ad nonnulla mammarum vitia progrediemur, quæ post pectoris & cordis mala etiam ab aliis auctoribus explicari solent.

OBSERVATIO XVI.

De lactis defectu.

Cum thoracis affectus ac cordis absoluerim, etiam mammillarum aggredi cōsentaneum est, quæ cum thoraci incumbant, & cor attingant, (Galenus teste De v'su partium lib. 7.) de his quoque agemus, non tamen de omnibus, cū nonnulli mammillarū affectus ad libros potius pertineant de tumoribus præter naturam. Mammæ itaque & ipsæ pectori impositæ, cordi præsidio sunt, ipsum subiectum contingentes pariter & calore fouentes, glandulosa substantia, in quo loco in mulieribus copiosum benigni alimenti superfluum colligi potest, lac videlicet, cuius causa exstiterit. Propterea & mammarum ac vteri maximus consensus est: ita vt neque lactatio, neque menstrua purgatio simul esse possint. Quomodo autem generetur ex optimo sanguine, ex Galeno, loco iam citato, quis intelligit. De albatū quidem natura, licet ex sanguine, ne videretur crudele (inquit Rondeletius) pueros sanguine nutrir. Reliqua de his vide apud Galen. loco citato, & Rondeletium. Nos autem hic primo de lactis defectu agemus. Cum igitur lac in mammis ex sanguine generetur (idem enim est cum sanguine, colore tantum differens) & cum sanguis sit lactis materia, mulieres, quæ lac habere volunt, multo sanguine præditas esse oportet, & vt sanguis ad mammæ fiat, curandum. Quare duæ erunt causæ potissimum penuriæ lactis, aut quia paucus est sanguis, aut quia ad mammarum venas non peruenit: sed de causis latius in scholio. Ceterum matrona proba lodoca Teylingia Augustini Teylingii vxor, socrus mea, quæ viginti proles ex vno marito exceperat, ne lac deficeret, semper solita erat vti lacte decocto cum hordeo excorticato in partes contrito, vulgares appellant, gort, alii grutten: quo cibo perpetuo vtens, miraculi instar lac ad mammillas euocabat. Solent enim mulieres Alcmariæ hoc solo præsidio vti. Refert Amatus centuria 4. curat. 92. de muliere puerum lactante, cui deficiebat lac, non propter mammillarum aut corporis totius siccam intemperiem, neque ob san-

guinem altera qualitatum infectum, calida, frigida, humida, sicca, neque ob puerum imbecillum lac sugere e mammis non valentem: sed quia sanguis bonus, sed paucus, in corpore esset, ideo iuebat vt cibariis optimis & sanguinem gignentibus vteretur. Sic & nos istis diebus talem quoq; nacti, consulimus, vt ouis recentibus, testiculis gallorum, carnibus gallinaceorum, ficedularum, turdorum, perdicis, phasian, attagenis, tum assis, tum etiam inrulentis, adiecta oryza, vteretur: carnibus quoque vitulinis veruecis, & ferculo Hispanico (Græci λελόφαρον appellant) quod per se sufficit. Deditimus & martios panes, amygdalas saccharo incrustatas, vnam passam, & varia billaria, vinumque optimum & odoriferum, quibus lac ad mammæ attractum fuit. Anconitana mulieres hippocampum piscicolum flexuosum, in puluerem redactum, & vino exceptum, ad lac prouocandum bibunt, & optime votis respondet.

SCHOLIA.

Lactis defectum appellamus, vel quod exiguum admodum existat, vel omnino deficiat. Facile etiā hic percipitur, mammillas affectas esse. A partu enim cum natus est infans, mammis rursum totum alimentum affluit. Quo fit, vt lac menstruo germanū esse inquit Hippocrates, & eodē tempore menstrua belle procedere nequeat, & foemina lactare, v. Galen. asserit. Proinde quibus menses mediocriter feruntur, iis lac in mammillis non colligitur: quibus vero hoc large superpetit, iis plane menses supprimuntur. Hoc itaque tempore, ac reliquo toto, quo mulier lactauerit, si lac deficiat, mammillas affectas esse non ab re fatemur, siue per essentiam, siue per consensum affectas sint. Earum vero affectus symptoma est in genere retentorum immodice. Causas duas potissimum esse diximus penuriæ lactis: aut quia paucus est sanguis, aut quia ad mammarum venas non peruenit. Si multus sit sanguis in corpore, & ad mammæ non perueniat, hoc fit vel propter venarum angustiam, (vt Rondeletius dicebat) aut obstructionem, aut propter sanguinis crassitiem. Defectus sanguinis est, aut propter totius corporis atrophiam, quam mulier ob picam, aut alimentorum fastidium contraxit tempore imprægnationis, vel quia post partum tanta sanguinis copia fluxit, vt retractus sit ad partem inferiorem, aut quia venæ plus iusto inanitæ sunt. At quoniam lactis materia sanguis est (vt dictum est prius) in venis contentus, quantitate ac qualitate con-

4
Quid intel-
legendum per
lactis defe-
ctum.

Quæ pars af-
fectatur.

Quis affe-
ctus præter
naturam sit
defectus lac-
tis.

5
Causa.

Quæ via in-
uestigandus
sit defectus
lactis.

OBSERVATIO XVII.

De muliere satis extenuata & graciles mammas habente, ex defectu lactis laborante.

Matrona quadam proba cum peperisset & defectu lactis laboraret, neque libenter infantem alteri nutrici commisisset, ad eandem consilii causa intrassem, atque animadverti scem eam mamas satis graciles habere, & quod ipsa esset utcuq; extenuata, huic alimenta optima calida mediocriter & humida, quæ plurimum nutrent, & multum sanguinem generarent, præscripsi, cum & ipse Gal. in lactis defectu ex sanguinis paucitate victum humectantem & calfacientem valem esse scribat, 5. De simpl. medic. facul. & cum medicamenta, ait, quæ non deficcant & modice calfaciunt, lacti generando utilia sint: quorum copiam habes apud eundem, & Paulum & Aetium, lib. 16. cap. 33. Ideo & alimentum augere duxi, & melioris succi cibos dare, panem optimum scilicet, ova recentia forbilia, iuscula, carniū succos, & vinum optimum, cum satis diues esset, & pullos gallinæcos, & ex fructib. vuas passas, pistachia, amygdalasque dulces: lussi quoque ut mammas confricerent, & aqua tepida cum spongiis foverent: hoc enim modo venæ, quæ ibi sunt, dilatantur: tum vberum frictione moderata ac fomentis per spongas, Aetio teste, sanguis etiam ad mammas trahitur. Animi affectus immodicos, præsertim mœsticiam ut vitaret, imperavi, & ut bene dormiret ac aleretur: caseum quoque recentem concessi, & præcipue lac cum oriz. & hordeo mūdato. Radices quoque pastinacæ domesticæ in iure pulli ac veruecis commode sumebat. Quibus quidem cibis medicamentosis non solum habitior euasit, verum etiam infantem alere potuit, ut non opus fuerit aliena nutrice.

S C H O L I A.

In defectu lactis, causæ ipsæ diligenter prius perscrutandæ, deinde amolierendæ. Si enim de minima tur lac ob exercitium, dimittendum, & nutrix in quiete & tranquillitate seruanda: si ob aliquem fluxum vel ventris, vel menstruorum, vel hæmorrhoidum, is prius restringendus erit. Ideo si menses nimis fluant, retinendi sunt. Si itaque ob totius corporis atrophiam, ob famem, vel quia post partum sanguinis copia fluxit, & venæ plus iusto inanitæ sunt, nutriendæ erunt optimis alimentis calidis & humidis & euchymis, ut iam diximus. Si propter crassitiem sanguis non fluat, leuiter incidentibus & attenuantibus, neque multum exsiccantibus, est utendum, & illa sint potius alimenta medicamentosa, aut condimenta alimentis permixta, ut herba fœniculi, apii, petrosi, vel radices aut anethi virid. Illa sunt iusculis admiscenda, & recentia esse debent, ne siccitate sua potius lac extinguant, quam generent. Zinzber magis tamen conditum, vel siccum, non tamen ex sanguine, & cinamomum in pauca quantitate in condimentis sunt utilia. Vinum quoque tenue, album, vel folium conuenit. Neque illis usus est interdicendus coëparum coëtarum, vel in iusculis vel sub cineribus

tius corporis temperamento, ac habitu, sicciore existente. Ex immodicis item sanguinis aut aliorum humorum, euacuationibus præcedentibus, vehementibus exercitiis, laboribus, vigiliis, fame, mœrore vel solitudine, aut arida æstuanteq; febre, vel id genus aliis, quæcunque plus quam expediat, corpus desiccauerint ac calefecerint. Hæc enim sunt, quæ inter alia lac lādunt, ipsumq; prouenire prohibent, ut legitur apud Galenum eodem lib. 5. De simplic. med. facul. nedum sanguinem ipsum minorem reddentia, sed partim etiam qualitatem ipsius vitiantia: quamuis & immodice refrigerantia huiusmodi quoque naturæ sint.

Si vero hæc non adsint, inspexeris autem aridas, macilētas ac graciles mamillas ipsas, ob propriam earum imbecillitatem, ac aridam intemperie prouenire lactis defectum conicere poteris, utpote, quæ non valeant tantum, quantum indigent pro lactis generatione, sanguinis copiam attrahere. At si propterea quod sanguis deterior seu vitiosus fuerit, utpote biliosus aut pituitosus, vel melancholicus existens, lac ipsum deficiat, id tum ex lactis colore, tum substantia, & sapore potissimum interstinguere poteris, præsertim si non omnino defecerit: non tamen possis habita cognitione temperamenti habitusque totius corporis & ætatis.

Namque si biliosus fuerit, præter eius tenuitatem ac flauum colorem, amari quodammodo saporis lac erit, aderitque temperamentum biliosum, habitus gracilis, ac ætas florens. Si vero pituitosus sanguis, crassioris substantiæ, albi aut pallidi coloris, acidi saporis, odorisque lac existit, lactantisque intemperies, habitus, ac ætas pituitosi quoque erunt, quemadmodum si vehementioris fuerit spissitudinis, ac paucitatis: obscuriorisque, ac quodammodo nigri coloris lac ipsum & reliqua, quæ diximus, melancholica fuerint, melancholicum quoque sanguinem adesse significabunt. Hæc tamen affectio quamuis infantibus magis quam mulieribus grauis sit, teste Aetio, cap. 33. lib. 16. non propterea despicienda erit, cum absque aliquo eiusdem mulieris præter naturam affectu, etiam gigni non possit: quapropter ubi imminuitur lac, aut omnino exstinguitur, vel corrumpitur, aut spissatur, vel attenuatur: præstat quidem alterius nutricis lac præbere, quemadmodum Aetius præcipit, lib. 4. cap. 6. Sin autem id non permittat res aliqua instans, victu nutrix curanda est, ut ne in morbum incidat infans (ut ipse inquit) ac ipsa sibi quoque meliorem vindicet sanitatem. Neoterici, ut Valescus, hæc signis prognosticis adiiciunt ex Rhaz. 4. Almanz. Lac illud melius est, cuius gutta vna supra vnguem stillata neque multum subtile sit, nec valde crassum aut congelatum: bonum habens odorem & dulcedinem conuenientem optimum est: at salsum, male olens, nullo modo infanti conuenit. At mulieri in vtero habenti lac ex mamillis multum fluens, debilem foetum (ex 5. aphor. 52.) notat. Si mammas duras habeat, foetum sanum designat: si mulier quæ neque prægnans est, neque conceperit, lac habeat, huic menstrua defecere. 5. aphor. 38.

6
Signa si ex sanguinis defectu pronuntiat.

Si vitiosus sanguis causa fuerit signa.

Pregnostica.

8

3
Curatio pro varietate causarum.

neribus. Valent & fatus mammarum cum rebus humectantibus, decocto malua, althea tam rad. quam foliorum, post frictiones, vt venae dilantur. Sed minime audiendi practici illi, vt admonuit Rondeletius, qui pul. ex sem. fœniculi & aliis calfacientibus & attenuantibus & resiccantibus componunt, vt corallo, qui nec sanguinem generat, cum nō concoquatur, nec in sanguinem vertatur ob siccitatem & duritiem; neq; propter eius qualitatem, cum sit frigidus & siccus, potest iuuare concoctionem, neq; sanguinis generationem. Herba fœniculi ob suam humiditatem minus siccatur, & ad sanguinis distributionem multum valet, & proinde ad lactis generationē; semen, cum siccum sit, desiccatur: sed recens, vt eruca recens, auget; sicca minuit. At res calidæ & humidæ, multum sanguinis generant, vt lac animalium in cibis sumtum, dalia, & alia id genus. Si autem sanguis non fluat ob angustiam venarum, optimum erit aqua tepida mammas fouere, vel sinapismum debilem, aut dropacem supra pectus ponere, vt sanguinem ad partem trahant. Sed diutius nō oportet supra mammas sinere, ne id quod attrahunt, digerant, aut inflammationem in ea parte procreent. Hoc modo fiet, iuxta Rondeletium. *℞ sicutum maceratarum in aqua ℞ j. pistentur diligenter, postea adde sem. synapi tenuissime triti ℞ j. misce.* ponatur supra mammas, vel dissoluatur, & pix miscetur multo oleo: & post aliquam frictionem applicetur supra mammas, vel potius in circuitu mammarum, sub clauiculis & sub alis; nam per illas reg. o. res venae ad mammas perueniunt. Frequenter lugere mammas, vel exprimere, lac effluere facit. Cucurbitularum appositio cum pauc. igne, paulo infra clauiculas, ad sanguinis attractionem prodest.

OBSERVATIO XVIII.

De defectu lactis ex lacte vitiat.

L Audatissimum lac est, moderatum (inquit Paulus libr. i. cap. 3.) spissitudine, copia, colore, odore & gustu. Cōmendatur & quod in unguem pollicis instillatum, eo inclinato ad lucem, neque subito, neque tarde videtur defluere. Iam vero in hunc modum probari potest: infuso lacti in vas vitreum, coaguli exiguum admiscetur, digitisque agitur. In quo postquam concreuerit, inspicietur, num casei portio minor fuerit quam serum; hoc enim lac inutile est. Contrarium huic concoctu contumax: probatissimum, quod vtraque habet mediocritas. Sic nos ad nutricem acciti, vt lac probaremus, biliosum, quod & deficiebat & corruptum erat tenue, fluuum & al. quo modo amarum: vt illud corrigere-mus, dedimus prius syrup. ex succo intybi, & ex succo infus. ros. communium, vt ita ad purgationem magis præpararetur humor biliosus. Deinde purgans medicamentum elegimus, quod humectaret, & minime exsiccaret; & sequens dedimus. *℞ syrup. ros. pallid. sœpius infus. ℞ j. cassia recens extracta, manna selecta, an. ℞ ss. aqua casei ℞ ij. B. misce, fiat potio brevis sorbitionibus, in quibus lactuca & hordeum excorticatum incocta erant,*

alvum: & vt nutrix laboribus abstineret, iussimus, a vigiliis quoque, tum fame ac mœrore: & ad lac etiam augendum, fœniculi radicem in ptisana decoctum præbuimus.

SCHOLIA.

S lex deteriore sanguine bilioso lactis defectus contingat, bilis erit temperanda, & leuiter purganda cum syrup. ex pluribus infus. ros. & similibus: vbi enim acrius tenuiusq; lac euaserit, iuxta Paulum, multis quidem tunc laboribus nutricem leuare, sorbitionibus autem & carnibus suillis, sæpeque & vini dulcis potu reficere conuenit: omne vero lac vitiosum, siue crassum siue acre fuerit & fœtidum, puerū, qui prius luxerit, eadē qualitate inficit. Lac autem acre nunquam ieiuno exhiberi debet. Fœtorem eius vinum odoratum & cibi dulces (eodem Paulo auctore) emendare possunt. At pariratione nigra bilis, si ea causa vitiosi sanguinis fuerit, ac defectus lactis, expurganda erit medicamēto, quod talem vim habeat, nec tamen exsiccet; veluti est diacatholicum seu syrup. Domini Augustini, si cum manna aut cassia fistula ea permisceas. Verum si pituitosus fuerit sanguis, medicamenta requirit, Galeno teste, ex calfacientia, aut primo aut secundo ordine, nō tamen desiccantia; & inter ea potiora sunt medicamenta nutritoria, vt fœniculum & anethum, virentia tamen & humida; radix & semen fœniculi ptisanæ incocta, iuxta Paulum. Et ideo si lac crassius fuerit, pituita vomitu elicietur, epoto oxymelite: laboribus cibum præcedentibus eadem extenuabitur: & in cibo conducunt hyssopus, origanum. Ad lac quoque generandum valet, pastinacæ radix; ita & lini semen cum melle linctum; iuxta Aetium. Sic & radices siferis, caryotæ coctæ cum iure pulli, & comesta, lac præstant.

OBSERVATIO XIX.

De lactis redundantia.

R edundantia lactis laborant mulieres primis diebus post partum, quia multis sanguis mittitur (inquit Rondeletius) & non absurnitur; aut quia non fugitur. Quando enim plus alimenti ad mammas defertur, adeo lac redundat, vt ex eius ampliore plenitudine mulier grauetur ac doleat, ita vt copiam eius ferre nequeat: præsertim cum e mammis non effluat, & propterea intus detinetur. Contingit autem sæpius puerperis, non raro autem reliquis lactantibus, vt in scholio latius dicturi sumus. Sic nutrix quædam ad nos venit adeo lacte abundans, vt mammae dolerent, lacte intus retento. Huic statim occurrendum esse putavi, ne in inflammationem mamillarum incideret, vel casei instar lac coagularetur, seu in grumos verteretur: facile enim, si & lac vitiatum fueris, mammarum vasa exulcerat, scabiem, pannos, & papularum eruptiones quoque inducit, vt Aetius annotauit, & nos quoque sæpe in praxi quotidiana vidimus. Quapropter vt lac minueremus, paucissimos cibos minusque alentes vt caperet, consulimus, exiguum quoque potum & ceruissiam tenuem; ita & crassiorem & vinum inhibuimus: partium vero infernarum ex-

ercitia concessimus, & quia sanguine abundabat, & vires ferebant, venam mediam in brachio secari iussimus. Sic quidam, si in toto corpore sanguis abundat, fieri iubent, vel internam venam secant: postea & tali venam incidunt, modo vires ferant: imo circa initia, si quid non impedierit, poplitis vel tali venam secant, copiosumque sanguinem ex ea vacuant, per eam enim fieri inflammationem prohibent. Et si altera mammillarum magis oblata sit, e directo venam secant, potissimum autem id servari iubent in puerperis, ubi menses retineantur, totisque viribus præter venæ sectionem, eos prouocare conatur: nam quibus menses medio-criter feruntur, ut prius dictum est ex Galeni sententia, iis lac in mammillis, multum præsertim, non colligitur. At si non retenti sunt, mediam vel internam secant. Post venæ mediæ sectionē spongia purā, molli posca egelida imbutā, expressamq; super mammas, fasciis accommodauimus, atque linteum aceto imbutum imposuimus, & assidue iuxta Aetium humectauimus, ita ut non sit subsequuta inflammatio: & corpus etiam purgauimus medicamento non admodum calfaciente, in hūc modum. *℞ syr. ex infus. ros. pallid. cum agarico ℥ j. β. aqua agrimonie ℥ iij. misce.* & victu attenuante vtens, ac incidente, & copiam sanguinis minvente, a dolore mammarum ex lactis plenitudine sanata fuit.

S C H O L I A.

Lac autem ut plurimum colligitur, oppletis sanguine communibus venis, quæ a mammis pertingunt ad vteros. Id etiam contingit mulieribus vtero gerentibus, interdum ob cōceptus imbecillitatem, interdum vero cum neque grauida est, neque peperit, sed ei menstrua defecerunt. Hippocr. auctore *Aphorif. 39. & 52. lib. 5.* de quibus modo noster sermo non est, cum de his verba facimus, quibus a partu, aut reliquo lactationis tempore, adeo creuerit in māmillis, ut propterea mulieres grauentur, ac doleant, ita ut metus sit, ne vbera inflammatione corripiantur. At in mulieribus, quæ primis diebus post partum hac redundantia laborāt, Rondeletius suadet, ut potius ante partum aliqua repellentia apponantur supra mammas, ne tantam sanguinis copiam recipiant. Nam postquam lac multum receptum est, nō potest repelli, sed per mammas euacuari debet, aut suctu aut alia ratione. Attamē Soranus ubi māmæ assidue doleant, scribit non debere a mulieribus neque infantibus exfugi, nam suctione plus materiæ attrahi afferit: id quod Paulus confirmauit *capit. 35. libr. 3.* Altimarus ex Aetii sententia, *capit. 34. libr. 16.* ab adultis ac peritis mulieribus mammas puerperarū leuiter exfugi posse scribit: præsertim ubi non immodice doleant, seu inflammata sint: effertur namq; foras leni hac exsuctione, quod in mammillis lac continetur, neque plus materiæ ad eas trahitur, & propterea inflammationem fieri per eam prohibetur, potius quam irritetur. Prohibetur quoque lactis exsuperantia, deorsum trahēdo, & appositione cucurbitularum in emunctoriis & pessariis, si sufficienter non fluat

sanguis: deinde linimēto in circuitu mammarum & sub alis imposto, ut boli arm. *℥ ij. spongie bedeg. rad. histortæ, ana ℥ β. cum oleo ros. & pauco acetoreducantur ad formam linimenti:* illinantur prædictæ partes. Supra mammas cataplasmata digerentia ex hord. far. cum oxymelite, vel ex herbis digerentibus cum quadam adstrictione apponenda, ut mentha, absint. & al. is. *℞ mentha sicca, m. ij. absinth. m. j. fiat decoct. iundantur.* & per cribrum excipiantur: quibus adde farina fabarum vel orobi vel lupinor. ana. *℥ iij. cum decoct. & pauco oleo lilior fiat catap.* Supra papillam vtile erit. *rad. chelidon. maioris decoctam & contortam apponere,* si hæc non iuuent, *cerusam, litharg. cadmiam in vnguentareducere,* commodum erit, & alia adhibere, quæ citra calfactionem digerunt, & medicamentis pituitam purgantibus corpus vacuare, & tenui victu attenuante & incidente vtendo, copiam sanguinis absumere. Aetius palmulam, cum pane ac posca tritam apponit: deinde eas moderate vincendo constringit, vel ouo toto cum rosaceo indurit, vel lentesaqua marina incoquit, & cum decocto mammas abluit, lentisque contusas imponit. Quod si lac omnino restinguere volueris, alumen & psyllium cum aceto & coriandri succo ac rosaceo adhibeto, ex eiusdem Aetii testimonio. Hæc tamen in puerperis, quæ vltro lactis exsiccationem postulant, ut sequenti Obser. dicemus, cum cautione adhibenda existimo: nam sæpe vidimus, qui multa repellentia mulierum mammis post partum apposuerunt, pessima symptomata induxisse: præsertim si asthmate vel ex pectore laborent, ut euenit Barthildæ Verlanæ, vxori Bartholomæi Teylingii sororii mei: cui cum appositum esset ex alicuius medici alioqui doctissimi consilio, emplastrum supra mammas post partū exsiccantium, facta est deinde magna obstructio in membris spiritalibus, etiam oborta tussi cum catarrho ad pectus destillante, ut per sex deinde annos continuo pessime habuerit, perpetuo catarrho ac tussi obnoxia, ut tandem tabida quasi euaserit, & ad finem vitæ perpetuo valetudinaria vixerit, licet nostra industria, Deo auxilium præbente, longius vitam protraxerit.

OBSERVATIO XX.

De lactis exsiccatione in puerperis nobilibus.

NON desunt delicatæ & nobiles puerperæ, quæ proles suas minime nutrire velint (quod tamen præstantius esset) ita ut a partu statim lac in mamminis exsiccari iubeant, utque māmæ solidiores maneant sine lactatione: ideo quædam obstetrices mammas oblinunt melle, hoc enim modo Gheertrudi Bronckhorstia cognatæ nostræ lac exsiccatum fuit. Noui & alias, linteum aceto inculcatum, in quo prius bullierat crocus hortulanus, commode applicuisse: nonnullas & folia viridia nucum apposuisse. Sunt & qui prohibent lactis generationem in mammillis, cum vnguento populeo, aut panno lineo, succo menthæ inculcato & appposito: aut cataplasmate indurto, ex radic. caulium, farina fabarum & lentium, cum

cum croco & sale, & nuce cupressi. Matronæ Venetæ, quæ crescere mammas non patiuntur a partu. inhibent lactis prouentum (teste Alexand. Benedicto Veronensi, lib. 11. cap. 16. emplastro ex melle, croco, terebinthina confecto, mammis imposito. Atque eo tempore iuscula non sumunt, neque vinum album bibunt, neque tenue. Sed & aqua marina fotu prodest. Obstetrices Delfenses lac exsiccant in puerperis panno lineo, oleo raparum intincto, vndiq; mammillis imposito: aliumque pannum lineum melle intinctum vel illinitum primo panno superimponunt: interim sub parte inferiore incipiendo mammillas debite constringunt, vt minus propendeant, illud in Iudoca Teylingia cognata nostra experti sumus.

SCHOLIA.

Mulieribus nobilibus ac ditioribus, quæ a partu lac omnino restinguere petunt, præstat minus repellentibus ac reprimentibus vti, sed tutius his medicamentis, quæ ipsum siccant atque digerunt, adhibitis, tamen prius per vincula, cucurbitulas, frictions, seu venæ tali sectionem, modo vires ferant, prout postulabit vsus. Tale habes medicamentum per Altimarum expertum, miraculo quodam id præstans, sine metu futuræ inflammationis. Habet autem *sceniculi, apii, oreoselin, maluarum & althææ cum rad. an. p. j. foliorum lauri, florum chamemeli. an. m. ss.* quibus in aqua arte decoctis, ac in largiori vase proiectis, testis deluper panno lineo mammillis, eas fouere præcepit: deinde eodem decocto mammas abluit, ac post ablationem, rosaceo omphacino illinit, quo tempore, vt leuiter quoque exsugantur, permittit, vt reliquum quod in mammis continetur lac fusum ac liquatum promptius foris effluat, nec materia aliqua ad eas trahatur. Resinæ terebinthinæ deinceps quantitatem, quæ satis sit, assumens, vino albo & odorifero, ac aqua ros. sæpius abluere iubet; cui duo aut tria oua tota, ac croci \mathfrak{d} j. adiacere permittit, & in emplastri formam seu cerati, cera addita, redigit: quod super lineo linteo, eoque crasso extensum (proforato tamen in duabus partibus, ex quibus mammillarum papillæ extra prominere possint) imponit, ac fasciis circumligat moderateque constringit. Singula autem dicta iterari facit bis saltem in die, videlicet mane & vespere, ante cibum: ita vt prius mamma foueantur, abluantur deinceps & illinantur, exsuganturque leniter, & demum emplastrum dictum imponatur: & fasciis moderate constringantur, ac ligentur. Elidæus Paduanus medicus & præceptor meus Bononiæ, lac exsiccabat inunctione olei ros. & menthæ, etiam mammis emplastrum de mentha imponens.

OBSERVATIO XXI.

De lacte in grumos conuerso.

Apartu aliquando, teste Paulo, lac in māmillis casei modo coagulatur; vel in grumos con crescit: quanquā hic affectus neq; idem sit, vt aliqui sentiunt, neq; eandem causam generationis habeat, cum lac in grumos concreseat ex sola causa frigida, sed tantum coaguletur in speciem

casei causa calida, vt ad longum videre poteris ex mente Galeni, Pauli & Aetii apud Altimarum: & ambo affectus pertinent ad morbum in numero seu magnitudine, & facile ab inuicem distinguuntur, grumescens quidam a frigida intemperie, & lac coactum casei modo, a calida. Vterque autem affectus statim curandus est, ne inflammationem pariat aut vlcerationem mammarū, præsertim, si etiam vitiatum lac fuerit. Ita Maria Ioannis, vxor Iacobi Teylingii, sororii mei, cum post partum lacte in māmilla dextra abundaret, & inter fugendum māmillā nimis nudasset tempore admodū frigido, māmilla indurata est, & dolorem incurabat. Cum itaq; suspicionem haberem lac in grumum esse commutatum, præcepi vt māmillam inungeret oleo liliaceo amygd. dul. & butyro recenti simul mixtis, addita adipe gallinacea: quo remedio dolor imminutus est, & durities mitigata, ita vt denuo effluente lacte infantem lactare potuerit.

SCHOLIA.

Ambo, nempe coagulatio in caseum vel grumos, modo fiunt ex lactis copia, modo ex lactis crassitie: vel potest lac concreescere in māmimis, post vsum medicamentorum refrigerantiū, vel nimis calefacientium, aut post concussionem aliquā. Hæc facile innotescunt, vt iam diximus ex agræ sermonibus & temperie: lac enim, teste Gal. non aliter quā sanguis extra vasa existens, in grumum conuertitur frigefactus. Et quia ex variis causis fiunt, curatio etiam varianda. Si enim ex crassitie lactis eueniat, extenuante victu vtendum. Si ex redundantia lactis, & nondum in grumum conuersi, a peritis mulierculis, vt prius dictum est, leniter exsugendum, atque sensim menthæ & fœnigraci succo illinendæ, & alia peragenda, quæ de lactis exuberantia diximus. Si ab immodico calore caseatum sit, victus ratione ad frigidum inclinante instituta, eisdem fere medicamentis, præsertim circa initia, vtendum erit, quæ *scholio Obs. 17. De lactis exundantia* diximus, ex Paulo & Aetio: priuatim autem Aetius surfures in aceto coctos, cum decocto rutæ mammis imponit, vel mentham cum polenta, aut iuglandes cum ruta ac melle: vel cuminum cum polenta, & crocum cum lacte, aut apium viride, vel folia solani seu halicacabi, cū brassicæ foliis, pauca myrrha ac croco adiectis, & exiguo aceto: iuuant & epithemata ex fœnig. sem. lini & althææ decocto, cum oleo viol. & exiguo aceto. Si in grumos sit conuersum lac, victu extenuante vtendum, ad calidum inclinante, lentium decocto, & aqua marina fouendæ, aut oleo calido dulci: inungendæ cum oleo amygd. dulc. aneth. amygd. & polline farinaceo. cum tēm. lini appposito, coagulum leporis potum, vel pauco aceto, butyro mixtum cum oleis dictis illinendæ. Alii cataplasmatibus & vng. incidentibus & detergentibus lac dissoluunt: vt, *℞ succi apii quart. ij. oxy-mel. ℥ ij. farina cicerum rub. & oryza. an. q. s. ad incorporandum*, fiat cataplasma. Si his medicamentis non dissoluatur, vel glandulæ indurētur, & suppurentur, tunc suppurantibus iuuanda est natura;

Curatio.

Curatio casei lactis.

4
Lactis in grumos conuersi curatio.

vt rad. althææ. lilior. alb. an. quart. j. ficuum paru. xx. decoq. in aqua donec mollescant: quibus adde axungia porcina non salita, aut butyri recentis quart. ß. coquantur, & cocta contundantur, & fiat cataplasma. adde olei communis parum. Quando materia est suppurata, aperitur locus, & curatur postea vt vlcus sordidum, de quo postea. Est & aliud quoddam vitium in ipsis mammillis, Græce *τρίχια*. Latinis Pilare malum dictum: cuius & meminit Aristoteles libr. 7. cap. 2. de quo & Benedictus Veronensis medicus etiam mentionem facit lib. 11. cap. 12. Plinius & pilos in mammis e partu innasci tradit: eos mastos herba (*inquit*) sanat indita. Gsbertus Horstius medicus nosocomii Mariæ consolationis Romæ, cum ibi essem, hoc malum fieri dicebat, cum puerpera pilum hauserit, tumque dolor magnus mouetur in mammis, nec sedatur donec pressus exeat, vel sponte, vel cum lacte exsugatur, utebantur in nosocomio vng. ex lithar. aceto, & oleo, sed præstantius est, vt exsugatur.

OBSERVATIO XXII.

De dextra mamilla inflammatione.

1 Puerperæ bene purgatæ in partu inflammatio oborta est, post tres septimanas in māmilla dextra: in febrē tertianam quoq; incidit hæc ipsa. Ad quā acciti, cum māmilla rubicūda esset, cumque aluum non deiceret, lenitium exhibuimus: deinde altero die, cum minus febricitaret, internam gibberi venam secuimus, moderate sanguine extracto. Quod si in principio menses non satis fluxissent, & retenti fuissent, ex tali vena id fieri iussissem. Mammam quoque statim inunximus vng. popul. & ros. simul mixtis. Sed cum inflammatio non sedaretur, rosaceo vsi sumus, etiam succo lolani cum aceto. postea etiam adiecto decocto chamæmeli & sem. lini. Cum autem transacto inflammationis principio nondum cessaret malum spongiis in hoc decocto madefactis, & etiam cum linteis lineis impositis, id mitigare in hunc modum studuimus. *℞ folior. malua, viol. an. m. j. flor. chamomill. meliloti. ana. m. ß. rad. althææ ʒj. se althææ, lini, fœnugræc. an. ʒij. summitatum anethi m. ß. bulliant in aqua communi. q. s. adde olei ros. chamæmel. an. ʒij. aceti ʒj. misce.* postea ex farina hordei, lini, fœnugræci cum pane trito in oleo sesamino & aqua decoctis, adiectis duobus vitellis oui & croci exiguo, fiat emplastrum, quod mammis apponatur. Et cum rursus purgata esset cum infus. rhabar. febris cessauit, & topicis dictis ab inflammatione etiam liberata fuit, neque ad suppurationem malum deuenit.

S C H O L I A.

3 *Causæ.* **M**ammæ, vt ceteræ partes corporis, sæpe inflammationem incurrunt, non solum confluite ad eas sanguine, verū etiā ob lactis copiam vel coagulationem casei instar. De quibus dictum est prius, & propriis signis facile internoscuntur. Quæ a sanguine fit, omni tempore euenire potest: reliqua non nisi puerperis & vtero gerentibus, vel quibus menses detenti sunt præternaturam. Ex quacunque causa fiat, non est sper-

nenda eius curatio: nam cum latior & adnosa earum substantia sit, nec multum obtineant innatum calidum, metus est, ne in scirrhum tumorem & demum in cancrum vergat, aut ea suppurata, ac ad abscessum progrediente exedens vlcus consequatur. Iuvat autem hic in principio, modo vires ferant, venæ sectio, vt iam diximus: etiam purgatio, quæ leniendo purgat, vt manna, cassia. elect. lenit, diacatholicon. Post hæc ad topica confugiendum, quæ reprimunt & repellunt: non tamen valida, vt madefacti linei ex aceto, vini albi & aqua gelida mammis impositi, & sæpe reiterati. In incremento, farina hordei cum oleo rosaceo, repellentia cum digerentib. permiscendo, vt farinam hordei cum succo semperuiui, oleo chamomil. & pul. ros. postea in statu addendo magis digerentia, vt oleum aneth. chamomil. acetum, cum decoct. rad. alth. & seminis lini, & emplastr. ex sem. lini, fœnugræci & rad. althææ: & in declinatione etiam de mucilagibus. Quibus si non discutitur, & ad suppurationem veniat, tunc erit iuuanda suppuratio, vt exemplo sequenti docebitur.

OBSERVATIO XXIII.

De inflammatione seu apostemate mamille sinistra in suppurationem conuerso.

2 **M**VLIER intra mœnia Delfis, ad fossam aqueā dictam, decumbens, cum inflammationem mamillæ sinistrae pateretur, quæ neque resolui posset discutientibus, & ad suppurationē tenderet, illico suppurationem adiuuandā esse duximus, idq; medicamentis temperate calidis & humidis emplasticam vim habentibus, quæ & maturationi & suppurationi, iuxta Gal. 5. De simplic. medic. facult. opitulantur. Idco post fortum emollientem ex rad. althææ & foliis malua, rad. lilior. & foliis viol. ac flor. meliloti, etiam sequens cataplasma mamillæ imposuimus. *℞ folior. malua. an. m. ij. rad. althææ ʒij. rad. lilior. an. m. j. coctis & contusis, adiecta farina triticea, hordei, fabar. an. ʒj. butyri recentis. ʒij. ping. gallinae, caponis, porci castrati. an. ʒj. olei linaei q. s. fiat cataplasma.* quo sine incisione ruptus est abscessus, alioqui inflammatione in pus permutata ad disruptionē ferro vel acriorib. medicamentis deuenissem. Quemadmodum istis diebus in nostra vicina, filia Ioan. Montfortii Machilda nomine, præcepimus, vt scapello aperiretur: quam empiricā mulier tractās, cum ingenti dolore & febre magis afficeretur, etiam postea ex pure corrupto, noluit adhibere, nisi postremo coacta eā admisit, & scapello per chirurgum aperta pure effluente, nocte subsequente egregie dormiuit, cum multis antea diebus dormire non potuisset. Et ita huic, tum alteri mulieri supradictæ, repurgato vlcere, chirurgica ope ad consolidationem tādē abscessus deductus est. Libet hic apponere quoddam arcanū, licet superstitiosum, ad inflammationē mamillarum, vt si quis occiderit manu dextra 25. ranas, manumque mamillæ postea applicuerit, idq; in principio, curabitur inflammatio sine suppuratione. Aliud quod nō est minus superstitiosum, si quis

*Signa.**Prognostica.*

quis manu tenendo talpā occiderit, tam diu comprimendo donec moriatur, is si manum leuiter ad mamam apposuerit initio; & hic inflammationem curabit absq; suppuratione. Talē fuisse in Hagha-Comitis virum cōstat, nomine Cornelū, cognomento Cannium, mercatorem vestium holosericarum, vt nobis retulit matrona alioqui honesta. Nuncquid verum sit, penes matronam sit fides.

SCHOLIA.

Apostema calidum, premisiss vniuersalibus remediis, in principio sanat aqua solatri, cum aceto & oleo ros. cōcussa & apposita. Apponatur emplastrū ex far. fab. foliis solani, oleo ros. aceto & melle paratū, coctum cum succo caulium. Discutit & resoluit materiam paratā & dolorem sedat. Alioqui si non resoluitur. *℞ far. fabar. fœnug. sem. lini. medullap. anis. farina hordei. an. ʒ. ij. croci ʒ. j. b. rad. bismal. cocta & contusa ʒ. ij. vitellor. ouor. num. viij. olei viol. chamom. an. q. s. fiat emplastrum.* Valet in augmento & statu. Vbi maturum est, aperiatur: mundificetur cum melle & succo apii & vitello oui; vt linamentum imponatur, & curetur vt aliud vlcus. Si sit frigidum, non conferunt repercutientia sola in principio, nisi misceatur cum resoluentibus & corpore prius purgato. Chirurgus quidā magna cum experientia in apostemate pituitoso utebatur emplastro ex rad. lapathii acuti, maluz, rad. fœnic. in lacte decoctis: quidam in principio adhibent fotum ex vino albo, aqua & aceto spongia tepida ad mota; postea & emplastro, iuxta Aui-cen. ex foliis apii bullitis cum vino, atq; contusis. Si maturandum, fiat emplastr. ex caricis pinguib⁹, rad. lilior. & cum farina fœnugræci & lini, & axungia porcina: illud enim maturat & dolorem mitigat. Maturū aperiatur, vt dictum est. Amatus aperit candēte ferro, vt in vxore Eduardi, *cent. i. curat. 47.* Sed is admonet, quod raro mamilla affecta ad sanitatem reducat, nisi altera sana a lacte exsiccetur. Exsiccabitur autē lac, si modo infanti mulier lac sugendum non dederit. Idem si lineis pannis frigida madefactis, mamillam frigececit, vel super eam puliculā ex fabis & aceto paratam imposuerit. Nec enim timeas de lactis exsiccatione; quia bene habente mamilla, vel facillime lac reuocabis: præcipue infantis attractione succuue. Visz enim sunt mulieres, quibus menses ob ætatem grandiore suppressi erant; & tamen illis lac copiosissimum ad mamillas denenit, solo puerorum succu; quos postea lactarunt, & ad annum & plus, atq; ita ac si eos pepererāt, tractarūt. Ex iis autem mulierib. ab Amato vna Ferrariensis, ætatis quinq; supra quinquaginta annorum visa est: altera vero nobilis apud Lusitanos Santaranensis, nata añs prope sexaginta. Lac aliquando in mamillis virorum admodū calidorum & carnosorum, in exigua quantitate visum est; sed rarissime, vt quidam medici referunt.

OBSERVATIO XXIV.

De scirrho mammarum, & duritie.

Scirrus mammarum fit post inflammationes, aut concretiones lactis, aut diuturniorem vsum repellentium, quæ materiam congelarunt;

aut post fortiter detergentia, quæ id quod tenue est, euacuarunt, & quod est crassarum partium, crassius reddiderunt. Si autem glandulæ indurentur, strumæ, siue chœrades a Galeno dicuntur, cum adenes induratas ait *χοιράδας* esse. Curatur autem scirrus eadem ratione, vt in aliis partib⁹, nempe partim emollientibus, repellētibus & digerentibus: vbi enim inflammatio ad duritiem vergeat, ea quæ molliendi vim habent, adhibere conuenit: in quem vsum laudauit Aetius, *cap. 38. lib. 16.* semen lini aut fœnugræci, cum aceto mullo coctum & impositum, aut sesamum illotum modice tostum, cum melle tritum, & calidum appositum: vel sterco caninum album, terebinthina exceptum superimpositum. Ceterum si ex coagulato lacte inflammatio fuerit excitata, eisdem circa initia vtendum medicamentis erit, quæ paulo ante de coagulato lacte conferre diximus. Verum si neque eis inflammatio cedat, ad ea, quæ modo commemorauimus, medicamenta progredendum erit. Et si ad duritiem tendat, ea ipsa quoque adhibenda, quæ modo retulimus. Sic mulieri, cui mamma ad duritiem peruenit, ceratum ex mucagine foliorum liliorum alborum & bismaluz, cui oleum lilaceum incoctum erat, cera n. odica addita, sparadapi instar liquata, per pannum lineum rarum seu detritū nonnihil tractum, mamma apponere iussimus. Est egregiū medicamentum, ad omnem duritiem, etiam conficiens puerperis, si puerum ablactare velint; ad lactis quoque resolutionem: nam appositum non solum mammam indurata emollit, verū etiam lac intra 24. horas resoluit, & in apostema vt transeat, præcauet, etsi videantur suppurari, estq; leniens atq; emolliens medicamentum & lene maturatiuum. Vtor quoque ad mammarum duritiem cerato de mucilaginibus. At Barthildæ Verlaniz, de qua alias diximus, puerperæ existenti, mamillarum apostemate correpte, cum ad suppurationem veniret, & abscessus per chirurgum scalpello apertus esset, cum pus postea non bene exiret, dum repurgantibus medicamētis vteretur, duritie quoq; oborta in mamilla exulcerata, pus minus effluebat, oborto quoq; dolore. Chirurg⁹ cum pulcem ex farina siliginis cum vngu. populeo mammis imposuisset, dolor magis increuit, duritie etiam aucta, neq; pure debite effluente. Ad quam accitus, febrem metuens, amota pulce hoc emplastrū admoueri iussi. *℞. rad. altheæ ʒ. ij. radic. enula campane ʒ. b. folior. maluz, viol. flor. meliloti, ana m. j. coctis in aqua ad mollitiem, & contusis adde farina hordei, & olei amygd. dulc.* quod satis est ad emplastrū formam; eoque mamillæ prius oleo amygd. dulc. bene inuncta apposito, durities cessauit, ac dolor & pus, quod antea crassum erat ac retentū, commode effluere cepit; ita vt breui facta vlceris mundificatione, ope chirurgi deinde probe curata fuerit.

SCHOLIA.

Triticum ad mollitiem coctum & contusum cum sabulo, quod ex cotib. in lintribus, dum Ad duritiē mamillarum.

iuuat ad duritiem mammarum: & dialthæa cum vnguento Agrippæ, & ros. oleo simul mixta & inuncta. Et quod habet *farina hordei, fabar. an. m. j. farina fœnugrac. lini, ana. ʒ. ʒ. vel m. ʒ. olei ros. ʒ. iij. croci ʒ. j. misce.* & mammis duris imponantur. Nodi vero ac glandulæ foliis persici mali recentibus & ruta vna contritis sanantur, vt quidam referunt: tragac. gummi arab. vitella ouorum simul mixta cum oleo viol. imponantur. At in muliere mamillas vlceras habente cum duritie, cum pus retineretur, emplastrum emolliens & simul maturans apposuius: & pure effluente, rupto abscessu eandem, vt vlcus, curari imperauimus. Ad vlcera mamillarum corrodentia scribit Tharantanus eadem valere, quæ ad linguam & os vlcerata conueniunt & ad aphthas, ponit lotionem ex mente Auicennæ ex decocto vini nigri styptici, sumach tinctorum, nucis cupressi, cassiæ lignæ, gallarum & agrimoniz. Bayrus ad vlcera mamillarum componit cataplasma ex foliis hederæ, & cum decocto vlcera foueri iubet. Refert & canabem syluestrem tusam cum axungia tumores & durities mamillarum curare, saniem expurgare, & dolorem auferre, mams impositam. Ad fistulas mamillarum ex Valesco valet quotidie bis cum decocto agrimoniz, aluminis & myrrhæ lauare, & vnguentum cum tenta imponere. *Recipe succi agrimoniz ʒ. j. aloes, myrrhæ, sarcocollæ, aluminis de pluma, ana ʒ. j. cum melle incorporetur vnguenti instar.* Vlcus sigillatur puluere sequenti. *ʒ. aloes hepat. myrrhæ, sarcocollæ, thuris, farina volatilis, sanguin. draconis, terra sigillata, aluminis roche combusti, corall. rub. myrob. citrinorum, balaust. an. ʒ. j. fiat pul. subtilissimus.*

OBSERVATIO XXV.

De mammarum incremento.

I Mulieri nobili, cum imprægnata esset, consilium petenti, ne mamillæ supra modum crescerent, præcepi vt panno duplicato in medio perforato, per quod transit papilla, tepide balnearet hoc liquore. *ʒ. aquæ portulacæ ʒ. iij. aceti ʒ. ʒ. misce.* Hoc modo ante me Ioannes Tiengius medicus Amstelrodamensis, idem ponebat supra mamillam eo die, quo mulier cognouerit se imprægnatam esse, vsq; quo sentiat infantem. Alii aquam pomorum arboris quercus in alembico distillant, & panno lineo inculcato apponunt, ne marmæ augmententur; quod etiam a partu fieri iubent, ne lacte repleantur. Idem præstare volunt aquam tegulæ ignitæ & sæpius extinctæ.

SCHOLIA.

2 *Causa cur mamma incrementum.* Mammæ non solum crescunt prægnantibus vel puerperis ex abundantia lactis; verum etiam puellis, postquam ad eam magnitudinem fere peruenerint, ad quam natæ sunt peruenire: vel quia incipiunt pinguescere, ob redundantiam alimentum, vel quia multus sanguis ad eas partes profluit, ante mensium eruptionem. Aliis quoque crescunt mammæ, quia aluntur flatulentis alimentis, vt castaneis, rapis: quod mulieribus monticulis accidit, vt refert Rondeletius; quæ mastas admodum indecoras & magnas habent.

Quare si quis velit earum incrementum prohibere, sanguinis attractionem impediat, & partes illas densas reddat, vt non facile sanguinem influentem recipiant. Commendatur succus cicutæ, (*prohibet enim incrementum*) aqua myrti, peculi rolar. & aqua distillationis pinearum, cum pauco aceto, & alumine positæ super mammas, intinctis pannis. Vt marmæ paræ & duræ maneant, nouem diebus mane & vesperi cum succo cicutæ fomententur; & herba trita superligetur. Galenus spongiam ex aceto madentem superimponi iubet. Erigit mamillas pannus lineus madefactus in decocto gallitrici, mams superpositus. Vastiores minuit, iuxta Paulum, cuminum tritum ex aqua impositum; & spongia aceto madens superimposita, & fasciis alligata. Plura vide apud Valescum, Gordonium, & Benedictum Veronensem, *cap. 17. lib. 11.* At extenuatæ marmæ non ita facile augmentantur, facilius enim exsiccare, quam siccum humectare, teste Galen. *7. method.* Frictionibus in principio augmentantur, contrectationibus, & emplastro de pice, & omnibus iis, quæ sanguinem augent, & illis, quæ ad atrophiam antea valere scripsimus. Vide Bert. Bononiensem de ingrassatione & extenuatione mamillarum. Verum hic minime prætereundum, quod papillæ mamillarum puerperis intus lateant absconditæ, vt pueros lactare non possint; quod pauperculis molestum est, multoq; magis si puellæ exsistentes papillas frictione in totum aboleuerint. Quibus autem latent, phialam vitream (*vt Amatus iubet cent. 5. curat. 31. in muliere Veneta nobili*) oris non admodum latam circumferentiam habentem, feruenti aqua impleri iubemus, ac illico ab ea aquam totam deponi: cuius phialæ sic calentis os ad papillam admouemus (mirum in modum attrahit) qua attractione papillæ formatae manent. Quamuis huius phialæ attractio prius dolorem pariat: quem facile postea contemnunt mulierculæ, cum tantum iuuamentum se inde consecutas videant.

OBSERVATIO XXVI.

De mammarum cancro.

Quamquam hic affectus ad chirurgiam pertineat, pauca hic adferemus. Cū enim tumor durus sit cancer, qui sensim incipit, scirrhus similis, nisi quod dolorem parit: scirrhus vero sine dolore est. Licet graue sit malum, solet aliquando diu protrahi antequam vlceretur: vti euenit Catharinæ Bokelli Delfensi mulieri, septuagenariæ, quæ per sex annos cancrum non vlceratum in mamma sinistra habuit; postea etiam vlceratum: quod cum integro anno correpta esset vetula, mense Augusto, anno 1560. me prius in consilium adhibuit, cum hactenus nullis præsidis vasa esset, re iam deplorata, ita vt neque opera manuali, nempe abscissione, curari posset in tam senili corpore; neque enim eradicari poterat sine periculo mortis; cum neque Bertapalia vnquam viderit cancrum curatum, etiam incipientem, (quāuis multa de eius curatione medici scribant & nunc quidā temerarii multa promittant) absq; incisione.

2 incisione. Sed vidi, inquit, cancrum instar ciceris in muliere pulcherrima; & rogatu amicorū, totali incisione & ruptorio radicitus extirpauit: & partim mihi male successit; & iterum reuersus fui ad curationem, cum euacuationibus debitis præcedentibus, & bono regimine & localibus remediis, quæ meo iudicio putabā conuenire. Sed qui aliter se intrōmittit curationi, vitam ægrotātium ad mortē deducit. Et narrat quomodo vetula post illud in curationem admissa saluiam pistā & dentibus masticatam apposuerit, & præter spem sanata fuerit; vt sic ipse habuerit laborem, & altera honorem. Et quamquā Galenus fateatur 2 ad Glaucl. se recentes cancrōs curasse: confirmatos tamen nequaquam; ideo prognostico habito, hanc nostram septuagenariam curari non posse prædixi. Idem & mecum sensit Henricus Vergerius medicus Haganus doctissimus, qui vna meū ad consilium accitus fuit. Post purgationē materiæ melancholicæ (quamquam incipienti sanguinis missione & purgatione & topicis remediis, iuxta Rōd. letium al. quando curari possit, vel abscissione si fieri potest) sectionem venæ hic in vetula adhibere nolimus: sed purgationem porius, sed leuiorem, in vetula: deinde & hoc medicamento topico communi consensu vsi sumus, ad palliationē vt vocant. *℞ succi solani repurgati seu despumati, & diu in mortario plumbeo, pistollo; plumbeo contriti ad leuem spissitudinē ℥ viij. ℞ tint. vulgaris decies lota in aqua solani ℥ j. plumbi vsti & similiter loti, vt supra ℥ j. olei ros. ℥ ss. succi solani, vt supra repurgati q. s. in mortario plumbeo ac pistillo plumbeo ad linimenti formam ducantur.* Sic Galen. lib. 2. ad Glaucl. solani succum imponit; hoc enim medicamentum est eiusmodi affectibus vtilissimum. Quod si ægrotus, inquit, tam liquidum medicamentum imponi nolit, præsertim cum domo exire, solitaq; opera exercere cogitur, medicamentum ex pompholyge imponendum, quo ad vlceros cancrōs me v. i. (inquit Galen.) vidisti. Et ita neoterici quoq; vtuntur vng. albo de tutia, de plumbo depompholyge. Ceterum longiore tempore hæc vetula sic tractata, nec vlcere admodum procedente, superuixit, donec annosa obierit. Memini istis diebus nobilē virginē nomine de Meer, quæ cancrōsa vlceros in mamma non haberet: cui consului, vt nullo modo vteretur iis, quæ cancrum ad vlcerationem deducerent, cum iam satis longo tempore eodem malo laborasset, licet satis confirmato: sed vt venæ sectione vteretur, cū vires satis constarent, & non adeo vetula esset, & purgationibus insisteret, & iis topicis vteretur, quæ ad palliationem cancri facerent. Sed nostro consilio minime auscultans, ad empiricam mulierem lapsa, & mamillæ vitione vsa est: & magna facta elchara locus apertus fuit: vnde vlcus magis serpens, totam mamillam occupauit vsque ad alas: & tandem totū brachium inflatum fuit, & magna miseria & dolore exhausta, cum cruciatu ingenti, misere vitam protraxit, donec moreretur. Eodem fere modo Margareta Cornelii in insigni Rolæ Delfis, mulier crassa & satis vetula,

cum cancrum occultum in mamilla haberet, ac consuluissem, ne eum medicamentis irritaret, vel aperiret, ad empiricam mulierem conuersa, ad cancrum confirmatum exedentem & vlcerosum deuenit, cum tanto foetore, vt quis apud eam vix consistere posset: etiam ad alas & brachium inflatum deueniens, misere tandem obiit. Palliatione ad tempus in ea vsi sumus, post venæ sectionem & purgationem, cum denuo nostro consilio vteretur, his medicamentis ad tempus pro palliatione chirurgica vtebatur. *℞ gummi tragacanthi dissoluti in aqua solatri ℥ j. vitellorum ouorum (propter dolorem & erosionem) num. ij. camphora ℥ ss. ducantur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, adiecto oleo ros. q. s. pro vnguento: desuper ponebatur vnguent. diapompholygos, postea vngu. priari vng. ros. & simul oleum ouorum, ad ℥ ss. aliquando succi solatri cum oleo ouorum. etiam postea adiecto oleo cheirino, in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo. Aliquando ex oleo ouorum solo cum cera, in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo agitis. Sed etiam febri continua lenta paulatim cum magno foetore & miseria vitam tandem clausit, anno 1589.*

S C H O L I A.

6 **C** Arcinosi tumores in omnibus consueverunt fieri corporis partibus; sed præcipue in mamillis mulierum, quando potissimum naturali sua purgatione priuantur, vt testatur Galenus lib. 2. art. curat. ad Glaucl. cap. 10. & lib. 14. method. medend. maxime vero in monachis religiosis & melancholicis, vt in hac vltima domicella de Meer dicta in Campo regio quondam canonica. Vidi mus innumeras religiosas apud Clarissas Delfenses hoc malo laborasse, & etiam obiisse; & vnā quæ adhuc viuit, quæ abscisso cācro restituta fuit, nostro cōsilio, de quo alias diximus. Huius etiam exemplum quoq; habes apud Amatū, cent. 3. curat. 32. Quorum originem etiam ad dignoscendirationem ante Galenum diuinus Hippocrates prosequitur lib. 2. de morbis mulierum. Zoar vero in cruribus potissimum cancrōs nalcī lib. 2. sui Theysir, cap. 27. contendit. In cruribus ego tantum mulierem affectam vidi; & Amatus vnum tantum se vidisse commemorat in crure cancrum patientem. Vidi & rusticum, qui in mento & circa labia cancrum habebat: quem Guilhelmus de Dalen chirurgus, me præsentē, excidit & curauit. Vidi mus & mulierem in nosocomio non solum cancrum circa mentum & nasum, sed per totam faciem habuisse, ex lue Gallica prius ortū: & nunc totam faciem exederat ita, vt monstrum potius, quam mulier videretur; quæ longo tēpore vitam misere protraxit, donec cū horribili dolore moreretur. In locis quoq; adenosīs, maxime vero in collo, axillis & inguinibus, euenisse visum est. In corporis quoq; partibus penitioribus sæpe innascuntur, palato, sede, & vtero muliebri, vt sæpe vidimus (p̄cipue in duab' mulieribus Delfensibus, ex qua vna obiit & altera misere vitā traxit, donec moreretur) quod & Gal. testatur lib. 6. Aphor. 38. quos & cancrōs occultos appellat, non solum eos

qui absconditi sunt, & non apparent, sed & eos qui apparent, & sine ulceratione fiunt.

8
Quare can-
cri in mam-
mis fœmi-
narum po-
tissimum
contingant.
Signa.

Præcipue tamen contingunt in fœminarum mammis, quæ quia fungosæ & inanes, ideo materiâ promte excipiunt: sed in eas, tum e capite, tum ex utero facilis est decursus. Huius obscura sunt rudimenta, ac plerumque tumor exoritur ciceris magnitudine, cum dolore & calore, quasi ferientis candentis acus (ita hisce quoque diebus Haza Cæsareæ vulgo dictæ in mamma originem habuit) interdum etiam dolore multo: hinc fabæ, deinde iuglandis & oui magnitudinem æquat (ita & in eadem Haza seu Hester vetula muliere iam dicta admodum biliosa & melancholica excreverat) dum tandem in ampliorem molem attollatur & increseat. Vidimus sæpe totam mamam occupasse in tribus religiosi seu monachi, usque ad axillas, quæ omnes tandem misere vitam finierunt. Quum iam illius materia aut vetustate, aut errore vivendi, aut medicamenti incalescit, dolor calorque citra inflammationem vehementer exercet: pars conspiciue liuescit, aut nigricat, venæ in ambitu crasso nigroque sanguine turgent. Huius continens causa est bilis atra, sanguisue feruidus ac retorridus: sæpe ex suppressis menstruis, aut hæmorrhoidibus, nonnumquam ex quartana febre cumulat. Quo pigrior & ignavio humor est, hoc mitior cancerum infert: graviolem vero, quo is calidior acriorque fuerit. Sic cancer latens citra vlcus, secundum Gal. ab humore melancholico miti oritur: at exulceratur ab acriori & contumaciori fit, ut Galen. de atra bile & variis locis docuit. Ille non nisi irritatus excandescit, diu citra perniciem consistit, ut in vetula illa septuagenaria. Hic vero coerceri vix potest, quæ brevi exesalute se detegat, fiatque cancer exulceratur, ut postea eidem septuagenariæ tum domicellæ supradictæ evenit. Sed domicellæ propter irritationem, in qua & corruptæ carnis speciem tumor exhibebat, cum foetore & lordida illuvie, horrido aspectu (ut quum cancer exulceratus) labris præduris & inuervis. Ex quo & sanies tenuis, nigra aut fulva manabat: vapor enim cordi expiratur cerebroque grauis, febris assidua (ut Fernellius doctissime annotavit) eaque lenta inest; frequens animi defectio, quum præsertim cancer mammis inhæret: exesit sæpe venis sanguis profunditur (ut in domicella prædicta & monacha apud Clarissas) & nisi malignitate occyus interimat, longe lateque prorepat. Curatio clarior euadet exemplo subsequenti.

OBSERVATIO XXVII.

De cancro mammillæ per modum Consultationis.

1
M Alui hoc, quo vxor tua laborat, vir doctissime, cancer est, toti mammillæ inhærens, ut eam quoque apprehendisse videatur: qui licet nondum serpat procedendo, est tamen occultus & latens, quamvis sit tumor inæqualis liuescens & aspectu teter. Incepit autem per se (licet alias scirrho succedere soleat) quantum ex tua carissima vxore intelligere potui: licet primo exiguum locum tenuerit: nunc tantam in molem excreuit, ut totam mammillam occupauerit instar cancri animalis fluuialis (vnde nomen habet) cum in isto pedes ex v-

traque parte sint corporis, ita in hoc malo venæ op-pletæ, & in ambitu tense, pedes huius animalis representare videntur: vel quia adeo pertinaciter hærent loco, quem apprehendunt, ut cancer animal. Puto hoc malum ab atra bile originem traxisse, etiam a mensibus suppressis: nam præter id, quod menses suo tempore non debite fluxere, etiam vxor tua sterilis est, cum nunquam proles suscepit: supra modum etiam melancholica esse videtur. Et quamquam hoc malum per sui initia, priusquam in membro figitur, curari potest: tamen ubi in molem satis insignem attollitur, insanabile efficitur, nemoque illud sine manus opere curabit. Id ipsum autem accidit propter sui crassitiam: nam nec repelli nec discuti potest, nec totius corporis purgationi cedit: sed tanta eius vitii malignitas est, ut mitiora plane contemnat remedia: vehementioribus vero irritetur, excandescatque, atque efferetur. Præterea cum ipsa iam longo tempore vix sit optimis remediis per insignes medicos adhibitis; & sanguinis missione & purgatione, & parum medici iuuarint, vix sperandum est, quod curari possit medicamentis: neque etiam abscissione, cum iam molus locum occupauerit: quoniam si cum parvus esset, neque altas radices egisset ac abscindi posset, sectionem admittere noluit; certe nunc minus sectio est admittenda, cum nullum iuuamentum adferre potest. Sola igitur palliatione utendum: atque tribus scopis, primo humorem atrabilarium prohibendo, cum victu conuenienti & concoctu facili & sanguinem bonum generante, vitando carnibus gallinæ, caponis, hœdi, ouorum luteis, cremore hordei borag. buglos. malua, beta, atriplice, sero lactis, & piscibus saxatilibus; abstinendo a carnibus bubulis, salis, fumo induratis, ceruinis, leporinis, caseo, & ab omnibus cibis melancholicis & flatulentis. Secundo humorem genitum, & per totum corpus dispersum vacuabimus, prius eundem præparando cum syr. de fumo terre de pomis, de epith. de acetos. de bugloss. deinde euacuabimus, semper a lenioribus incipiendo, ut cum epithymo in sero lactis, syr. ex infus. ros. pallid. cum solus sena, postea cum elect. tenui. confect. hamech. diacath. Idque sensim & per intervalla. Et si medicis præsentibus visum est, menses euocabimus; etiam secti vena in talo. Tertio humorem, qui in particulam aff. etiam procubuit, digeremus, & particulam firmabimus, ne quid humoris redundantis ad eam confluat. Regerendi vel repellendi quod in fluxit, tempus accommodum est in principio, tam in ipso purgationis tempore, quam ante. Vbi vero totum corpus exquisite purgauerimus, tunc digeremus. Vbi poteris vng. de rutia seu pompholyge: & mihi videretur commodum, laminam illam plumbeam, quam diu gestauit, relinquere; quia virus e mamilla exhalat, ita ut breui ulcerabitur & aperietur: nam cancer hic magnus est satis, & videtur materia in eo satis collecta esse & putrefacta: satius itaque erit materiam exitum dare, & non retinere per laminam, aut materiam illam putrefactam ibidem relinquere: cuius habemus egregium exemplum apud Rondeletium: nam experientia (inquit ille) didicimus, materiam illam

5 illam grauissimos dolores inferre, qui post aper-
tionem mitigantur. Adde, quod ex dissectione
nouimus, thoracē repleri sero sanguineo, nimio
usu repellentium: quod superiori año 1553. mer-
catori cuidā euenit in Montagnac. ciuitate Gallie
Narbonensis; qui priusquam moreretur, labora-
uit magna anhelandi difficultate: nihil aut parum
exspuebat: tandem vita discessit, & in thorace re-
pertæ sunt seri amphoræ quatuor. Quod accidisse
puro propter laminam illam plumbeam, quam
semper gestabat, & medicamenta fortiter refrige-
rantia, & repellentia, quibus usus est, etiam post
suppurationem. Argumento est sanguinem re-
fudasse in pectus, quia tumor maximus erat, qui
detumuit & longeminor factus est post usum il-
lorum remediorum: & cum prius laboraret diffi-
cultate anhelandi, ab eo tempore difficulter an-
helauit, donec e vita decesserit. Serum illud erat
sanguineū, id est, videbatur sanguis paucus in se-
ro dissolutus, nec tale esse, quale reperitur in pe-
ritoneo & pericardio. Ideo chirurgus vel medi-
cus, qui vxori medetur, admonendus erit, vt a val-
de repellentibus & refrigerantibus abstineat. Au-
dio medicum apponere aquam cardui benedicti;
6 illa quidem non ita refrigerat & repellit. Non de-
sunt Neoterici, qui ad palliationē apponant her-
bam Roberti, scabiosam, charifolium, caprifoli-
um, taplum barbatum, puluerem stercoris hu-
mani, cum anetho. Nonnulli procedunt cum ap-
positione carniū gallinarum; propter quod
vulgares Lupum appellabant, eo quod cancer in
die gallinam vnā comedebat; quam si non co-
mederet, ægrum comedisset. Sed caro talis facile
putrescit, & putredinem, qua cancer vlceratus fa-
cile afficitur, auget; ita vt eiusmodi remedia
mulierularum, quæ & carnem crudam collo ap-
ponere iubent in dolore capitis, foetorem indu-
cendo, plus noxæ quam commodi adferant. Hæc
sunt, vir humanissime, quæ ad palliationem huius
mali, quo vxor tua laborat, valere putamus; quæ in
commune hoc tempore consulere volumus. Va-
le. *Raptum Delfis, 26. Iulii, anno 1585.*

SCHOLIA.

7 HÆ mulier Amstelredami habitabat; verum
non diu post, cancer hic exulcerat⁹ fuit, cum
tanto fœ ore, vt vix quis adesse potuerit, totam
mamillam occupans, ad axillas vq; ita vt post
duos deinde annos misere quoque vitam trahens
(vt postea mihi relatum fuit) tandem obierit. At
causā canceri vlcerati eadem est cum superiori, ex
humore atrabiliari, sed acriore, vt diximus; & ideo
exulcerat. Signa quoq; in hoc solummodo dif-
ferunt, quod in cancro vlcerato, præter dolorem,
duritiem tumoremque, vlcera erosa ac inæqua-
lia conspiciuntur, plurima ex parte sordida, labris
præumidis, aspectu horrenda, & concreta hu-
morum, colluue ingrata. Iisdem scopis & reme-
diis curatur, venæ sectione, purgatione humoris
atri acrioris; & in mulieribus, si menses desunt,
tali venæ incisione; vel menses euocentur. In viris
hæmorrhoides proritandæ, si modo eas pati con-
sueuerint. Locum laborantem firmabimus cum

supradictis topicis. Insigniter etiam leniunt, & so-
lantur plurimū in ipsis exacerbationibus, & cru-
ciatus tempore, malua aut althæa in mulso suba-
cta liquefactæ, & rosaceo paululo læuigata, in-
star cataplasmatibus illita. Quod ad abscissionem at-
tinet, modo paruus sit & altæ radices non gerat,
hæc ad chirurgiam pertinent: de quibus suo loco:
hoc tantum nunc admonito, quādo abscinditur,
oportet sectionem incipere a parte sterni proxi-
miore, procedendo ad superiorem partem, pro-
pterea quod venæ maiores vltimo loco sint ab-
scindenda. Nam coꝝ in sanguinis vtriusq; (*scilicet*
venarum & articularum) ægrum seu ægram & as-
sistentes perterret, & ægri seu ægræ vires deicit:
ideo oportet hoc modo incidere. Deinde cauteri-
is vel potius caustico medicamento constringen-
te (*vt nos in lithotomo Guilhelmo de Dalen vidimus*)
sanguinem sistere. Neque statim compescendus
est sanguis, propterea quod vtrumque infectus,
est euacuandus. At Rodolphus lithotomus, cum
nostro consilio mamillam cancrofam in Gher-
trude Nicolai exscinderet, quæ frustra causticis
remediis curabatur, ita vt denuo cancro mamilla
multo maior intumesceret vlcerato, cum acu filo
perducto, vt manu vna mamillam eleuare posset,
cum nouacula dextre abscindebat, venasque san-
guinem effundentes filo alter minister constringe-
bat; & radicitus cancro cum tota mamma ab-
scisso, mox restrictorium medicamentum appli-
cabat; postquam crassiorē sanguinem ex ipsis
venis expressisset, deinde aliorum vlcerum modo
curabat. Hæc autem mulier habitabat Delfis in
Elephante; quæ recte per abscissionem fuit cura-
ta: vti & altera mulier e Viana, me præsentē; & ter-
tia satis vetula. Hæc peritis chirurgis committen-
da. Cuius modum abscindendi apud alios aucto-
res, qui de tumoribus præter naturam scripserūt,
tum apud chirurgiæ scriptores inuenies, ita vt nō
opus sit hæc omnia hic commemorare: quamuis
ille modus exscindendi, quo Rodolphus supradic-
tus utebatur, præ ceteris mihi placebat.

OBSERVATIO XXVIII.

De fissuris papillarum.

1 PApillæ aliquando finduntur vel vlcerantur, vt
puerperæ & nutrices pueros præ ingenti dolo-
re sugere non permittant aut ferre possint. Sic A-
talix vxoris Hugonis Iacobi pharmacopolæ, pa-
pillarum fissuras habentis, oleo liliaceo, in quo
pul. tutiæ inmixtus esset papillæ inunctæ sunt, in-
sperso deinde puluere rutæ exiguo, & superimpo-
sito folio violaceo viridi, ne camisia adhereret:
quibus præsidis sana facta est. Vxori Ioānis Fore-
stii fratris mei, in puerperio æturgia canina inun-
cta sola profuit: & año sequenti etiam pomatum
albū. Sed & in alia usus suū feliciter vnguento ex
pul. tutiæ lotæ in aqua rosæ, & vng. rosæ simul mixtis.
Vxor Adriani pharmacopœi nostri, gummi tra-
gacantho dissoluto in aqua rosæ, adiecto exiguo torne-
sol, vt magis robeat, ad fissuram mellis solui-
to, inungebatur, & statim sanata est. Reunuit
hoc remedium in officina semper paratum; quo
etiam ad lichenes, vulgo Quarrworm, utebatur, Quarrworm.

2 magna cum experientia, vti & nos sæpius experti sumus. Commendatur præterea oleum de spermate ceti. si eo papillæ ulceratæ & fissæ inungantur. Bickerus quidam solo zaccharo papillis insperfo vxorem suam curauit, superimposita argentea capsula ad papillæ formam eleuata, ne camiliæ adhæreret: Zaccharum enim vim abstergendæ & mundificandæ habet: ideo vlcera leuia ac vulnera minuta, nequaquã eff. tu digna curat: post absterfionem natura ipsamet postea eadem consolidante. Ita & vulnera in manu cultello leuiter incisa solo zaccharo insperfo idem curabat: sed huius rationem ignorabat. quam eidem aperui, propter absterfionem hoc fieri. Sibi satisfactum dicebat.

S C H O L I A.

3 **A** Matus ad papillarum dolores & fissuras hoc vnguentum commendat cent. 6. curat. 38. *℥. vng. populei, vng. de plumbo, an. 3 j. opii thebaici gr. v. misce fac vnguentum, & eo inunge mamillarum papillas: quas cum mulier lac dare voluerit puero, vino diluto lauet: & postea iteret; est sane remediũ hoc certum & indubitatum. Aliud Petri Spinozæ quondam pharmacopœi nostri, nunc Dordraci agentis, quod in officina paratum erat, ad fissuras papillarum (& ideo a mulieribus vulgo vocatum Tepel salf.) valet etiam ad vlcera inueterata, tum crurum vlcera, & ad noli me tangere. *℥. lapid. calaminaris preparati* (scilicet in vrina pueri non polluti, igniti, & ter quaterq; extincti, & in polleinem seu puluerem subtilissimũ redacti) *3 iij. terra sigillata 3 j. olivani cerussa, terebinthina, cera, ana 3 j. mastice, aluminis vsti, olei ros. lini, an. 3 ℔ seu ouilli 3 ij. axungie porcine recentis seu infusa 3 ℔. vini Rhenensis 3 ℔. fiat vngu.* vt ait is est, vel ad formam emplastri; & super pannum lineũ ducatur, & papillis applicetur. Illa quoq; valent, quæ obseru. lib. 14. scripsimus vtilia esse ad fissuras labiorum. Sed illud hic minime prætereundum puto, quod labra infantum ex papillarum duritie & calore, subinde scindantur & fissuras incurrant: quas facile cum lana succo plantaginis minoris, butyro & adipe gallinaceo recenti inuoluta, & rimis indita percurabimus. Absc lutis mamillarum vitis, quidam hic annectunt, ea, quæ vitia alarum, & grauem odorem abolent. Ideo vnum exemplum addemus.*

OBSERVATIO XXIX.

De fœtore alarum.

1 **I** Vuenis quidam biliosus, cum alas & axillas fœtentes haberet, vt puellis fere ob odorem fœtidum exolus esset, huic consului, vt bile prius euacuata & contemperata, cypero cum oleo illineret axillas. Ad alarum enim vitia valent, & grauem odorem totius corporis abolent. Si vitio sanguinis est, Benedictus Veronensis lib. II. ca. 18. illum demere, inquit, prius necesse est, ac corpus perpurigare. Si bilis in vitio fuerit, eam perpurabis: in vtraq; causa humores tẽperabis. Graueolentiam abolet iris, scholimomq; per se, nam per vrinam effluit id vitium. Rosæ quoq; succus per se, oleumq; myrteum, seminis scœnugræci decoctum graueolentiam alarum emendat; nitrum quoque

ex aqua quotidiano fotu, virus earum tollit, & alumen; nam & sudores sedant. Aegineta has mixturas commendauit, *aluminis liquidi p. j. myrrha p. j. vino diluta illinantur.*

S C H O L I A.

2 **C** Aussa huius mali possunt esse procatartica, *Causa.*

Vt motus excedens, & labor, tempore calido, tarda vestitiũ mutatio, & coitus superfluus: Antecedentes sunt multitudo humorũ corruptorum in corpore. Gordonius etiã ab humore melancholico fieri putat, & corruptione propriæ substantiæ. Causas coniunctas ad vapores refert ab humorib. corruptis elatos. Axillæ in iuuenib. magis fœtent, quã in senibus, licet materia corrupta senes quoq; abundant; deficit tamẽ calor mouens: nam & iuuenes peioris sunt regiminis; & calor est fortis. Crassiores quoq; quia facile sudant, plurimũ fœtent. Sed cur febricitantium corpora in febribus putridis, in quibus mali sunt humores putridi, ita non fœtent? an quia calor febrilis vt hemẽs & fortis cõsumit illã putrefactionẽ, cum & fœtor cum febrili calore expellatur? neq; corruptio diu manet, sed incipit immedie cũ febre, & cum eadem cessat. Quod coitus superfluus fœtorẽ excitet, fit eo, quod materiẽ ad exteriora moueatur & exeat ad cutẽ vapor putridus. Præterea sciendum, quod coactio & non euentio vaporũ venientium ad axillas, inguina & pedes, iuuant multũ ad inferendum fœtorẽ: nam illi conuersi in sudorẽ, non euentantur. Is vero sudor corrumpitur, & facit fœtorẽ. Hinc pedes frequẽter propter sudorẽ retentum & inclusum neq; euaporatũ, emittunt fœtorem. Plurimis hoc vitium familiare est, quib. conuenit, vt caligis sepe mutant, & foccos lineos sepe induant & mutant, præcipue æstate; hoc enim tẽpore magis obnoxii sunt: pedesq; frequenter lauentur aqua decoct. nucũ & foliorũ cypressi. & aliarum rerũ atq; herbarũ aromaticarũ. Signis hic

Cur corpora febricitantium putrida febre non ita fœtent.

Quibus pedes fœtent.

Signa.

4 Prognostica.

Curatio.

non opus est, cũ satis innotescant (*sive in axillis sive in pedibus, sive in toto corpore*) per suas causas & effectus: cum & is, qui apud eos versetur facile odorẽ olidũ & fœtentẽ percipiat. Hanc quidẽ putredinẽ ex prog. 1. com. 16. Galenus non abhorret; cum & eandẽ laudet: tñ odor vehementis fœtoris, notat putrefactionem, & non maturationem. Idem dicit Gal. 3. prog. com. 22. *Axillarum fœtor & totius corporis per longũ tempus durans, sine manifesta causa, lapra præsignat*, iuxta Gordonium, & Gerardũ Cremonensem super Viaticũ. Curantur fœtores humoribus prius pparatis & expurgatis, vel venæ sectione, si opus est. Deinde confert vti balneis, decoct. herbarũ odoriferarum, vt sylimbrii, melissæ, lauan. rad. ireos, & similiũ. Et in exitu balnei axillæ, tũ totũ corpus, lauari poterunt hoc decocto. *℥. anisi, cumini, ros. rub. an. 3 ij. cyperi, spicanar. schœnan. an. 3 ij. rad. ireos sicc. pul. 3 j. fiat decoct. in q. lb. aqu.* Poterit & camisia in eodẽ decocto lauari, & demũ exsiccata indui, iisdem, tum vestibus sepe mutatis. Reliqua vide apud Bened. Veron. loco citato, & apud Paulũ. Nũc tempestiuũ est, vt hoc finito libro, ad ventriculi affectũ transcamus.

Finis Libri decimi septimi.

Liber

LIBER DECIMVS OCTAVVS, DE STOMACHI ET VENTRICULI AFFECTIBUS.

OBSERVATIO I.

De oris ventriculi inflammatione.



Vibis os ventriculi inflammatur, in maximum dolorem, ob eius exactiorem sensum, incidunt: quibus & vrina rubra est: sitiunt, & febre continua affliguntur: ut cui-dam euenit. Huic statim clysterem emollientem & detergentem, cum aluum non redderet, iniiciendum esse consulimus: & ut aluo soluta sanguis statim ex vena interna, plenitudine apparente, mitteretur: cautione tamen adhibita, ne plus sanguinis euacuaretur, quam opus esset: solet enim hunc affectum syncope & virium imbecillitas, ob vehementem dolorem, sæpe subsequi. Et ideo in sanguinis missione hic summa cautio adhibenda est. Nam præcipuus scopus est in eo remediigenere, virium robur. Mox a venæ sectione, ad dolorem sedandum, hoc vel simile cataplasma applicandum esse duximus: *℞ farina hordei ℥ vi. florum chamomilla, meliloti, ros. rub. ana p. s. sem. coriand. santal. omnium ana ℥ ij. spica ℥ s. olei ros. ℥ iij. olei chamomillini, cotoneorum ana ℥ s. misce, fiat cataplasma.* Interea mandauimus, ut subinde syrupos caperet, eosque prius adstringentes, quales sunt syrup. cotoneor. de agresta, ex ros. siccis, in progressu vero hos vel similes: *℞ syrup. viol. nymphae, portulacæ, end. ana ℥ j. aqua ros. cichorii, end. ana ℥ iij. s. aqua menthae ℥ s. misce.* Cathartica per os sumta hic minus conueniunt; quia ad affectam partem trahunt. Sed post doloris sedationem, sola cassia cum pauco rhab. satis est: quæ etiam hic, tum in aliis, commode vsumus: etiam confectionibus cordialibus, circa initia hoc modo vel simili, conseruæ rosar. & aliorum adstringentium dosim augentes, & violarum magis minuentes: ut, *℞ conseruæ viol. buglossæ ana ℥ j. conseru. rosæ. ℥ s. corticum citri conditi ℥ iij. pul. diamargariti frigidi ℥ j. diarod. abb. ℥ s. coralli rub. ℥ j. manus Christi perlata ℥ iij. cum syrup. cotoneorum, fiat conditum.* Pro siti quoque egregie profuit rob de ribes, & conser. foliorum acetosæ, & cerasæ amarella dicta, & lactuca condita; quibus & in feb. continuis ad sitim feliciter utimur, ut in libris nostris De febribus cernere licet. In fine etiam tabulistrionsant. commode utebatur. His & similibus remediis hic conualuit: & alii similiter sanitatem consequuntur. Deo iuante. Interea hic magna diligentia opus est, cum malum sit periculolum, & minime contemnendum.

SCHOLIA.

Similibus quoque affectibus os ventriculi, ut œsophagus (de quibus diximus libr. 15. scholio obs. 31. 32.) tentatur, ut doctissimus Fernelius dicebat: quos & iisdem licet notis deprehendere. Præterea vero & mentis alienatio accedit, ob eos neruos, quos e sexta coniugatione suscipit. Mulie-

rem vidi (inquit) grauidam, cui tuberculo duro eoque ingenti ita os ventriculi obturabatur, ut quicquid indebatur, attracto ventriculi ore, mox remearet atque redderetur. Sic astantium omnium indicio nihil cibi potusve bimestri vel conatu maximo ea vorauit. Tandem morbo, desipientia febreque confecta decessit, edito partu, quem vitæ superstitem reliquit. Affectus enim ventriculi (ut interpres Hollerij summam enumerat) in œsophago, stomacho, siue orificio, fundo, tunicis, pyloro infiniti prope reperiuntur; tanto periculosiore, quanto coctio & distributio, cibi magis necessaria vniuerso corpori. Quales sunt intemperies omnis generis, tumores præter naturam, obstructions, defluxiones, excrementa illic collecta vel nata, vel aliunde immissa, cibis intempestius, nimis, biliosus, deiecta appetentia, nausea, vomitus, humores in tunicis infarcti, aut in fundo fluitantes, inflammatio, inflatio, dolor, exulceratio a causa interna, ut humore acri, pharmaco, cibo, osse acuto, præcedente abscessu, erosio: fames canina, immoderata sitis; & similes, quorum signa, causas, remedia explicare maioris est operis. Multa ex Galeno colligi possunt 3. & 6. De morb. & sympt. 5. De loc. affect. de sanit. tuenda. 7. Methodi. Signa ex Arte parua desumuntur. 8. *ἡ γὰρ τὸ πῶς* describit stomachicos, contra Andromachum, qui stomachicas confectiones sine discrimine scripserat prodesse stomachicis. Quod & vulgo hodie etiam empirici faciunt. Nos de singulis exempla quædam adferemus, certa & verâ methodo curationem instituentes.

OBSERVATIO II.

De ventriculi imbecillitate, ex intemperie frigida & humida; cui postea etiam materia pituitosa accessit.

I Vuenis, annos circiter viginti natus admodum studiosus, & doctus, Guilelmus Cripus Haganus, cum longo tempore valetudinarius fuisset, in ventriculi imbecillitatem lapsus est, ex intemperie frigida & humida: quam sitis nulla vel exigua, acidique ructus, & saliuæ copia comitabantur: & humiditatem aliquando vomitus subsequabatur, sine vlllo magno dolore, post horam vnam a sumto cibo: ita ut tandem ventriculus ex nuda primum intemperie adeo imbecillis facile humores pituitosos receperit, qui eo confluxerunt: ita ut non tantum nuda intemperies morbum constitueret, sed & humor pituitosus: ideo & vomitus pituitæ sine dolore, & etiam sub finem vomitus cibis, qui reiciebatur, subacidum quid sapiebat: ad frigidum enim ventriculum, iuxta Galenum, proprie acidus rectus refertur. Ad erat similiter inflatio quædam & ventriculi durities, ob flatulentos humores & frigidos, in fundo ventriculi magis hærentes. Quibus autem remediis hic sanitatem consequeretur, me consuluit. Huic igitur præscripsi cibos faciles bonique succi, utque a uibus montanis, cuniculis, assis que potius quam elixis vteretur. Concessi vinum medicatum ex absinthio; & cereuisiam absinthii-

tem, cappares, diacydonium, cum speciebus. Et ubi ad vomitum proclius esset, vt exiguum decoct. hordei, cum raphano, pauco adiecto oxymelite, debite biberet: & vt pro præparatione, decocta menthæ, absinthii vtriusque sumeret; adiecto syr. menthaceo, cotoneorum, & absinthii. Et vt subinde cum pilulis leuioribus expurgaretur; vt alexhanginis, ex hiera simplici, vel mastichinis. Deinde, vt vteretur elect. arom. ros. diatrion piperon, diacalamenihio. Et, vt stomachum inungeret oleo nardino, mastichino, maceris, pauca adiecta cera: & emplastrum ex mastiche stomacho apponeret; & vt subinde vinum generosum sumeret. Quibus remediis hic optime habuit: vt alius iuuenis licentiatuſ iuris studiosus (nam studiosi magna ex parte stomachum imbecillem habent, quæ imbecillitas plerumque iis adhæret, vt vmbra corpori: ad quam plerumque consequuntur ciborum cruditas, ructus acidus, nausæ, vomitus, fastidium) qui præter imbecillitatem ex diuturnitate mali natam, multam pituitam in ventriculo humido & frigido collectam habebat: cui & oxymel sæpe lambendum dedi, & mel rosa. modo cum decocto absinthii: tandem & pilulas mastichinas ad 3 j. postea triplicata purgatione per hieram picram Galeni, assiduo potu vini absinthii, & subinde assumpto syr. menthaceo, & aromatico ros. & stomacho exterius roborato cum cerato stomachico Gale. & mastiche, adiecto exiguo croco & cinnamomo, ac rad. cyperi, & oleo absinth. tandem hic, tum alii plurimi, vt frater meus Theodorus Forestus, sanitatem adeptus est. Et alii quoque haud pauci conualescentes, imbecillitate stomachi laborantes, prius aliquando hiera purgati.

S C H O L I A.

Imbecillitas stomachi seu ventriculi, fit multis de causis, non solum studiosis, vt istis duobus euenit; verum & conualescentibus, & aliquando sanis. Conualescentibus, vero frequens est: magis etiam ab imperfecta crisi; in quo reuocanda sententia Hippocratis: Si a morbo cibum assumens quis non corroboratur, largiori alimento corpus vti significatur. Quod si non assumenti cibum hoc accadat, scire oportet, quod indiget euacuatione. Conualescentes a morbo aliquando multum appetunt, ob extenuationem membrorum, non solum ab inanitione spiritus & humoris, balneo, profluuiio (quod & interpres Hollerius recte animaduertit, & nos in praxi quotidiana sæpius vidimus) sudoribus quoque & insensibili perspiratione, colliuatione, & similibus; sed etiam a ieiunio, inopia alimenti, calore languescente, vt flamma quæ in elychnio insita, ab oleo & aere fomitem & pabulum sumit. Aliquando vero appetentiam habent deiectam, ob vitiosos humores relictos. Vtrique sæpe, nisi accurate tractentur, in recidiuum incidunt. Priores quidem, quia cum extenuata membra multum appetant, non tamen sumta conficere potest imbecillus calor. Nota est enim historia multorum, qui a longa inedia sese repleuerant, adeo, vt inde suffocati fuerint: vt nos

cognouimus nostro tempore, tam in obsidione Harlemensi, quam Leydana præcipue contigisse; quando obsidione liberati ciues victu plenius se replentes mortem quam plurimi incurrerunt. Posteriores vero, quia reliquias morbi tandem natura stimulata aggredi cogitur. Quanto enim plus nutriuntur, tanto magis læduntur: donec accrescente malo, morbus repetit. Hi igitur curantur vacuatione, vt docet Gal. De sang. miss. contra Erasistratum, & historia 6. Epide. Illis vero remedia sunt, rerum non naturalium commoderatio, labor, cibus, potus, somnus, Venus, omnia mediocria: deinde longo tempore substantiæ reparatio per alimenta pauca, bene nutrientia, facilia coctum, sæpius exhibita. Nam pauca non sufficiunt, nimia non coquantur. In conualescentibus ergo, quibus reddita est appetentia, imbecillitas ventriculi non potest tantum concoquere vel conficere, quantum appetit. Modica itaque quantitate, sed breuibus interval-
6
lis, cibi boni succi & qui facile coquantur, reficiendi sunt. In aliis, quibus appetentia non redditur, reliquæ morbi in causa sunt: quæ optime vel rhubar. vel hiera picra, ex decocto cicerum aut absinthii, repurgantur. Sed de conualescentibus satis diximus, & exempla posuimus de febricitantibus: at nunc loquimur potissimum de sanis; in quibus imbecillitas est vel a sola temperie. Ventriculus enim varios morbos patitur, & symptomata varia, quæ a diuersis morbis nascuntur. Morbi autem sunt, intemperies calida frigida, humida & sicca; sine materia, vel cum materia; eaque pituitosa, biliosa, vel melancholica. Quare, si quis velit symptomatis occurrere, morbos agnoscat oportet; quod ex dolore, functione læsa, & aluicrementis dignoscetur. Difficilius vero dignoscuntur, quam curantur. Intemperaturæ sine materia raro fiunt: quod si fiant, diu sine ea esse non possunt, vt ostendimus in istis duobus iuuenibus. Nam omnis intemperies ventriculi nata est coctionem impedire. Quod si frigida intemperies vel sicca præsens sit, cruditatem faciunt, a qua multa pituita afferuatur in ventriculo. Si calida vel cibos vrit vel corrumpit, vel aliam cruditatem facit. At frigida indicia sunt frigoris sensus in parte infirma, nulla saluatio, aliquando multi ructus acidi: quos & sequitur appetentia & coctionis tarditas. Cui valent vina generosa & antiqua, præsumpta duabus aut tribus horis ante pastum, vinum Hippocraticum dictum, vel cui addita sint piperis grana aliquot, confer. aro. ros. diagal. diacinaomum, rosata nouella, plirissarcot. diamos. diambra, diatrion piperon, diospoliticum: quæ & calfaciunt, & ventriculo grata sunt. In tabulis vel opiatis, confer. anthos. steechad. & superbibant aquam menthæ abs. hyssopi, cum vino generoso, syr. de mentha, de absinth. hic conferunt, propter caliditatem & adstrictionem, quæ grata est huic parti & necessaria. Calidæ signa sunt, æstus in medio corpore, sitis assidua, lingua arida, iactatio corporis, a cibo nidorosi ructus; licet sitis magis siccitatem notet. Val. ut refriger. opiata, ex confer. viol. ros. flor. cichor. trisonan. diamar. frig. diatrion acant. frig.

Intemperies
sola diu ex-
sistere non
potest.

Frigida si-
gna eiusque
curatio.

Calida si-
gna & curatio.

Humida.

8

Sicca.

10

lactuca condita, & carnes cucurbitæ conditæ, quæ refrigerant, ventriculo & palato gratissima sunt: abluantur aqua frigida; & per duas horas ante pastum dentur; superbibendo parum aquæ: & fiat hæc vel similis opiata: *℞ conf. ros. ʒj. conf. flor. cucub. nenuph. ana ʒss. pul. trionj. ʒij. diatr. frig. ʒj. ʒss. diamar. frig. ʒj. conf. viol. ʒij. cum syr. end. simpl. fiat* opiata vel conditum. Humida vero intemperies fluctuationem & sitis inappetentiam, & coctionis tarditatem facit. Curatur facilius sicca intemperie; quia partes humidæ facilius vim medicamentorum suscipiunt quam siccæ: sicca enim propterea quod partes conciderunt & densiores factæ sunt, non facile (*ut dicebat Rondeletius*) cedunt medicamentis. Adde, quod medicamenta humida, non multum agunt, neque multum resistunt. Corabitur igitur humida intemperies, inedia, ut victu tenuiore aut exsiccante abstineat a multo potu vini diluti; & potius generoso meraciori utatur; vel posca, vel osymelite, hydromelite parum coctis, & multum dilutis, ut magis detergant & minus nutriant. Abstineant a iusculis: utantur carnibus & piscibus salsis, pane biscocto, cum multo sale. Rondeletius commendat cineres viperarum: valet pul. galangæ, cinamomi, piperis, & cineres hirundinum, conferva acori, saluæ, anthos, & vinum antiquum, cum aqua absinthii, ceratum massicis, & alia, ut apud Rondeletium viderelicet. In sicca intemperie tarda etiam fit concoctio, adest lingua siccatas, corporis extenuatio, saluæ paucitas, sitisque vehementissima. Intemperies sicca omnium difficilime curatur, ut omnes alii morbi: quæ enim consummata est, insanabilis existit; sed quæ sanari potest, curatur usu lactis, quia humectat & nutrit; & balneo: & statim a balneo, oleo dulci inungendum; & in lectulo a balneo, ubi quieuerit, lac propinandum; de quibus diximus lib. 4. De feb. hecticis: de quibus etiam vide ad longum lacchinum doctissimum, supra Rhaf. cap. 43. De affectibus stomachi, a quibus vitiatur concoctio. Habes ibidem egregia ad omnem intemperiem conferentia, tam sine materia quam cum materia; quæ etiam ad causam, signa, & curationem spectant, de imbecillitate stomachi, & ibi historiam egregiam ponit, se eiusmodi affectum curasse ex nimia circa ventrem diligentia in parco victu, & sæpe longa abstinentia, medicamentis ad roborandum ventrem datis: ac profecto eo deueniat, ut mortuum deambulare credidisses. Sed & ex vacuatione talis euaserat, quod senex iam & gracilis iuenculam duxerat: hoc autem maxime corpus siccat, curatus autem est iisdem præsidiiis, quæ Galenus ponit; id est victu humectante. His valent vinum dilutum non antiquum; iuscula pingua ex capis, gallinis, carnibus vituli lactantis, hœdi, adiecto vino exiguo, ad faciliorem distributionem, & concoctionem: cremor ptisanæ, cum oleo amygd. dul. lactuca, violis, borag. in iusculis decoctis, inunctiones ex oleo viol. amygd. dul. adiecta axung. gallinæ, pro linimentis, lactucæ conditæ, cucurbitæ carnes conditæ, conf. viol. & similia, vel si olea dicta ni-

mis relaxant, adde parum olei ros. cotoneorum; & tempore inunctionis guttas vini ad penetrationem. Si compositæ fuerint, signa utriusque posita coniungenda. Verum si intemperies fuerit cum materia, copiam vitiosorum humorum nausea, vomitus, grauitas ventriculi, & ructus potissimum a cibo ostendunt. Ideo videndum quomodo adesse materiam distinguamus. Primum ergo materiam frigidam adesse flatus monstrat, qui etiam sine cibi assumptione sentiuntur. Secundo percepta grauitas quædam & angor, præsertim si os ventris opprimant valde sensibile. Tertio grauitas capitis, & dormitatio: præsertim si cruda pituita sit; a qua etiam appetentia tollitur, ut Galen. lib. De plenitud. ad finem testatur: *℞ ʒ. de usu partium ad principium*, quod scilicet opprimant & granent. Contra acida, quæ tenuis est, appetentiam facit, ut de canino appetitu dicemus: quod si nauseet vel vomat, erit apertum. Pituita quoque nullam prorsus ventriculi erosionem excitabit, nisi salsa fuerit: hinc & acidi ructus, nulla sitis, tensioque ventriculi adsunt. Quod si flaua bilis, & nausea & vomitus accidunt, & tristitia & morfus; & iracundi fiunt; aperitur eius qualitas per vomitum, caput vero dolet; vel somnos turbatos efficit & breues; & sapor amarus sentitur, præsertim si plusculum ieiunauerunt. Hippoc. 2. De vit. Et sic si atra bilis abundet, tristitia metusque, ructus & excreationes foetidæ, piscisque olentis, somnus cum accessione imaginationum alienarum, contractioque & dolor poplitum & surarum. Sed num in ipso gignantur, aut aliunde influant, apparet primo Deloc. 4. & 2. de tempera-

II
Copia humorum.

Signa frigida materia.

Pituita cruda.

Acida

12
Flaua bilis.

Atra bilis.

Num in ipso ventriculo gignantur aut aliunde influant humores.

OBSERVATIO III.

De imbecillitate ventriculi ex laxitate & mollitie, in quo pituita postea coacervata fuit.

Scribit Rondeletius, ventriculi aliquando imbecillitatem fieri ex partis mollitie & nimia laxitate, citra intemperiem aliam, vel citra materiam; ut ipse colligit ex Galeni verbis i. ad Glauconem: ubi ait, syncopen fieri ab imbecillitate ventriculi; quam solis curat adstringentibus appositis supra ventriculum, quam affectionem fieri autumat Rondeletius post multas comestiones, quæ ventriculum multum distenderunt; aut quia ventriculus suapte natura est magis laxus, aut maior quam oporteat; & quia usus est æger nimis relaxantibus. Omnes istæ causæ distentionem ventriculi faciunt; quæ facit ut minus bene cibos am-

plectatur: quod si non facit, non bene concoquit. Apponenda igitur medicamenta primis qualitatibus temperata & adstringentia. Quod si minus profint, sunt augenda frigida adstringentia, quia magis adstringunt quam calida, & ad intra repellendo calorem excitare possunt. Post cibum assumenda, quæ per partem superiorem ventriculi possunt constringere, ut sunt pul. adstringentes, ex ros. cinamomo, cort. cyperi, corallo & aliis. Sed quia ventriculi in frigidatio magis periculosa est, calida etiam adiungenda, ut galanga. Sic nuper puella laxitate ventriculi laborabat: cui a cibo præscripsi cotonea mala, pyra cocta, vel condita, & extrinsecus cum oleo myrteo, cotoneor. & absinthii, ventriculum inungebam. Verum cum eiusmodi ventriculus laxus imbecillis non diu sine coacervatione materiæ persistere posset, uti huic puellæ euenit, pituita coacervata est in ventriculo, ut intemperies materialis accesserit, quæ non aliunde pendebat: quæ plerumque frigida & humida est: nam generatio humorum plerumque attinet pituitæ, lib. De atra bile, & De facult. naturalibus. fit enim ex cibis, qui ob frigiditatem & humiditatem, caloris ventris frustrantur actionem: præsertim si natura venter sit debilis. Erat autem hæc pituita in spatio ventris, non autem infixæ tunicis inhærens; eratque pituita aliquantulum crassa. Ideo oxymel simplex, postea & scyllinum dedi, deinde ut vomitu leuiter pituitam expelleret, consului ut acciperet mulsa potum cum oxymelite, eo quod pituita minus contumax esset, alioqui deuenissem ad decoctum raphani. Postea exhibui syrupos magis incidentes, & exsiccantes, & roborantes, syr. acetos. compos. & syr. de byzantiis: & purgaui cum pilulis mastichinis, & alephanginis & stomachicis ana ʒj. cum syr. menthaceo; fiebant pilule viij. Deinde viusum iisdem remediis, quæ diximus conferre ad intemperiem frigidam & humidam: nempe calida & sicca, ut sunt aromata omnia, intro assumpta & extra; ceratum ex mastiche & speciebus aromaticis. Adhibui quoque sacculos, & fomenta ex absinthio, mentha, schœnantho, rhad. cyperi, & caryophyllis composita; cauendo hypochondria: usus sum & diatrion pipereo, ex mente Galeni: quia hæc puella subinde extensionem ventriculi percipiebat, ex flatu. Talibus enim flatibus gigni solent, & succedere: unde duplici ratione concoctio vitatur, tam ex intemperie, quam ex mala cibi comprehensione. Huc enim facit historia illius, qui post horas quatuor cibum euomebat, ob flatum: ut etiam eueniebat fratri meo Theodoro Foresto. Ideo diacyminum exhibui subinde, carnibus assis & aromatibus conditis utebar, vino generoso aliquando, prout sumtus ferre posset: alioqui ceruissiam absinthitem concessi. Utimur & oleo anisi. Quidam pro arcano habent (ut Matthæus de Gradi refert cap. de dolore & apostemate stomachi) ad consumendum ventositatem ʒj. aquæ vitæ. Sed considerandum nunquid adsit caliditas hepatis vel renum: tum enim valde suspecta est. Noui ego studiosum quendam Louanii,

cum ibi adhuc studerem, qui omni mane pro humido & frigido ac debelli stomacho utebatur aqua vitæ, licet admodum pauca; ita ut tandem maximam ventriculi siccitatem incurrerit, & vena hepatis calorem: ut vix tandem corrigi potuerit.

S C H O L I A.

PRimum vero in sananda intemperie, quam humoraliquis in ventriculo collectus fouet (quæ etiam frequentissima est, ut diximus) videbimus an ex ipsa ventris intemperie & frequenti cruditate sit acervatus: ita ut venter ipsi sibi malum foueat. Hanc autem materiam plerumque frigidam & humidam esse constat. Sit ergo primum pituita in ventre; si crassior, in spatio ventris; altera inhæret tunicæ affixa, viscidorum modo. Sint & tenuiore irrigatæ & madidæ ventris tunicæ, unde & intemperatæ sunt. Hæc ergo omnia simul iungi possunt. Ideo a prima causâ ordiendâ curatio; hoc est, a vacuandis humoribus, qui in spatio ventris continentur, qui si contumaces fuerint, Galenus adhibet, oxymel aut scylliticum; & si æger nauseabundus ad vomitum, per vomitum educit, cum mulsa & oxymelite, ut nunc diximus, aut cum decocto raphani. Id bis facere utile est, si tunicis humores infixi, cum hiera expurgatæ; cuius hæc magna est utilitas: ut & aloes, licet bilem purgat; etiam pituitam, ob species admixtas in hiera. Quod si bilis sit in causâ (prius dictum est quis nam bilis modus in ventre gignatur) statim expellenda erit; quia facilis suapte natura est, ut expellatur. Est enim venenosa, syncopen faciens, & per consensum conuulsionem. Expelletur vero vomitu quod potest: quod si quid inhæsit, per hieram; exhibendo, non ut prius solam, vel ex vino, vel aliquo decocto extenuante, scilicet ex aqua. Ventriculi itaque intemperies calida, frigida, humida, sicca, cum materia, eodem, quo supra, modo curatur; nisi quod frequentius utimur pilulis, vel pulueribus laxantibus humores redundantes; qui magna ex parte sunt, bilis pituita, & aliquando melancholicæ, sed rato. Euacuantur autem vomitu, si nihil prohibeat, ut affectus thoracis, aut corporis constitutio. A cibo facilius est vomitus: ante cibum plus materiæ euacuatur. Si bilis vacuanda, post iuscula multa, vel post potationem liberaliorem prouocandus est vomitus. Nam bilis, ut oleum his supernatat, & ob id facilius euacuatur. Adde quod acrimonia eius temperatur mixtione harum potionum. Datur syr. viol. cum aqua tepida, vel iusculum pingue sine sale, aut decoctum betæ, cum oleo viol. vel cornu, vel amygd. Si autem pituita euacuanda sit, mane ante cibum euacuetur: quia pituita semper est in maiori quantitate, quam bilis; & in fundo ventriculi magis hæret: ob id vomenda ante cibum, vel si lenta sit & nimis hæreat, syr. acetos. simpl. dilutus aqua vel decoct. betarum vel parum agarici, vel asari, propinandum erit; prius relaxata regione ventriculi, oleo liliorum, vel amygd. inuncto, aut immisso digito, aut penna oleo intincta. Quod si fiat post corporis agitationem, vel frictio-

5

De pituita.

6

De bile.

Curatio in
intemperie
cum mate-
ria.

7

Vomitus
biliosus.Vomitus pi-
tuita.

frictionem super ventriculum in gyrum, facilius & plus voment. Pituita pilul. de aro. aut de hiera cum agar. euacuanda, sine aliquibus adstringentibus. Bilis autē rhab. infuso, syr. ros. & aliis mitiorib. purgantibus bilem. Lenissima medicamenta ob duas rationes sunt usurpanda; tum quia materia e longinquo non est vacuanda; tum quia ventriculus non est vexandus fortioribus: clysteres ad id multum faciunt: sed acres esse oportet. Humore autem cognoscere ex supradictis, & ex oris sapore; amarus bilem puram notat: salus bilem & pituitam permixtam; acidus pituitam & atram bilem: insipidus pituitam aqueam, vel dulcem; id melius deprehenditur ex vomitu. Atram bilem commodissime euacuabitur decocto polypod. vel senæ, vel epithymo decocto in iure galli antiqui, vel pulli, vel decocto mercurialis. Syrupi ad concoctionem vel alterationem sufficiunt: ad bilem *end. simpl. vel absinthii cum aqua end. vel cum syr. de cichor. sine rhab. aut cum rhab. vel cum syr. ex infus. ros.* si volumus euacuare bilemque detergere. Syr. ad pituitam valent, *hydromel, cremor hordei, cum melle, aut oxymelite.* Incidentes magis sunt syrup. acetosi compositi, & de byzantiis, qui leuiter incidunt, attenuant & detergunt. At si materia aliunde influit, tunc intentio esse debet, toti prospicere, vel parti, si pars sit. Si tamen vrget, vt syncopen morfu adferat, relicta prima causa, hunc affectum tollemus, donec affectus mitigetur; interim causa non neglecta. Ita incopia crudorum humorum 12. mel. horret purgationes: sed eas curat frictionibus & inedia; & optimum erit semper reuellere humores ad contraria, & deriuare fluxiones ad alias partes, vt ad infernam aluum clysmatis; ad urinam, post extenuantium usum. Causam non negligemus, vt in pituita inedia imperando, potum exiguum, cibos siccos, calidos, & reliqua quæ pituitæ generanda sunt contraria, alioqui si parati sunt humores, postea leuiter purgabimus cum hiera, quæ a longinquis aut remotis non attrahat. A sanguine melancholico si oriatur, & si is sanguis in toto abundat, Galenus sanguinem mittit, cum nec facile corrigi possit, nec absumi præ crassitie. Si fluxio biliosa, purgabitur similiter in stomacho, primo vomitu, mox absinthii decocto, vel hiera. Quoniam vero venter est qui recipit, non debent præter suas horas hia cibo abstinere, cum præsertim non soleant famescere. Vnde præceptum illud Auicennæ (*vt recte dixit Iacchinus doctissimus*) suspectum est, quod ad cibum fames expectanda sit. In cibo vero oportet præcedere leniens aliquod semper, mox sequi quæ roborant adstringendo: & vinum adstringens sit, album, tenue, vt per urinas bilem expurget. Patet autem quod vniuersa victus ratio esse debet, quæ biliosa excrementa non generet, id est, frigida & humida, in cibis, balneo, somno, quiete: quæ omnia vno aphorismo comprehendit Hipp. 6. Epid. In calida natura, refrigeratio, aquæ potio, quies. Sic vero & temperabitur bilis, & quæ circa secur est, per intestina repurgabitur. Num vero purgantibus instandum sit, dubitatur: credunt alii quod non, nisi lenientibus, vt natura bi-

lem traducere assuescat per loca consueta; dum corporis malus habitus corrigatur. Quod si influxus bilis in ventrem sit naturalis, vt ex portione pori fellei ad ventrem tendente: quem errore naturæ in quibusdam maiorem esse contingit, quam oporteat; malum est incurabile. At si pituita a capite descendat (& est casus, qui crebro euenit, Florentiæ præsertim, vt asserbat Iacchinus; magis tamen apud nos Batauos & Hollandos; ratione regionis) ipsi prouidere oportet, postquam venter melius habuerit: etenim humoribus in ventriculo collapsis & expurgatis, post derelictam malam membri intemperiem, ipsum roborando, ne facile recipiat, ipsi capiti quoque tanquam membro mandati prouidere oportet, postquam venter melius habuerit. Propria vero capitis prouidentia erit per contrariam intemperiem. Quoniam vero multa pituitosa excrementa generat, erit exempli gratia, intemperies eius frigida & humida. caput igitur calefaciemus & siccabimus. Sic enim & alimentum bene concoquet; vnde nec ex alimento pituitam generabit, & quæ ab inferiore susceperit excrementa, expurgabit per insensiles transpiratus, & etiam per sensiles vias: neque etiam promte suscipiet ea, iam firmatum. At qualis prouidentia capiti frigido & humido debeatur, dictum est de morbis cap. Capita vero eorū sunt, vt si adest multitudo pituitæ, vacuetur, si est communis toti, per totius prouidentiam: si partis solum per notas vias, per quas caput purgatur; per nares inquam, & os, & insensilem transpirationem, & per ea quæ calore & siccitate siccant, cum noctu assument. Si vero melancholicus est humor, si totius vitio, dictum est supra quomodo prospiciendum: si partis, vt lienis, quoniam male affectus, humorem melancholicum expurgabimus, eodem modo, vt dictum est; & victum instituemus, quo maxime eius succi generatio euitetur: & lienis affectum curabimus.

OBSERVATIO IV.

De Cardialgia, seu oris ventriculi dolore, cum quodam morfu, cui bilis vomitus subsequeretur.

FRater meus charissimus Nannius Forestus, si aliquo vehementi exercitio vteretur fatigatus, vel ieiuniū paulo diutius toleraret, & præsertim cum curru veheretur, iunioris biliosus, in cardialgiā aliquando incidebat, seu oris ventriculi dolorem, cum morfu & erosione bilis, vomitu erodente subsequente, ita vt syncope facile apprehenderetur, cum os ventriculi valde sensile haberet. Huic panem ex vino albo tenui frigidoque ac diluto vt caperet consulebam; tum succum mali punici acidi: cui & lactucam cum aceto concedebam, pullosque gallinaceos, & perdices, cum omphacio & succo limonum. Sic Hippocrates libr. 2. vulg. mulieri cui os ventriculi dolebat, & nihil remittebat dolor, polentæ pollinem in mali punici succi inspersum, semel in die in cibo tribuens, ipsam curauit: & non remouebat, vt ipse inquit. Et quia ad vomitum pronus esset frater ex natura, confestim vbi bilis roderet, syrupo ace-

8
Clysteres.

Ad atram
bilem.

9
Si materia
aliunde influit
quid agendum.

10

II
Pituita a capite in ventrem descendenti quomodo prouidendum.

Capiti frigido & humido quomodo prouidendum.

12

2 toso vel oxyzacch. cum aqua sumta facile vomebat: alioqui ubi syncopen metneret, micam panis mediocriter torrefactam maceratam in vino austero tenui & albo, & demum fortiter expressam sumebat: huius vini singulis tribus horis ut caperet ζij . iubebam, idque frigide; donec pulsus robustior fieret. Propterea iussi, cum non facile afficeretur cardialgia, ex ieiunio, ut non tarde sed citius cibum caperet, & ut ieiunium vitaret. Et quia ex natura melancholicus esset, & facile ex mœrore flaua bilis in ventriculum conflueret, & vehementi exercitatione, & præsertim motione currus idem pateretur, præcepi ut mœrorem & vehementiorem exercitationem & vectationes in curru vitaret; & ut continuo apud se pyxidem conferret consului, in qua rosæ rubræ & myrtilli ac santali pulueres cum aqua ros. & vino odorifero aspersi, inclusi essent; vel spōgia hoc odoramento (quo Celsus vititur, liquido immersa & pyxidi inclusa, ex rosa. & vino aut aqua ros. & myrtill. ana ζiij . vini odoriferi ζij . santalorum ζij . & fiat odoramentum: vel huius æmulum medicamentum ut conficeretur utile duxi,

S C H O L I A.

3 **K**αρδιαλγία, ut Altimarus ostendit, perpetuo affectus est oris ventriculi, eiusque infestum symptoma a succis mordētib. eueniēs: καρδιαλγία vero interim, non oris ventriculi, sed eius visceris, quod in thorace continetur, est affectus. Cardiacus quoque perpetuo oris ventriculi morbus, sed cum febre, eaque acuta; qua etiam ratione differt a cardialgia. Et ideo cardiacus morbus cū in acuta febre & maxime æstuosa sit, perpetuo periculū minatur: confirmat id eius causa, cum a rodentibus ac venenosis succis fiat, seu ab alicuius visceris inflammatione: adeo ut quidam os ventriculi valde sensile habentes statim ex eo intereant, teste Alexandro, nec minus periculosus est a lumbricis ascendētib. ad ipsum os ventriculi, quibus non nihil roduntur, & statim intereunt. Frequentius iuuenibus euenit in augmento ægritudinis circa sextum diem; & quam maxime eo tempore, quo æstas calidior incanduerit. Cardialgia etiam in febribus mala iudicanda: de qua *septimo lib. De feb.* diximus. Quantum ad curationem spectat, cum prædicti affectus ratione maioris minorisque differant, quo communis ratio tum victus, tum medicamentorum instituenda; aer frigidus eligendus, & domus depressior, nec alta, nec valde lucida, fenestris patentibus, ut perflatus accedat, leuique veste contegantur ægri, in cardiaco præsertim morbo. Pauimentum foliis vitis & ros. consternatur. Vigiliæ vitandæ; somnus moderatus competit; & quies motusque omnis interdendus, alius natura vel arte sit lenis, valent pyra, persica, vua, & quæ moderate refrigerant. Sed de his diximus De febribus. Potus sit aqua hordei. Aetius prisanæ succum aut alicæ per clysterem infundit, reliqua vide apud Aetium & Altimarum; de vomitu leui iam dictum est. Si vomere non possunt, lenia medicamenta adhibenda, thamarindi, infusum rhab. vel syr. ex infus. rosæ. & topi-

ca ventriculo adhibenda, ut inula, cottonæ, cum pane vel plantagine, vel polenta cum palinis Exsudantibus sudor inhibendus cum oleo myrtæo vel melino, myrto insperso. Extremæ corporis partes refrigeratæ concalfaciendæ, cum multa frictione ipsarum partium, lintellisque calidis adhibitis. Quod si ex visceribus quoddam inflammatum, unde cardialgia aut cardiacus morbus, eadem inflammatio curanda erit. Si ex ascendētib. lumbricis, ea tribuenda quæ ipsos interficiunt, & ex corpore expellunt; amaris expellas, iuxta Gal. 14. *meth. medendi*. Hoc autem vitium, ut etiam sequens, ad os seu ventriculi ostium pertinet, in quo ciborum fit appetentia. Atque hæc prima ventriculi pars est: uti secunda (quam eiusdem ventriculi spatium seu cavitatē appellamus) in qua eorundem ciborum fit concoctio: de qua parte etiam postea suo loco.

OBSERVATIO V.

De appetentia canina.

1 **M**onacha apud Delphenes, cum longo tempore cibum deuoratum euomeret, & in fine acida quædam & aquea, rursumque appetentia incitata iterum cibum assumptum cum rursus euomeret (*quod vitium canibus solet accidere;*) facile intelleximus eandem canina appetentia laborare; atque hanc causam internam esse ex sapore eorundem, quæ euomebantur, etiam ex ægræ relatu cognouimus, tum ex ructibus præcedētib. vomitum, tum ex acido sapore oris, dum acida euomerentur. Cum autem hæc multis medicamentis vsa fuisset, nec per alios medicos curari posset, cum valde debilis esset, ut has pilulas leues quidem sumeret præcepi, cum ad eam accitus essem mense Martio, anno 1563. *℞ pilul. de hiera simplici Galen. ℞j. rhab. optimi pulu. ℞ss. cum syr. ex infus. ros. fiant pilule s. valde exigue.* Quas cum in deluculo deglutiisset, bis alium deposuit, quas cum iterum atque semel cepisset, stomacho corroborato, vomitus desit. Vomebat autem hæc primo non solum aquea, verum postea & acida, ut diximus: sed in fine vomitus sentiebat aliquid amarulenti, quod & gulam vellicabat: ideo rhabar. ℞ss. pilulis de hiera addebam, iisque deuoratis malum, quod irremediabile videbatur, atque diu durasset, miraculi instar, cessauit. Ita & quendam alium iuuenem, hoc eodem malo, solis pilulis de hiera, liberaui.

S C H O L I A.

3 **Q**uatuor sunt accidentia ordine quodam sese consequentia, quæ ventriculi appetentiam præcedunt, cum secundum naturam quis appetit. Primum namque omnium totius corporis inanitio, seu vacuatio est: secundum, naturalis euacuationum partium: tertium, ventriculi suctus: quartum ipsius suctus sensus: hinc sequitur iam dicta ventriculi animalis appetentia. Si hæc præter naturam vitiosa redditur, modum in quantitate excedens, dicitur tunc canina appetentia, 1. *De Appetentia caus. symptomat. & comment. aphorif. 21. libro 2. canina.* a canibus sic appellata, apud Alexand. Trall. lib. 7. capit. 5. Ægri vomunt pituitam, & cibum, cum assu-

Pars affectus. assumunt, quem retinere nequeunt; & post vomitum alium appetunt: estq; vehemens & insedabilis ciborum appetentia: in qua afficitur os ventriculi, *ut i. De causis. symp. & s. De loc. affect.* Affectio vero (symptoma est in genere noxa functionum animalium, atq; ipsius sensus tactus: ipsa quidem functio est deprauata, non diminuta nec ablata. Egri enim plus cibos appetunt, & cum appetitum cohibere nequeant (*teste Aetio lib. 9. cap. 21.*) in ingerendis cibis modum excedunt: deinde multitudine eorum aggrauati, & absumptos citra nocumentum ferre non potentes, ad vomitum diuertunt: deinde rursus cibo se explentes, iterum ad vomitum reuertuntur, quemadmodum canes, Volunt autem hunc morbum fieri, vel propter intemperiem solam frigidam, vel ob pituitam acidam vel ob melancholicam, vel ob totius corporis dissolutionem magnam. Trallianus etiam a caliditate fieri scribit. Iam quoq; a causis procatarticis incitatur, ut a nimia aeris in frigidatione; quod accidit iis, qui per montes frigidos & niuosos iter faciunt. Ita & bulimon fieri volunt, de quo postea. Sic & ex potu aquae frigidae sunt & a frigido ore ventriculi, Ob id scripsit Hippo. aquam & aerem facere voracitatem; sed magis aquam, quam & voracem appellat. Fit & cum aeger nutritur alimentis exigui nutriti est, ut si vescatur oleis, fructibus, acidis, asparagis, radicibus, leguminibus, aut aliis alimentis imbecillioribus. Fit etiam ob longum usum alimentorum detergentium, ut ficum vel garum; quod se Rondeletius in se ipso expertum scribit: qui cum me vellere (inquit) cogere ad usum piscium, vtererq; frequentissime garo parato ex lycodionis (*vulgo Gallice Anchoys vocat*) & oxyleo, sicut etiam M. Silices fere omnibus horis comederem, ita fuit pituita illa ventriculi & intestinorum deterfa, ut mihi superuenerit appetentia canina, deinde bulimos; qui me adhuc hodie infestat. Hec Rondeletius. At causas procatarticas huius affectus deprehenduntur ex relatu aegrotantis, & his, quae praecesserunt. At si ex frigida intemperie, egestionem multam ex ipsorum ventribus procedet, crudis existentibus nimirum cibis, aut semicoctis. Si vero adfuerint acidi quoq; succi, aderunt simul cum his acidi ructus: nec mirum si frigida intemperies, frigidiq; vitiosi succi in ore ventriculi redulantes propter frigus, alimenti & non potus desiderium excitant. Ex imbecillitate retentricis facultatis in toto corpore, si contingat ob caliditatem, contraria magis iis (*teste Tralliano*) qui ob frigiditatem immodica appetunt, euenire videntur. Neq; enim siti carent, neq; acidum humorem vomunt: unde & his magis alius astricta est, quam citata. At iis qui ob retentricis in vniuerso corpore facultatis infirmitatem laborant, cibi minime cocti, copiosi, & subinde alterationem non experti excernuntur. Quare etiam tales continuis illorum corruptionibus laborant. Plura de his vide apud Gal. 4. & 6. *De loc. affect. & 4. de sympt. causis.* Hi autem facile, iuxta Paulum lib. 2. cap. 51. dilabuntur in coeliacum affectum, aut dysenteriam, & aquam intercutem, si ad consuetudinem vomendi peruenerint; cum & alios ingerant ci-

bos cum priores nondum sint concocti. Et si diu perduret, in boulimon permutatur; interdum in soporem & interdum ad mortem. At canina appetentia, quae ex immodica dissipatione ortum ducit, si priusquam ad summum peruenerit, cognoueris (*teste Gal. 6. De loc. affect.*) non difficulter curabitur. Si itaq; ex frigida intemperie vel succis frigidis oriatur, aer eligatur ad calidum & siccum vergens. Vitentur vigiliae immodicae & somnus alliciatur; exercitium moderatum confert, alui excrementis prius arte vel natura defecis. Declinandus timor & maestitia. Vini potus his, non cibi multitudo, remedium est: flauum quidem vel rubeum adstringens id vinum sit, & merum: edulia pingua, oleosa, ex Galen. & Alexand. & phasianorum femora, & carnes suillae. Multos equidem Galenus sanauit, qui indefinenter famecebant, vinum abundanter exhibens, flauum, vel rubeum adstringens: & primum offerre pingua oportet. Potus ante cibum multus calidus, ex Aetio, cerebella, pullesq; cum melle & oleo, sorbitionesque appetitum destruentes. Ex fructibus, pistachia, nuges pineae, colymbades, & oliuae ex melle; allium, porrum, & herbae dissecantes, thymus, satureia: ex medicamentis oxymel simpl. scill. mei ros. Vomitus inusculis pinguibus, cum decocto raphani. Si impacti humores pituitosi, hiera danda. Sufficit aliquando leuis euacuatio, & reiterata: quia multos humores non continet ventriculus, ob frequentem vomitum. Deinde electuaria propinanda, quae calefaciant & roborent ventriculum, ex cinamomo, arom. ros. diagalanga. Et exterius inuncto ventriculi ore, oleo nard. absinth. mastich. & vino maluatico partem fouebis, tum aliis de imbecillitate ventriculi dictis. Si sit ab intemperie sola frigida, alterabimus calfaciendo, & leuiter constringendo medicamentis & fascia. Si fiat ex immodica corporis dissipatione, abstinendum a continenti calido ac vini potu, & ab omnibus, quae tum extrinsecus, tum intrinsecus calefacere possunt, ex Aetii mente. Aer frigidus eligatur, quies iniungatur, somnusque mediocris, & vigiliae immodicae vitentur. Alii volunt, si propter resolutionem magnam totius corporis fiat; aut quia vsi sunt alimentis detergentibus & euacuantibus immodice, optimis alimentis iilosali oportere; vitellis ouorum, succo carnis optimo, & generoso vino, pane intincto in maluatico vino, vel Hippocratico, vel muscatellino. Haec alimenta deferunt ab iis, quae ad bulimon praeparantur, quod in bulimodantur (*ut sequenti exemplo dicetur*) multum alentia & multum satiantia: atque ob id eligimus pingua; quae sunt fugienda in appetentia canina, quod vomitum proripiet, ut & oleaginosa omnia, & magis liquida, quae suapte natura facillime vomuntur. Istis tantum alimentis vitimur cum volumus ab initio augere vomitus. Si propter alimentum, aut medicamenta plus iusto detergentia haec affectio acciderit, viscosa sunt danda, ut cremor alicae, pilulae, decoctum pedis veruecis, aut aliorum animalium. Alexander iis, qui ex caliditate

7
Curatio ex frigida intemperie vel succo frigido.

8

9

appetitu canino laborant, vinum non dat; sed cibos, qui ægre cōficiuntur. Calida his inimica sunt, quæ ex pipere parantur. Quibus enim ex immodico calore dissipatio fit, clysteribus lenibus utendum; animi immodici affectus declinandi, & potissimum ira: cibi; stabiles & ægre corruptibiles dandi, aquæ potus vel sem. coriand. præpar. decoctum. Cutemq; condensabimus oleo ros. omphacino & myrteo astringente. Valent lavacra frigida, si nihil prohibeat. A balneis calidis abstinendum. Unguenta restringentia & refrigerantia profunt. Curationem retētricis facultatis infirma ex frigidityte, Alexander absoluit cibis & medicamentis calfacientibus, brassica vino percocta, cinara, pulve ex alica, cum vino, olyra, zea, perdice, atagena, carne leporina; inter bellaria, vis passis: vnctionibus, epithematibus ex ladano, myrrha, aloe & similibus. Dat theriacam; & balneis calidis utitur, & quæ mediocrem habent adstrictionem. Exercitia cōmendat, gestationes, navigationes, & longas peregrinationes. Ad facultatem retētricem imbellem ex calore, oua dura exhibet: inter olera lactucam, intybum. Ex auibus gallinam cohortalem non admodum coctam. Anserum alas & pectora, & phasianorum. Ex piscibus, dura carne peditos, orp. um, glaucum, cuculum & sepias. Ex testaceis, astaces, buccina, pectines, cochleas. Ex leguminibus, phaseolum, fabam, oryzam. Ex fructibus pomaccis, mala dulcia, citria, vuam dura carne præditam: peponum carnem, cucumerum medullā, sycomora, duracina & persica. Balneas aquæ dulcis commendat, naturales refugit. Aliqui his addunt curationem a melancholia: in qua lienis ratio habeatur: & purgetur humor melancholicus, & stomachus roboretur exterius. Vide de his ad longum Alex. Benedictum Veronensem lib. 11. cap. 22. De curationibus variis inexplēbilis auditatis.

OBSERVATIO VI.

De grandi fame, quæ Bulimos Græce dicitur.

Iuuenis quidam Brabantinus, cum iter longum per frigora & niues faceret, vel externum frigus aliquod pateretur, ilico ore vetriculi affecto, bulimon incurrebat, & ab eo statim syncope afficiebatur. Quod cum illi in itinere ter contigisset, ita ut vix a syncope a sodalibus, qui illi in via aderant, leuari potuerit, hūc casum famulo meo hoc tempore in Brabātia existenti narravit: & is reuersus ad me, cum & Diestēsis esset, ac huic iuueni familiaris, eius nomine me consuluit. Præcepi ut iuueni rescriberet, ut omnium primo cum syncopen incurreret, ex mēte Galeni, tum Alexandri Tralliani, extremæ partes constringerentur, continerentur, & pungerentur vndiquaque; & astantes aures perfricarent, & capillos attraherent, atque odoramentis ex aceto vel pane vino intincto ægrum reficerent. Hoc enim pleriq; idiotæ sciunt: utuntur autem ad vitalem facultatem, quæ digeritur, recreandam recolligendamque. Ex iis autem quæ odoratu mouēt, est panis potissimum in vino imbutus: ægroque reuerso ad se, & defe-

ctione animi finita idem panis cū vino imbutus ante omnia dari debet. Reliquo tempore celerius nutrire, & quicquid ægre mutatur confici, utque ipsi exhiberi oportet: nec non quod confirmare potest. Ab eiusmodi namque, inquit Trallianus, inuuantur, & temporis processu ad bonam temperiem reducuntur. Generatur enim hoc malū, ex Galeno & Aetio, ex stomachi frigidityte ac viriū imbecillitate: quæ semper fere ab externo frigore ortum ducit, ut hic. Hinc, test. Galeno, aucta oris ventriculi frigidityte immodice, propter eius exactum sensum, ac ratione viciniam, eam ipsi cordi impertitur, ipsumq; valde refrigerat. Non abs re igitur causa existit, ut animi deliquū accidat. Imo propterea Galenus hanc affectionem dixit nihil aliud esse, quam animi defectum. Et cum hæc fames ingens ab externo frigore oritur, propterea peregrinationes (ut inquit Aetius) & itinera longa maxime per niuem facta (ut hic) affectionem hanc inducūt. Propterea & huius curationis ratio exigit, ne iuuenis iste neglectim habeatur, cum & quidam in locis desertis, aut in balneo in hoc malum collapsi ex instanti perierint, auxilii facultate destituti. Quapropter auxilia cōfessim pro eius curatione adhibenda. Namque assidua etiam bulimix & exsolunt, & in animi deliquia inducunt ægros; quibus ægre auxilium reperitur, ex eiusdem Aetii auctoritate. Et quia affectio hæc nempe frigiditytas adiuncta est siocitati, ut Gal. assertus. De simpl. med. facult. ideo calidis tum humidis cibis, tum medicamentis utemur. Itaq; ægrum reuocabimus (ut etiam Galen. docet. De compos. medica.) odoramentis aceti aut pulgii, etiam recenti pane odorato si ad manus sit. Vltro etiam panem cum vino maceratum offeremus, & oua sorbilia & carnem suillam. Valde cōmendat Rondeletius lucanicas Bononienses, quæ cum integro pipere parantur: multum enim alunt & ventriculum calfaciunt. Bulimon enim eodem modo curari scribit, quo appetētia canina: in hoc tantum differens, quod alimenta oporteat esse duriora, & tardiora ad concoctionem, ut alimentum inde factum diutius duret. In his oportet cauere longiorem cibi dilationem ac inediam, & singulis horis simplicissimum modicumque cibum offerre. Hæc sunt quæ iuueni huic valde vtilia esse putamus.

S C H O L I A.

Ventriculi ostium indigentia simul ac refrigeratione & imbecillitate virium laborans, incurrit symptoma, quod a βάλιμος, a Latinis ingēs fames, vehemens esuritio dicitur (teste Galen. lib. 1. de sympt. causis) βάλιμος etenim Græca dictio, adiecta vocibus, vim habet augendi significationes earum. Os ventriculi hic afficitur, ut 1. De caus. sympt. constat: & eius affectus est symptoma ex genere noxæ functionum propriæ ipsius appetentiæ deprauatæ. Differt autem a canina appetētia, quæ vniuersalior est: Bulimos magis specialis atq; particularis & deliquium accedens habet. Etiam causa differt: nam a frigore perpetuo fere accidit bulimos; canina appetentia ex nonnullis aliis causis, ut di-

Pars affecta
& affectus.

Curatio si in
febris acci-
dat.

5

ut diximus. Signa per se nota sunt, cum adest fa-
mes & deliquium sequitur. Modum generationis
& causam iam diximus, & etiam curationem.
Quibus adiunges, ea quæ & Galen. & Aetius de hac
affectione scripserunt. Voluntamen aliqui & in
febris hanc affectionem oriri, ut Aetio & Pau-
lo visum est: licet ea raro accidat. Inspiciendum
tunc quo accessionis tempore contingat: nam si
in remissione seu declinatione febrilium exacer-
bationum accidat, intrepide eis cibi sunt offeren-
di, quos diximus. Si vero in principio eueniat, aut
in vigore apparuerit, conabimur eos primo reuo-
care, potissimum pane calido, vaporem adhuc e-
mittente, vel polenta, aqua seu posca madefacta.
Friccio quoque tunc temporis extremarum partium
adhibeatur, & cataplasmata ex palmis, cotoneis,
in vino diluto decoctis, ventriculo applicentur.
Atque hæc usque ad remissionem facere oportet, ut
oportune cibum offeramus. Quod si ex his nihi-
lo melius habeant, audendum est per ciborum in-
gestionem auxilium offerre, vnam atque alteram
in vino madefactam buccellam panis tribuendo;
ut exinde refocillati, usque ad remissionis tempus
perueniant: in quorum corporis curatio, tum
sufficiens cibis ordinetur. Nam neque Galenus ip-
se veritus est in principio, incremento, ac summo
vigore exacerbationum febrilium, potissimum calidis
siccisque corporibus, quibus etiam stomachus fue-
rit imbecillus, cibum offerre, non vni duntaxat
aut alteri, sed pluribus, ubi usus postulare; præser-
tim panem ex vino diluto: ut siquid constat apud
eundem lib. 10. Meth. med. Si vero a frigidis in ore
ventriculi & siccis succis redundantibus hæc affe-
ctio fiat, iidem prius concoquendi, preparandi ac
expurgandi sunt. Propterea, si bulimos fiat ab hu-
more acido, euacuationem tentare oporteret: sed
cum maiore cautela id faciendum quam in appe-
tentia canina. Nam hi, ut dictum est, facillime in
animi affectionem incidunt, post euacuationem.
Sunt autem statim (ut iam dictum est) reficiendi
vino & rebus odoratis. Inunctiones & omnia alia
præscripta cap. De appetentia canina hic conue-
niunt. Id quoque considerandum, numquid a vermi-
bus contingat: cuius habemus egregiam historiam
apud Alexand. Trallianum, sic scribentem: Noui
mulierem quandam, quæ cum multa & immode-
rata assumeret, omniaque concoqueret, & nunquam
satiari se diceret, rofionem vero in stomacho ex-
periretur, & capite doleret, medicamentum pur-
gans accepit: erat autem hiera. Facta igitur euacua-
tione vermem proiecit, qui longitudine duode-
cim cubitos, & plures habere putaretur. Atque tunc
immoderata & furiosa appetentia conquieuit. In-
notuit igitur non bulimum, sed bestiam fuisse, quæ
ad cibum sumendum compelleret, omniaque con-
sumeret.

OBSERVATIO VII.

De Cura sine Pica & Malacia.

i

PVella aënos nata 15, filia illius Theodori Corne-
lii mercatoris frumentarii Delphensis ditissi-
mi, habitantis in foro frumentario. Hæc qui-
dem facie admodum pallida, statura exigua, citram

seu malaciam patiebatur: frumentum enim & tri-
ticum crudum & cretam in maxima copia come-
debat: uti & Maria Petri Sasboti filia, prægnans, in
maxima copia cretam vorabat. Est enim hoc sym-
ptoma & puellis & prægnantibus familiare ali-
quando, ut in si holiolatus dicturi sumus. Sed
quod ad hanc puellam attinebat, cum deprauata
appetentia ex ea statim reprobatione tollatur, nem-
pe prauorum succorum purgatione, ad eam cu-
randam, ex communi consilio Henrici Vergerii
medici Haghani doctissimi, qui vna mecum ad
curationem accitus erat, post tyrupum de absin-
thio sepius propinatum hoc sequenti infuso vi-
sumus: ℞ pul. folliculorum sena ℥ ij. infunde per no-
ctem in aqua heronica (cum & capite doleret) aqua
sumaria, absinthii, boraginis ana ℥ j. mane post expres-
sionem adde pul. spærier. hiera picra simplicis ℥ ss. syr.
borag. viol. (qui & vomitum incitat) ana ℥ ss. misce
sumebat mane hora vi. in diluculo: & post tres ho-
ras soluta est aluus: bis aluum deposuit, & semel
egregie vomuit. Deinde stomacho exterius cor-
roborato, oleo cotoneorum, nardino, & masti-
chino, & cerato stomachico superimposito, hæc
sanata est.

SCHOLIA.

Affectio quedam est. Græcis κίττα & μαλακία, 3
a Latinis Pica: quæ secundum quosdam a pi- 3
ca auicula nomen recipit; vela picæ auis varietate 3
(ut Paulus ait lib. 1. cap. 1.) vel quod eadem sub 3
inde hoc malo corripiatur: secundum alios ab 3
hederæ similitudine, quæ κίττα Græcis vocatur, 3
nam sicuti illa variis plantis (prout occurrit) se 3
implicare solet; ita mulieres ex pica laborantes. 3
varia edulia appetunt, atque ea contraria, quæ 3
tum voluptatem tum insauitatem gustandi ex- 3
hibent, Aetio teste lib. 6. cap. 10. Malacia vero dici- 3
tur, quasi mollities. Pica enim corrupta est appe- 3
tentia, quæ vtero gerentibus frequens est, & po- 3
tissimum accidere consuevit tertio a conceptu 3
mense: nam tunc fœtus (teste Paulo lib. 1. cap. 1.) o- 3
mne quod ratione alimentum ad ipsum fertur, tam- 3
quam imbecillior, nequit consumere: unde fit, ut 3
quum varia ex eo recrementa in stomacho graui- 3
dæ redundant, varia & naturæ aliena appetat: ex- 3
empli gratia, carbones extinctos, cretam, cimoli- 3
am, aliaque complura, ut etiam terram, carnem 3
crudam. Nouimus & nos aliquas mulieres graui- 3
das crudas anguillas deuorasse: & nuper istis die- 3
bus Delphis pellem ouillam crudam vna cum tra- 3
na, aliâ comedisse percepimus: alteram vero Alc- 3
maria picem naualem cochlearibus excepisse, at- 3
que deglutisse. Hæc non solum mulieres, sed & 3
pueros & viros nonnumquam infestat. Tanta enim 3
vis malaciæ est (inquit Fernel.) ut vir quidam no- 3
bilis edendæ calcis viux desiderio iam diu pressus, 3
illam tandè pugni magnitudine vorauerit recrea- 3
tus, nulla ventriculi, nulla viscerum offensione. 3
Vidimus & infantes & pueros aliquos adultiores, 3
carbones, cineres & arenam & cretam deuorasse. 3
& calcem a lapidibus excussam. Contingit & puel- 3
lis cachexia laborantibus, ob mensium retentio- 3
nē, aut feminis; a vitiatis & corruptis humoribus

A frigidis
siccis succis
quomodo
curetur.

Historia
mulieris ver-
mem proii-
cientis.

Pars affecta in ventriculo collectis. Atque ex his iam dictis facile patet, & quæ sit pars affecta & qualis affectus. Conflatur enim ventriculi ostiū, *ut i. De caus. sympt. & s. De locis affect. constat.* Estque symptoma ac noxa eiusdem appetentiæ, quæ depravata est; in qualitate tamen, & non in quantitate, velut canina appetentia, excedens, *ut i. De caus. sympt. habetur.* Aberrat facultas appetendi, cum non cibos, quin imo pravas appetat qualitates, ut acida, acerbæ, acrida, cimoliam terrā, testas, & iam dicta. Ita puella nata annos 12. apud Amatum cent. 3. cur. 86. facile pallida & gracili, indiscrete lapillos, terram, calculos, cretam, gossypium, lanam & varia similia comedebat; & ita eisdem delectabatur, ut inter suendum eius pulvinaris, super quo mulieres suere solent, gossypium suavi appetentia comederet, tametsi a matre & assistentibus increpabatur. Nec enim prædicta tantum comedebat, sed absurdissimos alios cibos: quæ & ab eodem curata fuit, ut ibidem videre licet. Apparent etiam taliter affectis assidua exspuitiones, oris ventris morsus, ac anxietates. Insequitur autem pravam eiusdem oris ventriculi intemperiem, cum eius tunica pravo aliquo excremento fuerint imbutæ: quo fit ut mulierculis vitioso humore repletis, euenire soleat affectio hæc; maxime cum vterum ferunt. Pro varietate autem, peregrina edulia appetunt, & propterea alio signo non indigent pro eorum dignotione: quamquæ etiam per vomitum iidem manifestari consueverunt. Contingit autem & puellis cachexia laborantibus, *ut diximus*, & a vitiatissimis humoribus in ventriculo collectis; ut hominibus aliquando accidit melancholia laborantibus, aut diuersis humoribus. Nam fere euenit, *ut Rondeletius existimat*, ut ventriculus appetat similia alimenta humoribus in se contentis: ut si atrabilis non vsta in ventriculum effusa sit, acida appetunt: si vsta sit & incinerata, carbones, cineres & alia alimenta sicca appetunt & assumunt, & illis delectantur: qui falsos humores, falsa: qui alios, alia: ita ut ex eorum appetentia humorẽ coniiciamus collectum. At Iacchinus hos sic affectos remediū quærere putat ex assumtis: remedia vero quærī per contraria. Hinc alii, qui viscidis abundant, acida appetunt: qui frigidis, multum acrida: qui calidis, acerbæ: qui indicibilis qualitatis, etiam indicibilis qualitatis cibos. An & hinc monstruosæ libidines in iis, qui semen retinent? Sed cur fieri dicas, ut in retentis mensibus conceptionis tempore hoc eueniat, non grandioribus, cum sponte detinentur? vtrumque tamen per naturam. Respondet, semper si intra tempus purgationum naturale detineantur, noxam faciunt hanc; non si extra. Natura enim alio ea excrementa sensim deducere assuescit: & eiusmodi excrementa in senioribus non adeo multa gignuntur. Solet autem hæc affectio contingere, iuxta Aetium, vtero gerentibus, fere circa quadragesimum diem a conceptu; & sæpe vsque ad quartum mensem durat; vel compluribus (teste Galeno) vsque ad secundum & tertium mensem; in quarto vero quiescunt, partim quod vomitione vitiatissimi humores expur-

gantur, partim quod concoquuntur, utpote exiguum cibi tum sumente muliere, ob fastidium; partim etiam quod multitudo vacuatione sit diminuta, quippe primis duobus mensibus fortis paucum ad se sanguinem attrahit, eo quod parum adhuc auctus sit: ubi vero iam creuit, tunc plurimo indiget alimento: atque tunc non id, quod optimum est e venis allicit, verum etiam, quia maiorem alimenti copiam requirit, aliquid vitiosi simul attrahit: & ita fit ut vniuersum corpus plenum esse desinat, & minori humorum vitio crucietur. Idem tamen affectus cum viros inuadat, ut diximus, ob humorem vitiatum ad os ventris delapsum, nequaquam etiam despiciendus est. *Curatio.* Vitiatus autem hic instituendus pro varietate vitiosi & prauis redundantis humoris. Sed hoc cunctis *vitium ratio.* commune est, ut cibis vtantur moderatis, & qui non facile corrumpantur. Sic panis succo cotoneorum aut malorum puniceorum maceratus confert; & cichorium. Ex auiibus neque pingues neque viroscæ, pedes maxime ac rostra, & ventriculi porcorum: & erinacei marini recentes cibi sint quantitate moderati, & si cibos auersentur, obsoniorum varietate ac iucunditate illectentur. Abstineant tamen a dulcibus obsoniis; verum iis, qui terram appetunt, nihil ita prodest, veluti amyllum recens. Cunctis ante cibum confert oliuas albas, muria conditas cum pane molli exhibere, aut quinq; vel septem amygdalas amaras: post cibum autem vug passæ, mala punica ac pyra præbenda. Potus sit moderatus, ne alimenta ventriculo innascent; ac vinum fuluum, odoratum, antiquum & subastringens bibant. Si vinum auersentur, aquam ex cianamomo decoctam potabunt, nostri vero, qui vinum non bibunt, cereuisiam; non tamen recetem, sed defecatam. Quod ad medicamenta attinet, quidam hic dant magis digerentia quam fortiter laxantia. Si vero stomachus ab acrida, acidoue, aut salso humore mordetur, ad excitandum vomitum tepidam aquam bibere poterunt; ut humor affligens reuomatur, alioqui si difficilis sit vomitus, aliquid aceti seu syr. acetosi addendum volunt. Si crassius fuerit quod euomunt, & ob difficultatem difficulter excernitur, raphani etiā decoctum cum aceto mulso exhibebimus. Nam omni studio conandum ut infestus humor citra molestiam per vomitum educatur; præsertim ipsis vtero gerentibus, quibus nec medicamentum purgans dandum, iuxta *Aphor. i. lib. 4.* cum in primis mensibus hic affectus oritur. Sed viris si accidat, neque per vomitum sedari possit, purgans medicamentum dandum, prius tamen syr. quibusdam adhibitis, pro ratione redundantis prauis succi, *ut oxyzach. acetos. veloxymel, vel scillinum;* deinde *hiera picra purgandus, vel agar. & rhab.* alii vomitum a cibo frequentem iuuare aiunt: & medicamenta laudant, quæ ad anorexiam commendant; *ut cass. thamar. diacath. & triph. persicam; syr. ros. laxat. de fumoter. compos. & serum lactis cum infus. myrobal. vel sol. sene,* quæ frequenter exhiberi volunt, nempe quatuor vel quinque vicibus, *ut Rondeletius iubet.* Deinde ventriculi intemperiem corrigunt, si qua sit contraria

traria ex recrementis; idque topicis remediis, prius de intemperie ventriculi dictis, cum de imbecillitate eiusdem ageremus. Aetius, euacuato humore vitioso, *lib. 9. cap. 23.* exhibet mali punici dulcis succum, mentha sicca inaspera, & portulacæ cremorem, & ipsam quoque in cibo; & alia quæ apud ipsum inuenies: & forinsecus topica languido stomacho imponit, cenanthe, balauftium, ros. & citinum cum vino cataplasmatibus modo, aut absinthium cum palmarum carne vino incoctum; vel cotonea cum posca & rosaceo, vel nardino cerato excepta: tum alia quæ ipse commendat.

OBSERVATIO VIII.

De Anorexia seu inappetentia, vel cibi fastidio.

Ioannes Theodorus Harperus, consularis vir apud Delphenes, cum inappetentia laboraret, ad incitandum appetitum vna cum Henrico Vegerio medico Haghano, sequentia præscripsimus: *℞. Syrupi de limonibus, de acetos. citri ana ℥ij. syr. acetosi simplicis, syrup. ros. ex multis infus. vel muchari rosana ℥j. syr. menthaceti ℥j. ℞.* Capiebat omni mane duo cochlearia pauco vino Rhenensi addito. Egregie profuit. Verum post discessum alterius medici, cum medicamēta abhorreret, macerabam per noctem absinthii Romani comam & dentis leonis radicem vnam atque alteram paululum contusam, in vino Rhenensi: mane vinum expressum propinabam. Et, dictu mirū, vir septuagenarius, vermem mortuum, postea & viuū, deiecit, & appetitus miraculi instar rediit.

SCHOLIA.

Si suctionis sensus in ore ventriculi pereat (teste Galen. 1. De causis symptom.) vel suction non fiat, aut corpus ipsum non inaniatur, affectio excitatur a Græcis communiter dicta ἀνορεξία, & a Galeno: modo ἀνία, ut patet comment. *aph. 17. lib. 4.* ab Hippoc. autem præcitato *aph. 3. lib. 6.* ἀνορεξία nuncupatur. & *aph. 61. lib. 5.* ἀνία, cibi fastidiū ab Hippoc. & Galeno appellatur: a Latinis modo cibi fastidium, interdū inappetentia dicitur; quanquam inter ἀνορεξία & ἀνία, hæc differentia tradatur a Galeno 1. De morb. vulg. ut etiam Donatus annotauit, quod illi appetentia carentes cibum non sumunt; alii oblatos fastidiunt: quæ quidem affectio contraria existit caninæ appetentiæ. Namque in illa modice appetunt: in hac nullo modo, ac nihil appetunt. Appetentia nedum oblata, sed abolita, pertinet ad symptoma in genere noxiæ functionis animalis, & proprie ablata. Estque pars affecta, os ventriculi, nempe læsum, & huius curatio etiam deseruit ad exiguam & imbecillam inappetentiam. Dictarum affectionum seu inappetentiæ, iuxta Alexan. *cap. 7. lib. 7.* aut intemperies quedam aut humores in stomacho contenti causæ sunt. Sic & Paulus *lib. 3. cap. 37.* duas fastidii causas ponit; aut vitiosam stomachi intemperiem, aut humorum redundantiam. Fit autem a causis contrariis his, a quibus fames excitatur; scilicet propter plenitudinem ventriculi, vel quod inanitionem nullam sentiat os ventriculi. Non sentit au-

tem, si plenus sit ventriculus recrementis dulcibus: illa enim satietatem faciunt, ut acida appetitum. Pituita etiam insipida, vel sanguis in ventriculo collectus faciunt satietatem. Biliofa recrementa, non quod ventriculum replent, sed quod eum supra modum calfaciunt, appetentiam deiiciunt: calor enim solida corpora laxando dissoluit, atque ad attractionis functionem reddit imbecilliora. Nam, ut frigus appetitum auget, sic caliditas eundem destruit; quemadmodum & medicamenta calida, dulcia, pingua, & vina generosa, ut Hippoc. scripsit: Torexis famem sedat. Vinum autem quia calfacit, & subito nutrit, famem auferre dicitur. Quare qui cenam aut prandium a potu vini incoant, hi parum aut nihil comedunt. Bibones quoque raro appetitum habent. Pingua vero, quia ventriculum relaxant, & quodammodo relupinant, appetitum deiiciunt. Deiicitur & post morbos acutos; in quorum principio multum alimentum assumere: id quod Hippoc. scripsit *aph. 32. lib. 2.* Omnes fere, qui male se habent, circa initia cupide comedentes, nec quicquam proficiunt, ad postremum nihil appetunt: qui vero circa initia cibum fastidiunt, postea bene appetentes, hi in melius euadunt. Post chronicos etiam morbos fit, quod ex his facultatum naturalium vis sit deiecta: in morbis præterea, in quibus non est facta insignis euacuatio per ventrem: item in omnibus internis inflammationibus, ob calorem ventriculi in fluxibus præterea ventris, vel propter imbecillitatem, vel quia recrementa defluunt in ventriculum; ut quando pituita a cerebro in ventriculum descendit, & excrementa sunt spumosa. Deiicitur & appetentia ob relictum exercitiū, aut quia nulla et pauca fit resolutio; ut in multis obesibus; in his qui consueverunt frequenter coire, & non amplius coeunt. Aliqui cibos non appetunt, quia priusquam esuriant, iuscula aut alia alimenta assumunt: quod sæpe ægrotantibus contingit, ob muliercularum importunam diligentiam. Vidimus in morbis quibusdam adeo increuisse inappetentiam, ut nihil vel modicum sumserint. Sic religiosam quandam apud diuam Barbaram Delphis, aëos 65. natam, anno 1562. ictero morbo correptam (cui & fluxus ventris perpetuo aderat) instar saponis nigra deiiciente, cui & vrina veneta, nigra, passea, copiose profuebat, corpore squalido & exsiccato, post sex septimanas plane exhaustam decubuisse, nihilque bibisse aut edulii sumuisse, præter grana quedam maiorū granatorū, illa in ore detinendo & exiguum succū sugendo. Ad quam Pater illius conuentus me deduxit, non sanandi, sed miraculi causa, quod iam diu vixerat sine potu ac cibo: quamuis altero die quo ad illam me deduxerat Pater, hæc obierit. Sed & illud quod nunc referam, magis admirandum esse existimo; Puella erat annos 27. nata cum dimidio, quam anno 1566. xj. die Maii vna cum chirurgo inuisimus, ad partem orientalem ipsius vrbs Delphenensis decubentem. Hæc autem ab anno 16. ætatis suæ perpetuo lecto decubuerat, atque iam vndecim annis nihil aliud sumserat, quam casei momentum vulgari lingua

Puella historia mirabilis xj. annis lecto decubentis.

Stollixe caes

Stolckii dicti, muliere adistente nobis narrante; nihil enim liquidum aut potus deglutierat, licet mediocriter mingeret: verum singulis octo diebus tantum semel aluum deponebat. Insuper cæca nata erat, quavis mediocri valetudine frueretur ad annum decimum sextum ætatis suæ. Ab eo autem tempore, terrore correpta, in hanc malam corporis dispositionem lapsa fuit, ita ut vndecim deinde annis subsequenter, nunquam lectum egressa, etiam nunc lecto decumbat; ac semper in deterius malum progressum fuerit: adeo ut aetate suæ vigesimo, venter in tumorem haud exiguum attolleretur: atque omnes eam eo tempore (*ut assistens muliercula narrabat*) pro hydropica haberent. Sed paulo post detumuit venter, præter rationem, & subortus est rugitus in ventre vehementior, ac murmur quoddam, tamquam ranæ viæ crocitanter in ventre latitasset, cum motu quodam ingenti ac vehementi sublatione, mox depressione, tum ventris tum thoracis, instar fluctuum maris sese commouentium: qui motus adeo validus erat, ut etiam nos manum ventri admoventes, eundem cohibere minime potuerim; ita ut is motus manum nostram attolleret. Rogavi puellam numquid dolorem sentiret? imo maximum, respondit. Insuper aiebat (*quod valde admiratu dignum erat, etiam muliercula adstante idem annuente*) quod motus ille ad plenilunium augeretur; & simul cum æfluxu maris, in maiorem elevationem totus venter tum. pectus mirum in modum attolleretur; & maris fluxu recedente simul motus ille decrederet & minueretur. Hic autem motus septem annos durauerat. Mirum quod puella tota vitiosa, superuixerit. Rogabam quoque numquid menses tempore consueti fluxissent. Sed pudica, ac mente constans rubore quodam suffusa, non respondebat; muliercula tamen assistente annuente, singulis decem septimanis certa quasi periodo profluere: sed admodum corruptas purgationes esse referebat. Cum autem animaduertirem portentosum morbum esse, minimeque naturalem, licet astantes causam referrent in terrorem, a quo male habere prius cœperat: ideo habitata huius puellæ genitura (*quæ nata dicebatur anno 1538. 25. Octobris die, circa quartam fere horam, post meridiem*) iuxta astrologorum decreta perscrutari volui numquid ab astris aliqua causa probabilis coniectura haberi posset. Erant autem tunc in medio cœli stellæ nebulosæ, quæ sunt cum oculo sagittarii; & in occasu nebulosæ, quæ est in aculeo scorpionis; luna in octava & Sol in septima, in loco opposito vitæ. Hæc cœcitatem decernebant, iuxta Ptolemæum. Sol quoque cum cauda Draconis & Saturnus in sexta, & Luna in octava, & Mars dominus ascendentis, decumbens cum Venere, portentosam & valde vitiosam genituram declarabant. Solus Iupiter in tertia domo in quadrato Saturni vix vitam sustentabat. Ita ut hæc misera videatur & brevis vitæ, ac valde vitiosa; licet ad hoc usque tempus vixerit tamen morbosæ. Sed hæc extra metam medicinæ, cum ad Astrologiam pertineant. Coniecturalibus enim signis ac causis non

ita insistendum, ut iis, quæ ad medicinam faciunt. Hoc tamen pro miraculo aut magis pro ostento habetur, quod tam diu sine potu vixerit, solo modico caseo utens. Ideo a curatione destitimus, cum & illa omnia remedia tum medicos ipsos respiceret. Multa certe apud nos latent: ut etiam de illa trienniali inedia puellæ Spirensis; de qua meminit Ioannes Langius medicus doctissimus 2. *epist. suarum Miscell. epist. 27.* Quæ quidem causæ adeo obscuræ sunt, ac soli Deo cognitæ, licet ex terrore (*ut huius puella contingit*) pessimos posse oriri morbos sciamus: uti etiam ex ictu bombardæ, ut alias narrauimus: militem enim cognouimus, qui ingenti eius fragore, cum bombardas admodum magnas emitteret, in perpetuam maniam inciderit. Narrat etiam Benedict. Veronensis, medicus insignis, 46. diebus continuis, quendam Venetiis ieiunium habuisse, habitudine membrorum frigida, crasso phlegmate intus & incocto, meatibusque corporis adstrictis. Pudet etiam (inquit) referre de virgine sacerdotali, quæ ætate nostra in ediam pluribus mensibus sustinebat. Illa quoque in miraculum patribus Romæ venerat, unde experimentum, pluribus custodientibus dedit, *Columba* nomen. Sed ad causas anorexiæ reuertamur, quas iam paulo ante enarrauimus: quæ ipsæ etiam exemplis subsequenter facile innotescunt, ut & quibus modis eas ipsas distinguamus; & sic etiam melius curemus.

OBSERVATIO IX.

De Anorexia ex humore bilioso, cum ventriculi intemperie calida.

Appetentiæ amissio quamvis contingat, si corpus non inanitur, vel ob calidam ventriculi intemperiem, vel a sanguine immoderato melle, aut si venter intestinaque immodice fluxerint: plerumque tamen appetentia prosternitur, humorum aut biliosorum, cum intemperie ventriculi calida; aut pituitosorum cum intemperie frigida, in ventriculo contentorum vitio. Sic iuuenis valde macilentus, ob biliosos humores cibum auersabatur; cui & sitis tum nausea aderant, & præcipue ventriculi morsus. Quem hoc modo curauimus: cum enim mordaces humores biliosi ventriculum lancinarent, & hic nauseabundus & in vomitum satis procliuus esset: statim ieiunio ventriculo 3. vj. aquæ tepidæ propinauimus, 3. j. & syr. acetos. simplicis adiecta: digitos in os & fauces demittendo vomitus commode eliciebatur. Aliqui hic, ut *Paulus & Alexander*, priusquam aquam tepidam cum aceto vel syr. acetoso exhibeant, tepide ægro alimenta humectantia, veluti prisanæ cremorem vel ouorum lutea dant, deinde exiguo tempore interposito, vomitum prouocant: nam is sine noxa iis est utilissimus, teste *Alexandro Traliano*. Alioqui, si difficilius æger vomuerit, melius est materiam ad ventrem prouocare, copiosiore temperatoque alimento prius humectatam, ut idem *Alexander* refert. Sic alteri, qui difficile vomebat, aquam hordei, pauco zaccharo immixto, cum syrupo viol. modo aquam hordei solam cum syr.

3 syr. viol. ex infus. ros. & de succo cichorii, aliquot vicibus dedimus: quæ etiam huic, post vomitum, ad contemperandos humores & alterandos, exhibuimus. Deinde pro leui purgatione propinauimus *syr. ex infus. ros. pallid. 3 ij. cum 3 iij. feri lactis:* qua potione breui, bene excreuit biliola: alioqui exhibuissem rhabar. infus. vel mannam, aut cassiam, cum decoct. thamarindorum. Bilioto humore euacuato, calidi ventriculi intemperiem in hunc modum alteraui: *℞ syrup. de succo acetos. citri, & granatorum acidorum ana 3 ij. dentur 3 ij. antepastum, his & confert syrup. de persicis.* Et pro alteratione & roboratione miua cotoneorum, & cotoneum ipsum zaccharo conditum, & syr. citri acidus, cum aqua hordei. Imperaui quoque, vt persicam in principio pastus assumeret: hæc enim maxime appetentiam incitat, si a causa calida prostrata sit; vti hicerat. Serapium vero de persicis hunc in modum fit, quo vti possumus in tali casu: *℞ succi persicorum, que nondum plenam maturitatem sunt assicuta lb. iij. decoquantur vsque ad dimidui consumptionem: permittantur subsidere faces: deinde adiciantur succi malorum puniceorum 3 vj. Zacchari q. s. simul perfecte coquantur, depurentur, adiectisque santalis citrinis q. s. suauiore odore reddantur.* Datur ex hoc syrupo 3 ij. mane & vespere, duabus horis ante pastum. Si persica defunt, pro illis substitui potest succus pomorum acidorum redolentium, minime dulcium. Interea hoc condito vti sumus: *℞ conferva acetosa, ros. ana 3 j. b. corticis citri conditi 3 lb. diacydonis sine speciebus 3 j. pul. specier. irionis 3 j. corall. rub. 3 j. cum syr. ex malis puniceis, vel persicorum, si adsit; fiat conditum molle.* Capiebat ad magnitudinem castaneæ, mane & vespere, horis duabus ante pastum. Modo etiam capiebat rob. de ribes, & rob. granorum Veenlandiæ, apud nos egregie incitans appetitum, ex causa calida deiectum, & ad stomachum calidum & sitim exstinguendam valens: quo in multis felicissime vsus sum. Exteriori vero fotum adhibuimus: *℞ ros. rub. m. j. folior. acetosa & inrybi satini latioris ana m. j. absinthii sicci & communis Romani anap. j. semin. coriand. prepar. 3 ij. sumach, baccar. oxyacantha ana 3 j. b. specier. diarod. abb. 3 j. decoquantur inf. q. aqua; adiectis succi cotoneorum 3 iij. aceti ros. parum; fiat fotus, cum spongia immerita & expressa.* Eaque calente ventriculi regio foueatur mane & vespere ante pastum: deinde vngu. infra scripto vngatur: *℞ olei cydon. ros. myrti ana 3 j. olei absinthii 3 lb. corall. rub. coriand. prep. santal. citrin. & rub. ana 3 j. flor. ros. rub. pulueris 3 ij. troch. de caphura 3 ij. aceti parum, cera q. s. fiat vngu. deinde apposui ceratum santalinum.* Victu quoque refrigerante vtens, & moderato somno, & quiete, & cibus refrigerantibus (*Paulus autem dat panem posca imbutum, etiam in potu*) vt lactuca & cichoreo, ex aceto: ex volucris montanas fumendo pedesque suillos, tum alia (*quæ etiam ab Aetio commendantur*) hic recte deinde valuit.

SCHOLIA

6 **S**igna vero, quæ calidam intemperiem notant, iam antea diximus: adest enim sitis, oleosusq; ^{Signa.} ructus; *Paulo auctore.* Quibus si & biliosi humores accesserint; etiam ventriculi rosiones, nausea, & sitis, subinde & febris hos sequitur. In intemperie frigida, contraria superius adesse diximus: illi enim non sitiunt & acida eructant, si simul adsint crassi viscosique succi, ij neque rosionem ventriculi, neque sitim experiuntur: & si in sinu humores existunt, nausea & vomitu premuntur. Si infarcti tunicis inhærescunt, nausea solum, non vomitu afficiuntur. Immodica autem corporis plenitudo, præsertim humorum crudorum inanitionem prohibens, si inappetentiæ causa fuerit, quemadmodum vrsis, & quibusdam latentibus aliis animalibus euenit, quæ per multum tempus a cibo abstinent, maxime hyberno tempore, haud difficulter dignosci poterit. Similiter etiam ⁷ si propter quampiam aliam causam, vtpote cutis densitatem, aut otiosam vitam impedita fuerit inanitio, & per consequens excitata inappetentia. At si calidi fuerint vitiosi succi, totum corpus occupantes, præter alia signa, rigor aderit, & febris ^{Prognostica.} cum cibi fastidio, seu inappetentia; quæ haud negligenda erit, cum sit ad vitam necessaria ipsa appetentia, *Gal. teste aph. 3. lib. 6.* Quamuis si iuxta principium morborum accesserit, aut iuxta vigorem, cum vires adhuc sustinere possent, nihil molestiarum infert. *Aet. auct. cap. 20. lib. 9.* modico tunc alimento ægri opus habent. Si vero in declinatione totius morbi appetitus perditio accedat, aut in diuturna imbecillitate, aut viribus debilitatis, aut ex immodica euacuatione, periculo non vacat, ex eiusdem auctoris sententia. Augetur etiã affectio hæc ab ætate: incommode enim pueri hoc malo afficiuntur, vtpote qui voraces natura sunt, & assiduo fomite opus habent. Quare magnus præter naturam excessus significatur, si pueri perditione appetitus fuerint affecti. Quomodo autem curetur calida intemperies, iam diximus: nempe ⁸ *Curatio in* refrigerante: eligendo aerem frigidum, & *intemperie,* singulis diebus excrementa alui educendo, natu- *calida.* ra vel arte, nempe clysteriis, vitando anxietates & reliquas animi perturbationes. Quidam hic commendant cibum refrigerantem; etiam oua sorbilia, testes gallorum; & ex volucris non graueolentes. Alii conantur & appetitum reuocare per odora menta, ex posca aut vino diluto, aut malorum cotoneorum, seu odoratorum pyrorum decocto, vel aquæ rosæ. *3 iij. aceti vini albi 3 j. santalorum omnium 3 ij. misceantur; & fiat odoramentum.* Extrinsecus quoque, vt iam ostendimus, stomachum fouemus, coroboramus, & intemperiem calidam alteramus, vt oleo ros. omphacio, cydoniorum, adiect. succo lactuca, cichorii. portul. vel solani 3 j. santalor. & corall. rub. 3 j. cum pauco aceto & cera exigua; fiat vnguentum: vel cydonium posca decoctum & contusum stomacho apponito. Eo tempore valet & frictio corporis atq; pedum, manuumq; palpatio & contrectatio moderata; *teste Aet. & saccelli, de quibus*

sæpius dictum est. Si adsint etiam humores biliosi, curatio iam satis constat exemplo superiori. Quomodo autem curetur intemperies frigida, etiam cum humore pituitoso, sequens exemplum ostendit.

OBSERVATIO X.

De inappetentia ex pituitoso humore, cum intemperie frigida ventriculi.

Puella pituitosa, mali habitus, ventriculo frigido cum afficeretur, pituita etiam collecta fuit in stomacho, unde ructus acidi, & ventriculi inflatio subsequiebantur: nulla siti premebatur, feruentia amabat, pituitam crudam sæpe euomebat, quæ appetentiâ adeo læserunt, ut dulcia omnia & vinctuosa & insipida, & omnem cibum tandem abominaretur. Ad quam curandam admissus, tentabam, nunquid pituita vomitu educi indeque auelli posset. Siue enim is humor in ventriculi tunicas sit impactus, siue secundum internam spatii latitudinem in eo contineatur, experiundam, an vomitu educi ac euelli possit. Et quia videbatur, non admodum difficulter vomere, dedi aquam tepidam, cum oxymelite; digitorumque immissione cibum tum pituitam simul euomuit: quæ tamen erat tenax (quamquam aliquando contingit, ut biliosa & pituitosa quedam euomantur, quæ perditum appetitum in quibusdam sunt causa; atque ita ab hac accessione liberantur.) Cum hic igitur humor pituitosus esset, quique vomitu non perfecteeductus erat, nobis utile visum fuit, ut is incideretur, atque extenuaretur in hunc modum, cum crassus & viscidus esset: *℞ oxymel. simplicis, scyllini, mellis rosæ solati ana ℥j. aquæ absinthii, menthe, fœniculi ana ℥ij. misce pro ij. dosibus.* Fuitque hoc repetitum bis terve, donec materia probe cocta videretur; quam tunc ita purgauimus: *℞ elect. hieræ pieræ Galen. ℥℔. dissolue cum ℥ij. iuris cicæ rubr. & datur in aluiculo:* quo medicamento aluum satis bene deposuit. Alias ob amaritudinem damus pilulas de hiera; & ita postea, cum hæc ipsa nondum satis purgata esset, post tres aut quatuor dies subsequentes pilulas deuorauit: *℞ pilul. alephan. de hiera simplici ana ℥℔ cum aqua absinthii: fiant pilule v. postea etiam ex ℥j. pilularum dictarum confecimus pilulas vj. e quibus tres per horam ante cœnam semel aut bis singulis septimanis sumsit.* Ultimo tam medicamentis assumtis quam ad motum ventriculum roborauimus: sumebat enim singulis diebus duabus horis ante pastum mane & vespere duo argentea cochlearia syr. absinthii, per se, vel cum liquore stillatio chamæmeli. Dedimus quoque *diacalamintum, vel diatrion pip. ad ℥j. modo tabulas arom. ros. sine musco, duabus horis ante pastum ℥ij.* Sic alteri viro eodem malo laboranti, post vniuersalia remedia commode exhibui *℥j. theriacæ.* At nostra puella etiam hoc condito utebatur: *℞ conseru. absinthii ℥ij. coticum citri ℥acch. conditi ℥j. ℔. specier. arom. rosæ. sine musco, specier. diacinnamom. ana ℥j. cum syrup. conseruationis citri, fiat conditum molle: capiat omni mane ad magnitudinem paræ ca-*

stanz, duabus horis ante pastum: & super bibebat parum vini meri. Exteriorius vero ventriculum inunximus vnguento sequenti: *℞ olei nardini, mastichini ana ℥℔. olei absinthii ℥ij. mentha sicca, ligni aloes, cariophyll. pulueris ana ℥j. olei maceris ℥ij. cera q. s. fiat vnguentum.* Vltimus & ante inunctionem fotu ex decocto absinthii, menthæ, calaminthæ, sisymbrii: cui specier. arom. ros. ℥ij. vel iij. in fine post colaturam injectæ erant, in vino mero decoctis: in quo calente spongia, aut lana succida madefacta & expressa, ventriculus mane & vespere ante pastum fovebatur. Deinde inuncto ventriculo, ultimo hoc emplastrum apponebatur: *℞ emplastro stomachici, emplastro mastichis, ana ℥j. ℔. coralli rub. ℥j. ℔. absinthii sicci ℥j. galanga ℥ij. tubigantur cum oleo nardino & menthaceo, & fingatur emplastrum vel ceratum (adiecta cera si opus est, ad maiorem soliditatem & cohærentiam) ad scuti formam, quod ventriculo post fotus vel inunctionem applicetur: Auferebatur autem, cum cibum egrotus sumeret, hoc est, prandii & cœnæ tempore, ne sua stypticitate cibum in ventriculi fundum descendere prohiberet. Præterea præcepimus, ut pastus initio pane asso cum vino macerato, adiecto pauco zaccharo, vteretur: in pastus vero fine puluere sequenti, aut huius æmulo: *℞ coriandri preparati ℥j. ℔. diacydonites cum speciebus ℥j. ℔. anisi, cinnamomi select. ana ℥j. pellicul. ventriculorum gallinarum preparati. ℥ij. ℔. zacchar. albiss. ad pondus omnium; fiat puluis: quo in fine pastus utebatur.* Hoc enim modo non solum hæc puella, sed alii plurimi appetitum deperditum ex intemperie frigida cum humore pituitoso receperunt.*

SCHOLIA.

Hæc affectio curatur contrariam causam inducendo; si enim ex intemperie calida, ut iam ⁴ *Qua in calida intemperie & humoribus calidis conueniunt.* procedente scholio diximus, oriatur, curatur eadem tollendo & alterando cum frigidis. Si adsit humor simul vitiosus, nempe biliosus, vomitu tum deiectione vacuandus, ut iam diximus, quibus etiam conuenit decoct. tamarind. prun. acid. & sebesten cum syrup. rosæ. vel rhubar. In crastinum medicamenti duabus horis ante pastum, quidam propinant aquam frigidissimam, modo ventriculi imbecillitas, aut aliud non prohibeat. Cibi condiantur multis acidis, omphacio, succo arantiorum: oliuæ, cappares, fœnicul. marinus & condita & salita conueniunt; & pisces salsi non pingues ex aceto. Clysteres iniiciantur, quibus recrementa intestinorum abluantur. Et, ut breuiter dicamus, in quibuscumque deiectione appetitus ob causam aliquam ventriculum calefacientem, ut medicamentum & alia, refrigeratione curantur: ita quoque si ob satietatem comedere nequeunt, ieiunent: quibus vero ob plenitudinem ventriculi appetitus tollitur, totius corporis euacuatione curandi: quibus ob derelictum exercitium, aut Venerem, xerceant se, & coeant modice. Si frictiones solitæ non fiant, iterum procurentur. Qui ob recrementa in ventriculo collecta hoc morbo tentantur, sunt euacuandi vomitu aut de-

Ex causa calida.

Ob satietatē, ob plenitudinem ventriculi, ob exercitium derelictum, aut Venerem.

5
Si ex frigida
intemperie
fiat, curatio.

aut deiectione. Si vero ob frigidam intemperiem, cibos fastidiunt, contrariis etiam medendi sunt tum cibis tum medicamentis. Ab Alexandro commendantur ius columbæ, vix passæ; pro potu vinum vetus; decoctum rutæ, anisi, fœnic. aut cinnamomi, aut piperis ex aqua, diatrion pipercon, diaspoliticum ex Gal. 6. de sanit. tuenda, & theriaca iuxta Alex. & succi absinthii potio & syr. medicamenta ex zinzibere & pipere confecta: de quibus videas Donatum. Extrinsecus stomachus corroborandus fotu, saccello, vng. & ceratis, ut

Ex humore
pituitoso.

iam antea ostensum est. Si vna adest pituita, curetur ut iam in obseruatione precedenti dictum est: quibus valet syrup. acetos. incidendo & detergendo pituitam & vomitum prouocando. Valet oxymel. & cappares cum oxymelite, & oliuæ ex muria, vel oxymel. conditæ; vel oxymel Iulianum iuxta Paulum & Alexand. Profunt & pilulæ ante cibum labellinæ, de hiera & compos. ex hiera picra, 6. de sanitat. tuenda. Etiam illa, quæ postea corroborant tam intus assumpta quam extra admota, ut iam

6
Si ex imbecillitate
viri
fiat, curatio.

exemplo precedente ostensum est. Si vero ex virium imbecillitate appetitus perditio contingat, considerare oportet, qualis intemperies vires resoluat; & per contraria eam ipsam corrigere. Ita quoque si post euacuationem aut morbum fiat, reficiendi. Si in febre vel post febrem appetentia auferatur, vel diminuatur, recurre ad exempla, quæ in libris nostris de febribus retulimus. At si propterea quod

Si suctio non
fiat.

suctio non sentitur, cibi fastium accadat, cerebro aut neruis ab eodem ipsi stomacho distributis, prospiciendum erit; & cognita eiusdem caussa, eam prius auferre necesse est. Si autem propterea quod totum corpus plenum existat, eiusdem corporis inanitione non peracta inappetentia fiat, idem vacuandum est, diuersimode tamen, pro varietate

Si a corpore
pleno.

redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ cutem rarefaciunt, utpote balneis ac frictionibus uti oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitio fiat. Ceterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdatur, illius etiam haberi curam conuenit, ut inquit Aetius. At si ex ulcere in stomacho aut ventriculo existente ortum ducat inappetentia, ab omnibus acerbis & cibis, & potionibus abstinere oportet; ac uti medicamentis quæ leniunt: puta sorbitionibus absq; oleo, tū iis, quæ ex amylo, lemnia terra, & lacte, vel quæ melle paucissimo conficiuntur, ut quæ purgēt citra rofionem, ex Pauli mente. Extra vero ex palmulis, & cydoniorum carne, & polenta, epithema facies: & ceratum ex melino vel rosaceo cū ammoniaco & thure. Reliqua vide de cibi fastidio. apud Ale-

Rusticus fa-
stidio cibi la-
borans post
alios morbos.

land. Trall. lib. 7. cap. 7. Oportet autem in omnibus habere rationem causse: Ita rusticus quidam post continuum fluxum sanguinis narium tandē in stomachi dolorem & imbecillitatem incidit, & hepatis obstructionem (quod color citrinus totius corporis indicabat) quasi iam ad dispositionem cachecticam tendens, appetitu omnino deiecto. Hic ad me, cum Alcmariæ adhuc habitarem, consultandi caussa accessit, cum variis & mul-

tis remediis medicorum imperitorum ac Empiricorum vsus esset. Cui licet ob purgationes adhibitas venter satis fluere, nolimus tamen constringentia adhibere; cum obstructio adesse videretur in visceribus, & fecibus adhuc apparentibus corruptis, cum hepatis oppilatione, quæ appetitum deiciebat. Ideo apozema sequens præscripti: *℞ corticum rad. petros. fœniculi, apii, cichorii ana ℥ ss. absinthii Romani, dentis leonis cum rad. cichori, mentharubra, flor. ros. rubana m. j. flor. cord. p. j. sem. coriand. preparati ℥ j. folior. senæ a stipitibus repurgatorum ℥ vj. sem. anisi ℥ iij. myrobal. citrinor. Indorum (ob fluxum ut paulo mitior procederet euacuatio) ana ℥ iij. vuarum cum arill. ℥ j. fiat omnium decoct. in tribus part. aquæ communis, & vna parte vini Rhenensis odoriferi. Et ratione artis decoquantur in duplici vase ad ℔ j. ss. stent deinde per noctem infusa: & confectis manibus fiat colatura cum forti express. addendo syr. de cichor. Nicolii, cum rhab. syr. de mentha, de absinthio ana ℥ j. cum albumine oui, depuretur decoctum, ac secundum artem clarificetur, & in eo pendeat nodulus infra scriptus: *℞ rhabar. selecti incisi ℥ ss. agar. troch. specier. arom. ros. descrip. Gabrielis, specier. diarod. abb. ana ℥ j. ss. spica, schœnanthi, & in ℥ lb. anagranii j. fiat nodulus filo constructus, exprimendus dum potio sumatur: quæ, tidie vero in diluculo ex eo decocto sumens cyathum vnum tribus horis ante pastum, modo ter quaterne quotidie aluum excernebat; etiam fœtida excrementa deiciens. Atq; ita profuit, ut aliis remediis aut medicamentis opus nō fuerit, imbecillitate ventriculi cessante, atque hepatis obstructione ablata. Simul totius corporis citrinitas, tū etiam cachexia ita cessarunt, ut ilico conualuerit.**

OBSERVATIO XI.

De siti immensa.

VIR quidam biliosus immensa siti laborans, cum maximam caliditatem & siccitatem oris ventriculi pateretur; huic aquam solam exhibuimus cum paucio vino; nam aquam ferre non potuit: sicuti alius, qui optime illam tulit sine vino. Alteri autem, cum nec vinum ferre posset cum aqua, aquam cum aceto multum dilutam commode dedimus, & syr. viol. cucurbitæ, aliaque refrigerantia & humectantia illis dedimus, qui ab esu rerum salutarum admodum sitibundi euaserant. Multi sunt ventriculo imbecilliore, qui neque aquæ potum, synocho vel febre ardente laborantes, ferre possent, etiam sani existentes. Vide de his exempla a nobis relata lib. 1. de febrib. scholio obseruat. 13. de synoch. non putrida. Quibusdam enim frigidissima potio altius cordi insedit: cuius exemplum quoque habes apud Beniuenum de abditis rerum causis, de quodam Blasio suo familiari, qui cū ardētissimo Sole lusu pilæ incaluisse, & in cellula vinaria subterranea frigidissimum vinum ob sitim bibisset, ilico defecit: quæ tamen non sine graui noxa restituit. Noni etiam, inquit Galenus, qui exhausta siti cruciabatur cum viperam deuorasset (forte fuit dipsas) & messorum, qui forte fortuna vinum biberant, in quo quedam

fere fuerat exstincta: & cum qui ex veteri vino fuerat inebriatus: item & eum, qui sitim tolerare decreuerat: denique eos, qui in nani deficiente aqua, marinam aquam bibere aufi sunt, quod siti immoderatione, quam reliqui cruciarentur; etenim soluta aluo, ac torminibus vehementer cruciati, celerius quam reliqui interierunt. Noni etiam quendam ardente febre laborantem, qui in crescente etiam dum morbo, aquam frigidam liberaliter bibens, satiari non potuit, donec moreretur. Itaq; circa ventriculi appetentiam huiusmodi euenire possunt errata. Hæc Galen. Scribit *Amatus* cent. 2. curat. 62. de tribus, qui ob potum frigida aqua mortui sunt.

S C H O L I A.

IN siti immoderata vel vehementi perpetuo, iuxta Galen. De caus. symptom. & 6. De loc. affect. os ventriculi affectum est, quamquam non semper primario, sed quandoque per consensum, vel iocinore, & maxime si ma eius parte, vel pulmone, vel mesenterii venis seu ieiuno inflammatis: ex loco citato Galen. & apud *Alexand. capit. 8. libr. 7.* Est itaq; ingens sitis symptoma in genere noxæ functionum, atque ipsius appetentiæ deprauatæ. Nec pro eius symptomatis notitia alia conscribenda sunt indicia, cum res ipsa ex laborantium relatione patefiat. Quod ad sitim inexplebilem attinet, quidam siticulosi fiunt consuetudine continuata, ita vt nonnulli continuo bibant & continuo urinam mittant, inter potiores ingenti palma. Græcia etiamnum potiores maximos effert, ebrios vero damnat. Neque Germani, vt Itali aut Hispani, ebrietatem pro vitio habent. Apud Græcos tamen, matronas vinum bibisse iniuria est: inter nuptias in Creta solis viris datur vinum, inter mulieres lagenæ aquæ circumferuntur. Eam commendationem bibendi L. Piso vrbis Romæ curator a Tiberio factus tulit, quod biduo duabusque noctibus, per potationem continuauerat apud ipsum iam Principem, Tricongii rara gloria, inquit Plinius: quando & hæc ars suis legibus constabat, non labasse sermone, nec leuatum vomitione, & similia diligenti legum scito, contra bibendi fallacias: namque bibendi consuetudo auiditatem auget. Scitumq; est Scytharum legati, quanto plus biberint, tanto magis sitire Parthos. Inuentumque est mira vitiorum solertia, vt aqua quoque per Hispanias, Galliasq; ac vltimam Britanniam Germaniamq; cum frugibus suam ebrietatem faceret. Delphica vrbis (in qua iam 34. annos medicinam feci, dum hæc secundo colligerem anno 1592.) ea gloria clara est, ob ceruisiam; quæ ad alias vrbes defertur. Sed Cretense vinum (inquit *Alexander Benedictus Veronensis*) Moromaticum dictum, gratiam ceruissis ademit; magno enim pretio ebrietas apud exterarum nationes emittitur, 30. aureis dolium venundatur. Veteres in ea bibendi gloria varia quærebant sitis incitamenta, pumicis farinam, aut cicutam, vt metu mortis bibere cogerentur. Hoc in vno instituto Machometus, alioqui salacissimus legum conditor, non damnandus est, quia vinum gentibus lege sustulerat, vt ebrietatis portentosam libidinem, iucundumque

in homine nefas adimeret: iis halitus scilicet idi non sunt, nec aliam quærunt ebrietatem, vnde iurgia & vulnera oriantur; nec mortifera loquuntur, non obliuio fit, faciei pallor, non furiales somni, non tremulæ manus effundentes plena vasa, fiunt: interemtis non putrida iocinora inueniuntur: vnde frequens morborum iniuria habetur. De hac siti loquuti sumus *scholio obser. 29. De capitis dolore ab ebrietate lib. 10.* de qua siti nunc non loquimur, quæ ex mala consuetudine fit, sed de ea, quæ ab aliquo vitio in corpore latitante, aut aliunde orto fiat. Sitiunt itaq; ob oris ventriculi calidam vel siccam, vel vtramq; intemperiem, vel ob humores vitiosos in ore ventriculi putrescentes, biliosos atq; falsos: & non tantum ob ventriculi os, sed etiam ob calorem iecoris, pulmonis, & ieiuni intestini, tam a causis internis quam externis calfacientibus & siccantibus: & fit ab humido deficiente, aut calido superante. A dipsaco serpente morsu, inexplebili siti ardent, etiam in diabete: & ij qui veteri vino indulgent: sic seruus apud Galenum ex veteri vino inexplebili siti laborans, in somniculosus factus, febre ardente oborta cum mentis alienatione, interit. Contra alter in ardenti febre & accrescente morbo, multa frigida epota, & in ventre subinde ebulliente, sitim validissimam passus est, ita vt inexplebili demum aqua potu interiret. Sitiunt & vulnerati sanguinis defectu. Alii quoque ex cibis & potionibus calidis venenatis, ex piscium salsamentis, garo, carne salita: etiam in phlegmatica febre; magis vero ex falsa pituita, in hydropismis. Signa generis per se nota sunt; sed causarum indigent distinctione. Dignosces autem, cum per consensum ab aliqua prædictarum partium inflammatione os ventriculi fuerit affectum, ex propriis signis inflammationum earundem partium. At si primario oblatum sit, nullum tale apparebit indicium inflammationis prædictarum partium. Si ex intemperie calida & sicca, ex iis, quæ superius diximus, facile dignosces: etiam si ex humoribus biliosis vel falsis contigerit: falsi enim & biliosi ventrem mordent, vt diximus. Si quoque ex humoris inopia exciteretur, facile ex infirmi loquela, tum ex iis, quæ præcesserunt, percipies (ita quoque de diabete) & tam causis internis quam externis. Nam ex caliditate & siccitate copulatis, siti premuntur in feb. ardentibus, & adurentibus omnibus, ac æstate, graui æstu. Plurima in lib. de feb. nostris habes exempla. Causæ etiam externæ a vino veteri, tum aliis calfacientibus & exsiccantibus, ab ægris vel astantibus cognoscuntur. At si ex contrariis causis sitis nulla est, hoc fit, quia sentiendi facultas demortua est in ventriculo; idque in febribus ardentibus & maximis exitium denuntiat. Est cum, præfente iusta causa sitis, non sitiunt; tantum qui febricitant: tum quia, vt modo dicebatur, exstincta est sentiendi facultas ventriculi; tum quia a capite humiditas defluit, atq; inde irrigatis partibus, vnde sitis incendi solet, non sitiunt. Verum ingentis sitis, de qua modo loquimur, non parui facienda curatio est, cum si nimium inualescat, ex ea ægri perire possint: quæ admodum Gal. nonnullos vidit immodice sitientes

3
Que pars affecta in siti.

Quis affectus.

Grati potiores.

Ceruissa.

4

Causa.

6
Signa.

Signa causæ.

7
Signa prognostica.

8
Curatio.

perire ex diuersis causis, ac modis quoque diuersis; ut patet apud eundem libro 1. *De causis symptom.* Quomodo sitis curetur, passim in libris nostris. *De febribus* aliquando diximus, & præcipue lib. 7. *observ.* 24. de siti valida in feb. biliosa, præcipue in scholio, non solum quomodo sitis curetur in febricitantibus, verum etiam quomodo illi curentur, qui ex siccitate sitiunt, & qualia illis viilia sint: deinde qui ex copia caloris sitim experiuntur, vel ex siccitate & caliditate sitiunt, vel ex humore bilioso, vel pituita salsa, aut ex partium inflammatione. Sed quod ad præsens negotium attinet, causæ ipsius sitis considerandæ. Nam fit ut aliquis sitiat post cibum, uti solet contingere iis, qui carnes salvas vel aliud quippiam salsi ingesserunt: fit ante cibum aliquis sitiat, oportet alterum duorum esse, aut humorem biliosum vel falsum in ventriculo collectum, aut siccitatem ob insignem aliquam euacuationem urinae, aut sudoris, aut aliam a medicamento factam. Si propter siccitatem pulmonum aut tracheæ arteriæ proveniat, tunc fit vel a febre calida & ardente, vel ab aere inspirato nimium exsiccante. Curatur itaque sitis, si sine materia sit, potu humido, ut aqua sola, vel paucio vino permixta, aut aceto etiam multum diluta, aut syr. viol. de cucurb. & aliis humectantibus & refrigerantibus. Idem faciendum, si ab esu rerum salifarum fiat. Sin ob exsiccationem tracheæ arteriæ & pulmonum fiat, magis inspiratione aeris frigidi, quam potu recreantur: ob id oportet fenestras aperire, per quas aura lenis ingrediatur, ad aeris cubiculi refrigerationem & agitationem. Inspergere oportet folia salicis, lactucæ & aliorum frigidorum & humidorum, maceratorum prius in aqua & aceto. Si a falsis humoribus, vel biliosis, euacuatione illius humoris, & alteratione opus est, quæ fiet frigidis & humectantibus. Si igitur humor (inquit Alexand. Trall.) in ventriculo habetur biliosus aliquod refrigerans & humectans adhibeto: quemadmodum etiam, si pituitosus fuerit, & id quod redundat, facitque sitim, falsum, ea quæ eiusmodi humorem repurgent, & abstergant, offero. Ego sane (inquit idem) noni eiusmodi sitim a salsa pituita ortam, per falsos cibos finitam fuisse, ut salsamenta & capparum. Quare non semper refrigerantibus humectantibusque utendum est: sed ubi causam accurrate distinxeris atque internoueris, tunc tandem congrua adhibenda curatio est. Proinde iis qui ex siccitate, humectantia; illis autem qui ob caliditatem, refrigerantia; aliis vero, qui ob falsam pituitam detergentia conueniunt. Ita quoque si post largam aliquam euacuationem fiat, cremore hordei, vino bene diluto insperso, aut iusculo pulli sine sale sedabitur, in quo decocta sint semina frigida maiora & herbæ humidæ. Si ob linguæ & palati siccitatem, abluant sæpe os aqua frigida, additis duabus vel pluribus guttis aceti vel vini albi. Ad mitigationem sitis in febribus, cum timemus nimium potum, vel ob hydropis periculum, vel ob fluxum ventris, imperamus ut teneant in ore vel pruna, vel cerasa sicca macerata in aqua frigida, & frequenter mutant; aut frustum pomi, aut ex muc-

Sitis quomodo arceatur.

cilag. cydon. & psyllii vel gummi Arab. extract. cum aqua viol. remedia paramus; potius quàm cum aqua rosar. cum illa exsiccet: sed propter odorem gratum non nihil eius apponi potest; nisi dolor capitis adsit. Radix glycyrr. recenter e terra euulsa masticata, sitim sedat. Vide apud Alexand. catapotia ad sitim arcendam; & ad febricitantes, quibus parum bibere conducit: item ad insolatus & profectioes, ubi sitis urget dulc. radicle 3 vj. semin. cucumer. sativi 3 iij. trag. 3 ij. leuigata in unum misecto, & albuminibus ouorum adiectis subigito, fingitoque catapotia, sub lingua continenda. Si plura desideres de feb. vide lib. 7. *observ.* 24. & quæ Donatus ex Galeno, Aetio, & Paulo collegit. Si ex defectu potus contigerit, abundanter tribuatur viribus consentientibus. Si ex diabetica dispositione, ea curetur. Si ex caloris copia ob edulia calida, vel merum vinum, medela erit frigide potus, ex Gal. 6. *De morbis vulgar.* & Aetio lib. 5. cap. 11. Si stomachus aestuat, succus rad. dulc. vel radix ex aqua, & thyrsi lactucæ conditæ. Si ex inflammatione iecoris vel aliorum viscerum illa prius curetur: ita quoque si ex pulmonia fiat. Si a veneno, illud prius curetur: deinde adhibeantur quæ sitim sedant. Et ita quoque si aliorum membrorum communicatione fiat, blandienda sensim est, donec morbi curentur. Et quæ ex œsophago & gula arefacta euenit, somno (ut Hippo. scribit) si datur. Prosumt & gargarismata, hordeacea, & cibi frigidi assumpti. Hæc de siti. Si plura desideres, vide Alexan. Benedictum Veronensem med. lib. 11. cap. 25.

OBSERVATIO XII.

De Singultu.

OS ventriculi aliquando conuulsione afficitur; quæ a Græcis λυγμός, ab Hippocrate aliquando λυγξ dicitur, a Latinis Singultus: & est quidam motus vehemens ac violentus stomachi, quo rem infestantem expellere conatur, ex Gal. 3. *De causis symptom.* & comment. aph. 39. lib. 6. Fortior & vehementior est ipso vomitu: Nam quæ vomitu expelluntur, in capacitate stomachi continentur: In singultu vero villis stomachi impactus est humor. Atque hoc modo differt hic motus a vomitu. Afficitur hic os ventriculi, ut 3. & 5. de loc. affect. constat, eo quod sit exactioris sensus: quam, iuxta Galen. comment. aph. 3. lib. 7. non solum os ventriculi, sed totus ventriculus ipse & pars ea, quæ proprie stomachus appellatur (gulam nominant) affici potest; licet non adeo exacti sit sensus. Continetur autem sub communi genere motuum illegitimorum seu deprauatorum, 2. *De causis symptomatum*: & sic est symptoma in genere noxæ functionum naturalium ipsius stomachi deprauatarum; duarum nempe, tam expultricis interdum quam retentricis; primo expultricis motus non legitimus; secundo loco retentricis; de qua vide Galenum & Donatum. Bifariam autem generatur, vel ex repletionem, vel ex inanitionem: aliquando & febricitantibus oboritur, ut exemplo ostendimus lib. 5. *De febre.* *observ.* 15. ubi etiam in scholio agitur de singultu, qui erat ex repletionem. & lib. 7. *observ.* 31. de singultu cum feb. acuta. Ad-

Singultus quid a vomitu differat.

Causa.

demus & hic vnum exemplum: Pastor ille in pago Rysvickio, homo crassissimus, statura oblonga, per antiphrasin *Nicolaus parvus* dictus; vir si quis alius ventricosus & gulæ deditus, post febrem satis continuam & fluxum ventris ac vomitum, incidit in singultum. Huic, cum ab omnibus pro deplorato haberetur, decoxi *semina anethi, carui, & portulacæ, & papau. albi in ceruisia tenuiore.* Ex quo decocto tantum cyathum vnum bibens, miraculi instar, præter omnium opinionem, a singultu hic curatus est. Quanquam idem valde ingluuii deditus & inordinate viuens, quo ad potum & cibum, alioqui homo satis senex, post annum in hydropem incidit, ex qua etiam obiit. Sed illi, qui singultum in tertiana habebat perdurantem 3. diebus ac noctibus, Ioh. Tiengius decoxit *m. j. semin. anethi ligati in globulo, in duabus pintis ceruisia,* quam æger bibebat calide. Prius tamen illum purgauerat cum *cassia & diacatholico, cum decoct. end. cichor. viol. fum. borag. bugloss. hordei mundati, semin. 4. frig. maior. prun. & sena, obfubrem, in sero lactis;* & post decoctum anethi sumtum stomacho applicabat sacculos in aqua calfacta positos, & expressos ventriculo applicabat: *Æ florum chamomill. meliloti, anethi ana m. j. orig. calaminth. ruta, ana m. ss. incidantur, & fiant duo sacculi;* quibus remediis cessauit singultus. Oportet autem in singultu curando (*ut in scholio latius*) causam prius animaduertere. Sic ille, qui singultum habebat ex ventositate, sequenti remedio euasit: *Æ philonii ʒj. diagalanga ʒj. detur cum vino.* Alteri & hoc sequens profuit: *Æ theriaca optima ʒj. pul. diptami ʒ ss. exhibitum fuit cum vino exiguo.* Quemadmodum alteri cuidam Antverpiano, qui per continuos 10. dies ac noctes singultum habebat, frequenter exhibitum est cochlear vnum calide ex sequenti decocto: *Æ rad. enule recentis ʒ ss. coquatur in aqua fontis ad lb. j. dulcoretur saccharo.* Deinde sub noctem vna vice accepit ʒ ss. *philonii Romani;* & statim cessauit singultus: quamquam & stomachus inunctus est oleo *mastic. cotoneor. & tereb. & absinthii;* corpore tamen prius repurgato cum electu. de *dactylis & succorof.* Noui vetulam octuagenariam, matrem vxoris illius Ortelii a regina Angliæ missi ad comitia Batauorum: quæ per semi-annum subinde singultiebat; remediis nihil iuuantibus, nisi deuorato *loch sano,* quo se tantum iuuari asserebat. Quæ vetula postea relicto singultu, etiam nunc cum hæc adderem, vivebat; quamquam post duos annos lecto perpetuo incumbens, viribus exhaustis vitam finiuit.

S C H O L I A.

5 SINGULTUS causæ inanitio & repletio. Qui ab inanitione, fere lethalis est. Sequitur insignes euacuationes, vt sanguis e vulnere, e locis muliebribus, aut aliunde: sequitur dysenterias, dyarrhœam, & cetera eiusmodi: ardores quoque & graues inflammationes viscerum. De quo priusquam præsagium instituas, vide num sit a repletione: minus enim periculosus est, sæpeque cum multa

per ventrem euacuantur, singultus a repletionem est; quia pars materiæ, quæ a reliquo corpore confluit in venterem, tunicis ventriculi imbibitur: quod etiam huic nostro agro, viro ingluuii dedito, eveniebat; licet multa per vomitum & fluxum expelleret; & quum adhibita essent partim ventositates expellentia, partim quæ biliosam materiam reprimerent, *ut sem. portul. pap.* hic curatus fuit. In febre licet periculosus est singultus, nisi sit criticus, & signa coctionis manifesto appareant: sic enim sæpe indicat crisin vomitione futurâ. Ita hic singultus primo ante vomitum, postea etiam post vomitum, nihil mali intulit. Cû tamen vomitus, qui remedium esse debet, singultum gignit, ab inflammatione cerebri vel stomachi metuendum. Et hic vomitus malus cêsetur, vt singultum gignat; quemadmodum a sanguinis fluxu singultum malum ait Hippocrates, sed Galenus recte addit, *ut plurimum.* Quod & Hollerius vidit in nobili quodam quinquagenario, vel seniore, e familia *D. d' Antragues,* cuius ille erat œconomus. Effusa enim incredibili sanguinis copia, euasit a cõuulsione, deliquis animi, singultu, adhibita cucurbitula: & sanus superuixit. In histericis vero ab vtero non ita periculosus est singultus. Ab inflammatione vteri deteriora musculis & ossibus temporû lethalis. In inflammatione hepatis sæpe etiam lethalis, *ut experientia bis aut ter vidimus.* Curatur multis modis, pro varietate causarum. Si a frigidityte, calfacientibus, teste Galeno & Aetio; tum cibus, tum medicamentis. Ruta in potu cum vino, apium, cuminum, calamintha, pulegium, dictamnium, nardus celtica, quodlibet per se aut mixtum aquæ mulsæ decoctæ: vel etiam seleti & daucus, & castoreum ex Galeno, Aetio & Paulo: etiam sumendo *diacalaminth. vel arom. rosa. vel diacynam ʒj. cum paucio vino.* Ventriculus quoque fouendus oleo rutaceo, vel in quo cuminum aut absinth. decocta sint: vel exterius inungendo cum oleo nardino, costino, mastichino: & laccelli ex vtraque *mentha, abs. calamintha, pulegio ana p. j. macere, cariophyllis, ligno aloes, mastice ana ʒj. vino albo aspersi & apposui.* Si etiam ex frigidi humoris copia, & viscosorum, tenuantibus & incidentibus vtendum, *oxymel. scyllino iuxta Trall. Aetium & Paulum;* & ita si pituita viscida sit infarcta in tunicis, quæ illam incidât, detergeant, euacuent, propinanda, etiam per vomitum, cum *acetoso syr. simpl. & oxymel. simplici & scyllino;* & si non vomant satis, pilulæ de hiera exhibendæ: & si agre vomant, per inferna, ex hiera & agarico, vel per clysteres (quod tutius est) purgabimus. Si diuturnus est morbus, concoquendus *melleros. oxymel. syr. de byzantiis, de stœchaæ,* si sine feb. fuerit: fugienda quæ abstringunt, vt *syr. menth. absinth. nisi facta iam euacuatione humoris* tunc enim conueniunt ad corroboracionem ventriculi; alioqui materiam infarctam magis impingunt. Concocto humore, rursus euacuandum cum *pilul. coctis, de hiera. de electis iij. gra. castorei.* Post illâ euacuationem *syr. de absinth. cõuenit cum aqua mentha, & diagal. & diacynam,* & exterius fofus iam dicti calfacientes, discutientes flatus, *ex oleo*

Prognostien.

6

Curatio

7

Ex frigidit
humorum
copia.

8

ex oleo abs. aneth. rutaceo: & post fotum vel inunctionem fascia diligenter venter comprimendus. Egregie iuuat aeris retentio ex Galeno, ita & sternutatio curat singultum ex plenitudine, teste Aetio, cuius exemplum posuimus De feb. lib. 5. obs. 15. & in scholio rationem attulimus. Erysimachus medicus in conuiuio Platonis Aristophanem singultientem docet tria remedia singultus: Continere spiritum (de quo lege Gal. de difficult. spirandi 3.) colluere fauces frigida (contracto ad interiora calore, vel obuso sensu) irritare sternutamentum in vehementi, nec aliis auxiliis cedente. Id (inquit) si bis aut semel feceris, etiamsi frequentissimus est, tollitur. Respondit Aristophanes non prius cessasse singultum, quam sternutamento represserit. Galenus in aph. distinguit, si singultus fiat a conclusis humiditatibus: eos enim, qui ex inanitione fiunt, qui sunt rariores, non sanat sternutatio: concusso enim capite & ventre, tum reliquo corpore, maxime nervoso, excutitur materia, quae singultum facit. Sicuti eadem calfacta succussione, tenuataque, partim vacuata & discussa, partim translata in partes ignobiles singultum finit, ut scribitur quarto De rat. v. et. in acutis. Sunt quaedam vulgaria; ut experimentum, quod interpretes Hollerii probari vidit, compresso utrinque ad latera medico digito dextero, vel crassius narratio aut insolita timor, alio videlicet seducta virtute animalis, quae respirationem facit. Cuidam nullis remediis cedebat singultus, nisi vino Hippocratico albo: cui refrigeratum fuisse ventriculum par est. Si singultus fiat a caliditate, refrigerantibus curatur. Si autem vna adsint humores biliosi, acres, corrupti, rodentes, vel corruptis cibis biliosis, si contingat, id ex praecedente victus ratione dignoscitur, & ex ructibus, vomitione, sapore, colore flauo, & calore. Quare non minus erit prouocanda vomitio quam in pituitosis humoribus. Sed his detergentia magis danda sunt, quam incidentia. Humor enim est nimis tenuis, & sua tenuitate ventriculum penetrando, & acrimonia pungendo, singultum facit. Galenus & Aetius vomitum medelam esse satis putant. Syr. end. simpl. vel compos. dari potest ad humoris concoctionem, & vomitus prouocationem. Sed quando ad vomitionem datur, cum aqua tepida vel aqua decoct. hordei in magna quantitate & tepidus est propinandus: post cuius assumptionem debet corpus moueri, & ventriculi regio saltem confricari. Quod si non vomant, Rondeletius exhibet cyathum unum decoct. glycyrr. vel passul. cum syr. dictus, aut cum multo saccharo, aut hyaromel bene dilutum. Quod si opus est leui purgatione, adhuc detur infusum rhab. cum decoct. passul. vel hordei vel glycyrr. vel cum syr. ros. laxatum. Valent & clystres, a quacunque causa fiat singultus, ad humoris deriuationem. Trallianus ubi recrementa rodentia & corrupta fuerint, vitur contemperantibus & abstergentibus: vinum his circumcidit, & omnia acia decocta: vitur aqua temperata & pane ea imbuta, ptisana, copiosa, piscicula qui aceti paululum habeat, & pullis columbarum. Abstinet a purgationibus. His valet intybi succus potatus,

Curatio singultus a caliditate orti & ab humoribus biliosis.

10

cucumeris semen excorticatum tritumque bibitum, & lactuca semen & portulacae succus, vel ipsa portulaca in cibo sumpta, & myxarum decoctum in posu. Lac asininum, caprillum; syr. viol. nymphæ, pap. Sic & a serosis humoribus medicatisq; & mordentibus vomitu praecedente: quibus si mordacitas non alteretur, abstergetur, discutietur iis, quæ sensus stupefactionem inducunt; opus erit, ex decreto Galeni & Aetii, 3) ph. loni vel the. riaca recentis; sed cum cautione. Exterius valent oleum rosaceum, caton. pap. nymphaea. Si ab alimentis vel medicamentis acris factus fuerit singultus, citra magnam plenitudinem, praesens remedium est, oleum amygd. dulc. recens, vel oliuinarum, vel butyrum assumere, vel ptisana cremorem, vel multum aqua frigida bibere, modo ventriculum non habeat imbecillem. Exstinguit enim medicamenti acrimoniam, & sensum minuit. Ligaturæ fere in omnibus causis fieri possunt quia inducendo dolorem singultum sedant. Verum si ob ipsius ventriculi aut alterius visceris inflammationem singultus fiat, ex eiusdem inflammationis curatione sedabitur: ita nos in quodam rustico inflammatione hepatis laborante & postea singultiente fecimus: qui prius secta vena & aliis remediis adhibitis ad inflammationem hepatis, & frigida ventriculo adhibendo, curatus fuit. Ita quoque si ex abscessu vel vlcere ventriculi contingat, eius curatio petenda ex propriis locis. Recte dixit Trallianus, Si ob euacuationem aut febrem singultus accedat, non dubie etiam firmiter perseverans, tunc ob siccitatem immodicam affectus oritur; & talis meruo quidem periculosus est. Quare in eiusmodi humectantibus & refrigerantibus auxiliis, praesertim temperata aqua creberrima, conelione, & omnibus quæ euacuatis adhibentur, utendum. Non autem quendam (inquit idem Trallianus) ex iis, qui ob hanc intemperiem singultuunt, frigida sorbitione conseruatum. At in inflammatione, ea, quæ actu frigida sunt, vitari debent: magis etiam continue tepida utendum, paulatim eam sorbendo: extremas autem manus calidissimas frequentius madefacere oportet: & pedes deligare, continereque non est alienum. Eadem cauenda, quæ de ventriculi ac hepatis inflammatione dicuntur. In inanitione etiam si desperata res est, iuuandus tamen æger distillatis, colaticis, iusculis & expressionibus, cibis humectantibus, inunctione dorsi & ventriculi, ex oleo viol. hydrelæ quoque. Ita etiam si ex euacuatione ortus fuerit singultus, curabitur per alimentum conuentionis assumptionem, & per ea, quæ def. ctum explent, Aetio teste: & si perseverauerit adhuc immodicus sanguinis fluore aut alui profluuium, iisdem prospiciendum erit. Inanitione etiam conducit oleum amygd. dulc. potum per se, aut cum aqua tepida pariter: & ptisana cremor per se, vel cum contrusa pullorum carne. At egrotanti, quem hisce diebus inuimus, singultus ab illo ortus, malum portendebat, ex aph. 10 lib. 7. & magis, iuxta Aetium, singultus in altiore sopore, aut animi deliquio, aut tetanis obortus, mortem non longe

Ab alimentis vel medicamentis acris.

Ab inflammatione ventriculi vel alterius visceris curatio.

12

Si ob febrem fiat.

13 Ex inanitione curatio.

14
Singultuosa
febres.

abesse præfagit. In herniosis senibus sæpe fiunt singultuosa febres: in quibus singultus non curatur, nisi reposito intestino. At si reponas vi, paulo post moriuntur. Anno 1547. (ut refert interpretes Hollerii) iuxta ædem S. Stephani de Saxi, puella assidue singultiebat: nihil deglutiebat, dolore facto in œsophago. Antea pulmonibus bubulis largiter vsa fuerat. Huic grauitas in stomacho, nausea, vomitus. Frustulum tamen pulmonis, quem ederat, in œsophago resistit. Cucurbitulis & idoneis remediis tandem reiectum frustulum: sicq; liberata est. Refert quædam remedia Trallianus contra singultum physica: sed quia superstitiosa, ea relinquemus.

OBSERVATIO XIII.

De Nausea, ex lacte concreto in stomacho, cum pessimis accidentibus.

MVlier 25. a. n. agens, Amstelrodamo Alcmariam venerat, mense Maio, anno 1550. recreandi se causa, vna cū marito, & vt cum amicis se oblectaret. Quæ cum copiose florem lactis seu crema deuorasset, ac vinum rubrum stypticum superbibisset, lac in ventriculo concretum, pessima symptomata intoxicati similia produxit: inprimis nausea sine vomitione afficiebatur, cum ingenti ventriculi dolore; adeo vt syncope subsequeretur & anhelitus præfocatio; ita vt astantes illam morituram putarent. Ad hanc accitus (que tunc ad fossam nouam in adibus Laurentij Gualtherij cognati nostri decumbebat) statim decoxi florum chamomilla m. j. sem. anisi, fœniculi ana ℥j. in aqua communi: & huius colaturæ capiebam ℥ij. cui addebam aceti vini modicum, & Zaccchari nonnihil; ac totum tepide propinaui. Quo remedio lac concretum dissolutum est, atque illa ipsa in vomitum prorumpens lac concretum vna cum vino euomit; & accidentia iam dicta magna ex parte sedata sunt. Glande etiam imposita ex melle ℥j. pulu. hiera picra ℥ij. diacryd. gran. ij. salis parum, ad diuersionem: aluum quoque excreuit. Insuper his tabulis vtens statim conualuit: Recipe pul. calamenthi ℥ij. specier. diacymini ℥j. marg. perfor. & non perfor. subtiliss. tritar. ana gran. iij. dissolutis in decoct. aqua flor. chamomill. & meliss. adiecto Zaoch. q. fiat confectio in tabulis. Venit nobis tunc in mentem id, quod Gilbertus Anglicus lib. 7. De venenis cap. de sanguine & lacte concreto in stomacho, scribit, quod sentiat frigus corporis & præfocatio anhelitus, vti huic mulieri contingebat. Is abstinere iubet a salitis, quia faciunt caseitatem. Dat acetum cum aqua in potu, cum succo calamenthi ℥v. Quia statim resoluit lac, & prohibet lac a conglutinatione. Sed quia flores chamomillæ erant ad manum, commode iis vsi sumus, cum ad nauseam faciant, & præcipue ad dolorem stomachi. Sed eo non vitur Villanouanus in grauidis; in quibus abortum mouet, ut ille refert. Sed hæc grauida non erat. Aliquid calamenthi in tabulis probe miscuimus.

S C H O L I A.

QVod ad lac concretum attinet, ad venena pertinet. Quod autem nauseam incitarit,

quæ nihil aliud est, quam appetitus vomendi sine effectu, signum erat iam lac concretum, vna cum vino, in ventriculi tunicis fuisse infarctum, vel intra tunicas collectum. Verum cum vomitio succederet, nausea cessauit. Quæ etiam fieri solet, vel ob obiectum nobis parum gratum; vel ob alimentum putrida & male olentia, quæ assumere ventriculus refugit; vel ob recrementa pauca tunicis ventriculi adherentia, aut intra tunicas collecta. Quare si nausea a viscidis humoribus adherentibus fiat, oxymel dandum, vel syr. acetosus. Si a bile detergentia sola sufficiunt, ut decoctum hordei, cum Zacccharo, vel cum syr. end. simpl. vel addendo parum succi ros. diluti aqua tepida; vel magnam copiam decoctionis pulli, cum multo Zacccharo assumere, & postea digito in os immisso vomitum prouocare. Bilis facile euacuatur, & detergetur: pituita magis contumax est. Quare decoctum raphani cum syr. acetoso dandum, vel cum decoct. rad. & oleo vel butyro rancidis, vt vomant facilius: sed magna quantitas est propinanda; vel vinum vel ius multum assumendum est, vt eorum copia ventriculus stimuletur ad vomitionem. Deinde pilulæ dandæ de hiera, cum agar. formandæ cum oxymel. dandæ vero manesunt, & detur decoctum asari pro vomitu, ante vsum pilularum: deinde ventriculum corroborare oportet. Alii sub vno capite tractant de supinitate, Græce ὑπινιασμός, de stomachi subuersione, quæ a Græcis vocatur ἀνατροπή, & nausea, Græcis ναυτία dicta, quam alii ναυνησιον appellant, & de vomitu. Differunt tamen hæc voces, licet ad deprauatum motum ventriculi pertinent, prout diuersimode offensus ventriculus ipse a diuersis causis fuerit. ὑπινιασμός τὸ σωμαχόν, Latine supinitas stomachi appellatur: qui effectus contingit quandoq; iuxta intemperie quamcunque ipsius stomachi, citra tamen vitiatos humores: fit etiam propter humiditatem multam quidem, non tamen malignæ qualitatis, ut constat ex Galeno 8. De composit. medicamen. secundum locos: Irriguus enim stomachus (vt ipse inquit) per largam humectationem, similiter vt ligamenta nervorum lassatur. Ανατροπή a Græcis, a Latinis Subuersio dicta, indifferenter duo significare poterit, ex Galeno. Nam quandoque appetitus perditionem sic appellare possumus; interdum vero nauseosas affectiones ab accepto cibo fientes: contingit etenim quandoque hoc vnum solum symptoma accepto cibo; vt si paulo fortiori motu moueantur, statim vomunt; vti fratri meo Theodoro Foresto contigit. Appellant etiam aliqui tales stomachicos. At si anorexiam, hoc est, perditionem appetitus, significat, antea eius curationem conscripsimus. Si accedat sumto cibo, paulo fortiori motu, & statim vomant, tunc curabitur vt nausea, & vomitus, cum parum a nausea discrepet; quādo a modice vitata humiditate exoritur. Verum si ob oris ventriculi solum fiat imbecillitatem, curabitur vt supinitas. Supinitas autem facillime curabilis est, quia aut astringentibus solis, aut quæ siccare humiditatem possunt, ac constringere laxatum corpus, tollitur. Græcis vero ἐμετός

Causa.

Curatio.

ὑπινιασμός
τὸ σωμαχόν,
supinitas sto-
machi.

ἀνατροπή,
Subuersio.

Nausea.

quos vo-
mitus, nau-
sea, vomitio
et nausea.
Nausea cum
vomitu con-
uenientia &
differentia.

6
Nausea.

Vomitio
quid.

Pars affecta

Affectus
præternatu-
ram.

7
Nausea si-
gna.

Nausea &
vomitus
causæ.

Curatio
nausea.

8

ἐμετ & a Latinis *vomitum* dicitur. At hic vna cum nausea (quam Græci *ναῦσις* seu *ναυτίσις* appellat) magnam cognationem habet, ac vnus affectus reliquum præcedit. Nam nausea vomitionem præcedit; licet non perpetuo ad nauseam vomitus consequatur, cum nonnulli nausearint, nec tamē vomuerint, *Galen. teste. 2. De caus. sympt. & Paulo cap. 7. lib. 2.* Nonnulli vero turbantur; sed nihil euomunt, humore ipsis tunicis imbuto: quæ nausea deprauatus est quidam expultricis facultatis ventriculi motus; quo vter ipse ea, quæ eius corpus contristat, quam citissime per stomachum euacuare appetit. Vel breuius, irritus quidam est conatus ad vomendum, & inanis quedam vomendi irritatio, quæ interdum ad vomitum impellit, interdum & citra vomitionem fit; *ut ex Galeno declaratum est.* At vomitus, parvus quoque est eiusdem facultatis expultricis ventriculi motus, quo ea, quæ in eius capacitate, seu latiori spatio existunt, ac ipsum contristant, & in se fluitant, reiciat quam citissime per stomachum, *eodem Galeno auctore, lib. 2. De caus. sympt.* In vtriusque afficitur (*ut ibidem liquet, & 5. De loc. affectis*) os ventriculi: vel est affectus totius ventriculi, cum ventriculus per se & quandoque per consensum afficiatur. Est autem vtriusque symptoma modo expultricis facultatis, præter naturam, modo naturalis, *ut ex Galeno constat, & longiore sermone ab Alimaro explicatur cap. proprio.* At nausea cognoscitur, quando ipsa in illa inani vomendi irritatione lancinat tantum ventriculum ipsum, & nullum humorem educit, *Actio teste.* Distinguitur etiam a subuersione; quoniam ea non nisi cibo assumto; hæc autem sine cibo assumto fit, *iuxta Paulum, lib. 2. cap. 54.* Quamuis Galenus aliam præter hanc asserat diuersitatis causam, quoniam ea aut propter solam ventris debilitatē, aut cum vitiatæ alicuius, modicæ tamen, humiditatis complexu fit: hæc vero ex multa, & etiam valde vitiatæ, citra quoque cibum afficitur. Vomitus autem signa frustra quispiam conscribere tentauerit. Verum a nausea ipse differt, quia per vomitum perpetuo aliquid excernitur; per nauseam nequaquam, *ut iam diximus:* quamuis eam vomitiones interdum conlequantur, *ut diximus;* interdum vero non. Et, ut summam complectamur, nausea & vomitus causæ duæ sunt præcipuæ; nempe copia, vel humorum vitium seu prauitas: copia nempe ventriculo grauando; prauitate morsum inferendo. Vide plura de his apud *Galen. 2. & 3. De caus. sympt. & 8. De compos. medicam. secundum locos, & apud Alexand. cap. 13. lib. 7. & reliqua apud Alimarium.* Quæ causæ facile innotescunt exemplis sequentibus de vomitu, quales sint succi, qui eam moueant. Ita biliosi vel serosi in ore ventriculi in nausea absorpti sunt; viscosi vero ori ventriculi infixi, *ut Trallianus docet.* Ex quibus modis nausea curetur iam diximus. *Vi. de eundem lib. 7. cap. 13. De nausea & vomitu.* Copiosos euacuabimus; prauos & vitiosos contemperabimus, & malignitatem ipsorum imbecilliorum reddemus; præsertim vbi biliosi & melancho-

lici fuerint: pituitosos extenuabimus, & crassos & viscosos; crudos vero in solo ventriculo redundantes & non ex toto influentes, medicamentis non sollicitabimus, sed victu curabimus, & humores in ipso contentos immutabimus. At si ex toto corpore influant in ventriculum, medicamentis maioribus utemur, modo per sanguinis extractionem, si abundet; modo per purgationem, si magna prauitas humoris existat. Si in nausea nihil efferatur, humores iam imbibiti sunt ventriculo: qui vomitu, ut diximus, expellendi, &c.

OBSERVATIO XIV.

De Vomitu, & Nausea præcedente vomitum.

FRigidos succos puella ex esu fluctuum horariorum in ventriculo longo tempore collectos habebat: unde in ore ventriculi frigus sentiens, immodice cibum appetebat, minimeque siticulosa erat; & sæpe sentiebat in ore acidam qualitatem, ita ut cibi quoque in ventre acrescerent. Aderat & huic aliquo tempore pondus quoddam, & tensio quædam circa ventriculum; ita ut subinde cibum ferre non posset ventriculus, & nausea afficeretur. Ad vomitum excitabatur, & cibum subinde euomebat, uti nobis narrabat. Ita ut hæc pallida, & cachexia quasi affecta, si cibum copiosius sumisset, nausea & vomitu corriperebatur. Nullam medelam adhibens, tandem & sine cibis tensionem & pondus sentiebat: ita ut coniceremus etiam copiam humorum adesse, nempe succorum frigidorum; quod postea etiam cognouimus, ex vomitu nauseam subsequente, cum humores pituitosos crebro intenteque, nulloque insigni spatio interposito, euomeret; ita ut & stomachum primario affectum esse perceperimus, & redundantes humores in eo esse genitos. Deinde, quia vomitus statim post nauseam oboriebatur, & citra vehementiam vomiebat, intelleximus quoque humorem noxium in lato ventriculi spatio esse, cum & in stomacho fluctuaret. Ideo cognita iam causa, succum pituitosum ac frigidum esse, præcepimus ut in aere calido versaretur: & quia iam in hyeme eramus, ut in cubiculo semper focum luculentum haberet, imperauimus: ut etiam somnus, quies ac inedia moderata essent: nam per moderatam inediam, *iuxta Trallianum,* non solum pituita alteratur, & extenuatur, verum etiam in sanguinem benignum probumque conuertitur; ut eiusmodi quoque humor per inopiam alimenti nutrire possit, præsertim vbi dulcis fuerit: sed hic parum acida appetitum edendi magis inferebat. Interea tamen, si vires inediam moderatam ferre non possent, carnes concessi potius assas, ut gallinarum; pullorum gallinaceorum. Columbarum iuuenum, phasianorum, perdicum (cum satis diues esset) turturum, turdorum, merularum, leporum, adiectis quibusdam odoratis, garyophyllis, cinnamomo. Pro potu concessi, vinum ruffum, aliquando subadstringens & vetustius. Vinum namque ad hoc calefacit ventriculum, ut in qualitatis eius calorem non intendat, licet eiusdem substantiam augeat. Ceruissam absinthitem si aliquando bibere veller,

concedebam: & ut in fine mensæ exiguum diacydonii cum speciebus fumeret; nihil deinde superbibens aut edens. Excrementa quoque subducebam alui, natura vel arte, fere quotidie: & imperabam ut omnes immodicos animi affectus vitaret. Quantum ad medicamenta attinet, si difficulter vomeret, dabam cochlear vnum atque alterum oxymelitis simplicis, modo scyllini. Sed quia facile vomebat, sufficiebat oxymel simplex. Interea decocto vfi sumus in hunc modum calfaciente & nonnihil incidente, & pituitam concoquente: *Calamintha, mentha, hyssopi, serpilli, pulegii ana m. j. absinthii m. ss. rad. feniculi, cappar. ana ss. seminis feniculi ss. j. sem. anisi ss. j. fiat decoctio in aqua communipro lb. j. coletur & aromatizetur cum ss. j. cinnamomi electi, & ss. j. arom. ros. sine musco, addendo oxymelitis simpl. ss. j. syr. menthacei ss. j. & clarificetur.* Deinde purgavi ventriculum cum pilulis ex aloelota, & hierapicra ana ss. componendo ex iis pilulas septem; quas mane deglutivit. Postea dedi subinde syr. menthaceum & absinthii, & species diacinnamomi, diarod. abb. & arom. rosati in rotulis confectas; singulis ss. iij. ponderantibus: ex quibus vnum quotidie sumebat, parum vini absinthii superbibendo. Interea ceratum ex mastiche, olei nardini aliquot guttis additis, ventriculo imposuimus; prius inuncto oleo nardino, menthaceo, & maceris, aliquot guttis olei caryophyll. adiectis. Quibus hæc probe curata fuit: quemadmodum altera mulier Alcmariana, annum 26. agens, quæ in insigni felis, in platea vulgo *Dronkenordia* dicta habitabat. Laborauerat autem per vij. continuos dies vomitu pituitoso, vix aliqua interposita mora, cum ingenti stomachi dolore ac torsione. Ad quam ingressus, mense octobri anno 1547. inprimis sequens decoctum propinaui: *Decoctionis hordei communis chalibeata lb. j. ss. syr. de mentha, mellis ros. colatiana ss. j. ss. minae coroneorum ss. j. misce.* Primo die, cum cyathum vnum sumisset, euomit. Secundo die, cum valde debilis esset, & continuo euomeret, sine febre, rursus dedi cyathum vnum, & retinuit: & ex reliquo sumebat bis in die. Deinde ad maiorem constrictionem, cum semper magis debilitaretur, præscripsi conditum sequens & vng. *Conserua ros. veteris, conserua roris marini ana ss. corticum citri conditi ss. iij. spec. diacymini, arom. ros. sine musco ana ss. specier. diarod. abb. ss. j. diacydonij cum speciebus ss. j. syr. menthacei q. s. fiat conditum: capiat læpius: Conserua cum granat. sem. myrtillor. sumach, cinnamomi electi, mastich. corall. rub. ana ss. j. flor. ros. rub. trochis. de carabe ana ss. j. olei mastichini, nardini, absinthii menthacei ana ss. j. cera q. s. fiat vng.* Quibus remediis & hæc curata fuit.

S C H O L I A.

6 *Signa causarum tam nausea quàm vomitus diligenter distinguenda.* IN nausea, uti & in vomitu, diligenter causæ per signa sua distinguendæ sunt, antequam ad curationem accedamus: nam hæc cognitu necessaria sunt, & viro indigent exercitata considerationis. Sicuti enim in succo frigido nullo modo egros siticulosos esse, aut ardorem in ore ventriculi sentire & aciditatem contingit: ita in salsa sitis auge-

bitur, minueturque appetentia, ac fortasse abolbitur; præter id, quod similem quoque sentiet in ore qualitatem. Si biliosi fuerint, oris amaritudo, sitis atque ardor simul cum morfu in ore ventriculi & inappetentia aderit, & assumti cibi in amarum seu nidorofam qualitatem vertentur. Quod si vomitus ad has causas consequatur, facilius per vomitionem redundans succus dignoscetur, tum visu a medico, tum gustu a laborante. Ita & vitiosi cibi deuorati vel corrupti in vomitu, quoque facile percipientur. Et si fuerint saniosi, vel serosi ac tenues humores, non solum ante cibos, sed & post acceptum cibum vomitum inducunt, ut *Aëtius refert 10. cap. lib. 9.* Iam quoque considerandum num in ventrem fluxerint: si enim a toto corpore, plethoricum erit, & ex signis plethoræ habebitur: & si vitiosis humoribus sit repletum, ex colore & eruptionib. papularum circa cutem cognoscetur; atq; ex vrina, teste *Aëtio.* Si autem ab aliqua parte, ut capite, splene, seu hepate, humor ad ventriculum transmissus fuerit, æger ipse primum affecti membri lationem sentiet, vel calorem, vel frigus, vel grauitatem, vel duritiem in tactu. Neq; nausea intensa neque crebra excitabitur, & vomitus leuior, & insigni aliquo spatio interpositus, habitusque totius corporis considerandus: tum qua victus ratione sit vsus, verum frequenti cruditati aut satietati inciderit, idq; in vita otiosa, ac præcipue præter consuetudinem, an contra, nunquid & membrum certo temporum circuitu vexari solitum nunc non vexetur, vel aliqua excretio iis retenta sit: alioqui si crebro intensæq; nullo interposito spatio, ut in puella nostra, contingat, certum erit ventrem per se & primario affectum esse, & redundantes humores in ipso genitos. Si nausea laborant & nihil notatu dignum vomant, humores noxii ventriculo infixi sunt; alioqui fluctantes facile vomunt. Et ita humores mordaces si valde molestant, calidi vel frigidi singultum inferunt; sed non adeo mordaces, nauleam. At a vomitu singultus & oculorum robur, malum, ex *Hippoc. aph. 3. lib. 7.* quemadmodum etiam a tuberculi introrsum ruptione vomitiones malæ, *aph. 8. lib. 7.* & ab ileo malus est vomitus; quando ilei exitiales sunt, ut sæpe vidimus in herniosis, maxime vero senibus, *aphor. 10.* qui, cum nulli clysteres iuuarent, vomitu continuo expirabant. Nausea autem (ut quidam volunt) signum crissimum existit: interdum vero signum malum, ut in febribus pestilentialibus: & quando in conualescentibus multiplicatur, indicat recidivam. Quod nausea in pestilentialibus febribus sint perniciosæ, ratio est; quod qualitatem venenolam arguant. Nausea sæpe decernit vomitum; & vomitus superueniens nausea, eiusdem curatio sæpe existit, si materiam adiunctam habet. At vomitio vtilissima est, si pituitæ ac bili permixta quæ maxime fuerit; si non multa nec crassa sit. Syncerior enim deterior est, siue fuerit porracea, aut liuida, aut nigra; quicunque ex his fuerit color, malum esse censendum est, teste *Hippocrat. 2. Prognost.* Vidimus tamen, inquit *Alexander Trallianus,*

Signa prognostica.

nus, mulierem, inter exempla, mensis vnus interuallo singulis diebus: miram porraceæ cholerae quantitatem euomentem, & conualuisse. Accidit quoque (teste Arculano) febricitanti spasmus aut epilepsia; & euomuit æger humorem floris æris similem, & euasit: vt puellæ istis diebus (cum hac scriberem) euenit, quæ in epilepsia eiusmodi humorem euomuit Delphis, & sanata fuit. Hippoc. bis in mense vomitum in corporibus sanis probauit. Aliis tamen sufficit bis in anno, Vere & Autumno. Nam cum æqualiter fiat, ægrum præseruat a plurimis morbis, & renum & pedum vitiis: diuertit enim ab inferioribus malis, & a superioribus malum eradicat: utilisque est omnibus morbis, qui a materia in ventriculo fouentur: & prodest, auctore Auicenna, ægritudinibus ventriculi materialibus, absq; tamen apostemate aut vlcere. Ideo si rarus est, conuenit: assiduus vero ventriculus viciat & debilitat, imbecillitate abducta: & veluti cloacam proluuiei vniuersi corporis facit. 10 Quidam volût bonum esse in apostematibus hepatis & proprie concavitatis ipsius, ac splenis, modo sit proportionatus materiæ apostema facienti, frequenter tunc bonus existit; vti & in febribus in die critica (vt multis exemplis ostendimus in libris nostris De febribus) modo non sint febres pestilenciales: in iisdem enim niger & male olens, subitam pernitiem denuntiat. Exitiale quoq; admodum est, si quis vomit omnes colores: & vomitio liuida graueque olens ocysimam mortem indicat: vti & omnis subputris & foetidus odor in omni vomitione malus est, eodem Hippoc. auctore. Contingit tamen aliquando (vt scholio obser. 15. lib. 5. De febr. exemplo probauimus) eos curari qui nigram & atram bilē euomuerunt. Niger vt fex sanguinis, malus; nisi in apostemate lienis, aut in fine veris contingat, vt Gradus annotauit. At excrementitius vomitus, cum anhelitus foeditate, intestinorum abscessum denuntiat: in colicis & iliakis pestifer est; quanquam vetula (cuius historiam posuimus lib. 7. De feb. obser. 4.) iliaca per octo dies recrementa reiciens, per me curata fuit. Quod autem interdū vomitus valetudinis causa recte fiat, experimentis credens Celsus approbauit. 11 Commonet tamen, ne quis, qui valere, & senescere volet, hoc quotidianum habeat: vt liquet lib. 1. cap. 3. Vomitus quoq; sæpe singultum clamorū curauit. Et is qui sine febre est, malus tunc esse non potest, quando robur naturę sequitur: etiamsi e cerebro vel toto corpore humor in ventriculum effluerit, vel a iocinore, a liene, aut mesenterio, modo eo tempore neque tumor in hepate, neque in liene sentiatur. Et sic quoque spontaneus vomitus seu arte paratus, iuxta Hippocrat. aphor. 2. lib. 1. Si talia euomuntur, qualia oportet, & bene ferunt, sicut talia quæuis euacuatio utilis est. Sed assiduus ventriculo nocet, peccatori, visui, dentibus, & antiquis capitis doloribus, præter eum, qui fit per ventriculi consensum. Qui cum vermibus est, in feb. pestilentibus, malus, ob putredinem: potissimum si mortui euomantur, cum & omnis vomitus in pestilentibus

febribus (vt de peste diximus) malignus habeatur. Aliquando in aliis febribus vermes reiecti nihil mali attulerunt, vt exemplis in febribus declarauimus.

OBSERVATIO XV.

De Vomitu, ob ventriculum non potentem cibum continere.

Vomitio aliquando fit, quando ventriculus cibum non potest continere. Non continet, vel quia alimenta sunt plura, quam continere possit, vt ebriis accidit: vel quia alimenta nimis sunt pingua, & leuia, aut ordine suo non assumuntur; vt si quis assumat (vt Rondeletius asserbat) magnam quantitatem incisorum, qualia sunt pastilorum caro, aut quæ vulgo pastex en pot Gallice dicuntur; vel si liquida multa ingerantur, post astringentia multa & dura, vel quia ventriculus plenus flatibus, alimentum suspensum in superiore parte continet: aut quia multa dulcia supra alia sunt assumpta, vt pepones, ficus, cerasa, & omnia alia dulcia, vel quæ parantur cum multo oleo, lacte vel butyro: vel si cum suspitione alimenta aliqua assumpta fuerint: vel vbi ex immodica humiditate ventriculi, etiam citra vitiatos humores, fiat, sola quantitate & copia affligente & veluti irriguum os ventris seu ventriculi reddente: adeo vt totum ventrem ob eandem multam humiditatem exsolutum ac laxum habeant laborantes: vti iuuenis quidam, ad me veniens consultandi causa, laborabat; qui omnem cibum facile euomebat, præcipue si butyrum & pingui a sumeret, quibus videbatur delectari. Huic autem omnia paulo ante dicta inhiuimus, & quia videbatur humida tantum intemperies, & aliquantulum frigida, facile illum nos posse curare diximus, modo optimam victus rationē obseruaret. Quare eidem astringentia edulia & potus quoque astringentes, & quæ moderate calfacerent cum quadam astringentia, commendauimus, vt cuniculos paruos assos, & pullos gallinaceos, & columbas iuuenes. Si elixis quandoque necesse esset vti, vt adliceret quædam odorata, vt garyophyllos, cinnamomum, exiguo omphacio addito aut vino odorato. Sicuti enim graueolentia omnia stomachum subuertunt; ita odorata eundem corroborant. Quod si carne veruecina, vel aliis elixis vteretur, id faceret quidem, cotoneis vel mali punici granis incoctis. Et si vino vteretur, concessi rubrum & astringens. Omnia enim his, quæ ori gratia sunt, & actu frigida vel calida, erunt adhibenda; & minime tepida, quæ vomitum prouocant; vti & omnia pingua vitari debent. A cibis cotonea mala vel pyra assata, absque tamen saccharo, commendabam. Medicamenta vero calefacientia, & quæ stomachum roborarent exhibui, & diacotoneum cum speciebus, & aromat. ros. superbibendo exiguum vini absinthii. & exterius ventriculo adhibui linimenta & vnguenta; quæ statim transeunt, & citius operantur quam emplastra, quæ tardius vim suam exerunt: quale hoc est vng. *Recipe olei mastichini nardeni,*

absinthii ana ʒ ss. mentha sicca. cinnamomi, maceris galanga. flor. ros. rub. ana ʒ j. ss. mastice ʒ j. cera modicum, fiat unguentum, ut artis est. Etiam apponebam crustam panis vino & aceto irroratam, asperso pulvere caryophyll. maceris. cinnamomi, calami odorati, ligni aloes, modo puluerem inspergendo, modo irrorando. Adeo ut his remediis hic iuuenis, tum alii plurimi (quibus vomitus tandem cessauit, & ventriculus roboratus est) cupitam sanitatem consequuti sint.

S C H O L I A.

4
Differentia
vomitui
spontanei.

Vomitui non vno modo, sed diuerso ac vario curatur, ut antea diximus, cum plures eius existant differentiae: Nam alius Spontaneus est: atque is rursus vel Criticus est, & laudabilis quidem, ex quo speratur salus morbi, ut quibusdam exemplis ostendimus in libris nostris De febris: Nam criticus plerumque terminus existit multorum morborum, potissimum febrium acutarum, apostematum hepatis, quae sunt in concauo ipsius, & similia: neque hic retinendus, quemadmodum saepe dictum est in obseru. nostris De febris: & ideo sinemus naturam operari, si & coctione praecedente & virtutis tolerantia videatur fore sufficiens; neque enim cibo nec alio remedio impedimus; imo si fuerit diminutus, aliquando iuandus, cum leuibus tamen medicamentis. Si vero excedat & omnino virtutem deiciat, ita ut mors subsequeretur, constringendus erit. Symptomaticus autem vomitus etiam ad spontaneum pertinet, qui etiam accidit magna ex parte in accessione febrium: unde modo Naturalis est, modo Violentus. Et quanquam aliquis laudabilis esse possit, omnis tamen est praeter naturam, ut nos docuimus de vomitu, qui in febre fit: sicut enim fluxus symptomaticus vires deiecit, ut scholio obser. 13. lib. 2. diximus, & ratio aliquid boni adfert; ita & vomitus symptomaticus: quanquam aliquando iuuare possit, modo non excedat; & si excesserit, restringi quoque poterit, uti aliae excretiones symptomaticae, de quibus in febris diximus. Atque ex iis exemplis facile discas num sint constringendae nec ne: & quando symptomaticae excretiones sint bonae vel malae, ut scholio obser. 26. lib. 2. numquid etiam sint impediendae nec ne, inuenies. Alius vomitus est Naturalis,

6
Vomitui naturalis.
Quietus.
Violentus.
Vomitui artificialis, & qualis in ipso obseruanda.

quo natura alleuiatur: alius Quietus, qui accidit stomachicis & facile vomentibus: alius vero Violentus, acutus & aestuosus, ut in cholera, qui & praeter naturam est. Alius est Artificialis, qui praecauet aegritudines futuras, vel praesentes curat. In quo quaedam sunt obseruanda ante vomitum, & in vomitu ipso, & post vomitum. Ante vomitum in primis cauendum, ne vomitus iis prouocetur, qui sunt inepti ad vomendum, vel quibus minus vomitus confert, uti praegnantibus: si enim fortia vomitiua ceperint, facile abortum patiuntur. Difficiliter quoque vomunt, qui stricti sunt pectoris, & villos latitudinales tunicae extrinsecus stomachi debiles habent. Parati vero ad vomitum sunt, habitudinis mediocris, lati pectoris, stricti colli, neque apti ad sanguinis spu-

Qui facile vomunt.

tum; stomachi robusti, scilicet fundi, & debiles secundum os ipsius; & si sint assueti. Ideo Anticenna, praeter iam dicta, quatuor proponit obseruanda ante vomitum: Primum, ut insueti ad vomendum assuescant, leuibus vomitibus; ne subito fiat transitus ad inconsuetum, quae corpus plurimum immutent. Secundum, ut ante vomitum praecedat ventris lenitio, facibus communibus sponte eductis, vel arte, balneo, aut elysmate aut pharmaco leniente. Tertium, ut ante vomitum cibetur cibus diuersarum virium, mixtis ex incidentibus, detergentibus, viscosis, dulcibus, acidis, sed maxime pinguibus, & his, quae diuerso modo parantur tam frictis, assis, quam elixis. Quod si metus sit vomitum futurum diminutum, ex difficultate euomentis, vel ex humorum ineptitudine, milceantur cum iisdem cibus aliqua vomitum irritantia seu vigorantia: uti est eruca, raphanus, ficus, arida, pingues, caepe, porrum cum aqua hordei & melle; melones, cucumeres, vinum dulce, de quo copiose bibat, & cibi non bene mastigentur. Quamuis praestantius erit praemittere cibos bonos, si timeas vomitum non subsequiturum. Quartum est, ut stomachus & extrema sint satis calfacta & collum, pectus: & tempus anni sit calidum, vel hora meridiei, nisi magnus adsit aestus; tunc magis eligatur tertia hora pomeridiana. In actu vero vomendi, cum tepida sumserit hora vomitus, vel paulo ante ipsum, motu inordinato sese moueat, ut cibus in stomacho agitur: oculi fascia circumligentur, ne laedantur, venterque leuiter vsque ad umbilicum stringatur: & cum vomere incipiat, digitis in os immixtis aut penna anseris oleo intincta fauces irritabit, & iteratis vicibus vomitum excitabit, donec stomachus a cibus & superfluitate exoneretur. Situs commodior est, ut sedeat capite inclinato & pectore, quo vomitus facilius procedat. Quod si accidentia difficilia superueniant, danda erit aqua calida; aut enim euomet, aut venter soluetur, & sedabuntur symptomata. Prodest & clyster leniens. Finito iam vomitu, quiescat, & facies lauetur aqua rosei cui parum acetum sit admixtum: vel abluit os cum vino & aqua mixta; & cibum ac potum tardet, saltem per duas horas si possit. Dentur deinde cibi boni odoris, & suavis saporis, paucae quantitatis & optimi nutrimenti, ac paucarum superfluitatum, facilis digestionis & citae penetrationis: & dormiat, neque bibat aquam frigidam, aut alium quemuis potum frigidum. Si excedat, succurratur & inhibeat. Arte igitur cum fiat vomitus, is utilis est in morbis longis, ut in quartana, morbis articularibus, ischiadicis, hydropicis, stomachicis, quibus pituita aut bilis abundat, etiam atra, quae omnibus modis perniciofa est. Morbis comitialibus prodest, & melancholicis, & calculosis: cephalaeam & renum ac vesicae vlcera sanat, ictericos ex oppilatione, epilepsiam ex stomachi vitio, ut in pueris saepe conspeximus: curat & cutis sceditatem: asthmaticos, cardiacos, & paralyticos leuat. Singultus lassitudinem corporis remouet, ut Arist. refert in suis Problematibus.

Leuis

Ante vomitum quae obseruanda.

7

8
Tempore vomitus quid obseruandum.

9
Post vomitum quae sint obseruanda.

Quibus utilis est vomitus.

10.

Immodicus ve-
hement.

Levis vomitus desiderium cibi facit, & a nauseis conciliat stomachum: torpori, somno graui & agrypnocomati viridis vomitus auxiliatur: vel ex humoribus mixtus, & epilepticis ex stomachi vitio, & conuulsis. A superioribus partibus auerit materiam, sensus omnes iuuat, & aciem inprimis oculorum exacuit: & ab inferioribus materiam inanit, si modicus est. At immodicus vomitus vehemensque surditatem & tinnitum, sibilumque affert, & oculorum obscuritates; ac epilepticis obest, si vitio capitis contigerit, & capite dolentibus, nisi ex crapula vel stomachi cruditatibus fuerit. Acetosus vomitus dentes offendit, quos pariter denigrat. Iecori etiam & pulmone nocet: nam & ex pectore venarum tunicas non sine periculo rumpit: stomachum demum affligit, & vires dissoluit. Si humores itaque superflui reiciuntur, nulla egent curatione; tales vomitiones iuuandæ, donec corpus sufficienter a recrementis fuerit mundatum. Regio enim illa est aptissima ad reicienda excrementa, quæ sunt collecta in superiore ventriculi regione. Ob id nauigatio illa in mari, & vectio, quæ vomitum excitant, sæpe curant dolores ventriculi diuturnos & contumaces. Neque etiam retinendi sunt vomitus in illis morbis supradictis, neque in his, qui fiunt a plenitudine ventris; neque in colico, nephritico, aut arthritico, doloribus. Biliosus quoque vomitus non protinus cohibendus est, nec morborum initio symptomaticus, a natura non temere illatus; sicut in febrium accessione (ut paulo ante diximus) nullo pacto inhibendus; materiam enim minuit & subinde radicitus euellit. At symptomaticus, impetu coactæ naturæ expulsus cohibendus omnino est, si superfluous præsertim fuerit, alioqui periculosus erit: is quoque qui æqualis est in corpore sano, siue spontaneus seu arte paratus, non cohibendus, cum a multis morbis hominem liberet, ut paulo ante dictum est. Criticus item, maxime iudicatus, cum laudabilibus signis præcedentibus non est restringendus, modo non excedat & virtutem deiciat. Interea, licet symptomaticus (ut in libro de febribus ostendimus) sit malus per viam signi (quia arguit materię multitudinem vel malignitatem eiusdem) tamen sæpe fit bonus per viam causæ, cum euacuatur materia, quæ morbi causa existit. Cibus tamē euomentibus crebro siue inconcoctum siue corruptum, ne perseuerando debilitetur stomachus, & praua contrahat vitia, remediis occurrendum est. Et licet humores superflui nulla egeant curatione, & statim non sint constringendi; tamen ne consuetudine vitium oriatur, & ne frequenti conatu rheumatismis facile repleatur venter, compescendus est. Ideo Auicenna & illi qui illum sequuntur, vomitum cibalem vel humoralem superfluum, & non æqualiter factum, constringere iubent. Sedis qui diuertit ab inflammationibus inferioribus, internis vel etiam a superioribus, ut in doloribus capitis, aurium, &c. non est inhibendus, modo non affecta sint collū, aut partes thoracis. Vomitus itaque omnes optimorum alimentorum, qui fiunt

In quibus non
est inhibendus
vomitum.

11.

Qui vomitus
compescendi.

12.

post alias vomitiones ob debilitatem retentionis, vel irritationem expultricis, compescendi sunt: ut si sanguis per vomitum reddatur. Neoterici duplicem differentiam vomitus quoque faciunt, illum distinguentes in cibalem, & in humoralem; sub cibali comprehendentes vomitum cuiuscunque rei in corpore, sub humoralis, cuiuscunque rei corporalis. Cibalem ita curant; eius causam primo remouendo, siue ab aere, cibo, potu, aliisque rebus non naturalibus, orta sit, eam remouent & nocumentum impressum, contrariis; & malam temperiem corrigunt assumtis medicamentis tam intus quam extra apposis: & stomachum roborant adhibitis leniter constringentibus, prohibentque humores ne in stomachum confluant, diuersionibus: etiam euacuatione, si humores videantur fluxuri in ventriculum: manus quoque ligant supra cubitos & pedes supra genua: quamquam inferiora membra constricta melius vomitum diuertunt & compescunt. Corrigunt accidentia, ut si syncope superueniat: & victum præscribunt supradictum, exiguum, bonum, & coctum facilem, & delectabilis saporis, quæque cito penetrent & proprietate roborent ventriculum, & resistent intemperiei impressæ. Si fiat a percussione supra stomachum, vel a membro; ut cerebro stomacho communicanti, (tunc enim vomere solent,) curetur percussio, vulnus; venæ sectione, & amoueatur nocumentum eidem impressum: inhibeantur humores, ne fluant in ventriculum, & membri ratio habeatur læsi, & communicantis, & ventriculi. Si a medicamentis venenosis, vomitu & secessu educantur: & dentur antidota propria: stomachus ac membra nobilia roborentur. Si hic vomitus cibalis fuerit per communitatem, siue a cerebro, hepate, liene, vel a toto; habeatur ratio totius: si a toto, caueant interim fortia solutiuia, & ea quæ ventriculum debilitant. Vel habeatur ratio illius membri læsi, siue fuerit hepar, lien siue cerebrum, inhibendo ne humores confluant, diuertendo, euacuando si opus est, & roborando membrum communicans & mandans. Eodem modo si sit per essentiam, auferendo causam, nempe intemperiem nudam, si quæ sit, solummodo alterando contrariis: si cum materia, & adsint humores, curabuntur, ut de pituita dictum est, & de bile, ut exemplo sequenti docebitur. De his vide Arculan. aliosque auctores, qui supra Rhazem scripserunt.

Quomodo vomitus cibalis curatur.

A percussione aut vulnere.

A veneno.

A toto vel alia parte.

Per essentiam.

OBSERVATIO XVI.

De vomitu bilioso.

Iuuenis quidam biliosus, frequenter in æstate circa caniculam, bilis vomitum experiebatur, cui os amarum erat: habebat autem & sitim vehementiorem, & ventriculi morsum ructusque nidorosos. Ad quem acciti, cum circa ventrem grauaretur, & os stomachi morderet, nolimus vomitum cohibere, sed potius epoto leui vomitorio, quod ex aqua tepida ꝑvj. constaret, addito syrup. acetos. simplici ad ꝑj. s. illum curare proposuimus, tepide a cibo sumto. Ex quo cum mediocriter vomuisset, absque dolore multa biliosa) bilis enim a iocinore in ventriculum transmittetur, cum ipsa

r.

2. in ventriculo nequaquam oriatur; verum a iocinore vel a vesica bilis in eundem transmittatur) os ablui iussit cum aqua & aceto. Deinde dedi syr. alterantes, in hunc modum: ℞. syr. de ribes, syr. acetos. simplici, syr. de end. ana ℥j. ℞. aqua acetosa, cichorii, end. an. ℥ij. misceantur, & bibat ieiunus per triduum. ℞. trionsant. in tab. ℥j. utatur cum syr. Purgavi cum decocto thamarind. in sero lactis. Sed quia euomebat, dedi bolum sequentem: elect. lenitivi ℥j. ℞. pulpa thamarind. ℥ij. pulu. rhabarb. ℥j. fiat bolus. quo ter excreuit biliosa. Interea cum bilis ex hepate in ventriculum confluebat, ceratum sequens hepati apponere iussi: ℞. cerati santalini ℥j. ℞. olei nymphae, ros. ana ℥j. ℞. lauentur aqua frig. vel rosa. addendo spice nardi pulv. ℥j. ducatur leuiter supra pannum lineum, & hepati apponatur. Ad ventriculum roborandum & vomitum compescendum dedimus subinde syrup. ex succo mali punici & mentha, & stomachum inunximus vng. sequenti: ℞. olei myrtei, cotoneorum, mastichini ana ℥j. ℞. hypocistid. acaciae an. ℥j. boli armeni, corall. rub. pulv. an. ℥j. aceti parum, & ceræ q. s. fiat vng. & sumto ante cibum in prima mensa diacydonite sine speciebus, & iis, quæ moderate restringerent, hic tandem curatus fuit.

S C H O L I A.

3. Vomitus biliosus quomodo curetur.

Q Vomodo vomitus biliosus curetur, vide Alexand. Benedictum Veronensem lib. 14. capit. 28. De vomitu bilioso. habes ibidem plurimas compositiones, quæ intus exhibentur, & exterius applicantur, tam fottus quam vnguentis, cerata & emplastra. Hic vomitus non est cohibendus, nisi excedat: cū & immodicus tamen consuetudine nocentior fiat, magis quam si vires prosternat, leuitum vomitorio duntaxat opus est: quod & Alex. Trallianus lib. 7. cap. 13. De nausea & vomitu dicebat. Si enim fuerit serosus tenuisque & non nimium ventriculo impactus, haud curiosum esse oportet ac sollicitum: verum satis est etiam solo vomitu ex liberaliore repidæ potu vti. vel cremore pisanæ ventrem recrementis liberare. Si aliquo modo sit infixa, & purgatione opus est, syr. ex infus. ros. pallid. vti possimus. Sed si nimium sit tenue excrementum quod reiecitur, & acre, a calidis abstinemus; & potius roborabimus & astringemus, ut est antidotum simplex ex malis cotoneis, vel ex succo solo eiusdem, cum sacchar. aut melle. Id multum roborat & acria recrementa contemperat: ideo & infirmo & calido stomacho, humori in bilem commutanti accommodatum est. Prægnantibus si vomitus biliosus fiat, vti alius, periculosus est ne abortum irriter: his vomitum sedant pampinorum vitis cimaræ, vel clauicularum succus in potu, sed & mali citrii succus, vix acerbæ. Quæ assumuntur, sicuti & cibi, nullam graueolentiam habeant, sed ægro grata sint. At quæ vomitum ex phlegmate mucoso curant, sunt attenuantia, ut syr. acetosus, additis speciebus calidis aromaticis, si ex crasso viscoso humore, syr. acetos. compositus valet. exemplum huius, quomodo curetur, dictum est obseruat. 14. præcedente. Vbi enim acida & dulcis pituita affixa videatur, extenuantibus, iuxta Trallianum, medica-

mentis vtendum est: oxymelite, raphani rad. & capari præparandus est humor, & purgandus. Et si in ventriculi cavitatem innatet, valet etiam, si inhaereat, vomitus vt adiuuetur (nam non oportet statim costringere) decoctum raphani, seminis anethi, atripl. adiecto oxymell. simplici vel scyllino. Dissecta pituita etiam euacuanda cum pilul. hieræ picræ: etiam clysteres ad diuertendum valent. Deinde stomachus roborandus, hoc vel simili vnguento exterius. ℞. olei absinth. nardini, mastich. coton. ana ℥j. corall. rub. mentha sicca, caryophyll. ana ℥j. spice nardi ℥j. syr. rosa. rub. ℥j. ℞. cera q. s. Detur tunc a purgatione syr. absinth. de mentha. Vide alias compos. apud Alexandrum Veronensem cap. 20. lib. 14. De vomitu phlegmatico. Verum his qui cibum frequenter euomunt (cuius rei exemplum quoque posuimus, obseruat. 15. præcedente) non solum cataplasmata ori stomachi, sed etiam iugulo imponenda sunt, ex mentha & mastiche. A cibo, quæ adstringant assumenda sunt: cibus, potus, parcius assumendus. At ex ciborum acrimonia post vomitum, quæ refrigerant & adstringant in esca danda sunt, & quæ styptica sunt & acetosa. At si stomachi exundatio ex cibo nimium diluto fuerit, aut nimo potu, a vomitu stomachus ex calefacientibus ac exsiccantibus iuuatur; & paulo post cibis siccioribus, quibus aromata admisceri debent. Et panis crustam tostam Cretico vino infusam, superiniectione mastiche, garyophylloque, conferre haud dubium est. At si spiritus in vno ventre inclusus, cibum attollens, rarefit, cucurbit. maiuscula umbilico imposita mire facit, ante cibum impacta; ac subinde rutaceo oleo g. langæ puluere & cymini insperso. Alii vero, vbi vomitio fit ob flatum cibum suspendentes, dant medicamenta ante cibum qualia postea scribemus conferre ad ventriculi inflationem: & inungunt iis, ne flatus discutiunt. Cōmendant clysteres; quos in omni vomitione viles esse volunt, modo pauca quantitas iniicitur neq; fortiter laxantia aut olentia apponantur. Horum formulas habes apud Rond. c. propria. De vomitu.

OBSERVATIO XVII.

De vomitu melancholico.

1. Vamuis atræ bilis vomitus sit periculosus, tamen, vt antea ostendimus, aliqui ab eo sunt curati. Talis minime est restringendus: nam materia melancholica cum retinetur, præcipue adusta, infert symptomata grauissima. Ita melancholicus quidam, qui circa lienem subinde dolebat, per certa quædam intervalla humorem melancholicum, sæpe etiam atrum, vomebat. Huic igitur consului, cum remedia contra hoc scædum malum & molestum a me peteret, cū in autumnii principio essemus, & etiam videretur aliquo modo laborare sanguine melancholico (licet quadragessimum annum ageret, vir tamen niger & hirsutus ac venas satis amplas habens) vt paulo ante vomitum qui fere certis periodis illū infestabat, post leniēs medicamentum sumtum, altero die sanguinem in brachio sinistro ex vena lienari sibi detrahère iuberet. Mox atram bilem expurgauimus, cū decocto senæ, myrob. indor. fumaria & syr. bugloss. boraginis. Deinde

De his qui cibum frequenter euomunt.

Deinde splenem tum ventriculum roborauimus. Ita vt facile is tandem curatus fuerit. Et vt magis deinde vomitus constringeretur, mandauimus, vt syr. menthaceum cum aqua melissa, adiecto exiguu vino mali punici, sumeret.

SCHOLIA.

2. **H**ic vomitus, nisi immodicus fuerit, non est inhibendus, præmissis vniuersalibus remediis: si superfluat, vt alius excedens, est constringendus. Solet plerumq; hic vomitus contingere, si melancholia fecalis multiplicetur, & non descendat ad intestina, sed copiosius transfluat ad stomachum, illum grauando, vel morfu irritando. Maxime attrabilis vomitum infert: qui equidem vomitus vbi excesserit, nihil præstantius est in primis, quàm humorem illum inferius clysteri ad intestina retrahere, non tamen acri: & stante repletione sanguinis melancholici, venam incidere. Et ideo etiam quia hic in liene dolebat, basilicam sinistram secare fecimus. Et propterea aliquis mirabitur, cur aliquando venæ sectio in vomitu conueniat? imo etiam Græci, præter Arabes, id suadent. Ita Alexand. Trallianus c. 13. De nausea & vomitu, lib. 7. inquit: Si autem ex toto corpore ventriculo influant, tunc medicamentis vtendum maioribus. Interdum enim & sanguinis missio requiritur, si in superare videatur: & purgatio, si magna humoris prauitas existit. Quod si ambo videantur abundare, tum venam secare, tum purgare oportet. Si igitur adsit repletio totius, & adsit omnium humorum aequalitas, tunc sanguis dominetur, fiat venæ sectio ex vena communis: alioquin si ex hepate originem habeat, ex basilica dextra; vti a liene ex sinistra: vel ex saphena si a repleto sanguine mēstruo, vel ab hæmorrhoidib. Huius exemplum posuimus de moniali iuuentula 25. annu agente, singulis periodis menstruam purgationem per vomitum reiciēte, a me curata, lib. 6. obf. 25. Refert quoque, fere incredibilem historiam de moniali quadam Matth. de Gradi. Papiæ commoranti; quæ tribus annis delicatissimum, quantumuis cibum semper euomebat, cum humoru aquosorum haud exigua portione: quæ deinde ex ætuans maximo dolore afficiebatur, vt furiosa & phrenetica impetuose admodum sese moueret: aliquando & in syncope collapsa per semi horā pro mortua habebatur; ita vt nullæ diuersiones iuuarent nisi post quatuor aut quinque horas: deinde per se alleuiabatur. Huic frequens sanguinis missio facta est ex vena communi dextri brachii, ita, vt singulis trib diebus per duos mēses semper extractæ fuerint ad minus semper septem vnciæ sanguinis pro vice, cum etiā viueret septendecim diebus absq; cibo & potu, sumēdo tantum modicum vini Veruacini singula die. Postea de octo in octo dies demissus est sanguis, &, quod magis admiratu dignum erat, bona habitudine læta ac iucunda videbatur, cum tñ nihil cibi retineret.
4. Fuit tamen hæc phlebotomia curata, præter spem medicorum omnium excellētiū, qui eam viderunt. Vnde Gradus infert, hunc vomitum a toto originē habuisse, ab humore in os ventriculi delato: & hinc quoq; sanguinis detractionem iuuisse credebat. Recte Auer. 7. Collectaneorum suorum

Utrum vena
sectio aliquan-
do in vomitu
conueniat.

Historia mirabi-
lis Matthæ de
Gradi.

dixit, c. De curatione cancri, quod sicut in natura sunt monstra; ita & in medicina monstruositates apparent: de quibus multa refert Rabbi Moyse part. 24. suorum aphorismor. In vomitu igitur sæpenumero sanguinis missio non improbat: nam si corpus morbidum est, ac venæ sanguine turgeant, plurimum fracta vena ex stomacho reicitur, vel duarū librarum interdum pondere (vt nos lib. 15. retulimus & exemplis approbauimus) tum a iecoraria vena incipiendum est; quæ acuto scalpello secanda est, (teste Alexand. Veronensi medico) ne latiore vulnere spiritus vitalis subducatur. At scēminæ sanguinem euomentes, profluentib. mensibus, protinus liberantur, auctore Hippocr. Vtriq; sexui sanguinem euimenti, narium aut hæmorrhoidum profluuiū subuenit; si parcius, tunc phlebotomia prodest. Sæpe etiam in vomitu melancholico, vt hic in sinistro brachio vena vulnerata, auxilium attulit, ex liene facta fluxione in ventriculum, vt a iecore ex basilica dextra: propterea si sit vomitus humoralis, periodicus, tunc plerūq; vena toto vel a parte per consensum stomachus afficitur, humorē ad se fluentem recipiens: & curandus est eo modo, quo dictum est. Sed antequam stomachus in vomitum effundatur, ea primum diligenter obseruanda sunt, vt materia in diuersum trahatur, vt iam diximus; & vt membrum recipiens validius fiat, & membrum, a quo materia fluit corrigatur. Ante accessionem dandi syr. refrigerantes acetosi & parum styptici, si materia fuerit calida ac mordens. Tum die integro deiectio ventris, ex thamarindis prunisq; nostratibus fieri potest; vel venter clysteri molli. Et stomacho ac iecori deinde imponenda emplastra ex santali, ros. rub. myrti baccis, ciper. anastuli spodio. & similib. cum oleo ros. & cera compositis, conspersis aceto acerrimo. In phlegmatico melancholico humore, qui periodice effunditur, valent balani Indici seu myrob. epithymum, agaricus cum sale Indo; finita accessione, & lieni imponendum emplastrum de meliloto, myrto, ac ladano ex vino meraco vel aceto. In phlegmatico quoq; humor deiciendus, ac alio ppellendus, & stomachus confortandus est; accerebrū, si inde emanat humor, firmandū est. Si vomitus a pharmaco excitetur, pharmacum in primis educendum est, & venenositas detegenda, vel vomitu, vel per aluum deiciendum: nimium enim stomachi tunicas lancinat, aut mordet: huic curatio omnis necessaria est, quæ supra de bilioso humore posita est. Quod si vomitus venerit ab apostemate, vel vlcere, aut dolore vetriculi, tunc curatio petenda ex propriis capitibus, de quibus mox agemus. Si contingat a ventriculi raritate, vniatur & roboretur stomachus; cauendo a solutiuis & iis, quæ vomitum incitant: & a vomitiuis & valde resoluentibus. Et intus sumatur, quæ stypticam viscositatem habent, vt cotoneum, pellicula interna stomachi, & vinum moderate stypticum, tum alia viscosa, de victu dicta, & ab auctoribus latius explicata. Si sit ex oppilatione pylori, si naturalis, nō recipit curationem: alia causa remouenda: & id eo si ab humore crasso & viscoso, vt magna ex parte euenit, curetur abstergentibus, incidenti-

Monstra mon-
stra.

Si vomitus pe-
riodice mouea-
tur quomodo cu-
randus.

De vomitu
quem pharmaco
excitant.

A ventriculi
raritate.

Ex oppilatione
pylori.

bus, & exhibitione hieræ picæ, in forma elect. de quibus iam antea dictum est. At nunc pauca de vomitu sanguineo adiciamus, quamvis de eo prius loquuti sumus lib. 16. De cruenta spuitione.

OBSERVATIO XVIII.

De sanguinis vomitu.

Virille, qui ex ventriculo sanguinem recētem naturalem per vomitum reiciebat; eum ut compescerem a me postulavit. Quod efficere studui, primo sanguinis missione, etiam diuersione per ligaturas & cucurbitulas in cruribus, postea sequens exhibuimus: ℞. trochis. de carabe, de terra sigillata ana ℥℥. aqua bursa pastoris, portulacæ, plantag. an. ℥j. misce. quæ illico iuuerunt. At alter iuuenis, cui exhibitum fuit medicamentum acre per empiricum, sanguinem, laxatis venis seu venarum orificiis, vomuit. Huic commode consulimus, ut lactis heminam cum vini dimidia aut tertia parte, idq; paulatim & continuo haustum sumeret. Hoc enim virus medicamenti mitigat, eluit & pariter conglutinat, Alexandro Veronensi medico teste, lib. 13. cap. 10. Valet & syrupus ex mali punici succo: aliqui acerolum præferunt, niue refrigeratum, ut torpescere membrum faciat, & punctiones obtundat. Acetosus namq; conglobatum, si quis intus relictus fuerit, sanguinem discutit.

S C H O L I A.

EVomitur nonnunquam sanguis ventriculi venis a copia sanguinis cum impetu ruētis aperitis (idq; maxime, si venarum ora imbecilla fuerint) etiam a vitioso acriq; sanguine erosio. Assumpto quoque veneno plurimi vomitionibus periere. Quidam cathartico epoto vomitorio sanguinē euomuerunt, antequam morerentur. Innascuntur etiam interdum in stomacho carūculæ hæmorrhoidibus similes; ex quibus per intervalla sanguis vtiliter profluit: raro tamen id euenit: vti etiam ab impacta gulæ sanguifuga: vel fit iis, qui aquā palustrem vna cum bestiola incaute biberūt: & interdum sanguis ex capite, e iecore, liene, in stomachū profluit & transfertur, vel in foeminis mensib. suppressis aut hæmorrhoidibus, aut sanguinis missione vel venere intermissa, ut viduis & religiosis etiam pluribus contigit: vel ab ictu hæmorrhoidis serpentis: a plurib. corporis partibus, & a stomacho sanguis profluit, ut latius ad longum lib. 16. De sanguinis spuitione docuimus, & præcipue obs. 24. eiusdem libri; ut non opus sit ea hic repetere, aut diutius huic curationi insistere. Quod ad præsens attinet, satis est, quod is sanguis, qui ex ventriculi venis vomitur, concretus non est, nec inde magna sanguinis eruptio potest contingere; quod graciles vētriculi venæ sint. Aliquando qui vomitur sanguis, a remotis corporis partibus in vētriculum defertur: ut si cui membrum quodpiam excisum fuerit, natura non minus sanguinis quam antea generante, sanguis quo membrum illud ali debuit, ad vētriculum deferretur. A toto, adest plenitudo. A iecore aut liene, tūc adest in dextro aut sinistro latere tumor. A mensibus suppressis vel hæmorrhoidibus, aut hæmorrhagia, ex astantibus dignoscitur, & euacuatione solita suppressa. Et qui ex aliis partibus defertur

ad ventriculum, qui euomitur, concretus esse solet, vel facile concrefcit. Sanguinis itaq; vomitus, nisi fuerit periodicus, cum corporis robore, periculum præfagit: cui nisi protinus subueniatur, animi deliquium affert. Ex venæ scissura diu emanās, vlcera minatur, & abscessus, ob eam causam (ut Gal. demonstrat) medico opus est solerti & ingenioso, magnæque experientiæ. Si itaq; sanguinis vomitus ob membrum aliquod excisum fuerit, aut ab vniuerso corpore in ventriculum deferatur, incidatur dextri cubiti vena media: si ab hepate, dextri interior cubiti incidenda: a liene, eadem incidatur vena, sed in sinistro cubito: si a mēsum suppressione, a saphana pedis dextri: si vero ab hæmorrhoidum consueto fluxu recenti, ischiadica vena in parte sinistri pedis minimo digito vicina, ut quidam volunt: si ab hæmorrhagia e naribus solito fluore suppressa, ex exteriori cubiti vena sanguis mittatur eiusdem lateris cum nate, unde sanguis fluere solebat. In hoc pathemate, quacunque a causa ortum sit (quoniam vires eo laborant & imbecilla plerumq; esse solent) modica venæ, dū inciditur, diductio fiat, ne maior q̄ par sit, spirituum resolutio fiat. Parce præterea detrahatur sanguis, idq; repetitis vicibus, si opus est. Ante venæ sectionem, si alius resistat, sequens enema aluo infundatur, vel si sua sponte (ut conuenit) excrementa non deiecerit: ℞. cassiæ extractæ, zach. rub. an. ℥j. olei viol. ℥ij. salis parum, cum decocto quatuor remolliuorum prun. & hordei: fiat enema, quod ante pastum iniciatur: deinde fiat venæ sectio, ut dictum est. Deinde tam intrinsecus, quam extrinsecus adstringentia adhibeantur: qualis hic pulu. est. ℞. lapid. hamatit. ℥j. baccar. myrti ℥ij. acaciæ, boli arm. veri. corall. rub. ana ℥ij. fiat pul. subt. lysimus, ad modum alcohol; & sumatur ℥j. cum aqua plantag. adiecto exiguo aceto; idque mane ventriculo vacuo, & vesperi, si opus est, adiecta ℥j. syr. carosificis, vel ℞. confer. ros. veteris, confer. rad. symphyti maioris ana ℥j. boli arm. loti in aqua ros. ℥j. lapidis hamat. pulu. ℥j. corall. rub. ℥j. cum syr. cydon. fiat elect. molle: capiat ad magnitudinem parvæ castaneæ trib. horis ante pastum. Valet rob. ceras. syluest. acid. vel oxyacanthæ, & lyc. ex coto-neis, & de agrestia; si duo cochlearia sumantur. Extrinsecus crura fricentur valide; iisque vincula dolorifica iniiciantur, ipsisque cucurbitulæ sine scarificatione affigantur. Si ab hepate sanguis deferatur, supra hepar cucurbitula defigatur, si a liene, supra lienem; si a matrice, supra matricem. Sumto cibo, si ægrotus ipsum retinere nequeat, cucurbitula ventriculi regioni affigatur. Si neque restrin-gatur sanguis, deinde fotu sequenti vel simili vtendum: ℞. balauft. psidia, gallarum, rhois obsonio-rum, baccarum myrti, ros. rub. ana q. s. decoquantur in aqua plantag. & aceto, in quo decocto calēte spon-gia madefacta & expressa, ventriculi regio fouea-tur; deinde & hoc vnguento sequenti inuncta: ℞. olei myrti, coronei, mastic. ana ℥j. hypocyttid. boli arm. cerall. rub. acaciæ, baccar. myrti ana ℥ij. aceti parum, ce-ra modicum, fiat vng. quo ventriculi regio mane & vesperi post fotum inungatur. Reliqua vide lib. 16. obs. 24. & 25. & alios auctores.

OBSERVATIO XIX.

De vomitu atræ bilis; una cum vermibus
& scarabeis.

SCHOLIA.

3.

1. CVM Balduinum Kerckvveruium Brielen-
sem mense Octobri, anno 1567. duplici
tertiana correptum, curassem, deducor ad
puellam annum 22. attingentem, quæ vomitu con-
tinuo longo quidem tempore laborauerat, & bi-
lem tanquam picem valde atram una cum vermi-
bus deiciebat, quos tunc spectauimus ad pal-
mam fere in longitudine, coloris cineritii: & pau-
lulum ante meum accessum nouem numero euo-
muerat, omnes fere mortuos. Atram vero bilem
picis instar, quam spectabam, prima fronte san-
guinem concretum esse putabam, qui ab vtero in
stomachum transmissus esset: sed cū statuto tem-
pore menses prodirent, atram bilem esse intelle-
xi. Verum, cum esset bonæ constitutionis, neque
febricitaret, & circa stomachum doleret, nonni-
hil appetu quoque deficiente, hoc ipsum ex hu-
moribus corruptis fieri existimabam; Vnde &
vermes generabantur; eo quod fructibus autu-
mnalibus valde crudis antea vsa esset. Alium non
probe deiciebat, nisi duobus diebus tantum se-
mel; & stercora quidem dura feculenta satis na-
turalia & minime nigra. At vomitus admodum
frequens erat. Medicus assistens dederat pilulas
ex aloë: verum parum profecit. At apozemate
sequente per me descripto, vomitus, qui prius cre-
bererat, nonnihil cessauit; postquam plurima
nigra recrementa per inferna deieciisset: vnde &
melius habere videbatur: ℞. *absinthii communis*,
centaurii minoris, *agrimonia*, *portulaca ana* manip. j.
semin. anisi, *portulaca ana* ℥ j. *foliorum senæ* ℥ ss. *rha-
barb. selecti* ℥ j. ss. *schœnanthi* ℥ j. *glycyrr. rasæ* ℥ ss. *pas-
sul. enucleat.* ℥ vj. fiat decoctio pro ℥ viij. colatura
zaccharo parum dulcoretur. Dimidiū cum sum-
sisset, bene excreuit: primo feces, mox atram bi-
lem copiose: ac vomitus & ventriculi dolor non-
nihil cessarunt. Die intermisso, reliquum sumsit.
Interim ad appetitum incitandum capiebat duo
cochlearia subinde ex syr. sequentibus: ℞. *syrup.
delimonibus*. *syrup. absinthii*, de *scelopend.* *syrup. capill.
Veneris* (quia parum tussiebat) ana ℥ ij. & statim
sumebat ℥ ij. ex tabulis hoc modo descriptis: ℞.
specierum diarod. abb. ℥ ij. *specierum diatræg. frig.* ℥ j.
semin. zedoaria puluerisat. rad. tormentill. puluerisat.
ana ℥ ss. dissol. in aqua *portulacæ* & *agrimonia*, adie-
cto zaccharo optimo qu. s. fiat confectio in tabul. Et istis
remediis vtcunque habuit. Verum anno 1568. 10.
Iulii die, rursus ad Cornelium Philippum Con-
sulem vr̄bis illius ex febre continua acuta decum-
bentem euocatus, puellam denuo inuisi: quæ li-
cet vtcunque nunc se haberet, tamen paulo ante
scarabeos vomitu reiecerat (*res portentosa & incre-
dibilis, nisi ipse conspexissem*) quos mater nobis o-
stendit, præsentē Petro chirurgo Brieleni, & viro
consulari, amico nostro haud vulgari. Referebat
& mater vitium scarabeum reieciisse, qui per duos
dies superuixerat: referebatur autem ad incanta-
tionem hoc malum.

VERMES vomitione reici, haud insolens est,
nobisque non raro visum. Testatur & idem
Amatus Lusitanus *curat. 5. 6. ac 10. cent. 1.* Generari
autem posse in ventriculo, vt Amatus existimat,
difficile fuerit affirmare; verisimilius est ad ventri-
culum peruenire. Vide Beniuenium *de crassiore
pituita expulsa*, & cum ea etiam verme, longitudi-
nis digitorum quatuor, satis pleno, capite rubro,
leui, rotundoq; , pisi magnitudinem excedente:
cetero corpore lanugine quadā cōtecto, cauda fur-
cata ad similitudinē nouæ lunæ; pedibus quatuor,
duobus in dexterore, totidem in sinisterore par-
tem coaptatis. Admiratus Beniuenius vermis for-
mam, medicis eruditioribus ostendit. Nullum in-
uenit, qui monstrum simile se vidisse vnquam fa-
teretur. Aderat tñ senior quidam, sed medicæ artis
imperitus; qui testatus est similem se vidisse ver-
mem, vomitu quoq; propulsum, ab Alexan. quo-
dam cœnobita: qui statim, vt ille aiebat, proiecto
eo, mortuus est. Vocitabat autem hoc monstrum
cordis vermem. At contra æger ille Beniuenii cir-
ca cor & ventriculum dolens, cum medicamento
vomitionē fieri iussisset, vt primū vermem ipsum
euomuit, ad pristinam reuersus est sanitatem. At
vermes reiectos sæpe vidimus: sed scarabeos, nisi
hoc tempore, nunquam: quamquam alii quoque
videntur vidisse, cum & Gordonius medicus suo
tempore illustris, scribat part. 5. cap. 20. *De vermib.
vermes, serpentes, scarabeos generari ex putredine in
corpore humano; sicuti extra in mūdo vermes & muscæ
ac similia generentur.* Sed & Iulianus (*teste eod. Be-
niuenio*) medicam artem professus, dum grauitè
ægrotalet; & aduenienti medico dolorem, quo
circa ventriculum miserabiliter cruciabatur, ex-
poneret, tangente illo (vt fit) ac manibus locum
pertractante, erupit in vomitum: quo & ipse fru-
stum carnis ad parua pilæ magnitudinem, in quo
vermis, non secus ac bruchus in siliqua reclude-
batur, reiectans, ad pristinam statim reuersus est
valetudinem Ego quoq; Delphis puellam monia-
lè in curatione habui, quæ cum diris dolorib. per
integrum annum afficeretur, se tandē præ angu-
stia circa ventriculum moti exclamabat, & nisi in
vomitum prorumpere posset, se moriturā vocife-
rabatur. Quare medicamentum vomitoriū cum
adhibuissem, frustum magnū carneū albo colore,
albuminis oui instar, magno conatu reiecit, ita cō-
gelatum ac indurātū, vt cultello acutissimo vix di-
uidi posset; & ab omni dolore statim liberata, de-
inde sana vixit. Carnis quoq; frustulum, cū de pe-
ctoris morbis ageremus, tussi reiectū a muliere, ex
Beniuenio scripsimus, & q̄ etiam nos in aduocato
vidimus, de quo alias diximus. Sed, quod æque
admiratu dignum, refert Bened. Veron. *lib. 13. c. 22.
de generib. vomitus*, quēdam lapidem, nucis iuglan-
dis magnitudine, euomuisse. Refert quoq; Nico-
lus c. proprio, *de vomitu*, inter reliqua admiratu di-
gna, lapidē oui magnitudine vomitu reiectū esse.
Ceterū qui eiusmodi vomunt, nō oportet vomitum
inhibere, cum omnia talia præter naturam
sint. Et sic, qui hæc vel atram bilem vel vermes vo-

Historia Beni-
uenii.4.
Scarabeos in
corpore genera-
ri posse scribit
vt vermes
Gordonius.Bruchus in sil-
iqua carnea re-
clusus vomitu
reiectus.Lapis vomitu
reiectus.

mitu reiiciunt; ut hæc puella faciebat, non oportet inhibere, sed eius causam tollere, & talia quoque medicamenta præscribere, quæ vermes necant, & expellunt: de quibus latius suo loco dicemus, *cap. proprio De vermib.* Iisque expulsis ventriculum quoque roborare oportet. Hæc de vomitu. Si de his plura desideres, quæ vomitum excedentem & reprimunt & constringunt, vide Aetium, tum alios auctores, iam superius citatos, & qui supra Rhasem scripsere.

OBSERVATIO XX.

De stomachi dolore.

1. **I**Chthyopola Delphensis, qui in Flandrica platea commorabatur, ingenti stomachi dolore afflictebatur, cum insigni clamore, ut sese quietum tenere non posset, ob nimiam angustiam, qua affligebatur. Ad hunc accitus, cum decoctum florum chamomillæ in ceruisia communi præbuissem, emissis ructibus & in sudorem solutus, incantamenti instar omnis dolor evanuit: ut nullis aliis præfidiis opus fuerit uti.

S C H O L I A.

2. **O**Mnium inter sæuissima symptomata habentur stomachi dolores; deinde inflammationes, inflationes, abscessusque molliores, ac ulcerationes. Sed nunc de stomachi prius dolore agemus, qui interdum impatibilis est, & mortem sæpe accelerat. In eius ostio sæuior sentitur, quem & cardiacum quidam vocauerunt dolorem, alii cardialgiam vocarunt, de qua prius dictum est; quæ refertur ad intemperiem calidam, cum materia biliosa. At stomachi dolor interdum & morbus longus est; in quo affectu breuioris sunt vitæ. Dolor ipsum aut inflatio sequitur, aut ardor modo inflammationis, intercisiones torsionesque, vel rosiones sequuntur, quæ tormenta stomachi alii appellauerunt. Est aut stomachi dolor, tristis & puerilis sensatio, ab aliqua ledente causa. Et dolor omnis, aut stomachum distendit, aut degrauat, aut pungit, vel mordet eroditve: aut in imo afficit ventre, aut medio, vel ipso ostio. Dolor quoque continuatur, & interimit: aut periodicus est; qui interdum confecto cibo sedatur; interdum hominem exinanito ventre vexat. Aliquando assumpto cibo torsiones solent quiescere: modo ingens dolor est, cum cibis tantum conficitur. Alius vero dolor vomitu bilioso sedatur aut acetoso, qui in terra ebullienti similis est; alioqui continua poena est. Aliquibus quotidiano pituitæ vomitu, mane præsertim, quiescit dolor. Acutum stomachi dolorem quædam consequuntur: frigidus sudor, cordis palpitatio, pulsus frequens, ac formicans, ac animi defectus. Dolor ventriculi, sensus est nocius eiusdem, & symptoma tactus lesi. Quæ pars sit affecta, iam satis constat: vel in ore ipsius ventriculi, vel in ventriculo, aut parte eiusdem, nepe in concauitate, vel tunicis ipsis. Atque hoc symptoma pendet a morbo intemperaturæ materiali vel immateriali: a materia quidem humoralis, vel ventosa, vel a solutione continui. Hic dolor ratione suæ essentiae distinguitur, grauans, extendens, perforans, pūgens, mordicans; quamuis plures haberi possint, ut ex Montano c. de dolore

capitis diximus. Sed dolores stomachi communiter, iuxta Neotericos, ad quatuor referuntur; ad grauantem, extendentem, pūgentem, corrodentem. Vel alia diuisio ex parte loci, partem stomachi læsarum. In toto, vel in parte, ut iam paulo ante diximus, ut in ostio vel fundo. Rursus quilibet ex his, intensus, remissus, mediocris, continuus, periodicus, & sine periodicis. Et qui interpolatus est, ab euentu ipsius doloris varius quoque esse potest, dum cibus in stomacho est, vel descendit; vel stomacho vacuo, aut inanito, vel intenditur, cibo iam digesto, vel cum digeritur. Sedatur etiā (ut iam paulo ante diximus) vomitu, ructu (ut huic nostro ægro eueniebat) aut vërositatibus superius vel inferius emissis, vel sensibili expulsionem humiditatis aquosæ; uti contigit patri Io. Matth. de Gradi. Et nos hoc tempore puellam in curatione habuimus, cui idem eueniebat. Iam quoque dolores alii noui, recentes, breues, diurni: quidam ad alios morbos succedentes, vel per se incipientes, vel simul concomitantes cum aliis symptomatis, ut fluxu ventris, spasmo, vel stomachi singultu. Hæc enim omnia ad morbi cognitionem, prædictionem, & curationem faciunt, ut exempla subsequenter ostendent.

OBSERVATIO XXI.

De ingenti stomachi dolore in potatore.

1. **A**lbertus chirurgus Delphus, si quis alius potator egregius, anno 1565. sub Martii finem, cum plurimos dies noctesque vario potu ventriculum impleuisset, modo vinum rubrum bibens impurum modo ceruisiam crassissimam, eamque valde feculentam & recentem, cum puluere zinziberis & zaccharo; domum rediens, post mediam noctem excitatus intolerabilem dolorem in stomacho patiebatur, ut se veneno infectum clamaret: dolor enim adeo grauis erat, ut se in lecto continere non posset; cum totius corporis concussione, ut astantes hominem iam iam moriturum existimarent; ac pro deplorato habentes, extrema inunctione per sacrificulum peracta, ita illum in dolore relinqueret: donec mane ad eum accitus, deprehendi crura totumque corpus adeo tremore concuti, cum totius lecti commotione. At vix mihi interroganti locum affectum ostendere potuit: tandem ostendit se circa mucronatam cartilagine adeo dolore torqueri, tanquam pugione perforaretur: astantes autem narrabant, post potum insignem & diuersum, hoc malum originem suscepisse. Urina quam tunc inspiciebam, minime tincta erat, sed admodum cruda: non fiebat, nisi exiguum potus flagitando, cuius si vel guttam in ventriculum demitteret, mox in gutture & in stomacho se suffocari clamabat; lingua minime arida existente, neque potu descendente. Aderat inanis vomitus, vel nausea, eum ad vomitum frustra incitans. Sequens igitur vomituum præscribo: *℞. hordei mundati p. j. flor. chamomille (ob dolorem) p. ss. seminis anethi ℥ j. bulliant in aqua communi; & huius colatura accipe ℥ iij. addendo syrup. ex infus. ros. communi, oxymelitis simplicis, syrup. de cich. Nicol. cum rhabarb. ana ℥ ss. misce.* sumebat tepide; & euomit ceruisiam satis copiosam.

piofam & pauca biliosa. Doloꝛe tamen æque permanente, vocatur & secundus medicus, Cornelius Ericius, collega meus. Pulsus erat contractus; & ne copia ceruicis & vini suffocaretur, sequens medicamentum vna præscripsimus: *℞ folior. fenæ ʒvj. agar. femin. albileuis ʒij. cinnamomi ʒj. semin. anisi ʒss. bulliant in ʒix. decoct. communis; & fortiss. expressioni addendo ʒij. syrup. ex infus. ros. commun. misce pro ij. dosibus.* Vnam cum statim sumisset, medietatem portionis euomit, interim bis copiose excreuit multa biliosa, fœtida & aquosa, in maxima copia; & simul plurima euomit. Ab huius medicamenti operatione mox incidit in somnum, deinde & sudorem: & bene se habuit. Interea ad ventriculi roborationem capiebat subinde ʒij. vel ij. spec. diarod. abb. in tabulis. Altero die cum rediremus; nullo doloꝛe torquebatur: vti & nocte subsequente: vt se iam sanatum diceret: ideo reliquum portionis nō dedimus, nisi tertio die alteram dosim: & aluum commode reddidit, & perfecte sanus factus est, quamuis in primis abstantibus pro mortuo habitus.

S C H O L I A.

4. *causa.* INfinitæ sunt causæ doloris stomachi & interprocatacticas præcipue cibus potusque inordinate sumtus; vti in hoc chirurgus: nam oriri potest ex cibo, vt porro, cape, allioq; & his similib. ventro quoque septentrionali; vel si post labores sudoresque nudum fuerit corpus frigori expositum: nam & dolor ex gelida pota subito quandoque interimit, aut in colicum commutatur. Potionatis vero veneno, intolerabilior dolor habetur; & ex medicamentis valde adurentibus, vel soluentibus, vel ex percussione, casu, offensione. Sic causæ mediatae doloris duplices esse possunt; vel Primitiæ, de quibus nunc diximus; vel Corporeæ: vel Immediatæ, vt *intemperies calida, frigida, sicca*: humida, sine materia, doloꝛem nō facit; vel est cum materia, aut acuta intus mordente, aut corroden- te, & mordente intus humore, vel adurente, vel vtroque modo, vt in calida inflammatione, ex humoribus simplicibus, aut compositis, quale est acetosum salsum crassumq; phlegma, vel viscosum, vitreumq; omnium teterrimum. At melancholicus item humor acetosus doloꝛem excitat periculosum. Sed inter omnes cruciatus, qui inter tunicas insedit humor vitiat, sæuiores poenæ excitat; vel oris stomachi præsertim. Ita & continui solutio, spiritus interclusus. Quod ad causas corporeas attinet, duplices quoque habentur: vel per communitatem seu cōsensum, vel per essentiam: per cōsensum, vt a toto, quemadmodum in febribus; de quibus satis dictum est in libris nostris de febribus. aut crisi, aut a membro particulari, vt cerebro sibi communicante, aut absolute, aut mittendo materiam catarrhalem; ita a neruis, splene, atram bilem in ventriculum euomente vel mittente; a bile, vt in hepate seu fellis vesica: ab intestinis, vt vermibus, ventositate & vaporibus ex fecibus malignis eleuatis in ventriculum: sic a renibus, vt in doloꝛe calculi. Ab vtero, vt mensium retentione, hæmorrhoidum. Per essentiam vero,

sunt humores iam dicti in ventriculi fundo aut tunicis inhæretes. Ad causas remotas referri possunt nocumenta concoctionis, & quæcunque intemperiem ventriculi labefactant. Hæ causæ perquirendæ certis signis, vt exemplis docebimus, antequam curationem instituamus.

O B S E R V A T I O XXII.

De doloꝛe ventriculi intolerabili, cum hypochondriorum suspensione.

Gertrudis Bartholdi, cognata nostra, mulier siquæ altera pulcherrima, 30. ann. cum compluisset, an. 1546. mense Iunio in intolerabilem doloꝛem stomachi incidit, cum hypochondriorum suspensione. Lotium huic extreme crudum & album erat, instar puræ aquæ. Cum variis medicamentis curari non posset, dolorq; magis intenderetur, & difficulter aluus solueretur, post absinthii decoctum, cum liquida pharmaca plane & semper abhorreret, summo diluente huic adhibui stomatici laxatiui calidi in tabulis confecti ʒvj. vnica dosi, cum difficilis solutionis esset: quo medicamento octies aluum deposuit: & multa putrida & pituitosa excreuit. Et quia operabatur nō sine torminibus & angustia, pro ablutione pharmaci dedi cyathum vnum iusculi pulli: a quo postea cum vnum secessum adhuc habuisset, dormiuit per totam noctem subsequentem, vlque in maximam lucem diei subsequentis, cum antea præ doloꝛe per quatuor aut quinque dies aut noctes non dormiisset. A somno autem surgens, ab omni doloꝛe liberata sana omnino euasit. Ceterū, quod ad stomaticum laxatiuum attinet, quod in officina a pharmacopœo paratum habebatur; hæc erat eiusdem descriptio: *℞. sacchari optimi lbj. cinnamomi, zinzibaris ana ʒij. caryophyll. galangæ ana ʒj. nucis muscatæ, spica, ligni aloes, cardamomi, macis ana ʒss.* Si vero laxatiuum facere volueris (quo nos hic vsi sumus) addatur ʒj. scammonæ præparatæ. coquantur cum sufficienti quantitate aquæ saccharatæ; & fiat confectio in tabulis. Attamen hic cautio adhibenda, quod ea non liceat vti in magna dosi: nisi in corporibus robustis, expertis & notis. Ideo cum hæc mulier (vt alias sæpe experti eramus) difficilis solutionis esset, & fortis admodum, dosim auximus ad ʒvj. alioqui vix ʒij aut iij dedissemus. Est autem medicamentum forte, ob scammonæ, & vehementis operationis; in hoc tamen casu conferens, ad pituitosos & crudos humores in ventriculo collectos habentes vtile quoq; iliosis, colicis doloribus a materia pituitosa vel ventositate crudis, nequaquam vero in morbis calidis; vt eo tempore medicus quidam, sed Empiricus in omnibus fere morbis, etiam calidis & febricitantibus, male dabat; & nunquam fere laxans pharmacum propinabat, quin aliquid & huius laxatiui stomatici admisceretur. Præceptor meus Bononiæ, Elideus, medicus egregius, hoc sequenti in simili casu utebatur: *℞. electuarii de dactylis ʒss. philonii Romani ʒij. cum aqua chamomillæ, fiebat portio breuis.* In summo doloꝛe dabat aliquando ʒj. philonii, prout particularia suadebant. Vide & hoc sequens: nam com-

mode ab ipso quoque adhibitum aliquando fuit: *℞. elect. de dactylis ℥vj. philoni Romani ℥j. cum ℥ij. aqua florum chamomill.* At mulieri Brabantinæ, Alcmariæ, 60. duorum annorum, simili dolore correptæ cum tabulæ post purgationem ex elect. de dactylis ad ventositatem & pituitam stomacho infarctam & suspensionem hypochondriorum exhibita essent, & non iuuarent neque linimenta apta neque ventosæ siccæ applicatæ ventriculo (seu potius inter umbilicum & stomachum) solo hoc fotu tandem dolor sedatus est: qui ita habebat: *℞. rad. althææ ℥℥. flor. ros. rub. flor. chamomill. summitatum absinthii ana m.j. coquantur in aqua chamomill. & aqua communi q. suf. pro ℔. j. ℞. in fine addendo vini Rhenensis optimi, aqua ros. & aceti ana parum, & fiat fotus.* quo omnis dolor cessauit. Adeo illud medicamentum approbavit, ac diuinum appellabat, ut memoriam inscriberem, ut alios simili malo laborantes a dolore curarem. Ita quoque Margareta Cornelii Ioannis illius viri consularis filia, mense Nouembri, anno 1571. cum in dolorem stomachi intolerabilem incidisset, post purgationem vniuersalem adhibitam, hoc sequenti fotu ab omni dolore incantamenti instar fuit liberata: *℞. absinth. communis & Roman. flor. chamomill. ros. rub. mentha, omnium exsiccat. ana m. j. sem. sumach, myrtill. ana ℥℥. flor. melilori p. j. coquantur in aqua communi pro ℔. j. ℞. colat. adde spec. diarod. abb. ℥ij. ℞. specier. arom. ros. ℥j. aqua ros. ℥ij. aceti ros. ℥j. ℞. iterum semel ebulliant: & fiat fotus pro ventriculo.*

S C H O L I A.

5. FRIGIDAM vero causam flatibus quidam haud imperite iungunt: nam vehementes dolores, tensione eorum excitantur. Materia vero flaturum pituita est. Ita in duab. istis mulieribus aderat pituitolus humor crudus, flatuosus, hypochondrium non minus quam ventriculum extendens. Est quoq; pituita hæc crassior; unde turbidus vapor, multusque eleuetur, idque a tepido calore. Sic 12. Meth. meden. Galenus cap. 8. ait: *grauissimos a recentibus flatibus dolores fieri: retinentur obstructione vel densitate loci, in quo cohibetur, ut transpirare nequeant: alias si soli humores sint crassi & viscosi, non fit dolor vehemens. Gignuntur vero flatus, cum calefiunt humores crassi & glutinosi: sic enim in flatu crassumq; vaporem vertuntur.* Neg. enim necesse est exhalationem semper illam siccam esse & terrestrem, quam in meteorologicis materiam flatu dixit Aristoteles: sed sat est spirituosam & tenuem esse substantiam, præ ea, ex qua gignebatur. Agens vero est calor: locus autem (ut quidam volunt) in quo flatus includuntur, ventriculi tunica sunt. Nam si in medio spacio aceruetur, facile vacuatur, ex ea vero parte difficilime, & longo tempore, ac non nisi vehementer extenuatus, & dissolutus: quod cum non nisi calidis fiat, metus est, ne rursus plus, eorum usu, flatus eleuetur, quam tollatur. Facit ad difficultatem cura, quod non sicuti in acri humore, tuto sopientibus uti possumus, quæ & dolori prosunt, & causa humorem sua frigidity temperant: at hic causam augent, cum rebellem discussioni crassum spiritum faciunt, & tunicas

densant, per quas debebat excerni. Hæc fere Galenus de flatuoso dolore loco iam dicto. At 14. Meth. c. 7. fieri flatus ait, *vel cum calor debilis est, vel cum humidum crudum, crassum & glutinosum humorem contineat. Vnde excrementum quod natura excerni insensibili transpiratu consueuerat, iam non transpirat: præsertim si densa sit pars, in qua continetur.* Quin subdit, *Calor quoque auctior hoc facere potest; dum tamen tantus non sit, ut digerere possit.* Idem etiam 5. Aphorism. ultimo: *Fit flatus vel imbecillitate caloris, vel ex crassitie humoris, ut hic fiebat.* Ex quo patet, non esse temere admittendum, quod quidam sine discrimine dicunt, tepida esse, quæ flatus gignunt. Nam a valido calore ibi fieri aliquando ait, materiarum ratione; & frigidis curat. Præterea id asserit libr. 12. *cum multo melius curari colicos, ait, sine calidi fomentis: quoniam ab illis sape augetur dolor, aucta doloris causa, ex 6. De loc. affect.* Dolores a flatibus fiunt, vel cum frigidus crassusque humor acervatus est in corpore crasso, & denso genitus, qui egredi nequeat, vel a flatuoso spiritu: has inquit causas esse probabiles. Retinetur crassitie, & densitate corporum: & humores tum alterare, tum tendere parrem possunt, ut spiritus tendere. Quod vero imaginantur quidam, calorem plurimum extraneum facere flatus, cum naturalem minuit, fabulam esse putat Iacchinus, vir doctissimus. Quicumque enim calor vigeat, flatus tollit; nisi, ut diximus, qualitatis materiarum ratione etiam multos flatus faciat. Vnde neque in febribus vrentibus fiunt, neque in auriginosis, iuxta Aphorismum. Quod si in pravis febribus appareat inflatus venter, id venit, quoniam non sunt calore vehementes, & cum multa cruditate humorum. Materia vero aggregatur tum ciborum ratione, qui crassi natura sint & viscosi; tum ex multitudine & crebra cruditate: & in summa ex omnibus causis, quæ pituitam gignere possunt. Quæ vero calorem debilitant, vel spiritus resoluendo, vel per se refrigerando, ut frigida potus, aut frigida vina, dolorem facere possunt, ut fieri frequenter videmus. Imo post frigida potum doloribus ventris quidam perierunt; quibus scilicet id viscus natura erat imbecillum, & aderant materiarum, e quibus flatus gigni poterant, in ipso ventris corpore aggregatæ. Sic dolor ab externo frigore excitatur; præcipue si extrema patiuntur: quæ sunt partes nervosæ & frigida, & exsangues; a quibus facile frigus pervenit ad ventrem. Auget etiam frigus dolores: quoniam densat tunicas adeo, ut non transpiret quod in eis continetur: hinc magis dolor excitatur, cum flatus exitum non inuenit. Et quia una cum pituita flatu aderat, tensio sentiebatur, ut dirumpi putarent tunicas ventriculi: & etiam nos tensionem sensu seu tactu percepimus, quæ etiam super abdominis musculos sentiebatur. Sed de ventriculi inflatione postea latius. Sed hic etiam aderat simul, ob materiam frigidam, gravitas ventris, sine siti atque ardore: & sentiebatur in stomacho quædam frigiditas. Nunc aliud exemplum adferamus.

Pituita præsertim crassior est materia flaturum.

OBSERVATIO XXIII.

De dolore stomachi, ex pituitoso humore ac
tensione.

PVella admodum pituitosa, tempore hiemali, paupercula, cibo crudo utens, lacte, & aliis cibis pituitosis, incidit in dolorem ventriculi vehementiorem, cui aderat distentio quædam. Simul sentiebat magnam ventriculi gravitatem; propter quam spirandi difficultas accidebat, ventriculo distento septum transversum comprimente. Non sitiebat, neque aderat ardor aut calor: cibis quoque ad infimas partes ventris descendentes leuabatur nonnihil; & flatibus siue ructibus emissis, vel per alium exclusis, & calidis inuabatur: ita ut facile intellexerim, ex pituita flatulenta, hunc dolorem originem cepisse, qui & summo studio statim anodynus placandus erat. ob os ventriculi exacto sensu tactus præditum. Ideo statim hunc forum præscripsi: *℞. flor. chamæmeli, melibari ana m. j. absinthii, flor. ros. rub. summitatum anethi ana man. s. seminis lini, fœnugraci ana ʒ ss. seminis anisi, carui, fœniculi ana ʒ ij. coquantur in aqua communis, s. pro ʒ ij. in qua calida madescat spongia: quæ deinde expressa ventriculo admoueat, eaque foueatur: & deinde oleo subsequenti inungatur: ℞. olei chamæmel. anethini. lilior. ana ʒ ss. his commixtis fiat inunctio.* Quibus aliquo modo sedabatur dolor, gravitate adhuc permanente. Ideo & has pilulas deglutendas præbuimus: *℞. pilul. de hiera simpl. mastichinarum, trochisc. agarici ana ʒ j. cum aqua absinthii, fiant pilula xij. tempore matutino dentur.* Quibus optime alium deponebat. Verum cum adhuc materia tenacius ventriculi tunicis inhaereret, & dolor in totum non cessaret, licet nunc non ita vehemens esset; post decoctum absinthii, florum chamomilla, semin. fœniculi & anisi in aqua decoct. addito oxymell. simpl. & compos. hanc purgationem exhibui, cum satis robusta esset: *℞. diaphœnici ʒ ss. aquæ florum chamomilla ʒ ij. misce. & sexies multa pituitosa excreuit, etiam ventositatibus emissis.* Et dolor ita mitigatus est, ut vix de eo amplius conquereretur. Tunc ventriculum roborauimus intus sumtis tabulis sequentibus, seu rotulis: *℞. specierum aromat. ros. sine musco; specierum diacimini ana ʒ j. dissolutis in aqua absinthii, & florum chamomilla, adiectis ʒ ij. sacchari albi ssim. fiant rotule ponderantes ʒ ij. vel ʒ ss. & capiat ante pastum ij. horis vnam.* Præterea iussi, ut hunc puluerem in officina pararet: *℞. coriandri præparati ʒ ij. anisi, cinnamomi selecti, fœniculi, cari ana ʒ ij. maceris ʒ j. sacchari ad pondus omnium, fiat pulvis, cuius detur ʒ j. vel plus in sine pastus: & præcepi ut eo sumto nihil biberet, neque amplius ederet.* Extrinsecus vnguento sequenti ventriculum commodè inunximus: *℞. olei absinthii ʒ ss. olei nardini, mastichini, cotoneor. ana ʒ ij. garyophyl. mentha sicca, cardamomi, coralli rub. mastichis, flor. ros. rub. ana ʒ j. cere exiguum, fiat vnguent.* quo ventriculi regio inungatur mane & vespere ante pastum: & postea applicetur ceratum Galeni stomachicum, ad scuti formam. Quibus præsidii ab omni dolore liberata fuit.

SCHOLIA.

Signa doloris stomachi diligenter perscrutanda, antequam ad curationem accedamus. Si fiat ex nuda intemperie, iam diximus signa, cum de imbecillitate stomachi ageremus. Et si cum materia, etiam ex parte signa declarauimus: quibus hæc adiungere poterimus. Si igitur a causa materiali frigida, grauitas ventris aderit, ut iam diximus, si ne siti ardoreque; & in stomacho frigus sentitur, calidis inuatur: quibus si ætas, temperamentum, anni tempus & constitutio, victusque ratio præterita respondeant, plurimum ad causæ inuestigationem facient. Ex pituita salsa, in ore salitudo molesta est non sine siti valida. Ex phlegmate acetoso vel melancholico humore (*ut saepe iam dictum est*) rosiones aderunt stomachi sine æstuatione: aut vomitus acres acerosi melancholici demonstrant, quibus dolor sedatur, & lien tumet, tum difficilis malaque concoctio in ventre fieri solet, quod & ex phlegmate contingit. A causa calida materiali, quæ hominem supra modum inquietat, punctiones, intercisiones, morsus sitiq; ac oris siccitas, vel amaritudo, stomachi ardor æstus, & febris interdum sentitur, ac pulsus, ut initio febris, coarctatus; tum vomitus aluus biliosa est. At stomachi instabiles rosiones a iecore materiam effundi, indicium sunt: inde pulsus ad interiora remittitur, ac extrema frigescunt, animusq; linit. Quæ præterea, (inquit Galenus) ægrum inuare solent, humoris naturam denuntiant: dolor a materia calida (*ut tradit Hippocr.*) hordeacea pulve sedatur. Ita in frigida, castoreo cum aceto scillite. Si doloris origo ex imo ventre oritur, nihilominus cibi desiderium aderit, illæso stomachi ostio: verum singultus ac rosiones molestæ erunt. At humoris crassitudo, quo crassior est, eo maiorem affert dolorem atq; tormentum, cum ventris grauitate; unde pulsus inæqualior fit, & vomentibus ægris pulsus ad temperamentum redit. Periodicos dolores patiuntur cum plurimum melancholici, & qui præcordiorum dolores sustinent. Ex vento, adest flatu crepitulq; ventris frequens ac singultus: tum nec in eodem loco figitur dolor: qui tamen veluti clauus infixus hæret. Et cutim extendit: tum ad motum cucurbitulæ profunt. In iis tormentis extrema si frigeant, ut Hippocr. scribit, malum augurium faciunt, si perseverant instantes: si vero insuperabiles pustulæ ortæ fuerint nigræ, ac protinus exulcerentur, lethales sunt: lethalis est & grauior somnus, si quæ præterea dexter pes vesicæ extulerit, exitialis habetur: magisque si æger dulcia adamauerit. Vterum gestantibus peculiare malum est. Dolor quoque qui ex homine fuerit inter tunicas cohibito, egrius curatur. Dolor stomachi a causa externa vel primitiua, minus malus; cum facile remoueri possit, excepto illo, quæ a medicamento venenoso aut corrodente vel veneno fiat, vel gladii percussione: tales difficulter tolluntur, ubi est illi magis mali, qui ex causa corporea oriuntur: minusq; malus ex una causa, quam ex multis simul complicatis, etsi ex mordicatione febris ephemera, vel alia subsequatur perdurans aut continua. At dolores stomachi ex apostemate vel ulcere vix

4.

Signa.

A causa frigida materiali.

Ex pituita salsa.

Acida & melancholica.

A causa calida materiali.

5.

In imo ventre.

A crasso humore.

Periodici dolores.

Prognostica.

7. vel nunquam curantur, nisi nacti fuerint diligentem & expertum medicum. Omnis dolor rodens, acutus, aut diu perleuerans, deducit ad syncopen, imo ad mortem, teste Gal. 5. De loc. affect. cap. 6. cum ex eo narrat subsequutum spasmodum aut epilepsiam. Ita hisce diebus puer cum ieiunus esset, ac radicem angelicæ sylvestris comedisset, ingenti dolore stomachi correptus, mox epilepticus concidit, corpore toto, ac manibus simul convulsis ad quinque horas: qui tandem difficulter a me curatus fuit. Erat puer quinque annorum, alioqui valde agilis. Prægnantes facile stomachi dolore quoque apprehenduntur, ob mentes restrictos; & facile tunc animo linquunt, ut matri meæ carissimæ Margaritæ Nanniæ, ex Baiarorum familia, contingere solebat: sed salis momento in os indito, mox reuiuifcebat; ut antea quoque dictum est lib. 17. nostrarum obseruat.

OBSERVATIO XXIV.

De dolore stomachi a rebus calidis affectu.

1. Mercator ille, qui in foro Delpheni habitabat, pro cuius ædibus Rex inter signum erat, tormina in ventre & circa utraque hypochondria cum pateretur, ebibat plusquam dimidiam pintam vini Romani vulgo dicti, cum 3j. pulueris granorum paradisi: nā hic aromatarius erat, sed eo vino ebibito incidit in ventriculi dolorem, tum ventris crudelissimum & atrocissimum: ita ut præ angustia & rumpi & suffocari videretur: neque euomere neque secessum habere potuit. Vociferabatur, se ignem in stomacho habere. Ad hunc eodem die accitus 20. April. die, anno 1563. ac eadem hora, qua mori putaretur, statim dedi 3ij. vel plures decoct. hordei, in qua 3j. seminis anethi incisa erat, adiecta 3j. syr. ex infus. ros. Eaque portione repide sumpta, vinum euomuit, & liberius anhelum trahere potuit: & a vomitu paulo melius habere cepit; & incidit in somnum. Post somnum, quamuis minus doleret, circa præcordia grauitas quædam remanebat cum dolore; & cum aluum non redderet, paulo plus quam dimidium portionis sequentis propinaui: ʒss. sol. senæ ʒij. semin. anisi ʒss. rhab. selecti ʒij. schœnanthi ʒss. ebulliant in ʒix. decoct. communis, & fortiss. expressi. adde oxyrach. simpl. ʒj. syr. ex infus. ros. ʒss. misce pro duab. dosibus: vna assumpta quinquies aluum deposuit, & a dicto symptomate in totum liberatus est; ita ut alteram dosim non sumferit. Potus huic erat ptisana hordeacea, eo quod febrem timerem. Sed ea non superueniente, optime deinde habuit.

SCHOLIA.

5. Cardamomum (quod vulgo granum paradisi dicitur) ultra tertium gradum calidum & siccum est, vel saltem in tertio gradu. Habet enim vim valde excalfactoriam. Dioscor. potum ex aqua ad comitiales, ischiadicos, tusses, neruorum resolutiones, rupta, vulsa, tormina, latus ventris tinea valere, scribit; & ex vino potum renibus, difficultati vrinae, a scorpione ictis, auxilio esse. Verum hic aromatarius cum in substantia sumsisset, præter iustam dosim, plurimum obfuit, & pene hominem necauit: quamuis eidem alias (ut narrabat) ad similem

dolorem in minori quantitate sumatum profue-
rat: nunc autem plurimum, & ad internecionem fere læsit. Ceterum dolor stomachi cum ex variis causis fiat (ut diximus) vario modo quoque curatur. Si enim ob intemperiem calidam, vel frigidam doleat, eodem modo curatur intemperies rebus contrariis & alterantibus. Sic & dolor ex vento frigido, aut aqua gelida epota, contrariis remediis sanatur. Stomachus enim pane calido sa-
pe fouendus est, aut laseris afflere calefacto, aut cupressino, aut piceo: alii fermento cinere vtuntur in sacculo. In potu vero betonicæ farina cum vino efficaciter sumitur, si sine febris fuerit; alioqui cum calida aqua datur. At hic ob cardamomum sumtum, aqua hordei, & eius cremor conueniebat: iuuabat & vomitus, quia calore & copia ventriculorum extendebat: ita & tormenta ac rosiones ex malo cathartico, vomitionibus iuuantur, clysteribusque; ita & ex cibis pariter acutis fieri debet, pinguique cum insipidis dari iubent. Ex malo medicamento, venenato, erodente, æger vomere debet, atque pro veneni ratione remedia communia ac particularia ex libris venenatorum querenda sunt: sicuti & veneficiorum auxilia ex iisdem libris haberi debent. Vbi dolor vehemens-
tissimus est, & suspicio sit de aliqua materia venenosa aut medicamentosa venenosa assumpto, theriacam recentem dare potest. Si ex quavis causa primitiua vel extrinseca venerit, ea ipsa tollenda. Et si ex intemperie nuda, siue calida, siue frigida, curetur, ut de imbecillitate ventriculi prius dictum est. Si dolor sit a materia frigida, huius curationis exemplum posuimus. Hic in cibis, potionibus, styptica vitanda tradit Galenus, ante stomachi extinctionem, si pituita nimium redundet. Nam crassæ, duræ, siccae terrestres sunt materiae, (adstipulante Zaar) quæ dolorem stomachi inferunt. Iis
exiguus cibus ac potus offerendus, facilis concoctionis, bonique alimentum, aliudque valiter exinanitur. Sed prius necessarius, modo in ieiunio, modo post cibum vomitus, vtilis exercitatio, gestatio, nauigatio, frictioque. Nihil edendum, aut bibendum nisi calidum, vitatis tantum iis, quæ pituitam contrahere consueverunt. Sed in iis considerandum est, an stomachi duntaxat causa fiat, an alterius membri propinquitate fuerit? Primum igitur materia digerenda; ac exinde purganda; ultimo stomachus omnino recreandus est. De vomitu vero, leuibus concitandus est, aqua tepida, cum acetoso syr. simplici, aut composito: si id fieri minime potest, alius commode mollienda est; nam aluum trahere violenter, periculosum est, quandoquidem materiam vnde quaque contrahit. Aquosa pituita hydromelite ac syr. acetos. simplici compositione apte præparatur, vel mentha syrupo: at viscosum phlegma oxymelite compos. vel scillitico; vel si ex iecore fluxerit materia, vel venis. At quanquam dolori ventriculi a causa frigida calidis medicamentis succurratur; tamen si hepar calidum est, verendum, ne dum vni mederis, alteri noceas; & calidis medicamentis ventriculorum iuuans, hepatis caliditatem augeas. Mitigetur itaque

Curatio doloris stomachi.

4. Dolor ex ventu frigido aut aqua gelida epota.

Doloris stomachi ex cathartico remedium.

Curatio doloris stomachi a materia frigida.

6.

7. itaq; dolor anodynus supra descriptis: cauendum tamen ne hepatis regio fomentis illis vel vnguentis tangatur. Mitigato dolore, pilulæ exhibendæ ex hiera, adiecto rhabar. Si a cerebro vero, *stachadis* syr. digeratur. Digesta materia aquosa, deiciatur cum aloë lota. At quod in tunicis ventris impactum est, hiera quoque perpurgatur: vel si valde viscosum hieris maiorib. Deinde stomachum, vt prius, ram sumtis quam admotis roborabimus; vt speciebus arom. ros. & similib. & cerata stomachica, emplastra, linimenta apponemus; & inungemus: vel sacculos iam sæpe dictos adhibebimus: quorum copiam vide apud auctores. & præcipue apud Arculanum, vel Benedictum Veronensem, qui ea magis Latina in vsum suum transtulit. Si a bile dolor stomachi; rosionibus æstuat: solent autem qui tentantur stomachici, interpositis quibusdam diebus, hunc humorem euomere. Sed qui perseverat dolor perniciosus est, & interdum hominem necat. Is recte aliis ducitur, potiones absinthii dantur: & si calida sit materia, in continuato dolore potiones ex violaceo & rosaceo, syr. nymphææ & papauerinus, ex albo semine, ac calyce. Si autem bilis venticulo innatet, vomitu euacuanda aquæ tepidæ ʒij. syr. acetati ʒj. b. misce, & post cibum bibantur. digito inde aliquanto in os post & fauces immisso, aut penna vomitus eliciatur. Si vero ægrotus siapte natura non facile vomat, euacuetur sumta portione sequenti: ℞. syr. ros. laxatiui ʒj. b. rhabar. puluerisati ʒj. cum aqua cuborū & absinthii; fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Si vero bilis ab hepate in ventriculum per intervalla transmitti videatur, hoc electuario vtire: ℞. diacydonii sine spec. ʒj. conseru. ros. acetosæ ana ʒj. b. pul. elect. trium famal. diarod. abb. ana ʒij. b. cum syrup. ex ros. sicco, fiat electuar. molle: capiat ʒj. tribus horis ante pastum. Extrinsicus malua iuuat ex oleo ros. vel viol. addita santalorum farina, & inungatur oleo myrteo, & cotoneorum. Experimento valet ventris gallinæ interior membrana arefacta in farinam, ob eam causam, tunditur & datur. Quibus præidiis si non cedat dolor, soporifera non sine metu danda sunt. Si dolor sit ex atra bile, iis necessaria gestatio, nauigatio, si longus morbus est, ac diebus interpositis accedat: & si fieri possit, ex nausea vomitus. Vitanda cruditas est, sumendi cibi faciles & stomacho non alieni, vinumque austerum bibendum, interea humor digerendus cum siliquis lenæ, polypodio, & aliis melancholiam digerentibus; & venter repurgandus pilulæ ex hiera & indis. Deinde roborandus stomachus, et si ex lie. ne veniat, eius ratio quoque habenda, vt prius dictum est. Reliqua vide apud auctores.

ANIMADVERSI O.

10. IN Scholio obseruat. huius, Lector benigne, diximus Cardamomum a vulgaribus quondam granum paradysi vocatum fuisse. Sciendum tamen, quod granum paradisi sit semen diuersum a cardamomo vero, quamuis pro cardamomo maiori quis accipere posset, cum videantur eiusdem fere esse virtutis. Ceterum granum paradisi, vulgari nostra lingua Greyn appellatum, ab Arabibus

vero Mellegetta, aut Millegitta dictum, a semine crebro, pharmacopœis tum medicis satis notum, & in officinis etiam nunc ab Aromatariis frequenter venditur, & nostri quoque hoc semine in puluerem redacto aliquando cibos suos cōdiunt: ita vt non opus sit eius loco cardamomum sumere, cum & frequentissimum sit, & hodie magna copia ad nos aduehatur. Verum quod ad cardamomum attinet, quatuor eius species nunc in officina habentur, maius, (inquam, minus, medium, ac minimum. At minus pro vero habetur ac sumitur. Quamobrem cum mentio sit in aliquibus confessionibus aromaticis de cardamomo, intelligunt cardamomum minus. Et ideo cū simpliciter cardamomum scribunt auctores, cardamomum minus, vt vsuale, accipiunt. Plura de his si desideres, vide Matthiam Lobel, in aduersariis fruticū, sub fruticum, cremiorum & arborum, pag. 445. & in obseruationibus stirpium, pag. 616. & commentar. Andr. Matthioli in libr. 1. Diosc. cap. 5. de cardamomo eiusque consideratione.

OBSERVATIO XXV.

De dolore ventriculi & pylori, per modum consultationis.

1. **R**egnerus insignis Iurisperitus & Aduocatus, quondam Pensionarius Amstelrodamenfis, consilium a me petiit, de dolore ventriculi fundum occupante, paulo supra vmbilicum, diuturno & per intervalla recurrente. Cui hæc scripsi: Vt a dolore illo paulo supra vmbilicum, vir doctissime, liberari possis, quamuis medicorum illustriū multis remediis vsus fueris, radicem huius mali omnium primo inuestigare oportet. Dolor hic ex ventriculi fundo, obrepletionem & obstructionem, nascens, vno tamen tempore subinde magis affligens, quamuis raro omnino a dolore videaris plane liberatus; oriri quoque videtur etiam ab exortu intestinorum, quem ex pyloro intestinum recipit. Quidam tamen hunc non prius vbcare intestinum dignantur, quam in orbes anfractusque circumuoluatur: atque ideo alii simpliciter productionem, alii cum appendice duodenum digitorum, Græci ἐκποσιν δωδεκάδακτυλον appellat. Cum autem hic dolor sæpe sua intervalla habeat, longiusque protrahatur, locum affectum & causam diligentius indagare oportet: antequam curationem moliamur. Locus affectus, iuxta circumscriptionem doloris, videtur esse in locis iam dictis. Est in iis locis quadam obstructio seu ἐμπεγξίς, quæ etiam ob imbecillitatem locorum dictorum facere dicitur; cum loci dicti iam longo tempore affecti facile recipiunt, non tantum nouum humorem, verum etiam sua imbecillitate eundem, nempe pituitosum, gignunt vel fouent: qui cum crassior existit, diutius ibidem moratur, ac difficiliter soluitur: vnde malum diutius quoque protrahitur; cuius causa etiam concoctio impeditur, quæ fit in ventriculi fundo: & sic ventriculus crudum humorem quoque dimittit ad pylorum. Atque huius consequio, videlicet ex illa materia pituitosa, etiam ventositates crassiores & tiores, loca affecta extendunt, vsque ad vmbilicum fere, & maiorem dolorem inferunt. Verisimile est ac concludimus, quod sit pituita inhaerens fundo ventriculi, deinde

Curatio a bile.

Doloris curatio
a atra bile.

3. quoque adharens & pyloro & intestino iam dicto. Nam superuacanea quidem pituita in cerebro, in ventriculo, & in intestinis gigni consuevit: sed in cerebro tenuis & aquosa: in his vero crassa atque lenta: hac enim peculiare est ventriculi & intestinorum excrementum, non feces alui; quippe quæ cibi excrementum est commune: etenim cum illorum substantia frigida sit atque membranosa, crassum certe ac viscosum de se excrementum proferet; quale est pituita lenta. Hac igitur secundum naturam gignitur concrevitque in intestinis: e quibus cer-
 4. nitur alias sponte fecibus circumiecta descendere, alias purgatione vel clystere manifeste deduci, alias dysenteria vi corradit. Quum autem parcius ea vacuatur sensim aucta caloris vi, in vasis tandem crassescit, ut prorsus obstruens intestina quasi infarciat, fiatque latentium difficiliumque morborum causa. Talem pituitam crassam ego in fundo stomachi, tum intestini iam dicto collectam & adnatam esse existimo, magis tamen vno tempore, quam alio: ex qua etiam flatu gignuntur: unde etiam tensio sentitur. Sed cum fouentem causam magis habeat ob pituitam inclusam crassamque; ideo hæc ipsa remediis aptis detergenda & purganda erit: deinde loca ipsa affecta roboranda quoque erunt, ne eadem gignant vel foueant, recipiant, colligantve. In curatione itaque (ut in omni stomachi oppilatione) damnamus astringentia, & quicquid crassum humorem generat; sed potius attenuantia, aperientia, simul detergentia & incidentia, ob pituitam crassam. Erit itaque utile oxymel simplex, etiam compositum & scyllinum, & pulula ex hiera. Quare cum hunc virum inuiseremus in Haga Comitum agentem, & apozeinata incidentia & detergentia, & simul pituitam expurgantia præscripsimus, melius habere cepit. Egregie profuit post pituitam crassam purgatam, vinum absinthites, & ceruisia absinthites; etiam stomacho exterius postea corroborato.

S C H O L I A.

5. **D**olore urgente, quoad possumus, cibo & potu abstinebimus; quoniam concoctio bona esse nequit. Postea dabimus cibos tenues, & qui vim extenuandi habeant: eritque exiguo potu contentus æger, & meraciore; vitabitque frigus in toto corpore, sed extremis præsertim: & cum materia adhuc absit vna cum dolore & flatu, propter obstructionem; licet fomenta (de quibus paulo ante diximus) dolorem sedent & insensibiliter vacuent, nequaquam iis utemur in hoc casu; quoniam affectum magis proritant, ubi adsit talis oppilatio & materia infixæ est, vomitu non educemus, cum illud adeo crassum sit, ut educi non possit, nisi prius extenuatum fuerit, & viæ apertæ. Transitum vero inter lienem & stomachum, si ibi adsit oppilatio, iis parare debemus: de qua agemus, cum de ictericis atris loquemur; & de iis, quæ ad lienis tumores faciant. Bilis autem atra repurganda, ac ne eadem regeneretur, victus rationem emendabimus. Si via quoque inter stomachum ac bilis folliculum, ex morbi regii curatione, præclusa fuerit, remedia perquiremus, sicuti ad intestina, ubi præclusus transitus est, ab iliæ & colicis doloribus. Ita & iis utemur, quæ vias inter iecur & stomachum, vel

De oppilatione stomachi.

mesentericarum poros aperiant; humores incidendo, si crassi sint, & detergendo & repurgando. De dolore ex stomachi duritie. Durescit & interdum stomachus sine abscessu vitio: unde ægre in coquendo rugas contrahit, maleque digerit. Ex frigore oritur, aut materia frigida in tunicularum meatibus combibita, atque in altera earum infixæ. Verum interior magis officit, apostemati quam similima duro: in eo tactus durus est, difficulterque inclinatur æger: nam in poris tenuibus malum insitum est; tum demum hyptica dissoluentibus utendum: & in duritia sine abscessu has portiones vitiliter damus, ex mentha, calamintha, & absinthio, & catapotia, ex hiera cum agarico: & emplastrum vitiliter imponimus ex mastiche, croco, meliloto, spica, bdellio, cera, & oleo lilino, vel oleo ex violis luteis. At de dolore ex abscessu calido, vel frigido, & ob stomachi vomitam, postea latius.

O B S E R V A T I O XXVI.

De dolore stomachi ex casu oborto.

Quidam sacerdos (cui nomen erat Gerardus Bacherus) Alemariæ in via regia dicta habitans, cum anno 1546. e scala cecidisset, cubiti radium fregit: quem chirurgus tractabat. Huic autem post octo dies superuenit stomachi dolor vehementior, & totum pectus occupans. Lotium huic crudum erat: non febricitabat. Ideo hunc syrupum propinaui: ℞. oxymelitis simplicis ℥j. B. aqua hyssopi, feniculi, scabiose ana ℥j. misce: & cum aluum non deponeret; ita eundem purgaui: ℞. Diacatholici ℥vj. castoreæ extractæ ℥ij. mummiæ ℥j. B. dissol. cum ℥ij. decoct. pectoral. addendo syr. capill. Vener. ℥j. misce. & sexies aluum deposuit, & dolor magna ex parte cessauit. Et sequenti die, cum adhuc aluum deponeret, cyathum vnum iuris pulli dedi. Cū adhuc exiguus dolor in stomacho permaneret cum appetitus deiectione, hoc vnguen. inuncto dolor cessauit: & ventriculo corroborato appetitus rediit: ℞. olei mastichini ℥j. olei absinthii, menthacei ana. ℥ij. stor. ros. rub. pulueris atorum, corticum granat. coralli rubei, cinnamomi, mastichis ana ℥j. cera exiguum; fiat vnguentum. Quibus prædiis a dolore fuit in totum liberatus.

S C H O L I A.

Hic dolor licet post octo dies a casu prius ægrum affligebat, non est dubitandum, quin aliquo modo cadens a scala stomachum læserit. Et si nos in principio fuisset acciti, ea de causa sanguinem detraxissemus: sed quia lotium nunc crudum erat, & alui resistebat, hæc purgatio satis ad rem fecit. Quomodo cunque stomachus lædatur siue casu, siue offensione, siue percussione, vel ictu; periculosum est: Nam refert Alexander Benedictus Veronensis, lib. ii. cap. 9. ex ictu, propter membri nobilitatem, per multos protinus fuisse mortuos. Nouimus inquit Beniuenius libro suo de abditis causis morborum, capit. iij. fullonem quendam nomine Petrum, qui unico pugno stomacho cuiusdam iuuenis violentius impetito, hominem interemit. Ceterum in eiusmodi casu inedia æger continendus est, ac protinus sanguis demendus est ex iecoraria vena, modo vires terant: in cibo prisana vel alica danda est,

De dolore stomachi ex lapidibus vel alterius ictu.

est, sine vino: alius singulis diebus mollienda est, ac materia extrema auertenda est. Alii suadent leniter adstringentia dari in cibo & potu. Et quandoque ex eo ictu sanguis erumpit; prodest rhubarbarum cum vino styptico vel rubrica lemnia; emplastro imposito ex farina hordeacea, scilicet *3 iij. ladanii 3 ss. ros. 3 iij. aloes 3 vj. cum succo plantaginis, & oleo ulino.* Si sanguis conglobatus sit, curetur ut iam alias dictum est. Interea quoque sciendum, quod stomachus interdum aut vulneratur, aut compungitur, aut mordaci humore exulceratur, vel scinditur; sed incaute acicula acuta deuorata, vel acu vel vitro, quandoque perforatur, & vento (ut prius diximus) aliquando intus incluso, magno extenditur cruciatu. Vidimus (inquit Alexander, Benedictus Veronensis lib. 11. cap. 7.) mulieres duas, quæ acus pariter crinales, vitri frusta, capillosque pusculos (ut nos quoque vidimus) vomitu reiecerunt: quarum altera, ut refert idem Benedictus, exanimata interiit, altera tres ingentes caudæ caninæ arefactos nodos euomit, qua ratione, aut quomodo prius ea hauserint veneficia, in dubio est. Sic nos quoque vidimus pannum, clauos, ferramenta, & nescio quæ non vomitu reiecta. Sic etiam Beniuenius De abditis morborum causis scribit cap. 20. *mulierem quandam, aneam acum deuorasse; quæ nulla inde noxa percepta, integrum annum ita ut erat sana permansit. Quo peracto cepit dolor satis acutus mulierem ipsam circa ventriculum urgere.* Cum remedia a diuersis medicis nihil proficerent, & sic annis iam decem tali dolore, miseram vitam traheret, ecce acus illa terebrato ventriculo, e paruo demissa foramine profiliuit. Quam acum Beniuenius vidit, & mulierem curauit, quæ paucis post diebus, vnitæ vulneris facta, in pristinam sanitatem restituta est. Accidit & huic quod Ioannes Langius epistol. 40. libr. 2. refert: *In gynæcio, ait, Ducis Juliæ acensis, virgo dum sese exornaret, perterrita ingemiscens, acus quinque, quas in ore mordicus tenebat, deglutit, & per urinam illas easdem reddidit.* Idem Benedictus Veronensis refert de virgine Veneta libr. 2. capit. 9. & causam huius reddit libr. 5. cap. 13. in suis Anatomicis libris. Ego quoque vidi mulierem Delphensem, in insigni calcaris, ad quam accitus sum cum altero medico: quæ cum in gutture doleret, Chirurgus incaute stylo immisso (vulgo *probam* vocant) ferro, e manibus clauso in ventriculum, sæpe dolore tenebatur; & paulatim macie consumpta, cum præsidia hic nihil iuuare possent, tandem obiit. Vti & iuuenis quoque Harlæmensis, qui cum squillas (vulgari nomine *garnaren* dictas) cum circa Oceanum mare cum puellis luderet, deglutisset viuas, oborto dolore in ventriculo hic quoque mortuus est. Ceterum illis qui ex veneficio acus & alia enormia reiciunt, tum crines, quidam genistæ flores recentes aut arefactos, in potu dedere, ut concitatis vomitionibus, omnia ex faucibus erumpant. Nos quoque vidimus puellam Delphis in ventriculo dolentem, per inferiora modo excrementa picis instar nigra uti saporem excreuisse, & lapillos & ossium frusta etiam per vomitum: quæ longo tempore laborans &

macilentior facta, tandem etiam interiit. Ea vulnera aut alteram tunicarum duntaxat lædunt, aut ambas lacerant. Latiora stomachi vulnera, quæ pro Hippocratis sententia exitalia sunt, singultus & bilis vomitus insequitur, sanguisque per aluum interdum; & si quid cibi vel potionis assumtum est, ex patefacto vulnere redditur: venarum subinde pulsus elanguescunt, sudores tenues oriuntur, per quos extremæ partes exitaliter frigescunt. Signa tunicæ interioris læsæ sunt, dolor vehemens, assumpto acetoso aliquo, vel acuto vel salso; tum vomitus, aut excrementa sanguinea: tumet deinde venter, ac dolet, non sine febre. At si circa os stomachi punctura fuerit aut vulnus, vbi malum granatum est, in anteriori parte, ad decimum tertium spondylium vehemens dolor infigitur, vel magis aliquo acuto assumpto, tum anhelitus difficilior redditur, animus linoquit, sudore extremorum pergelido. At si vna ventris pars percussa fuerit, minus periculi facit: tum supra vmbilicum dolor habetur, & alius sanguinea reddit. At in medio si offenditur venter, inter vtrumque augurium est. Leues stomachi ictus, Galeni verbis, sanari possunt: *Eger primum temperato conclauio, non in plano, sine vento fumoque collocandus est; animo securus, sine multo sermone, sed tacitus quiescat, vel supinus dormiat.* Cibus liquidus damnatur, quippe plurimus, ac difficilis concoctionis: laudatur stypticus, aridiusculæ substantiæ, non multi alimenti: & ad septimum vsque diem a vini potione abstineat. Exactis septem diebus, stypticum nigrum extincti sapius chalybis aqua dilutum, prodest: quo nec nimium a siti vindicari debet, ante septimum: ex eadem aqua, cum syr. rosato, aut rhodozaccharo vetere, vel cum syr. myrrina interdum bibat, & parcius: tum & vinum mali punici, saporis mediæ, modice bibat. Alius, iniecta glande oneranda est, aut clystere mollienda. Eo membro vulnerato, sanguinis protinus missio necessaria est, aut ventris lenis deiectione, ex aloë lota, ac rhubar. torrefacto, aut myrob. citrinis. Vomitus hic damnatur. Aut si humore mordaciori conuigerit malum, eundem matutinis potionibus præparabis, ac deinde cathartico perpurgabis: deinde iis quæ leuiter vulnera agglutinant, dabis: nec differendum est; mora enim difficiliora redduntur vulnera. Profundiora stypticis sanantur, *balauft. plantag. ros. & similibus.* Agglutinantia styptica sunt, *terra Lemnia, bolus Armen. thus, mastix, tragac. aut emplastica extrinsecus imposita.* Sed quia hæc ad chirurgiam pertinent, ex iis petenda quæ & vulnera ventriculo extrinsecus inflata sanant.

OBSERVATIO XXVII.

De Stomachi dolore, a parte dorsi posteriore ad anteriorem transiente.

Iuuenis quidam Delphensis, Ioannes Vandera-nus dictus, intensissimo dolore dorsi afflictebatur, e regione ipsius stomachi, tanquam pignore perforaretur, cum ingenti clamore. Dolor autem a parte posteriori incipiens in dorso, ad partem anteriorem stomachi transibat, cum ma-

Quibus casibus intus stomachus vulneretur.

Prognostica & signa partis ventriculi læsæ.

Curatio.

Agglutinantia styptica.

xima difficultate anhelitus; ita ut ex punctione vehementiore tum dolore suffocari videretur. Ad hunc in nocte accitus sum: cum sine febre esset, cum pulsu æquali, licet parum veloci, & utcumque magno, minime tamen duro; & vrina tenuis, cruda, parumque subspicea spectaretur, nequaquam tineta, decoct. flor. chamomill. ℥ iij. & syr. ex infus. rosa. ℥ j. exhibuimus. Et quia tempus valde frigidum erat, inunximus tam partem posteriorem, quam anteriorem oleo anethino & chamæmelino. Mane cum rediissem, licet melius dormierat, dolor tamen nondum erat sedatus. Ideo hanc portionem sequentem propinaui: ℥ folior. sena ℥ iij. seminis anisi ℥ ℥. bulliant in ℥ v. decoct. pectoral. & fortiss. express. adde electuarii lenit. syrup. ex infus. rosa. ana ℥ ℥. misce. quater quaterve ventrem deiecit: ac post excrementa deiecta, & rudibus emissis, ilico hic dolor sedatus est.

S C H O L I A.

Dolor stomachi non semper in parte anteriore hæret, sed etiam e regione ventriculi dorsum fatigat; ut sæpe vñ venit, cum dorso incumbat: quemadmodum etiam euenisse Mariæ Comitissæ illustri filia Domini Principis constat, cum de tali dolore & inappetentia apud me conquereretur. Valde etiam quidam, si dolor sit in parte anteriore, dorsum quoque inungunt, vel cataplasmata applicant: quod & nos frequenter cum magna utilitate fecimus. At alii cuidam, qui simili dolore afficiebatur, vomitorium medicamentum dedimus; & egregie contulit. Refert Amatus Centuria 1. curat. 73. de ingenti ventriculi dolore: Venerabilis Abbas, inquit, cum gravissimo ventriculi dolore infestaretur, ut alta voce exclamaret; post multa adhibita remedia, vomitorium ex helleboro illi propinauimus: quo alba quadam ouorum albo similia euomuit; & sanus ilico factus est, veluti nobilis quidam Neapolitanus, qui cum simili dolore premeretur, post ebibitam integram libram aque florum Naraziorum tepidam, similia euomuit & sanus factus fuit.

O B S E R V A T I O XXVIII.

De ventriculi dolore ab assumpto veneno.

IN pago quodam non procul a ciuitate Pithuriensi, in qua vrbe tunc praxin exercebam, iuuenis existens, cum ex Italia, ex Iacobi Syluii medici regii commendatione anno 1545. Pithueros accessissem: eo tempore tres comederant ex vno pastillo, & veneno infecti sunt, atque omnes dolore intensissimo circa stomachum corripiebantur. Vnus autem ex iis lotium ad me misit, quod cum spectassem, tenuis substantia erat & viridis coloris, suspicionem veneni præbens. Nam vrina viridis, teste Auicenna lib. 1. fen. 1. summa 2. doct. 3. c. De significatione urine viridis, spasmus in pueris significat, aut venenum in potu sumtum: & si fuerit in ea hypostasis, spes erit vitæ; alioqui metum incutit. Cum is, qui vrinam adferebat, rem gestam narraret, magis suspicionem augebat. Prescribo itaque vomitorium medicamentum; & ut simul pingua deuoraret, quibus, ut postea intelleximus, statim ab omni dolore euasit, & curatus

fuit. Alter vero, antequam cōsiliū peteret, subito interiit. Tertius autem cum intellexerat priorem per me sanatum, tardius tamen & ille lotium ad me transmisit, in re tam seria ludens. Huic quoque vomitorium præscriptum est, ex decocto raphani & oxymelite, vel simili; & sumta theriaca, & hic conualuit. Est enim theriaca commune remedium contra venenum sumtum: proprium antidotum præscribere non poteram, cum non scirem, cuius generis venenum esset. Quibus remediis consopito stomachi dolore, vterque curatus est.

S C H O L I A.

Veniebat eo tempore mihi in mentem historia illa, quæ anno 1538. mense Iulio Bononiæ contigerat, de tribus fratribus nobilib. & valde diuitibus, in vñis ædibus cohabitantibus, & duob. vxorem & liberos habentibus. Quorū fratrum natu minimus, nescio quo odio aut similitate, vel hereditatis desiderio impulsus, duos fratres, tum vxores ac liberos veneno perdere decreuit; & fere totam familiam perdidit, arsenico in vini cadum iniecto; ex quo bibebant ignari. Postquam longo tempore ex eo vino bibissent, ceperunt tandem veneni symptomata in ventriculo ac ventre & venis persentiscere. Quando & amicorum quidam ab iisdem cōuiuio excepti depromto ex eodem cado seu vase vinum liberalius bibissent, statim & illi vbi domum redeunt, dolorem & puncturam in ventriculo sentiebant: atque mordacitatem quandam, & corrosionem, & inextinguibilem sitim tandem senserunt: nam hæc plerumque sunt symptomata arsenici: est enim calidum & siccum, ut refert Auicenna cap. proprio. Horū vnus suborta veneni suspitione, statim epoto oleo euomuit, & liberatus est; adiit tamen ad propinquos, eos de veneficio insimulans. Hi se excusant, atq; similiter iam dies aliquot se affligi queruntur. Excussis exploratisque omnibus, denique in cado vinario arsenicum inueniunt, quod in fundo crustas effecerat. Comperta re statim medici accersuntur. Cum iam malum in venas grassari cepisset, & putredinem vna cum febre creauisset, Dominus Matthæus Curtius, medicorum in Italia tunc facile primus, consuluit ad reprimendam putredinem, intentionem exsiccandi habendam. Ergo bolum Armen. cum Zaocharo rosato exhibuit: item syrup. de corticibus citri, acetosum, limones, arantiorum & granatorum succum, & id genus acidorum per se edere, tum cibis miscere iussit. Quod si inter initia, dum adhuc in ventriculo venenum hæreret, fuisset vocatus, humectantia & lubricantia conducere dicebat, ad expellendum vel vomitu velalui deiectione: periire ex isto veneno tres. Hispanus tamen medicus, qui adhuc meo tempore vivebat, cum Bononiæ agerem, quæ & sæpe in praxi comitabar, cum consilia haberentur, humectatiua & infrigidatiua intentione vtendum esse suadebat; & iis dabat, quibus in hoc casu succurrebat, pharmacum exagar. trochis. ℥ j. ℥. rhabarb. tantundem, diacassia ℥ vj. elect. de succo rosar. ℥ iij. murechari ℥ j. Hæc

6 Hæc iuueni robusto viro exhibita bene eduxerunt, & eundem febre probe liberarunt. Agaricum tamen in aqua nenupharis infudit, & eam expressam miscuit. Ad termina quæ in intestinis manserant, clysteribus lubricantibus est usus. De veneno pulcherrimus est locus apud Galen. *de loc. affect. lib. 6. cap. 5.* vbi inter reliqua, ita inquit de veneno per os sumto: *Quum enim homo suapte natura probis humoribus abundans, ac sanorum more educatus, de repente moritur* (vt lethali assumto veneno fieri solet) *deinde corpus aut liuens, aut nigricans, aut varium esse, aut diffuens conspicitur, aut præmarcore secundum molestumque reddit odorem; tunc venenum sumfisse aiunt.* Memini ego puerum apud Delphenes, cum pulsem ex arsenico, qua glyres interficiuntur, incaute sumfisset, solo vomitorio ex oleo & iusculo pulli venenum euomendo statim curatum fuisse. Solent in Italia in principio hausti veneni assidue lac bibere, cum oleo amygd. dulc. Et hoc quidem iam sæpe expertum est Auicennæ *De curat. enterit. in fine* decerptum. Ego solo oleo amygd. dulc. epoto cum ceruisia butyracea in multis usus sum, quos curavi, *de quibus suo loco dicemus cum de venenis agemus.* Narrat Amatus *cent. 2. curat. 65.* de puero, qui epoto arsenico post annum prius abierit. At ego noui qui multo annos superuixere, sed in magna miseria, cruribus resolutis, vt vix incedere possent; & mulierem post duos annos tandem vitam obit. Ita & religiosa quædam Delphis veneno infecta, longo tempore, sed misere, superuixit.

OBSERVATIO XXIX.

De ventriculi dolore ex obstructione hepatis, & vteri inflatione.

1 ELisabetha Guillemi, 36. annos nata, vxor Ioannis Stopii, Alemariæ anno 1551. dolore intolerabili ventriculi afficiebatur, & circa hypochondrion dolebat; partim ab hepatis obstructione partim ab vteri inflatione: qui dolor admodum vehemens ab imo ventre vsq; ad stomachum ascendebat; quæ eiusmodi doloribus alias obnoxia ex ventositate; quibus valde angebatur. Ad illam ingressus, libenter enema iniecissem; sed cum nullo modo admitteret, decocto sequenti bis in die utebatur, cum aluus resisteret: *℞ scabiosa fœniculi cum toto, viol. capill. Pen. melissa, florum chamomilla, meliloti ana m. j. cassiæ, agrimonie (ob hepatis oppilationem) ana m. ss. rad. glycyrr. 3 ss. semin. anisi, carui, ameos ana 3 j. semin. fœniculi 3 ss. flor. cord. p. j. follicul. sene 3 j. epithymi 3 iij. polypod. quer. 3 ss. prun. damas. num. xv. vuar. ab arill. repurg. 3 j. hordei mundati p. j. iuinbar. sebesten. ana num. v. coquantur in sero lactis, pro lb. j. ss. Saccharo dulcoretur colatura: in qua pendeat globulus sequens, exprimendus tum potio sumeretur: ℞ rhabar. selecti 3 j. (erat enim ipsa magna ex parte biliosa, quamuis nunc etiam pituita præcipue erat collecta) agarici trochis. 3 ss. spica, schœnanthi ana gran. vj. fiat nodulus. aluus vicumque eo decocto soluebatur, dolor tamen non sedabatur. Locum igitur dolentem inunximus vnguento sequenti; prius fomento infrascripto vtentes: ℞ vnguenti*

nostri pectoral. dialthæa, olei chamæmelini, anethini ana 3 ss. misce. ℞ rad. althæa 3 ss. folior. malua florum chamomilla, meliloti ana m. j. ss. artemisia, absinthii, cassiæ ana m. j. sem. lini fœnugr. malua, anisi ana 3 j. sem. fœniculi 3 j. coquantur in aqua pro lb. j. ss. profotu in sine decoct. addendo vini Rhenensis optimi parum, & aceti 3 j. ss. Quo & hypochondrium dextrum & ventriculus, & imum ventris circa vterum fouebantur, cum sponsia calide immersa & expressa. Et aliquo modo dolor remissus est. Verum cum rursus aluum non deponeret, hoc modo illam purgauimus: ℞ diacatholici 3 ss. diaphœnici 3 j. agarici trochis. 3 ss. pul. zin. 3 ss. gra. ij. dissolue eum 3 iij. decoct. suprascriptæ. In aurora cum sumfisset, egregie aluum deposuit, multa pituitosa deiecit: & emissis multis ventositatibus, dolor sedatus est. Die subsequente tamen rediit, & cum balano rursus aluum deposuisset, rursus sequenti fomento vsi sumus: ℞ flor. meliloti, chamomilla ana m. j. artemisia m. j. absinthii p. j. rad. althæa 3 j. sem. fœnugr. 3 j. ss. sem. anisi, fœniculi, malua. ana 3 j. aceti 3 j. coquantur in aqua communi. profotu: etiam hoc deinde emplastro infra umbilicum imposito versus dextram partem, vbi tunc dolor erat: ℞ flor. meliloti, chamomilla summatum anethi cum flor. ana m. j. ss. sem. malua 3 j. semin. fœniculi 3 j. ss. rad. althæa 3 iij. coctis in aqua ad molliundinem & contusis adde farinæ semin. lini, fœnugraci ana 3 ss. olei lilior. amygd. dul. ana 3 j. ss. olei anethini, chamomilla, scorpionis ana 3 ss. misce. Ventriculus tunc minus dolebat: sed magis dolor erat circa imum ventrem, versus dextram partem; sed inferius, vt locum hepatis non attingeret. Interim pro corroboratione stomachi cum oleo absinthii ventriculi regionem inunximus. Vrina huic minime inflammata erat: ideo obstructio illa, quæ in hepate erat, potius erat ex humoribus frigidis quam calidis: & quia dolor ad vteres tenderet, versus inguina, etiam ad regionem renum, ideo commode aliquid olei scorpionis adieciimus: & egregie profuit; & liberata ab illa obstructione, quæ locos dictos affligebat, plurimum lotii profundebat: & tandem cataplasmate seu emplastro appposito, dolor iterum cessauit. Interea his tabulis utebatur: ℞ specier. diacimini, trionsan. (vt hepar minus calfieret) ana 3 iij. diambra (ob vterum) specier. arom. ros. (ob stomachum) ana 3 ss. dissolutis in aqua artemisia & absinthii. adiecit. Sacch. albiss. q. s. fiat confectio in rotulis. ponderantibus 3 iij. sumebat ante pastum per ij. horas, dolore non amplius redeunte. Eodem fere tempore alia mulier, illius quoq; vicina, iisdem malis cum affligeretur, iisdem fere præidiis, vel parum immutatis, & hæc similiter conualuit.

S C H O L I A.

5 Dolor ventriculi si ex vitio aliorum membrorum fiat, siue ex vtero, iecore, liene, patet ex iâ dictis, quod illis mēbris prospicere oporteat: & in qua minera mali seu materia lateat, & ad ventriculū transferatur, primo tollenda est: & quia hic erat materia frigida atque flatuosa, & eductu difficilior, cum dolor quidem remitteretur, sed

postea rursus rediret, repetenda erat purgatio. Interea & ventriculi quoque ratio habenda erat, eundem roborando oleo absinthii exterius inuncto, ne vapores flatuosos reciperet. Ideo & diaciminum & arom. ros. conveniebat. Quare cum talis morbus aliquando per intervalla huic mulieri reuenteretur, de præseruatione consului, ut optimam victus rationem institueret, ut minus pituita gigneretur, neque ventositas accederet ex iis quæ fomitem præbeant: quare imperavi ut omnia frigida & crassa vitaret, olera, carnes vetulas, duras, & molles nimium, fructusq; frigidos, legumina, & ut somnos longiores fugeret & vigilias superfluas, quæque viscera grauant: ut & extrema membra ac ventrem potius calida conseruaret quam frigida, præcipue pedes; & iis vteretur, quæ flatus discuterent, & pituitam attenuarent modice, non tamen valde calfacientibus, ob hepatis caliditatem. Et ita nunc fere omnes dolores stomachi absolui: quibus distinctis remedia sunt petenda ab affectibus supra enumeratis. Quod si dolor fiat a nimio sensu, ut qui facile in animi defectionem incidunt, non erit præter rationem imperare usum theriacæ recentis, factis quibusdā prius euacuationibus per clysteres & pilulas convenientes. Ceterum si dolor fiat ab inflammatione, apostemate, abscessu, vel vomica, aut ulcere stomachi, de iis nunc per ordinem dicemus: cum seorsim de iisdem tractandum sit.

OBSERVATIO XXX.

De ventriculi phlegmone seu inflammatione.

Cum stomachus, veluti ceteræ corporis partes, inflammatione tentari possit, modo in ore ventriculi, ut in 1. obs. huius libri diximus, modo in alia quavis ventriculi parte: id ex dolore simul cū politu dignosci potest, quæ pars affecta sit: similiter & ex proprii eiusdem partis muneris oblatione: appetentiæ, siquidē in ore ventriculi: cōcoctionis autē, si in eius cavitatē excitetur. Sic iuuenis occurrit qui nobis proponebatur curandus: qui cum continuo febricitaret, ac lotiū valde rubrū haberet, dolorq; immensus ac assiduus in ventriculo adesset, qui nullis medicamentis ad motus mitigari poterat, tumore manifeste conspiciens, & æstum tactu percipiens, cum & manifesta grauitas ei aderat, simul & febris continua, ut diximus (quæ omnia inflammationis ventriculi signa sunt) inflammationem adesse percepi. Quare tenui & exquisito victu præscripto, ut Galen. monet lib. 13. method. pristinæ cremore contenti, a carnibus, vino & aliis cibis calidis abstinuimus, potuque aquæ hordei mundati & glycyrr. vtentes, malisq; acidis aeremq; temperatum seu parum ad frigidum vergentem, elegimus, & somnum moderatum aut paulo breuiorem admisimus: nam si longior fiat, quam oportet, potius inflammatio augetur, detēto insimul in tali somno intus non solum præter naturā calido innato, sed alieno, & eo qui præter naturam est: ad quorum detentionem non immerito inflammatio ipsa (ut diximus) augetur. Similiter quietem iniunximus; & ut motum omnem vi-

taret præcepimus. Nam prima sunt in curatione ipsa (teste Celso 5. cap. lib. 4.) quies & abstinencia: id eo & immodici animi affectus non parum nocent, & propterea vitandi sunt. Et hac quoq; de causa mandauimus ut parum loqueretur. Quod ad medicamenta attinet, confestim, cū nihil prohiberet, ex vena interna cubiti dextri sanguinem utcunque detrahēre iussimus. Deinde oleo rosaceo, cotoneorum, puluere rosa. siccarum adiecto, vel huius amulo, cum pauca cera, ventriculum inunximus. Purgationem eo tempore non dedimus, cum in principio essemus: sed frictionibus & ligaturis ad diuersionem comode utebamur: & si alium rō redderet, ut lenibus clysteribus ea tantum leniretur, cōsuluimus: mox & fotu ex floribus ros. rubear. absinthii Romani. & portulacæ decocto parato ut vteretur præcepi: & ut per os exhiberetur id quod sequitur: ℞ syr. de end. ex succo acetosæ, syr. de ribes ana ℥j. aquæ plantag. ros. acetosæ ana ℥ij. vim granat. acetosorum ℥j. misce pro iuleb. tam ob sitim quam febrem. Postea, cum materia magis fluxa esset, ne aliqua sumeret quæ intus materiam constringere possent. Quare & hunc syr. vel simile cepit: ℞ syr. viol. ex infus. rosar. rub. syr. de acetos. curi ana ℥j. aquæ end. ochor. borag. ana ℥j. aquæ absinthii fœniculi ana ℥j. misce pro i. de iulis. Et tunc prius pro leni purgatione cassia accepta, quæ antea daretur, tum non erat. Oleis supra scriptis, o. ei chamomill. & absinthii parum addidimus. Fotum quoq; adhibuimus, ex floribus chamomillæ, meliloti, rosa. absinthii, viol. matris, rad. alibæ, & somin. sumach. decoctis in aqua rosa. & chamomilla, addito in fine pauco aceto. & dolore sedato, inflammatio cessauit, tum febris ipsa, apostematis resolutione facta. Tunc quoque præscriptum, ad ventriculi roborationem diarod. abb. in tabulis. & perfecte conualuit. Venit tunc mihi in mentem historia illa Amati de mercatore, quem Anconæ curauit, qui in ore ventriculi inflammationē patiebatur, qui sauiissimus alioqui morbus sæpe est: a quo qui euadunt Iouis filii, & albæ cornicis dicendi sunt. Leni itaq; clystere fecibus eductis internam venam dextri brachii pertundere iussit, sanguine ad uncias decem extracto; & loco dolenti sequentia apposuit: ℞ olei cydon. myrtill. ana ℥j. pul. myrob. curin. ℥j. boli Armen. ℥j. eoque rep. de locus affectus ungeretur. At cum his parum proficeret & dolor ingens, cum anxietatibus & nausea perseveraret, ex eodem vulnere brachii iterum sanguinis missio ad uncias octo repetita fuit: & emplastrum hoc admotum: ℞ farinæ hordei ℥j. ros. rub. siccar. santal. rub. ana ℥j. pul. sumachior. m. hypocyssid. an. ℥ij. olei rosa. omphacini, succi omphacii, id est, agrestis ℥j. cum succo end. & ros. q. s. fiat emplastrum: quod sic frigidum, ob intentam caliditatem, dolenti loco admovebat, & sæpe innouabat: quō vir ille melius habere cœpit: neque dolor ita intense eundem vexabat. Porro ut alius singulis diebus responderet, admodum sollicitus erat, præcipue lenibus clysteribus, ut hoc sequenti: ℞ iuris pulli, vel decocti maluar. ℥xv. olei ros. viol. ana ℥ij. vitelli ani numer. ij. ℞ acch. ℥j. B. cass. extracta ℥j. salis com-

mun-

Dolor a nimio sensu quomodo curatur.

munis 3j. misce; fiat clyster. Elapsis vero quinque diebus, locus, ut antea, male affectus, fomento ex ros. & chamomilla parato fouebatur: ac postea hoc aliud emplastrum apponebatur: *Yacanthi, id est, brance versine, rosa, rub. rad. maluanisci ana p. j. in aqua fiat decoctio; & abiecta aqua in mortario marmoreo, omnia optime pistentur: quibus adde farina hordei, chamomilla, seminis leni, fenug. ana 3ss. sanctal. rub. alb. ana 3j. cum oleo ros. & chamamelino & pauca capi pinguedine fiat. emplastrum: & loco dolenti tepidum admotum fuit.* Tertio die, post admotionem emplastri, ruptus & phlegmon: & æger per vomitum saniei parum reiecit, veluti per egestionem: se tunc sic multo melius habere sensit. Sequentibus diebus aquam mellis ad vlcus lauandum bibebat, cui quandoque thuris mannam, Galeni consilio miscebat: quibus intra 20. dies sanitatem obtinuit. Cibus huic prisana erat, ad octo præcipue priores dies, cuius vice adamygdalatum, multa destillatitia rosacea paratum, quandoq; veniebat: postea vero ius pulli gallinacei ille largiebatur, aut ex eo paratam panatellam, vel eius carnibus continuatum contusum. Potus vero aqua hordei per se, aut mixtum illi granatorum vinum erat. Sed & aer circumdans, frigidus quoque erat. Hæc amatus cent. 3. curat. 93. At iuuenis, de quo prius dictum, per modum resolutionis curatus, ruptionem non fuit expertus.

S C H O L I A.

Ventriculus secundam suas tunicas, siue internam siue externam, potest pati tumores præter naturam, & præcipue phlegmonem: quam quidam volunt fieri ex calidis succis, ut ex sanguine, vel ex bile, vel ex utroque humore permixto; idque in ore ventriculi vel in alia quavis eius parte: quam ex dolore simul cum positu dignosci volunt (ut paulo ante diximus) & ex propriis eiusdem partis muneris oblatione: appetentiæ siquidem in ore ventriculi; concoctionis in eius cavitate. At quod ipsa morbus compositus sit in magnitudine primo, & secundo intemperie, & tertio in soluta continuitate, patet apud Galenum, lib. De diff. morb. tum. 3. De temper. lib. De inæquali intemperie, ac reliquis plerisque locis. Quapropter non ab re eam insequuntur, tumor præter naturam, grauitatis, ac multi caloris sensus & dolor circa partem affectam. Accedunt adhæc sitis valida, & febris ardens. Tumor autem & calor etiam tactu a medico iudicari queunt. Nausea quoque consequetur, propterea quod inflammationis causa in ventriculi tunicis contineatur. Verum ubi biliosus magis redundet succus, ita ut inflammatio erysipelatis naturam referat, vehemens erit ardor, sitis immoderatio, ac ardentissima febris, sed minor tumor ac grauitas. Ex quibus etiam signis interstinguis poterit diuersa causa eiusdem inflammationis; præcedente victu ratione, ætate, temperamento, anni tempore ac reliquis non prætermittis. Est omnium horum tumorum eadem generatio, scilicet ex superuacua materiæ affluxu, siue ab initio inutilis sit, siue utilis sui natura, sed parti molesta. Influit autem generatim

per venas, per quas nutritur. Quod si sanguis sit, primum maiores tenduntur, mox minores, donec resudat in ipsam carnem humor, eamq; spongiæ ritu madidam reddit, ac spatia, quæ fibras interiacent, & in quibus arteriæ non mouentur, replent: unde durus repletionem tumor fit, & tensio: & renititur comprimenti; & dolor adest. Calor vero tum ex natura humoris gignitur, tum quia collectum in arcto loco impactum, non transpirat: unde necessario putrescit. Putredo vero calorem gignit: qui in ea parte sit, quæ vel ob vicinitatem, vel ob præstantiam cordi calorem communicare potest, febrem facit, aut ephemeram aut putridam, prout maior vel minor est communicantia. Vnde 10. Method. 6. febres ex phlegmone aliquo modo dici possunt putridæ, si causam respicias, licet reuera sint ephemeræ natura: quando solus calor communicatur cordi, non autem putridus vapor, vide 1. De feb. diff. 5. & De vena sectione ad initium. Sed nunc sicut ex sanguine plus iusto influente, phlegmone in eo gignitur: ita & ex aliis humoribus tumores alii fieri possint. Videtur enim quod simili ratione fiat generatio, iuxta Iacchinum doctissimum, eodem scilicet influxu, ex 13. method. 1. & De vena sectione. Quod si res ita habet, cur ergo auctores phlegmones solius meminere? Respondet Iacchinus: Atqui erysipelatis stomachi alibi fecerunt mentionem, ut 10. Method. & 4. De vict. 2. Quod vero scirrhusi tumores fiant, nos, inquit Iacchinus, vidimus in dissectione: ut Florentiæ in muliere e domo Puccina. Respondetur primo, sub phlegmones voce, comprehenditur etiam erysipelata, ubi non est ex æste loquendum. Alii vero tumores raro accidunt, quoniam in membranis duras non facile confluere potest crassus & viscidus humor; præsertim in internam. Aliquando in externa constiterit: & memini (inquit idem Iacchinus) me ad tactum scirrhusos tumores sensisse; duos inquam, sine dolore. Hi ergo si accidunt, ex communi ratione curandi scirrhus, curantur; addita solum curatione a parte: quam in vno exemplo phlegmones monstrare saterit: & iure; quoniam maxime periculosa est, & curatio multum artificii exigit. Sed hic videndum, etiam ventriculum posse in tumorem eleuari ex solo vento: cuius habemus exemplum apud Beniuenum De abditis causis caput. 40. Annum 16. agens Petri Guicciar dini filio ita cervix ventriculi sine ullo doloris sensu eleuabatur, ut magnitudinem cydonii pomi æquaret: nec manifesta causa ostendebatur, cum omni notamento careret. Quare rem admodum diligenter vestigare cæpi; admiratus quoniam abditæ huius mali causa esse possent. Sed quum nullum prorsus præter ventum inuenirem, a quo, ventriculi caput paulatim eleuato, ita eiusmodi fieret tumor, ut & ossa talem situm adepta, nec ultra ad pristinum statum reuersa, figuram illam illis impressam tanquam naturalem custodirent: ferrea demum lamina, quæ ex cingulo quoque surgebat ferreo, stomachum comprimere iubeo; quo paulatim ad fidem suam retrocedere cogeretur: quod factum est. Nam haud multo post hoc vno tantum præsidio ita repressus est

Vnde tumor, tensio & dolor ac calor.

Vnde febris.

Quomodo tumores in stomacho etiam ex aliis humoribus fieri possint. Scirrhusi tumores post dissectionem in stomacho inueni.

Duri tumores in parte externa aliquando constiterit.

Elevatio stomachi.

tumor ille, ut ad pristinam ac naturalem formam ipsius ventriculi cervix penitus reuersa sit. Hæc Beniuenius. In iliaco dolore, cum excrementa per os redduntur, ventriculus quoque in tumorem quandoque attollitur (*ut nos vidimus*) partim quidem ex flatibus, sed magna ex parte ab excrementis eo perlatis. Quandoque autem tale aliquid contingit, non modo spes vitæ superest; sed mors fere imminet. At stomachum indurescere diximus paulo antea. *si holi obs. 25. huius libri*, eiusque curationem, sed breuem, adiecit: sed durities illa non est omnino sine dolore. At erysipelas licet eque aut magis periculosum, quam scirrhus tumor ventriculi præcepta tamen curatiua habet simplicissima; scilicet solis frigidis intus, & extra admotis. Sed nos de phlegmone prius agamus, id est, tumore facta a mediocri sanguine & vili. Hic ergo in partem influit ex maioribus venis, quæ eo confluunt: confluxus vero causa est, vel ex ipsa parte attrahente, vel ex quapiam alia transmittente (*iuuat enim modo suffissimas Galeni demonstrationes 13. Method. in Epitomen cogere*) Quæ transmittunt, robustiores necessario sunt, vel natura, vel ex accidente aliquo suscipientibus comparata. Transmittunt autem, quia ipsa se grauari sentiunt, vnde vi vtuntur noxiorum, leu onerosorum expultrice. Quæ vero grauant, aut quantitate molesta sunt, aut qualitate vitiosa & noxia: vt calida, frigida, acida. Ex altera parte, quæ attrahunt, confluxum causant: attrahunt vero calore partis, aut dolore. Opus vero caloris Asclepiades nolebat attractionem dicere, *ut Galen. scribit*: ipse vero vult attractionem dici; cum ille influere humores, non autem attrahi in partem calefactam diceret. Et quidem non facile decernitur (*dicente Jacchino*) quis horum rectius sentiat. Asclepiades calore, vt puto, considerauit fundi & liquari circumstantium partium succos: aperiri partis meatus ac laxari. His facilis fit confluxus, vt contra frigidis arcetur. Nec Galenus aut ratione, aut experimento monstrabit, quod calore attractio fiat. Nam quod in magno mundo a sole sursum feratur vapor, attractio non est: si quidem per se mouetur sursum, ex forma quam a generatione acquisiuit. Ratio vero, solum rarefactionem & heterogeneorum solutionem a calore fieri inuenit. Secundo *De diff. feb. 11.* loquitur disiunctiue, quod calor vel attrahit vel recipi facit. Adde, pro Asclepiade, quod calor, cum intemperiem efficit, dolorem efficit. Ad dolorem non propriam attractionem reducit Galenus, sed ad transmissionem, *ut statim dicemus*. Dolor enim, inquit, confluxum excitat: quoniam natura dum causam contristantem expellere tentat, si quidem primo impetu non prospere succedat; maiore impetu nixa, sanguinis aliquid, & spiritus eo trudit. Sic ad dolores plagarum, tumorem insequi cernimus. Hoc ergo non est dolorem attrahere, sed doloris occasionem esse, vt humores in partes transmittantur. Quod si *2. De diff. feb. & alibi centes* attrahere dolorem inquit; non proprie de attractione loquitur, sed cum ea similitudinem habet, quatenus pars do-

lens ipsa dolore repletur. Ideo rectius loquitur *3. Method.* cum inquit: Dolor est fluxionis causa: non dicit, fluxionem trahit. Et rursus *6. De v. sup. parium*, attractionem triplicem ponit; vacuo, calore, familiari qualitate: doloris vero non meminit: sed hoc, quia non erat ad propositum, cum de attractione cordis ex arteriis loqueretur. Considera ex eo loco expertum attractionis caloris: vt flamma ex ellychnio oleum attrahit, & hoc caloris vi ex lucerna, vnde eam exhauriri videmus. An non videas magis num siccitate attrahat, an calidi? sicca enim humidum attrahere vehementer videmus; vt spongiam, linum: hinc ergo ellychnium. Sed tunc aliam causam attractionis dare oportebit: nempe quæ a siccitate sit. Præterea si hæc esset attractio, tunc siccum, id est, igneum, humidum sibi contrarium attraheret: contraria vero se refugiunt. Sed hæc alias. Signa phlegmones ventriculi, si ex ipsa natura haberi debent, partim affectus natura sapient, partim affectus partis. Atqui affectus signa hæc sunt: dolor primum, qui ex solutione continui fit, facta ex materia repleta, & tendente sensitiuas partes: mox tensio, seu exus partis, quæ repletionem accedit. Cum enim durum vniuersum sit, quod tactui, non cedit, *s. De simplic.* alia dura erunt concretione, alia repletionem; cuiusmodi est phlegmone. Quod vero materia, a qua fit, sit sanguis, necessario calor aderit parti; & non solum ex natura materię, sed etiam ob putredinem, quæ ex necessitate sequitur. Semper enim humida & calida corpora cum in calido loco manent, non perflata citissime putrescunt. At non perflantur, quod omnes meatus, per quos transpiratio fit, sunt adstricti vel obstructi. Vnde & probe Th. Salici phlegmonem adstrictam passionem dicebant. Rubor vero ex natura humoris accedit. Hæc indicant omnem phlegmonem, quæ sub sensum venit: sed si interna sit, non omnia hæc sentiuntur; quædam tamen. Primum ergo dolor sedem affectam demonstrat, si præsertim non extimas partes attingat, quod tactu distinguitur. Vnde internas partes afficere monstratur: quæ & ex vehementia eius coniectura fit. Mox sensus tactus aut visus tumoris circumscriptionem sentit: sed hoc non semper euenit, vt cum remotas partes obsederit. Ideo, quod dicit, & apostema manifestum fuerit, id est, tumor apertus; efficax quidem nota est, sed quæ non semper sentiatur. Fit tertio coniectura ex febre, quæ necessario adiungitur. Est autem necessitas generationis ex putredine, *ut in lib. De vena sect. habetur, & 1. De diff. feb. 5.* Quæ cum necessario putridum calorem excitet in parte: si quidem pars illa, vel quia vicina est, vel quia nobilis, multis vasis abundans; vel ob multitudinem materię collectæ calidæ; communicabit cordi calorem suum igneum: vnde vniuersum corpus incalescet præter naturam; & ita fiet morbus febrilis. Quod si non modo calorem, sed & putridum vaporem insuper impertiri possit, iam non febris modo, sed putrida fiet. Cum igitur venter vicinum positum habeat, ar-

Erysipelas stomachi.

Phlegmone ventriculi ex sanguine mediocri & vili confluente.

Hæc doctrina multis partibus erit communis.

Phlegmonem interna signa.

teria, & iecinori, facile febrem faciet. & eam putridam, & continuam: cuiusmodi sunt omnes febres, (ut ostendimus in libris nostris de febrib.) quæ ex viscerum tumoribus & inflammationibus fiunt. Hæc Rhases. Sed super eundem scribens Iacchinus (cuius verbis hætenus usi sumus) coniecturam, inquit, solum affectus facies, nisi & alterum addatur; calor loci perceptus, & ab agro & astantibus; cum palma ventrem attingunt. Adde & sitim, quæ necessario euenit; nam cetera symptomata, quæ Galenus numerat, insequuntur, præcipue os ventris afflictum: ideo adaugent coniecturam affecti loci, sed non affectus. Siue enim conuulsio seu delirium sequatur, siue cibi horror: omnia, inquam, ad ventris morsus sequi dicuntur: sicuti & animi deliquia. Ob has causas Auicenna vaga quædam signa addit, ut certificet coniecturam; Si (inquit) dolor remediis non soluitur, & durat, significat apostema. Sed signum est inefficax, nisi intelligatur continuitas caloris: hoc enim aliquid facit ad agnitionem cum reliquis. Similiter & vitia pulsus & anhelitus, communia aliis causis esse videntur, non propria phlegmones. Hæc de signis phlegmonem indicantibus. De prognosticis postea.

OBSERVATIO XXXI.

De ventriculi phlegmone, seu inflammatione lethali.

Grauitate & continuo febricitabat Harko quidam Alcmarianus, admodum senex, qui iuxta Sacellum Sancti Spiritus, ex phlegmone ventriculi decumbebat, & ex continuo singultu, qui procul dubio etiam ex inflammatione ortum habebat. Ad hunc cum circa quartum diem prius accitus essem, vix remediis adhibitis, facto etiam prognostico, eodem die obiit. Neque admiratu dignum, cum morbus hic semper periculosus sit; nam & de morbi magnitudine quid attinet dicere, cum & per se lædat plurimas & necessarias actiones, ut nutritionem: & dolorem prostermentem vires inferat. Habetque id præcipuum, ut principes partes in consensum maxime trahat. Sed de his latius in scholio.

SCHOLIA.

Vbi stomachus inflammationem sustinuerit, magna opus est diligentia, teste Alexandro Tralliano lib. 7. cap. 14. quoniam maximum morbum & necessitatem corpori affert. Quod si imbecilles fuerint vires, iis, qui ea laborant (ut huic senienti) mortifera ut plurimum esse solet. Quamuis non solum iis, sed etiam qui valentiores ipsis sunt, ab ea interitum consueverunt. Nam quibus veliecur, vel ventriculū phlegmone obsidet, veluti pleuriticis, peripneumonicis ac synanchicis, vna salus est, videlicet ipsam virium robur, ex Galeni decreto 10. meth. med. Curatio quanquam ex communi phlegmones curatione pendeat, ut augmentum inhibeamus, & factam phlegmonē curemus: ea tamen oportet ad ventriculi phlegmonem accommodare. Præscribemus itaque vitum refrigerantem (ut iam diximus) & tenuissimum; & si naturam erysipelatis magis referat,

magis refrigerantibus vtendum, ut lactuca, cichorea, vel endiua, vulgo scariola dicta, in aqua hordei decoctis, & pusana, postea in iure pullorum gallinaceorum decoctis: abstinentes a vino & carnibus, ut dictum est. Venam quoque statim secabimus, præcedente clystere emolliente, si alius strictior: pariterque ad diuersionem frictionibus, ligaturis, cucurbitulisque ac reliquis diuersionibus vtetur circa initia: abstinētes a medicamento purgante, ne materiam ad locū afflictum & inflammationem trahamus: ex Gal. decreto. Huius habemus hystoriam apud Grad. supra 9. e Almanforis, cap. proprio, de puella iuvene robusta, quæ cum die 3. ab initio apostematis medicamentum solutiuum, contra opinionem alterius medici, cepisset, 5. die obiit. Vomitus hic perpetuo etiam euitandum voluit, cum ventriculū dilaceret: alii tamen tempore mutationis conuenire existimant, ut rumatur: præstat tamen ab omni vomitu abstinere. Quod purgatio non conueniat in principio, constat ex Gal. 13. meth. medendi. Post hæc ad ea quæ extrinsecus applicantur confugiendum, & mixta curatio debet esse, ex astringentibus & laxantibus: quæ circa initia semper adstringentia intendi debeant, iuxta eundem Alexandrum: & si eis duntaxat vtaris eo tempore, non peccabis, ex Galeni auctoritate 13. method. medendi. Vallet itaque oleum omphacinum, rosaceum, cydoniorum, vel de absinthio, si valida non fuerit inflammatio, aut feruor: vel ex rosaceo & absinthio per flor. chamomel. radic. ac foliis althææ præmixta in aqua pluvialis decoctum facit, & paucis aceto aut vino albo fiant epithemata vel vnguent. ut iam ostendimus exemplo paulo superius dicto. Et ubi iam laxantibus magis indigeas, utpote incremento aut vigore, adde prædictis laxantia, & augeas, ut chamamelum, althæam, semen lini, meliloti & fenugræci & adipem anserinum, oleum chamamel. anethinum, lilaceum, & mastichinum, ac vtriusque amygdal. iis omnibus aut quibusdam simul permixtis, varia medicamenta compones, uti vltus postulabit, & epithemata, cataplasmata, & vnguenta. De quibus vide Aetium & alios auctores. Vbi moderata fuit inflammatio, etiam ceratum Galen. 4. method. sufficet: & ubi stomachus magis corroborari postulet, aloem augere conuenit, admiscereque cum eo succum absinthii, aut cœnanthem, aut succum capreolorum viris. Ceterum ubi phlegmone prorsus inclinauerit, & alius non deiciatur; tunc poteris exhibere mannam, thamarindos, syr. ex infus. ros. viol. Vbi vehemens sentitur ardor, vel cassiam, cum cichorii aut hordei decocto. Et quamuis Galen. sit. 13. method. & filiculam & corticem nigri veratri approbat. iis hoc tempore præstat abstinere. Si quid vero scirrhum relictum est, uti phlegmone est, ita ut emollientia requirat, etiam corroborantia ac astringentia cum eis permisceri debent, ex Tralliani decreto: quorum medicamentorum magnam copiam reperies apud eundem, & Aetium & Paulum. Si itaque durus tumor appareat: siue quia ab initio vera phlegmone non erat: vel

Refrigeran-

tia.

Vena sectio
& diuersio.A purgatio-
ne in princi-
pio abstinē-
dum.Error cuius-
dam medici
notatur.Vomitus nō
conuenit.

Tópica.

4

Signa pro-
gnostica.

Curatio

Quo tempo-
re purgatio
præberi pos-
sit.

6 erratum est in remediis, resoluendo fortius quam expediat; tunc malagmatis est utendum: quale ex meliloto fit. Cuius generis est & illud a Rhase, ultimo loco descriptum. Egregie valent, cum & vim abstringentem adiunctum habeant. Oportet ut illa medicamenta, quæ ventriculo vel iocinori apponuntur, habeant aliquid adstrictionis, ut Galenus monet in historia ex Theagene Philosophi Cynici. Est namque ventriculi (ut paulo ante diximus) sicuti iocinoris, maximus, & toti animali communis usus. Stomachum enim, providentissimus artifex, Deus in medio totius corporis posuit, tanquam ciborum receptaculum, aut promptuarium quoddam, ut ab eo cetera membra nutrimentum sibi ipsis exposcerent, captarentque. Ideo semper roborandum est. At erysipelatis intentio magis est refrigerandi, ut phlegmones vacuandi, 13. meth. & 14. hinc fit, ut eius curatio sit refrigeratio; quali utitur 10. methodi & 9. meth. 5. Modice tamen fiat, id est, quantum exposcit affectus, ne forte in affectum frigidum transmigret: sic enim scirrhi gignuntur.

OBSERVATIO XXXII.

De apostemate frigido ventriculi ac diuturno, in abscessum & pus transmutato.

1 PVella pauperula 18. annos nata, in platea diui Petri dicta, Alcmariæ habitans, per integrum annum circa stomachum intolerabili dolore cruciabatur: quæ cum medicis non vteretur ob paupertatem, forte fortuna me transeuntem vicini ad puellam introduxerunt. Magnum tunc tumorem circa mucronaram cartilagine[m] conspeximus, valde eleuatum & duriores, tactui resistentem. Quem locum cum leniter attingerem, ferre non poterat. Crura autem tum reliqua membra stomacho non coquente, macie consumpta videbantur, nutritione minus accedente. Præ nimio dolore misera exclamabat, se apostema ac abscessum in stomacho habere: quod & signa præsentia indicabant. Astantes mulierculæ nescio quæ non adhibuerant ad dolorem tollendum; prius existimantes, hunc dolorem tanquam ventosum se posse auferre tegula calefacta apposita; modo etiam tabula lignea, ut vulgares facere solent; eaq; externa causa vel simili, sua caliditate materiam ad stomachum conuertunt; eaque attracta, cum non possit debite a natura regulari, porositates concauitateq; medias stomachi subintrat, ac vnitatem soluit, ac apostema per se aliquando inducit; talis error plerumque ab astantibus imperitis inducitur: etiam subinde a medicis indoctis, dum ventosam magnam ventriculo, corpore impuro existente, apponunt; vel pannos calidos, aut frictiones fortes ventriculo adhibent; idq; in principio existimantes omnem dolorem ex ventositate oriri. Cum hæc itaq; integro anno dolore confecta ad extremam maciem deuenisset, facile ex signis præsentib. intelleximus, ibi abscessum diuturnum frigidumq; adesse, cum nulla siti præmeretur, quâquam subinde leuiter febricitare videbatur. Et quum iam longo tempore aluum non deposuisset, & libenter clysterem emollientem prius iniecissem, quem nullo

modo admittere volebat, mandavi ob dolorem, ut talis fatus fieret, prius epotâ decocto sequenti, parato ex foliis senæ, foliis caulium rubrorum, scabiosæ (quæ omnia apostemat. interiora resoluit vel maturat, vel rumpit; quod non solum in hac puella, sed etiam in alio abscessu interno siue pectoris seu alterius cuiuscunq; expertus sum.) ficibus adiectis & uuis passis absque arillis, dentis leonis (ob febriculam) foliis maluæ, & rad. althææ, decoctis in sero lactis: qua bis in die, cum pauperula esset, utebatur ad aluum emolliendam. Quæ licet in principio minus conuenissent, ut scholio præcedente dictum est: tamen hic, cum in declinatione diu malum exstitisset, & maturatione opus esset, commode hoc decocto vti sumus: tum fatus ex decoct. folior. maluæ, rad. althææ flor. chamomill. mentha, & absinthii utriusque tam ad dolorem sedandum, quam ad maturationem; reliquiis cõtusis, & butyro receti mixtis, cataplasmatismodo stomacho appositis. Et præter spem intus ruptum est apostema; & abscessus ille annuus, vomitæ instar: & euomit sanie sanguinolentam; & per inferiora satis copiose saniem excreuit, tumore detumescete, & dolore omnino consopito. Quare statim ad deterfionem puris, vti sumus decoctione hordei non excorticati, pauco melle rosato adiecto, ad detergendum vlcus: & egregie hæc ipsa conualuit, cum admiratione multorum. Quidam vulgares eo tempore, qui tunc aderant; huic puellæ dedisset oleum oliuarum pro vomitorio, etiam post abscessum disruptum, ad leniendum vlcus, ut illi adserebant; quibus restiti, neq; admitterebam; auctoritate Galeni edoctus; qui nos lib. 5. meth. med. ita admonuit: (Ceterum (inquit) qui e ventriculo eluere pus voluit, non sine periculo vomitum prouocant: sicuti si aliter infixam illi putant per oxymeli & radiculam detergerent. Tutius itaq; est deiectione vti, cum vomenti periculum sit, ne & quod vlcus sit, dilaceret, & succum quempiam inutilem ex vicinis attrahat. Absq; mora itaq; continuo decies in hora capiebat cochlear vnum atque alterum, vel paulo plura ex decocto hordei, cum pauco melle ros. cum subitanea eiusmodi vlcera indigeant mundificatione, ne profundantur, aut tunicas stomachi penetrent. Hoc enim modo hæc miseram pauperulam puellam, vlcere absterfo, sanitati pristina restituiimus, diuina gratia nobis assistente.

SCHOLIA.

4 A Postemata & abscessus, iuxta iuniores, qui Auicennam sequuntur, & supra Rhase[m] scripsere, fiunt, vel per modum congestionis paulatim; vel per viam defluxus, ab omnibus humoribus: vel ex vno, vel duobus simul mixtis, & calidum quidem ex sanguine vel bile; frigidum ex pituita vel humore melancholico; cui nonnulli addunt apostema ventosum, si & ventositas simul adsit. Si igitur calidus est abscessus, aut ex cholera vel sanguine oritur, aut utroque humore, æqualiter, calidus, aut inæqualiter. In bilioso abscessu, dolor tactu vel vti clauus infixus, inest feruentissimus, cum ardenti febre, naturalique circuitu, siti audissima, cibi radio, vomitu quandoque bilioso, cum furore

Sanguineus. furore phrenetico; vrina citrina vel flaua conspici-
 citur. Ex sanguineo vero abscessu venter superior
 pars magis tumescit, ac extenditur, cum maiori
 pulsu, ac grauitate; vrina purpurea cernitur, vena-
 rumque pulsus maiores sentiuntur, tumor ipse
 mollior efficitur: si virium vetus fuerit, corpus
 macie conficitur, caui oculi fiunt, vrina subsistit,
 alius liquida redditur; & assumpto cibo stomachus
 male afficitur. Abscessus frigidus, nempe humore
 congesto, mala concoctione, nimio otio, humo-
 reque eodem confluente fit. Ex pituita abscessum
 grauitas sine siti indicat absque ardore stomachi:
 tum nulla febris adest vehemens, vel periodica
 tantum, os salua abundat, venter ac facies pallent,
 turgent sine duritie; nullum cibi desiderium est,
 pulsus mollis, vrina crassior, alba, corpus graue
 redditur, ac torpore quodam afficitur, qualis le-
 thargicis euenire solet, leſa ex aliqua parte memo-
 ria. Ex melancholia apostema durum est, in quo
 dolor non perpetuus est; sicuti neque cibi appeti-
 tus: venter in eo quandoque sponte fluit: sed sem-
 per corpus macie conficitur, ructusque acidos e-
 dunt, agri insomniculosi. vrina tenuis, ad glaucū
 vergens, pulsusque tenuis est, ex abdita febris: vis an-
 helius grauis est, ac animus tristis, ac semper mœ-
 rens. Oltium ventriculi, praesertim in abscessu ca-
 lido, saeuissimo dolore afficitur: animus enim vel
 primo die protinus linquit, non aliter quam præ-
 cordiorum abscessu: vnde neruorum distentio-
 nes, mentis animique furor oboritur: multi namque
 & attoniti fiunt, ex cerebri & cordis haud dubia
 communicatione cum ore stomachi, in quibus-
 da nimia inedia sensibilitate adeo obfuere, vt simi-
 liter caderent, spasmatis membris omnibus. Ma-
 xime mentis alienatio comitatur si sit apostema
 calidum: si frigidum, caros, stupor. Si sit in fundo
 stomachi, dolor est minor, & excreſcit, non im-
 mediate post cibum, sed per horam post eius as-
 sumtionem: tumor quoque & dolor prope umbi-
 licum, per duos digitos aut tres, aliquando decli-
 nans magis versus dextrum, modo sinistrum: ma-
 gisque leditur concoctio quam appetitus: & in fun-
 do magna ex parte subsequitur maior lubricitas
 ventris. Si in parte anteriore, magis subiacer sen-
 sui, & dolor in parte anteriori sentitur; & non to-
 lerat ager compressionem. Si in posteriori, e con-
 tra dolor in posteriori parte sentitur. Si sit in o-
 mnibus partibus, accidentia omnibus partibus
 sunt communia. Si in tunica interna, symptoma-
 ta valde intenduntur: dolet supra modum, appe-
 titus deficit: syncopis, tremor ob cordis con-
 sensum sequuntur: & vomitus, si in superiori par-
 te, vel secessus si in fundo: vt licet in contrarium
 euenire posset, dolor augetur, quasi immediate
 sumto cibo, & in descensu; & dolor circa spatulas,
 ob œsophagum seu gulam extensam per deorsum.
 Si externa tunica, accidentia magis remissa, ne-
 que fit dolor maior sensibiliter post assumtum ci-
 bum; nisi esset multæ quantitatis. Tumor & du-
 rities exterius magis percipiuntur; neque aliquid
 sensibile per vomitum aut secessum educitur de
 apostematis materia; neque ita læditur virtus ap-

petitiua aut coctrix: modo habent ventrem mol-
 lem, modo duriores, deficiente virtute retenti-
 ua, aliquando expulsiua. His addunt signa tem-
 porum apostematis & resolutionis, maturationis,
 ruptionis & indurationi: de quibus de pleuritide
 dictum est. Reliqua vide apud Arculanum, tum
 reliquos.

Prognostica signa ex superius dictis etiam pa-
 tent, quod confirmatum ventriculi apostema, vt plurimum interficiat, calidum tamen velocius
 quam frigidum. Et si ad maturationem & exitu-
 ram tendat, sæpe desperationi propinquior quam
 spei est. In cancroſo nulla spes relicta. Pituito-
 sum magis quam biliosum sanatur. Et in tunica
 externa minus malum quam in interna: exteri-
 us medicamenta imposita magis iuuant: & in tu-
 nica interna magna ex parte calida sunt per viam
 defluxus; frigida per congestionem. In fundo
 minus mala quam in ore, imo pessima. Ratio in
 promptu est: fundum minus sentit, & fortius est
 in resoluendo, ob caliditatem. Hæc quoque ma-
 la censenda, si frigus membrorum extremorum
 accedat; imo lethale, iuxta Hippocratem, si fri-
 ctionibus & pannis calidis non remoueatur. Bi-
 liosum quoque deterius sanguineo: & melancholico
 pituitoso. Interna quoque si ad sanationem per-
 ueniant, vix vel nunquam curantur, ob mem-
 brum nobile: quamvis hæc puelli curata fuerint,
 est ex raris contingentibus. Ita & Gradus in toto
 tempore suæ praxeos, tantum bis terue curatos
 vidit. Quomodo calidus abscessus seu apostema
 curetur, iam ex parte dictum est. Cælo primum
 frigido & humido ager contineri debet, vbi sine
 animi perturbatione, sine lectione, balneo, sine
 frictione stomachi degere oportet. Nec somnus
 longior conuenit. Valet & cibis facilis coctionis:
 ac paulatim frigida ac humida nature, tum actu,
 tum potentia offerendus est. Vinum obest & car-
 nes, & omnia tragemata ex saccharo & melle.
 Valet *syr. viol. ros. thamarindi & pul. hordeacea,*
cum succo punice: & syr. ex succo nymphæ: vtrius-
 que iam dictus vsque ad septimum: deinde attri-
 plex, cucurbita in cibo danda. Suppurato ab-
 scessu, refrigerantia & adstringentia paulatim re-
 mitti debent. Alius lenienda clysteri tantum
 mollienti. Et si ex sanguinis vitio sit, valet *syr.*
ros. oxyzacch. In bilioso, *viol. nymph. pap.* & pro-
 tinus vena secanda, vt diximus. Sed a catharticis
 abstinendum. Partiaff. & frigida prius im-
 ponda, leuiter astringentia: increſcente malo par-
 tim dissoluentia, partim astringentia: vbi consi-
 terit morbus, dissoluentia & laxantia augenda: ita
 tamen, vt non careant restringentibus, ob partis
 nobilitatem. Inclinate malo, ad maturantia, & dis-
 soluentia veniendum. In fine demum, si non re-
 soluatur abscessus, sed suppuretur, maturan-
 tia ac emollientia conueniunt; adiectio tamen
 leui constringente, & ventriculum roborante,
 vt succo absinthii. Prorumpente demum pure,
 vlcera curationes lequuntur. Quorum copiam
 praesidiorum inuenies apud Alexand. Benedictum
 Veronensem: quæ magna ex parte ab Arculano

7
Prognostica

8

Curatio ab-
scessus ca-
lidi.

9 exceptit. At in abscessu frigido, si initio discutien-
tibus non curantur, (sicuti priores abscessus) mate-
ria enim crassa est, ac parum obsequēs; diaphore-
tica plurimum valere volunt, hoc est, resolutentia.
Quidam ea admiscere ausi sunt: quod alii minime
censent, nisi commixta quoq; cum calida mate-
ria foret. In phlegmatico igitur convenit in prin-
cipio oleum ros. & absinthii æquis portionibus,
imposito emplastro ex *far. fœnug. lini, hordei, lu-
pinorum, meliloti ana ℥ j. absinthii, schœnantiana ℥*
ij. ros. rub. myrti, aloes ana ℥ iij. tusa & cribrata ro-
faceo excipiantur, adiecto adipe gallinaceo, an-
ferino, & succo plantag. linguinalisq; Alii saccu-
lis vtuntur duobus, aut spongiis decocto perfu-
sis, & expressis inter duas tabulas, ex decoct. ros.
*cauliculorū myrti, mentha, absinthii, santal. schœnan-
thi, nardique paribus portionibus, exiguo vino auste-
ro decoctis, & percolato succo.* Interea rhodomel in
potu iuuat, cum plantag. & absinthii aqua. In-

*Apostematis
seu abscessus
frigidi cura-
tio & pitui-
tosi.*

10 crescente abscessu inungemus oleo ros. chamamel.
anethino, nardino ana ℥ ss. cera quod satis est, adie-
cto spica, maceris, schœnanthi exiguo, & superimpo-
suo emplastro ex farina lupinor. fœnugr. ana ℥ ij. ros.
meliloti, chamomill. anethi, apii ana ℥ ss. cum brassi-
ca succo, & oleo chamameli. In statu, vtuntur o-
leo nardino cum spica, schœnantho, cyperio &
aceto, & emplastro ex melilot. chamomill. radic.
alth. ammoniaco, adipe anferino & gallinaceo,
& similibus: & si ad collectiones veniat, radice
liliorum cocta & imposita, & quicquid collectio-
nes aperiat, si suppuretur. Sed vnum inprimis
animaduertendum est: si venter intempestiue
fluat, tum emollientia plurimum obsunt; sed a-
stringentia imponenda sunt, donec subsistat al-
uus, ex palmulis emplastro frigido, aut calido pro
abscessus qualitate cum succo vix acerbæ aut ab-
sinthii, aut si opus sit, materia mixta vtrumque
commiscebimus. In abscessu melancholico, inter
initia rosaceum, lilinum, lutearumq; violarum, aut
narcissinum cum aceto commixta valent, inuncto
stomacho, & subinde hoc emplastro imposito:
*℥. farina fœnugraci, sem. lini, althææ ana ℥ ij. meli-
lot. rosæ. aneth. myrti ana ℥ ss. ex iis æm oleis cum
adipe gallinaceo, ac anasino misceantur.* Cum in-
crescit tumor, inungimus violaceo oleo ex luteis
viol. lilin. adipe anasino, anferino, addito croco.
In statu, ex adipe anatin. anferin. gallinaceo, ceruin.
vitulin. an. ℥ j. styracis liquid. bdell. myrr. spic. ma-
stic. cyperi. cartham. sem. interioris an. ℥ ss. amygd. a-
mar. ℥ j. gummi in vino dissoluantur: deinde tulas
amygdalas conuicito, & reliquas species; adipem
postremo infunde: id emollit, discutit & confor-
tat. Si phlegmone indurescat, valet emplastrū de
meliloto; & Nilei malagma, quo veteres uteban-
tur, qui gloria sua fraudandi non sunt.

OBSERVATIO XXXIII.

De ventriculi ulcere.

1 PVella 15. annorum, per biennium fere cum de
dolore ventriculi cōquereretur, aŕno 3. tumo-
rem manifeste viderunt parentes in eo loco: neq;
tunc quicquā consilii aut remedii tēratum. Hinc
ruptionem animaduertunt: excreuitque puella

materiam biliosam, pituitosam ac saniosam per
aluum. Ex his apostema apparuit. Hæc cum Bo-
noniæ in Italia decūberet, tunc prius vocatus est
Elideus, medicus hospitalis Bononiensis Viri di-
ctæ, præceptor meus. Is indicatione sumta ab æta-
te, virtute, temperamento, loco male affecto (quo-
niam locus vehementer sensibilis existit) continuiq;
solutione; iudicauit necessarium exsiccantibus
abstergentibusq; vtendū esse, ac magna opus fore
diligentia, tum quia locus est principalibus mem-
bris subministrans; tū quia toti corpori nutriti-
um præparans. Quare loco potus & digestionis,
præscripsit aque mellis vsum. Cibum vero facili-
mē coctionis, exigue quātutatis, ex hordei cremo-
re, nonnūquam ex panata, exiguo cinamomo ad-
iecto: & aliquando vinum in pauca quantitate ad-
misit. Pulsus huic erat creber, debilis, paruam ha-
bens inæqualitatem vt fit in affectibus vetriculi:
vrinæ albæ, crassæ, nō coctæ. Stomachum inunxit
oleo mastichino, cum lana succida applicando.
Tertia die vidit eam licentia laborare: & quem-
admodū Gal. 6. par. aph. 1. causam eius fore dice-
bat, vel imbecillitatē virtutis retentivæ, vel vlcera-
tionem vetriculi & intestinorum; sed præceptori
certo persuasum fuit, hanc prouenire ab exulce-
ratione stomachi, ob loci dolorem, ruptionem &
saniosam materiam; non ab ipsius virtutis debili-
tate. Ideo adhibuit fomentū exsiccatiuū & con-
strictiuum; nēpe ex absinth. mont. flor. ros. malicorū
gallis, balauft. myrrill. mastich. olib. exhibendo præ-
terea mium cotoneorum, cum quibusdam ad-
stringentibus. Hinc tandem excrementa melius
cocta visa sunt, & sanata est.

SCHOLIA.

EXulceratur sæpe stomachus, leuiter tacta tu-
nicarum superficie; modo grauius ambabus
tunicis erosio, vel perforatio lethaliter. Exulceratio
alia recēs est, alia inueterata, ex acutis humorib.
in stomacho congenitis, aut capitis acutis destilla-
tionibus, aut abscessu ad aperto pure (vt in hac
puella, tum præcedente) aut pustulis in eo ortis, ex
quibus pestifer exit liquor. Ex vulneribus quoq;
præsanatis, aut perperam, vel per incuriā relictis.
Venena item philtæ potione exulcerant, &
stomachum & intestina omnia, sicuti & cathar-
ctica ab imperitis oblata; veluti scammonium &
euphorbium. Refert Benedictus Veronensis o-
biter exemplum vnum cuiusdam religiosi; vi-
cinum quendam in podagræ dolore auxilio præ-
sentissimo curaturum se promiserat; audierat e-
nim hic bonus homo, pilulas, quæ ab euphorbio
in officinis nomen habent, huic morbo sæpe
profuisse: ex solo igitur euphorbio confici pilu-
las speciariorum non minus quam ipse erat impru-
denti, iussit: assumtis catapotis, dysenteria eo die
æger correptus fuit perniciofa; atque altero se-
pultus. Exulcerato stomacho febris adest subin-
de, lingua aret, sitisq; viget, animus quoque sub-
ducitur, si vlcera ingentia fuerint, & in ostio præ-
sei tim stomachi. A cibo salso præsertim quoque
frigido, aut calido, vel acuto, veluti sinapi, ace-
to assumto, summus dolor. Purulentia præterea
vel cruen-

3
Exulcera-
tionum, &
machi dispa-
rant.

Libr. 12. cap. 17.

4
Signa.

vel cruentę vomitiones, immixtis tunicarum cru-
stis indicio sunt. Oris item graecolentia ex crudis
veluti piscibus, vel adustis ossibus, & ventris lien-
teria adest molesta. At exulcerationis varietas, ma-
gnam differētiā habet: in primis oris stomachi
limumm dolorem ac accidentia sequuntur terri-
bilia; difficultas anhelitus, sudores extremorum
frigidi, ac animę demum defectus: cibus quoque
deuoranti cum os stomachi pertingit, maximum
dolorem infert; delapsus exinde, quiescere statim
permittit ægrum. At quę in imo ventre sunt vlce-
ra, minus lædūt: sed male digerit æger. Verum si

*Vlceris signa
in ore ven-
triculi.*

*In imo ven-
tre.
In œsophago.*

*Differentia
ulcerum in-
testinorum
graciliū &
stomachi.*

Prognostica.

vicus in œsophago infederit, inter scapulas (ut
narratum est) dolor figitur, ac in deuorando cibo
excruciat æger, minus tamen, quam si in ostio
fuerit. Intestinorū graciliū, ac stomachi vlcera
cum in eodem fere sint confinio, doloris loco fe-
re non discernuntur: tempore tamen cruciatus,
differunt, graciliū enim intestinorum tormen-
ta sæuius sentiuntur, ac inter excrementa tunica-
rum ramenta conspiciuntur; sicuti inter vomitio-
nes ulcerum crustę cernuntur ex stomachi vlce-
ribus: qui acri cibo assumpto, protinus læditur, quo
intestina tenuia non læduntur. Quibus stomachus
supra modum exulceratur, nunquam sanantur: &
si vetus vitium est, lienteriam inducit, aut ex acu-
tis humoribus vel corruptionibus, dysenteriam
minatur: iis plerumque os graue olet, uti apud
Dodonæum cap. 25. de honesta matrona constat,
annos (plus minus) 40. nata, quę ex ore foeten-
tem spiritum multis emiserat annis; quę longo
tempore morbo cōfecta e vita decessit: & ventri-
culus exterius ab omni parte superficietenus in-
uentus est exulceratus, & quę ipsum contingebant
vniuersa, non tamen alia, quam quę ventri-
culo contigua erant, parte. Exulcerato stomacho

*Curaciones
ulcerum sto-
machi.*

(ut Paulus scribit) in omnibus quidem eduliis ob-
soniisque acria vitanda sunt; atque eadem pariter
in potionibus. Sed mitigatoria utique laudantur,
quales pulres sunt sine oleo, ex amylo, hordeacea-
que farina, ac terra Samia Lemniacque rubrica, ex
lacte aut melle. Et quoque sine medicamento mor-
daci purgandus est æger. Nostri recentiores, præ-
ter aeris temperamentum, animi securitatem lau-
dant, ac temperatum somnium. Ac inter cibaria
quicquid actū vel potentia leuiter exsiccat, qualis
panis similis, gineus est, sine sale, sineque multo fer-
mento, ac pilana, alica, far ac amyllum, lens excor-
ticata, oryza, & faba fracta. Auiculę quoque pro-
sunt, ut galena, perdises, atagenes, phasiani, turtu-
res, turdique; inter quadrupedes, lepores iuniores, ca-
preoli; hœdi, vituli que, verneceque, iuuenes: laudaue-
re & intestinorum hœdi ac vituli ex aceto condi-
turam, ac eorundem extrema pariter cōdita, tum
oua sorbilia in aceto cōcta, aut caseum recentem:
vel ipsum lac, cum abstergere volumus, cum ferro
ignito aut lapidib. ignitis vlcerā sanat, vinum ru-
brum subacre, nullarum virium, ex aqua in qua
chalybs ignitus multoties exstinctus fuerit; vel i-
psa eadem aqua cum syr. ros. valet & in ipsis ciba-
riis posita. Initio enim abstergenda sunt vlcera,
tum cibo tum potione: tum styptica damnantur.

Tum cum vlcera perlananda sunt, styptica dam-
prodest panis cum mastiche, aut balauistiis confe-
ctus; & caro ipsa veru affata, ex cydoniorum suc-
co, aut mali punici vino, vel cum omphacio vuę.
Sorba quoque immatura arida in puluerem reda-
cta dantur in eduliis. Ex potionibus, quę morda-
cem humorem compescūt, singulis propinamus.
Interea vomitiones & cathartica vitam. Si pur-
gandus, sufficit cassia. Quibusdam valentibus ad
huc, profunt venę sectio, vel vrinam ciere. Si eue-
niat ex distillationibus, iis succurrendum, ut di-
ctum est. Abstergūt zaccharum cum aqua; vel mel,
vel mulla, cum passulis. Si vlcera sint in gula aut o-
re stomachi, adglutinantia admiscemus; ut ante-
quam in ventrē descendant, hæreant, quale gum-
mi arabicum est aut tragac. at si in imo fuerint pu-
ra, vno haustu assumi debet. Rupto vero aposte-
mate, lac caprinum mane in potu valet, si recens
ac tepens fuerit; ante cœnam vero duorum hora-
rū interuallo hordeacea cum zaccharo roseaceo
aut melle damus. Quę in omnibus fere ulcerum
generibus calidis & aestate off. rimus: hyeme vero
ac materia frigida, rhodomelite vtimur salubriter
percolato; aut hyssopi decocto cum melle. In
phlegmate vero falso, aqua brassicę opus est, aut
oliuarum muria: modus est a quatuor ad sex vn-
cias. Mundis & absteris vlceribus, quę vulnera
consolidant damus, passillos ex succino. Quę ad
œsophagi vlcera valent, prius dictum est: id quę
vide apud Arculanum, & Alexandrum Veronen-
sem, qui eadem habet. Balnea ferrata & alumina
ta laudantur. Vlceribus vetustis, ex quibus corru-
pti humores fluūt, oliuę & rutę folia, ac agrimo-
nię in nigro vino cōcta ad duas partes, percolato
decocto, mane & vespere detur ad 3 vj. vlcera e-
nim omnia interiora sanat. At si stomachus ero-
sionibus perforetur, iis præfidiis vtetur, quę in
sanguinis vomitu diximus. Si fluxus acciderit vē-
tris, valent trochisci ex spodio: quo tempore ad-
stringentibus opus est. In vehemēti ulcerum tor-
mento, philoniū ocysimo præsidio iuvat; exsic-
cando plurimum refragatur vlceribus, ac ablu-
mendo humores fluentes. Alii athanasia compo-
sitionem prætulere: & ad vlcera & ad fluxum Pau-
lus dat cydonium malum cum pulve.

*Vomitones
& cathar-
tica vlceri-
bus stomachi
vitanda.*

Balnea.

OBSERVATIO XXXIV.

De stomacho natura angustiore.

Vidi, inquit Gal. lib. 2. artis parue, ventriculum
cuiusdam ita paruum, rotundum, ac propen-
sum in ilia, ut propria circumscriptio perspicue
appareret spectanti & attrectanti. Ita & apud nos
puella quædam Delphica perpetuo male habebat
in stomacho: nam a natura angustior factus erat.
Quem his notis deprehēdimus: nam plurimo ci-
bo distentus stomachus lædebat: sed exhibitio
exiguo cibo, idque frequenter, minus offende-
batur, & commodius tunc cibum cōcoquebat. Hoc
autem inatum vitium, iuxta Galenum, immed-
icabile iudicauimus: & ideo eandem incuratam re-
liquimus. Tandem in mandatis dedimus, ut pa-
rum & frequenter cibum cōcoctu facilius su-
meret, ut minus dolore afficeretur.

S C H O L I A.

2
Innata sto-
machi vitia

Morbi in-
strumentales.

3
Asperitas
stomachi,
vel nimia
lenitas.

Proulima-
res.

Sunt autem & naturalia vitia incorrigibilia: ut si stomachus natura angustior factus fuerit: cuius notas nunc posuimus. At si venter natura laxior est, cibus intus importune innatat; nec in coquendo quod satis sit, corrumpitur stomachus: ita enim a natura materia diminuta, aut nimia efficit: plurimum tamen cibi sustinet magnitudo stomachi. Ii instrumentarii morbi sunt. Parem offensionem habet stomachi rotunditas; in quo cibus grauior sentitur, qui ad ima haustus proptinus delabitur. Ventris quoque positus notatur: nam si ad extrema vergat, aut nimium diaphragma supprimat, damnatur: quoniam ille concoctioni, hic respirationi aduerletur. Inter instrumentarias quoque affectiones annumeratur flaminis leuior contextus; unde & naturalis calor infirmior redditur: textura tamen alioqui crassior quam par sit, ad concoquendum incongrua est: rugas enim eo modo difficulter contrahit: tenuitas ipsa, aut ex humilitate laxante, aut siccitate consumente generatur, aut calore continuante absimitur; ut in morbis longis accidere solet: ex frigido quoque (*et raro contingat*) extenuatur venter. Est & aliud stomachi organicum vitium, nimia quaedam stomachi asperitas, aut aliquibus laxitas importuna, qua cibus ad intestina citius quam opus sit, labitur. In illa venter asper est, veluti in bubus, denticulatus callus est in ore; & in ventre, ubi crenes maxime conspicuae sunt: in homine multo minoris ad os stomachi, ut scobina fabri, leuior asperitas, sicuti pueron versus in medio in modum rubri ad conficiendos cibos extans callus cernitur: nec in omnibus pares crenes (*ut vidimus*) apparent; teste etiam *Alexandro Veronense*. Nostri recentiores non ad concoquendum cibum, sed ad retinendum facere putant; unde nimia asperitate, qua diutius cibus retineatur, siue nimia laxitate, qua cito profluat, corpora facile consumi tradidere. Asperitas pinguibus, molliuibusque cibis, altera stypticis leuatur. In positu aliud quoque vitium est naturale, qui tumor ventris dicitur: extrinsecus enim prominet, proulimates vocatur, hoc est, prominens positio: sanari id malum minime potest; difficulter enim cibos concoquunt: sacculo occurrimus pluma anserina pleno, aut pelle vulturina. Differt ab inflatione ventris seu ventriculi, de qua prius dictum est, & postea latius dicetur.

OBSERVATIO XXXV.

De ventriculi cruditate.

PVella annos 24. nata, textoris filia, nobis vicina, alioqui pulcherrima, facie supra modum pallida, ventriculi cruditate longo tempore laborabat; cibum non concoquebat, neque recte permutabat: Lotium in ea valde crudum, album, inconcoctum, sine hypostasi spectabatur: ructus perpetuo emittebat, & subinde acidus: siti nulla premebatur. Hec cum adessent, facile intellexi, hanc cruditatem procedere ex ventriculi frigidityte, & simplici intemperie frigida, etiam humida admixta: nam facile cibus in stomacho crudus innatabat;

quem subinde euomebat, tamen rarius, frigiditate magis superante. Vsa fuerat longo tempore cibis crudis; & ut ab aliis intellexeram, victu rationem non observabat. Hanc autem, ne in maiorem cruditatem incideret, admonui, ut neque in multitudine, neque in qualitate eorum, quae in cibo accipiuntur, neque in acceptionis opportunitate, neque in ordine delinqueret: & ut quaecumque concoquere valeret, ea tantum ingereret; & non quae appetitus exposcularet. Propterea recte dicebat Aetius, *ne quis in cruditate incidat, cautione in omnibus praedictis est utendum, ut neque in multitudine eorum, neque in qualitate, neque in ordine sumendi delinquant; & ea tantum ingerant quae concoquere possunt.* Mensura itaque ut maxime omnium curam haberet imperavi, & appetentiam refrenaret, neque plus quam vires tolerarent, acciperet. Iuxta quoque tempus accipiendi cibi, neque impetuose, neque acervatim, neque solidis partibus, aut absque coman- dicatione eos ingereret; neque etiam potus cibum interpellaret, id enim unionem ciborum impedit, singulosque ventri innatare facit; *ut idem Aetius refert.* Iussi praeterea, ut & ordinem praeposterum cauere, ne scilicet mala coronea aut punica, aut aliquid aliud tale in primis ingereret, deinde vero olera assumeret, aut alia quae aluum emollirent: nam & intempestivam assumptionem evitare oportet; ne antequam hesternus cibus probe descenderet, pranderet, aut etiam praeter consuetam horam. Cum enim nulla exercitatione sese exerceret, peius habebat, nam sedentaria erat, & sartrix. Tales enim semper desides, hoc malo magis afficiuntur, quam aliae puellae, quae ambulando vel aliter se exercent. Concoctu difficilia quantum posset vitaret, etiam admonui, ut sunt carnes natura durae, salsa, fumo induratae, bubulae, aut etate seniores. Et id eo abstinere iussi quantum posset a pinguibus, salinis ac vetustis, & ab oleribus frigidis, quaeque flatu pariunt, a cibis corruptis, foetidis, ac graueolentibus, ac fructibus dulcibus flatuque generantibus, & immaturis, bellariisque quae difficulter concoquuntur, & cibis peregrinis & inconsuetis, placentis. Deinde ut post assumptum cibum, motus inaequales ac conturbantes vitaret, consului, & aestum nimium, ac refrigerationem: haec enim concoctioni ciborum resistunt. Sed ut praecipue hypochondria ac pedes moderate calidos custodiret: manuque inter dormiendum os ventriculi apprehenderet: id a Gal. magis laudatur, *s. de med. simpl. fac. cap. 5.* quam calor ille, qui a fomētis paratur. Somnus & quies his conferunt, & erectior decubitus: & ea quae capiti subiiciuntur sublimius insternantur, & reclinatio ipsa in sinistrum latus fiat. Frequentes agitationes etiam si vigiliis infestantur, cibos perturbant, intestinaque inflata reddunt. Sed cum hic intemperies frigida esset & humida, tum aer quam cibus, & alia magis ad caliditatem & siccitatem vergant: & sic potius assis quam elixis & valde humidis uteretur, iussimus. Et cum intemperies simplex facile tollatur, amotis caussis, ut de imbecillitate diximus, ideo hanc frigiditatem calidis curare nitendum esse duximus: & cum una hu-

effundi videbatur, vento intus murmurante: ructu quoque ad os ex imo ventre, prorumpente, fumido & grauitate olente: caputque huic graue erat: & quiescere nesciebat: siti urgebatur, velle vireque feruebant, cum cibi tadio. Huic longi somni velle esse diximus, & ut in quiete maneret, sine exercitatione, & ut in latere sinistro dormiret. Id enim mire ex Aristotele conuenit: & rursus in ventrem redormire, plurimum ad coctionem facere, quidam volunt. Attamen qui in dextro latere somni inueniunt, alio magis consulunt. Sed ambulationes somni antecedere debent, quoad cibus ad imum ventrem resideat. Et quia videbatur hic materia aliqua biliosa erodens, & quod nauseam pateretur, ubi cibus inconcoctus permaneret, nec alio auxilio iuuaretur, aqua hord. tepida cum syr. viol. expellendam esse proposuimus: quod si difficulter vomeret, ob nauseam: infulum rhab. vel syr. ex infus. ros. pallid. cum rhab. ut sumeret precepi: & ventre exonerato, ut stomachum roboraret, vino mali punici, mediis saporis sumto; ac ut edulis acetosis acidulisque iuaretur, vinoque austero nullarum virium epoto, & aqua ante infracto. Propter capitis dolorem etiam fronti adhibui oleum ros. exiguo aceto infusum. Ac stomachum inunximus oleo ros. myrt. emplastro imposito ex malo coton. buccis myrt. santaliq. farin. & spod. pulu. inspersis, oleo ros. vinctis & cera q. s. vel absq. malo coton. Quibus praesidiis hic iuuenis bene habuit. Quoadmodum, & alter, qui ex humore frigido acidum ructum emittebat: ac sapor in ore acidulus erat. Huic, cum pituita etiam ventriculum grauaret, decoct. absint. sumto, cum oxym. cumque ad vomitum procliuor esset, decoc. raphan. exhibui, cum oxym. tepide. Rursus post ment. calam. melissae, absint. decoctum, purgavi cum pil. infra scriptis: ℞. pil. de hier. Gal. pil. stomatic. ana ℥ j. pil. de agarie. rhab. electis. ana ℥ ss. cum sy. de ment. fiant pil. vii. dentur mane. Postea capiebat aromatic. rosa & subinde utebatur vino generoso, & diatrionpi. & stomachum inungebat ol. nar. & spic. Atque iis tum alii, his vel similib. remediis, a mala concoctione & imbecillitate stomachi a causa frigida, conualuere.

S C H O L I A.

CAUSSA autem eorum symptomatum (etiam doctorum schol. precedente) communis, alteratricis facultatis frustratio est. Prima vero eiusdem frustrationis causarum genera duo sunt, ut Gal. lib. 3. de caus. symp. inquit: Alterum ex facultate ipsa laesa; alterum ab externo quopiam errore proueniens. Virtutis autem laesio adhuc bifariam esse potest: aut culpa propriae substantiae, ex aliqua primarium qualitatum intemperie: utpote cum praeter naturam calefacta, infrigidata, humectata, aut exsiccata fuerit. Vell laeditur virtus ipsa ab aliquo instrumentali morbo, ut erysipelate, phlegmone, oedemate, scirrhus, abscessu, & aliis eiusmodi: quorum omnium occasione, venter facultate eius concoctrice oblesata male concoquit. Verum in eiusmodi ventriculi temperamenti vitii propria eius substantia labefacta, concoctio laeditur: in ceteris morbis, qui tantum sunt instrumentales, duntaxat impedita. Qui vero ex intemperie simul, & instrumentali morbo com-

positi affectus sunt, utroque modo sunt noxii, ex sententia eiusdem Galeni praecitato loco. Ex tota itaque internis causis affectus ventriculi male concoquitur; ut doctus etiam annotauit Alimarius, cap. proprio de cruditate. Verum ipso minime affecto, a nonnullis etiam causis concoctio impediti potest; ut propter cibi ac potionis immodicam copiam, vel propter eorum qualitatem alienam, aut sumtionem intempestiuam: intelligo acceptionem ciborum, antequam prior cibus probe subiret, ac etiam praeter consuetam horam, similiter propter incongruum ordinem, vel somnum exiguum, & immodicas vigilias, exercitationesque; mox a cibo factas: aut vitiosum excrementum. Quanquam si ex eo concoctionem frustrari contingat (etiam ventriculo minime affecto) inter internas causas connumerari debet. At si ex immodica cibi ac potionis copia, vel praua eorundem qualitate, seu intempestiuitate, vel incongruo ordine aut exiguo somno, haud aegre a laborante ipso seu astante percipi poterit. Interim vero ubi corruptela assumptorum sequatur, ex ipsa corruptionis differentia alimentorum qualitas praesumpta argui poterit: nam si in fumosam qualitatem corruptela vergat, argumentum est ex calidioribus magisque biliosis cibis prouenire: si vero ad acidam, ex iis qui frigidiores natura sunt, magisque pituitosius. At si in ventriculo cibi non suapte natura in fumum transmutentur, & quispiam fumosum ructum emittat, efficientem huius causam, calidam ipsius ventriculi intemperiem esse, coniiciendum erit. Si vero saporem acidum referunt, eam frigidam esse necesse est: quamuis similiter in excrementis fiat, cum in ipso ventriculo continentur. Nam acidas qualitates quidem creant, quae pituitosa sunt & frigida: fumosas vero quae calida & biliosa, ut liquet eodem 3. de caus. symp. Ut vero distinguas, utrum intemperies aliqua duntaxat calida vel frigida, an vitiosus quispiam humor ventrem infestet, dare oportet cibos, qui suapte natura, modo in corruptionis, quam maxime aduersentur, ex Galeni auctoritate 1. de loc. affect. ut panem illis, qui in fumum transmutare cibum consueuerunt; mel autem iis, qui acidum a cibo saporem percipiunt. Deinde considerare excrementa, tum ea, quae euomuntur, tum quae per alium deiciuntur; num humor aliquis cum illis quidem biliosus ac calidus, cum iis autem pituitosus ac frigidus excernatur: an nullo vacuato humore, ipsa exigua quandam mutationem habeant. Nam si sine humore, perquam exigua in ipsis facta mutatione, deici videbis, intemperie duntaxat ventriculum laborare percipies. Si vero humor quoque deiciatur, qui cibum corrumpere possit, videbis cibos huiusmodi humore submersos, & ab ipsis ventriculi actione manifestius alteratos. Verum ubi in tunicis ventriculi impactum contineatur excrementum, id quod ex inani nausea, sine vomitu, quae irritat duntaxat & nullum humorem euacuat, dignoscet; si calidum fuerit, praeter nauseam, sitis vehemens aderit (ut iam saepe dictum est) & interdum febris; si frigidum, maior ciborum

Signa causarum ab errore commisso.

Ex corruptela assumptorum.

Si ob calidam aut frigidam intemperiem ventriculi fiat cruditas signa.

4
Causa

Causa in-
terna.

7

8
De sicca &
humida in-
temperie.

Signa mor-
borum in-
strumenta-
lium.

Causa bra-
dyspepsia.

Causa pro-
pria aepsia.

Causa dyspe-
psia.

Prognostica.

10

ciborum cupiditas excitabitur, nec siti, nec febris affligentur. Intemperie calida aut frigida breui eo perducitur ventriculus; in humiditate & siccitate non ita actionem amittit, nisi prolixo temporis spatio; eodem Galeno teste 3. de sympt. causis. Signa sicca intemperiei & humida, uti & frigida & calida, diximus de imbecillitate ventriculi. Humida itaque intemperiem, præter ea, quæ ibidem diximus, hydrops plerumque præcedit: uti & sicca, senium vel marasmus: eodem Galeno auctore. Si vero ab instrumentalibus quibusdam morbis prædicta symptomata oriantur, ex eorundem instrumentalium morborum propriis indiciis cognoscuntur: de quibus satis in præcedentibus quoque diximus. Sed quæ ex iam dictis symptomatibus magis parata sint hæc incitare, videndum est. Sciendum est autem, quod promptius *βραδυπεψία* oritur exiguofomno, ex cibis qui difficulter corrumpuntur, & si ultra, quam vires tolerant, sumantur; iuxta Galenum & Aetium cap. 24. libr. 9. Quemadmodum ubi citra corruptelam concoctionis omnino priuatio sit; ita ut quales accepti sunt cibi, tales permaneant, iuxta omnem eorum qualitatem, quæ proprie *ἀπεψία* dicitur, scire licet prorsus superatum esse ventriculum aut ob immodicam ciborum multitudinem, aut ob virtutis imbecillitatem, aut a valido frigore, aut ob vehementem in siti caloris refrigerationem; ut apud eosdem liquet. Adeo enim in tali statu venter non concoquit, ut etiam concoquere prorsus non tentet. Circa mediocres etiam, & consuetos cibos, si nihil in totum effecerit ventriculus, maximam eiusdem esse intemperiem prodit. Ceterum si cum corruptione cruditas oboritur, quæ proprie *δυσπεψία* dicitur, ex calida vel frigida intemperie, præsertimque ex calida excitatur, cum nullum esculentum calefactum durare imputre possit, ut constat apud eundem Galenum. Similiter oritur ex recrementis calidis aut frigidis, aut vitiosis ciborum qualitatibus iuxta ventrem consistentibus: aliquando etiam ex inordinata sumptione ciborum, aut potuum, aut intempestiuitate sit, ut apud eundem Aetium patet. Ex quibus itaque causis, quodlibet prædictorum symptomatum oriri paratum sit, ex his liquido constat. Nunc ad prognostica accedamus. Cruditas assidua maxime vitanda, cum ex ea vitiosi humores, morbi que gignantur, siue ex boni, siue ex mali succi cibis fuerit orta: quanquam ea deterior sit, quam vitiosi succi cibaria effecerunt: ut liquet apud Galen. libr. de cibis boni ac mali succi. Aequè mala quoque est in amara bile redundantibus cruditas; citissime enim febrem accendit: quodcunque tam prædictorum symptomatum ex cibis oritur, ex facili corrigetur. Mala quoque intemperies stomachi, postquam est inueterata & antiqua & confirmata, curationem non recipit. Quod autem ex ultimo virtutis collapsu in henteriam, aut tympaniam hydropem finiatur, testis est Galenus, eodem 3. de causis symptomatum. Omnes quoque magnæ ventriculi intemperies, veluti & aliarum partium, virtutem deficiunt; ut ibidem patet, & comment. apho. 20. 2. lib. Et propterea cum

circa mediocres, & consuetos cibos nihil in totum effecerit, maximam ostendit ventris intemperiem. Pessima in amara bili; in qua cibi in nidorulentam & fumosam qualitatem corrumpuntur: quando ea, quæ in acidam vertit, ut raro talibus naturis contingit, minus nocet, Galeno auctore 8. meth. med. Nidorosa ac fumosa cruditas tunc minus noxia est eisdem, si alius lubrica fuerit: si astringitur, gravis est; si quidem ex adstrictione eius vitiosa natura, in febres prompte incidunt; præsertim si ad solita conuertuntur opera, eodem Galeno teste. Omnium etiam prædictorum trium symptomatum pessimum est *ἀπεψία*, si vitio facultatis fiat: sicut *βραδυπεψία* minus affert periculi. Ex assiduis cruditatibus colicæ & iliacæ passionnes contingunt. Ex corrupta digestionem seu concoctionem, hydrops, carcinoma, herpes, noma, erysipelas, vitiligo, lepra, scabies & similia, ut quidam volunt, oriri solent. Sic ex corrupto succo sanguis cum ceteris humoribus corrumpitur. Et sanguis corruptus, omnium pessimus est. Quod ad curationem attinet, qualis victus omnibus communis sit, obseru. 34. præcedente diximus. Diuersa tamen ratio victus pro causarum diuersitate, uti & medicamentorum, præscribenda est. Quæ autem conueniunt frigida, calida & sicca & humida intemperiei, ea petenda ex iis, quæ imbecillitatem ventriculi curare possunt; & si sit cum humorum abundantia, ex iis quoque, quæ ibidem diximus, tum etiam de nausea & vomitu, quomodo tales sint curandi, facile intelliges. De imbecillitate itaque ventriculi, tum etiam quæ dicta sunt de nausea, vomitu, quæ alterant, purgant, ac roborant & corrigunt intemperiem, & quæ excrementis corrigendis satisfaciunt, conscripta inuenies. At si ex aliquo instrumentali morbo prædicta excitentur symptomata, nemini dubium est, quod in eorum curatione, & ipsa quoque delentur: aliam enim inflammatio, aliam erysipelas, aliam abscessus, & schirrhos requirit: de quibus omnibus in præcedentibus dictum est. Verum ubi ex alimentorum multitudine, quæ concoqui nequit, aut eorum vitiosa qualitate cruditas fiat, confestim procurandum erit, vomitu, aut purgatione per infernas partes, ipsos expurgari. Ei ciendus etenim est cibus, si coacuit intus, aut computruit, ex Celsi auctoritate, lib. 4. cap. 5. modo suapte natura vomant: nam cogere eum, qui vomere non potest, absurdum est ex Galen. 1. de loc. aff. & Si facile vomant, ut promptius id fiat, dandæ illis sunt aquæ tepidæ multæ, pauco aceto aut syr. acetoso permixto, seu oxymelite: at si vomere haudquaquam valeant, præsertim ubi multum aut corruptum nutrimentum notabiliter ad inferiora ventris sit motum, adiuuandum est, ut citius descendat, aut glande subdita, aut leui peritærius infusione, per clysteres videlicet, ut 8. meth. med. a Galen. scriptum est. Veluti etiam, si crudum, aut diminute concoctum in superiori ventriculi parte alimentum adhuc consistat, modo concoqui possit, aliquid diatrion piperion dabis, simplicissimo quidem modo, quo ab eodem Gal. 4. de sanit. tuend. scriptum

11

Curatio.

12

13

est, vel si id haberi nequit, tantundem piperis longi aut albi, si hoc adsit, aut nigri exhibere convenit. Similiter extrinsecus adhibitis concoctio iuvanda erit, ut si expansa manu (ut paulo ante admonuimus) os ventris apprehendatur, aut puerulus carnosus admoveatur: ut Aetius refert. Vide de his Gal. 5. de simpl. & 7. meth. ubi scribit, & humanum corpus illi impositum curasse. Alii in quiete parvos catellos ventri imposuere. Sed puellus ne sit humecta cute; sudore profuso, refrigerant potius quam calfaciunt, inquit Gal. Valent & calida exterius adhibita: quorum sylvam inuenies in præcedentibus, & apud Gal. 8. meth. conscriptâ. Quod si non modo ex alimentorum prava qualitate, sed intemperstivitate, aut inordinata eorum sumptione, seu exiguo somno, cum corruptela cruditas generetur, non alia ratione curari debet, quam si ex prædicta alimentorum vitiosa qualitate, aut multitudine fuisset excitata. Illud tamen particulatim attendendum erit, quod quibus ob fluxibilis copiam in ventriculo contentam, vel calidam admodum eiusdem intemperie *διονεικία*, seu cruditas cum corruptela accidit, cibos corruptu difficiles, difficilesque concoctu offerre convenit. Nam quæ concoctu difficilia sunt, non facile alterantur, ac corrumpuntur. Sed si in multum calorem inciderint concoquuntur magis, quam si moderato occurrerint, ex Gal. decreto 1. de aliment. facult. quod etiam confirmavit Celsus eodem cap. 5. lib. 4. Hæc libuit hic addere ex Altimaro. Sed exempla subsequentiū, variam esse curationem pro causa adhibendam, ostendent.

OBSERVATIO XXXVII.

De quodam ex cibo corrupto in stomacho existente, laborante digestionis corruptione.

Quidam hoc tempore cum circa stomachum male haberet, & cum excrementa, aut ventris crepitus flatulq; supra modum & præter naturam olerent, corruptam digestionem seu concoctionem animaduerti. Hic enim præcipue ex edulis, quibus delectabatur, nempe piscibus, ructus acidus emittebat: quod signum erat frigida intemperie ipsius ventriculi. Deinde cum ex lie-ne (nam subinde in hypochondrio leuem obstructionem seu dolorem sentiebat) melancholicus humor ad ventrem effunderetur, cibum magis corrumperebat; quod non solum ructus acidus, sed ea, quæ cum cibo euomerentur, subinde aciditatem habebant. Quamobrem huic, cum nauseabundus esset, per vomitum prius cibum corruptum, deinde per ventrem educere decreui. Post cibum assumptum dedi decoctionis betæ, atriplicis, ficuum ʒiij. syr. acetosi simplicis ʒj. oxymelitis ʒss. prius iniuncto ventriculo ut paulo laxior esset, cum oleo amygd. dulc. ut melius euomeret: facile enim vomebat. Postea dedi decoctum betonicae, menthae, absinthii, hyssopi, adiecto syr. acetoso simpl. & composito: & commode eum purgaui cum pilulis de hiera cum agarico, & pilulis aromaticis, mastichinis ana ʒj. cum syrup. menthaceo; conficiendo pilulas septem. Lienem iungebam cum oleo de capparibus. Et ventriculum quoque corroborabam cum speciebus

diagalangæ, & aromatico rosato; exterius inungendo cum oleo menthaceo, absinthii, & maceris; adiecta pauca cera: super imposito deinde emplastro seu cerato mastichino.

S C H O L I A.

Diximus digestionis corruptionem fieri, cum in stomacho cibus boni succi corrumpitur, aut aduritur, aut acore, vel terro sapore vitatur, quæ exinde natura refugit. Cibi vero qualitatem acidam faciunt pisces, caroque gelu coacta: vtri & qualitatem fumosam, mel, raphanus, allia, nasturtium, sinapi, & similia; & oua fricta facile in fumum mutantur. Sæpe vero in conualescentibus, materia acetat & recidiuam minatur, reliquis putrescentibus: quod in acutis febribus male pronuntiat ex caloris defectu; at in longis morbis diuturnitatem morbi præsignat. Contingit aliquando, imo sæpius, & ventriculi debilitatem & malam concoctionem siue ciborum corruptionem relinqui in conualescentibus, morbo acuto seu longo superato; aliquando quidem tantam, ut neque assumat alimentum, aut assumptum non elaboraret; estque indicium reliquias morbi relictas in causa esse, quod suctionis sensum non percipiat: alias autem quoque accidit, ut suctionis sensum percipiat quidem, quæ a membris extenuatis ipsius corporis sit, eaque ratione alimentum expetit; elaborare tamen assumptum non potest, ob debilitatem relictam. At in sanis hæc eadem contingunt ob nudam intemperiem, ut diximus, vel cum materia: sicuti enim accescunt ructus ex causa frigida, ut diximus; ita & fumosa superfluitates sine cibi vitio, ex calore malum oriri significant. Egnetæ ex calida habitudine frigidam cum omphacii succo dari suadet, aut cytoniorum malorum decoctum. Sed de his, uti etiam de bile, si cibos corrumpat, illa ipsa aut vomitu deicienda, aut leuiter per aluum expurganda, denuo roborato ventriculo, ut iam sæpius dictum est: quibus adiungere poteris ea, quæ nos de imbecillitate ventriculi prius diximus, & quæ ad longum referuntur apud Benedictum Veronenlem lib. 13. cap. 1. & 2. 3. de imbecillitate stomachi eiusq; notis & curationibus, & quæ idem de ægre concoquentibus & vitiata concoctione agit in eodem libro. Interea diligenter cauendum, ne frigidissima etiam in bile aut ex temperie calida stomacho affecto applicentur; cuius vide exemplum apud Beniuenum de abditis morborum causis cap. 15. de quodam, cui ex incuria medici emplastrum frigidissimum stomacho appositum fuit, morte subsequente; & cap. 15. de quodam interemto ex frigidissimo aquæ potu: de quibus alias diximus, cum aliis quoque & lib. 1. obs. nostrarum de febr. scholia obs. 13.

OBSERVATIO XXVIII.

De stomachi resolutione.

Vis aliquando in stomacho attrahendi vel ex toto corrumpitur vel læditur: aut enim (ut Gal. docet) nil attrahit, aut ægre aut parum trahit, ita ut ex toto auferatur aut diminuatur, aut omnino corrumpatur. Id vitium aliqui resolutionem vocare, quod œsophago (ut alias diximus) plurimum euenit:

euenit: morituri enim aut omnino defecti viribus, nihil deuorant, aut difficulter assumunt. Idē & in perniciosis febribus vel ipsa instante crasi, extraria & præternaturali frigidityte vel humida addita resolvente, aut calida & sicca rarefaciente, vt in acutis contingit febribus, in quibus sine alio faucium vel gutturis vitio neque cibum neque potus aut celophago canalicula apprehendi potest. Mirum est, (inquit Benedictus Veronensis) nec tamen ab re, quod cibum nonnunquam cathartica vi dicta ita resoluta, capiunt; potum autem nequeunt. Hoc quidem malo, ex imbecillitate stomachi laboranti cuidam spica & nuce muscata, adiecta exigua mastiche, cum paucio vino rubro sumtis, recte occurrebamus: nam calidis & siccis vis attrahendi conseruatur; caryophyllo, cinamomo, cymino & iis similibus iuuatur: sicuti in ardēti febre succo, cucumeris aut cucurbitæ decocto. Refert Beniuenius se nobilem quendam, Iohannem nomine, Neapolitanum (cap. 66.) hoc vitio diu affectum, cum a medicis aliis curari non posset, curasse (cum ex calidiore habitu ventriculi vitium contractum certis indicis intellexisset) iis, quæ aridum ac iam tabe consumptum corpus desiderat. Primo die solas lactucas ex aceto & oleo commaducare præcepit; veruecinam carnem potius quàm auem exhibendo, & vinum frigidum & austerum: ac genere victus frigidum ac frigidioribus medicamentis vtens, intra duos menses agrum restituit.

SCHOLIA.

Pessimum vitium est resolutio stomachi a Latinis dicta, cum cibi non tenax est; quo corpus (vt Celsus tradit) non alitur, sed tabe consumitur. Sed qui hoc vitio, seu imbecillitate ventriculi laborant, stomachici quoque appellantur: quamuis & illos quoque qui nec cibum continent nec desiderant, aliqui & dissolutos inualidos vocauerunt: vel textura ratione affecti, imbecilliterque attrahentes, vel parum appetentes, stomachi inualidi etiam dicuntur. Quamuis etiam vulgus eos quoque stomachicos vocat, qui appetentiam perdidērunt; vel quibus post cibum ventris os grauatur; & quibus nausea cōtingit, & ad vomitum impelluntur, cibique corrupti sunt, & nidorosi vel vitiosi, & eos quibus ructus molestiam parit, vel cibi vix descendunt. Quorum tamen curationes (vt iam ostendimus) pro varietate causarum cum affectus perficiuntur. De imbecillitate stomachi vide Benedictum Veronensem lib. 13. cap. 3. habes ibidem diuersas curationes, tam ex frigida & humida causa: & quæ studiosis victus ratio conueniat; cum fere omnes, vt religiosi & togatorum fere magna pars, stomacho sint infirmiores, cum plurimum sine corporis exercitatione viuunt. At de resolutione agit cap. 9. & 10. vbi quædam selectiora remedia breuiter quidem enumerat. Si retentrix vis sit læsa, vel quia stomachus nihil retinet, aut parum comprehendit, nec cōcoctionem aut digestionem opportunam exspectat; aut si pertinacius quam opus sit retinet, vel digesto etiam cibo, retinet tamen interdum, sed tremulo, vt di-

ctum est, modo, vel spasmoso, siue singultu. Sic in lienteria cibum non continetur. Summa, retentrix corroboratur stypticis frigidis. At vis expultrix læsa vel ex toto sublata, inertem in ventre cibum derelinquit; sicut in ileo morbo: aut debilitatur & lassescit; ita vt serius irritata cibum expellat, vel partem duntaxat, aut modum exsuperat irritata virtus, aut corrumpitur, vnde ructus, vomitus, fluxus. Expellendi vi concitata, cibum nō diu paritur concoctum, & prauum humorem expellit, & cibum indigestum emittit. Nimio enim frigore vel humore laxatur, combibito inter tunicarū stamina, vt dictum est. In causa est & membri læuitas, humoris mordacitas, leuitas grauitasve, vlcus abscessus, aut flauæ bilis inopia, vel si pylorum nihil recipiat, & arida sine putu & styptica. Expultricem corrumpi rarum est; rariusq; euenit, vt ex toto cibum expellatur, præterquàm in vomitu symptomatiko: at si expulsiva infirmior, digestionem corrumpit; vehementior vero, vt in lienteria, inconcoctionem affert: remedia de lienteria dicemus. Sed si nihil expellat, ob frigiditytem, laxantia quædam vmbilico imponunt, ex succo cyclaminis, cucumeris erratici, colocynth. cum felle vaccino, & aliis. Ex caliditate & siccitate, ex herbæ mercurialis succo, & in ebulli rad. cum oleo viol. & cucurbitino, & similibus, diacrydio adiectis. In cōmuni expultrix potentia ex calido & sicco leditur frigidis & humidis succurritur. Interea sciendum, quod non omnibus eodem modo cibum in ventre moram trahit; quidam, quoties assumunt in die, toties ventrem exonerant; alii semel, alii sæpius, quidam alternis diebus; nōnulli quarto aut octauo quoquo die. In stomacho plurimum a sex horis ad 12. vsque, aut quintam vsque decimam moram trahit, pro stomachi, ac aeris qualitate, & modo, proq; corporis exercitatione. Causæ variæ ex cerebri affectu, læsa animali potentia, aut studiorum occupationibus, aut retētrice vi validiore, vel imbecillitate expultricis, aut ventris exterioris musculorum infirmitate, vel si bilis in immum ventrem nō effusa fuerit: plurimum facit ea, de qua dictum est, leniens, aut nimia crenarum asperitas: obest & spiritus intus inclusus, abscessus, vermes intestinorum, ac varia membrorum oppilatio. Huc spectant styptica commanducata ante cibum, retardantia digestionem. Quæ autem duriores aluum emolliunt, iuuant ad expulsionem, vt caro pinguis pulli, ouium sorbile, adiecto Zaccaro emollit: ius pinæ, lac recens, ius gallinacei veteris, aut gallina, ventrem cathartico modo turbat: pruna, cerasa, mora, ficirecemes, arida præpingues, & carica, vna matura alba, & passula, ex oleribus beta, atriplex, spinach n. blitum, mercurialis, brassica semicocta, vel efficacius, si nudis pedib. æstate pavimento aqua aspersa ambulauerit; duram enim aluum emollit, nec alio auxilio quandoque leuatur; lupulus quoque iuuat. Frequentius in prandio bibere aluum liquidum reddit, pruna Damascena matura, & dulcia Hispanica leniunt vētem: ex prunis compositio simplex & cassia, & syr. viol. butyrum vero recens, aut adeps gallinaceus aut anserinus, cum psyllii

De expultrix.

De mora cibi in ventrem.

Ventrem mouentia.

De potentia retentrix læsa.

decocto lentore, vel alihæz, illinitur ventri; asperitatem enim stomachi emolliant. At si bilis flava interclusa fuerit, aperientibus opus est, *ut postea de ictericis diceretur.* In intestini oppilatione, qua iliacis profunt damnis. In summa, calida & humida in communi expultricem vim corroborant; sicuti per intervalla acuta & amara lassaque excitant in prima mensa, propterea coeparum & sinapis usus, piperque longum quandoque assumtum prodest. Cibus vero ex stomacho citius defluit, ex nimia nervorum cerebri ad ventrem pertinentium debilitate; sed rarius: frequentius vero retentrice infirma, aut nimium valida expultrice, & humida quandoque stomachi laxitudine immateriali, vel cum humore salso, acuto vel acetoso aut lubrico, aut ulcere innato, ab exiguo naturali calore prope extincto, cibus protinus, *Gal. teste* profluit. Hic victus ratio priori morbo dissimilis esse debet. Prodest animi securitas & quies: cubiculo calido ac sicco, temperantia proximo, uti debet, somnoque longiore; a cœna vero si uim procumbendum est, in sinistrum fere semper litus: ante cibum fricari supramas partes convenit. Panis ex similagine conficiendus est; parumque fermentari debet; exiguo sale addito vel nullo: mastichis pollinem ingerito, ac coriandrum præparatum. Pro plebe sorba arida tunc misceri iuvat. In obsoniis auicula, turtures, phasiani, perdices, turdi, lepores & similia, assa præsertim. Vinum rubrum adstringens bibendum, aqua ferrata temperatum. In prima mensa, quæ leviter adstringunt offerimus frigidiuscula, si calida causa fuerit; aut contra si frigida; stomacho oleo lœtiscino, mastichino illinendus.

OBSERVATIO XXXIX.

De ventriculi inflatione, cum ingenti dolore.

INflatur aliquando venter, crasso intus incluso vento, ex damnatis cibis; qualia sunt legumina omnia, & dulcia, una recens, ficus, poma, mustum, allium, caps, crucea, brassica, bulbi, lac, omnisque cassus; aut si cibus, qui faciliter concoquitur, secunda apponatur mensa, aut Venus crudo stomacho frequens: vel summam, si infirmus fuerit calor cum crassis & crudis humoribus, vel melancholicis, ut in hypochondriaco affectu. Sic pistor quidam Alemarianus, familiaris noster, cum in autumno flatulentis cibis uteretur, & subinde mustum bibisset, annos 28. natus, stomachum quoque debilem habens, incidit in ventriculi dolorem intolerabilem, cum eiusdem inflatione etiam exterius apparente; quæ & tactu sentiebatur. Ad hunc accitus, cum medicamentosas potiones omnes, quæ in officina pharmacopæi parantur, respiceret, nec ullas admitteret, imperavi ut chamomillam communem & Romanam concisam, adiecto momento seminis anisi & cari, decoqueret in ceruisia communi: quam cum bibisset, flatum per superna & ventris crepitum emisit, & ilico levamen sensit, præcipue ventositatibus una cum ructibus superius emissis. Sed cum dolor nonnihil adhuc perseveraret, certis tandem rationibus persuasus, pilulas vij. ex 3j. pilul. hiera simplicis Galeni, deuoravit. Quibus ter alium deposuit; & ventriculo

mox inuncto oleo chamamelino, anethino, rutaceo simul mixtis, tum oraque inflatio ventriculi cessavit. Interea tamen iubebam ut ad magnitudinem fabæ maiusculæ omni mane ex hac mixtura sumeret: *℞ pul. seminis dauci, petroselin. 3j. sem. anisi 3ij. b. conferva buglossæ 3j. conferva florum rosmarini 3j. b. specier. diagalange 3j. syr. de corticibus citri parum; fiat mixtura.* Etiam sumebat diagalangam in tabulis, duabus horis ante cibum 3ij. vel ij. Quibus præsidis hic sanitati probe restitutus fuit. Huic tamen lactis usum interdixi, quo maxime delectabatur; minime enim illis convenit, teste Hippocrate, quibus præcordia plurimum prætenduntur; magis si sonant intestina, ex multa intus materia.

SCHOLIA.

Accidit quandoque (ut etiam Donatus recensuit) ipsi ventriculo, ut instrumento coctionis, retentrice, seu complectente ipsius facultate imbecilla existente, affectus quidam, quia Græcis, præsertim a Paulo cap. 38. lib. 3. & a Galeno 3. de caus. symp. *πνεύματος 3. αέρδι* dicitur; quamvis quandoque ab eodem Gal. (ut patet 14. meth. med. *πνεύματος* den. *πνεύματος* nuncupetur; Latinis autem *inflatio ventriculi* appellatur: qui affectus nihil aliud est, quam eiusdem ventriculi distensio & dolor, ex flatuoso spiritus. Flatuosus enim spiritus in eo gignitur, aut per os excernitur, & sic ructum creat; aut per sedem. In ea autem venter seu ventriculus ut coctionis officina afficitur. At affectus a Gal. 14. meth. med. inter morbos reponitur in quantitate seu magnitudine. Differt tamen ab œdemate, quoniam œdema prementibus nobis cedit, digitique admodum alte in ipsum descendunt; inflatio vero digitis pressa, vestigium non retinet, ac sonitum veluti tympanum reddit, ex eodem Gal. 14. meth. Gravitas quandoque & distensio non solum circa ventrem ipsum, sed iuxta totum pectus: aliquando vero retro, iuxta collum, ac deorsum, & ad ipsa vertibula irruit; sæpe autem vtrinq; occupatos tenet; aliquando & tumorem circa os ventris efficit; ructusq; inanes fiunt, modice allevantes; & inhibiti flatuum, qui per alium excerni consueverunt. Quibusdam eorum dolores accidunt, ac appetitus perditiones, ac capitis dolor, ut patet ex Aetio, Archigenis auctoritate, cap. 27. lib. 9. Si vero ante perfectam restitutionem cibum accipiant, amplius membra ipsa inflantur, & cum dolore distenduntur: levantur autem alimento inferne subeunte, & flatibus siue per ructus siue per intestina exclusis, *vide Aetium inquit.* Vbi vero flatuosus spiritus per intestina movetur, multiformes edit sonitus; quorum non omnes nomina sunt sortiti: verum prudenti viro ex diversis sonitus differentiis, quale quantumque excrementum sit, ac quo maxime loco voluatur, patere potest; ut eod. 3. de caus. symp. ap. Gal. legitur. Quomodo spiritus flatuosus vel flatus ipse generetur, iam ex parte diximus scholio obser. 22. huius lib. Breuiter, cum inflatio ventriculi fiat a multis flatibus, qui solent fieri a debili calore tanquam a causa efficiente; ab alimentis flatulentis & humidis, vel a pituitosis succis;

Causa.

6
Causarum
diferentiarum
notitia.

succis: alii volunt fieri spiritum flatuosum a mediocri calore: vel (ut alii volunt) ex humoribus, vel cibis languida caliditate in vapores dissolutis, in ventriculo generatur, iuxta Paulum in Aetium: nam refrigeratio, (inquit Paulus) hoc nomine, quod extenuare & dissolvere non sic idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas cum non tantum extenuet, sed etiam discutiat, flatus generationem impedit: minor vero caliditas, diffundit quidem & transmutat alimentum, verum minus quam opus sit: unde flatus excitatur. Verum si ex flatuosis cibis inflatio oriatur, ex exiguo, & brevis temporis spiritu flatuoso orto, qui vno vel altero ructu vacuatur, comprehendi poterit. At si ex eisdem cibis natura si quidem non flatuosis, sed in vapores per mediocrem caliditatem resolutis inflatio fiat, ab assumptione eorundem, paulo post tempore, inflatio generabitur: & proinde ex laborantium, seu astantium sermone id promte percipies. Verum si neque assumptio ciborum præcesserit natura flatuorum: pituitolos humores in ventriculo contentos ac inhalitum solutos, inflationis causam existimabis. Nam si ex atra bilis in eundem ventriculum effusione flatus quidem generetur, quam affectionem hypochondriacam, ac flatuosam nominant, præter reliqua peculiari ter metus & inestitia aderunt: quemadmodum de melancholia cap. proprio diximus. Sed exempla infra scripta hæc melius docebunt.

OBSERVATIO XL.

De ventriculi inflatione, cum dolore, ex succis pituitosis.

2 **V**entriculi dolor (ut alias diximus) a flatibus in ipso generatis plerumque fit, aut ex pituitosis humoribus in eo contentis, aut ex cibis in vapores ab imbecillo calore resolutis. Atque hæc ipsa ventositatis raro sine ventriculi dolore est. Hoc malum in me ipso expertus sum anno 1556. mense Junio, cum imbecillo stomacho laborarem, tormina ventriculi vna cum ventositate sentiens, ingentem stomachi dolorem passus sum. Cum itaque cibos flatulentos non sumissem, ex pituitosis excrementis dolorem & flatum ortum conficiebam. Ergo ut huic symptomati occurrerem, omnium primo causam auferre decreui; nempe medicamentis pituitam deficientibus, leuiter laxantibus intemperiemque auferendo, ut & calor naturalis diminutus augeretur. Ideo optimè duxi pilulas sequentes sumere, quæ utrumque faciunt, scilicet leuiter purgant & calorem ventriculo suppeditant: ℞. pilul. communium, seu pestilentialium, aut Ruffi. ℞ ij. pilul. de hiera, ℞ j. cum aqua fœniculi: fiant pilule 5. Quas mane hora nona deuoravi: & cum tardæ operationis essent, mane sequenti quatuor prius secessus habui, valde copiosos & pituitosos & corruptos, cum emissionem ventositatum: quibus tormina, dolor atque ructus & flatus magna ex parte cessarunt. Sumsi quoque decoctum florum chamomill. seu cumini & anisi in cerussa communi: quibus ventositates expulsæ sunt, & a dolore fui liberatus. Alioqui si

non cess. it. t., omnino post pilulas illas leues, ex hiera vel aromatis (quæ idem præstant) pituitam coquendo accepissem: & vna ventriculum roborassem cum syr. de mentha, decoctione ex corticibus citri, cum decocto menthe, hyssopi, betonicæ, absinthii florum anthos, & similibus. Deinde rursus reiteratis pilulis, demum accepissem attenuantia calida, flatusque discutientia, ut decoctum cymini vel fœnici, cum mentha vel hyssopo in vino decoctis. Quibus etiam in rusticis felicissime usus sum. Sic anno 1565. hortulanum curavi, cui ventriculus ex ventositate prominebat, ita ut fere abscissum metuerem. Cui cum medicamenta flatus discutientia propinassem, adieciis quibusdam amaris & detergentibus præfidiis, idem per vomitum & secessum post multos ructus, vermes plurimos reiecit, ventriculo mox subsidente. His hortulanus iste, dum maximo ventriculi dolore & distensione torqueretur, egregie conualuit.

S C H O L I A.

Hic affectus minime contemnendus est: nam Inflatio ventriculi, vbi diu perseverauerit, Signa prognostica. metus erit, ne in hydropem siccam præcipue terminetur: & si multiplicetur ventriculi inflatio in conualescentibus, recidivam significabit. Næque qui a morbis immodice se satiant, flatuosi, ac toto corporis habitu turgidi redduntur, ut 3. de caus. symp. Galenus docuit. Quod vero, qui morbo regio laborant, non multum ventosi sunt, ab Hippoc. 72. 5. lib. scriptum est. Indicatio vero curationis (ut & Alimarius ex 14. method. in edendi annotant) inflationum omnium communis est, ut quod præter naturam est vacuetur, in quoque id contineatur loco. Propria vero indicatio post hæc communem est, ut tenuissimis & calidis potestate medicamentis id perficiatur: ut aere calido, somno longiore, qui ex toto affectus leuat, teste Paulo, & misce coctionem iuuat, ut habetur 12. meth. med. Et primo exercitatio levis, deinde maior adhibenda, maximeque ea, quæ superiores partes moueat, quod genus (ut Celsus refert, cap. 5. lib. 4.) in omnibus stomachi vitis aptissimum est. Frictiones item extremarum corporis partium, si adhibeantur, conferunt. Alius omnino sit levis, & vbi adstricta, frictum clyster infundendus, ut Aetius iubet. Interponenda quoque abstinencia, iuxta Celsum: præcipue vero, teste Aetio, vbi ex dissolutis in vaporem cibis orta fuerit inflatio. At si eam ferre non possint, cibi exhibendi sunt calidi, attenuantes, minimeque inflantes, boni succi & cocti faciles, quantitate exigui. Diuidantur autem ex mente eiusdem Aetii, ita ut in prandio tertiam, in cenâ vero reliquas duas accipiant partes. Fructuum vero ac olerum humidorum esum semper habeant suspectum. Potus cibum non interpellet. Per omnem tamen cibum vinum meracius exhibeatur, at non multum. Nam multum potum, tanquam infestissimum hostem, deuient, ut Aetius admonet: & si Medicamentorum ratio non ita diu ante cibum sumerit, aut cibum fuerit natura flatuosus præstantus, primum vomere præcipe, cum iis, quæ iam sepe commemorauimus:

Curatio a
flatulentis
cibus.

6

post vero vomitum, eos fouere oportet, ex oleo, quod tenuium sit partium, quodq; rutam habeat incoctam, aut aliquod calidorum seminū, vt cumini, apii, petroselin. *ex Gal. 14. meth.* Interea profunt calida & sicca fomenta, ex milio & furfure; præsertim si dolor sit mediocris: vel ex sem. lini, ordeacea, & loliacea farina, cumino & sem. anethi, aut apii, aut fœniculi, oleo rutaceo, aut hydromelite, cataplasma cōficiatur, modo adiecto oleo laurino vel cētaurii coma, aut eryngii semine, vel lauri baccis, & melanthio. Cucurbitulæ cum multa flamma admotæ, bonæ magnitudinis, vmbilicum vndique comprehendentes, egregie iuuāt incantamenti instar, teste Paulo & Galeno, *14. meth. med. & 12.* Glandes etiam supponendæ, ex sem. rutæ, cumino & melle confectæ, sale adlito. Et clysteres ex decoct. folior. rutæ, flor. chamameli, puleg. calamintha, fursiæ, adiectis seminibus fœniculi, dauci, & cumini; & caricis: & in lib. 1. adiciendo olei anethini, chamamel. rutacei an. 3 j. diaphœnici, diacatholici, benedict. laxat. an. 3 j. B. sale addito, fiat clyster. His addere poteris quæ apud Celsum, Aetium, Paulum scripta sunt: vt est castorei quoque 3 j. cum aceto scyllino, iuxta Aetium sumta. At si ex pituitosis humoribus in halitum solutis contigerit stomachi inflatio, succi prius digesti euacuentur. Euacuabuntur autē vomitu, si ægri in illum proni sunt; si minus & per inferiorē ventrem, per clysteres paulo acriores, teste Galeno: vel per purgans aliquod. Galenus & hic vbi dolor vrget, ex spiritu flatuoso genito ex prædictis humoribus ante purgationem cucurbitulam adhibet, cum multa flamma copiosa: deinde humorem euacuat, vt videre licet *12. meth. med.* Humore iam repurgato, eadē topica, quæ iam dicta sunt, & ab aliis auctoribus descripta, conueniūt, vt emplastrum de baccis lauri, supra totum vētrem & supra stomachum, emplastr. stomachicum Galeni: & intus exhibenda potio absinthii, hyssopi aut rutæ. Paulus dat ouillū talum vltum: confert & diacynamomum, diacyminum, dianisum, diaxyloaloes, diacalamentha aut diatrion pipereon, cum exiguo vino diluto. Nunc aliud exemplum addamus.

OBSERVATIO XLI.

De stomachi & hypochondriorum inflatione
ex humore melancholico.

ANno 1588. mense Februario Serenissimus Elector & Episcopus Coloniensis, qui hoc tempore in castello Honselredickio dicto agebat, incidit in ventriculi inflationem ac hypochondriorum, non sine magno dolore; ita vt me accersiri iuberet. Sentiebat etiam tensionem quandam in hypochondrio sinistro, ex lienis inflatione & obstructione, vt melancholiam: quam procul dubio ex variis suis aduersitatibus contraxerat. Hypochondria ac ventrem cum tangerem, valde distenta erant; iniecto clystere carminante ventositatem, prima vice parum profecit; tandem cum & dolor vrgeret, & totum fere ventrem occuparet; & vrina aliquantulum tincta esset (credo ob dolorem) eumque ructus subinde experiretur, sed difficulter exeuntes: & nihil per

ventrem neque flatum emitteret, clysterem partim emollientem (eo quod alius durior esset) partim dolorem sedantem, & partim ventositatem expellentem, in hunc modum præscripsi: cum & circa lumbos se dolere diceret, etiam calculo sæpius obnoxius: *Rad. althæe mundata 3 j. folior. branca vrsinæ, parietariæ; maluæ, mercurialis, florum chamomill. melilotæ. summitatum anethi an. m. j. seminis anisi, fœniculi, cari an. 3 j. B. ruta m. B. sem. lini 3 j. coquantur in aqua communi pro lib. 1. cola. adde cassiæ pro clysteribus 3 j. diacatholici 3 B. benedictæ laxat. 3 j. olei chamamel. anethini an. 3 j. olei rutacei, amygd. dulc. an. 3 B. vitellum vnius oui, salis 3 j. B. mis. fiat clyster; eoque diutius detento, ter aluum excreuit flatibus quoque multis tam per superna quam inferna emissis. Venter postea etiam repurgauimus, cum sequenti potione (prius etiam carminante potione ebibita) quæ ita habebat: *℞ syr. ex infus. ros. pallid. cum foliis sene 3 j. B. diaphœnici 3 j. aque decoct. flor. chamomill 3 ij. misce, stomachum inunximus deinde cum oleo rutaceo, mastichino, & maceris. Postea & hoc vng. ℞ olei mastichini. coton. maceris an. 3 ij. cerati stomachici Gal. 3 ij. olei garyophyll. gutt. ij. cera q. s. fiat unguentum. Interea & hac confectione utebatur: ℞ specier. aromatici ros. diacalamintha, diarod. abb. diacumini an. 3 B. dissolut. in aqua absinth. adiect. Zacc. albiss. 3 iij. fiat confectio in rotulis ponderantibus 3. iij. vel 3 B. Egregie hæc iuuabant. Alioqui addidissim aliquot guttas olei anisi, in dicta confectione; quibus vt i soleo: etiam oleo ipso cum modico vino per os sumto, commode vtor ad ventositates expellendas, etiam in colico dolore. Hypochondrium sinistrum inungebam linimento sequenti: *℞ olei de capparibus. olei rutacei an. 3 B. olei amygd. amar. emplastri de melimoto & (quia leuis durities aderat) emplastri de mucosil. an. 3 ij. olei garyophyll. (ob meliorem odorem) guttas tres, ammoniaci dissoluti in aceto 3 ij. cera q. s. fiat unguentum. Interea quoque imperaui, vt Excellentia sua abstineret a multo potu, & a multis iusculis, leguminibus, & oleribus, minusque dulcibus quia talia flatu gignunt. His autem malum cessauit: alioqui diatrion pipereon dedissem aut theriacam.***

SCHOLIA.

Hæc ventriculi inflatio, ob melancholicum humorem in ventriculum infusum, pertinebat ad hypochondriacam affectionem, quam alias flatuosam appellauimus: quod etiam ex signis cognouimus, cum mœstitia adiuncta esset. Ceterum cum de huius curatione prius dixerimus: hic nihil addendum: nisi quod materiam melancholicam flatulentam digerere debeamus cum oxy-melite & decoct. ceterach, scolopend. rad. capp. thamaris. & anisi, etiam mentha, melissophylli, chamæpit. thymi, & similibus. Quidam hic laudant pro purgatione hieram Russi, cum exiguo mastichis. Deinde etiam in tumore melacholico fotum cōmendant, per spongiās, ex aceto, cumino & annis trito, potiusq; fomentis vtuntur quam vnguentis: ne cera

Curatio a
pituitosis
humoribus
in halitum
solutis.

ne cera meatus obstruat; ideo irinum & rutaceum oleum quidam & nardinum cum castoreo vetriculo admovent.

OBSERVATIO XLII.

De ructu ventriculi cum aliis symptomatis.

Cum inflatur aut distenditur stomachus, vapores malos & indigestos. Galeno ita tradente, per os eructat, & acidum interdum aut graueolentem ructum emittit, quibus emissis aliquando grauis dolor statim consopitur. Quod uxori cuiusdam calcearii Delphis euenit. Hæc equidem non solum circa lumbos & renem dextrum vehementer dolebat grauida duorum mensium, verum etiam dolor ille totum vetriculum & os eius occupabat, & tanta vehementia stomachum & diaphragma comprimebat, ut præ angustia vix anhelitum trahere posset, & spiritum e pectore educere. Existimabat autem se pleuritide laborare: cuius causa me vocabat, ut certo sciret, quo morbo laboraret, & simul a dolore subleuari posset. Cum autem hæc me præsentem plurimos ructus emitteret, quibus non nihil videbatur subleuari, mox tandem dolore redeunte: ideo cum potionem sequentem ebibisset, ac multos ructus tum ventositates per superna, flatulque & vetricis crepitus demississet, atque locum dolentem linimento infrascripto vnxissemus, panno calido deinde admoto, miraculi instar omnia symptomata dicta cessarunt: non obstante, quod merus esset de abortu, ob nimium dolorem & angustiam: *℞ sem. anisi, feniculi, anethi an. ʒj. β. glycyrrh. ras. ʒβ. unar. passul. enucleat. ʒ. β. malua, ob dolorem renum, m. β. bulliant in aqua coramuni q. s. & huius express. accipe ʒij. addendo sy. ex infus. ros. commu. sy. de cicchor. Nicolai an. ʒβ. misce: ℞ olei liliacei, anethini, ping. gallina an. ʒ. β. misce, pannis calidis admotis, præter omnium opinionem absque purgatione aut aliis remediis, tantum ructibus & ventositatibus emissis, cum nocte sequenti sudasset, & deinde bene dormiisset, sanitati restituta fuit.*

SCHOLIA.

Solus homo inter animantia, ut tradit Aristoteles, flatum ructumque emittit; quod ex stomachi humiditate contingit: ventres enim aliorum animalium aridiores sunt. Verum, ut Plinius refert inter morum exempla, Pomponius consularis, poeta, nunquam ructauit. Id vitium ex crassioribus fumidisque vaporibus vi quadam erumpit, ab imo (ut aiunt) stomacho: at enormiter quadam gloria potioribus per ora euoluitur. Censura igitur dignos quidam putarunt, qui ex crapula eructant. At ructus cum plurimum fiat ex indigestione stomachi, aut ex frigore, aut vëto: mulieribus sæpissime vnlux vitio, sæpe cum ventus includitur, nec efflari per se potest, quæ ructus commouent, damus: qualia sunt anisum, origanum, cuminum & similia. Verum si multa subest pituita, prius perpurganda esset: alioquin in continuatos verteretur ructus. Sed hic non opus fuit purgatione, cum tantum ventositates hæc mulierem torquerent. Verum, & antea dictum est, exiguo suo calore inflatur stomachus: copiosiore in ru-

ctus prorumpit, cibisq; pariter infantibus, ut de inflatione ventriculi diximus. Sunt & alia quæ effectiue excitant ructum: sicut raphanus, & sinapis: quædam materialiter in ventum & fumidum vaporem conuertuntur: ut ouorem lutea, si fringuntur, ac ipsum lac: omniaq; cruda magis quam cocta inflant: & stomachi caliditas lac arefcere facit. At de ructu acido atque fumoso, & quibus signis, si adsit materia frigida, pituitosa vel melancholica, distinguantur, iam antea dictum est. In materia melancholica adest grauitas, lienque subinde dolet & intumescit; & venter cum cibi indigestione, acidoque ructu. A bile ex oris amaritudine sitique; graueolentesque ructus in pestilentia fiunt, ex corrupto quoque cibo, potu pestifero, ut ex lepore marino, aut interioribus vlceribus aut abscessibus, aut infantibus ex tineis. Æruginis dirus sapor, compunctionibus, ardoribusq; indicatur. Cœnosi ructus, qui cibum non mutatum referunt post horas septem, imbecillitatem concoctionis reddunt. Acidus sapor perdurans hydropem minatur. A vento nullum sapor indicium facit: vel si ex frigore aut frigidis natationibus. *Curatio.* Innum primo, quod ad curationem attinet causis primitiuis & antecedentibus occurrendum est: deinde iis quæ inflationem stomachi discutiunt. Si ex crasso succo, ut antea dictum, oxymelite leuatur: deinde hiera; postea & diatrion pipereo, ex aqua v. l. vino; in ructu quoque vaporoso & fumido absinthium & hiera picra. Reliqua ad ructus dissoluendos vide apud Arculanum, & caput proprium Valesii lib. 4. cap. 11. de eructatione: vbi ad longam causæ, signa, prognosis & curatio explicatur. Non tamen semper acidus ructus ex causa frigida oritur: sæpe etiam ex calida, ut apud Trallianum viderelicet. Et vide apud eundem quomodo tales curentur.

OBSERVATIO XLIII.

De muliere cholera morbo correpta.

Cholera morbus est acutissimus, sine febre ferre, quæ vel vno die, vel altero, vel certe paucis diebus hominem rapit: substantia corporis effusa, partim assiduis vomitionibus, partim iisdem deiectionibus: nisi medicum peritum ac fugacem inuenerit. Sic mulier quædam Alcmariana, vxor cuiusdam fabri ferrarii, prope Sancti Spiritus facellum commorantis, mense Iulio, æstate vigente anno 1548. cholera morbo corripitur: cumque & vomitionibus & deiectionibus multa aquosa liquida corrupta & euomeret & simul deiceret, cum tanto impetu, ut humoribus multis spiritibusque vacuatis vires conciderent: vnde suborto sudore frigido ac tremore cordis, in synopen lapsa est: adeo ut astantes illam pro deplorata habentes, curationem sacerdotibus reliquissent, cumque munita esset extrema inunctione, tandem de remediis cogitarunt, atque me ad ægram deduxerunt; mox per me odoriferis naribus adhibitis, atque digitorum frictionibus factis, ad se paululum rediit. Sed quia adhuc valde nauseabunda apparebat, vomitum illico noluius constringere, ob materiz venenositatem.

2 Quare adhibito *cyatho uno decoctionis hordei communis, pauco & accharo adiecto*, pro medicamento absterfitorio & lotorio. A quo cum rursus semel vomisset, & secessum habuisset, mox hunc syrupum propinauimus: *℞ sy. cotton. 3. ij sy. de ribes 3. j. sy. de cicbor. Nicoli cum rhab. sy. menthacei an 3. ℥. misce.* Cepit autem circiter cohlearia duo; Postea solum syr. de ribes, menthaceum & cotoneorum dedimus, & accharum ros. perlatum. Postremo capiebat aliquādo pro roboratione & maiori cōstrictione, *diacotoneum sine speciebus.* Ventre ac stomacho inuncto oleo mastichino, & cotoneorum, symptomata cessarunt: ita ut illis tantum remediis, pro mortua habita, sanitati fuerit restituta; cui & exiguum panis biscocti in vino rubro stypticomacerati, pauco cinnamomo asperso dedimus, aliquando & succum granatorum expressum: & sana euasit.

S C H O L I A.

5 **R**heses, & qui eum sequuntur, statim post syncopen, de cholera morbo agunt: eo quod sæpe syncope tales afficiantur, ob nimiam euacuationem, & ob ventriculi consensum: & alii vero de hoc malo, cum plerumque ventris perturbationem, & simul fluxum habeat, scribunt, cum de aff. & ibus intestinorum agunt: verum cum etiam ad ventriculum referatur, de eo quoque malo in hoc libro tractandum esse æstimamus. Multi hic de nomine contendunt, & a causa nomen accepisse putant, a Græcis medicis: quamuis non ex propria sententia, ut Galen fatur 2. method. med. cum *χολή*, id est, bilē causam esse arbitrati sunt, uti & Corn. Celsus lib. 4. cap. 11. sentire videtur; cum tamen non solum a bile, sed cibi prauitate & corruptione humorum, fieri soleat. Trallianus potius a materia, quæ cum per ventrem adfertur, ex intestinis videtur excerni, fieri putat: Intestina vero choladas, veteres appellabant, ut etiam Homerus testatur his verbis, *κέχνητο χαμαὶ χολάδες*, quod est, *Fusa erant humi intestina.* Cum totus igitur ventriculus ab aliquo, quod morsu ponderere contristet, vexatur, idque statim eiicere cupiat, superno infernoque ore ad excernendum utens, affectus quidam hic gignitur, qui a Græcis *χολέεξ*, 3. de caus. sympt. a Latinis similiter cholera dicitur: quamuis Barbari hunc affectum *cholericam passionem* vocant. Est hæc affectio nihil aliud, iuxta eundem Trallianum, quam immoderata perturbatio, quæ per aluum & vomitum, propter stomachi submersionem, ac eiusdem offensionem prouenit. Paulus describit quoque cap. 39. lib. 3. eam esse immodicam ventriculi perturbationem, supra infraque erumpentem. Et quanquam Celsus hæsitet, num intestina vel stomachus lædantur, cum vtriusque commune vitium esse posse putat: iuxta tamen Gal. loco citato, secundum totum hic ventriculus afficitur, ut etiam docet *Alimarius*. Et ita quoque symptoma est in genere noxæ facultatum naturalium, & proprie expultricis deprauatæ; quæ proprie cholera dicitur. Nam quandoque citra eiusdem facultatis noxam fit, licet perpetuo aliquem præter natu-

ram affectum consequatur, veluti supra de vomitu dictum est; quanquam eam non proprie choleram nominant, ut si fiat propter ciborum qualitatem, Alex. Trall. auctore. Hippocrates 4. de rat. vict. in morb. acutis & Gal. in commento, duplicis cholæræ meminerunt, & aridæ & humidæ. In utraque perturbatio est ventriculi immodica infra supraque. Differunt causa & symptomata: arida enim fit ex spiritu flatuoso acro, qui siue egeratur, siue retineatur, lancinat, & mordicat partes ventris nervosas, venter inflatur, strepitus fit, dolor in lateribus, & lumbis, alius nihil deiecit, sed adstringitur. Eiusdem curationem vide loco citato apud Hippoc. Alia est humida, quæ gignitur ab alimentis eorumque prauitate, vel a medicamentis, & plerumque a vitiorum humorum copia, vel a bile admodum corrupta, aut a pituita falsa corrupta: de qua nunc agimus. At Neoterici quidam distinguunt species secundum humores, qui deiciuntur ac vomitu expelluntur: & sic quædam est aquosa, ex phlegmatis genere: altera biliosa, ut cholæræ prasinæ, æruginosæ & similium; vel melancholica corrupta, adustionem participans diuersarum naturarum & colorum. Alii aliter distinguunt: vel quod per se incipiat, aut alios morbos subsequatur, modo critica, vincente natura; modo symptomatica. Alia rursus in corpore debilis ventriculi, vel aliis virtutibus debilibus; alia in corpore fortis: quædam acuta, habens accidentia grauissima, medico metum incutientia. Alia vero non ita acuta. Quæ quidem differentia petuntur ab ipsis symptomatibus: quemadmodum & alia a tempore, quod ea ipsa sit in principio, in augmento sui motus, vel in statu, aut declinatione. Penes materiam, vel quod sit in ventriculo, vel in partibus vicinis aggregata, vel transfluxa: modo nocens quantitate, aut multitudine aut indigestione, alteratione, putrefactione, mordicatione, cum præsentia ciborum acrimum, mordicantium aut alterius humoris: vel ex defluxu a toto vel a membro particulari ad ventriculum & intestina. Atque hæc ipsa modo a causa primitiua sola, modo iuncta tum materia circa stomachum, Sed hæc ipsa ex causis tum exemplis subsequen-
7

O B S E R V A T I O XLIIII.

De cholera ex medicamento assumpto.

Cum excitetur cholera (teste Paulo & Tralliano) non ex vna causa duntaxat, sed etiam ex multis: ideo causæ illæ prius perscrutandæ, antequam curationem instituamus. Et quamuis fiat ex magna alimentorum prauitate, ut ab iis præcipue, quæ succum crudum, flatuosum vel acrem procreant, quæque ægre concoquuntur ac tarde permeant, ut intestina suilla, sanguine infarcta, cæpis, pipere, pinguedine, quib. nihil difficilius coquitur: quæ etiam sunt suilla caro, bubula, caprina, animalium ventres, & caseus, & quæcunque facile putrescentem succum, vel humiditatem acrimoniæ cōiunctam habent. Verum præter alimenta & vitiosos humores, ut latius in scholio subsequente dicemus, etiam medicamenta hunc affectum excitant, quæ

Quæ præter naturam affectus sit cholera.

Differen

De nomine.

Quid sit cholera.

Quæ præter naturam affectus sit.

quæ sua natura vomitum cient, & perturbationem tam per superna quam inferna concitant, vel excrementa ad ventriculum trahunt, vt veratrum. Sic mulierem noui, quæ cum diu circa præcordia male habuisset, empiricus eius cognatus *3* *ij. rad. ellebori albi in talis incisi* acceperat, & vino per noctes infuderat tres. Vinum expressum cum mulier bibisset, in vomitum enormem atq; choleram incidit, ac animi defectum, & anhelitus, præfocationem. Ad quam accitus, poculo inspecto ex quo potionem sumserat, inueni radices ellebori albi in vino infusas. Statim adhibeo decoctum hordei communis in aqua pura, adiecta pauco zaccharo, idque tepide, vt melius euomet: & pro veneni absterfione, mox propinabam *3* *ij. florum nenuph. albi pulueris satorum* (hoc enim proprium eius est remedium, teste Guainerio) cum ceruisia, propter calorem; cum venenum, seu veratrum, cum vino sumisset. Quamquam Guainerius dat cum vino, vti & theriacam seu gentianam cum vino. Mox roborato ventriculo exterius cum stypticis emplastris, & rob. de ribes per os, tum syr. cotoneorum exhibitio, postquam satis euomisset & ventrem deiecisset, hæctandem curata fuit.

S C H O L I A.

3 *Medicamēta quomodo cholera inducant.* Medicamenta acria subinde choleram morbum procreant. Sic Galenus *commento aph. 1. lib. 5.* dicit ex elleboro albo instar cholerae perturbationem fieri, & vomitum, & tandem, propter ipsam euacuationem, supra modum ipsis purgatis conuulsionem aduenire: sicuti & choleram patientibus, contractiones frequenter adueniunt, & sæpius ac maxime eorum qui sunt in suris musculorum. Et tunc conuulsio fit per compatiendi ad os ventriculi societatem. Sub veratro, nempe albo, reliqua pharmaca violenta subintelligenda sunt, quæ ex euphorbio, colocynthide, & scammonio, ex esula seu lathyride constant: ex quibus non tantum cholera seu perturbatio ventris, sed & conuulsio tandem euenit, si huic malo non statim occurratur. Ideo recte dixit Rondeletius. *Excitant hunc affectum medicamenta, quæ sua natura cient vomitum, aut ad ventriculum trahunt excrementa, vt veratrum, colocynthis, scammonium.* Variæ igitur causæ ipsius cholerae sunt, vt dicere cœperamus. Ideo recte dicebat Alexander Trallianus, lib. 7. cap. 16. de cholera. *At non solum de una sit causa, sed etiam multis; nempe ob cibum copiosorem assumptum, & quia concoqui non potuerit, corruptum: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, præsertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam sursum aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, vt epithemata quadam, aut frigidarum aquarum usum, si eas bibant, aut in eis diu natauerint.* Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: nam acrimonia sua fluxiones iritant, & officia vasorum ventris mordicant, & vomitum atque deiectionem inferunt. Corruptuntur etiam alimen-

ta; vel quia ad id apta erant: vel quia in maiori quantitate assumpta fuerunt, & non potuerunt concoqui sed corrupta sunt: vel quia eo ordine non sunt assumpta, quo debebant; vt cucurbita putrefacit facile, si aliis cibis misceantur, sic & pepones & melopepones. Alimenta præterea facile corruptuntur in corporibus intemperatis, quæ in temperatis coquantur facile, vt dulcia, aut quæ excitandæ cholerae apta sunt peculiariter, vt pepones, mala armeniaca, chrysomela (*abricois Galli vocant, iuxta Rondelerium*) nuces amygdalæ; acria, vt cape, allium. Corruptuntur etiam bona alimenta, quamuis ordine recto, & quantitate iusta fuerint assumpta, ob intemperiem ventriculi calidam, & ob prauos humores in eo contentos, & maxime bilem. Rursus frequentis crapula corruptuntur humores, & ex intemperata qualitatis materia; etiam ex aqua, *vt paulo ante ex Tralliano diximus, quod Galenus docuit.* Ex qua pituita aut flaua bilis aut atra generatur continuato vitio; qui etsi protinus morbos non adferunt, tamen coaceruatis intus ex longo usu humoribus, vitia contrahuntur inextricabilia; imo aliquando tales morbos inferunt, qui in octauum quandoque protrahuntur annum. Ceterum alii omnes istas causas iam dictas referunt ad duas generales causas; ad materiam, quæ lædit suo acumine aut multitudine: alteram ad laborem virtutis in expellendo. Interim & remotas causas diuidunt rursus in internas aut externas: externas eas vocant, quæ nauseatiua satietatem (*vt vocant*) & ad corruptionem cibi quouis modo inuent, vt est aer extreme frigidus coctionem impediens vel debilitans, quantitas cibi nimia, motusq; inordinatus post cibum, vigiliæ excedentes, animique affectus maxime tristes, resoluentes & coctionem debilitantes; coitus statim a cibo, cibi-que omnes male qualitatis, acuti, pungentes, corruptibiles, & ad putredinem parati, vt carnes mortuorum, & quæcunq; facile in venenosam qualitatem vertuntur, vt persicæ iam dictæ, indebita præparatio eorundem ciborum, vel eorundem præpostera assumptio, *vt iam diximus.* Internæ sunt, quæ per essentiam lædunt, aut per communitatem: per essentiam vero, qualibet intemperies simplex vel composita, sine materia, immediate faciens ad indigestionem & materiae corruptionem. Cum materia, vt humores in stomacho lædentes. Ad quas causas etiam referri poterunt apostemata, abscessus, solutiones continuæ; etiam vulnera in stomacho existentia, quæ ad causam etiam per essentiam pertinent. Per communitatem vero a toto vel membris particularibus, vt hepate, splene, cerebro, aliisque materiis malas ad ventriculum seu intestina transmittentibus.

OBSERVATIO XLV.

De cholera ex cibo diuerso & corrupto assumpto, orta.

1 *I*uuenis quidam biliosus, vigente æstate, cum in vna mensa diuersis cibis usus esset, cœpis, atque peponibus, & raphanis, atque pinguibus

Quomodo humores corruptantur.

Causa externa.

Causa interna.

Alimenta & cibi quomodo facile corruptantur.

dule busq; edulis, incidit in choleram. Ad quem accitus cum prius cibum corruptum euomeret & si nul per inferiora deiceret, cum ventriculi maxima angustia & grauedine; atq; intellexisset ex eius sermonibus, quæ in prædio sumisset, & quod largiore satis potu usus esset, atq; iam malum adhuc in principio esset, nolimus statim vomitum & alui fluxum cohibere. Nam si quis in principio, aut coaceruatim ea quæ afferuntur cohibere aggreditur, is maioris mali facile auctor est, teste *Actio cap. 12. lib. 9.* Inutilia enim cum sint (ut ipse inquit) euacuatione opus habent. Ideo auctores, si hoc malum ex corruptis in ventriculo cibis, siue propter copiam, siue prauam qualitatem, eueniat; aqua tepida exhibita ægrum vomere iubent. Nos autem dedimus aquam decoct. hordei non excorticati, pauco zaccii admixto. Quo satis vomebat, & aluum deiciebat. Alexander Trallianus mulsa vitur, quæ aluum & vomitum sine noxa irritat, eodem auctore. Cum autem euomisset, astantes plurimum adhuc metuebant ægro. Attamen in hoc morbo prudentis medici est, terrentia statim non reformidare; quando nulli morbo minori momento succurritur: ac protinus æger, ubi ista ceperunt, aqua tepida vel mulsa vomere cogendus est. Nisi enim quid impedimenti fuerit, celerrime rursus ad naturalem statum reuertuntur: potissimum si corruptio ob copiam ciborum fuerit oborta: quanquam & huiusmodi affectum proprie choleram non esse velint. Hic tamen etiam postea per vomitum & aluum quædam mucosa, pituitosa, nidorosa, inter quæ inconcocta quædam & semicruda videbantur, euomuit; ita ut hic affectus ad choleram referri possit. Tunc enim mihi venit in mentem similis fere casus apud Amatum *centur. 2. curat. 31. de Caspare de Robertis, genere nobili, qui cum vigente æstate in cœnaradiculis (quibus delectabatur) vesceretur, in choleram lapsus est: qui de ventriculi grauedine, ac in eo erosionibus perceptis quoque conquerabatur. Cui & aquam tepidam bibendam dedit: qua etiam multa mucosa, pituitosa, nidorosa & semicruda euomuit. Reperta vero eadem tepida aqua, nihil præter aquam ipsam euomuit, aut deorsum egressu. Quare tunc ventriculum roborans, cerato quodam ventriculo admotum, & intus minam cydoniorum cum speciebus sumens, & panem biscoctum in vino generoso & ascriptionis participe irroratum dabat: a iuribus abstinens & rebus duris concoctisq; difficilibus.* Et ita nostrum quoque ægrum curauimus. Vomitu & secessu postea desinente, a somno paulatim cibo refecimus; & ut cruditatem auerteret imperauimus: tostumq; panem cum vino mali punici commode dedimus; & ventriculum exterius roborauimus, pullosq; gallinaceos cum acore seu omphacio, piscesq; saxatiles cum exiguo & suauis aromate præbuimus: & mox sanus factus est.

S C H O L I A

4 C Vm igitur ex variis causis cholera exoritur, diligenter signa perscrutari oportet, tam ea quæ hunc affectum præagiunt atq; demonstrant,

quam quæ causas ipsas distinguunt, & quæ mera prognostica sunt. Nam his cognitis de curatione cogitandum, quæ ad vnamquamque huiusmodi causam accommodetur. Præscientia signa habentur ex vitæ instituto præcedente, tum victus ratione, quæ corruptionem ciborum, & humorum nimiam repletionem inferre solent, per motum quoq; inordinatum post cibum assumptum: & ex assumptione corruptibilium rerum; de quibus in causis abunde dictum est: potissimum si naturalis stomachi debilitas aduncta fuerit, vel innata, vel accidentalis, ob causas dissoluentes diminuentesq; virtutem. Sic coitus superfluus ventriculum debilitat, quemadmodum & febres morbiq; diuturni; quibus si accedat nauseatina satietas (ut vocant) cum accidentibus prædictis, immediate futuram choleram prædicere poterimus, si adfuerit punctio dolorue circa ventriculum & intestina. Ita & æstate atque autumno cum mali humores generantur, eo quod fructus crudiores comeduntur, si prædicta adfuerint, choleram præagimus. At signa demonstratiua & præsentis indicia, sunt (teste *Actio lib. 9. cap. 12.*) vomitus biliosus & nidorosus, & acidus, ad plures horas continue perseverans; & venter inferne eadem excernit, sequiturque sitis exsugatio, impeditur pulsus, musculorumq; manuum ac pedum, maxime vero surarum, contractio & tensio; & (ut refert Celsus) non solum bilis supra infraque erumpit, sed primum aquæ similis, deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnunquam nigra vel varia. Ex his quasi tempora eiusdem cognoscimus ex Arculano. Incipit enim primo cum lenitate, deinde statim augetur, cum dolore, & punctione in ventriculo & in intestinis; & quæ sunt minus maligna primo expelluntur, ut cibi corrupti; deinde humores aquosi & biliosi & citrini, subflui, tandem & virides (ut in nobilissima domicella Hentia, filia Domini Præsidis Hollandæ, conspeximus, quam etiam curauimus) postremo nigri. Et in processu perueniunt ad spasmum seu conuulsionem & singultum; & postremo ad salutem pulsus, sudorē frigidum, syncopen & mortem; & hoc usq; ad quartum vel septimum diem. Est enim egritudo peracuta; cuius terminas ad salutem aut mortem a 4. ad 7. At symptomata illa mala, ut est extremorum frigus, & circa faciem frigidus sudores, & facies terribilis, & pulsus ad prauitatem & inæqualitatem tendentes; & quæ ad hæc succedit syncope, aliquando vero & conuulsiones: illa quidem ob vacuationem & oris ventris laborem; hæc vero vel similiter ex ore ventris, cui cerebrum & nervosæ partes consentiunt (& erit conuulsio per consensum) vel ex siccitate, quæ pessima esset & lethalis. Sed hic notandum (ut Jacobinus doctissimus quoque admonet) quod hic casus non fit, nisi ex calido & bilioso succo, cum corruptione aliqua, id est, mala qualitate acquisita. Vult tamen Rhases ut forti animo simus, & remediis instemus, neque desperemus statim de salute. Attamen prædictione te a culpa seruabis immunem: ut exemplum sequens te docebit:

Conuel-

7. *Signa caus-
sam seu specie-*
Conuelluntur enim aut sui mordacitate, aut ex-
pultrice concitata, vel resoluta retentrice. Verum
antequam ad signa prognostica veniamus, prius
omnes causæ distinguendæ. At facile omnes in-
terstingui poterunt: nempe ob alimentorū assum-
torum copiam, aut eorundem (ac etiam potionū)
prauam qualitatem, quæ omnia ex laborantis, seu
astantium loquela percipies; veluti etiam si præ-
cesserit vsus frigidarum aquarum, aut frigidorum
medicamentorum ab extra adhibitorum. Verum
vbi ex copia bilis, seu aliorum prauorum succorū
redundantia, cholera fuerit excitata, ex propriis eo-
rundem humorum signis, ac sepius iam dictis, eos
discernes. Sicuti igitur biliosam choleram signifi-
cabunt initio, ea quæ de siti, dolore, punctione, vi-
giliis & bilis vomitu diximus; ita pituitæ vitreæ
præsentiam, in ventre pondus, frigus, & sensuum
grauitas, indicabunt: vti & phlegmatica salsa, ex
salsedine, sicuti bilis ex amaritudine, vti iam fre-
quenter dictum est, percipietur.

OBSERVATIO XLVI.

De cholera lethali ex bilis copia.

1. **P**Vella iuuenula, biliosa, sitibunda, quamvis
certis intervallis natura sese vomitu ac secessu
bilioso exoneraret, tamen ob impetū humoris
biliosi erumpentis, salubri humore simul cum bi-
lioso foras expulso, male subinde habebat. Huius-
modi homines a Græcis *χολεραϊ*, & *χολεραῖντες*
dicuntur, Plinio vero *biliosi*. Ceterum hæc puel-
la, cum ætas esset, & victu calidiorē vsa esset, &
alliis & cepis, bilem adeo copiose nunc infra, nunc
supra deiciens, & rofionem & caliditatem circa
ventriculum percipiens, cum præcordiorum do-
lore intensissimo, extreme decubuit. Ad quam
prius tertio die accitus, cum ea vidissem, quæ per
aluum & vomitum efferebantur, omnia biliosa
esse, ægramque vehementer sitire, & linguā sca-
bram habere, non sine febre ardente, choleram
ex bile prauissimam esse intellexi, viribus iam o-
mnino collapsis: cumque tribus istis præcedenti-
bus diebus ac noctibus bilem porraceam euomis-
set, illam in periculo esse pronūtiaui; & cum me-
dicamenta parum proficerent, atque nunc etiam
crura manusque contraheret, sitis accendebatur
magis, & anima deficiebat: adhibui ea, quæ ani-
mam refocillarent. Sed omnibus illis signis ma-
lis concurrentibus, mortem prædixi; Nec mi-
rum, cum tales subito moriantur, verum nō prius,
quam nares acuantur, & tempora extenuentur,
& oculi caui fiant, faciesque decorem amittat, &
extrema frigore & sudore corripiantur. Quæ cum
animaduertērem, & simul ex toto corpore subito
ad stomachum & intestina humores confluere,
leues quidem superna perentes, & graues ac cor-
ruptos ad intestina, cum continuo impetu deflu-
entes, viresque prosternentes; cumque iam sine
somnia esset, & anima frequenter deficeret, & fa-
cies quadam formidine percussa cerneretur, &
nares acutæ essent, & extrema sudore & frigore
corriperentur, & singultus inquietaret, pulsū
modo ablato, modo redeunte, mortem de pro-
ximo futuram prædiximus, materia virulenta ad

intima præcordia confugiente: ita vti in quarto
die hæc obierit.

S C H O L I A.

REcte dixit Alexander Trallianus lib. 7. cap. 16.
Cholera acutissimum affectum esse, syncopen infi-
gnem, immodicamq; virium resolutionē inducen-
tem, atq; id omnibus in confesso esse. Idcirco accurate in-
ternosci, & celerrime curari, merito postulat. Etenim
dilatatio in omnibus acutis morbis nociva est: in hoc autem
affectu etiam exigua, ac leui curandi mora, haud sim-
plicem offensam, sed etiam absolutam subinde tabem,
quæ phthisis dicitur, conciliat. Hæc Trallianus. Non
mirum igitur, quod in hac puella, cum ad tertium
vsque diem, ne de remediis quidem cogitasset,
subito ita vires conciderint, vt talem faciem in-
current, ab Hippocrate descriptam, qualis tabi-
dis contingit, ac paucis diebus, vt quarto die, vi-
ribus exhaustis interierit. Idque Celsus confirma-
uit: quippe cum hic affectus toto genere periculo-
sus sit. Vbi enim signa prædicta adsunt, vt subita
extenuatio, præsertim faciei, & frigus & pulsus
mutatio, & syncope ac cōuulsiones in debili cor-
pore; magis lethalia habentur; si etiam in fine do-
lor perseveret, & punctio, cum virtutis debilitate,
arguunt corporis consumptionem. Attamen non
semper desperandum est, iuxta eundem Celsum,
cum idem dicat, *Neg, tamen vlli morbo minori mo-*
mento succurritur: modo (vt nos quoq; addamus) tem-
pore medicamenta apta adhibeantur. Cholericæ
vero istæ affectiones magis in æstate fiunt; & fe-
bres intermittentes, & quibus errores accidunt,
& quandoq; malignæ fiunt, & ad morbos acutos
perueniunt, vt 7. de morb. vulg. Hipp. scriptum reliquit.
Autumno etiam frequenter contingit, ob esum
fructuum, vt diximus; raro vero in hyeme. At si
ex procatactica causâ, id est, quæ recenter im-
pressit, vt ciborū ratione eueniat; quomodocun-
que erratum sit, facilius affectus videtur, quam si
ex totius malo. Quæ vero magnitudinē affectus
monstrant, & morem, hæc magis aperient, præser-
tim ad vires comparando. Cum enim affectus to-
to genere periculosus sit; grauius periculū euadit,
vbi ea comparuerint. Sunt autē, quæ superueniūt,
& morem significant, ex superflua motione sym-
ptomata, vt extenuatio subita, cum alia supra di-
cta. Vrinæ quandoq; copia. Pueros & adolescen-
tes voraces, plurimū infestat: viris cum euenit pe-
riculosior est, si lacertosi præsertim fuerint. Assue-
tis id malum minus periculosum est, ex quo aqua
euomunt. Qui eam frequenter incurrunt, facilius
eam tolerant, materia non existente tam copio-
sa aut maligna: qui vero raro, difficulter sanantur,
ex causis contrariis; & ideo infantes citius curan-
tur. Et quamquam hæc puella alias hoc malo bis
aut ter affecta, facilius curabatur; attamen nunc
existente materia maligna cum febre satis arden-
te, antea stomacho imbecilli existente, & nunc
viribus deiectis, quarto obiit. Quæ vero origi-
nem habuerit ex cibi corruptela, aut alia causâ
primitiua, modo non sit causâ venenosa, & quæ
ex materia pituitosa & aquosa sit (cum hæc faci-
lius corrigantur) etiam si accidentia in principio
R

3.
Signa!
Prognostica

4.

5.

6. terrorem incutiant, minus periculosa habetur. Ex opposito, mala est, quæ in corpore forti, non consueto aut hyemæ fiat, & ex multiplici corruptione, non tantum in ventriculo, sed in venis totius & membris in processu virtute deficiente cum ceteris malis symptomatis iam dictis. At, ubi restringitur cholera, sæpe declinat materia subito ad vias urinæ, & accidit urinæ ardor; & malum (vt diximus) subito leuatur. Est hæc passio cholericæ dicta vt plurimum salubris, si debite tractetur, sed non apud tardos, & negligentes (vt Arculanus recte dicebat) neque apud imperitos: celeritate enim indiget. Nam mora, vt in hac puella, se ipsam negligente, mortem intulit. Quod facile in principio curetur, infra scripta exempla docebunt.

OBSERVATIO XLVII.

De cholera cum sauisimis symptomatibus & recte curata.

7. **M**aria Gerardi, vxor illius Magistri Remi Astrii, Mathematici insignis ac Philosophi Alcmariani, mihi admodum familiaris, mense Septembri, anno 1551. in acutissimam choleram lapsa est, vna cum syncope vehementiore: pituitam prius multam & aquosam; deinde & bilem prassinam æruginosamque, simul euomebat & per inferna deiciebat. Statim accitus, & ad eam ingressus, frictiones adhibui, & ligaturâ brachiorum; mox a syncope releuata, hoc sequens medicamentum propinaui. *℞. decocti hordei non excorticati ℥ iij. syr. ex infus. ros. rub. magis apertarum ℥ j. miste.* quo facile vomuit, & secessum habuit: nolimus enim in principio ea, quæ efferebantur, cohibere: Quin imo, cum adhuc nauseabunda esset, hæc tepide propinauimus: & euomuit. Nam sola aqua tepida cum syr. acet. simplicis, satis officium suum in tali casu præstitit. Interea etiam dedi hunc syrupum. *℞. aqua decoct. hordei mund. ℥ iij. syr. de ribes, syrup. cydoniorum, an. ℥ ss. syr. ex infus. ros. ℥ ss. misce.* syrup. iste vltimus non erat paratus ex ros. pallidis seu provincialibus dictis, qui magis laxat, sed ex ros. rubeis parum apertis per infusionem, cum & aliquo modo detergat, & lauet ventriculum & intestina. Materia itaque maiori ex parte vacuata (quod in horis 24. plerumq. fit) leuiter huiusmodi cohibitionem incipere licebit. Ideo imperaui huic nostræ ægrotanti, vt tempore satis ebiberet aquam coctam cum syrup. de acetos. citri, ex cotoneis & syrup. ex ros. siccis, æquis inter se portionibus cum aqua cocta mistis. Et vt frequenter vteretur ad maiorem roborationem ventriculi & constrictionem, iubebam ex condito sequenti, veleius æmulo: *℞. conserua ros. antiq. conserua acetosa, rob. de ribes, ana ℥ ss. diacydonii sine speciebus ℥ vj. semin. acetosa, semin. citri puluerisator. an. ℥ j. manus Christi cum perlis ℥ ij. specier. trionsant. ℥ ij. cum syrup. conf. myrobalan. empeliticarum & syrup. menthaceo, fiat conditum mediocriter molle:* de quo sumebat instar dimidiæ castaneæ, per horam ante pastum, mane & vesperi; etiam extrinsecus hoc vnguento ventriculo roborato, ac temperate calide inuncto, mane & vesperi ante pastum, *℞. olei myrtei, cotoneorum, ana ℥ ss. olei mastichini ℥ ij. corall. rub. ros.*

3. *rub. hypocythid. acacia, ana ℥ j. santali citrini ℥ ss. cera exiguum, fiat vnguentum.* Et quia prius facile in syncope inciderebat, frustum manus Christi subinde dedimus, superorbendo cochlear vnum succi granatorum acidorum. Sed cum leui frictione, vt dictum est, cessaret syncope, reliquam curationem cum supradictis perfecimus: alioqui si accidentia terrentia non cessassent, dedissem vinum tenue, odoratum, cum aqua frigida fractum. Sic anno 1588. Iuuenis quidam in febre continua biliosa cum supra modum bilem euomeret, & infra deiceret, & in syncope incidisset, cum sudore frigido, parum vini Rhenani dedimus cum aqua fractum: quibus syncope cessauit, & ad se rediit, cum astantes illum moriturum existimarent, cum nocte subito ad iuuenem vocatus essem. Cum itaq; in muliere hac humorum excretio quæuisset, cibis prohi succi utebamur, parum restringentibus; addiundo ad ventriculi roborationem, columbaceum pullum perdicesque, & gallinaeos, cum acore, vt omphacio: vel pisces saxatiles cum aromate suauis. Et ita probe restituta fuit sanitati, cum vera cholera laborasset, sine febre.

S C H O L I A.

4. **P**ro morbi diuersis temporibus, proq; casuum & caussarum diuersitate; hic varia curatione opus est. Et licet in communi, æger collocandus sit conclauis obscuro & temperato, variisque odoribus grato, citro, malis cydoniis, aliisque similibus pomis: tamen in iis ægris oblectamenta quærenda sunt; quandoquidem aliis panis odor fastidio est: ita & aliquos noui, qui odorem pomorum cydoniorum respuebant. In primis animi securitas, ac somnus omnino magnam curationis partem possident: quæ cantu sonoque queritur, secundum aliquos. Attamen ægri ita male habentes, strepitum illum sæpe ferre non possunt. Et nõ solum hic leuiter adstringentia, etiam in cibis ipsis permisceri debent, aut parum ante assumi; sed etiam post eos, cum simul ingruat vomitus, & alui fluor, quamq; & ea moderata esse debet, nec a principio. Nã in principio (vt iam diximus ex Actio) quæ efferuntur, cohibenda non sunt: nam inutilia (vt idem refert) euacuatione opus habent. Sic quidam huius mali tres status faciunt: Primus est, cū corrupti in ventre cibi molestiam inferunt, & notæ corruptionis adsunt, sed adhuc natura ad excernendum non impellitur: tunc enim leuiter irritare vim ventris oportet, priusquam per se irritata vehemens sponte eueniat: hinc enim nullo modo incommodum eueniet. Signa erunt huius status, cum nauseam patitur, sentit morsus & rugitus, & angorem circa ventrē. Sic, si cibos venenosæ qualitatis sumat, vel purgantes cibos, vomitus tunc a mulsa fiet, vel aqua hordei tepidis, idque donec venter bis vacuetur: a quibus fouendus est venter absinthino oleo vel mastichino calido, vt vomitu relaxatus roboretur. Si vomitū recuset, vnguentum conficiemus, addita cera, corallis, mastiche, aloe, & similibus. Quod si æstuat & æstas sit, oleo cotoneorum (melinum appellatur) utemur.

5. *Primus status.*

Mox

6. Mox ubi quieuerit, cibum dabimus, assum magis: sed mollem, ex his quibus assuevit, eligendo. Sepe vero & ventrem proritare itidem expediet. Hinc etiam alia comoda, quod causa ipsa, hoc est, humores mitigantur. Quod si corruptio flatus excitauerit, quod saepe fieri solet, aliquid quod discutiat flatus propinabimus; & extrinsecus pulueres aromaticos vnguentis admiscebimus. Hollerius huius causa exhibet cochleare medium seminis cumini, aquae incoctum. Ceterum si sponte natura coepit excernere vtrumque; (*est secundus status*) considerabimus num talis corruptio totum inuaserit, an ventrem solum, & primas venas, quae inter ventrem & iecur sunt. Nam si ad has partes solas attinet, sufficient ea, quae diximus, vno excepto, quod calida aqua potabimus. Hic enim intentio non est vomitum proritandi, sed abluendi excrementa, iis, quae infixae & inhaerentia priritant, & temperare ea faciunt, ne mordeant. Ita nos in iuvene priore dedimus, vti etiam in muliere, quae medicamentum ex veratro sumisset, a quam decoctionis hordei communis cum zacch.
- Secundus status.*
7. Tertius status est, cum in toto corruptela viget; itaque quamuis a ventre incipiat, prosequetur expultricis impetus. Hic vero considerare oportet, quod motus hic symptomaticus est, non prorsus naturalis, ut sunt excretiones, quae per naturam fiunt. Vt igitur illas semper sinere oportet, quia modum non excedent (*est enim leuis proritatio*) ita hic distinguere oportet. Quatenus enim praua sunt, & a natura excrera, sinenda sunt: quatenus modum excedunt, sistenda. Initio igitur eadem calidae portione utemur, in easdem intentiones, ut priritatio sedetur; ita enim moderatior vacuatio. Sed si malum ingrauescat, cogitandum de remedio est, priusquam symptomata adorianur. Intentio igitur erit fluxionem sedare, quod duos scopos habet, ut & omnes affectus, qui e fluxione fit: Primus alio humores auertere: secundus roborare partes, quae recipiunt. Primum ab auersione incipiemus, quam modis supra expositis iam saepe faciemus, vinciendo scilicet extremos artus: nam & frictiones per manus adhibita quietae, & mites. Praeterea extremorum deligaturae eidem conducunt: & si quidem alius vrget, plures brachiis & iuncturis, quibus illa cum manibus committuntur, cum frictiones, tum vincula iniicienda sunt. Sin autem vomitus magis vrgeat, tum femora tum talos constringere, paululum ipsa dissoluendo, rursus deligare oportet (*ut patet quoque ex Tralliano*) quo materiam semper in contrarium reuellamus. Nam & eo dolore natura ab opere expellendi auertitur, & ad eam partem humorum copia attrahitur: etiam cucurbitulas admouendo. Mox & roborantibus utendum extrinsecus. Hic tamen naturam causarum animaduerrere oportet: Nam si aestuat venter, & sitit multum, & biliosa sunt, quae euomit aeger, applicare oportet & actu & potestate frigida: cauendo tamen excessum frigoris. Exempli gratia, succum intybi, vel oxalydis, vel portulacae, vel semperuiui, vel coryledonis, ex hordei farina: sic ex granatis totis expressum succum. Vel panis his succis immersus, vel &

linteus saepe renouatus cum incaluerit, vel cotonea mala aut pyra, vino austero, vel aceto incocta, & tusa in linteo extenso apposita. Vel rubi & rosarum & vitis germina & rosa ipsa contusa & emplastri forma applicantur. Quod si non adeo magnus calor appareat, cum hac materia aliquod aromaticum admiscebimus, ut inter herbas mentham siccam, sisymbrium, mastichem, cyperi radicem tussam, rosas siccas. Sic & panis assus aceto infusus, & mentha, rosae & cenanthe conspersus. Vbi vero signa caloris & aestus non adsint, ut quod materia frigidior corrupta sit, calidiora in eandem intentionem afferre oportebit; quale est Gal. emplastrum, i. ad Glauc. ex cotoneis palmulis vino coctis, aloe, mastiche, croco & farina hordei. Possumus & superiorum aliquo videntes, ut cotoneis ex vino aromat. ros. puluerem inspergere: haec extrinsecus: quorum copiam inuenies apud Alexand. Trallianum & Rondeletium & alios. Intro vero sumantur in eundem usum ea, quae a ratione cibi aliena non sunt, sed grata: ut scilicet quantum fieri potest, retineantur. Si igitur aestuat, lactucam & intybum, cum aceto mandenda dabimus, aut limones, aut citri carnes, aut cotonea Sic & Trallianus ob copiam bilis, causam efficientem obseruans, per contraria semper curandum esse dicit, per ea, quae refrigerant & humectant, tum cibos, potus, & epithemata, quae eiusdem sint facultatis. Proinde ptisanæ cremor refrigeratus his est idoneus: item lactuca eodem modo refrigerata, paulo aceti adiecto. Nos quoque thyrsis lactuca conditis commode utimur, similiter & is commendat intybum; & panem ex aqua sumtum. Inter testacea conferunt, pectines & buccina lota saepius; astacum bis coctum, & pisces duriores. Ex fructibus, qui non admodum maturi sunt, & adstrictionem mediocrem habent, praesertim mala, pyra, mala punica, & vua pensilis. Ex bellariis huc conducunt vuae passae, & castaneae. Poterimus & panem ex acerbæ vuae succo, vel punicorum dare, & aquam frigidam; sed id parum, quae non vniuersa, iuxta Trallianum, sed paulatim & in cibi sumendi medio tempore bibatur. Sic & corna, mespila gustet, & ex cerasis austera, quae morella dicuntur: conferunt & grati odores astringentes naribus obiecti. In censu vero medicamentorum astringentium, erit acacia, hypocystis, in vino dissolutus; & terra Lemnia, & bolus armenus: miua quoque simplex dicta & syr. e myrto. Quod si affectus his non sedatur, & timor est syncopes, somnum inducere expediet: eo enim sedantur prorsus fluxiones haec, idque potius exterius oleis fronte & tempora inungendo. Vel dandum diacodion. hinc duplex commodum: nam sedatur priritatio expultricis vis, & humorum modus sistitur. At si nihil horum continere queat, cucurbitulam magnam ventri admouemus, & est maximum praesidium ad vomitum sistendum. Nam valide retrahendo eiusmodi cucurbitula vomitum prohibent. Praeterea si diutius adherent, etiam concoctione iuuant, & ventrem, ne amplius profluat, cohibent, eodem Alex. teste. Interea aluo adhuc egerente (*ut inquit Aetius*) amyllum cum decoctione capiti papauerum, per

Secundus status.

Tertius status.

Frictiones & vincula.

9.

10.

(cucurbitula.)

rr. clysterem infundatur; simul etenim cohibet & refrigerat, somnumque inducit, ut ipse refert. Nihil enim his præstantius est quam somnus & quies. Si vero iam symptomata eueniant, illis succurrere oportet quam primum, ut antequam æger in syncope incidat, vinum exhibere, vel aquam carnis, in hunc usum paratam; quod etiam ubi syncope accesserit, faciendum, præter alia remedia, quæ vniuersim ad syncopas fieri diximus, excitantia. Si conuellitur ex inanitione, morandum non est, sed prædicto periculo extremæ partes aqua & oleo dulci tepido fouendæ; similiter maxillarum musculi, per spongas. Post hæc si malo profligato vigiliæ vexant, moderatus somnus conciliandus: si inappetentia, ventrem roborantibus, & cibis gratis excitabimus. Ex his iam dictis constat, quomodo curatio in genere, ratione causarum & symptomatum, & temporum, sit varianda. Quæ particularibus exemplis supradictis, & iam adhuc dicendis multo clariora euadent.

OBSERVATIO XLVIII.

De duabus mulieribus cholera seuissima laborantibus, & curatis.

I. Catharina Ioannis Harpadi consulis Delphenensis filia, nuper nupta, & circa tertium mensem prægnans anno 1558. 23. Iunii incidit in choleram gravissimam, ita ut abortus metueretur. Ad quam nocte accitus, ilico dedi decoctum hordei communis, cum pauco zaccharo: a quo rursus cum satis vomisset ac aluum reddidisset, cumque extreme debilis esset; ut sæpius deinde ex condito sequenti vteretur, præcepimus: *℞. corticum citri conditi ℥ss. medulla citri condita ℥ij. conserua summitatum absinthii Romani: conser. ros. ana ℥iij. specier. diarod. abb. & arom. ros. sine musco, ana ℥j. cum syrup. menthaceo & cotoneorum, fiat conditum.* Venter inunximus oleis sequentibus; & cum lana stomachum fouebamus cum iisdem oleis. *℞. olei cotoneor. ℥ij. olei nardini, absinthii, ana ℥ss. misce.* Præterea ne abortus fieret, totum ventrem inferiorem inungi iussimus cum vnguento Comitissæ. Et ne vapores maligni sursum reperent, cum paulo melius habere visa est, capiebat a cibo grana septem vel plura seminis coriandri præparati, simplici tunica zaccharo incrustati. Altero die, cum redirem, cholera cum sedata esset, conquerebatur de calore circa renes, quibus inunctis cum vnguent. infrigidantis Gal. cumque astantes illam prodeplorata haberent, non solum a cholera curata fuit, verum & ab abortu præseruata. Vti etiam Petronella, vxor Sasboti Bokeli, cereuisiarii Delphenensis, quæ tamen non erat grauida. Hæc enim anno 1560. 19. Martii die, cum in choleram noctu vehementiorem incidisset, cum torminibus ventris, doloreque intolerabili, & maximo cruciatu & angustia, ita ut suræ ac crurum musculi valde conuellerentur, frigidumque exsudaret, ita ut me electo tunc vocauerit, cum animaduertterem simul flatus adesse, statim exhibui cimini parum puluerisati cum ceruisia, dum in officina decoctum hordei communis parabatur; cuius decoctionis dedi *℥iij. addendo pro maiori diuersione syrup. ex infus. ros.*

℥j. mellis ros. colati ℥ss. misce. & deinde totum ventrem inunximus cum oleo anethino & chamæmelino simul mixtis, ob dolorem, quibus præsidii statim miraculi instar fuit curata: ut aliis remediis vti opus non fuerit.

S C H O L I A.

3. Hic morbo medemur, ut paulo ante diximus, si syncope aut aliud symptoma tale non impediat, ablata causa. Quoniam primum vnamquamque causam abscindere oportet, postea ad intemperiem venire. Sed quomodo sit auferenda causa, & per quam regionem, docet Hippocrates: *Quo natura repit, &c.* In hoc affectu cum fiat excretio per vomitum & secessum, ante omnia erit prospiciendum, an æger vomat facile vel difficile; num sine conuulsione & syncope: nam ipsis primum esset occurrendum, ut grauioribus & magis vrgentibus. Et quamuis prima mulier facile vomebat, nolimus vomitum nec secessum irritare, sed contenti fuimus ablutione cum decocto hordei & zaccharo. Et ideo materia illa absterfa, ventriculum roborauimus, & ad constrictionem leuem deuenimus, ne fieret abortus. In altera vero muliere, quamuis erant statim in principio accidentia mala; nempe conuulsio, nolimus statim constringere, & ideo abstergentibus vti sumus, cum facile vomeret, & secessus satis haberet, syrup. ex infus. ros. dedimus cum melle ros. in hordei decocto: & quia aderat flatus, dedimus etiam cuminum: & cessante fluxu ac vomitu etiam cessauit conuulsio, alioqui etiam ad conuulsionem præsidia adhibuissimus. Quod si vomitus fuisset in his difficilis, parum adiuuissimus, cum leuioribus tamen, ut mulla. Sed si bilis in ventriculo fuisset, vel alimenta adfuissent in bilis naturâ corrupta (quod per nidorosus ructus intellexissimus) abstinuissimus a melle rosato, vel calidioribus, & ab iis, quæ bilem augent, & intemperiem. Aqua tepida contenti fuissimus, non tamen in parua quantitate (sic enim vertitur in bilem) sed copiosa; tum ne bile scat (ut ait Hippocr.) tum ut ventriculi partes omnes abluar, & citius reiciatur. Ager autem sinendus est vomere, donec vitiosus humor totus, aut maiori ex parte reiectus fuerit: nec antea medicamentis adstringentibus est vtendum: quoniam materia, quæ agitata est, & quasi sursum elata, retineri non potest, nec etiam debet, ne humoris corrupti vacuatio impediatur. Siue igitur corruptio ob copiam ciborum fuerit oborta, siue alimenta fuerint corrupta, siue humores corrupti, conuenit aliquando in principio iuuare excretionem, tam per vomitum, quam aliquando per sedem; leuioribus tamen purgantibus medicamentis, prout diuersus humor requirat. Ita viribus integris recte faciunt, qui modice detergentia exhibent, ut quicquid reliquum est humoris, euacuetur: ut in materia calida dant aquam hordei, cum pauco zaccharo; in frigida, cum pauco cinamomo. Si adhuc humor supersit, in calido capiunt myrob. citr. *℥ij. fiat decoctio in aqua hordei; & in ℥iij. colaturæ sacchari parum dissoluunt, in frigida, pilul. de hier. vel arom.* sed ab iis abstinere: ad vomitum magis conte-

6. conferunt, quam ad cholera morbum, qui fere totum humorem, & plusquam sat est, euacuat: nā hac excretio, quamuis utilis sit; si modum excelsit, periculo non vacat, cum prostratis viribus mortem afferre possit. Vbi igitur vitiosus humor, in principio adiutus leuiter, totus vel ex parte sit reiectus: tunc ventriculus est corroborandus, ne attractis a partibus vicinis excrementis, vt a liene, iecore, ac intestinis, ea quæ præter naturam est vacuatio, continuetur. Ideo ventriculus potius admotis, quam sumtis est roborandus: quoniam admota melius corroborant & sistunt, citra ventriculi nauseam, vel subuersionem. Quæ vero sumuntur, siue medicamenta, siue alimenta fuerint, reiciuntur, propter agitationem. Propterea æger quiescat; & interim quod admotum est, non erit otiosum. Somnus, si fieri potest, conciliandus, vt qui & concoctionem maxime iuuat, & excretionem retineat. Admota perpetuo debent esse adstringentia: sed calida in frigida, & frigida in causa calida. Quæ vero admoventur, vel sunt emplastra, vel sacculi, vel foci oleorum, vel decocta herbarum, vel succi earundem, & fruct & pulu. Formulas vide apud auctores, & præcipue apud Rondeletium, tam in causa calida, quam frigida, & apud Hollerium.

OBSERVATIO XLIX.

De cholera cum syncope & conuulsione.

1. **C**holera cum syncope & conuulsione, omnium læuissimam esse diximus: quæ cum Ioann. Boethum, ceruissarium, in foro frumentario Delphis habitantem inuasisset, adeo grauis fuit, vt ex continuo vomitu ac secessu in syncopen inciderit, deinde in conuulsione manuum, pedum, & præcipue surarum, & ppe modum in omnium musculorum contractionem: & non solum musculi pectoris (vt vidimus) motu conuulsuo afficiebantur, sed & gutturis, dorsi, tum ventris contrahantur, vt simile in praxi nunquam viderim, cū tanto dolore & animi defectione, vt hominem ilico moriturum dixisses. Ad hunc 23. Martii die anno 1563. in nocte vocatus, ilico hoc medicamentum deterforium dedi, vino prius narib. obiecto & factis frictionib. extremorū, vt a syncope releuaretur nonnihil. *℞. decoct. hordei commun. ℥ iij. syrup. ex infus. ros. rub. comm. ℥ j. misce.* eoque assumpto euomuit plurima biliosa; & secessus plurimos habuit. Cum autem lipothymia non cessaret, imo syncope oboriretur, ad vinum confugiebam, tenue, odoratum, cum aqua frigida fractum; quod paulatim sorbendum dedimus, nempe cum molli panis sumtum. Modo dedimus panem feruentem, vino punico infusum: quod cum vomitu reiceret, rursum dedimus. Interea ob deliquia animi refecimus eum tostæ carnis succo expresso, cū vino punici, malique cydonii. Præterea ad imperum ipsius cholerae, ac vomitum inhibendum, tum pro siti enormi ac syncope, vt continuo ex hac mixtura sumeret, mandauimus. *℞. rob. de ribes ℥ j. rob. cerasorum, syrup. cotoneorum, an. ℥ ss. manus Christi cum perlis ℥ vj. misce.* Ad contractiones vero continuas in omnibus fere locis linimento in-

frascripto iussi inungi. *℞. olei irini, vermium terrest. an. ℥ j. castorei puluer. ℥ ij. misce.* & per totam noctem loca conuulsione affecta continuo eo linimento parum calfacto inungebantur; ita vt maximo quasi miraculo mox hæc omnia mala symptomata cessarint. Postquam autem malum nonnihil inclinasset, nutriuimus illum lacte amygdalato, cum aqua furfuris confecto, modico zaccharo perlato, ad mediocrem dulcedinem, adiecto. Deinde & cibis optimi succi eum quoque restaurauimus; nempe pullis gallinaceis, columbis, perdice, cum acore: pyra tum mala cydonia, modo cocta, modo assata præbuimus. Postea, cum extoto quasi omnia accidētia prædicta cessassent, post duos tresue dies adeo venter restrictus est, vt nihil excrementorum deiceret: qua de causa, vt omni mane cochlear vnum syrup. ex infus. ros. sumeret præcepimus; ita vt postea semel in die naturaliter excreuerit, calore & siti post morbum relictis etiam cessantibus. Doluit tamen subinde in ventre inferiore versus pubem, vt ægre lorium redderet: at pube sæpius inuncta cum oleo chamæmelino, idque calide, copiose deinde lorium reddidit, & sanus factus est.

S C H O L I A.

CV rationē pleriq; , vt dictum est antea, duobus fere modis absoluunt; vel causam remouendo, vel symptomatibus occurrendo. In remouendo causam, rationem habent materiae fluentis, num ea digna sit euacuatione: eamque diuertunt, in contrariam partem trahendo: hinc & quidam balneo vtuntur, vt materia ad partes externas trahatur; sed melius ligaturis tum vinculis, vt iam dictum est, tum frictionibus. Habent etiam rationem materiae fluxe, vt moderare, quo natura vergat, eam vacuent per vomitum aut secessum: alioqui, si superfluat, & vires deiciat, restringunt, & roborant ventriculum, & vitæ institutum præscribunt. Sic alii causam remouent, diuertunt, humores incraissant, viasque & ductus constringunt: de quibus satis iam dictum est. De quibus videas *Gradum, Gatenariam, Arculanum, & alios, qui Rhazem aut Auicennam sequuntur.* Symptomatibus occurrunt, qualia hæc fere sunt, *sitis, syncope, singultus, conuulsio, vigilia.* Sitim restringimus aqua hordei, cum succo granatorum, vel iulebo rosac. succo granato. & syrupo eiusdem, tum illis, quæ ad sitim valere scripsimus in libro nostris de febribus. Syncopen curamus eo modo, quo antea de syncope diximus, *lib. 17.* & quorum exempla etiam posuimus *lib. 7. de febr. symptomat.* & ita syncopi intendimus, asperzione aquæ frigida in faciem; vino subtili odorifero, non tamen multum vinoso, aquæ permixto, paulatim absorpto, iure carnis, & similibus: interea si extrema frigescant, pannis calidis fouemus. Et viribus deiectis consulimus vino austero prius naribus admoto, vel assumpto succo carniū, vino granatorum admixto, prælo expresso, buccella panis vino imbuta, naribus admota, vel deglutita, modo possit Singultui proprie ex inanitione, subuenitur frigidis, stomachum roborantib. vacua-

6.

tionem inhibentibus, vino & miua coroneorum; exterius, emplastris ex cotoneo, vel fottu ex aqua chalybeata, in qua rosæ & santali & similia incocta fuerint, cibisq; facile digestiuis, frigidis & roborantibus. Reliqua de singultu cap. proprio petenda. Contractioni manuum, pedum & iuræ, iuxta Paulum, oleum calefactum musculis pāno imponendum, vel cerora liquida addito castoreo. Si ex inanitione, oleo tepido dulci & aqua, partes fouendæ extremæ, & musculi maxillatum, per spongas, si contrahantur; alii hyeme inungunt oleo nardino, liliaceo; æstate violaceo & ros. Quidam ex inanitione partes fouent lacte tepido cū panis admoto; at nos commodè in muliere vli sumus oleo irino, & vermium terrestrium. Vigiliis occurrunt soporiferis, vt diacodio, & aliis: de quibus vide auctores.

OBSERVATIO L.

De cholera mutata in celiacum morbum, seu celiacam affectionem.

1.

Pætor Rheniburchius, Delphis decubuerat in foro, in Mechliniæ hospitio, ex cholera sæuissima, ad desperationem fere: a qua licet nostra industria euaserit, postea tñ, hyeme existente, cū intemperiem frigidam ventriculi haberet; unde pituita multa congesta, pcedente cruditate, & in ventriculi cavitare coaceruata, quæ indies intemperiem magis fouebat, in celiacam tandem affectionem incidit. Ad quem accedens ann. 1559. die 2. 12. huic optimam victus rationem proposui, obseruandam, qualem nobis describit Trallianus ex Philumeni medici antiquissimi decreto, cū & celiacus ita curentur, nempe cibis non nimium aluum reprimentibus, sed qui adstringentes facile concoqui, & in totum corpus distribui possunt; qualis est panis bene elaboratus, probe coctus, vinoq; adstringenti instinctus; nec non lenticulæ & oryza sorbitiones: pisces vero dura carne præditi: & ex auibus, quæ non sunt pingues, præter palustres. Ita & panis cum malis cotoneis & myrtis coctus, exhibitus. Vitella quoq; ouorum assa & aceto instincta, & lac scissile ppinatum, carnes leporinæ, aut ferinæ, ac alia, quæ in fluidis affectibus prosunt. Quod ad medicamenta attinet, cum liquida incocta excerneret, modo pituitosa, modo biliosa, & quasi fluida & cruenta, sine acrimonia tamen: licet huic ventriculus frigidus esset, hepar tamen illi calidum erat; quod & venæ apparentes indicabāt, & constitutio ipsa parum macilentata. Prima vice vt ventriculus ab eiusmodi humoribus liquidis lauaretur, hanc potionem sumsit. *℞. decoct. hordei non excorticati ℥ iij. syr. ex ros. siccis & cotoneorum, (ad maiorem repressionem & roborationem) an. ℥ ℔. misce, detur vnica vice.* Deinde sumebat ad placitum ex hoc condito. *℞. conf. ros. antiqua ℥ j. miua cotoneorum ℥ ℔. corticum citri conditi & medulla citri condita (ob sitim, quam experiebatur) an. ℥ ij. myrob. empelit. conditor. & citrinor. ana ℥ j. ℔. specier. diarrhod. abb. ℥ ℔. specier. arom. ros. sine musco ℔ ℔. cum syr. cotoneorum: fiat conditum.* Interea semper ante cibum sumebat ℥ ℔. diacydonii sine speciebus: & sub noctem amygdal. cum aqua oryza co-

fectum, vt melius dormiret, & minus liquida excerneret. Interea & ad maiorem restrictionem & stomachi roborationem, utebatur etiam sequenti mixtura. *℞. conf. ros. antiqua ℥ j. trochisc. de spodio, cum semin. acetos. ℥ ij. trochisc. de iurabe ℥ j. rob. deribes, syr. de agreste, syrup. menthacei, ana ℥ ℔. misce.* Verum antequam hæc sumeret, cum circa ventrem nō nihil doleret, & tormina experiretur, hoc enema iniectum est. *℞. decoct. hordei comm. torrefacti ℔ j. olei ros. omphacini, sacchar. rub. an. ℥ j. vitellum vnius oui: fiat clyster.* vix tepide iniiciebatur, ac clystere iniecto materia in melius commutata est. Tunc utebamur mixtura supradicta; & linimento sequenti ventriculum inungi curauimus. *℞. olei mastichini, cydonior. myrtini, ana ℥ ℔. pul. ros. rub. mentha sicca, maceratis ana ℥ ℔. cere modicum: fiat linimentum.* Atque hæc valde profuere. Nam hic morbus, curatione statim adhibita, teste Alexandro Tralliano, facile tollitur, postea difficilior; vbi enim inueterauerit, tarde remouetur. Similem fere casum habes apud Amatium Lusitanum de celiaco morbo & *ναυτία* & atrophia *centur. 3. curat. 87.* in quo loco plurima remedia reperies; quam æger ille longiore tempore hoc malo laborauerit; At noster æger statim adhibitis remediis citius conualuit, spatio vndecim dierum. Verum curato vtcunq; celiaco morbo ac fluxu, dolorem & caliditatem circa tenes passus est. Sed facile hoc symptoma repressum cerato infrigidante Galeni lumbis impolito. Verum non diu post pustulæ quoq; obortæ illi sunt circa palatum & linguam; quæ breui tamen hoc collutorio cessarunt. *℞. decoct. hordei comm. aqua plantag. ana ℔ j. semin. cydon. ℥ j. ebulliant leuiter, & colentur, colatura addendo diamori ℥ j. ℔. mellis ros. colat. ℥ ℔. misce.* Sed cum tempus hybernū esset, cum frequenter cogeretur aluum deponere, ex frigore & ventositate dolorem cum torminibus circa hypochondrium sinistrum expertus est; qui tamen mox ablatus, inunctione olei de cappar. anethini, chamæmel. simul commixtis. Sed a celiaco morbo breui curatus, post aliquot dies idem tussim incurrebat: syrup. pectoral. tum ecligmata, ne incideret rursus in morbum celiacum, præscribere non fuimus ausi: sed lacte amygdal. vrentes, cum aqua farfaræ & zacch. parato, vt continuo masticaret glycyrrhizam viridem recentem, a cortice exteriori repurgatam, iussimus. Quibus remediis etiam a tussi liberatus est: & quamquam is diceret se habere contra tussim infallibile remedium, nempe pomum excavatum, melle rosaceo repletum, & parte superiori prius abscissa, & eadem cooperta, supra prunas assum, & sub noctem deuoratum, quo seipsum frequenter a tussi curauerat, nunc tamen eo non vtendum suauimus, ne rursus affectionem celiacam incurreret: & satis amygdalatum sub nocte sumtum ad rem fecit, tam tussi quam celiaco malo conueniens.

SCHOLIA.

COeliaca affectio licet vna cū lienteria, diarrhœa, dysenteria, ad immoderatas alui fluxiones pertineat, tamē cum etiam ad ventriculi affectio-

Contractioni
resistentia.

Ad vigilias.

3.

4.

5.

6.

affectiones, secundum quosdam, referatur, de ea hic dicendum esse putauimus. Quamuis hæc ipsa a lienteria differat, tamen cum eadem sæpe confunditur; & quidam sub vno capite de iisdem tractant, cum iisdem fere remediis curentur. Græcis vero *κοιλιακή*, a Latinis cœliaca seu ventralis affectio dicitur, ab ea quæ afficitur parte nomen assumens, ex Aetii mente cap. 37. lib. 9. Velox quidem est exitus eorum, quæ per os assumuntur; verum non omnino crudorum & incoctorum. Nam in ea affectione solum leuia, & humecta excrementa egerantur, ventre pro imbecillitate ea digerere nequeunte, vt ipse inquit: quapropter nec concoquantur omnino, nec digeruntur alimenta, sed humentia, imperfecteq; cocta redduntur: neque ita celeriter ea, quæ assumpta sunt, in cœliacis, egerantur; quemadmodum in lientericis. Dicitur itaque morbus hic cœliacus, *κοιλιακή* nomine, ventrem siue stomachum significante, in quo potissimum fit: non tamen in claret, *κοιλιακή* apud Hippocratem quandoq; ventriculum, quandoq; vero aluum significare; vnde etiam Amatus testatur, non tam ventriculi passionem, quam gracilium intestinorum esse; & Dn. Fernelius doctissimus inter symptomata intestinorum, non autem ventriculi solum enumerat, cum dicat: Ex imperfecta chyli malag, distributione fieri, quam mesenterii, lienis aut iecoris obstructio, vel trabentis facultatis imbecillitas, vel alimentorum maximeq; fructuum fugacium, & potus immoderata copia peperit: hæc enim distribui tota nequit, sed maxima ex parte in abdomine subsistit. Ab his causis multa congeritur illuies, quæ sensim in tenuioribus intestinis aucta, vel in ventriculo, vel in mesenterio, vel circum viscera tempore corrumpitur. Quumque sua copia grauis esse cœperit, vel sponte infra interdumque supra prorumpit, vel a natura laceffita propellitur; nonnunquam leuissimo clysteris medicamentiue irritamento exit. Et quamquam hic, vti & in lienteria, amborum, nempe ventriculi tum intestinorum, sit affectus, vt etiam docuit Donatus, ex Galen. 6. de loc. affect. & aphor. 12. 4. lib. & ambo sint symptomata in genere noxæ functionum naturalium, retractoris videlicet; in cœliaca tamen diminuta, (in qua cibos non complectitur vsque ad consummatam concoctionem) in lienteria vero abolita est. Qua ratione etiam differunt & inter se communicant. Iam etiam, vt 6. de loc. affect. patet, lienteria seu leuitas intestinorum subito euenire non potest: propterea cœliaca præcedere eam solet; vbi ventriculus frigidior fuerit: leuia autem & humecta excrementa egerantur, ventre præ imbecillitate ea digerere nequeunte: & non cibi crudi, & incocti interne prodeunt in cœliaca affectione, vt Aetio visum est. Sequitur autem cœliacos assidua egestio, aliquando foetida, cum animi deliquii sensu, cibumq; auersantur, ac decolores & vehementer graciles fiunt, vt etiam Paulus testatur. Languida cum fit, & imbecilla ventriculi facultas in cœliacis, nec concoquantur, nec digeruntur alimenta, sed cruda, humentia imperfectaq; redduntur, aluo continentur fluida: quamquam quæ assumpta

sunt (vt paulo antea diximus) non ita celeriter, veluti in intestinorum leuitate, egerantur. Fernelius hæc addit: Pulsus frequens & celer existit, tanquam febris affligeret, & deiectionis leuissimæ animi defectio- nes obrepunt. Ante eruptionem abdomen distenditur, venterq; prominet: hisque succedens spontanea perturbatio, quæ cœliaca affectio est. Ita & Alexander Trallianus. Cœliacus affectus ex ventris ipsius cruditate generatur, dum ipse præ imbecillitate cibum concoquere, & corpori suppeditare nequit. Quare liquida, & non bene concocta, varii coloris, nec non cruenta feces, veluti ex vase distillante per aluum excernuntur. Nihil igitur mirum est, quod sanguis non probe concoctus in ventrem recadat, retentrice facultate amissa, aut vitiosa: vnde longo tempore frequens ventris resolutio, cum assidua deiectione perdurat: corpus extenuatur, vigiliis consumtum: cruditas rosioq; & tormina ventrem affligunt, & cibi fastidium comitatur. Hactenus Alexand. Sed hic sciendum, Cornelium Celsum longe aliter hunc morbum descripsisse, quam nos hactenus fecerimus: cuius & meminit Alexander Benedictus Veronensis, lib. 20. cap. 7. de cœliaco morbo, inquit: Celsus lib. 4. cap. 12. morbum hunc pylori, id est, portonarii proprium esse ait, in quo venter iuduratur, & torminibus premitur, aliusque adeo nihil reddit, vt ne spiritus quidem infra, sed nec supra erumpere possit. Cuius etiam meminit Beniuenius cap. 106. in libello suo de abditis morborum causis, cum Paulum patrem suum clystere ex solo lacte in ventrem iniecto, ac multis subinde strigmentis depositis, ab hoc malo curauerit. Sed hic lector admonendus est, locum illum apud Amatam sub finem scholii curat. 87. centur. 3. mendosum esse; cum dicat, patrem Beniuenii obiisse, quum tamen idem Beniuenius patrem suum ab illo morbo referat a se curatum esse. Ceterum non loquimur de illo cœliaco morbo, sed de eo, qui ad ventriculum pertinet, & subinde ad vtrumque nempe ventriculum & intestina, in quo humida & incocta egerantur. Quæ affectio aliquando cito curatur, & non diu durat. Nam, vt scribit Fernel. aliquando vacuato humore superfluo, profluuium hoc sponte cōquiescit: interdum postero aut tertio die. Attamen, secundum alios, non statim per se desinit, imo diutius durat, & vix remediis cedit: & propterea, si diutius duret ac protrahatur malum, ad magnam omnino desperationem progreditur, agris ad conuenientem diætā pigrescentib. Et si affectus autumnno incipiens ad hyemem vsq; se extendat, difficilius omnino curatur, ex Aetii sententia, præcitato loco. Cum vero inseparabilia symptomata sunt celeris exitus ciborum, (qui ad diminutam concoctionem consequetur, propter iniustum complectendi tempus) deiectionis humiditas, & digestio in corpus diminuta, vt constat ex Galeno, lib. de diff. symptomatum: si eadem cœliaca progreditur, necessario atrophia consequetur, propter diminutam in corpus alimentorum digestionem: quod exemplo sequenti ostendemus. Ideo, vt ex Tralliano prius diximus, morbus hic, curatione initio adhibita, facile tollitur, postea difficilior. Vbi autem inueterauerit, tarde remouetur.

Cœliaca affectio vnde dicta.

Lib. 8. c. 8. de cœliacis ex Philo-
lumen causa
& signa.

10.

Qualitas cœli-
cus morbus
apud Cornelium
Celsum.

11.

Prognost.

OBSERVATIO LI.

De cœliacæ affectione cum Atrophia.

Vir sexagenarius, cum in hyeme paulo diutius cœliaca affectione detineretur, macilentior factus, in consilium cum me vocasset, quibus modis curari posset, animaduerti eundem etiam atrophiam affectum, ob diminutam in corpus alimenterum digestionem. Hic autem liquida subalbida, male cocta, humentia, sed non fœtida, longo tempore deiecerat, unde & cœliacam affectionem esse cognouimus, ex intemperie frigida ventriculi. Totum corpus album erat, quasi cachexia affectum, cum atrophiam, ita ut non nutriretur. Huic autem, cum etiam pituitam in stomacho coaceruasset, consului ut prius cochlearia duo oxymelitis acciperet, ad deterisionem: cumq; nauseabundus esset, eo assumpto leuiter euomit, alioqui dedissem decoctum raphani cum oxymelite. Mox ad pituitam magis digerendam & præparandam imperaui, ut decoctum absinthii & mēthæ sumeret, cum syr. ex absinthio, mentha, melle ros. Postea ad leuem purgationem dedi potionem sequentem. *℞. myrobal. chebul. ʒiij. flor. ros. rub. p.j. absinthii Rom. manip.j. bulliant in aqua communi, & facta express. in ʒiij. dissolue syrup. ex infus. ros. pallid. ʒj. agari-ci trochisc. ʒ. ʒ. fiat potio.* Interea dum hæc operabentur, exterius iussimus ventriculum oleis refocillari, nardino videlicet, mastichino, absynthino, & mēthæ, succida lana exceptis. Mox & scutum apponi iussimus, ex sola mastiche, aliquot guttis olei absynthini adiectis, pistillo calido supra aluram ad scuti formam redacta. Post diem vnum aut alterum similiter imperaui, ut ʒj. theriacæ optimæ acciperet; mane, cum pauco vino astringente. Iussi quoque, ut subinde acciperet diacydon, cum speciebus, præcipue ante cibum, & vesceretur cibis boni succi, pullis columbinis domesticis, ficcedulis, phasianis, turture & cuniculis paruis, & contusum acciperet, & succum ex carnibus prædictis; adiecto aliquo puluisculo ex cinnamomo, caryophyllis, & exiguo croco: & ut etiam in fine Martio pane & pino zaccharato vteretur. Et vinum concessimus rubrum: etiam cynaram cum suo iure, & in fine ut vteretur iis, quæ leuiter urinam cierent. Quibus remediis & hic tandem bene se habuit.

SCHOLIA.

Cœliaca affectio, & lienteria, fere iisdem remediis curantur; quamuis seorsim Trallianus de cœliacorum curatione, ex Philumeno scripserit. Is in potu dat *radicis quinque folii decoctum, & rubi radicis similiter, nec non salicis arboris*; hæc in calida intemperie magis conferunt, uti & *syrup. myrt. de ribes, ex succo cichorii; coroneorum, oxycacchar. cum decocto acetosæ.* sed & leuis purgatio ex *myrobal. citrinis, thamarindis, vel syrup. ex infus. ros. pallidar. cum rhabarb.* Idque in principio, quando vires nō sunt deiectæ. Deinde astringentia adhibenda, ut *semen plantag.* Valet egregie, iuxta Aetium, & Paulum, gallinarum ventriculus desiccatus ac tritus, & potui inspersus, nec non apii, fœniculi, anisi decoctum, & eodem

tempore, quæ urinam ciunt: sed eorum quantitas minor esse debet, nec eorum usus largus commendatur; sed & vomitus, si in ventriculo humores collecti, modo ad vomitum prouincunt; alioqui minus prouocandus. Deinde topica adstringentia adhibenda. & cerata, & saccelli, ut de vomitu bilioso diximus. Si simplex sit intemperies sine humore, prædicta conueniunt, excepta purgatione. Si ex frigida intemperie, curationem præcedente obseruatione iam diximus. Cum autem eodem medicationis ductu utendum sit in leuitate intestinorum ac in lienteria, quod ad cœliacos & dysentericos (ut Aetius refert) propterea quæ auctores scribunt, de vnius curatione, etiam alterius subintelligenda erunt. Quamobrem complura remedia ponemus de curatione lienteriae, cum de Alui profluuiis quoque agemus. Hæc de cœliaco affectu, qui etiam ad stomachum pertinebat, dicta satis esse puto. Si plura & veterum remedia desideres, illa ipsa tū reliqua videas apud Trallianum, lib. 8. cap. 8. de cœliacis, quæ ex Philumeno excerpfit. Et ita stomachi ac ventriculi malis absolutis, huic libro finem imponentes, ad iecoris mala transeamus.

Finis Libri XVIII.

LIBER DECIMVS-
NONVS.DE HEPATIS MALIS AC
Aff. etibus.

OBSERVATIO I.

De calido imbecillo hepate.

IR quidam, qui ex iecore calido & imbecillo laborabat, cum pauper esset, ad nosocomiū Delphenicū deferrebat; ad quē acciti sumus. Huic cibi nullum desiderium aderat; siti infestabatur, urinā fuluā lōgo tempore (ut narrabat) minxerat, & biliosa subinde euomuerat; fereq; cum pulsum attingere febriebar. Unde tandem iecore contabescente, humores eidem colliquebantur; mox & ipsius visceris carnes: bilemque crassam, grauiter olētem, valideq; coloratam, per alium deiciebat, & febris tunc adaucta fuit. Quæ, inquam, omnia ad calidi distemperamentum notas referuntur, & ad habitudinem iecoris corruptam, eiusque magnam imbecillitatem, morbo iam magis confirmato. Nam quoque simile quid loturæ recentis carnis deiciebat: unde & tabe conficiebatur. Venit mihi tūc in mentem Pauli dictum: *Si iecur (inquit) contabescit, vniuersum tabe conficitur corpus: febris exastuat, cibi radio elanguescit, bilem euomit.* Sic cum stomacho incolumi humida ac liquida recrementa sunt: egre decoquente iocinore vires eius infirmas esse diiudicari necesse est. Si vero loturæ recentis carnis simile est, quod effunditur, commutatricem vim ad sanguinis generandi munus inualidam esse haud dubium est. Cū itaq; huic hepar calidū esset, ideo calida vitæda pposuimus; qualia sunt loca æstiosa, ignis, multaq; vestimēta, & vestes pellib. subsumptæ. Sed illa vltima minus imperaui, cum additiones

tiores pertineant. Concessi refrigerantia: vt ex herbis, *oxalida*, *lactucam*, *portulacam*, *intybum*, ex fructibus *cerasa non dulcia*: a prunis abstinuimus, cum aluum satis fluidam haberet. Animi perturbationes, iram, furorem, mœrorem, exercitia interdiximus; vigilas, edulia actu calida, viscosa, crassæ materiæ (*qua maxime nocent, cum illi optime iecori consulant, qui poros aperiant*:) qua etiam de causâ, lactaria, mellaria & aromata omnia damnauimus. Et inter obsonia bubulam, carnemq; hircinam, & ouillam, agninam, arietinam; & inter pisces quicquid sine squama est, quales sunt anguillæ, murænæ, ac congridi: oua etiam dura tosta & omnia pingua, vinumq; dulce & mustum: famem quoque, cum ea corpus inflammer: & inter cibaria cucumeres; & aquosa omnia & putredini obnoxia. Iecinora inter cibos laudauimus, vt sunt pulli gallinacei, auiculæ: & perdices, atagenes, phasianosq; commendauimus: sed quia pauper erat, contenti fuimus cuniculis, & similibus, atq; alaudis, & turture. Et quia ex calida intemperie hic affectus hepaticus erat, aerem quoque elegimus ad frigidum vergentem: & somnū moderatum atq; nocturnum, & quietem imperauimus. Et cum in vniuersum cibi mediocriter refrigerantes & minime obstruentes, teste Paulo, sint eligendi, quiq; probe distribuuntur, & robur temperiemq; inducunt, & vim abstergerendi viscera, aperiendiq; efficaciam habent; aliqui hic commendant ptisanam, & eius cremorem, seridem & cichoriū, modo crudum, modo coctum cum coriandro assumptum: etiam succus ipsius epotus, calidis & frigidis iecinoris vitiis opitulatur. Interea multa iura & pingua detestanda. Saxatiles pisces concessimus, & cotonea, & malorum punicorum grana, ante cibum, cum pane, & pyra astringentia, & vuas passas, ex Galeno. A vino abstinuimus, ob febrem: tamen dilutum aliquando & *ὀλίγη ποσὶν*, ex Paulo (*si adsit magna stomachi imbecillitas*) datur. Sed quia hic erat pauper, ceruissam chalybeatam, ob fluxum dedimus: modo etiam ob febrem aquam hordei, cum succo punicorum: aliquando & eam, in qua cichorium aut seris incocta erant; adiectis coriandi seminibus præparatis. Potiones vero, quod ad medicamenta attinet, viles duximus refrigerantes, detergentes, leuiter aperientes, & adstringentes; vt decoctum seridis, cum syr. de end. ex ros. siccis, adiectis santalis & diatrion. san. & proleui expurgatione rhabar. modo in infus. modo in substantia, cum decocto end. scariolæ, cichor. & syr. de portul. de limonibus acetos. citri, de granatis, oxyzacch. etiam acetosam, lactucam, portulacam in iure carniū decoximus. Cū autem male hepar inunxisset, ex empirici consilio, oleo laurino & aliis calidis remediis, cumque etiam dolorem aliquem in regione hepatis sentiret; eo relicto statim nos inunximus cum vng. santalino, & epithema imposuimus, vel huius æmulum, ex aqua plantag. solatri, acetosæ, endiu. cum aceto & santalis. Postea cum & fluxus adesset, constringentibus vti sumus, vt ros. siccis, eiusque syrup. & de portul. valet etiam syrup. de agre-

sta cum supradictis parum aperientibus & refrigerantibus. Hepar quoq; inunximus vng. ros. & santalino simul mixtis. Quibus hic postea bene habere cœpit. Verum, pro dolor, magistris nosocomii non admittentib. amplius vltiorem curationem, cum viderent magnos sumtus, & quod non statim perfecte curaretur, ab omnibus remediis cessatū est: ita vt postea hepate contabescente hic æger quoq; contabuerit. Et tandem fere per annum aut plures menses in nosocomio manens sine remediis, mortuus est. Neq; mirum, cū huius affectionis, curatio haud quaquam despicienda sit: quoniam nonnulli, propter curandi incertiam (*vt Gal. inquit 4. de artic. perierunt*. Nā & hic in principio perperam ab empiricis fuit tractatus. Quomodo autem in causâ fuere medici, vt ægri morerentur, ibidem declarauit Gal. Hic autem ex calida intemperie, iecinoris imbecillitas fiebat: quæ rite curari debet: nam temporis spatio colliquationes ex ea fiunt, primum humorum, deinde etiam carnis ipsius hepatis; quinimo totum corpus absumitur, *vt ex Gal. & Paulo liquet*. Iecore enim, quod membrum naturalium regimen possidet, cuncta animalia viuunt. Propterea de eius affectibus sollicitus admodum medicus esse debet: Sanitas enim magna ex parte (*vt Hippocr. docet*) ex iecoris bona valetudine constat. Quod si negligitur, facile periclitatur homo. Atque ita hic æger, cum prius in manus empiricorum incidisset, postea curari non potuit.

S C H O L I A.

Quod iecur sit principale membrum, quodque eius sit officium, satis abunde diximus in præfatione huius libri, & in libr. nostris de incertis pri-narum iudicio: cum hoc viscus vniuerso corpori (*vt sanguificationis organum*) alimentum præbeat. Ideo multis vitiis excruciat, simplicis aut compositæ primum habitudinis distemperamento: vel naturali simplici, vel pariter composito. Hinc intemperies tum simplex, tum ex humorum vitio, substantiæ corruptela, obstructio, scirrhus, inflammatio, abscessus, vlcus. Hepatici vero seu iecinorosi, non vt veteribus, qui hepatis inflam-matione laborât, dicuntur: sed cum citra manifestum aliquem illius affectum imbecillitas sola acciderit ex intemperie. Hos enim pprie iecinorosos seu hepaticos medici nominare consueuerunt: quando videlicet citra aliq. manifestum in viscere malum, in propriis actionibus debilitatur, *vt liquet ex Gal. 5. de loc. affect. & 8. de compos. medic. secundum locos & 3. de causis symptom. quem & sectari sunt Paul. lib. 3. cap. 40. & Aetius lib. 10. cap. 1. & Alexand. lib. 8. cap. 3.* Iecur hic læsum est, vt ex lotura carniū cruentarum liquet apud eosdem auctores locis iam dictis. Estq; symptoma in genere noxæ functionum naturalium, alteratricis scilicet: ac magis speciatim sanguificæ ipsius iecinoris, quæ nō ablata est, sed diminuta ac imbecilla. Atq; eius imbecillitatis causâ quæuis intemperies esse poterit, vel calida, cuius signa iam ex parte diximus in obseru. præcedente: vel frigida, de qua obseruatione sequenti dicemus. Ceterum quod ad calidam

Hepatici, qui
ita appellantur,
& iecinorosi.

7.
Part. affecta
& affectus.

*Causa.**Signa calida
intemperiei.*

8.

Prognostica.

9.

Curatio.

10.

intemperiem attinet, ea ipsa fit ex cibis & potionibus calidis, & eorum conditis; & postea augetur ex præsencia biliosi humoris irrigantis carnem & venarum tunicas. Signa habentur calidæ intemperiei ex obs. prædicta, etiam ex colore totius corporis valde citrino, & bili attestante: nam & oculorum alba quandoq; pallescunt: estq; urina pallida, flava, & mordax, si ieiunarint, & ictericorum similis, bile tincta. Habitus illorum gracilis est: sitis adest ob stomachi consensum; & corporis tactus calidus. Et si plurimum excefferint colliquationes iam dictæ biliosæ, crassæ, fœtidæ, genitæ ex sanguinis adustione, tum in iecinore cõtenti, tum in mesenterio, *vt 5. de loc. affect. 9.* mox caro colliquatur ex multo calore. Adest cruenta egestio, & colliquationes, vt in febr. pestilentib. & inappetentia febris, & fumorum vitiosorum vomitus, (*8. de comp. med. secund. loc. & 5. de loc. aff.*) vel æruginosus, & similes deiectiones: lingua scabra, corpus siccum, & gracile, iecore colliquescente; & incruenta sanies, contabescente. Et temporis spatio ex ipsa substantia tandem particulæ longe fœtidissimæ decernuntur, *teste Alexand. c. 3. lib. 8.* Sed & ex temperamento ægri, ætate, anni tempore, & prægresso victu, reliqua innotescunt: nam temperamento calidi sunt, & tenues habitu, pilosque densos habent, curis dediti, & animo iracundi. Prognostica etiam diximus in fine obseru. licet periculum ex affectus magnitudine iudicatur. Magnitudo vero affectus cognoscitur, primo ex magnitudine symptomatum: secundo ex diuturnitate, tertio ex eo, quod remediis rite adhibitis non cedit.

Transit autem in hydropem, aut in febrem tabidam, quando cum calore viscus etiam siccus euadit. Curatio vero calidæ intemperiei facile constat ex obseruat. dicta, cui adiungere posses exemplum puellæ Lucensis curatæ a Iacchino. In ea primum erat intemperies calida; cuius ratione hepatica dicebatur. Erat extenuatio, qua in tabem tendere videbatur. Aderat & siccitas solidorum, quæ incrementum corporis tardabat. Cui tamen succurri non poterat; attamen prohibere eius augmentum opus erat, vnde minus incrementum corporis impediretur: erat enim in media adolescentia. Necesse itaque erat, vt in complicito affectu, ad id, quod causa erat, maxime spectaret: nam sine eius sanatione, neque alterum sanari poterat, id erat intemperies calida & sicca: in cuius sanatione, ex longitudine affectus verisimile erat aceruata esse excrementa biliosa, & id omnia restabantur. Ideo cœpit primum vacuationem moliri medicamento, quod minime excalfaceret: cuiusmodi fuit aqua Villica, quam septies propinavit, ea ratione, qua docuit aquas propinari solere. A purgatione ad alterationem transiuit, succis herbæ cichorii vtens, *ex Gal. 8. comp. med. secund. locos;* quos succos cum modico zacchar. per 10. dies illi dedit, quousque caloris signa remittebantur. Optima victus ratione utebatur, refrigerante, oxalide, lactuca, portulaca, intybo, & ex fructibus, prunis, cerasis: euitando salsa, dulcia & pingua. Exterius etiam cataplasma imposuit, ex

farina hordei, & succis supradictis: vel epithemate eiusdem generis vsus est, ac illinitione ex cerato santalino dicto, aut cerato simplici Gal. Demum ad extenuationem curandam, accessit ad lactis potionem, cuius vsus antea docuimus. Atque his adeo profecit, vt non modo carne repleretur, sed colorem supra, quam credi potest, mutaret ad melius. Reliquum curationis vide apud Gal. Paul. Aet. & Alexan. locis citatis. Nunc exemplum frigidæ intemperiei proferamus.

OBSERVATIO II.

*De frigida hepatis intemperie, cum eiusdem
imbecillitate.*

Vir quidam post longam & largam sanguinis fluxionem e naribus, totum habitum refrigeratum habebat: vnde & iecur multum pituitæ contraxerat; corpus tactu frigidum & subhumidum erat: facies etiam ei albida euaserat, & intumescens. Et cum pauper esset, aquæ frigidæ potu intempestiuo vsus fuerat, tum cibis frigidioribus: quæ omnia temperiem frigidam indicabant, & eam auxerant: urinae tenues & albæ procedebant. Cruda quoque per aluum deiciebat, post longam excrementorum retentionem: verum non valde olida, at debito liquidiora. Sed non adeo ac priori erant assidue excretiones, neque ita multæ: durabat tamen hic affectus diutius: Deinde per aliquod dies venter maiori copia pfluabat. In fine minus graueolentia excernebat, speciem putrefacti sanguinis non colliquati habentia: & quod excernebat, veluti sanguis niger apparebat; quamuis tamen diligenter consideranti non niger erat sanguis, neq; grumus, sed velut limus quidam sanguinis crassi, prope ad atram bilē accedens. Id vero, quod ad ipsum iecur prius ferebatur, pituitosum & crudum ac semicoctum efficiebat. Neque facies ita in eo collabebatur, quamuis febris subinde languida apparebat; temperamento ipsius corporis ad frigidius inclinante; victu nimirum frigidioris præcedente, ac vita otiosa. Hæc cum animaduertirem, vt in aere calido tum cubili sublimi versaretur consului, & omni victus genere calidiusculo cibisq; coctu facilibus & boni nutrimenti vteretur. Paulus & Alexander panem cum vino assum sumere laudant: & idem Alexander ex olerib. brassicam, bis terue coctam, cum iure gallinarum, sternorum, aut turdorum: & auiculas iptas paruas, & anserum ventriculos; in quarum carniū iure serpillum, satuirea, hyssopum, fœniculum, samsucus, oreoselinum & similia incocta sint, laudat. Possunt & iura cinamomo & caryophyllis condiri. Interea assas carnes comedendas proposuimus, si dictas fastidiret. Verum cum & hic pauper esset, simplicem victum eumque calfacientem instituiimus, & medicamento sum: ita vt apio, nasturtio, mentha, salvia, semine apii, petros. anisi, & similibus in cibis vteretur, mandauimus: & zincibere, croco, galanga maiore, & inter herbas etiam melissa & absynthio, & multa brassica cum cymino, & quæ calida sunt & tenuium partium. Quæ obstruunt frigida sunt. Vix enim reperies insignem frigiditatem hepatis, sine aliqua obstructione. Ob id quæ

Signa frigida
intemperiei.7.
Prognostical8.
Curatio.

9.

quæ tenuinum sunt partium, conueniunt, quia aperiunt, & ab obstructionibus liberant. Ideo & ciceris rubei ac atrius dedi, etiam passulas, quæ efficaciter iecur iuuant: idq; in prima & secunda mensura. Quidam & hic cochleas in cibo cum aromate, & vinum generosum dant, sed optimum est tenue ac parum dilutum. Sed quia hic pauper erat, ceruissiam absinthiten concessi. Et quia hæc intemperies etiam pituitam admixtâ habebat, ex causa frigida, ideo dedi decoctum sequens, loco iulebi.

℞. decoctionis absinthii, agrimonie, centaurii minoris, cassute, end. ℥j. syrup. de eupatorio, absinthii, ana ℥j. ℞. syrup. de end. oxymellis compos. ana ℥j. ℞. misce pro quatuor dosibus. Deinde dedi hanc purgationem.

℞. folior. senæ ℥vj. agarici femin. albi ℥j. ℞. zinzib. albi ℥j. sem. anisi, fœniculi, ana ℥j. infunde per noctem in decoct. absinthii, marrubii, centaurii, capill. vener. schœnanthi ℥ix. & facta express. huius accipe ℥vj. addendo syrup. de eupator. ℥ij. misce. fiat potio pro ij. dosibus matutinis. Verum postea cum excrementa satis aquosa redderet, abstinuimus a purgantibus: sed de obstruentibus utebamur, & quæ materiam per vrinas deducerent; hoc vel simili modo.

℞. rad. fœniculi, petroselini: asparagi, ana ℥j. capill. vener. polytrichi, marrubii, absinthii, centaurii, ana man. j. schœnanthi, rad. cyperii, ana ℥ij. semin. anisi, apii, cymini, ana ℥ij. fiat decoct. in aqua communi & vino tenui. In fine post colaturam adde syrup. de byzanthiis ℥ij. fiat potio pro ij. dosibus. Postea ad maiorem roborationem adiecimus ros. rub. & spicam & absinthium, & exhibuimus dialaccam, diacurcumā, dianisum, aromaticum ros. rosat. nouell. & condita in hunc modum vel similem descripta.

℞. conferu. flor. rorismar. ℥j. conferu. absinthii vtriusq; an. ℥ij. corticum citri conditi ℥j. iecoris lupi exsiccati ℥j. specier. diacrod. abb. diagal. ana ℥j. trochisc. de absinthio ℥j. vuar. passul. contusarum, ab arillis repurg. ℥j. semin. anisi ℥j. cum syrup. de eupat. fiat mixtura seu conditum. Exteriori vti sumus hoc vel simili foru.

℞. folior. agrim. marrubii, absinthii, ana m. j. florum chamom. p. j. spica nardi, schœnanth. ana ℥ij. rorismarini m. ℞. cum vino & aqua coctis partibus aequalibus, fiat forus hypochondrii dextri. Deinde inungatur hoc vnguen.

℞. olei nardini, absinthii, mastichini, an. ℥j. olei ros. ℥ij. spicanardi Celtici, caryophyl. schœnanthi, an. ℥j. succi eupatorii ℥j. aceti & cera parum: fiat vnguent. vel loco aceti adde parum vini cum inunctio fit. Atque his remediis optime se habuit.

S C H O L I A.

6.
Causa frigida
intemperies
coru.

Frigida hæc intemperies fit plerumque vsu rerum frigidarum, vt intempestiua aquæ frigida potione (vt huic viro contigit) aut nimio rerum frigidarum vsu, intus vel extra: post longam & largam sanguinis fluxionem, tam per vterū, quam per hæmorrhoides, quemadmodum & huic pauperi euenit, sanguine supra modum e naribus effluxo. Ita & cuidam consuli Geertrudebergenfi, dum hæc transcriberem, accidit: qui non solum in iecoris imbecillitatem ex frigida causa incidit, verum etiam in totius corporis malum habitum & cachexiam. Quæ quidē sanguinis fluxio totum

habitum refrigerat & potissimum iecur. Signa vero intemperiei frigida hepatis iam ex parte diximus Obser. iam dicta, quæ calidæ contraria sunt. Pendent autem omnia ex mala concoctione sanguinis, vt tactus corporis frigidus, & corporis albedo totius, & œdemata, & pituitosa febres, & tumida sæpe facies, præsertim oculi & crura, vrinae tenues, albæ: excrementa per aluum cruda, valde liquida, aquosa, & non solida, ventrisque profluvium certis temporibus. Et huius frigida intemperiei curatio non minoris facienda est, quam calida: nam tractu temporis corruptio etiam in viscere sanguine, febris superuenire solet; quæ tamen ab imperitis medicis vsque adeo negligitur, vt laborantem interdū nequaquam febricitare putent: quinimo si vltro ea intemperies frigida augeatur, permurabitur ad aliquam intercutem, quemadmodum Galen. docuit s. de loc. affect. Et quouis modo antiqua debilitas hepatis, difficilime emendatur, temporeque aut in malum corporis habitus, vnde debilitas totius corporis fit, aut in hydropem vertitur, potissimum si frigida intemperie ortum habeat. Frequenter quoque contingit in hac iecoris imbecillitate (vt longa experientia vidimus) sanguinem vltro e naribus profundi: aliquando id fit per vterum, interdum vero per hæmorrhoides, nonnūquam etiam per vrinarios meatus, vt aliquando quoque spectauimus. Ideo & hepatici ex frigida causa diligenter etiam curandi sunt. Curatur autem hæc intemperies frigida iisdem fere remediis, secundum aliquos, quibus ventriculus ipse imbecillus ex intemperie frigida: quin & breui persistere non potest, quin habeat adiunctam humiditatem. Sæpius vero & humores obstruentes adstant, geniti ob vitiata concoctionem: vnde remediis obstructioni dicatis egebit. Transit autem hæc in hydropem, vt diximus: quamobrem vbi corpus expurgaueris per agarici potionē, hieram, diaphœnicū, victus rationem ad calidū inclinante institues, & siccantem, si multa humiditas iam sit iuncta: cibos exhibebis actū & potestate calidos & potiones, tū natura, tū conditura. Mox & medicamenta propinabis magna, ex his quæ sæpius diximus, theriacem mane ad ℥j. & dialaccam & diacurcumā. Extrinsecus vero adhibebis vnguenta ex nardino oleo & speciebus diamosci. Demum aromata omnia, quomodocunque corpori applicata, hanc sanant intemperiem: præcipue vero, quæ & astrictione participant, vt macer, nux muscata, caryophyllum. Expedit & his ob excrementorum copiam continue offerri, quæ vrinas mouent (de quibus dictum est in obseru. præcedente) atque in exercitatione, regionis mutatione, negotiosa vita, curam omnem reliquam constituere. Probatum maxime cypheos compositio, ab Andromacho descripta. Reliqua vide apud Galen. Paulum & Aerium & Donatum. Præter olea, cerata, vnguenta, extrinsecus admota, valent & intra confectiones aromaticæ, vt arom. ros. diagal. caryoph. cum conferuis, ad modum opiata: superbibendo parum vini diluti aqua absinthii, vel marrubii, vel betonica. Hæc intemperiem castigare poterunt, & imbecillitatem,

Ad humidam
intemperiem.

10.

Ad siccam in-
temperiem.

quæ ab intemperie frigida sit. Eadem etiam humi-
dam intemperiem castigant. Hæc autem his no-
tis cognoscitur. Sitim nullam adfert, linguæ adest
humiditas, vultus totumque corpus non ita collabi-
tur, sed tumidum atque pituitosum apparet, tum ex-
crementa, deiectionesque aquosiores. Hic tamen
augenda est dosis resiccantium, ut si antispasmodicum
opiata addatur, ex spongia bedegari, vel cornucervi, vel
intestinis gallinae & lupi, vel ex corallo aut ebore. Vi-
ctusque ratio magis exsiccans hic esse debet: tum
ea danda, quæ ad hydropem (in quam facile muta-
tur) valent. Si sicca sit intemperies (licet rarius eue-
niat) recrementa sicciora erunt, corpusque siccius &
tenuius: sitis aderit; & deiectiones alui paucae &
crassiores apparebunt. Hæc autem difficile curatur:
nam difficile est rem siccam humectare; tum quia
quæ agunt, debilia sunt; & quæ patiuntur, multum
resistunt: partes quoque exsiccatae concidunt den-
sioresque redduntur: & medicamenta non possunt
penetrare, ob imbecillitatem facultatum natura-
lium, & maxime concoctionis in substantia mem-
brorum solidorum: ideo & in marasum, vitium
irremediabile, incurrunt. Ne igitur radices agat,
cibis humectantibus curabitur, lacte, butyro, vitellis
ovorum, vino, succo carniū, ptisana, lacte amygdalarum
& inunctionibus. Atque tales regendi, ut de hectica, ma-
rasmo & tabe diximus. Ad quæ loca lectorem re-
legamus. Ceterum simplex intemperies diu sola
non consistit, quin breui post tempore humoris
vitium accersat: sic calida bilem, & frigida pitui-
tam. Ideo & horum humorum respectus habendus,
ut iam saepe ostensum est.

OBSERVATIO III.

De hepatico seu iocinoroso, ab empirico quodam pro
pleuritico perperam iudicato.

1.

Ioannes Petri, cognomento Rex, qui Alcm-
riæ in Aggeris via prope pontem habitabat, cum
duobus fere mensibus ex hepatis calida satis in-
temperie cum obstructione quadam tum inflam-
matione, attamen non vehementi, tendente ad
apostema, cum dolore eiusdem ac imbecillitate,
laborasset, ad eum prius vocatus sum sub finem
mensis Iun. anno 1553, in lecto decumbentem, &
antea a quodam empirico pro pleuritico habitum,
& longo tempore male curatum, sanguine qui-
dem demisso, at aliis perperam medicamentis ad-
hibitis. Ad eum ingressus, reperi eundem ad ex-
tremam debilitatem devenisse, ac ab astantibus
amicis tunc pro deplorato habitum: qui me tunc
prius accersiri, tum vxor, iusserunt. Ad quem dili-
genter respiciens, inveni hominem ex continuo
dolore vigiliisque adeo debilitatum, viribusque
consumptum, ut ossa tantum restare viderentur.
Aderat enim dolor in hypochondrio dextro, qui
aliquando ad diaphragma, aliquando ad ventri-
culum extendebatur. Et quantum ex signis præ-
sentibus colligere potui, hominem non pleuriti-
cum, sed iocinorosum iudicavi, non sine inflam-
matione, una cum obstructione & hepatis calidi-
tate & imbecillitate ad apostema quasi tendente.
Aderant enim vigilæ; & successit ventriculi de-
bilitas, postea etiam aliqualis lienis durities; to-

tumque corpus macilentum euadebat: hoc est, &
paulo antea ex Aegineta diximus. Si iecur contabe-
scit, universum tabe conficitur corpus: febris exasuat
ager, cibi radio languescit: quæ inquam omnia huic
aderant, quamvis febris lenta erat, quasi hectica
consumens totum corpus. Pro variis accidentibus
varia conscripsimus. Pro vigiliis tempora hoc li-
nimento iungi iussimus. ℞. vnguent. popul. olei
mandrag. papau. an. ℥. ℥. opii thebaici ℥j. croci gr. iij. ce-
ra q. s. fiat linimentum. Interim pro hepatis obstru-
ctione, inflammatione, & pro vigiliis, bis in die
ex sequenti decocto bibebat. ℞. cuborii cum rad.
dentis leonis, cum rad. acetosæ, end. fumaria, lactuca no-
uella, viol. ana m. j. agrimonia, capill. ven. anethi viridis,
ana m. ℥. sem. quat. frig. maior. ana ℥j. semin. anethi,
portulacæ, ana ℥. ℥. glycyrr. ras. ℥. iij. fiat decoctio in aqua
commun. pro ℥. j. ℥. colatura, adde syr. de cichor. Nicolæ
cum rhaz. syr. de end. ana ℥j. syr. viol. papau. borag. an.
℥. ℥. arom. cum ℥. ℥. spec. diarod. abb. & gr. v. trochisc. de
rhabar. fiat clareti instar pro iulab. Et cum cyathum
vnum bibisset, capiebat ℥. iij. specier. trionsan. & dia-
rod. abb. confecti cum aqua end. adiecto zaccb. ut artus est
in tabulis. Pro dolore utebatur hoc forum, tam in re-
gione hepatis quam diaphragmatis & ventris. ℞.
folior. malvæ. (quia circa hepar & loca dicta erat
quædam durities & tensio) m. j. folior. viol. man. ℥.
flor. ros. rub. florum anethi seu summitatum eius, sum-
mitatum absinthii, florum meliloti, chamomil. ana p. j.
fiat decoct. in aqua commun. pro ℥. j. ℥. in fine addendo
acetum optimi & vini Rhemensis, ana ℥. iij. specier. trionsan.
℥. j. ℥. misce, pro fotu. Mox inungebatur vnguent.
sequente. ℞. vnguent. alabastr. olei ros. coron. an. ℥. ℥.
misce. Post forum & inunctionem dolor sedatus
est, potissimum in diaphragmate & ventriculo, &
in hypochondrio dextro: ita ut postea melius dor-
mire potuerit. Postea ad maiorem hepatis & ven-
triculi roborationem. Ex condito sequenti ute-
batur. ℞. conserua capill. vener. ℥. ℥. succi intybi seu
seridis ℥. ℥. conserua. nenupharu (ad maiorem altera-
tionem & refrigerationem hepatis) conserua bu-
gloss. ana ℥. ℥. conserua. ros. flor. cichorii, ana ℥. iij. corti-
cum citri conditi ℥. ℥. zaccbar. ros. perlari ℥. v. spec. dia-
rod. abb. trionsan. an. ℥. ℥. cum syrup. de succo cichor. & ros.
fiat conditum. Postea etiam eodem usus est, adie-
cta conserua. viol. ℥. ℥. & specier. arom. ros. ℥. j. cum
syrup. menthaceo. Et ventriculus inungebatur oleo
mastic. cotoneor. & myrteo. Dedimus prius ℥. j.
rhab. in substantia: nam alia purgatione uti nolui-
mus, cum hic satis per se aluum fluentem (ut he-
patici solent) haberet, & sæpe biliosa male olentia
deiceret. Post aliquod tempus manifeste senti-
re potuimus duritiem quandam in hepate, in-
flatione pedum non diu subsequente: ideo &
de apostemate & scirrho merus erat. Sed loco
dolente inuncto, haud exiguum leuamen sub-
sequutum est, ut plurimum adhuc de eius salu-
te sperauerimus. Linimentum tale erat. ℞. em-
plastri de meliloto ℥. ℥. olei cotoneor. amygdal. amar.
ana ℥. iij. vnguenti santalini (ob intemperiem cali-
dam hepatis & imbecillitatem) ℥. iij. gummi ammo-
niaci in aceto soluti ℥. j. ℥. misce. fiat linimentum. Ute-
batur & his tabulis, cum maximo commodo.
℞. be-

8.

5.

*℞. hepatis lupi incisi & contriti ℥j. ℞. specier. diarod. abb. specier. diatr. frigid. ana ℥℞. pul. rhab. optimi, amomiaci in aceto dissoluti ana gr. iij. dissoluatur hæc in decoct. cuscute, capill. vener. cum aqua fœniculi, bugloss. scabiosa, lupul. adiciendo zaccb. q. s. fiat confectio in rotulis, ponderantibus ℥ iij. miraculose contulit; etiam in iisdem illis aquis hepate lupi bullito & expresso. Veteres dabant ℥j. hepatis lupi in puluere, cum vino dulci, sine febre; alioqui cum succo seridis, vel cum aqua calida: nos commodè cum aquis dictis propinauimus. Nam & Galenus iecur lupinum medicamento ex eupatorio indidit, vt ii. de med. simpl. quanquam & eo solo vtitur 8. & 6. de compos. medic. secundum locos. Sua proprietate efficax est medicamentum, ex Asclepiade. At cum hoc electuario, tum linimento, aliquo tempore vteretur, dolor omnis in hypochondrio dextro cessauit, & durities simul euauit. Quamuis paulo post conquestus est de lienis duritie & obstructione: quæ tamen symptomata sola inunctione olei de capparibus mox cessarunt. Sed in conualescentia pedes cum inflati manerent, decocto sequenti adhuc utebatur: *℞. agrimonie, ceterach, scolopend. ana m. j. decoqueb. in aqua & vino Rhenensi, & colatura expressa zaccbaro dulcorata*, utebatur bis atq; ter in die, maximo suo commodo. Similiter & condito sequenti, omni mane ad castaneæ magnitudinem: *℞. conseru. flor. roris marini ℥. ij. conserua buglossæ ℥. ℞. rad. sax. frag. condita ℥. ℞. corticum arantior. condit. & citri ana ℥ ij. ℞. trochisc. de cappar. ℥. ℞. specier. dialacca ℥ ij. specier. diarod. abb. ℥ j. ℞. cum syr. de cichor. & oxymel. simplic. q. s. fiat conditum.* Pedes inflatos fomentarij imperauimus, qui œdematosi videbantur, cum aqua marina. Quæ ablutione, lotionem ac foru subliderunt: ita vt pristinam valitudinem peruenerit. Interim pro colophone totius curationis etiam his tabulis utebamur: *℞. specier. diarod. abbat. trochisc. de capparibus ana ℥ ℞. specier. dialacca ℥ ℞. dissolutis in aqua agrimonie, cichorii & sumaria ac fœniculi, adiecto zaccb. q. s. fiat confectio in tabul. dos. ℥ ij. quibus vtens, quotidie fecesum habuit. Et iecore imbecillo restaurato cœpit indies magis magisque conualescere, etiam carne accrescente: ita, vt dictis remediis, post diurnas afflictiones, pro deplorato habitus, magna cum nostra industria, laude Diuina & Dei ope, cum multorum admiratione sanatus fuerit.**

S C H O L I A.

7.

Cum hunc ægrum præ manibus haberem, venit mihi in mentem historia illa Siculi medici decumbentis, qui se ipsum iecinorosum, tum alij medici perperam pleuriticum iudicabant, apud Galen. lib. 5. de loc. affect. cap. 7. cum Galen. vna cum Glaucone post alium medicum ad illum ingressus, inflammatione iecoris laborare, eundem iudicabat. Similis quoque historia etiam narratur a Beniuenio, de abditis causis morborum cap. 75. de Antonio Brunellesco, a priore medico iudicato pleuritico, cum malum in iecinore esset, cum inflammatione, ab eodem Beniuenio recte curato. In quo vehemens dolor a latere dextro in

iugulum humerumq; transmitteretur: & bilem quoque euomebat æger, quem & singultus pene strangulabat. Verum cum huiusmodi vitii notæ eadem fere sint, quæ & lateris abscessum indicant, medicus cui primum cura demandata fuerat, eum curabat vt pleuriticum (vt noster empiricus;) Sed cum iecoris vitio laboraret, aliter eundem curauit Beniuenius; quemadmodum & nos hunc ægrum restitui-mus. Oportet igitur medicum non solum morbum cognoscere, sed & locum etiam in quo sit, diligentius perscrutari, vt huic commoda medicamenta apponantur, & vt tales non vt pleuritici, sed iecinorosi recte curentur, adhibitis iis quæ ad hepaticos vel etiam inflammationem iecoris (si adsit) conueniant, in quibus etiam canones auctorum obseruandi, de quibus docte & egregie scripsit Arculanus. Ceterum quia frequens affectus etiam huius visceris est obstructio, ob multas causas vt postea dicemus, ideo huius exemplum vnum nunc adferemus.

O B S E R V A T I O I V.

De obstructione hepatis, ex flatibus crassis.

Scribit Galenus lib. 5. De locis affectis, non solum a crassis humoribus iecinoris obstructionem fieri, verum etiam halituoso quoque spiritu ibi concluso, cui non pateat exitus. Quod & Aet. confirmauit libr. 10. cap. 2. cum dicat, iecinoris oppilationes fieri a flatibus nebulosis & concoctis difficilibus. Et sic secundum Galen. & Aetium dignoscitur hæc obstructio, cum vaporosi & crassi flatibus multitudo coaceruatur, quæ exitum non habet: quoniam non grauitatis solum, sed etiam distensionis sensum sentiunt laborantes. Sic istis diebus vir in platea Flandrica habitans, insignem dolorem vna cum tensione patiebatur in hypochondrio dextro, cum tempore vteret iter fecisset, & flatulentis cibis usus esset. Cum nulla febris adesset, huic dedi decoctum florum chamomillæ, seminis anisi & fœnic. cum vino tenui: & ne materia coaceruaretur, exhibui ℥ ℞. diaphœnici, cum ℥ iij. decoct. cicerum rub. Exteriori inunxi locum dolentem cum oleo nardino, amygdal. amar. & chamamelino: & dedi diacuminum. Utebatur victu extenuante & carminante. Etiam foru ex floribus chamomillæ, meliloti, summitatum anethi, cumini & anisi, & absinthii, cum recens esset affectio ad tollendam obstructionem vtens, facile curabatur. Hoc est quod Hollerius dicebat: Oppilatur hepar a crassis flatibus sed facile discutiuntur: non ita facile a crassis viscidisque humoribus, vt postea suo loco dicemus.

S C H O L I A.

Inter alios instrumentales affectus, quibus crebro iecur laborare contigit, potissimum is est, qui a Græcis *εμπεξέσις*, a Latinis Obturatio, oppilatio seu obstructio dicitur. Est autem ea, læsio seu amissio prædictarum iecinoris cavitatum, ex infarctu alicuius substantiæ; humoris scilicet seu flatuosi spiritus, vt ex Galen. 5. de loc. affectis & aliis multis locis colligitur: idque in extremis vasorum partibus, non autem in propria eius substantia (vt Arabes quidam senserunt) quæ *ωσέξυμα* dicitur, quod ipsum ad longum Donatus ostendit.

S

1.

2.

3.

εμπεξέσις
oppilatio, obturatio, obstructio
hepatum.

Παράσπασμα
Pars affecta.

Medicus iecinorosus a seipso tum alij perperam pleuritico iudicatus.

Affectus.

Atque hic affectus, morbus existit non in intemperie, sed instrumentalis est morbus, in via seu cauitate. Obstructio autem admodum familiaris est iecori, nullumq; viscus hoc æque vitio tentatur, eo quod vena e portis per iecoris substantiam in ramos tenuissimos dissipata obliteretur: & quod huc alii rami non minus tenues e caua vena conueniant, per quos omne debet alimentum traduci & exportari. Et ita secundum alios obstructio fit in venis capillaribus hepatis, per caua & gibba disseminatis a vena porta, vel caua, ob earum angustiam & flatum, vel etiam crassi & lenti humoris copiam, ut pituitæ in frigidiore temperamento. Biliosis etiam temperaturis praua victus ratione vtentibus, sæpe crudus humor in ventriculo & primis venis colligitur, qui calore attractus ipsius hepatis obstructionem parit. Causæ sunt frequentissimæ: victus ratio ex crassis & viscidis, exercitium a cibo, crassiora alimenta in prima mensa assumpta, succedentibus calidis & tenuium partium. Nā ex his crudus humor intra venas rapitur, sicuti plerumque fit a medicamentorum aperientium usu, ventriculo crudis humoribus referto. Et sic humor crassus, lentus aut multus, qui interdum e cerebro procumbit in ventriculum, & deinde præterfluit, sensim in tenues iecoris venas cum alimento penetrat, easque obstruit. Fere tamen ex alimentis crassis, viscosis multisque fit obstructio, quum aut balneis, aut motu vehementiore mox a cibo in tenues venas vel rapiuntur, vel impelluntur: nonnunquam & bilis flaua in iecore præternaturam diutius coercita, nec tempestiue expurgata, mire crassescit, grauesque & admodum periculosas iecoris obstructiones inducit, ut quæ interdum etiam in cysti lapidescat, ut aliquādo post incisionem mortuorum deprehendimus. Duæ tamen præcipue causæ referuntur ex *Galeno*, *Aetio* & *Tralliano*, crassi & viscosi humores, vel spiritus halituosi in venis hepatis conclusi: & huius ultimi exemplum iam diximus, & quib. notis dignoscatur, scilicet non solum grauitate, sed etiam tensione. Nam grauitas & distensio, cum obtuso dolore, dextro insident hypochondrio, quod tum præcipue manifestum est, cū quis mox a cibo exercitationem subit. Ea tamen sine tumore, & sine febre est. Talia etiam possent apparere ex humoribus crassis. Græci enim, (*Galenum*, inquam, *Paulum*, *Aetium*, ac *Alexan.*) de obstructione tractantes, quæ per se sola citra alium complicatum morbum iecur exerceat (de qua nunc loquimur) duarum tantum prædictæ obstructionis causarū meminere, spiritus videlicet flatuosi ac crassorum viscosorumque humorum. Hæc cum multiplex non fuerit, etiam sine febre excitari consuevit. At reliquæ, quæ mox a principio cum febre inuadunt, a calidorum humorum multitudine ac putredine ortæ, non difficile cognoscuntur ex dolore vehementiore, tum febre: nec alium requirunt curationis modum, quam reliquæ, nisi quod non adeo calidiora attenuantia exigunt. Qua de re nō ex propria obstructionis natura febris consequitur: sed cum ea multiplex fuerit, propterea bene

Causæ.

5.
Signa ex halitu
spirituoso.

Ex crasso &
viscidis humo-
ribus.

6.

dicebat *Aetius*, eam quandoque sine febre esse, quandoq; cum febre. In recentinamq; ac exigua, & non multa existente iecinoris obstructione, febris non excitatur: in diuturna vero ac multa, non mirum, si ea consequatur, magnitudinis tamen & diuturnitatis ratione. Quin imo idem *Galen.* 8. *meth. med.* dicebat, obstructionis magnitudinem discerni ex magnitudine febris, ut quæ ex maiore obstructione, maior, ex minore, minor fiat. Verum cum oppilatio omnis inueterata, non tātum in hepate, sed in omni membro putrefactionem operatur, ac febrem accendit, ut *Aet.* inquit: breui etenim tempore putrefactio cōsequitur ad obstructionem ex vitiosis humoribus, in frigidis intemperaturis, propterea obstructiones celerrimè curare oportet. In calidis vero non cito, sed temporis progressu accedit, (ut liquet ex *Gal.* 8. *de compos. medicam. secund. loces.*) & consequenter ad putredinem febris. Si ex vitiosis humoribus contingant, eodē *Gal.* auctore, nec minus & aqua intercus cōsequi poterit: viscosi enim frigidis ac crassis humoribus diu in iecinoris vasis cōsistentibus, ex iis vasa ipsa primo infrigidantur, & demum iecinoris propria substantia, ad cuius infrigidationem perpetuo sequitur aqua intercus, ut cōstat 5. *de loc. affect.* Quod vero totius etiā corporis extenuatio, ex eius diuturnitate necessario consequatur, propter alimenti penuriam, quam Græci dicunt, cuiuslibet parere poterit, nec alia indiget ratione seu auctoritate. Et sic quoq; obstructio ex calore hepatis, sæpe icteri causa existit, ac febris lētæ & inflammationis, atrophie etiam in pituitosis, cachexiæ & hydropis, ut dictū est, & colici doloris, ut *Arculanus* & *Gordonius* testantur. Soluitur aliquādo in concava parte, existente vētris fluxu: & est aliquando alius liquida, & subinde sanguinolenta, si caua pars laborat. Ita, si gibbosa, adest anhelitus difficultas, vrina vix redditur, aquosa est, tument dextra præcordia, & iecore tumido supprimuntur: alius nihil reddit, aut tantū aridū: & si vrina crassa redditur, soluitur aliquando malum. At curatio generale quippiam habet, partim ex natura causæ proximæ, id est, humoris obstruentis, quem etiam licet morbum nominare, partim etiā ex causā remotiore, id est, abundantia humorum in corpore. Obstructio autem tolli nequit, nisi eius prima causa tollatur: imo si quis ad obstructiones tollendas accedat, non vacuata copia humoris in venis, potius augebit obstructionem, 11. *meth.* 10. & 8. Quod erit apertum, si consideremus, quid exigit prima ratione obstructio. Est autem eius indicatio apertio, quæ fit per ea, quæ contrario modo humores afficiunt: si lenti sunt, inciduntur, si crassi, extenuentur, & vna euacuetur, quod præternaturam continetur in vasis. Sed quæ hoc efficiunt, ut plurimum sunt potestate calida, & fundentia sanguinē: quare metus est ne augeant obstructiones, si quidem copia humoris adsit in venis. Itaque præceptum est, ante medicamenta, quæ obstructione liberāt, abundantiam minuere, idque vel vena secta, si sanguis abundet, vel humoribus ad calidum vergentibus, ac copia

7.

Prognostica.

8.

Curatio.

9.

ac copia sua quoque molestantibus potissimum ubi eadem obstructio adhuc fiat, ex interna cubiti vena, *vt 11. meth. med.* etiam in inueterata, si febrem accendat, Paulo teste, etiam si sanguis melancholicus vel crassus causam dederit, modo vires ferant, alioqui si humores alii & crassi in causa sint, purgatio adhibenda. Quomodo autem purgatio sit facienda, id figura seu formatio, tum etiam situs eiusdem visceris, indicabit, per quæ scilicet loca eam facere oporteat. Nam quæ in simis iecoris sunt excrementa, ad intestinum: quæ vero in gibbis, per vrinas euacuabimus, Galen. auctore lib. de const. art. med. quanquam etiam eadem iecinoris gibba, si multo vitioso succo sint referta, per deiectiones & pharmaca deiectoria (*καθαρστικά* Græci vocant) expurgari debeant: si vero mediocri succo referta sint, per vrinarios meatus, ex Gal. 7. *meth. med.* Aliqui hic, si pituita abundat, per vomitum vel aluum educunt. Vitiosis succis mediocriter concoctis ac eductis, ad detergendas obstructiones accedemus, *vt 8. & 11. meth.* In calidis infuso *rhab. vtemur, cum decocto intubi*, si crassi sint humores, adiciemus pro purgatione *infusum agarici*, vel *vtemur pilul. ex agar. & rhab. vel ag. greg.* si valde crassi sint humores. Deinde vtemur aperientibus, quæ ad intemperiem frigidam valere scribunt auctores, si ex succo frigidus fiat: si autem calidi adsint succi, vtemur iis, quæ ad calidam intemperiem valent, *vti & exempla infra scripta docebunt.*

OBSERVATIO V.

De hepatis obstructione, ex pituita crassa.

1. PVella pituitosa, cui facies discolorata erat, ac membra fere omnia pallore squalabant, genæ tumescebant, & labia quasi e mortua tum pallida spectabantur, ac pedes tumentes habebat, vrina clara, alba mingebatur: grauitas quoque tum distensio cum obtuso dolore dextro infidebat hypochondrio, & potissimum perceptibilis mox a cibo si sese moueret aut exerceret, quæ omnia certissimum signum, in iecore obstructionem esse, ostentabant. Hanc vero suspicionem augebant causæ præcedentes: nam victu crasso & humido longo tempore vsa fuerat: nulla tamen febris corripiebatur, neque adhuc in hypochondrio dextro tumorem experiebatur. Spiritum impedit trahabat, præsertim si scalas ascenderet, vel alta peteret. Pedes cum vesperi magis tumerent, signum hoc erat quod partes distantes priuatæ erant alimento conuenienti, cuius quoque causa facies pallescebat. Pulsus huic mollior erat, ac languidior: nulla sitis aderat, & os saliuâ madebat, quæ inquam omnia ex pituita glutinosa obstructionem arguebant. Curationem vero a victus ratione, nempe extenuantibus, instituiimus, vsque aerem frigidior, paludosum vitaret, ventosum, & austrinum siccumque eligeret, & cibos calidiores attenuantes gustaret, *asparagum, capparem, fœniculum, carnes pullorum, gallinarum, turdorum, merularum, perdicum, ac aliarum auium paruarum montanarum, assatarum, vel coctarum cum hyssopo, oreoselinum, satureia, pulegio, apio, sampsucho & similibus.* Inhibuimus cuncta cibaria glutinosa & crassæ ma-

teriarum, veluti carnem bubulam, vaccinam, agnina, hircinam, & inter pisces molliores: pestiferam etenim materiam præstant, vt murænæ, anguillæ, congridi. Perniciosissima habentur, *lac, caseus, pedes quadrupedum, & viscera, damnata materia existimantur, præterea oryza, far, & omnia dulciaria & lactaria,* & lac quo crassius est eo nocentius, a quo serum exiguum excernitur: nam quod plurimum casei continet, hepaticis, calculosis & lumborum vitiis nocet: sic & palmarum pinguium natura oppilat, si ex toto non maturæ sint, ita & filigo cum lacte in pultem parata eadē vitia producit. Imperauimus quoque vt sereno cœlo ac calidiore habitaret, corpusque exercitatione aliquantisper vegetaret ante cibum: nam exercitium conturbans a cibo sumto, noxium admodum est: eaque ratione quies tunc imperanda. Iussimus interea, vt ante cibum vigilaret: nimio enim somno torpescunt sensus, & ideo somnus sit nocte non turbatus, paululumque sublimius, caput, connexæque corporis partes componantur tempore somni. Panem optime fermentatum laudauimus, qui si sale, cymino, fœniculo, aniso, vel similibus subactus esset, magis commendatur. Vtiliter quidam & addi volunt pro plebe, lupinorum farinam aut erui. Interea cibum offerri volumus qui facile concoqui posset, in parua quantitate, & vt vnice caueret, ne plus, quam vires tolerarent alimenti sumeret, & ne ante quam hesternus cibus concoctus esset, alium gustaret, aut horam consuetam præuenteret. Concessimus & vinum tenue, cum & huic menses deficerent, aut minus fluere. Propterea etiam huic consuluimus, cum vires adhuc fortes essent, vt paulum sanguinis ex saphæna mitteretur: & egregie profuit. Licet enim sanguinis missio aliquando approbetur in obstructione hepatis, pro ventilatione in pituitosis ex basilica vena, tamen in hæmorrhoidibus & mensibus suppressis prodest venas crucis potius incidere, vt apud auctores videre licet. Quæ venæ sectione cum menses fluere, interea ea elegimus quæ materiam inciderent, aperirent & detergerent, & simul ad euacuationem facerent: quale est sequens decoctum. *℞. rad. fœnic. petros. asparagi, apii, graminis, ana. ʒj. origani, rorismarini, artemisia, (vt magis fluere menses) chamæd. ana. m. j. centaurei, cassute, agrimonie, chamæpit. lupuli salictarii, fumaria. ana. m. ss. sem. fœniculi, dauci, pistinacæ. ana. ʒj. vuar. passul. ab arill. repug. ʒj. glycyrr. rasa ʒiij. folior. senæ ʒj. agarici fœmin. ʒj. ss. rhab. selecti (valde enim hepatis prodest) ʒj. schœnanthi, cyperi, calami aromatis. zinz. albi. ana. ʒss. coquantur in aqua communi, pro ℥b. j. colatura addendo syr. de byzantiis, oxymell. simpl. de duabus rad. syr. de artemisia, de eupathorio. de quinque rad. an. ʒss. mis. pro iij. aut iij. dosibus.* Deinde dedi pilulas de hiera, & aromaticas, ex ʒj. septem ante cibum. Postea & has pilulas, prius assumtis syr. aliquibus incidentibus. *vt oxymell. diureticos. ℞. agar. trochis. ʒij. rhab. optimi ʒj. diag. gran. j. vel ij. cum oxymell. fiant pilule v. vel vij.* Mox dedi decoctum *radic. filicis, cum oxymelice, radix*

Enim hæc, sicut & semen securidacæ, ab antiquis plurimum probatur: nam & Gal. succum eiusdem radicis in compos. solebat ponere. Sed & conditum sequens præscriptum: *℞. conser. capill. vener. flor. betonia, ana ℥℥. trochisc. de eupat. de rhab. ana ℥℥. specier. diarod. abb. trionsant. ana ℥j. syr. de byzantiis, de eupatorio q. s. fiat conditum, detur ad magnitudinem nucis anellana, superbibendo vinum dilutum cum aqua cassia & artemisia.* Hypochondrium dextrum hoc vel simili vng. inunximus: *℞. olei nardini, amygd. amar. ana ℥j. ℔. succi apii ℥℥. coquatur ad succi consumptionem, addendo spica nardi & Celtica, schœnanthi, asari ana ℥j. sem. apii, petros. ana ℥℥. cyperi, ros. ana ℔℔. cera q. s. fiat vnguentum.* Quibus remediis hæc puella melius habuit.

S C H O L I A.

Qui venas habent astrictiores, ut frigidi temperie, plus obnoxii sunt obstructionib. tam ob venarum angustiam, quā ob copiam pituitæ lentæ & crassæ. Sunt enim illa duo, causæ obstructionum potissimæ; nempe meatum angustia, & humorum crassities, vel lentor, vel sanguinis copia. Quibus modis cognoscatur, iam dictum est, & quomodo etiam curetur, nempe optima victus ratione, eaq; attenuante & usu medicamentorum incidentium, & subtiliantium materiam crassam, cōcoquentium, & demum purgantium; deinde vtendo medicamentis tollentibus obstructionem; liberatis obstructionibus, intemperiem emendando, & viscus roborando. Sunt qui hic laudant vsum cæparum ex oxymell. vel aceto, ut Rondeletius facit: iuscula in quibus rad. apii vel petros. aut fœniculi incoctæ sint, ex syr. oxymell. vel aliquod diureticum: deinde laudant purgationem ex ℥℥. diaphæn. cum aqua apii vel graminis, deinde inter aperientia trochisc. de eupat. diarod. dialac. de rhab. de absinth. de curcuma probantur: longiore tempore his vtendum. Quædam tamen ex his nimis calida & ingrata, & acria: quorū vsum mulier nobilis apud Rondelet. in vlcus renum incidit ex vso cōpositionis de vino, excerptæ e Praxi de Taranta. Igitur eiusmodi calida frequenter non danda. Obstructio hæc a natiuitate ob vitium paruitatem, curam non admittit, quāvis bono regimine præseruari possit a multis morbis, qui hunc affectum subsequi solent.

O B S E R V A T I O V I.

De hepatis obstructione, ex causa calida, cum hepatis caliditate.

Vir quidam Delphis dolorem hypochondrii dextri sentiebat, vna cum ventris stipricitate: urinam subtilem & rubrā habebat, & plurimum sitiebat, & pruritus ei in toto corpore aderat; vt cunq; macilentus erat, & citrini coloris, cum pulsu veloci, & febre, licet exigua. Quem cum inuiserem, intellexi, illi a calida causa obstructionem in iecore adesse: ideo venam basilicam in brachio dextro secari iussi, sanguine moderate extracto. Mox hunc syrup. propinaui: *℞. syr. acetosi simplicis ℥ij. aqua decoct. enduiæ, cichorii, hepatica, lactuca, capill. vener. polytrichi, dentis leonis ℥ix. fiat syrup. pro ij. dosibus.* Postea eundem hoc modo feliciter purga-

ui: *℞. rhabar. selecti ℥j. ℔. infunde per noctem in aqua end. cichorii, fumaria q. s. adde expressioni electuar. de succo ros. ℥ij. syrup. ex infus. ros. ℥j. misce, & quinques egregie aluū deposuit. Deinde dedi trionf. vel diarrhod. abb. in tabul. modo vnum, modo alterum: & inuncta regione hepatis cum vnguento santalino, optima victus ratione adhibita, breuiter & hic fuit restitutus.*

S C H O L I A.

Si sit obstructio ex calida causa, vel succi crassi ad calidum tendant, conuenit syr. ex succo cichorii aut enduiæ, quam scariolam vocant, oxyzacch. acetosus simplex, & ex rad. cum aceto vel e fumaria. Purgatio commoda ex infuso rhab. cassia vel manna, cum aqua cichorii vel intubi. Deinde pastilli ex diarod. abb. triasant. vel succus fumaria desiccatus, & in pastillos redactus: hic autem dolorem omnem soluit, etiam si febricitent. Reliqua vide apud Aerium, Paulum, & neotericos: qui addunt, accidentibus esse occurrendum, siue atrophia subsequatur, siue febris, siue cachexia vel hydrops; idque ex propriis suis locis. De quibus & Arculanum & Gatendarum & reliquos consulo.

O B S E R V A T I O V I I.

De hepatis inflammatione.

Elio, prætor in oppido Schaga decumbens, crapulæ satis deditus, inflammatione iecoris correptus est. Huic autem febris continua aderat, & dolor valde grauis in hypochondrio dextro, cum tussicula quadā inani. Cum enim hepar multo sanguine abundet atq; illo nutriatur, multasq; & magnas venas habeat, per quas magnum sanguinis fluxum vel potius refluxum ad se patitur, ob id hoc viscus aptum est ad suscipiendas eiusmodi inflammationes: & magis in hoc corpore, vino ac poculis dedito. Præterea cum inflammatio hepatis tumorem, dolorem, febremq; necessario secum adferat, ex eo & respirandi difficultas oriebatur, tussicula inanis, vt dictum est, tum dolor ad clauiculam ascendebat; ita vt is pleuritidem falso esse putaret. Quod aut eiusmodi dolorē sentiunt ad iugulū vsq; id ob membranæ costas succingentis tensionem fieri volunt, quæ tenditur ob septi transversæ tensionem; & septum transversum tenditur ob pondus hepatis deorsum trahēs. Sed hoc non nisi in magna phlegmone fieri volunt. At huic febris satis acuta aderat; & lingua arida rubensque, qualis in principio hic cernitur; postea autem nigrescebat (vt fieri assolet) & aspera fiebat. Habebat vero sitim inexhaustam, nauseam, & cibi fastidium, & singultum: quæ, inquam, omnia inflammationem hepatis indicabant, lotium quoq; rubrum spectabatur. Ad hunc igitur accitus mense Iunio, anno 1548. venam basilicam ilico tundere feci, ad uncias octo, vel paulo plus, sanguine effluente, cum eodem die secessum habuisset. Sed sequenti die cum non satis aluus responderet, lenitium sequens vt exhiberetur, mandaui: *℞. cassia recens extracta ℥j. rhab. pulu. ℔j. fiat bolus: ex quo quatuor sedes vt cunq; biliosas habuit; ita vt ex hac leui purgatione & sanguinis detractione febris mitior*

minor euaserit, dolore parū diminuto, sed adhuc
vtrunque permanente. Inunximus regionem he-
patis vnguento santalino, & pannum lineum eo-
dem vnguento inunctum apposuimus, sine cal-
factione. Interea & hoc decocto utebatur. *℞. en-
diuia, cichorii cum toto, dentis leonis cum toto, acetosa,
viol. lactuca nouella. an. m. j. fumarie, agrimonia, ca-
pill. vener. boragin. bugloss. ana manip. ℞. chamapityos,
chamad. (cum esset etiam quedam obstructio, tum
cholera paulo crassior, quam leui purg per aluum
excreuerat) ana man. ℞. rad. graminis, perros. ana ℞. ℞.
sem. 4. frigid. maior & minor. an. ℞. j. sem. anisi ℞. ℞. tha-
marind. ℞. j. prun. damasc. num. xij. vuar. p. ss. ab arill.
repurg. ℞. j. liquir. ras. ℞. j. hordei mund. p. j. fiat decoct.
in aqua communi pro ℞. j. ℞. colature addendo syrup. de
cichor. Nicoli cum rhabarb. ℞. j. ℞. syrup. viol. de limoni-
bus, de endiu. ex infus. ros. commun. ana ℞. ℞. misce. Quo
iulebo, seu apozemate, cum vsus esset, febris val-
de diminuta est, & quotidie aluum deponebat.
Morbo autem magis inclinante, pro dolore vsus
est sequenti epithemate, bis aut ter in die, atque
ita dolor omnis euauit, neq; ad apostema deue-
nit, de quo metuebat, sed salus cum nostra laude,
ab astantibus pro deplorato habitus euasit: *℞. en-
diuia viridis, cichorii. an. m. j. flor. chamomilla, melilori,
flor. ros. rub. an. m. ℞. summitatum absinthii p. j. coquan-
tur in aqua communi pro ℞. j. ℞. in fine addendo aqua
absinthii, end. ana ℞. j. aceti optimi ℞. j. specier. trion-
fant. ℞. j. ℞. Iterum ebulliant, & fiat epithema pro
hepatis regione. Eo peracto inungatur linimen-
to infrascripto. *℞. olei amygd. amar. chamomil. an.
℞. ℞. olei ros. vnguenti santalini, ana ℞. j. misce. Quod
ad victum attinet, tenuissimum adhibuimus, in
principio nil nisi cremorem prisanæ, lactucam,
tum poma cocta administrando. Prisana a Gale-
no maxime laudatur in cibo 13. meth. medendi. Ab-
stinendum a dulcibus, quibus tum iecur tum lien
intumescunt. Postea in fine prisanam in gallina-
ceorum pullorum iure concessimus, intybo & ci-
chorio incoctis. Auctores enim hica valde refri-
gerantibus ac astringentibus abstinere: de quibus
consule Alexand. Trall. & Galenum, tum alios
auctores.***

S C H O L I A.

Haud raro iecur inflammatione laborat, ob
anguinis fluxum & refluxū, vt diximus, quæ
haud aliter in ipso quam in ceteris nostri cor-
poris partib. gigni consuevit, nec etiā ab alia caus-
sa. Nam communis omnium phlegmonarum ge-
neratio (teste Galeno 10. 13. 14. meth. medendi. & in libr.
de tum. præter naturam, & de inæquali intemperie, ac
aliis plerisque locis) ex sanguinis influxu est copio-
sioris, quam pars postulet: nam & caro hepatis,
quam quidam Græce parenchyma vocant, in quā
sanguis ex refertis vasis halitus specie ex sudat, in-
flammationem gignit, auctore Gal. 14. method. med.
Omnes igitur causæ tam internæ quam externæ,
quod ad generationem inflammationis, tum caus-
sas, attinet, resumere oportet ex his, quæ de ven-
triculi inflammatione diximus. Addendæ & his
causæ externæ ex libr. 11. Galeni. method. cum
de cataplasmatibus agit in pleno corpore: vt si quis

etiam dolori sedando cucurbitulam affigeret, aut
calida emplastra ad moueret in pleno corpore, fa-
cile inflammationem adferre posset: quanquam
inflammationes in fluxu sunt repletis venulis, &
carne eius irrigata, & repletis spatiis. Signa iam ex
parte in Obseruatione præcedente diximus, quæ
ad dignotionem partis affectæ plurimum faciant:
iecur enim ipsum inflammatione affici deprehen-
ditur, ex dolore cum positu, quoniam in dextro
latere ad nothas costas dolor a laborantibus sen-
titur. & cum magnam trahant spirationem, vehe-
mentius excruciat, sentiuntque in eadem dextra
præcordiorum parte grauitatem, & interdum iu-
gulum ad infernas partes detrahi, (nam id non o-
mnibus commune est, sed ii tantū, quibus iecur
costis alligatur) atq; sic dolor, ad succingentem co-
stas membranam peruenit. Quoniam vero de do-
lore mentio fit, distinguit Gal. 6. aph. 5. de situ phle-
gmone. Nam quæ est in profundo carnis, dolorem
grauem faciet, id est, sentiet quasi pondus quod-
dam deorsum trahens viscus, & diaphragma: at
dolor magnus non erit, nam pars, quæ proprie af-
ficatur, sensum non habet. At si membrana patia-
tur, erit dolor acutus. Addit, & si venas afficiat, do-
lor pungens & tensius fiet. Alibi tamen scripsit
Galen. (vt. 2. de loc. affect. 2. & inde sæpe) venarum
tunicas, & arteriarum non sentire, 16. de vsu part.
Prorsus carent, inquit, sensu siue inuerti, siue secueri.
Respondeo, vti & Iacchinus facit, locus est men-
dosus, 16. de vsu, lege: Fiunt insensiles venæ & ar-
teriz, seu nerui incidantur, siue vinculis excipian-
tur. Et quidem si venas subiens inflammatio do-
lorem acutum facit, non poterit euitari talis do-
lor, in quauis parte consistat: vbiq; enim venæ ade-
runt. Et tamen Auic huiusmodi meminit distin-
ctionis factæ a Gal. 6. aph. 5. statuens, quod si venas
affligat, dolor erit acutus. Oportet igitur & alia si-
gna habere, quæ & ratio ex natura rei sibi inuenit,
& experientia ex sensatis confirmat. Primum est,
febris acuta, vt quidam sentiunt: alii & ardentem
febrem adesse volunt, vt Rondelietius. Idem face-
tur Aetius, quod febris adest acuta, inæqualis, quæ
plerunque ad vespertinam, & noctem exacerbatur.
Quod vero febrem ad iocinoris inflammationem
comitari necesse sit, a Galeno decretum est, 2. de
loc. affect. Verum quod ea acuta sit, nequaquam
falsus est, nisi præcitato 5. lib. de loc. affect. vbi de ery-
sipelate verba faciens, scriptum reliquit ardentem
febres, ac vehementissima symptomata euenire,
cū ipsum in iocinore, vetriculo aut pulmone fue-
rit ortum, vel inflammatio erysipelatis particeps
fuerit. Quinimo lib. prorrh. 2. phlegmone in ioci-
nore, vel ventre orta, q̄ non continuo ac perpe-
tuo maligna, nec acuta consequatur febris, decre-
tum reliquit. Nam inflammationum magnitudi-
nem (vt etiam sentit Donatus ab Altomari) per-
petuo febris ex proportionem sequitur. Et propter
ea nisi valenter iecur inflammari contingat, licet
febris excitetur, quoniam princeps viscus est, ta-
men ea acuta nō erit, nisi eadē inflammatio magna
sit. Pro cuius magnitudinis proportionem ipsa quibq;
& maior erit, & vehementius excitabitur: de qua

Signa.

5.

6.

Quod non semper
per totam in-
flammationem
vymatur febris
acuta.

7.

forte Aetius intelligere voluit, cum dicit lib. 10. 13. quod accessionis tempore quidam dilirio apprehenduntur, ac acroleotium excernunt, & febris adest acuta, inaequalis. Sic quoque Alexandri Traliani verba intelligenda, cum dicitur exigui hepatis inflammationem, non statim febrem inducere, sed vehementem & acutam febrem: aliter falsum esset. Nam orta inflammatione in eo, cum princeps membrum sit, uniuerso corpori impetit, & tensionem & calorem immodicum, qui febris est, eodem Gal. teste. 4. de caus. puls. & propterea necessario (ut ipse 2. de loc. aff. scriptum reliquit) ipsam iecoris inflammationem febris comitatur. Secundum signum est, & grauitas in dextris praecordiis, deorsum trahi videantur cum aeger assurgit, qui etiam aliquando ad iugulum (ut paulo ante diximus) usque protenditur, eo quod membrana, qua suspenditur diaphragmati & deorsum trahitur, ortum habet ex ea quae costis subtenditur: sed hoc non nisi in magna sit phlegmone. Iam quoque et magis interuallis tussis exigua, arida, & quae nihil exspuunt, molestare egros solet, atque spiratio parua & crebra, quae admodum 2. & 5. de loc. aff. a Galeno scriptum est. Adest, inquit Iacobinus, & tussis sicca, vel quia ex gibbis partibus aliquid in thoracem effluit, vel quia calor molestus pulmonem afficit, vel demum, quia respiratio libera non est: unde natura noxam e respiratoriis organis pellere volens, tussim excitat. Fit & respirandi difficultas, tum ob tumorem, tum ut Rondoletius putat, ob febrem, quae maiorem refrigerandi necessitatem habet. Addit & ipse tussiculam inanem. Dolor vero fit grauis, quia non sentit, nisi in parte gibba: tunc ob ligamentum, quo cum diaphragmate iungitur, ligaturque, dolor punctorius sequitur, & cruenta excretio, in his qui abundant sanguine. Sic ego praemanibus semel habui mulierem laborantem inflammatione iecoris, cum dolore aggrauante in hypochondrio dextro, quae simul per aluum sanguinem excernebat, valde plethorica: & quae fuit sanguis detractione, tum aliis aptis remediis, tum topicis hepatis tempestiue ad moris, probe curata. Sed num per tussim quae plerumque arida est sanguinem relectant: id ego vix vidi, quod sciam. Alia vero quaedam signa ab eodem Galen. 5. de loc. affect. tum ab Aetio, cap. 5. lib. 10. & Paulo 4. lib. 3. referuntur, utpote de lingua sicca & adusta, & de eiusdem colore rubro & nigro, de bilis flaua vel syncera bilis, tum eius quae vitellis ouorum assimilatur, vomitu, quae postea aeruginis aliquando colorem referre conspicitur: item de aluo adstricta, nisi una cum visceris imbecillitate inflammationem excitari contingat, ut liquet eodem Gal. 5. de loc. affect. Gal. & locum ex Aetio & Paulo citatis. Sed haec partim communia sunt symptomata, multis acutis morbis succedentia, partim non necessario adueniunt: ita & color corporis subuertitur in arguati morbi speciem permutatus, & singulatus quoque consequuntur. Sunt autem haec supradicta euenientia seu in gibbis, seu in simis: communia enim sunt utrique parti, quanquam vehementior sitis, nausea, biliosorum sanierum vomitus,

finis accidat magis, contra respirationis vitium, & in respirando dolor, plus gibbas partes insequatur, magisque tussis excitetur atque dolor usque ad dextrae partis iugulum, adeo ut detrahi videatur, cum gibba pars est affecta, ut a Galeno 5. de loc. aff. scriptum est. Licet idem testatur in neutra praedictarum partium exquisitae distinctae inflammationem posse consistere, nam omnium eius partium carnes inter se continuantur. Si tamen ingens in parte gibba consistat inflammatio, vel solo tactu dignosci potest. At simarum partium inflammatio per alia, potius symptomata quam per tactum investiganda, ut liquet 5. de loc. aff. Nam in simis sit magis fastidium, nausea, vomitus biliosus, sitisque vehementior. Et licet tumor circa partes gibbas hepatis, ex sanguine ortus, eiusque aggregatio facile tactu dignosci possit, si sit magnus, & praesertim in gracilibus, quibus abdomen non est crassum, praecipue post secundam vel tertiam diem, cum ex febris vehementia siccantur, (teste Gal. 5. de loc. aff. 16.) tamen alias non sentitur, quod triplex ordo musculorum hepatis substantia superprehenditur. Saepe vero imponit talis tumor nec dico, tanquam sit in iecinore affectus, cum tamen sit in musculis abdominis: quae casum recitat Gal. Stefano cuidam enenisse, & nos aliquando vidimus deceptos medicos: & Hippocrates multos ait, ex eo quod ignorant, lucrum facere, quod credunt se curasse phlegmonas iecinoris, cum tamen sint musculorum. Ideo distinguendae praedictae affectiones. Etenim, iecinore inflammato tumor secundum lineamenta rotundus, figura videlicet ipsius hepatis aequalis succumbit, ut Aetius fatetur, qui etiam ad corporis decubitu simul conformatur. Maior enim apparet corpore ad sinistrum latius reclinato, minor autem, rursus ad dextrum reuoluto, nimirum hepate sub nothas cedente coctas, neque visus, neque tactus similiter succumbente. Amplius autem (ut idem inquit Aetius) in hepatis inflammatione, in eum bens cuticula naturali modo se habere conspicitur: musculis autem inflammatis cutis circumtenditur, ut si quis digitis apprehensam attrahere velit, ea minime sequatur. Propriissime aut tactus discernet, num in alto tumore vero in superficie inflammatio ipsa consistat: rectorum aut musculorum tumores praeter naturam oblongi, atque per totum ventrem extensi videntur, umbilicum (veluti haec quoque musculorum coniugatio) comprehendentes: quapropter haud obscura est eorum dignotio, utpote quos & positus, & figura declarat, accedente ad haec, quod ipsi a nullo exteriori musculo conteguntur. Galen. autem fore praecitato lib. 5. de loc. aff. Haec autem obliquis quoque musculis, quia thorace ostendunt, sunt communia, ut ipse inquit. Sed multo difficilior est notitia musculorum, qui his subiecti sunt: difficilima vero transierorum. Cum ergo iecur inter hos musculos sub peritoneo positum sit, cum tribus contegatur musculis, fieri non potest, ut tactus aliquam ipsius notitiam praestet, nisi vel magna in ipso oriatur inflammatio, vel incurbentes ei musculi extenduntur, ut liquet ex Galen. eodem loco. & ideo in

Gibba

Diffinitio
Inflammationis
in pleuritis

Gibba tantū parte, si sit magna, solo tactu percipi potest, vt paulo ante dictum est. Distinguitur quoque non facile a pleuriti: quamobrem mirum non est, si medicus ille deceptus est *s. de loc. 7.* Sæpius vero locus dolens distinctionem facit, & tussis humida, si eueniat, pleuritim monstrat, quæ sedem febris comitatur: idem de siti & nausea. Demum si ea, quæ vomui excernuntur biliosa fuerint, vel æruginosa; & si iis excrementa hepatica succedunt clarissimum de hepatis inflammatione est argumentū. Neq; in inflammatione iecinoris adest dolor punctorius; neq; pulsus adeo durus, qui & terræ modo tactum lecer, velut in morbo laterali. Tussis in iecinoris inflammatione perpetuo est sicca. At exempla infra scripta hæc melius docebunt.

OBSERVATIO VIII.

De hepatis inflammatione admodum calida,
in parte gibbosa.

VIt quidam istis diebus ex calida inflammatione hepatis laborabat; idque in parte gibbosa: quod ex istis signis percipiebam: in dextro hypochondrio quidem dolebat, qui dolor etiam tactu percipiebatur. Signum satis magnæ inflammationis; at si in sinistrum latus decumberet, magis dolebat, ita vt neque in dorso diu iacere posset: & inter spirandū dolor magis accrescebat, & ad dextræ partis iugulum ascendeat, tumore quoq; exiguo ad figuram lunarem apparente; hoc enim soli iecinori proprium est, vt tumoris cumulū vniuersum habeat circumscriptum, vt diximus. Tussim præterea sicca patiebatur; aderat & sitis, ac febris continua, ita vt neq; probe dormiret. Quo malo cum vltra duodecim dies conflictatus esset, metumimus, ne in abscessum aut duritiem, vel hydropem malum terminaretur; nam vix aut difficulter posse resolutione terminare dubitabam: & quia principium videbatur transactum, magis de abscessu metuebam; atq; suspensum me tenebat, nūquid hic venæ sectio adhuc esset adhibenda: & quia ventrē minime laxum habebat, sed durum, nūquid purgatio hic conuenire posset; cum potius si gibba pars hepatis laboret lenibus vrinam cientibus auxiliemur, sed non prius quam concocta sit materia: in caua autem eius parte, nisi procedente tempore, & non ante quartum, vt aliqui volunt, solutiuu valida exhibenda sunt, cum vsq; ad illum diem humores in fluxu sunt, qui pharmaco solutiuo excitati ad magis fluendum excitarentur. Si cauum itaq; eiusdem visceris afficiatur inflammatio, procedente tempore per ventrem eos vacuare licebit, ex eiusdem Gal. sententia, lib. 13. method. quem sectatus est Paulus: licet eandem purgationem per aluum, cum iecur phlegmone laborare incipit, tanquam valde nociuam, cum maximam excitaret phlegmonem, eodem loco prohibuerit; quæ tamen vacuatio, cum videlicet phlegmone iam concoquitur vel inclinauerit, partim per clysteres fieri poterit, partim per ea medicamenta, quæ per os sumuntur, vt eisdem auctoribus visum est; quos clysteres primum quidem ex aqua multa cum sale fieri præcipiunt, postea vero, in remissio-

ne videl. hyssopum vel origanū vel minus centaurium, vt cnicum seu colocynthidem imponi iubent. Sed tutius nos hoc vel simili clysteri vtimur. *℞. folior. malua, althæa, beta, viol. an. m. j. mercuriali, centaurii minor. an. m. j. prun. n. xij. coquantur in aqua com. pro lb. j. addendo olei amygd. dulc. viol. cham. an. j. mellis ros. j. B. cass. mund. j. j. diacath. j. B. salu pa. u. fiat clyster.* Vbi vero per clysteres phlegmone non curatur, Gal. audacter dat, *13. meth. med.* in cibis vtricam, mercuriale, epithymum, filiculam seu poly-podium, & reliqua, quæ scribit modice aluū dericere. Verum in remissionib. tum iis ipsis audacius, quam antea vtendum; tum vero, q̄ iis sunt valentiora, partim in ptisana coctis, partim tussis ac in molliissimum puluerē redactis; quæ vel ex ptisana, vel ex aqua exhibeantur. Idem quoq; Gal. filiculæ aliquid in ptisana, ac nigri veratri corticē aliquando incoxit, ac præbuit. Atqui nostris temporibus mitiora ac tutiora medicamenta comperiuntur, quibus vti poterimus; vt manna, cassia, fistula, syr. ex plur. infus. ros. purpurearum tum persicarum, ac etiam rhabarb. Hic vero cum aluum siccam haberet, etiam in gibbo existente inflammatione, vêtrem omnium primo emollire oportebat, cum iam principium transisset: & ideo etiam iuxta Auic. præstat hic ante omnia, vt venter competenter teneatur laxus; qui sic dicit: *Caueas dimittendo naturam restrictam, in hoc enim est nocuum maximum, & in ipso est horror: & non dimittas eam resolutam superflue, & cadat virtus, & gliscat natura; imo superest tibi, vt soluas strictam cum qualitate, & constringas solutam cum equalitate.* Bonum est ergo, licet inflammatio seu apostema sit in gibbo, vt venter teneatur laxus, cum suppositoris aut clysteribus lenibus, aut cum diapruno, scilicet simplici, cassia, fistula vel diacatholico. Cum igitur aluus hic adstricta esset, libenter hunc clysterem vel similem iniiecissim. *℞. malua, bis malua, folior. viol. an. m. j. cucum. cucurb. an. m. j. prun. sebesten. an. nu. xx. quat. sem. frig. maior. an. j. y. sem. anisi j. y. flor. chamomill. vio. an. pil. j. fiat decoctio in lb. j. in aqua dissolue mell. viol. zaccbar. cassia, ana j. j. olei viol. j. y. misce, clyster hic mollis est, leuiter detergens & refrigerans, sensimque aliquid excrementorum euacuans: quem tertio quoque die Rondelerius, si aluus durior est, iniici iubet. Et quamquam præcipue conueniat, si inflammatio sit in caua aut splene; vallet tamen etiam si sit in parte gibbosa, vbi venter strictus est: Verum cum clysterem non admitteret hic æger, dedi hanc potionem. *℞. syr. ex infus. ros. pallia. cum rhab. j. j. cassia fistula recens tracta, diacath. ana j. y. aqua cichorii j. y. misce: fiat potio: qua satis aluum deposuit, & materiam biliosam excreuit. Altero die, quanquam venæ sectio in principio neglecta fuerat; tamen, considerando sanguinis abundantiam, & vires adhuc constare, sanguinem detrahare mihi vtile visum fuit; licet omnes auctores & inter eos Auicenn. venæ sectionem hic tantum in principio commendent. Et quamuis principium iam transactum erat, ita vt aliquis timere posset de sanatione, vt ita dicam cum Auicenna: tamen venæ sectio etiam conuenit**

egregie in dolore intento, si sanguis abundet, & vires adhuc consent, eodem Auicenna auctore. Memini ex scriptis M. Ioan. Tyengii, quod ille in muliere 40. annorum, cum tribus mensibus apostemate hepatis laborasset, comode venam basilicam in dextro brachio misit; quamquam & illa tussifica laboraret; tamen aliquid sputi sanguinolenti (licet in gibba hepatis inflammatio & apostema esset) vna cum tussi emittebat; quemadmodum & filius illius Berosi doctoris magnifici, ann. 12. natus, apud Amatum, qui etiam in gibba parte hepatis inflammationem patiebatur, vna cum tussi & sanguinis sreatu: cui licet in principio ad uncias 5. vena cubiti secta fuisset, tamen postea cum in iocinere doleret, cum inflammatione gibbae partis, post clysterem iniectum, denuo sanguinem ex vena, quae inter digitum annularem & minimum repit, uncias quinque sanguinis cum maxima utilitate detrudere mandauit: cuius totam vide historiam, quomodo is puer curatus fuerit, *cent. 4. cur. 1.* Postquam igitur venam in hoc nostro ægro secari fecissem, exhibui decoctum sequens, admodum iuleb. *℞. end. cichorii, lactuca, acetosa, ana man. j. rad. cichorii, fœniculi, ana ʒ ss. semin. 4. frig. maior. ana ʒ j. cassutha ʒ ij. spicenardi, schœnanthi, ana ʒ j. coquantur in aqua communi pro ʒ j. colatur. adde oxyzacchara simplicia ʒ ij. misce pro 4. dosibus.* Postea addidi magis aperientia & diuretica: ut *syrup. de byzantiis, acetos. compositum,* & aliquando hunc syrupum: *℞. aquae endiu. absinthii, fœniculi, ana ʒ j. syrup. de end. de byzantiis, oxyzacchar. ana ʒ ss. misce, fiat syr.* Oporteret autem in declinatione (*ut latius in scholio dicemus*) etiam diuretica hic adhibere, ut *syrup. de end. compos. capill. vener. & de byzantiis, cum decoct. semin. 4. frig. maior. cum radic. graminis, apii, & petros. ac similibus.* Interea purgaui etiam illum, ante diuretica, cum infus. rhabar. adiecta schœnantho. Et quia principium pertransierat, quo ad topica, licet ab initio magis repellentia profuissent, ut inunctio olei ros. lentiscini aut melini; nos potius nunc oleo ros. adieciimus primum oleum amygd. amar. & absinthii, deinde etiam cotoneorum & mastichinum, aceto albo parum immixto: etiam hoc epithemate, vel simili videntes. *℞. ros. rub. cichorii, end. an. p. j. flor. chamom. meliloti, absinthii, anethi, ana p. ss. bulliant in aqua pluuiali: demum adde succi cichorii ʒ ij. aceti albi ʒ ij. misce: fiat epithema.* Postea & hoc fotu seu epithemate, aut simili, vsumus. *℞. florum chamomill. meliloti, ana man. j. extremitatum absinthii, florum ros. agrimonie seu eupatorii, centaurii minoris, ana m. ss. fœnugrac. sem. lini, spica, schœnanthi, ana ʒ ij. fiat decoctio in aqua pluuiali, pro ʒ ij. adijciendo aceti optimi ʒ ij. pro fotu.* Facta fomentatione, cum pannis calidis locus exsiccatu his oleis inungebatur. *℞. olei chamomill. ʒ j. olei amygdalar. dulc. & absinthii, ana ʒ ij. misce, & inunctione peracta apponebatur ceratum, ex duabus partibus emplastri, de meliloto, & vna parte cerati seu vngu. santalini.* Atque hoc modo accidentia postea ceperunt diminui, & anhelitus facilitati; & dolor minuebatur, somno ac appetitu redeuntibus, ac febre cessante. Interea tamen

post purgationem, ad hepatis roborationem, & caloris alterationem, subinde sumebat rotulam vnam specier. diarod abbat. in tabulis. Et ita liberatus fuit ab inflammatione, per modum resolutionis, absque suppuratione.

S C H O L I A.

¶ Vori iam de signis iam egimus. restant adhuc signa prognostica: quae & acutorum affectuum hic generalia sunt: vnica enim salus est, virium robur, *ut 10. meth. med. habetur.* Hinc noster hic æger, cum adhuc virib. valeret, ab hoc morbo, licet primo ingressu difficilis videbatur, sanatus est. Ideo vobis imbecilli, ut senes & graciles & biliosi, aut peribunt, aut in tabem transibunt, ut nos sæpe vidimus in multis; *uti constat 3. epid. 2. 5. & 1. præsertim si ex erysipelate laborant, ut 5. de loc. 6. constat.* At sciendum, quod signa quoque erysipelatis sunt maioris & minoris ratione differentia; non modo enim acuta febris inde eueniet, sed prorsus ardens; & sitis, & reliqua de lingua, quæ æstum insequuntur, longe grauiora, unde & erysipelas periculum magis quam inflammatio decernit; uti & in libris nostris de febribus ostendimus. Pessimum quoque hic, ut & in inflammatione, signum est, extrema refrigerari, cum medium corpus vritur; & cum pedes subinde nudant, cum sint frigidi. Sunt & alia quædam notæ quæ generatim in acutis ponuntur, *1. prog.* Vomitus vero niger, pessimus, ut & porraceus: magnam enim aduersionem significat. Morti vero proximis intumescit venter; rupto abscessu, & sudant sudore frigido circa collum, & faciem; & languentur animo, ut Bellamartus apud Iacchinum contigit. Generatim vero morbus periculum grande minatur. Spem facit sanguis de naribus large fluens, præsertim tempestive, id est, post coctiones & sudores *3. de crifib. 3.* Coctiones vero in vrinis cognoscuntur, *ut ibidem habetur.* Hippocrates de hoc morbo *aph. 12. lib. 7.* ita suum prognosticum facit. In hepatis inflammatione singultus malum. Quod nos obseruauimus in rustico quodam, qui cum valde singultiret, & senex esset, mox moriebatur. Interea tamen non semper singultus iocinoris inflammationem comitatur, sed quando ea in magnitudinem attollitur ac feruescit: in quo feruore stomachus ad compassionem trahitur, nonnunquam propter neruorum communicationem. Quare, ut *Galen. comment. eiusdem aph. dicebat,* tunc solus compassio sit stomacho cum hepate, quando inflammatio & maxima & pessima fuerit: nonnunquam etiam bile multum calida & multa, in huius visceris inflammationibus genita, ac confluente ad intestinorum principium: qua superfluitante, atque ad ventriculum recurrere, contingit os eius morderi, atque ideo singultire. Quidam autem arbitrantur magnitudinem inflammationis ventriculum premere, ac singultum facere, non habente exitum spiritui. Verum ex quacumque causa singultus fiat propter hepatis inflammationem, semper malum est; quoniam eam maximam atque pessimam esse significat, *Galen. auctoritate, præcitato aph. & comment. aph. 58. 5. lib.* Si vero iocinoris inflammationem vehemens atque acuta febris comi-

8.
Signa prognostica.

9.

Singultus in hepatis inflammatione malum.

10.

II.

comiteretur, malum quoque est: nam valenter idem viscus inflammatum esse ostendit. Quemadmodum si eadem febris exigua & non acuta fuerit, minus malum portendit, quia exigua quoque inflammationem significat: propterea quod inflammationum magnitudinem perpetuo febris ex proportionem consequitur, *Gal. teste 2. prorrh.* At eadem febris acutissima, vehementissimaque si fuerit, ac vehementissima siti laborantes excruciet, pessimum erit indicium, quoniam inflammationem erysipelatis participem, aut ipsummet erysipelas in iecinore ortum significabit, quæ febres magna ex parte (*ut liquet 5. de loc. affect.*) in tabem transmutantur. Idemmet *Gal. 10. meth. med.* de iecinoris inflammatione scriptum reliquit, quod si in abunde calido & sicco corpore generetur, potissimum, si notatu digna fuerit, omnino æger morietur. Et quamquam sanguis e naribus fluens (*ut paulo ante diximus*) post signa coctionis bonum sit; & coctiones in urinis, tum alia signa critica sint salutaria: vidimus tamen nos aliquando, quibus labia ante coctionem exulcerabantur, periisse, & etiam post coctionem similiter mortem incurrisse. Ideo si in abscessum vertatur, lethale est, cum ad carnem usque hepatis corruptio pertingat, ut postea exemplo declarabimus: ut etiam si pus simile appareat faciei olei, vel ut amurca fluxerit, ex incocta putredine proprie illius substantiæ, *ut exemplo ostendimus in lib. nostro de febribus.* At si pus intra tunicas contineatur, nihil patiente substantia hepatis, vacuato pure liberantur omnes. Neque enim necessarium est hepate suppurato hominem interire, nisi magnum sit virium. Vnde dicit Hipp. 2. de morbis, Pulmone suppurato, vel hepate, si album & purum pus effluat, fibris etiam cruentis intermistis, ægrum conualescere; si vitello oui simile, & subviride pus, crassum ac subfœtidum, mori. Nam pus album alteratricis robur ostendit, & victoriam naturæ. At phlegmon quoque seu apostema periculosius est in cauo, quam in gibbo: vomitum enim excitat periculosum; & sitim, & colicos dolores, & nauseam mouet. Alii gibbi vomitum magis exitialem putant, ex loci nobilitate ac actionis dignitate, quoniam vis concoquendi ac distinguendi dispensandi; in ea parte a natura sita est: nam & principalibus membris annectitur: vnde eorum communicatione cauo præfertur. Sed iecoris duritia omnibus affectibus deterior habetur, si malum præsertim vetus est. Quicumque fuerit abscessus qui in vomitum transit, fere nunquam sanatur. In quavis quoque iecinoris inflammatione, si crudo etiam num morbo, & viribus infirmis, alui oritur profluuium, malum. Inimica etiam corporis liquatio, præcipue si vel raucitas, vel multa simul tussis accedunt. Mortiferum est spumantem sanguinem excreari, vel spurum statim subputridum, vel syncere biliosum esse. Sanguis tamen vomitione redditus salutem interdum denunciat: id semel vidimus in muliere annos paulo plus quam 40. nata: quæ etiam per inferius sanguinem excreuit, & fuit nostra industria curata. Ita & purulenta deiectio quibusdam salutem attulit. Verum si huic

12.

13.

morbo ventris fluxus superuenerit, nisi fuerit iudicialis, lethalis est. Si iecoris abscessus ad lienem transitum fecerit, non improbat, quod e diuerso perniciosum est; nam vomica iecoris nunquam ferme sanatur. Ita & singultus, sequens (*ut paulo ante admonuimus*) apostema hepatis, ut plurimum mortem prænuntiat. Et apostema hepatis si prolongetur perducit ad hydropem, ut multis exemplis conspeximus. Ita si inueterato apostemate sequatur ventris solutio, lethale quoque malum est. Neque aliquis euadit ab apostemate duro & confirmato: multoque minus si carcinoma adfuerit. Nam velocius interficit, quæ admodum & exitura notabilis propinqua magis desperationi existit, quam spei. Quanquam alia apostemata hepatis, ut plurimum sanantur, si recte regantur, potissimum si neque in principio curationis error committatur. Quæ vero apostemata sunt dura, melancholica, diuturna, indurata, desperata habentur: quanquam secundum aliquos, ab initio curari possunt. Omne enim apostema hepatis, quod non curatur ab initio, causa hydropis existit. Ita omne apostema generat oppilationem: oppilatio indigestionem: indigestio aquositate: aquositas hydropem, *teste Gordonio: quemadmodum & citatur a Gal.* Vbi maxime coniuncta est debilitas expulsiva hepatis, & in eo, quod ad saniem conuertitur, *dicente Auicenna*, non speres salutem, cum hepar sit fons virtutum naturalium; ad quarum perditionem sequitur mors. Post apostemata dura & ad saniem conuersa, difficilius curantur biliosa, ob læuitatem accidentium: deinde pituitosa, postea sanguinea: licet pituitosa habeant remissiora accidentia, quam sanguinea: sunt tamen deteriora, ob diuturnitatem & materiæ inobedientiam. Sed hæc postea exemplis clariora euadent. Nunc quædam addamus, quæ ad

14.

15. Curatio.

V. Bna raste.

generalem curationem inflammationis hepatis pertineant. Exquisitissimo omnium primo victu hic opus est; æque ac si ventriculus sic laboret (*Galen. teste*) quoniam munus eius visceris tot animamali est commune, acciditque omnibus animalis partibus maximum incommodum, ubi non probe concoctum alimentum sit, siue non in sanguinem rite fuerit conuersum, *ut ab eodem Gal. 13. meth. med. dederetur est*: qui alimentum ibidem tenue & non mordax elegit; & abstinet ob angustiam venarum in iecinore, ab astringentibus, quæ constipant: & glutinosi cibi, qui obstruunt. Præsanam, & eius cremorem, commendat: alii & in iure gallinaceorum pullorum coctam, si vires imbecilles sint, & phasianorum, & sternarum, iuuenum columbarum, perdicum, turdorum, merularum: tunc gustet, vel contusum earum carniem, in tubo vel cichorio, lactuca, incoctis: præcipue si inflammatio feruens sit, seu erysipalatis particeps. Ab astringentibus cauebimus; ut succo granatorum & alica. Quod cum vniuersaliter in omni phlegmone iecinoris sit verum, maxime tamen verum est, ubi cauæ partes laborant: quoniam integris viribus adhuc eo alimenta perueniunt, siue astringant, siue obstruant: sed & meatus, *teste Alexandro*, quibus

16.

expurgatur bilis in ieiunum, obstruunt, contrahuntq; tumores, & ad discutiendos difficiles ipsos reddunt. Adde quod semper fames elui debent, quæ in venas effluunt in apostemate, ob id malum punicum & Alexander & Galenus vitans. Sic & vinum pro potu summopere vitandum, ut quod omni feruenti inflammationi in totum sit aduersum, eodem Alex. auctore, sed pro potu aqua hordei utendum, aut aqua, in qua prius cichorium aut intubum fuerit decoctum, vel etiam parum radic. glycyrrhizæ. Confert item, ubi eiusdē visceris gibba fuerint inflammata, pro cibo ptisanam, aut eius cremorem, cum apii decocto exhibere, quoniam modice urinam mouet; & semina citrulli, peponis & magni cucumeris: Hæc enim & per urinas vacuant. Reliqua vero, quæ ad victus rationem pertinent, si ad caput de ventriculi inflammatione confugas, scripta reperies. Interea præcipue somnus in principio accessionum vitandus; quoniā fluxiones auget; quæ eo tempore maxime ad intra feruntur. Ut & cibare eo tempore maxime lædit, *11. meth. ultimo.* Quod ad reliquam generalem curationem attinet, curatio ipsa resumet eosdē scopos, atque in ventriculo: nempe ut inhibeatur generatio phlegmones, & sanetur, quod ipsius est factum. Inhibemus vacuando & auertendo fluxionem, si ex ea causā oriatur; & astringendo & roborando partem ne recipiat. Fiet autem vacuatio & auersio, ex vena basilica dextra, ut rectitudo seruetur. Sic enim natura optime agit, ut *experientia monstrat in lib. epid. & testatur Galen. lib. de vena sect. & 3. de crisib.* quod vero reuellat & vacuet, etiam docet Galenus *11. cap. lib. 13. method.* Quod si neque interna cubiti vena se ostendat, etiam media vel humeralis secanda, *13. method. quod & sequuntur Aetius, Paulus & Alexander.* Rondeletius quoque inquit: Curantur inflammationes hepatis & lienis larga sanguinis missione, e directo partis affectæ. Iuxta eundem cucurbitulæ quoque sunt in utraque affectione coxis affigendæ, ad diuersionem. Modum vero vacuationis, tum ex redundantia modo, cum ex ætate, tempore anni, natura, regione, consuetudine, & ante hæc ipsa laborantis virtute, inuenies: ut *eidem Galen. visum est,* quoniam, si id ferre queunt, semel quantum satis est, detrahendum; si vero non, per vires partium, *teste Aetio.* Hæc autem venæ incisio oportune in prima & secunda die contingit: si vero dolores vrgeant, & adsint vires, etiam septima die venæ incisionem facimus; ut ipse inquit, & nos etiam nunc exemplis docuimus, si malum adhuc magis protractum fuerit, modo vires ferant. De purgatione satis dictum est in Obseru. præcedente: quæ licet in principio nō ita conueniat, tamen quarto die facienda. Etiam aliquando in principio, si aluus adstricta est; cum lenientibus tamen medicamentis. Quod ad topica attinet, statim post venæ sectionem in principio ad ea confugiendum est, quibus vacuari possit, id quod in phlegmone obfessa parte continetur. Hæc namq; communis est indicatio curationis omnium phlegmonarum, (ut sæpe diximus:) nam priusquam totum cor-

Curatio generalis.

17.

Vena sectio.

18.

Purgatio.

Topica.

pus a recrementis liberum fecerimus, cauendum est, ne ea applicemus, ut Alexander inquit. Pessime igitur faciunt, qui in corpore repleto ante venæ sectionem ea applicant. Si enim hepati apponantur aliqua frigida, ante venæ sectionem: metueda est maior conculcatio humorum, quo postea malum minus resoluetur. Et ita in topicorum adhibitione duo perpetuo obseruanda sunt, quorum primum est, ne frigida admoueas, etiam si inter initia adhibeantur; alias magis noxæ, quam utilitatis causæ erunt. Auctores volunt apponi eadem astringentia quæ ventri; tum fots ex tepentibus, ut Galenus scribit. Contra *10. lib. cap. 7.* utitur etiam in phlegmone, contra rationem nostram supra, ubi diximus verificari de erysipelate dictū *libro 10.* Respondeo, verum est, quod diximus, securum vsum non esse, nisi in erysipelatis: at in phlegmonis non tuto fieri, sed cura coacta, præponendo minus malum; ut frigida poratur, ob periculum, ne æger incidit in marasimum. At *lib. 9. c. 5.* prohibet in phlegmone, suadet in erysipelate. In phlegmone itaque actu frigida non sunt applicanda. Secundum est, quod eadem medicamenta nunquam absolui debent ab his, quæ medio-criter astringendi vim habent, indicatione sumpta a parte affecta, propterea quod iecur animalibus altricis facultatis principium sit, & venosum ab hoc oriatur genus, ut ideo eius robur seruandum sit. Quo fit, ut etiam eo tempore, quo quicquam amplius non influit, nec illud quod in laborante particula continetur repelli possit: adhuc mixtæ facultatis esse debeant medicamenta, ut ex eodem Galen. liquet præcitato *lib. 13. method.* Nam coeuntibus vna contrariis indicationibus, compositum quoque esse medicamentum oportet: illo etiam tempore clysteres, iidemque leues, iniici debent; maxime si non sponte egerat aluus. Aetius in primis illinit regionem hepatis extrinsecus oleo rosæ aut œnanthino, aut myrteo: procedente tempore, eodem oleo, seu cydoniorum cum mastichino aut chamæmel. & sumpta a situ visceris indicatione, parum aceti aut vini albi admisto. Eodem tempore adhibet cataplasmata, vti & Paulus facit, ex farina hordei, fœnugræc. cum palmulis, cotoneo, meliloti flor. absinth. & chamæmelino aceto adiecto, vel in mulsâ decoctis. Et si vehementior sit ardor, mala cotonea & rosaceū oleum aut cydon. vna cum foliis plantag. cichorii, intubi addunt; & fots parant: de quib. eosdē auctores consule, & Rondelet. qui multas formulas habet. Cum autem iam remittitur morbus, ad ea, quæ dissoluunt, mistæ tamen materiæ cum adstringentibus, deueniemus; qualia sunt, quæ supra descripsimus: cerata quoque & cataplasmata ad ventriculum. Illud quoq; perpetuo animaduertendum, quod quantum inflammatio a principio suo recedit, in tantum relaxantia, seu digerentia vires præsidiorum adstringentiū vincere debent; licet semper (ut diximus) ea mixtæ facultatis esse necessum sit. Procedente vero tempore, si in gibba visceris parte phlegmone cōsistat, ubi phlegmone iā concoquitur, non solum eis, quæ modice urinas mouent

19.

Quæ animaduertenda sine circa topica medicamenta.

20.

21.

uent (vt diximus etiam antea) sed etiam valentioribus vtilicebit; asaro, inquam, nardo Celtica, phu, hoc est, valeriana, petros. Smyrnio & meo ex Gal. *audoritate*: insuper oxymel dandum, ex Paulo; vel cum decoctis herbarum dictarum, syr. de byzantiis, de tribus rad. de eupat. Si in cauo, tempore, pcedente, potius purgabimus, eodem modo, quo antea docuimus. Verum vbi neq; eisdem inflammatio cōquieuerit, seu ad suppurationem permutterur, adiuuare naturam oportet, vt quam celerime puris generatio fiat. Cum autem perfecta suppuratio fuerit, abscessus quoq; rupturam adiuuare oportet, & post eius eruptionem, per eandem viam, per quam puris transmutatio contingat, iuuanda quoq; natura erit siue per sedem aut urinā, aut etiam os, transmissio fiat: quibus vero medicamentis eadem perficere oporteat, copiosissime ab Aetio, cap. 4. lib. 10. scriptum est, ac etiam a Paulo præcitato loco. Si vero in scirrhi naturā prædicta inflammatio vergat, eius curationē postea docēbimus. Quod si fluxionis ad ipsum iecur causā ex ipsomet oriatur, adeo, vt propterea ad ipsum multū cōfluat sanguinis, ac phlegmone generetur, ne amplius phlegmone increseat, auferri hæc quoq; causa debet primo. Hoc autem bñfariam esse poterit, aut propter aliquem calorem præter naturam in ipso iecinore existentem (& huc transferri possunt quæ de calida intemperie ante dicta sunt) aut propter eiusdem dolorem (quibus autē dolor auferretur, postea latius dicturi sumus, cum de dolore hepatis agemus.) Quæ vero ex his causis phlegmonem excitat, eam prius pro eius curatione auferre tentabis, vt eodē 13. meth. med. a Gal. scriptum est: & deinceps ad prædicta topica medicamenta te conuertas. Quæ, inquam, omnia multo adhuc clariora exemplis infra dicendis patebunt.

OBSERVATIO IX.

De iecinoris inflammatione, cum obstructione, & febre continua, licet lenta, tendente ad apostema, in quo metus erat etiam de suppuratione.

1. Iohannes Georgii, faber, monoculus, vir triginta octo annorum, potor ceruisarius, si quis alius, egregius, Alcmariæ, in platea Lutconteropia sic vocata, habitabat: qui, cū apud amicos largiter bibisset, anno 1547. mense Maio, in hepatis inflammationem incidit, simul cum obstructione, tendente ad apostema; ita vt foris manifeste appareret tumor secundum lineamenta rotundus; vt ex hoc signo facile de iecinore inflammato, non autem de musculis externis, iudicare potuerim. Cui & aderat dolor vtrumque vehemens, cum grauitate quadam & febre continua, licet lenta, & non valde acuta, ex materia biliosa & pituitosa, cum pauco sanguine admixto, vt mihi apparebat. Ideo glande ex hiera picra, sale & melle, diagridi granis aliquot cuspidi impositis, aluum ad excretionem irritauimus, cum durior esset: mox sanguinem ex vena basilica dextri brachii ad vncias tantum sex extraximus, cum febris continua lenta esset, ex materia crassiore, pituitosa & biliosa: & quamuis plethora similiter laboraret, & victu pleniore prius vsus esset, tamen ad vncias

tantum sex detraximus, cum temperamentum eius naturale ad bilem potius, quam ad alios humores inclinaret. Deinde imperaui, vt sequenti potione vteretur vsque in quartum diem, bis in die. ℞. corticum radic. fœniculi, glycyrrh. ana ℥ ss. endiu. cichorea cum rad. ana manip. j. cassia, scabiosa, dentis leonis, chamæpit. buglossa, ana man. ss. flor. cord. flor. ros. rub. ana p. j. semin. anisi, semin. 4. frigid. maior. ana ℥ j. hordei mundati man. j. prun. damasc. quart. j. fiat decoct. in aqua commun. pro lb j. ss. colat. addendo syrup. de endiu. de cichor. cum rhabarb. syrup. de byzantiis, ana ℥ j. misce. Interea extrinsecus locum dolentem inunximus oleo ros. cotoneor. chamomill. & anethino simul mixtis. Quarto vero die hoc præscriptum est medicamentum. ℞. diaphœnici (videbatur enim adesse materia pituitosa vna cum flatu) ℥ iij. elect. de succo ros. ℥ ij. diapr. lenitiui seu simplicis ℥ ij. ss. dissolue cum ℥ iij. aqua end. addendo syrup. capill. vener. ℥ j. misce. qua potione septies exoneravit aluum, cum maxima alleuiatione. Interim quotidie ter quaterue sequenti vrebatur fotu, cum panno laneo in liquore infra scripto intincto, & expresso, idque moderate calide: ℞. flor. chamomill. meliloti, flor. ros. rub. (rosas addebam ad roborationem visceris: nam tunc mihi in mentem venit illius Historiæ Galeni 13. meth. cap. 9. de Atalo medico Sorani discipulo, qui perperam hepatis phlegmonem curabat: & similiter de apostemate ventoso, quod Gal. phlebotomia curabat, & humido pharmaco, ex chamæmelo, ruta & semine agni) ana p. j. semin. anisi, fœnugraci, lini, ana ℥ j. ss. santalor. rub. ℥ j. coquantur in aqua simplici q. l. & colaturæ expresse adde aceti optimi ℥ j. aqua end. ℥ ss. iterum bulliant leui & vnica ebullitione; & fiat epithema pro hepate. Quo solo miraculi instar inflammatio, tumor ac inflatio, & omnis dolor euanescere; ita vt neque apostema subsequutum sit aut abscessus. Atque iis tantum remediis dictis sanitatem pristinam æger hic noster consequutus est: quemadmodum & nauta ille, qui in nosocomio Delphesi longo tempore prius ex inflammatione decubuerat, quæ inflammatio ad duritiem conuersa erat, ita vt apostema in scirrhum mutaretur (post venæ sectionem & alia remedia apta, etiam topica multa, & fotus, & epithemata) cerato ex emplastro de meliloto, de mucilag. & vnguento seu cerato santalino, partibus æqualibus mixtis, adiecta pauca mastiche, ros. & oleo chamomill. & liliaceo, etiam a duritie satis diuturna curatus fuit, vt in scirrhu non transierit, magna cum nostra laude, & a dolore & inflammatione, etiam tumore diuturniore, ac duritie, egregie curatus fuit.

S C H O L I A.

Apostemata hepatis, iuxta eos, qui Arabum decreta sequuntur, easdem distinctiones, differentias ac species fere habent cum ventriculi apostemate; quamuis & ea, quæ in hepate fiunt, distinguuntur penes locum, vt nunc diximus, in quo fiunt, vel in gibbo, vel in cauo, vel in partibus suspensoriis, vel in membrana hepar cingente, vel in venis eius, vel substantia. De eo,

4.
Apostematum
hepatis differe-
ntia.

quod cauum vel gibbum occupat satis diximus. In membranis autem magis dolent, & febrem ardentiorē experiuntur. In hepatis carne pulsus mollior, febris ex putredine diuersa, magis putrida, & dolor magis grauans: quibus modis differat a pleuritide, & a musculis abdominis, dictum est: nam tumor in apostemate myrach seu abdominis leui compressione sentitur; hepatis vero, cum in profundo sit, magna compressione. In musculis visui subiiciuntur: in hepate minime, nisi in gibbo ut hic in macilente figura lunari, in musculis oblonga, nec illi ita siti aut febre excruciantur. Differt quoq; apostema hepatis ab apostemate venarum mesaraicarum, quamuis in signis plurimum conueniant, scilicet febre, grauitate, dolore & similibus. Est tamen apostema venarum mesaraicarum cum minori febre, minori grauitate: & ipsum sequitur fluxus chylosus ut plurimum, & magis extenuatio quam cachexia aut hydrops, quæ hepatis apostema sequuntur; neq; tactui subiacer, uti hepatis apostema. Alia quoque distinctio est penes materiam ipsam; nam est vel sanguineum apostema, vel biliosum, erodensq; vel pituitosum aut melancholicum, vel vëtosum, modo per viam paulatinæ congestionis, modo per viam defluxus. *Vide Gradum & Arculanum ac alios.* Quibus & hæc diuisio accedere potest, modo magnum, modo paruum, modum mediocrem. Et quod ad distinctiones temporum attinet, aliud est in principio, aliud in augmento, statu aut declinatione; aliud recens, aliud diuturnum; benignum, malignū, corrodens, corrumpens. Quibus additur & differentia terminationis, ut per viam vrinæ, sudoris, fluxus sanguinis narium, cū sensibili expulsiōe: idque in gibbo frequenter; in cauo per fluxum ventris, vomitum. Vel resoluitur, vel maturatur, ac abscedit, & in pus vertitur: vel in scirrhum aut duritiem transit; aut corrumpitur: qualia quoq; de aliis inflammationib. & apostematibus dicta sunt prius, cum de ventriculo ageremus. In apostemate calido vel abscessu, oculi sanguine vel flaua bile suffusi, lingua rubra, & crescente morbo nigra, facies decolor, & aluus vario colore turbata: animus deficit, singultum & frigus in membris exterioribus: vrina purpurea, subrubra, spissa, cū liuore, æger valde sitit, *iuxta Hippoc.* & in calido abscessu aut duro, dolor ad iugulum ascendit, & annexas scapulis costas; præcordia contrahit: æger supinus, aut in dextro latere tantum, quiescit: in sinistro magis dolet: febris importuna ac sitis; vrina lucida, modo crassa. In frigido grauitas sub hypochondriis dextris, arida tussis, non sine febre ac siti, sed leuiore, facieq; pallore. At in phlegmatico, color plumbeus corporis, facies ac genæ inflata, pulsus mollior; febricula leuis, sine siti, vrina crassa, alba; cibi tædium, nausea: quib. si vitæ ratio & alia cōsentiant, certius est iudicium. Si a melancholia, maior durities, pōdus a cibo; vrina tenuis, diluta; pulsus tenuis, nullum cibum desiderium, color fuscus totius corporis. Ex bile si fiat, ea, quæ de erysipelate diximus, huc transferenda: inflammatio ingens est, rabe membra conficiuntur; vi-

gilæ, excedens sitis, ardor, lingua arida citrina, febris continua, & de tertio die magis exasperans, pulsus durior. Ex sanguine, dolor minor, quam in bilioso, linguæ color rubens, postea denigrescens: vrina conturbata, rubra, superius liuescens: venæ extuberant; pulsus plenus, magnus, velox, frequēs; potiusque vndosus quam ferrinus: maior tumor, minor grauitas, dolor magis extendens, quā pungens; febris conclusa, continua. Ventosum dignoscitur ex dolore extensiuo absq; grauedine, cum pauca aut nulla febre. Signa vero temporum apostematis hepatis, uti indurationis, resolutionis, permutationis, & maturationis, habentur ex iis, quæ de pleuritide a nobis tum aliis auctoribus dicta sunt. In principio accidentia sunt remissa. Postea intenduntur: deinde remittuntur cum resoluitur. Et si dolor nō diminuitur ex remediis aptis, tunc ad saniam conuertuntur, & magna ex parte lethale habetur, ut de vlcere hepatis dicemus. Hoc satis est hic admonuisse, si increfcit phlegmon ac sentitur suppurare, dolor increfcit, hypochondria magis protenduntur, frigore enormiter corripitur æger: cui in sinistram latus recumbere grauissimum est, aperto pure, per vesicam subito putris materia prorumpit, vel membrana disrumpita in concuum ventris labitur, ut de vlcere latius dicendum. Si induretur, grauitas sine febre manet, & extenuatur corpus, & vrina minuitur. De prognosticis signis dictum est prius: præſagientia habentur ex corporibus habentibus venas strictas, qualia sunt corpora pingua, parata incurrere obstructions, intemperaturas, dolores, & hepatis apostemata: & quicunque vtuntur cibariis crassis, viscidis, potu vini potentis, & a cibo inordinato motu, huic malo obnoxii sunt. Ex quibus iam dictis etiā facile causæ omnes patent apostematum hepatis per essentiam; ut sunt, mala intemperies calida, humores ad se attrahens; frigida, debilitans coctionem & vim expulsiuam; oppilatio, retinens & figens humores in hepate; dolores, materiā trahentes ad locum. Vel fit per cōsensum, vesica fellea obstructa, & felle ad hepar regurgitante: vel humore melancholico ex splene ad hepar transeunte, vel ab aliis membris ex vtero mensibus restrictis; ita & fit a renibus, vel ventriculo, chylo nō bene præparato, ut sanguis ex eo fieret: aut ab hæmorrhoidibus restrictis. Sed præter has alia etiam sunt causæ externæ; ut percussio, casus super hepar, ventosa corpore pleno hepate, ut sæpe contingit, a medicis imperitis admota in hepatis dolore, quæ attrahit materiam apostema inferentem, etiam in plethoricis ad sanguinis e naribus fluētis restrictionem: fieri etiā potest ex calidis emplastris vel epithematibus, hepate corpore plene impositis; vel quoq; ex nimis frigidis vnguentis atq; fotibus, constrictione materiā impingentibus. Suntq; & hæ causæ primitiue, ut torsio, percussio, obuiatio, & strictio fortis ac continua zonæ. Vel sunt internæ, ut oppilationes, inhibita materiæ euēctatio, vel compositio aut paruitas hepatis. Ad internas etiam pertinet antecedentes, multus sanguis calidus, bilis, vsusq; calidiorū ciborum, intemperies cali-

Differentia inter apostema hepatis & abdominis.

5. Differentia apostematis hepatis & venarum mesaraicarum.

6. Calidi apostemati & abscessui signa.

Frigidi.

Phlegmatici.

Melancholici.

Biliosi.

7. Sanguineas.

Ventose.

Signa temporum apostematis hepatis & maturationis & indurationis.

8.

Signa præſagientia.

Causas

9.

Externæ.

Primitiue.

Internæ.

Antecedentes.

Lib. XI X. De Hepatis affect. Obs. X.

calida cum febre, bilisq; retentio in vesica fellea; cum alia multa: cibi styptici, viscosi, frigidi, exercitium a cibo, venus, phibitio euacuationum cōsuetarū: ita & causse ventositatis & debilitatis parent ex iis, quæ de ventriculo diximus. Cōiunctæ causse apud Arabes sunt ipsi humores: de quibus omnibus consule Valesc. & alios practicos, Arculanum & Gradum: qui & varias curandi intentiones ponunt, exque iis alii septem, ut *Gatenaria*: nēpe, vitæ institutum, quodq; augmentum apostematis inhibeat, *diuersionem, repercussionem, digestionem, euacuationem, resolutionem, remotionem male intemperiei*. Alii in tres partes tantum curationē partiuntur: in eam, quæ causam antecedentem respiciat ac tollat; *deinde* in eam, quæ cōiunctam respiciat: *denique* in illam, quæ vtriq; communis sit. De quibus vide *Arculan*. Primam absoluit euacuando per venę sectionem, & per euacuationem ventris, in bilioso pituitoso, melancholico: quamuis alii præponunt syrupos digerentes, deinde purgāt, prout humores in causa fuerint; etiam postea urinam cient, pro ratione materiæ; ut apud eosdē videre poteris: diuertunt frictionibus, ligaturis, cucurbitulis. Quod ad secundam intentionem attingit, utitur repercussiu in principio: de quibus etiam canones addūt, ut *Valesc* quoq; facit: ut apud eundem, cum *Arculanum* legere poteris. In augmento, vsque ad medium status, iisdem repercussiu addunt resolutiua: & in fine resoluentia, modo apostema resolui possit; alioqui, si maturetur, eam iuant, uti *Arculan* facit. Tertiā intentionem, vtriq; communem, perficiunt curatione accidentium, & regimine sex rerum non naturalium, aliter tamen procedendo in apostemate sanguineo, aliter in bilioso aut pituitoso, aut melancholico. Sed ne hic longiores simus, eosdem auctores consulto, tam de iis, quæ intus, quam extra adhibeantur, pro ratione humoris abundantis, & inflammationem aut apostema inferentis.

OBSERVATIO X.

De hepatis apostemate in abscessum commutato, mox in vlcus malignum, deinde in esthiomenon ac gangranam, ac tandem in mortem.

FAmulus ceruisiarii cuiusdam, Delphis misere ultra annum lecto incubuerat, in ædibus, quibus tria candelabra pro insigni erāt, vir annos triginta sex natus. Hic per integrum annū dolore hypochondrii dextri conficiebatur, atq; in autumno febrem habuit non obseruantem typum, lentam tamen; qualis in corruptela substantiæ iecoris fieri assolet. Durauit deinde hæc febris, typū non retinens aut obseruans, per totam hyemem sequentem, quæ neq; hominem in vix reliquit, & perdurauit deinde ad æstatem vsque. Fuerat autem hic vsus plurimū & diuersis medicis, uti in morbis chronicis hic maxime fieri solet: ideoq; ei plurima, eaq; varia, a multis & variis descripta fuerat. Cum autem per annum, quasi tabe consumtus foret, maximos dolores perpessus, ac tunc faciem ictericis similem haberet, qualis contingere fere solet omnibus ictericis, tandem collegam

meum Cornelium Ericium, alioqui medicum doctissimum, accersuit, sed non diu: eoque repudiato, cum opem non sentiret, variorum medicorum empiricorum opera vsus est; ita ut tandem ad extremam atrophiam deueniret. Cumque ita per annum tabidus miseram vitam traxisset, sub æstatem anni 1561. cum forte fortuna ad alium ægrum inuisendum, qui in iisdem ædibus, in quibus & hic famulus decumbebat, accitus essem, me quoq; consuluit. Sed homine inspecto admirari cœpi, cum in vita virum magis consumtum macilentiorēq; nunquam vidissem, cui tantum pelliculis rugosa vna cum ossib. restabat, vniuersa carne consumpta, non aliter quam pictores *Diuum Hieronymum* macilentum & ex sanguinem depingunt. Iecore enim ita contabescente totum corpus tabe absumentum conspiciebatur. Deinde huic quidem viro non solum facies erat citrina, sed vniuersum corpus flauum euaserat, etiam albedine oculorum in citrinum colorem plane conuersa; quod & ictericis & ictericis euenire solet. Aderat & huic tussis sicca, admodum molesta, hominem omnino conficiens. Hypochondrium deinde dextrum apparebat durum & valde subtumidum, & omnibus conspicuum, musculis abdominis plane extenuatis & consumtis. Urina vero renuis erat, sed supra modum tineta ac ignea, ut vinū rubrum ac diaphanum videretur. Sed & oris siccitas eum molestabat, præsentē febre hectica, ac pulsu vix apparente, & magis sub noctē intensā. Id quidem recte docuit *Gal. lib. 1. aphor. 12. in commento*, suppurationis tali febre laborare; cum sic scribat: Et morbo quidem laterali & phrenitidi magna ex parte per triiduum diem accessiones fiunt: suppurationibus autem, quæ ventri eueniunt, aut hepatis & tibi, cotidie & magis ad noctem: qui vero ex liene laborant, & omnino ex atra bile, per quartum. Ceterum huic ægro modo aluius adstricta erat, modo admodum liquida, & plurima biliosa liquationis instar egerebat: postea iterum fuit arida & sicca admodum aluo. Præterea aderat & cibi fastidium, sitisque inexhausta; ita ut aquam frigidam ac gelidam magna in copia præter consilium medicorum hauserit. Ad hunc, postquam ultra annum laborasset, ingressus, cum ab initio huic sanguinis detractio esset prætermissa, idque male in hepatis inflammatione, & apostemate; nunc id nullo modo licuit, in homine iam tabe & hectica febre consumto, ipsoque humido radicali etiam absumto. Ego vero apostema in hepate confirmatum atque incurabile pronuntiaui: & non diu post, meam opinionem confirmauit, cadauer sectum post mortem. Nam tumor admodum durus paucis diebus e regione hepatis ita in immensum excreuit, ut omnibus appareret: non sine dolore: quod signum erat abscessus futuri: nam si simplex scirrhus fuisset, minus doluisset. Quare prædicto prognostico eum pro deplorato habuimus, cum apostema hepatis confirmatum non curetur. At postea cum idem tumor laxior fieri inciperet, febre magis crescente, suppurationem expectauimus: ideo per chirurgum, qui

tunc etiam aderat, ea apponi iussimus, quæ sup-
 purationem iuarent: nempe hoc cataplasma. *Rad. althææ. mundata 3 ij. farina hordei 3 ij. farina
 fenugraci, sem. lini, pinguedinis anseris, porci, an. 3 j.
 cyperi, schœnanthi pul. an. 3 iij. ammon. in aceto dis-
 soluti 3 j. olei lilior. mastichin. an. 3 j. fiat cataplasma.*
 Postea cum apostema maturum apparebat, & ma-
 teria satis deducta erat ad sanicem, remittebantur
 quidem prædicta accidentia, grauitas tamen ma-
 ior remanebat, cū materia in vno loco magis con-
 gregata videretur, & tactu lenitas & mollicies sen-
 rireretur, duritie, quæ prius sentiebatur, in totum
 ablata. Statim autem cognouimus ex dolore re-
 deunte, ruptionem appropinquare, punctione &
 febre rursus incremente, & grauitate maiore.
 Cum tamen per se non rumperetur abscessus, vt
 chirurgus ruptionem iuaret imperauimus, & vt
 emplastris superscriptis, tū aliis maturatiuis, qui-
 bus ad tempus vsus erat, immisceret simum co-
 lumbinum, fermentum, cæpas & narcissi radicem
 & similia; vtq; æger sese supra latus velociter mo-
 ueret. Aliqui auctores, vt Gradus, vt facilius
 rumpatur, clysterem iniiciunt (vt Gradus iubet)
 satis attractiuum: & frictiones adhibent versus
 partem anteriorem: quamquam illi (vt Serapio
 iubet) melius & tutius per viam vrinæ, cum iis,
 quæ vrinam ciunt, materiam deducant. Quod
 etiam commodius est hoc in loco, vt nos fecimus,
 cum apostema in gibbo magis videretur: in cauo
 tamen secessus magis vtilis: de cuius partis absces-
 su etiam dubitabam, totumq; hepar infectum es-
 se; ideo per aluum etiam materiam deduximus.
 Verum cum eiusmodi ingens apostema nō rum-
 peretur, chirurgum præsentem incitauimus, vt ad
 incisionem procederet; sed in corpore debili &
 exhausto id tentare noluit, vel non audebat: exis-
 timabat enim, quod tandem per medicamenta
 apposita rumperetur. Verum cum illud non suc-
 cederet, & escharam quasi induxisset, denuo me
 in consilium adhibuit. Ego autem cum ex signis
 præsentibus animaduertirem, quod pus totum
 cauitatem ventris occuparet, potissimum e regio-
 ne hepatis, vbi tumor ingens laxior apparebat (*nā
 motio puris & fluctuatio quadam exaudiebatur*) vl-
 cus iam factum in hepate, malignum, putridum &
 corrosiuum iudicabam, quod hominem subito
 e vita tolleret, nisi vltio (vt veteres medici facere so-
 lebant) vel incisio aut apertio statim fieret scalp-
 ello vel phlebotomo aliquo: quæ licet etiam in ho-
 mine deplorato & viribus exhausto periculosa
 haberetur; tamen tentandum fore, ne æger statim
 ex putredine puris intus collecti exspiraret. Ideo
 & secundus chirurgus aduocatur, qui incisionem
 statim agendam censuit; quod & mihi vtile vide-
 batur: præhabito tamen prognostico, quod cura
 coacta & periculosa foret; attamen tentanda, ne
 vlcus in peius procederet: interim si fieret, atque
 æger animo delinqueret, atque sic vitam finiret,
 id in manu nostra non esse; cum vires exhaustæ
 essent: interea potius anceps, quam nullum reme-
 dium adhibendum. Ceterum ægro ipso, tum ami-
 cis astantibus consentientibus, chirurgus dextre

suo officio functus est, prima vice post adhibitam
 incisionem sanie virulenta & sanguinolenta abs-
 que pure exeunte. At cum vulnere impositum es-
 set linamentum, quod secunda visitatione amo-
 uebatur, materia viscosa, purulenta, fœtida, co-
 piola emanauit, cum tanto fœtore, vt totam do-
 mum eo impleret, ita vt vix quisquam nostrum
 in cubiculo apud ægrum persistere posset. Cum
 vero materia viscosa foret, vt eo minus exire pos-
 set, denuo coactus est incisionē ampliorem facere,
 quod etiam dexterrime peregit, neq; interiora le-
 sit: exiuit tunc materia admodum fœtida, & pu-
 rulenta, amurcæ similis; vnde coniecimus omnia
 interiora corrupta, & hepar similiter, & ægrū non
 euasurum amicis prædiximus. Illud enim procul-
 dubio mortē prænuntiabat, iuxta aph. 47. lib. 7. in
 hunc modum diuino illo Hippocr. inter medicos
 facile principe, prædicente: Quorum hepar sup-
 puratum adurit, si pus purum fluxerit & album,
 euadunt, in tunica enim hoc pus continetur: si ve-
 ro qualis amurca fluat, pereunt. Similem vero ca-
 sum aliquādo & ipse habui, cui & typhodes febris
 aderat, qui etiam ex eodem abscessu mortuus est,
 amurca post incisionem etiam effluente; cuius hi-
 storiam habes lib. 2. observationum nostrarum, obs.
 37. de febre typhode. Verum in nostro hoc ægro,
 de quo nunc agimus, tertio statim die ab incisione
 caro exterius facta est liuida, ac in gangrænā mor-
 tificata. Solet autem gangræna fieri ob magnitu-
 dinem inflammationis, quæ vitæ, sensus & motus
 partis extinctio ac mortificatio est; quæ tamen
 nōdum integra est, sed iam futura. Quum vero a-
 liqua pars ita languens, vita & sensu carere cœpe-
 rit, tum (*φάρελος vt de sphacelismo ipsius cerebri a-
 lias diximus*) Græcis, Latinis Sideratio is morbus
 dicitur, vt Galeno visum est, in libello de tumo-
 ribus præter naturam. Qui distinguere videtur,
 quod sideratio sit solidorum corporum corru-
 ptio, ita vt ossibus quoq; insit (vt & hic in ossibus
 costarum, corpore iam demortuo ac inciso apparuit,
 vt mox ostendemus,) gangræna, etiam corporum so-
 lidorum, sed ossa non corripuens. Ceterum non
 solum caro externa circa labia incisionis liuida
 & mortua erat, sed & interior: quod cognoui-
 mus ex ingenti putredine & fœtore, qui ex lo-
 co inciso exhalabat, dum vulnus reficeretur, non
 aliter quam ex homine cadaueroso & demor-
 tuo. Præterea dum chirurgus paulatim pus pro-
 pelleret, & ad exteriora labia vulneris deduceret,
 tanta cauitas apparebat promtuarum instar, vt &
 interna tandem etiam corrupta spectarentur. In-
 terea nos per interiora exhibuimus ea, quæ vlcus
 detergerent, & mundificarent: quamquam nihil
 proficeremus, ægro indies debiliore euadente, vt
 tandem nihil per os sumere potuerit. Et vt paucis
 rem absoluamus, septimo die ab incisione peracta
 hic mortuus est. Eoq; demortuo, cadauer, amicis
 id consentientibus, a chirurgo incisum, probis
 viris tum me præsentibus. Est in tota ventris capa-
 citate reperta maxima copia puris valde fœtens,
 vt præsertim in cubiculo, in quo incisio fiebat, per-
 durare vix potuerint. Occupabat autē pus tā partē
 finit

finistram quam dextram sub toto abdomine, vsq;
ad imum ventrem; & repertum est omentum a pure
virulento consumtum: peritonæum quoq; diru-
ptum & putidum cōspiciebatur: similiter & inte-
stina nigredine & plumbeo colore infecta specta-
bantur. Hepar autem durum videbatur, ingentis
magnitudinis; albicans autem circa stomachum,
sed in gibba sui parte, prope costas spurias, nigrū,
exustum ac plumbeum in esthiomenon transmu-
ratum: erat enim hepar circa illam partem, potius
esthiomenatum (*ut ita dicam*) quam ulceratum; &
in parte gibbosa paululū deflectente a costis, gan-
græna infectum. Et vix pus in hepate conspicie-
batur, potius vero in concavitate ventris, quod ab
hepate dirupta membrana eo fluxerat. Præcipua
autem hepatis corruptio erat in parte dextra, ver-
sus costas spurias, & circa musculos intercostales,
qui etiam similiter nigredinem cōtraxerant. Co-
stæ quoq; spuria tanquam igne combustæ ex est-
hiomeno, nigritiem & exsiccationem contraxe-
rant, ita ut carbonis instar nigre adustæ frangeren-
tur. Ulceratio vero ad musculos abdominis pro-
cesserat, magis in parte dextra, qui muscoli simili-
ter tandem nigredine & gangræna infecti erant.

12. In parte vero hepatis esthiomenata, potius virus
& sanies spectabantur, quam verum pus. Mirum
fuit, quod hic tam diu vixerit. Post eius obitum
Iulii, anno 1561. facta apertione cadaveris, hæc
spectauimus. Ceterum, ut tunc nobis quoq; refe-
rebatur, antequam in illam tabidam & siccam dis-
positionem tum dolorem dextri hypochondrii
incidisset, multis etiam antea annis fuerat valetu-
dinarius. Verisimile est hunc prius inflammatio-
ne hepatis laborasse, demum duritiem subsequu-
tam; postea apostema; deinde abscessum, tum
vltus, ita ut ex gibba eius parte esthiomenata tum
gangrænata, sanies ad partes circumstantes fluxe-
rit, & partes adiacentes, ut costas ipsas esthiomeno
infecerit. Et quia ingens fuit abscessus, etiā in par-
te concava, facta diruptione pus etiam defluxit in
capacitatem ventris, intestina, rū omentum ipsum
ac peritonæum inficiens. Diaphragma tamē nullo
modo læsum spectabatur: quare & mente cōstitit
per totum morbi decursum, nisi paucis horis an-
te quā moreretur, cum falso imaginaretur se cer-
uissiam coquere: solēt enim morituri, ut longa ob-
servatione animaduertimus, plerumq; ea imagi-
nari, atq; facere, & illas actiones obire, quas in vita
maxime excercuerūt. Ita hic ceruissiarum famulus,
omnia quæ in hoc opere, nempe coquendi cerui-
ssiam, obire solēt, agebat, aliosq; famulos iubebat,
& vrgebat, ut munia sua quoq; præstarent. Mori-
ruri enim, quæ ad actionem propriam spectant, ple-
riq; peragunt, præcipue morte appropinquante:
quemadmodum etiam contigit cuidam sartori
Alcmariano, nobis familiari (*de quo egimus in libris
nostris de Obser. febrium*) qui moribundus tanquam
acu vestes suæ, artem suam sartinam, gestibus,
mox exspirans, exprimebat.

S C H O L I A.

14. SOlet aliquando inflammationem, si in princi-
pio negligatur, vel perperam curetur, absces-

sus incurabilis hepatis subsequi; & hunc etiam
vltus magna ex parte lethale; cum & apostema
hepatis confirmatum ad suppurationem vergat.
Primum igitur sanguis vertitur in putridam sa-
niem, deinde sanies caloris beneficio in pus abit;
atque ea ipsa puris collectio abscessus dicitur: e-
rumpente deinde pure vltus manet cauum ac for-
didum, si statim non repurgetur. Hac mutationis
serie multa vitia ex vno eodemque fonte dima-
nant: quæ ut variis sunt nominibus insignita, ita
& varias curandi leges habent. Inflammationis
seu apostematis notas iam diximus. Abscessus ve-
ro (qui & vomica dici potest) & putrida sanies in
pus conuertitur: dolores & febres, teste Hippocr.
tum cetera symptomata inualescunt; rigores sæpe
nullo ordine, ut diximus, nullaque ratione inua-
dunt: quos sequitur caloris exacerbatio. Confe-
cto iam pure, omnia quidem remittuntur, ipseque
ardor deferuescit; vites tamen relinquuntur mul-
to imbecilliores, pulsusque frequens, parvus ac
languidus, crebraque animi defectio. Quum ru-
pto abscessu puris illuuias prorumpit, eius tetro
vapore cor obruitur, qui sæpe graui orta animi
defectione ægrum de medio tollit; ex hoc enim
vix quisquam seruari potest. At quum exiguus est
abscessus, si vires satis consent, pus nonnunquam
vomitione prorumpit, aut per alium, ut per vri-
nas profunditur. Sed & interdum fissa vel exesa
iecoris substantia (*ut nunc huius vidimus*) id excidit in
abdominis cauitatem. Huius quoque rei narrat
Gradus historiam, cui fides vix adhibenda, ita scri-
bens: Si dolor non minuitur ex aliqua re, tunc a
postemata hepatis conuertuntur ad saniem (*huius
sanem intelligit pus*) & fiet tunc prognosticon; q̃
eiusmodi apostema sit mortale: quia facta sanie
& vlcere in apostemate hepatis, non est regularis
curatio. Tamen vidi ego (inquit) in vno scholari A-
lemanico, post vltus hepatis & eductionem multæ quan-
titatis carnositatis hepatis: de qua fecimus experien-
tiam multoties, quia concussione facta de eadem sub-
stantia in aqua calida cum virgula agitando, remane-
bat vera carnositas hepatis, tum venulis dispersis per
eam. Et tamen in processu liberatus est, & eius color
in melius mutatus, ita ut curatus fuerit præter spem
meam, & socii alterius medici. Sed tales euacuationes
sunt monstra in natura, quæ aliquoties sunt in homini-
bus, ut dicit Auerrhoes, ut alias retuli in simili casu.
Hæc Gradus supra Rhaf. cap. proprio de dolore hepa-
tis. Verum vltus ex abscessu cōtractum, quoniam
alimento continenter alluitur, perpetuo colluie
multa sordescit, neque vnquam potest sane-
scere, ut recte dicebat Fernellius vir ille doctissimus.
Ideo quoque plurimum dubito de illa Gradi hi-
storia, quamquam fide dignus suo tempore pro-
fessor & insignis practicus, se id vidisse commemo-
rat. Iecoris tamen solida substantia, sperma-
tica cum sit, non magis quam pulmonis repara-
ri potest. Vidimus nos in nosocomio Delpheni
vulneratum militem, qui vltra annum cum dimi-
dio ibidem decubuerat, longo tempore superui-
xisse, at post mortem corpore inciso totam sub-
stantiā pulmonis prius per vulnus fuisse excretam,

15.
Nota abscessus

16.
Historia Gradi
de carnositate
hepatis cum
pure emissæ

17.
Vltus hepatis
cur difficulter
aut nullo modo
sanetur.

ut sine pulmone iam spectaretur, flabello cordis in totum ablato; cuius etiam mentionem fecimus lib. 2. obser. nostrarum de febr. scholio obs. 37. de febr.

Vlcus hepatis
nota & praesentia.

18.

Typhode, sub finem. Vbi igitur vlcus hepatis est, tunc vitiosa est sanguinis confectio; corpus non alitur, sed fere tabescit; putrida, saniosa, & interdum cruenta est alui deiectio, ac sepe quasi ex cadauere facta colliquatio. Vrina quoque sanie perfusa, aut si ea in abdominis spatium penetret, hydrops omnium grauissimus oritur, qui & inguinum pubisque grauitate & manifesto tumore se prodit; si quidem vires tam diu persistant, quod vix certe vnquam vlla observatio notauit. Ideo etiam huic nostro aegro hydrops non est subsequutus, quanquam etiam pus in spatium abdominis fluxerat: sed potius atrophiam totius corporis est concomitata. Ideoque ob esthiomenum vlcus in putridum partem gibbosam, tum totius hepatis substantiam, iecur (ut ego puto) nec vllum sanguinem bonum nec nutritioni utilem, generare potuit; multoque minus potuit ipsum distribuere in venas: unde enormis illa macies totius corporis; quum numquam in vita (ut paulo ante diximus) macilentiorum conspexerim. Ceterum quibus modis suppuratio iuuanda, & demum quomodo maturum apostema sit rumpendum, id satis declaratum est: sed rupta vomica, puris subsequitur repurgatio, & ipsius vlcus curatio. Si vomitu, vel per alium relictiatur, aqua mellis calide danda, si ad vesicam & renes tendat, aqua mellis cum emulsione lactis seminum comm. frigidorum, ubi adfuerit caliditas & exasperatio, propinanda. Sin calor remissior fuerit, radices asparagi, apii, in aqua mellis coctae adiungendae, valet & aqua hordei non excortic. cum sem. mal. & zacch. & aqua lactis caprini, cum zaccharo consolidamus cum thure, mastiche, bolo armen. & similibus, cum aqua mellis, zacchar. aur. endiu. plantag. & similibus. De quibus videas tam veteres quam iuniores.

OBSERVATIO XI.

De hepatis substantia tota purulenta & corrupta post mortem inuenta.

FAmula quaedam, Barbara dicta, Delphis apud Petronellum Brasseriam habitans, cum longo tempore non sine febre decubisset, per me tandem utcumque restituta fuit sanitati, ita ut aliquot mensibus foras prodiret. Verum postea facta recidua, rursus aliquot mensibus decubuit; neque tunc vlla medicamenta adhibuit, nisi cum iam macie exhausta iaceret, cum febre lenta, sitique continua, & fluxu colliquante. Atque cum tunc ad illam accitus essem, tumor circa stomachum apparuit rotundus, ita ut ibidem apostema esse videretur: atque instante iam quasi morte, & remediis aptis adhibitis, etiam extra apposis, nihil iuuantibus, & cum ex tactu pus sentiretur, constabat intrus latere abscessum iam maturum Chirurgus accitus incisionem in moribunda tentare non fuit ausus. At die vno atque altero subsequente, famula obiit die 4. Ianuar. anno 1592. & facta post mortem incisione inuentus est lobus hepatis supra stomachum ascendisse, totius hepatis membrana il-

lata, quae hepar continebat: sed ea incisa, tota substantia hepatis corrupta & purulenta, vomica instat, undique effluxit in capacitatem ventris, cum tanto putore, ut quis diu apud cadaueriam lectum permanere non posset. Quae quidem hepatis vomica causam mortis praebuit.

SCHOLIA.

Cum hic lobus hepatis supra stomachum ascendisset, & tumorem exterius rotundum effecisset, medicus aliquis, quantumvis doctus, ex loco affecto indicasset ex rotunditate supra ventriculum existente, apostema in ipso ventriculo existisse, nullo apparente tumore in hypochondrio dextro. Attamen hepate toto suppurato, propter magnitudinem abscessus, lobus ventriculum comprehendens eo ascenderat, quamuis non in ventriculo, sed in hepate abscessus repertus est, ut sectio post mortem indicauit. Ideo diligenter haec consideranda, ne in simili casu quis fallatur, non obstante quod inflammatio seu apostema hepatis eodem fere modo curatur, ut ventriculi: nam vnumquodque apostema eorundem, tum abscessus, propria quaedam remedia sibique familiaria habet: de quibus satis nunc dictum est. Et facile quoque distinguitur his notis, de quibus superius diximus: ita & inflammatio, seu apostema ventriculi. De quibus egimus lib. 18. de ventriculi affectu.

OBSERVATIO XII.

De hepatis insigni dolore, ex materia crassa, ventosa, intra membranam hepatis & eius substantiam collecta, ut metus quoque de apostemate est.

Erardus Nannius, Alcmarianus, ceruisiarum pailulus (nam cum tenuis fortuna esset, victus querendi gratia dolia ceruisiaria deportabat, alioquin de nobili stemmate Zuylenorum oriundus) mense Augusto, anno 1546. in insignem hepatis dolorem ex materia flatulenta lapsus est; ita ut de apostemate metus foret; quamquam se pleuritide existimabat affectum. Ad quem ingressus, statim ob insignem dolorem sanguinem ex vena basilica incubito dextro detrahare iussi, sanguine circiter uncias octo educto, cum aluum per se satis mollem haberet. Die vero sequenti, cum dolor ex integro non cessaret, ventosas cum scarificatione nartibus admoui, ad diuersionem. Deinde cum semel hoc epithemate locum dolentem fouisset, miraculi instar omnis dolor euauit, qui ex inflatione erat: ita ut non opus fuerit purgatione. Et praeter spem statim conualuit. Forus seu epithema tale erat. ℞. flor. melil. flor. ros. rub. folior. absinthii, viol. an. m. j. sem. anisi, fenugraci, lini. an. ℥ iij. cocta in aqua communi (quia pauper erat) ex his parabatur fortius, loco dolente etiam inuncto. ℞. olei ros. olei amygd. amar. olei de spica, absinthii, an. ℥ ij. misce. Interea tamen hoc decocto vtens, sanus factus est. ℞. fumariae, agrimoniae, cassiae, cichorii cum toto, borag. bugloss. scabiosa, fœniculi cum toto, ana m. j. rad. liquir. ℥ ss. flor. chamomill. p. j. sem. fœniculi ℥ iij. cicerum rub. ℥ j. insubar. sebesten, an. num. v. hordei mund. p. j. fiat decoctio in aqua

3. *aqua communi, pro ℥j. ℞. dulcoretur zach. bis in die ex eo sumebat.* At alteri mulieri dolenti ex hepate, cum apostemate frigidiorē, præcedentibus vniuersalibus remediis, quarto die sacculus hicadmotus, prius coctus in vino & expressus, ilico dolorem sedauit. *℞. absinth. chamæd. an. m. j. flor. chamom. man. ij. flor. ros. m. j. schœnzuthi m. ℞. semin. lini, anisi, carui, an. ℥ij. santali albi & rubri, an. ℥j. ℞. fiat sacculus.* Nocte rursus dolore ascendente, eidem lateri iterum appositus sacculus & idem dolor sedatus est: at cum haberet maiorem dolorem anhelitus quam prius, & expueret materiam crudā, locus inunctus est dialthæa, & pro oppilatione hepatis descriptum, quod sequitur. *℞. pul. trions. ℥j. ℞. dialacca ℥j. pul. diacapp. ℥℞. zach. ad duplum pondus.* fiat tragea, de qua sumens quotidie, & bis in die inungens cum dialthæa, septimo die fuit curata, cum iudore magno, & quasi continuo.

S C H O L I A.

4. **T**unicam tantum velantem iecur, præcipue dolere quidam autumant: cum oppilatione tumet membrū, spiritu intus incluso, aut abscessu duro, cum obcalluerit, aut phlegmone, ex lapsu ex alto, vel incussu hepar dolet, vt prius diximus. At extensiuus dolor, vt hic, a ventositatē fit, vel vapore, vel humore multum flatuoso. Inflatur autem iecur ex cibis, qui in secūda digestionē flatum parant, ventositatē in hepate retenta, vel ex crassis humoribus genita. Et dolor fortis est, vel ab apostemate, tunc adest febris: vel si fiat a ventositatē, tunc sine febre est: nam febris si accedat, ventositatē sæpe resoluit. Ventositati proprium est, augeri & minui, mutari & interpolare: nec adest grauitas, sed potius tensio, & in gibbo extenditur ad pectus & dorsum: in cauo ad ventrem & intestina: & mutabilis est dolor, nec color corporis aut faciei, vt in apostemate, mutatur. Hic autem in victus genere quicquid frigidum, ventosum est, damnatur: paludes ob eam causam vitandæ ac niuosa loca. Quæcunq; ad inflationes ventriculi conferunt, hic transponenda. Valent diacyminum, diagalanga, pilulæ aromaticæ dictæ. Milium ex fortu iuuat. Si vna cum ventositatē adsint vapores, vel humores crassi, materia minoranda, digerenda, eradicanda, diuertenda clysteribus & aliis generibus diuersionum: viæ aperiendæ, vt ventositates exeant, & resoluendæ simul hepar roborando: & accidentia corrigenda, & vitæ regimen imperandum. De quibus vide Arculanum, qui huius doloris ventosi curationem proprio capite persecutus est.

O B S E R V A T I O X I I I.

De scirrho hepatis.

1. **V**t quidam Delphensis tumorem scirrhum diuturnum patiebatur in gibba parte hepatis, qui & tactu deprehendebatur, cum gracile & adipis expers esset abdomen; idq; facilius erecto, vel in dextrum latus inclinato ægro, quam decubente supino: tum quippe nō nisi pressu animaduerti poterat. Situ quoq; & figura iecoris circumscribebatur: cui etiam ægro facilis decubitus dexter, sinister verò grauis erat, cum moles quædam

velut suffocans in ventriculum & præcordia incumberet. Hic autem tumor ex contumaci & inueterata obstructione paulatim originem ceperrat. Ab ea quidem Fernelius semper fieri vult, raro, vel potius nunquam, ex inflammatione originem trahere, quod in viscere natura calido & humido omnis inflammatio in perniciosum abscessum desinat. Fit tamen aliquando ab inflammatione, vt alii volunt, imo sæpius, vt doctissimus quoque Iacchinus recenset: quemadmodum & nos præter hunc virum in aliis, & in nosocomio Delphensi præcipue, obseruauimus: vidimus quoque mulierem ex hydrope mortuam, post mortem a me incisam totum hepar scirrhi modo induratum habuisse: *de qua obseruatione sequenti agemus.* Recte quidem & auctores post inflammationem hepatis de scirrho agunt: quāquam etiam & ab initio statim gigni posse, absq; præcedente phlegmone, cōtendunt: vel paulatim collecto in viscere excremento crasso dum nutritur, vel a liene eo transmissio: quod sane vtrumque fieri videmus quotidie. Sed & Galenus in lib. de morbi temporib. ait lenim & latenter incipere: post multum tempus sentiri, vt & in hoc ægro cōtigit. Ideo hic scirrhus, vt Fernelius ostendebat, a simplici tumore distat, quod non nisi longo dierū numero, simplex vero tumor etiam breui procreetur. Humorem dicit auctorem esse obstructionis, qui primum tenues iecoris venas implens & infarciens, auctusq; in omnem visceris substantiam redundat, & eam perinde atque venas obstruit: quod si rursus multo plenior cumuletur, iecur in amplam molē distendit: tumq; viscus turgidū ac tumēs apparet. Tempore humor siccescit, & vi caloris tenui parte dissipata, reliquus rotus obdurefcit: cuius permistione iecoris substantia labefactatur, verusq; tandem scirrhus emergit. Secundum eundem, modo fit ab humore pituitoso, vt huic nostro ægro, modo a bilioso. Illum causæ antecesserunt, quæ crassum pituitosumq; succum coaceruant, hunc vero, quæ biliosum: in illo dominantis pituitæ refrigeratiq; iecoris, in hoc bilis exsuperantis, concalfactiq; iecoris, signa illucēt: hic vero ictero succedit, & lentam febrem comitem habet: ille nequaquam: hic vnus in eum hydropem præcipitat, qui ascites appellatur: ille citra vllū incommodi genus diu persistit, aut dūtaxat cachexiam leucophegmaticamue infert. Cum igitur hic scirrhus ab humore pituitoso, & refrigerato hepate, originem haberet (*nam & hic victu crasso pituitoso vsus erat, & subinde aquam biberat, cum pauper esset,*) vt hunc recte curaremus, victum talem instituimus, quo in obstructionibus liberandis vtimur. Ideo cibos faciles concoctu adhibuimus, & qui incisoriā vim & repurgantem complecterentur, crassa, viscosa edulia, & omnia dulcia, hepati nocentissima vitauimus. Materiam crassam pituitosam minorauius hoc medicamento. *℞. syrup. ex infus. ros. cum agar. ℥j. ℞. diaphœnici ℥ij. aqua fœniculi, cassuta, an. ℥j. aqua cichorii ℥℞. misce,* detur in diluculo, ter quaterque excreuit aluum. Deinde ad humoris crassi & visci di preparationem, sequenti deco-

Alo, vel huic simili, vti sumus. *℞. rad. graminis, petros. asparagi, foniculi, macerat. in aceto, an. ℥j. rad. althae ℥℥. marrubii, ceterach, cassia, capill. vener. agrimonie, scolopend. ana m. j. semin. anisi, fœniculi, an. ℥j. ℥. folior. senae ℥viij. agarici fœmin. albi levis ℥j. zinzib. albi ℥j. vuar. passul. ℥j. ficuum ping. num. v. fiat decoct. in aqua commun. pro ℥℥j. ℥. colatura, adde syrup. de byzantiis, acetosi compos. de eupator. ana ℥j. misce. Deinde purgavi hoc pharmaco sequenti. *℞. agarici fœmin. albi levis ℥j. rhabarb. select. ℥℥. zinzib. albi ℥℥. schœnanthi, spica, ana gran. v. infunde per noctem, facta prius leui ebull. in ℥v. decoct. superscripta. mane fortiss. expressioni adde diaphœnici ℥℥. syrup. de eupator. ℥j. misce. detur in diluculo, quo aluum optime excreuit. Interea inunximus hepar oleis amygdal. dulc. lilior. chamomill. & mastichino simul mixtis. Sed quia non febricitavit; sanguinem non detraxi, ut Amatus fecit in Marci librarii Veneti sororio, qui scirrhum iecoris habebat, vna cum febre. Vide rotam eius historiam *centur. 3. curat. 48.* Post purgationem & olea dicta, hoc linimento regionem hepatis inunximus. *℞. emplastr. de melilot. de mucil. cerati nostri de ammoniaco, an. ℥℥. vnguenti santal. ℥ij. pul. ros. absinthii, ana ℥j. olei absinthii ℥j. ℥. fiat linimentum, aceto immixto, ad ignem. Catapotia etiam confecimus ex ammoniaco, puluer. hieræ picræ; vel quæ hoc modo fiunt. *℞. agarici ℥j. myrrhæ, styrac. ana ℥℥. spica celtica, schœnanthi, cinamomi, ana ℥℥. excipiantur terebinthina: & fiant pilula v. ex ℥℥. vel ℥j. dentur mane in exitu lecti. Rursus dabam decocta magis incidentia & vrinam cientia; adiect. radic. irid. bismalua & semin. alkekengi, etiam passul. & dactylis. Alii deinde dant pilulas de sagapeno, vel fœtidas. Dedi autem pilulam vnâ ex ammoniaco: & postea foras conuenientes, in hunc vel similem modum. *℞. rad. alth. ℥ij. rad. irid. sambuci, an. ℥j. flor. cham. meliloti, sambuci, an. pug. j. absinthii, man. j. spica vtriusq. & azari, ana ℥ij. fiat decoct. in aqua intestinorum, pauco adiecto vino, quia pauper erat. Deinde redibam ad vnctiones, cataplasmata, ex ammoniaco, bdellio, & aliis conuenientibus. Quibus remediis æger hic bene habuit: quamuis ex hoc rumore scirrholoso in totum sanus non euaserit. Cum & Galenus fateatur *2. ad Glauc. cap. 5. se scirrhum diuturnum nunquam sanasse, nec alium vidisse qui id potuerit: qua de causa nonnulli consulunt, ut ad balneas eant, quibus vniuersa Italia ornatur. Vidi tamen Elideum Paduanum, medicum Bononiensem, præceptorem meum, medicum nosocomii Vitæ dicti, curasse scirrhum hepatis, nunc temporis a Baptista medico haud vulgari tamquam incurabilem iudicatum, exhibendo intermissis diebus modo rhabarb. potionem, modo pilulas de ammoniaco: interea etiam faciendo vnctiones, & cataplasmata loco affecto apponendo, ex ammoniaco, bdellio, & similibus, & exhibens hepar lupinum. Quibus remediis ille æger sanatus fuit. Post vniuersalia, tali electuario ad oppilationem hepatis commodè utebatur. *℞. rhab. selecti ℥j. ℥. hepatis lupi prepar. diarrhod. abb. an. ℥j. cum oxym. q. s. fiat electuarium. At vni-*******

ce his profunt ea, quæ partim aluum subducunt, partim vrinas mouent. Quibus egregie facit confectio ex amygd. & cnico; de qua Galen. *5. de sanituenda* meminit. Oportet autem cnicum contundere, & sic componere. Iacchinus, medicus doctissimus, scribit se feliciter vsum extrinsecus mollientibus, & intrinsecus potione salis aquæ: habet enim vim extergentem & extenuantem plurimam. Itaq; alteri scopo satisfacit curandi scirrhi, nempe vacuationi. Vtus etiam sum (*inquit*) potione ammoniaci, hoc modo: ammoniacum cum rutæ dimidio in pilulas confirmatum propinabam, pondere drachmæ vnus vel scrupulorum quatuor. Habet enim vim emolliendi, & leuiter extergendi & exsiccandi. Iuuat vero & trochis. de rhab. vsum & alia medicamenta aperientia egregie, & vrinas cientia, de quibus dictum est, cum de obstructione ageremus. Vide eundem cap. de obstruct. hepatis. Ad vrinas priuatim, *inquit*, sum vsum potione distamni & asari. Extrinsecus adhibebimus ea medicamenta, quæ ad ventriculi scirrhus valent: qualia sunt illa, quæ ex bdellio, ammoniaco parantur ex meliloto & cæsylo. Hæc enim in cerati formam redacta apponuntur: habent vtramq; intentionem, molliendi nimirum & siccandi: quod quamuis serius faciant, quam quæ solum siccant & acria sunt, id tamen tutius faciunt; ideo præeligenda.

S C H O L I A.

Hæc duo vitæra, iecur & lien, sunt opportunissima ad scirrhum, ut Gal. docet. *13. method. cap. 15. & 16.* in quo Attalum Thessalum, medicum, Sorani discipulum reprehendit, quæ Theagenem Cynicum philosophum interficeret, cum solis relaxantibus topicis vteretur. Quod minime faciendum est semper: In hepate quidem, cum limoso sanguine nutriatur; in splene, quod humorem recipiat crassum; & in renibus, quia sanguine spisso nutriuntur. Alibi tamen dicit Galenus splenem subtiliori sanguine nutriri, quo hepar nutriri solet. Vide Amatum, qui hoc dubium soluit *scholio centur. 3. curat. 48.* Duplex quoq; scirrhi est differentia, ut *2. de arte curatiua ad Glauc.* quorum vna exquisitus dicitur scirrhus, tumor sensu priuatus, durusque; altera, non exquisitus. Qui omnino non insensibilis est, ut patet etiam *14. method. medend.* Estque hic affectus morbus in quantitate; secundo intemperies, quoniam frigidus affectus; & tertio, in soluta continuitate. Quantum ad partem læsam, hepar hic affectum est; ex tumore duro quidem existente, cum exiguo aut nullo dolore, & interdum sensu priuato cognoscitur, quandoque non omnino insensibili. Duplex eius generatio: vel ab initio ex influxu humoris, sed rarius; vel, quod frequentius, si sensim aceruatur in venis; vel facta permutatione ex erysipelate aut phlegmone, ob multam & intemperstiuam refrigerationem, quod frequentius euenire, ait Galen. *2. ad Glauc. cap. 5. nempe ex humore crasso, frigido, pituitoso, vel atrabilario, aut ex his simul mixtis, ut liquet 14. method.* Si ex nigra bile, color totius corporis ad nigrius declinabit; si ex crassa lentaque pituita, ad albidius, vel plumbi colorem,

3.

9.

Scirrhi differentia duplex.

Affectus.

10.

Parti affecta.

Causa.

Signa.

11. Iorem. Scirrhi vero exquisiti, in iecinore sine sensu persistentes, omnino insanabiles sunt, ut in ceteris partibus, teste *Galen. 14. method. & 2. de arte cur. ad Glau.* quamquam neque is, qui difficulter sentitur facile curationem admittat, eodem auctore, quamuis ab initio sapius ipsum curauerit, sed ad plures dies extentum, neque ipse sanare potuit, neq; alium vidit qui posset. Nam omnibus iis, qui ita affecti sunt, ex necessitate subsequitur aqua intercus. Pereunt autem quam plurimi in tempore longo: quidam etiam breui, qui ventris profluuiolaborant. Curatio perficitur vicissim, teste *Gal. 2. ad Glau.* nunc humidis mollientibus, nunc siccantibus. Si nimium calfaciamus & exsicceamus, indissolubiles, & ideo insanabiles, & similes lapidibus, reddimus: si nimium emolliamus vel humectemus, hepar dissoluemus, ideo emollientibus adiungenda, quæ digerendi vim habeant, & parum constringant, ne vis hepatis labatur. Vide de his & *Galenum & Aetium* corpore prius euacuato & humoribus crassis vel atrabilariis, tum iis utemur, quæ per urinam deducunt materiam, de quibus vide *Rondeletium*. Exterius iis utemur quæ constant ex absinthii coma, mastiche, nardino ac lentiscino vng. adiuciendo thymiana, & bdellium, medullam anseris, & alia topica, tam apud *Galen.* quam *Aetium & Paulum descripta*. Vide & formulas ad hunc effectum aptas cap. proprio apud *Rondeletium & Altimarum*.
- 12.

OBSERVATIO XIV.

De hepatis scirrho in hydropem lethalem mutato.

1. **M**ulier Alcmaria grauida, etiam hydropelaborans, paupercula, tumore scirrholo hepatis præcedente ad me venit consulendi causa, cum diu hoc malo laborasset: quare curationem irritam fore iudicabam: quamuis ad solam quædam remedia paratu facilia, sed frustra, præscripserim, quæ tamen cum pariendi tempus adesset, feliciter peperit prolem: at decimoquarto die a partu obiit. Ventre autem matris post partum non detumescente, licet a partu utcumque purgetur, tamen illam morituram prædiximus: & ita 14. die a partu e vita migravit. Mortuæ autem corpus incidendum curauimus, eo quod obstetrix certo affirmabat secundum adhuc partum, ob venteris molem, in vtero herere, cum ego eandem ex scirrho hepatis, quem hydrops subsequutus esset, mortem incurrisse pronuntiabam: quod & incisio mox indicaret. Incisione itaque peracta, præsentē obstetrice, tum aliis nonnullis, integra cupa, qua mulieres pannum lauant, aquæ citrinæ e ventre fluxit, plus quam viginti heminas effluxisse coniectabam. Omentum vero erat plane absumentum, & glandulæ mesenterii indurata: hepar vero non solum in scirrhum mutatum, sed in lapideam quasi duritiem cōuersum: nam sparsim in ipsa substantia hepatis fabæ instar lapilli concreuerant. Vterus bene se habebat, unde diuino quodam miraculo, & Dei prouidentia, fœtus in vtero ad maturitatem iusto tempore pariendi est seruatus; neque secundus partus inuentus, ut obstetrix existimabat, adeo anatomia
- 2.

ignara, ut tentandi causa vesicam pro vtero eidem ostenderemus, ut vterum, quamuis loquax latis, a vesica distinguere non potuerit: quæ hætenus diu artem obstetricandi, pro dolor, exercuerat: & in ea etiam consenuerat.

S C H O L I A.

IEcur autem, vel vnam aliquam eius partem indurari frequentius accidit, imo aliquando lapillis durioribus quasi concrecere cernitur. Meminit enim *Dodonæus*, medicus doctissimus, se nonnullorum, qui ab ictero in ascitem delapsi erant, iecinora vidisse adeo dura & lapillis vndique plena, ut nouacula percindi non potuerint. Simile narrat & *Andreas Vesalius*, in epistola de China, ad *Ioachimū Roelants*, de quodam Bello armato Senensi, cuius iecur prorsus candicans, superficie constabat non læui, sed admodum inæquali, & lenibus tuberculis exasperata, anterior vero eius pars & vniuersa sinistra, ad modum lapidis indurata. Refert quoque *Antonius Beniuenius*, quod in muliere nobili, quæ ex dolore circa iecinoris partes diu afflictæ erat, & tandem mortua, post corporis incisionem inuenti fuerint in iecinoris membranulæ parte decliuore congesti lapilli, figura & colore diuersi, alii enim rotundi, alii angulares, quadrati alii, prout positura & casus effecerat, maculis etiam rubeis, cœruleis, albisque distincti. Hi sua grauitate, ex tunica sacculum longitudine palmi, latitudine vero duorum digitorum effecerant. Hanc autem nos mortis causam (*inquit*) arbitrati, disputare de obscuris vanum & inutile iudicauimus. At in vesica fellis, ut alias diximus, & etiā c. 94. ab eodem *Beniuenio*, dictum est, subinde lapides reperiri contingit: verum laxiorem reddi membranam iecinoris, atque in ea calculos dependere, ex rarissimis est. Sed quod in hac nostra muliere inuenimus glandulas mesenterii induratas & pancreas similiter, id quoque adeo rarum non est. Scribit enim *Rondeletius cap. 35. de hepatis scirrho sub finem*. Id annotatione dignum est, quod ex frequentiori corporum dissectione obseruauimus, omnes hydropicos, vel scyrrosos, glandulas mesenterii induratas habere, & pancreas similiter. Quare non erit inutile (*ut idem admonet*) totum ventrem oleis tingere, vel vnguentis, totumque ventrem fouere.

OBSERVATIO XV.

De ictero.

Iacobus quidam Alcmarianus, annum 27. ægens, crapulæ deditus utcumque, alioqui biliosus, anno 1548. sub finem mensis Februarii, nulla præcedente febre, neque aliquo morbo, totus palluit & auriginosus factus est. Quod simplici ictero hic laboraret, qui ex obstructione meatuum ad bilis cystim pertinentium fiebat, facile percepimus: nam repente hominem adoriebatur, sine febre, ac sine magna corporis, ac virium iactura, cum & deiectiones huic albidæ essent, eo quod bilis illapsa in intestina, cohiberetur: unde & urinæ admodum crassæ, atque adeo rubicundæ ut prope nigrescerent, inerant & dextro hypochondrio grauitatis sensus, sine conspiciuo tumore. Hæc cum animaduertērem, e vena

basilica secta in manu dextra (cum in brachio non esset consuetus, nec facile admitteret) moderate extracto sanguine, non tamen multo, cum sanguis frænum bilis existat, mandavi, ut diebus sequentibus bis in die ex hoc decocto sumeret: *℞. cori- cum radic. cichorii, fœniculi, petroselinæ ʒj. rad. brus- sei, asparagi ana ʒj. cassia, agrimonie, marrubii, ana m.ij. betonica, melissa ana man. j. sem. anisi, carui, fœni- culi, amei ana ʒj. semin. quatuor frig. maior. ana ʒj. cicerum rub. ʒj. schœnanthi ʒj. coquantur in lb. iij. aqua. ad lb. j. ʒ. colatura, adde syr. de byzantiis ʒj. ʒ. mellis ros. colati (erat enim obstructio ex humori- bus viscosis crassis, cum cholera vitellina crassa admixta) syr. de cichor. cum rhab. ana ʒj. misce, & fiat apozema. Ceterum cum icterus fiat ex obstru- ctione, ob vesicæ felleæ oppilationem, ideoque in eo duo potissimum requirantur remedia, ut venæ sectio & purgatio vehementior; post præparatio- nem & humorum extenuationem, sequentē pur- gationem exhibuimus: *℞. rhabarb. select. ʒj. sp. ʒ. schœnanthi, ana gr. iij. infunde per horas 12. in aqua lu- puli, fœniculi ana ʒij. fortiter exprimantur. Adde ele- ctuarii de succo ros. ʒij. ʒ. diapr. lenitiui ʒj. ʒ. aga- rici trochiscati in puluerem redacti ʒj. ʒ. syr. de cichor. Nicoli ʒj. misce, fiat potio: quæ exhibita fuit in aurora; & habuit sex sedes, cum magno leuami- ne. Verum cum adhuc doleret ex gravitate in hy- pochondrio dextro, versus stomachum; fotu se- quenti adhibito dolor euauit: *℞. flor. chamomill. meliloti, summitatum absinthii, malua, eum toto an. m. j. sem. anisi, fœnugr. sem. lini ana ʒij. coquantur in aqua communi, & fiat fotus. Sedato dolore, & per pur- gationem egregie aluo soluta, ablata causa, mox ab ictero liber euasit. Vide Amatum, de Perotia Monte Sancto filio, annos 10. nato, qui tres uncias syr. ros. solutiui tantum sumsit, cum aqua cichorii; & ab icteritia liberatus fuit.***

S C H O L I A.

SI excrementa in hepate non rite vel omnino non separentur, symptomata quædam indu- cunt; ita ut per totum corpus cum sanguine diffu- so bilis flaua, non omnino, vel non rite, segrege- tur ac expurgetur: qui quidem affectus, proprie Icterus dicitur, licet etiâ varia sortiatur nomina. Dicitur autem *ικτερος* a Græcis, teste Galeno, lib. de diff. febr. & 3. de causis, quem affectum Latini quandoq; Icterus, quandoq; Auriginosum no- minant, a calore auri, quem bilis per totum cor- pus diffusa repræsentat. Verum cur Græci affectû hunc *ικτερος* nuncupent, Aet. declarat cap. 17. libr. 10. Est enim *ικτερος*, inquit ille, a similitudine ad ani- malculû, quod *ικτις* id est, viuerra appellatur. Est autem viuerra animalculum illud, quo cuniculos excludunt venatores, vulgo apud nos *een Vret* di- citur, quod licet corruptum sit, aliquo modo ad Latinum nomē Viuerræ accedit. Alii volunt illud animalculum esse mustelam syluestrem, quæ au- ricolores oculos habet. Celsus aut hunc affectum etiam Arquatum vocat, ab arcu cœlesti, eo q̃ eius colorē imitetur: ita & ab auro Auriginē quoq; vo- carūt. Idem quoq; interdum & morbum Regium appellat, ut liquet c. 24. lib. 3. Hinc cecinit Serenus:

Regius est vero signatus nomine morbus:

Molliter hic quoniam celsa curetur in aula.

Hoc idem Celsus testatur, eumq; regium vocari morbum, quia lasciuus, cantu, delitiis, multa, vita soluta, curis, in aula curetur. Vulgus medicorum Icteritiam nuncupat. Alii & Icterus dictum vo- lunt ab aue Galbulo dicta Latine, quod aureo sit colore hæc avis. Insequitur vero hoc accidēs sem- per causam præter naturam proximam, hoc est, fusionem bilis per cutis exiguos poros: quæ cum incipit, apparet maxime in illis partibus corporis, quæ sunt vehementer albæ, ut oculi: mox in vni- uerso detegitur. Huiusmodi rursus fusionis causa interna aliqua prior est, seu proprie causa sit ef- fundens, seu velut occasio. Quæ autem sint eius- modi effusionis causæ, ex Gal. habetur. 5. de loc. affect. 7. cum breuiter, tam ex Galen. 3. de causis sympt. & 5. de loc. affect. & ex Aetio & Paulo, cōstet ex triplici cau- sa provenire, vel vitio particulæ, quæ excremen- tum ipsum expurgat, vel ratione viarum, per quas expurgat, vel vitio ipsiusmet excrementi. & ideo in morbo regio nō perpetuo idem locus affectus est, neque iecur semper afficitur, ut a Galeno demon- stratur. 5. de loc. affect. nā modo iecur afficitur, mo- do vesica bilis, modo vniuersum corpus. Ita in hoc nostro ægro potius vesica bilis afficiebatur: quod cognouimus ex istis signis, quia citra febrem hic morbus regius hominem occupat, cum dextræ præcordiorum partis gravitate, & excrementis albis excretibus, & urinis biliolissimis, & affatim excretis: quæ omnia vesicæ bilis vitio talem mor- bum regium fieri indicabant. Verum & illud bi- fariam fieri potest, vel ob eius imbecillitatem, propterea quod biliosum humorem, sicuti con- suevit, in se ex hepate non attrahit, & ob id impu- rum sanguinem relinquit: vel etiâ contingit ean- dem nimis repleti, ut propter repletionis multitu- dinem idem excrementum expelli ad intestina nequeat, excretrice simul facultate existente im- becilla. Poterit & secundo morbus regius fieri vi- tio viarū ex ipsa vesica ortarum, utpote cum ipsæ obstructæ fuerint viæ p̃ quas ex iecinore ad ipsam vesicam biliosum excrementum trahitur, vel eæ, per quas ab eadem vesica ad intestina propellitur: quippe omnibus prædictis modis non expurga- tur a bile sanguis, & in totum corpus diffunditur, ac morbus arquatus efficitur. Ex viarum vitio fit, cum propter earum obstructionem fieri contin- git. Ex imbecillitate vero separatricis facultatis, si eadem vesica bilis in attrahendo, seu excernen- do prædictum succum, propter aliquam intem- periem fuerit debilis. Namq; fellis folliculû, cum inter naturalia instrumenta connumeretur, unicū habet, veluti reliqua, imbecillitatis principium, a partis intemperie ortum, ut eodem 5. de loc. affect. in fine Galeno visum est. Atqui interstingues, si ob meatuū ipsius obstructionem fiat morbus regius, ut in hoc nostro ægro euenit: namq; vna cum al- bis excrementis, gravitatis cuiusdam sensus dex- trū hypochondrium vrgebit, citra febrem. At si propter eius imbecillitatem fiat, talia excremen- ta circa gravitatem deiciuntur. Vtriusque tamen statim

Bilis fusi-
onis
causa.

5.

Quot partes
creantur seu affi-
ci possent in
morbo regis.

6.

Signa vesicæ
bilis affectæ.

7.

Centur. 4. cu-
ralio 7.

de feb. varia
nomina.

4.

statim vrinæ biliosissimæ affatim excernuntur, ut inquit Paulus. Et ita hic post venæ sectionem humores vias illas obstruentes, edulis, potionibus ac pharmacis attenuauimus, & obstruiones deopilauius, ex præcepto Gal. s. de loc. aff. & præcipue purgauimus, iuxta Aetiū auctoritate Ruffi, non in principio, sed prius materia attenuata, & vasis reſeratis, alioqui illi medici, qui bilē expurgant antequam sit extenuata, nec vasis reſeratis, maximi mali auctores sunt. Quæ autē attenuent, & vias aperiāt, & ictericis vtilia sunt. de iis vide Aetiū & Paulum. Ceterum, si ab hepate, vel a toto, malum oriarur, id exemplis infraſcriptis patebit, cum & eorundem affectuum diuerſa etiam curatio iuxta cauſas varias sit inſtituenda: ut exemplo nunc de ictero, ex calore iecoris vna cum febre orto, docebimus, & poſtea de iis, qui ex alia cauſa oriuntur ſumus acturi.

OBSERVATIO XVI.

De ictero ex calore hepatis, ac eiusdem viſceris, leui inflammatione vna cum febre duplici tertiana.

Cum in Zuylandiam, pagum vltra Moſam ſitum, ita dictum, ad quandam mulierem accitus eſſem, anno 1568. cui febricitanti vna die per empiricum perperam ſanguinis detractio tum purgatio adhibita fuerant: plusquam vigefies hæc ipſa aluum depoſuit, ita vt viribus proſtratis animam agere videretur: quæ tamen a me curata fuit. Verum in iſdem ædibus laborabat eiſdem maritus non diu poſt duplici tertiana, corpore etiam ſtauo tincto colore: ad quem prius decimo die huius mali accitus fui, qui primum octauo die venā ſibi ſecari fecerat, & ſuomet conſilio ſeiſum foliis ſenæ purgauerat: cumque ſemper peius haberet, decimo die me prius vocauit. Aderat tunc dolor quidem in hypochondrio dextro, ſed vix effatu dignus: quamuis in eodem loco ſentiebatur calor intenſus. Antequam in febre incidere, etiam quādam grauitatem in eodem loco ſenſerat: & ex parte etiam pallidus aut ſtauus euaserat, quāquam nūc multo magis: ita vt prius obſtructione hepatis laborauerit: nam ex ea etiam ſolet morbus regius originē ducere: & tunc ſine febre permanent ægri (vt Galen. teſtatur lib. 9. de compoſ. med.) nec non & grauitas quādam in eadem dextra parte præcordiorum adest: præſertim inter vehementer reſpirādum, & ea ſigna adſunt, quæ de obſtructione hepatis prius ſcripta ſunt: quamuis non ſolum ex obſtructione iecoris, ſed & ſcirrho eiſdē, morbus regius fieri poteſt, ſignis ſcirrhi tunc præcedentibus, vel præſentibus. Obſtructio itaq; hepate, facile etiam calor acceſſit, bile per loca conſueta non expurgata: nam ex ſola calida intemperie eiſdem viſceris, cum multa copia bilis progignatur, quæ multitudine expurgari nequit, eadem per totum corpus diſfuſa, propter eiſdem excrementi copiam, icterus excitatur, vt a fellis folliculo vix recipi poſſit: tunc plerunq; abſque febre in dextro hypochondrio feruor circa iecoris locum percipitur: alui excrementa bile perfuſa videntur, vrinæ craſſæ, crocæ, profunduntur, ſegnitieſ, ſpi-

randique difficultas concurrit, tum poſſimum perceptibilis cum mouetur, nam ſi icteritia ex copia bilis fiat, ab intemperie calida iecoris facta, meatusque ad folliculum fellis pertinētes aperti ſunt, alui excrementa tunc biliola erunt, eo quod portio bilis profundatur in aluum, & tunc vix febricitat æger. Sed non diu poſt ſucceſſit febris duplex tertiana, ſatis valida, ita vt & iecinoris inflammatione poſt obſtructionem & caliditatem hepatis ſubſequuta fuerit: cum & ipſe regius morbus interdum ex inflammatione iecinoris oriatur, propter quam ſanguis omnino a bile expurgari nequit, imo vna cum ſanguine bilis per totum corpus deſertur: & hinc morbus regius generatur, propterea quod & eiſdem bilis copia ob eādem cauſam in eodem viſcere gignitur, & coſtipatio quādam fit, leu anguſtia locorum, per quos ipſa bilis ex venis tranſfertur ad canales veſicæ bilem recipientes, vt Galenus inquit comment. aphor 6 4. libr. 4. Cuius quidem morbi regii indicia ſunt, præcordiorum dextra parte dolor, biliolæ deiectiones, & febris, vt inquit Paulus. Namq; ſi omnino febricitant, Galeno teſte 9. de compoſ. medic. ſecundum locos. Similiter & hic vrinæ ſtaua bile vehementer coloratæ videbuntur. Quæ quidem ſigna cum nunc in hoc ægro adeſſent, & iam per decem diem febricitafſet, & ſanguinem octauo prius die emiſſet, ab vltiori ſectione venæ abſtinendum duximus, quamuis & hic etiam in parte dextra capitis non nihil doleret, quod ex inflammatione & calore hepatis bile ſurſum allata (licet toto corpore ſtauo exiſtente, non per modum criſis, vt aliquando etiam fieri ſolet, vt ſuo loco dicemus) fiebat. Vnde cum intemperies calida adeſſet & febris, etiam intemperiem illam ſanare inſtituimus victu & medicamentis, quæ cauſam huius mali, tum inflammationem, tum intemperiem calidam, tum febre reſpicerent. Et quia bilis abundantia aderat, tam ex intemperie & cauſis dictis, quam ex febre duplici tertiana (quæ omnia bilem abundare conteſtabantur,) ideo non ſolum bilis erat purganda, ſed & ipſa intemperies alteranda. Quare ad exſtinguendum calorem, tum febre ipſam, hoc iuleb præſcripſimus. ℞. ſyrup. de endiuia, de limonib. de cichorea cum rhabar. ana ꝑj. aqua end. acetoſa, ſumaria. ana ꝑij. fiat iuleb pro tribus doſibus. Deinde ita eundem purgaui. ℞. electuar. de ſucco roſ. ꝑj. electuarii lenitiui, diaphœnici an. ꝑj. β. rhab. ſelectiſſ. β. ſpica gran. v. ſyr. de cich. cum rhab. ꝑj. β. aqua cichorii ꝑij. fiat hauſtus, quo multa biliola deiecit, etiam choleram vitellinam. Deinde & diarod. abb. in tabulis exhibuimus: & hepar inunximus vnguento roſ. & ſantalino ſimul mixto. Et quia non dormiebat, ob febre, & circa partem dextram capitis dolebat, ea parte tempora inunximus, etiam frontem ſub noctem, cum vng. populeo, cui parum olei nymphaeæ & pap. immixtum eſſet. Poſtea 14. die egregie ſudauit, & a febre liberatus eſt, & icteritia eundem reliquit.

SCHOLIA.

Icteri cauſas nunc ex parte indicauimus: ſed qua arte coniecturi ſumus q̄ cauſa affligat, nunc

exemplo ostendimus de iecinore: nam si levis suspicio huius mali adsit in iecinore, a quo obstructio, inflammatio, vel scirrhus eveniat, causam ipsius facile inueniemus. Si adsit obstructio, albicant canum instar excrementa, urina est flava, victusque præcedens aptus fuit gignendis obstructionibus. Auget & notitia structuræ corporis: quoniam scimus angustas habere venas, & facile his capi solere. Si vero obstructio absit, considerabimus num causa aliqua bilem abundare fecerit, nempe iecinoris intemperies, vel aliæ externæ. Sic enim causa nota erit, bilis abundantiæ, si acutus & biliosus morbus præcessit, causa patet, scilicet natura excernens: si enim ex copia bilis fiat, ab intemperie iecoris facta, meatusque ad folliculū fellis pertinentes aperti sunt, alui excrementa tunc quidem biliosa erūt, eo quod portio bilis profundatur in aluum, & vix febricitat æger. Quod si nullū horum adsit, concludimus debilitatem fellis vesicæ esse. Num vero peccet vesica attractione, vel pulsione, coniicitur hoc modo, quoniam si pulsione peccat, diu detinetur, & cærulea euadit: ob id etiā Iacchynus sæpe vidit in vesica fellis lapillos eius coloris, quod & nos ipsi sæpe vidimus; exurit enim tempore retenta. Num vero pulsio repletionem nimiam impediatur, vel debilitate, inde ostenditur, quod quæ a repletionem est, multa simul deiecit, & malum statim cessat: at ubi debilitas est, diu durat, & forte non cessat: sicut & ubi attractiva debilitatur. Sic quoque, ut docte annotavit Fernelius, cystim fellis occupant obstructio, calculus, repletio, inanitio. Obstructio autem eius est ductus, quo bilis e iecore prolicitur, aut eius quo e cysti in intestina eructatur. In utraque alui durior est, pigriorque, fæces albicant, urina flava, crassaque adeo sunt ut sæpe nigrescant: bilis cum sanguine in summum corpus effusa ictero cutem deturpat. In priore tamē cystis prorsus exhausta est, in posteriori illa bilis copia distenditur, variisque exsuperantiæ symptomatis premitur. Calculus in cysti fellis plerumque concrevit niger, sed tamen levis, & qui aqua immersus innatat, neque ita ut ille qui a renibus aut vesica euellitur, subsidet in imo. Origo illi est a flava bile, quæ proprio cōceptaculo diutius coercita, nec tempestive vacuata, nec novæ bilis influxu renouata, mirum in modum obdurecit. Id autem in primis accidit, quum vterque cystis ductus obstruitur. Huius quidem neque manifestæ sunt notæ, neque graua symptomata, quibus certo ac facile detegi potest. At suspectus iis esse debet, quibus grauis & diuturnus fuit icterus. Decrepitus quidam senex, in iram mire propensus, post decessum sine felle ac sine cysti inuentus est: in cuius sede calculus ingens concreuerat. Quin etiā post diuturnum icterum oborto alui profluuiio, huius naturæ innumeros calculos instar pisi aut hordei, in plerisque exturbati (*inquit Fernelius*) deprehendimus. Nos quoque vesicam felleam in corpore inciso post mortem, lapillis plurimis virentibus, subflavis, & nigris, ad flauedinem & viriditatem tendentibus, repletam conspeximus. Sic non desunt alij qui testati sunt, in folliculo fellis inter re-

sectiones calculum innatum fuisse eiusdem cum felle coloris, quod in boue frequentissimum fuisse asserunt, ut *Benedictus medicus Veronensis testatur*. Ita & Iohannes Langius *epistola 57. libr. 2.* inquit: Nec tantum in renibus & vesica, sed in fellis folliculo bilis quoque, hepatis adustione, in lapidem concrevit: in quo, dissecto Frederici Ducis Saxonie, Cesaris Romani Electoris, corpore, tres iustæ molis lapides reperti traduntur. Neoburgi ad Danubium cum virgo Vestalis continuis sub hypochondrio dextro torminibus affligeretur, & medici nec causam tam diuturni doloris reddere, nec opem ferre possent, defunctæ corpus Illustrissimus Princeps Ottenrichus Comes Palatinus disseccare iussit: In quo cetera viscera præter hepar illaesa fuere: de quo folliculus fellis pondere lapidis inclusi pendulus, in substratum intestinū procubuerat, quod mirum inoffenso fellis vtero, motu attriuerat. In muliere Diamantes vocata, (*ut refert Beniuennius*) vnus, in tunica fellis, atrii coloris, & magnitudine castaneæ aride inuentus est: & alij in panniculo, quo contegitur hepar: vnde etiam veluti in folliculo dependuli sacculum effecerant. Solent autem isti aliquando luteo colore pallere, nausea & cibi fastidio laborare, & diutina aduersa valetudine frui. Bilis porro in propria cysti nunquam tantopere exsuperat, ut hanc in ingentem distendat magnitudinem, ac tunc sane infesta est grauitatis pondere, pressu ac suffocatione, ructu, ardore, siti, iracundia, & si quando forte computrescat, febribus intermittentibus. Hinc igitur grauissima mala prodeunt, nec certe leuiora, quum affatim ea prorumpit. Cystis enim quum prorsus exinanuit, omnemque bilem suam foras eructat, aut biliosas vomitiones, aut cholera morbum, aut diarrhoeam, aut dysenteriam, aut alia his finitima symptomata concitat. Non pauci e viuis erepti sunt, in quibus non alia interitus causa comparuit, quam quod folliculus bile omnino esset exhaustus. Sed icterus qui ex obstructione meatuum ad bilis cystim pertinentium fit, repente (*ut diximus*) hominem adurit, sine febre & magna corporis aut virium iactura. At ob iecoris inflammationem, totum quoque corpus biliosis excrementis perfunditur, propter magnum sanguinis incendium: urina & alui excrementa flava bile colorata sunt, febris concurrit vehemens, varie faciei color mutatur, sitiunt agri, & in iecoris regione sensum grauitatis percipiunt: quemadmodum euenit Machtilde Adriani, Delfis in duplici Cruce habitati, acutissima feb. ictero cum inflammatione iecoris ad necem vsque laboranti, satis vetula, ad quam post tres septimanas prius ingressus eam, Deo inuante, cum magna laude curauit. Fit etiam icterus per crisin in iudicationibus febrium biliosarum, ut exemplis ostendimus in lib. nostris de febribus: etiā fit ex venenata qualitate sanguinem corrumpente, sed de his postea suo loco, nunc aliud exemplum proferamus.

OBSERVATIO XVII.

De muliere ilea malo correpta, & in icterum incidente, & curata.

Potest

8.

9.

Qui morbi in cysti fellis.

Lapilli in folliculo fellis reperi.

I Otest aliquando icteritia fieri per communitatem ab intestinis, dum ipsa intestina sunt oppilata, ut in colico dolore & ileo, in quo casu bilis in intestinis retenta ascendit ad stomachum per reuolutiones intestinorum, & fit ardor in ventriculo & corruptio digestionis, vertigo, & similia: uti nuper euenit mulieri ex ilei dolore in icterum incidenti: quæ cum ingenti dolore torqueretur, & simul ictero affecta esset, clystere iniecto, statim melius habuit. Deinde adhibitis remediis deop-pilantibus & ventositatem carminantibus, quæ etiam ad icterum facerent, admodum breui per nos fuit curata.

S C H O L I A.

A Rculanus medicus insignis, cum varias causas icteritiæ recenseret, tandem adiungit icteritiam fieri per communitatē ab intestinis, quando obstruitur extremitas meatus cystis fellis ad iunum intestinum, propter phlegmata, quæ sunt in ipsis intestinis obstruantia orificium dicti meatus, vel dum ipsa intestina sunt oppilata, ut in colico dolore, & ileo. Et licet secundum eundem, in duplici meatu possit fieri oppilatio, ex qua icterus oriatur, nempe in illo, per quem folliculus fellis attrahit bilem ad hepar, aut in illo, per quem expellitur ad fundum stomachi vel ad intestina: tamen cholera etiam crassa, replens intestina, potest esse causa, cur cholera existens in cysti non veniat ad intestina, quāuis meatus sit apertus: & in hoc casu aliquando cholera retenta in intestinis, ascendit ad stomachum, & fit ardor & nausea in stomacho, & symptomata iam prædicta, & in his casibus non habens descensum per intestina, reuertitur ad hepar, & postea spargitur cum sanguine per totum corpus & est causa icteritiæ. Hoc autem fit valde raro & non nisi sopita expulsiva, vel destructa, & sopito aut destructo intestinorum sensu, vel etiam destructa operatione villorum latitudinaliū ipsorum intestinorum, quod aliquando accidit propter nimiam ipsorum extensionem: unde colica est causa icteritiæ, & antecedit eam, quando icteritia antecedit colicam, quando propter oppilationem, aut aliam causam colera retenta non venit ad intestina, ad stimulantem expulsivam, & lauandum intestina. Et pendunt ambæ scilicet icteritia & colica, ab eadē causa communi, ut puta ab oppilatione pori fellei, venientis ad intestina. Habetis & alia plurima apud eundē Arculanum, de causis & signis icteritiæ, quæ perlegere poteritis. Est tamen dubitatio de eo, quod dicimus, icteritiam fieri cum doloribus circa ventrem: quod etiam fatetur Auicenn. cum dicit, colicam cum ea iungi. Et nos sæpe vidimus in praxi ad colicum dolorem succedere icteritiam, & subsequi colicam ad icteritiam. Et ratio dicat, id fieri posse, quoniam causa obstruens potest etiam dolores ventosos facere, si in aliam partem transmutatur. At Hippoc. 5. aph. ult. aphor. ait: Qui icterico morbo tenentur, non valde flatuosi fiunt. Exponit Gal. quoniam bilis materia non est generatio-nis flatuum apta. Gignuntur ergo solum flatus a calore debili. At aliter aphorismum exponit Iac-

chinus, & magis ad veritatem, quæ obseruatur experientia, quod verum est ex parte materiæ biliosæ flatus non fieri, sed non ex parte pituitosæ, quæ obstruit. Si ergo icteritia solū sit sine alio affectu obstructionis, tunc flatus non fiet: si cum obstru-
Solutio.
ctione, tum solū, cum est a grassis & viscidis & frigidis humoribus, quod sæpe contingit. Dubitatur secundo, pro curiosis verborum Gale. Nam si vis expultrix alienorum, vesicæ tribuitur, ergo & sensus quo percipiat, quod quātitate vel qualitate est onerosum: ergo & nervis participat. At contrariū huius dicitur 3. de facult. e. 2. quod nullis nervis participat. Falsum vero hoc est, & contrarium his quæ 5. de usu part. 9. dicuntur. Vetus interpres proflus affectus legit: sed causam non reddit, cur dicatur. Vnde manifestum est, quod nervis participat. Sic ergo legatur litera: nec tamen id similiter se habet in vesica iocinoris, hoc est, non sentimus ipsam grauari quanto vel quali bilis. Vnde manifestum, quod exiguis admodum nervis participat, i. quod habet exiguū sensum: ergo exiguos nervos, quod etiam de usu partium fatetur Galenus.

O B S E R V A T I O XVIII.

De febre acuta, post septimum diem cum icteritia cessante.

M Vlier quædam Alcmariana, vidua, sæpius icteritiæ obnoxia fuerat. Hæc cum acute febricitaret & tertianam cōtinuam haberet, post septimum diem tota palluit, & icterica euasit, & a febre, bile per crisin ad partes exteriores elata, liberata est. Quæ deinde cum nullam sentiret grauitatem, tensionem aut dolorem, in hypochondrio dextro, manumq; huic loco admouens, cum perciperem neq; tumorem, neq; duritiem aliquā subsistere, atq; viderem alui excrementa esse naturalia, incolume iecur, iudicaui bilem effusam per totum corpus, cutemq; colore aureo defœdatam per modum crisis: ideo & a febre per illam expulsionem liberatam fuisse. Quæ etiam mox, sudore euocato per cutem, paucis remediis ab ictero conualuit.

S C H O L I A.

R Ecte scribunt medici, icterum quoq; per crisin posse fieri: quod quidem vitium febrientē ægro, repente ac cumulativè superueniens, febrem si finierit crisin testatur, materia ex alto foras prorumpente, prorumpente nimirum ad cutem bilioso humore, ratione bonæ indicationis, ut ex Paulo & Galeno liquet, qui morbus regius, & excrementi vitio quoque generationem habet: eo siquidem crassiore existente potius quam multo, nam si tenuis eadem fuisset bilis, utiq; & in eadem crisi foras propulsata fuisset. Id quoque confirmabunt alui excrementa, & urina, quoniam utraq; secundum naturam se habebunt, & ob eā causam nullum visceris affectum declarabunt. Fit itaq; ex effusione bilis, quæ per iudicationem fit in febribus, ut etiam aliquib. exemplis ostendimus in lib. nostris de febrib. de quibus Hippocr. meminit 4. aph. 62. & 64. Malum, inquit, est ante diem 7. icterum euenire in febribus: at die 7. & his, qui deinceps, bo-

Quomodo colica potest esse causa icteritiæ & rursum icterus causa colici doloris.

Dubium.

Signa morbi regii ex crisi.

num est. Subiungit, nisi dextrum illum obduruerit, hoc est, nisi morbus eueniat occasione affectu, qui omnes communi ratione morbum regium faciunt, eo quod obstruunt, *vt Galenus ait*, meatus fellis: sunt autē hi, *vt diximus*, vel illi meatus, quibus ex iecinore ipsa vesica attrahit bilem, vel quibus ex vesica truditur bilis ad intestina. Per duriciem ergo Hippocrates intellexit omnem affectum tumoris, seu phlegmone sit, seu scirrhus. Sape autem icterus fit ob aliquem affectum iecinoris, obstructionem nempe, inflammationem, vel scirrhum, *vt scribit Galenus*, quorum affectuum, cum nullus adfuerit, alteram causam adesse constat, naturam videlicet, morbos curantem, nempe quæ ex crisi fit. Significat ergo hac sententia Hippocrates, tunc laudari debere regium morbum, cum sola nature pulsione fit: & hæc est crisis, quam dicit etiam nō semper laudabilem esse, sed solum a die septima. Cuius causam Galen. scribit. Quoniam, *inquit*, ante septimam diem non potest bilis efferri per viam crisis in cutem: itaque necessario accidet ob aliquem iecinoris affectum, *inquit Galenus*, qui tres sunt; obstructio, inflammatio, scirrhus. Hæc quoq; ad signa prognostica pertinent: nam symptoma in qualitate mutata, insigne non est. 12. meth. Nihil ergo lethale significat, nec curam exigit, nisi ob foeditatem, a qua provenit. Curam exigunt, vt inflammatio venosi generis, vt scirrhus, vt obstructio, vt vesicæ infirmitas. Interea tamen, si pulsione nature fiat, distinguunt Hippocr. & Gal. signo iam dicto, quod ante septimam non laudatur, sed post septimam, non necessario, quia tūc etiam ex affectu iecinoris potest provenire, qui etiam ultra septimam persistere posset, & mox bilis operationem operari. Intelligitur hic bona crisis, repestiue & legitime facta: alias crisis erit symptomatrica dicta, quæ ante septimam euenire potest: quare erit malū, vel quia malam crisin significabit ante coctionem, vel malum iecinoris, aut vesicæ bilis affectum. Anceps tamen huius terminus videtur, cum & ante septimum salutaris aliquando fuerit, *vt nos ex Hippocr. de Epidemiis ostendimus, lib. 3. de febr. Scholio Obser. 10.* Sic etiam apud Hollerium c. 37. de morbo regio, anno 1545. quidam sexto factus ictericus, commota aluo biliosa deiecit, urinis nigris & multo felle tinctis: febris expers iam ambulabat, quasi omnino liberatus, 14. recidua, 17. obiit. Aliis duobus idem accidit. Quidam admodum robustus, ante septimum ictericus factus, ægerime, & cum recidua, euasit. Anno 1549. mense Aprilis & Maio (quo fere tempore Luteriæ febres tertianæ exoriuntur) multis aureæ urinx, & morbus regius primis diebus. Cuiusdam nobili ita affecto detractus sanguis ter ad octo fere vascula iteratis vicibus. Sanguis totus & spuma & consistentia flauus. Visus est conualuisse 17. recidua, alui profluuium, bilis crassa & meracior, singultus levis. 21. obiit. Laborauerat aliquando lue venerea. Multos quoque in Epidemiis ante septimam euasisse legimus: In Coacis salutarem esse icterum 7. 9. 11. 14. Si indurerat, ambiguum. Galenus de rat. vict. in morb. acutis,

in biliosa febre ante septimum ictero cum rigore vel horrore solui voluit: si vero absque rigore, *ὅς οὐ τὴν κατὰ φύσιν*, lethale. Vbi criticum icterum, sine tumore, aut inflammatione hepatis, & excretionem consequentem, horrores vel rigoris nomine intellexisse videtur. Plura de his vide apud Altimarum, cap. proprio de ictero: & Amatium supra historiam illam, centur. 3. curat. 40. in quibus locis ad longum hæc res tractatur. Quod ad reliqua signa prognostica attinet, etiam & hæc adiungere possemus: Morbo regio laborantibus (*secundum Hippocr. aphor. 42. libr. 6.*) si fiat hepar durum, malum: nam & icteritia, quæ a lapide, & quæ a scirrhus, incurabilis: quidam ferunt & carnem & verrucam in meatibus increuisse: Sed & Celsus, auctoritate Dioclis, testatur, quod si morbus regius post febrem oriatur, ex toto proderit, si post hunc febrem, occidet. Icteritia si fuerit diuturna, periculū hydropis minatur, potissimum si vrina etiam diu fuerit aquosa: tunc equidem obstructio magna a visceris frigiditate provenit. At malum quoque est, prostratum appetitum esse, & ægrum vigiliis molestari, delirioque affici, sermonemque cum labore formare. Hæmorrhoides vero in hoc morbo fluere bonum. Periculis quoque obnoxius est homo, si icteritia confirmata laboret, & non curetur, neque materia expellatur: subito enim tandem cor aliaue aliqua nobilis pars opprimitur. Urinæ innatans, quid simile orobi grano, malum, & vrina alba, parum tincta, *vide de his Arculan. & Auicem* sed crocea & tincta magis, salutem denuntiat. Turgidus venter in regio morbo malus, & valde tumescens lethalis magna ex parte, & secundum Gradum infectio crocea per transennam commissuræ capitis anterioris, lethalis, hepate inflammato. Icteritia etiam sine febre, iuxta Valesc. in senibus pinguibus, raro aut numquam curatur, vt ipse sape expertus, materia crassa viscosa existente. Citrina magna ex parte velocius curatur nigra, & citius generatur ac terminatur. Citrinæ frequentis crisis sunt signa & ægriudinum hepatis, nigræ splenis, sed de nigra latius suo loco, quibus si hæmorrhoides fluxerint, præcipue in nigra bonum. Sed e splene nigra magis diuturna quam quæ a iecore: licet & hæc a iecore quandoque fieri posset: *de quibus vide Arculanum*, & etiam de viridi, cum triplicem icteritiam faciat: quanquam lien nunquam progignat icterum flauum. Quantum vero ad curationis rationem spectat, si icterici fiant ratione bonæ indicationis (*de quibus nunc agemus*) facile hi curantur (*Galenus teste 9. de compos. medic. secundum locos, & Aetio cap. 18. libr. 10.*) ex aquarum potabilium balneis, ac olei discussorii affricione, & omnibus cutem rarefacientibus, quale est anethinum oleum & chamæmelinum, irinum & amaracinum. Similiter, (*vt inquit Aetius*) rosmarinus herba, oleo incocta, ipsum plurimum discussorium facit. Cum his præterea viscus adhibendus est humidior, qui humorum crassitudinē moderate attenuare possit. *vt eidem Galeno visum est 5. de loc. affect. & Aetio præcitato loco.* Quanquam idem Galenus eodem loco

4.
Signa prognostica

6.

7.

8.

Curatio morbi
regii si crisis ratione fiat.

loco præceperit taliter laborantibus, ut aqua, sua-
pte natura calida, & cui discutiendi vis esset, ute-
rentur: ex his namque quidam bonam valetudi-
nem consequutus fuit, *ut ipse inquit*. Interea crisis
choleræ ad cutem non est impedienda, sed potius
adiuvanda aspectu rerum citrinarum (*ut Arcu-
lanus iubet*) & induendo vestes citrinas, & cum e-
ductione per poros cutis, cum frictione, balneo,
& sudorem euocantibus.

OBSERVATIO XIX.

*De ictero absq. febre, sola purgatione & nodulo in cer-
uicia dependente & expresso, & ceruicia e-
bibita, curato.*

NO B I L I S matrona Kerckvveruia, non feбри-
citans, & bene valens, toto corpore croceo
facto 17. Sept. die, anno 1587. consilii causa
me adit, cum subito ictero correpta esset, & ex-
crementa alba & duriora essent. His duobus re-
mediis miraculi instar statim convaluit: *℞ syr. ex
infus. ros. pallidar. cum foliis senæ ʒj ss. diacatholici ʒ.
ij. aquæ agrimonie ʒij. misce.* detur in diluculo.
Aluum egregie deposuit. Mox quotidie ceruiciam
bibens, expresso nodulo infrascripto, in ceruicia
dependente, convaluit: *℞ marrubii exsiccati m. j.
rhab. optimi incisi ʒij. schœnanthi incisi gran. v. croci
orientalis gra. iij. spec. diarhod. abb. ʒj. fiat nodulus fi-
lo astrictus.* Ita Margareta Teylingia, cognata no-
stra, ex solo decocto foliorum buxi in sero lactis,
sine aliis remediis ab ictero curata fuit.

S C H O L I A.

SC R I B I T Diosc. succum marrubii e foliis con-
cusis expressum, & sole coactum, cum vino &
melle illitum, oculorū claritatem adiuuare, na-
ribus regium morbum expurgare. Memini anno
1559. mulierem nobilem vetulam de Auizaet, in
Hagha Comitis ex ictero laborantem, ex oppila-
tione cystis fellis, admodū diuturno, multis reme-
diis adhibitis & purgationib. & attenuantibus, &
decoctis, p. medicos doctissimos, nō potuisse cu-
rari; cui continuū vsus syrupi & succo solo mar-
rubii cōfecti, cū zaccharo, admodum cōmendaf-
sem: quo cū die vsa esset, ab omni flauedine icteri,
qua per duos annos & ultra afflictata esset, curata
fuit: ita, ut illum syr. pro curando ictero semper in
summo honore habuerim. Sic quoque exsiccata
herba in nodulo egregie pfuit. Laudatur & apud
Aetium cremor absinthii, & succi cichorii cyathi
bini aut terni per se aut cū vino poti, & verbenacæ
rectæ aut oxalidis decoctum. Sanguinem hic non
detraximus; mulier. n. pituitosa erat, & catarrhis
sepissime obnoxia. Sed hic videndum, ob auctorū
verba admodum varia, num venæ sectione in hoc
malo sit vtendum? *In lib. de purgantium vi, sic scri-
bit Galen.* Si, *inquit*, morbo regio laborantib. san-
guinē miseris; extremam in perniciem ages. Hoc
etiam argumento vtitur *in lib. de atra bile, ad mon-
strandum medicamenta proprium humorem trahere.*
Alias, *inquit*, idem esset ac venam secare. Cur ergo
nullus in his venam secare est ausus? Contra hanc
sententiam est cōmunis schola. Nam Aetius, *Duo,*
*maxima, inquit, sunt remedia, venæ sectio & purga-
tio. Sed venæ sectio si sanguis abundet, adhibetur.* Sic

etiam Auicenna. Respondetur, Icteria secundū
selsanguinem mitti non poscit, id est, si nulla eius
caussa adsit, sed solus affectus mutati coloris, &
caussa q̄ est morbus, scilicet bilis fusio. Hic. n. bilis
redundantia est: ergo purgatione opus est: hac iu-
ueris; venæ sectione nihil iuueris. Contra vacuan-
tur omnes humores: *& 2. meth.* secat venam in vi-
tiosi succi abundantia. Respondeo, hæc est seque-
strata a sanguine: secundo hæc fixa est, nō mobilis
per venæ sectionē: quare vacuabis sanguinē depu-
ratum. At vbi adsit caussa antecedens, a qua cōti-
nens foueatur, tunc distinguendū est. Nā si ex co-
pia eius in venis, corpus cacochymū erit. Stultum
ergo fuerit venā secare, q̄ ad eam copiam attinet.
Si vero copia hæc habet adhuc causam, ut intēpe-
riem, nō secabis; at si sit a phlegmone, eius gratia.
Si vero copia sit, quia nō expurgatur, tunc distin-
guas, q̄ non expurgatur ob imbecillitatem; quare
tunc sanguinem frustra mittes: aut non expurga-
tur obstructione; quæ si a crassis & lentis, & sanguis
abundet, secato venam: si a scirrho, vel lapidibus, nō
secabis. Viso in quibus sanguis mittendus, nūc re-
liquā curationem explere oportet. Hæc vero pri-
mo vertitur ad causam, *ut Auic. recte inquit*: post-
ea ad iam factum morbum. Si ergo caussa fuit na-
turæ impetus (*ut fuit in obs. 17. precedente*) in crisi,
nihil nobis erit negotii circa causam, sed solū cir-
ca affectum derelictum: quæ erit generalis cura. Si
vero ex bilis abundantia, vel ex intemperie, purga-
re bile corpus oportet, & intēperiem sanare. Pur-
gatio ex diaprun. sol. de succo rosarum. Intempe-
riem sanare supra docuimus, victu & medicamen-
tis. Si sit ex calida intemperie, sine materia, tantum
alterabimus, ut recte apud Arculanum & Gradum
inuenies; alioqui si vna adsit materia, digeremus,
euacuabimus, & malam intemperiem remouebi-
mus. Formulas medicamentorum videas apud eos-
dem. Si ex immodico calore partium solidarum
fiat, utemur cibis humidis, *auctore Paulo*, & medio-
criter refrigerantibus, ptisana scilicet, intybo, seri-
cichorio, piscibusq; & vino tenui aquoso, frictio-
ne, exercitio moderato, balneis, ex aqua potabili
tepida. Sed prius distinguere oportet, num ex vni-
uerso corpore bilis procreata sit; tunc. n. neq; do-
lor aderit, neq; grauitas circa ilia, nec febris. Idq;
tamen bifariam esse potest, vel propter solidarum
partium calorem immodicum; vel ratione alimenti,
q̄ ipsis distribuitur. Ex vtraq; tamen caussa ppter
excrementi multitudinem icterus oritur; quoniam
cum expurgari nequit, vna cum sanguine per to-
tum corpus defertur. Vna autem ab altera caussa
distinguetur, interrogatione facta eorū, quæ præ-
cesserunt. Nam si multo tempore calidiorib. cibis
ac potib. vsus fuerit æger, ciborum vitio tribuen-
da erit occasio. Vbi vero hæc non præcesserint, ex
calida vniuersi corporis intemperie morbum re-
gium excitari, aucter censeto. Eadem ratione, si
ex alimento partibus distributo fiet. Fieri autem
etiam potest ex veneno, vel aliqua caussa externa,
citra febrem, sanguine in bilem exagitato, ppter
corruptionē aliq̄ peregrinā, ortam ex noxi me-
dicamenti portione, aut venenatarum bestiarum

De purga-
tione.Ex bilis ab-
undantia &
intemperie.Ex immodi-
calore parti-
um solidarū
curatio.6
Signa vni-
uersi corpo-
ris vitiosi
fiat.Signa ex ali-
qua caussa
externa vel
veneno.

morfu, *Aetio. & Passio restibus*, q. & exemplo pro-
 bat *Gals. de loc. aff.* cuiusdā imperialis serui, qui vi-
 perarum venationi deputatus erat; cum a vipera
 morsus erat, huic vniuersi corporis color fuit mu-
 tatus: adeo vt porri colorē referret: ex quib. causis
 fuit, interrogatione altantium & agri. de co-
 gnoscitur. Si igitur ex veneno sit, propria curatio
 veneni exigitur *Gul. Theriacen* propinquit. Mor-
 su v. huiusmodi mendum, trahendo venenū ex-
 terius, vt rulo gallinae viuentis, & aliis, & empla-
 stis, vt *Arcul.* iubet. Et partes tueantur *frigidis &*
stypticis, aqua ros. accio & succis infigidantibus pro-
 priis, debita adhibita *strictura*; & dentur *bezoartica*
propria; & caliditas, ac siccitas superflua impressa per
 venena remoueantur. Si intus venenū sit, assum-
 tum, adhibeatur vomitus, & secessus; & dentur pro-
 prium remedium, si cognoscatur; frangaturq; eo-
 rum acuitas propriis praesidiis; & membra nobilia
 tueantur, & exstinguatur membrorum & humo-
 rum superflua caliditas. Idem iudicium esto de aliis
 causis primariis; & remoueantur causae corpo-
 reae, tū febres, si aduerint. Si causa obstru-
 ctio sit, ea remouenda: quare a venae sectione humores
 parabimus, vt scribitur in lib. d. vi purgantium, & i.
 de natura humana. Hoc autē fit amouendo quali-
 tatem, qua obstruunt, lentorem scilicet, & crassiti-
 em; q. sit diffecantibus & extenuantibus. Signum
 autem egregium, q. soluta obstructio sit, est seces-
 tingi, vrinam vero reddi melioris coloris: quod a-
 liquando fieri sensim videbitis; confectum ali-
 quando, vt in hac nostra Kerckvveruia euenit, in
 matrona de Auizaet valde sensim. Quae autem sint
 deobstruentia, supra abunde diximus: acida, acria,
 amara, quibus utemur in cibis & potionibus quo-
 ad possumus; interim & acribus, vt clysmatis: post
 ea conducent ea, quae crassam bilem & pituitam
 purgant: in quibus diaphœnicon maius esse cen-
 setur, & elect. de succo ros. pilulae aut. cum turbiti
 & aggregati. in fine & rhab. infusio. Rusticis
 Iacchinus *succum cyclamin radice* propinat ad 3.
 ij. cum vino albo, post horas duas in stupham ducit,
 quae & cutis tincturam per sudores purgat; qui et-
 iam crocei visuntur in strigili. Si vero ex imbecilli-
 tate vesicae felles sit causa, primum corpus purga-
 bimus, saepe enim, vbi nō adeo crassa est, sola pur-
 gatione & meatuum apertione tollitur. Mox victus
 ratione conuenienti, & potione, q. intemperiem
 sanat, curabimus: similiter & extrinsecus ad motis.
 Cum n. iecinori sit annexa vesica fellea, vix fieri
 pōt vt imbecilla fiat, q. iecur vna patiat: quare
 cura eius erit cura iecinoris. Post hanc ad iā factum
 malū descendemus, hoc est, bilē ipsam per summā
 cutē fūsam vacuabimus. Id vero fit omnib. quae i-
 psam in vaporē soluunt, extenuando, & aperiendo
 poros, per quos debet expurgari. Optime itaq; hic
 conducunt, quae cutē rarefaciunt & sudorē cient,
 vt balnea dulcis aquae, & frictiones, ex chamame-
 lo, & eius potio (ante balneum) ex vino vetaqua
 mulsa. Vide balneū conueniens apud *Rondeletii*,
 & errhina purgantia bilē, si in oculis & facie perfe-
 meret affectus. Aetius anagallidis succo vitur, nos
 et betae, vel cyclamini, aut melanthio cum aceto-

Acetū vero acerrimum, si naribus attrahat eger in
 folio desidens, contineatq; et pressis naribus pau-
 lisper, mirifice conducit, Paulo auctore. Addā ad-
 huc exemplū de ictero ex obstructione iecinoris.

OBSERVATIO XX.

De ictero cum obstructione iecinoris.

BARTHILDA Verlania, mulier me hercle pro-
 ba, vxor Bartholomaei Teylingii, sororii mei,
 anno 1551. mē. Aprilis, in iecore dolebat, sine
 febre, pouissimū in hypochondrio dextro, qui do-
 lor totum diaphragma occupabat, & ad ventricu-
 lū vīq; perueniebat: ideo ad vomitū proclius erat;
 sed nulla aut pauca euomebat: alius retinebatur,
 albedine oculorū bile suffusa: & deinde tota cro-
 cea euasit. Lotiū tanquam croco in eo infuso spe-
 ctabatur. Dolor etiam ventriculum cum ructibus
 & ventositatibus infestabat. Ex signis supradictis,
 cum ad tactum doleret, imo sine tactu, in hypo-
 chondrio dextro, dolore satis vehemēti, cum gra-
 uitate, obstructionem in hepate esse cognoui; ex
 qua etiam icteritia orta est. Et quia alius strictior
 erat, & ructus in ventriculo aderant: ilico clyste-
 rem iniiciendum proponebam: sed illa abhorren-
 te, ex glande satis acuta (ex *hiera, melle, sale, & dia-*
gridio) subdita, difficulter, & tantum semel, aluum
 deposuit. Cum morosa esset, & omnia medicamē-
 ta respueret, post aluum solutam glande, licet si-
 bentius potionem purgatoriam dedissem, ad sub-
 leuandum tamē dolorem, hoc fotu coacti fuimus
 vti, cum & vna cum obstructione flatus admixti
 videbantur: *℞ florum chamomill. meliloti, summi-*
tarum anethi an. m. j. sem. anethi 3 iij. sem. fœniculi 3.
ij. sem. anisi, fœnug. ana 3 iij. coquantur in aqua com-
muni, pro fotu. & bibebat hanc potionem: ℞ flor.
anethi, chamomill. scabiosae ana m. j. sem. anethi 3 j. B.
sem. fœniculi, anisi an. 3 j. coquantur in ceruisia com-
muni. Ructus emittebat quidem ea potione; sed
dolor non mitigabatur: quamuis & locus dolens
oleo chamamel. anethino simul mixtis inunge-
retur. Quo neque dolor cessabat, nisi fotu postea.
Et tunc admisit medicamenta, & primo praescripti
hunc bolum: ℞ cass. recens trahē. diacathol. an. 3 B.
pul. cinamomi electi 3 B. pul. arom. ros. sine musco, gra-
ij. pul. sem. danci gra. ij. fiat bolus; quo bis aluum depo-
suit. Hypochondria oblinebat lequenti vngu. ℞
dialthae 3 j. olei lilior. absinthii an. 3 ij. misce. & bibe-
bat decocti artemisia 3 iij. 3 j. B. cymini parum pulu.
incocti, ad ructus emittendos & ventositates. Ve-
rum dolor nondum ex toto mitigatus est; sed ma-
gis increbuit: ideo vti sumus vesica fomētis imple-
ta, & adhibita loco affecto, & sacculo ex hisdē reb.
imposito, & emplastris ex rad. althae, flor. meliloti,
chamom. absinth. decoctis adiectis, muccag. lini, fœnis-
grae, & oleo lilior. supra indictis. omnibus istis nihil
iuuantibus. Quare purgationem quoq; adhibui-
mus: ℞ diacathol. 3 B. elect. de sacco ros. hiera pira
simplicis, diaphœni. an. 3 j. trochys. aer. hab. 3 j. B. agar.
trochys. 3 B. aqua fœniculi, brygloss. absinthii ana 3 j.
miscelū sit in aurora; & coptole eduxit pituitam.
 Et tribus magnis ventosis sub stomacho & hypo-
 chondrio dextro apposis, dolor incantamentū
 instar sedabatur. Remanente adhuc grauitate in
 hypo-

Curatio ex
veneno.

7

Curatio ob-
structionis.

Nota.

8

Ex imbecil-
litate cystis
felle.

9

4

hypochondrio dextro, sed leui; & dolore iterum, sed non tam graui, subinde redeunte; ad obstructionem tollendam & icterum, hoc decocto vte-
tur: *℞ marrubii viridis, cichorii cum toto, dentis leonis cum toto, agrimonie, fœniculi, cassiæ, hyssopi, capill. Ven. fumarie ana m. j. absinthii utriusque, borag. ana p. j. quinqueread. aperitiu. ana ℥ ss. rad. liquir. ℥. iij. semin. fœniculi ℥ ij sem. 4. frig. maior. ana ℥ ss. v. uar. pass. ab arill. repurg. p. j. fiat decoct. in aqua communi, pro ℔b. ij. addendo syr. de quinqueread. ℥ j ss syr. acetosi compos. syr. de cichorea cum rhab. ana ℥ j. misce. in eodem decocto hic globulus pendeat, filo adstricto, quem exprimebat dum portione mane hora vi. & meridie hora quarta hiberet: *℞ rhab. selecti ℥ j. ss. agartici trochis. ℥ ss. spica schœnanthi ana gran. v. croci orientalis. ℥ iij. b. alb. anagran. iij. crassius confusa in nodulo ligentur.* Et deinde iterum accepit superiorem purgationem in aurora; quæ cū iterum copiose eduxisset pituitam & bilem vitellinam, ab omni dolore liberata est; & corpore exteriorius magis bile perfuso recte habuit. Interea post medicamenti operationem sumsit ius pulli ad reliquias abstergendas, & excreuit denuo biliosa. Pro roboratione iecoris sumebat ex tabulis diarrhod. abb. & tandem ab obstructione hepatis, tum ictero, Dei ope, sanata est; cum astantes ob insignem dolorem, quo prius detinebatur, illam pro deplorata habuissent.*

SCHOLIA.

5

VIDEBATUR hic obstructio esse in concaua hepatis parte, cum ictero; cum ad vomitum procliuis esset, licet non vomeret, tamen dolor ad ventriculum ascendebat, neque febricitabat, vt filius illius Berossii doctoris apud Amatum centur. 4. curat. 83. annos natus quinque, cui & iecur dolebat, & in eius oculorum albo icteritia percipiebatur; cuius lotium eius coloris erat, ac si multū croci in aqua iniectum esset, non nisi ad nigredinem vergens; & stercus album conspiciebatur: cū quibus ventriculus infestus erat, & ad vomitum procliuis; ita vt puer ea, quæ comedebat, sæpe euomeret: si ea tamen retinebat, in putidos ructus, caliditatem extraneam arguentes, incurrebat. Cū quibus omnibus puer hic aliquantulum febricitabat, quæ omnia iecinoris concauas partes obstructas esse declarabāt. Ideo pro victu prisanam cum sem. melonis paratam dedit, aut amygd. cremorem, iusculū pulli; & pro potu hordei decoctum. Et hunc syr. exhibuit stomacho ieiuno: *℞ syr. de end. lupul. ana ℥ ss. aq. end. cichor. lupul. an. ℥ j misce. & iecinori hoc emplastrum apposuit: ℞ far. bord. ros. rub. an. p. j. ss. absinthii, lupinorum, chamomil. an. p. j. schœnanthi ℥ ij. croci ℥ j, olei ros. chamomill. an. ℥ j ss. cum decoct. chamomill. & ros. fiat emplastrum,* quo breui optime valuit; adeo vt sexto die epoto pharmaco ex rhubar. cum manna, sanitatem integram obtinuerit, stomacho quoque inuncto linimento infrascripto: *℞ olei coton ℥ j. ros. ℥ ss. cera parum. ad ignem fiat unguentum.* At nostra ægra validiora requirebat remedia, cum simul pituita cum bile vitellina eam magis affligeret sine febre.

6

OBSERVATIO XXI.

De ictero ex oppilatione meatus cystis seu poris fellis, tendentis ad intestina, unde ingens colicus dolor sequutus, cum fecum induratione.

Mulier Alemariana, quæ in platea Diuæ An-næ habitabat, annos viginti septem nata, cum peperisset, optime in partu habuit. At puerpera existēs, post mensem a partu, cum forte non ex integro purgata foret, nimium cito sese aeri ventoso cōmisit: vnde icteritia oborta, ex obstructione meatus vesicæ fellis, tendentis ad intestina: mox subsequutus dolor ingens colicus, etiā circa hypochondriū dextrum, versus partē inferiorem ventris; qui dolor postea ad ventriculum ascendebat, cum tanta angustia & vehementia, vt ab astantibus pro deplorata haberetur. Postquam mulierculæ varia adhibuissent remedia & purgationes, quibus omnibus nullo modo alius mouebatur, tandem coactæ fuerūt me vocare. Ingressus ad illam mense Septembri, anno 1549. animaduertens huius insignis obstructionis & doloris causam esse materiam biliosam, & pituitosam ac flatulentam, omnium primo eam tollere decreui, nempe enemate infrascripto; cum illa quoque fateretur, se ante partum icteritia laborasse; at nunc multo grauius, cum fecum induratione: & quod in partu minus purgata fuisset: vnde malum ita auctum. Tale erat enema: *℞ parietarie, maluæ cum toto, mercurialis, artemisie, centaureæ minoris folio. viol. ana m. j. melissæ florum chamomill. meliloti ana p. j. semin. lini, fœnugrac. anisi, carui, ameos, petrosel. communis & macedonici ana ℥ j. coquantur in aqua communi. pro ℔b. j. adde cassiæ pro chysteribus. electuarii, hierapicræ an. ℥ ss. benedictæ laxat. ℥ iij ss. olei amygd. dulc. chamomill. ana ℥ j. olei scorpionis (cum & lotium non bene redderet) ℥ ss. salis communis ℥ j. ss misce. Bis excreuit: primo squibalas duras, ac excrementa alba; secundo vero paulo liquidiora, cum exigua alleuiatione. Deinde vt hoc decocto vteretur mandauit: *℞ melissæ, iuæ muscato, chamapityos, cichor. end. marrubii ana m. j. mentherubæ (ob dolorem stomachi) m. ss. flor. chamomill. flor. cord. an. p. j. flor. ros. rub. (ad hepatis & stomachi roborationem) p. ss. cori. rad. fœniculi, apii, petros. an. ℥ j. liq. rasa ℥ ss. sem. anisi, corian. preparati, agni casti, carui an. ℥ j. calami arom. incisi ℥ j. ss. cicerum rub. cassiæ an. p. j. hordei communis p. j. fiat decoct. in aqua communi pro ℔b. j. ss. stent per noctem supra herbas, colatura adde syr. de artemis. de scolopend. de cichor. cum rhab. ana ℥ j. syr. de byzantiis ℥ ss. mis. bis in die ex eo sumebat. Sed cum rursus dolor vrgeret, hoc fotu vli sumus: *℞ flor. chamomill. meliloti, absinthii, mentha ana m. j. florum ros. rub. p. ss. semin. anisi fœnugr. lini ana ℥ j. fiat decoct. in aqua communi pro fotu, fiat fotus cum spōgiis, vt artis est. At cum dolor nec eo sedaretur a decocto suprascripto hanc purgationem exhibuimus (licet post fotum locus dolens inungebatur cum oleo chamæm. aneth. ros. simul mixti:) *℞ elect. de succo ros. ℥ ss. rhubar. selecti pulueris. ℔ j. spica incisa & subtiliter pulueris. gra. iij. diag. gr. ij. cum aqua fœniculi, lupuli, melissæ an. ℥ j. fiat potio. quæ satis fortis in puerpera: sed viti-****

2

3

bus bene constantibus, & cum iam per mensem a partu progressa esset, optime tulit. Oportet enim in ictero ab oppilatione meatuum, forti uti purgatione. Quam equidem cum mane in diluculo sumisset, septies aluum deposuit: & tunc urinam valde tinctā reddidit; quæ & postea magis incrasata est & crocea euasit, usque ad nigredinem. Et ideo rursus adhibito fomento, non tantum dolor sedatus est, sed ægra ab icteritia liberata, & pristinae sanitati (*quamvis ab astantibus pro deplorata habita*) restituta est. Sed quod iam mente fere exciderat; a purgatione cepit cyathum iuris pulli, pro medicamēti abstersione. Aliqui solo decocto rad. chelidoniz curati dicuntur. Quo & feliciter usus sum in muliere, in parte Orientali Delphis diuturno ictero affecta.

S C H O L I A.

PRO curatione huius mali, illud dictum Rhasis 7. Continentis circa principium, cap. de icteritia, diligenter considerandū puto, quod ipse ab alio medico magni nominis audierat, hoc ipso affectu nullū deteriorem esse, si eius curatio dimitteretur, vel in ea levis error committeretur, cū vidisset multos hac ratione extinctos. Et ita nō fuit mirum, q̄ hæc mulier, neglectis optimorum medicorum remediis, perperā muliercularum pharmacis nescio quibus vtens, in summum discrimen peruenerit. Et ideo vulgus in remediis ictericorū facile fallitur, cum non vna sit causa huius mali, vt diximus, sed varia: quæ in primis animaduertenda atque tollenda; & demum affectum, amouere oportet. Vbi enim diu durat icterus, facile in peius vergit: cuius exemplum habes apud Amatum, cēt. 1. curat. 83. de morbo regio, ictero dicto, ob crurum vlcerata quædam occlusa eueniente, & postea in dysenteriam cruentam permutato, deinde in mortem, ob hepatis debilitatem. Et sicuti in puerperis hoc malum graue est, ita & in grauidis magis: quib. si forte eueniat, vt aliquando euenire solet, a fortibus purgationibus & aperitiuis abstinendum est. Rondeletius his præscribit victum optimum, & hoc medicamētum carpis & pedum plantis ad-mouet; quo sanitatem pollicetur: *℞ foliorum visci queruini m. ij. chelidonia marrubii ana m. ss. contundantur in mortario, addito paucō vino; & applicentur.* Ego tamen in Illustri Domina de Schagen, anno 1548. cum in ultimo mense partus icteritia citrina laboraret, ac iam fere tempus pariendi instaret, (quod etiam ad facilitandum partum faciebat, & ad icteritiam) hoc sequenti vino Hippocratis dicto, seu clareto, cum non febricitaret, commode usus sum: *℞ marrubii, pulegii, capill. Ven. verbenæ, artemisia an. p. j. calami arom. incisi ʒj. β. croci orientalis ʒj. cinamomi selecti ʒβ. cum saccharo & vino Rhenensi albo. fiat claretum secundum artem, pro pinta vna. Et sumebat mane ex eo cyathū vnum, & meridie hora quarta alterum.* Eo cum vix vsa esset per quinque aut sex dies, feliciter peperit, & ab icteritia in totum liberata est. Verum quia omnia aperitiua, vt & hæc erant, menses euocare possent, & partum immaturum ad exitum promouere, vt sequeretur abortus; ideo hæc nullo modo compe-

terent, nisi circa finem, cum partus inflat, vt felicius procedat, vt hic euenit.

OBSERVATIO XXII.

De ictero nigro.

VIR quidam in via molitoria Delphis habitās, cum per duodecim fere annos quartana laborasset (*quod multis portentosum esse videri potest*) totus niger euasit. Deinde cum nigro ictero etiam longo tempore tum quartana affligeretur, neque ab eo, neq; a quartana liberari posset (*quem quatuor annos, cum iam octo annis quartana laborasset, a plenitudine curaueram, quartana deinde post 14. diem a pleuritide curata redeunte, consului, vt bona victus ratione vteretur, neq; amplius medicamentis se ipsum conficeret.* Verū postea contra nostrum consilium, cum uxorem ad me misisset, cui interdixerā ne empiricis fidem haberet, forte fortuna inciderat in Ægyptium quendam medicum (vt nostri vocant) qui illi pollicebatur ex vna potione sanitatem: qui cum esset vitæ pertæsus, die sequenti a potione exhibita obiit.

S C H O L I A.

QUAMVIS icterus niger ad lienem pertineat, hic tamē etiam de eodem malo aliquid commentabimur. Cum enim amara bilis seu citrina, auctore Gal. 3. de caus. sympt. a vesica iecinori incubente expurgetur; ita nigra bilis seu melancholicum excrementum a liene expurgatur, eod. Gal. teste, loco citato. 2. de natur. facul. & 4. de usu partium. Tercium vero in venarum concoctione excrementum expurgans renes, nempe per lotium. At nunc loquimur de nigra bile; quæ si non separatur, succedit symptoma a Paulo c. 49. lib. 3. μέλας, hoc est, niger icterus, seu ater morbus regius appellatus. Qui nihil aliud est (*vt ex eo auctore colligitur*) q̄ delatio quædam sanguinis impuri, non expurgata ab eo nigra bile, in vniuersum corpus; vel proprii instrumēti expurgantis imbecillitate, vel iis per quas expurgatur quomodocunq; obstructis, vel ratione ipsiusmet excrementi, cū immodica fuerit eius quantitas. Lienis actionē tum eius usum vniuerso corpori cōmodum, habes & 2. de nat. fac. 4. de usu partium. & 9. de compos. med. secund. loc. & 6. de loc. aff. In ictero nigro totum corpus nigricat, & vlcerum cicatrices nigra, 2. de fac. natur. suntq; nigriores quam ab hepate. 5. de lo. aff. & apud Paul. Lienem affectum esse notat dolor sub sinistro hypochondrio, teste Aetio c. 7. lib. 10. aut adest distētio, aut grauitas, seu tumor. Estq; hic affectus symptoma in genere affectus corporis, & in eorum numero, quæ visibilia dicuntur, ac totius corporis, lib. de diff. febr. & 3. de sympt. caus. Hoc vitio affectos sequitur tristitia præter rationem, & mordacitas eorum, quæ circa ventrem sunt, difficultasq; spirandi: cibos auersantur & nigra lotia excernunt: aliquando autem & per quædam intervalla corpora ipsorum tepescunt: stercora vero chalcanti colorem referunt; & alius resiccatur, vt liquet ex Aetio, c. 17. lib. 10. Inter omnia signa præcipuum existit, ater vniuersi corporis color. Si sit ex obstructione meatus, adest grauitas & distētio; vel etiam dolor lienem exercebit. Si sit ex atra-

Quid sit icterus niger frequenter morbus regius.

Signa lienem affici.

Quis affectus præter naturam sit icterus niger. Signa eius sūt.

Signa causarum.

Rondeletii experimentū in mulieribus grauidis icteritia laborantibus.

Historia mulieris grauidæ ab icteritia curata.

4 attrahendi potentia imbecillitate, cum & intemperantia causse esse poterunt, cum simplices tum compositae. Fufissime distinguuntur causse ab Aetio c. 14. lib. 10. ab his, quae eduntur, bibuntur, & ex eis, quae forinsecus cuticulę iuxta sinistrũ hypochondrium accedunt: ubi etiam declarat num conferant vel lædant calida seu frigida. Frigida intemperies ab omnibus frigidis læditur, & calida iuuat: contra fit in calida intemperie. Si ex inflammatione splenis vel scirrho ater morb. regius exciteretur, ex propriis signis indicatur, vt libro sequenti docebimus. Si fiat ex eiusdem excremeti vitio, ex vitio prægresso melancholico dignoscetur, siue ex signis frigidi ac sicci hepatis. Quãdoq; etiã utroq; viscere laborante regius morbus euenire poterit, vt sequenti exemplo ostendemus, nigriore quam pro consuetudine veri morbi regii, subsequente colore, ita vt putaretur flaua bilis fuligini esse permixta, vt Gal. inquit, 6. de loc. aff. aderuntq; indicia indifferenter affecti tum hepatis tum lienis. Quod vero omnino grauius afficiatur illi, in quibus atræ bilis humor vna cum sanguine ad cutem est delatus, quam in pallida, ab Aetio scriptum est c. 17. lib. 10. Idem ater morbus regius, si diu perseuerauerit, nec obsequatur medicamentis adhibitis ac cedat, malũ est. Nam consentiente iecinore, aqua intercus succedet, vt liquet ex eodem Aetio. Vrina vero, si suam seruauerit naturalem dispositionem in atro morbo regio, salubre erit indicium: exigua namq; indicabit lienis affectionem, nec adhuc eidem iecur consentire. Ictericæ nigræ euentus rarior est quam citrinæ, & magis prolõgatur, & difficilius curatur. Si sit ex intemperie, ea corrigenda iuxta Aetium. Et si sit viarum obstructio, & copia nigræ bilis cum sanguine, vena interna cubiti sinistri, liene affecto secetur; non tamen copiose, sed per vices potius, si opus sit. Si vero nigra bilis redundet per vniuersum corpus sine sanguine, vel aliquid sectionem venæ impediat, purgatione exhaurienda est, eodẽ humore prius concocto ac præparato cũ medicamento atram bilẽ expurgante; vt cum syr. de succo fumarie, de pomis, cum oxymelite, aqua lupul. &c. & cum purgatione folio. fenæ, myrob. indor. epithymo, confec. hamech. Deinde extenuatibus, sed validiorib. q̃ in hepate, vtendum, cum aceto muls. cort. cappar. rad. thamaris, scolopendrio. Si sit ex inflammatione, seu scirrho lienis, curetur, vt suo loco dicemus. Si fiat vitio alimentorum seu potuum vim habentium succum melancholicum gignendi, adhibeatur victus ratio contraria, vt cap. de melancholia scriptum est.

OBSERVATIO XXIII.

De ictertia nigra, ex utroq; viscere obstructo.

1 **B**ARTHILDA Verlania, de qua ante dictum est, anno 1554. cum per integrũ annum quartana laborasset, & in accessu febrili, consilio pharmacopœi, accepisset destillatũ agrimonie cũ aceto, (quo quidam vtuntur ad quartanam) ingens dolor postea obortus: & rursus laborare cœpit ictertia ad nigredinem & viriditatẽ inclinante, tam ex lienis quã iecoris obstructione; sed hypochondrio dextro magis dolente. Cui hæc præ-

scripta sunt: *℞ marrubii, agrimonie, cassia, cere-rach, fumarie, ana m. j. cort. rad. fenie. cichorii an. ʒ j. cort. rad. thamarisci, cappar. an. ʒ ij. end. capill. veh. absinthii Romani an. m. ss. sem. anisi ʒ ij. follicul. fenæ ʒ j. ss. prun. damasc. nu. xv. epithymi. polypod. quer. an. ʒ ij. fiat decoctio in aqua communi, pro ʒ j. colature addendo syr. de cichor. cum rhab. de end. de epithymo an. ʒ j. misce, ex eo bis in die sumebat, quando non febricitaret: & quia eramus in æstate & fine mensis Iunii, a quartana, (quod dictu mirum est) hoc apozemate fuit liberata; remanente tamen ictero nigro & dolore. Sed cum idem fere decoctum sumisset absque sena, decoctis in aqua floribus chamomillæ adiectis iisdem syr. cœpit aliquantulum a dolore leuari. Sed hoc fortu deinde adhibito, cũ dolor in hypochondrio dextro grauius rediret, ab eodem liberata est: *℞ rad. alihæ ʒ ss. flor. chamom. meliloti ana m. j. absinthii Rom. folior. viol. malua flor. ros. rub. ana q. j. santali citrini & rub. ligni aloes ana ʒ j. sem. lini, fenug. an. ʒ ij. ss. sem. malua ʒ j. coquantur in aq. chamomill. end. an. q. s. & in fine adde vini Rhe-nensis ʒ ij. aceti optimi ʒ j. ss. misce. fiat fortis: quo dolor cessauit. Sed cum aluum non bene deponeret, rursus decoctum præscriptum est, vt prima vice; etiam nodulo iniecto ex rhab. select. agarici trochis. an. ʒ j. ss. & spica ʒ j. adiectis syr. de scolopend. de Byzantio, oxylacch. compos. ana ʒ ss. syr. de cichor. Nicol. cum rhab. ʒ j. ss. misce. & aromatizetur cum ʒ ij. cinamomi selecti, & specier. diar. hod. abb. ʒ ss. Deinde ex iisdem fere herbis præscripto longo decocto, tandem curata fuit.**

S C H O L I A.

AB utroque viscere etiam atrum posse euenire icterum, diximus. Et quia hæc matrona quartana laborauerat, tam ex liene, vel potius vitio totius euenisse potuit hic icterus, quam etiam vitio hepatis, cum & in hypochondrio dextro magis doleret. Cum autem morb. regius ater ex intemperie iecoris aliquãdo euenire possit, sine liene affecto, tunc corpus minus atro colore tingitur: nã si a solo liene, totius corporis admodũ niger erit color. Verũ hic & lien afficiebatur, ob quartanam præcedentem. At ubi vtriusq; simul viscerib. laborantib. contingit, hanc ictertiam nonnulli viridẽ appellare solent, cum ad viriditatem color inclinet subinde, iuxta Auicennam, tũ Arculanũ, qui eundem sequitur: & vocatur ictertia viridis, ex participati-

ictertia viridis, vel mixta ex vtroq; viscere.

4

Curatio.

5 ranti viridi ictero, in cubito aut manu venā secui-
mus, sed potius in talo, cū menses restricti essent:
cui etiam dedimus a venæ sectione infusum rhab.
cum decocto senæ. Deinde, ex mente Hollerii, cū
eiusmodi virginibus talis fœdus color oboriatur,
dabimus purgationem, ex *hierapicra* ℥j. ℞. cū aqua
alkekengi, cassuta, end. & oxymelite; vel hierapicram
cum rhab. & agar. trochis. Vide eundem. Verū sicuti
hic victus ratio communis esse debet vtriq; vi-
sceri conducens: ita & purgatio vtrumq; succum
aspiciens dari debet, *eisdē succis prius preparatis syr.*
de succo fumarie, cicchorii, oxym. cum aqua borag. lu-
pul. end. & cassuta: Deinde purgandum cum infuso
rhab. senæ, epith. vel diacath. & diasenæ. A purga-
tione vtriq; visceri cōsulendum, magis autem aut
minus vni, vel alteri, prout vnus visceris aff. ctus,
vel alter magis vrgebit: nunquam tamē altero ne-
glecto. Quod etiam de emplastris, linimentis, vn-
guentis, fotibus, intelligendum est, tam roboran-
tibus intus vel extra admotis, vtriq; visceri con-
uenientibus, simul mixtis, modo vni, modo alteri
magis cōuenientibus. Absoluto itaq; ictero, nunc
progrediamur ad alia symptomata, nempe cachexiam
& hydropem, licet vtriq; visceri quandoq;
communis, sed præcipue hepatis, cum sine hepate
affecto non contingant; quamuis ab aliis mem-
bris etiam incipere possint, sed non absque hepatis
consensu, cum hepar sanguificationis organum,
(*ut iam sape dictum est*) existat.

OBSERVATIO XXIV.

De cachexia.

1 VIR quidam Alcmarianus, annos quadraginta
excedens, in autumno post febrem erraticam
crura habebat valde inflata; quæ quidem inflatio a
pedib. incipiebat & tibiis: mox & femora, deinde
& totum quasi corpus, tum faciem ipsam, & palpe-
bras ac labia & gingivas, occupauit; quæ omnia ad
albedinem declinabant: ita vt totius corporis mo-
les augetetur, & simul ad colorem album declina-
ret; & tandem testes quoque inflarentur. Hunc
vero præ manibus habebat empiricus: qui cū cu-
rare eum non posset, tandem aliqui ex amicis me-
ad agrum deduxerunt. Cum vero animaduerte-
rem huius corpus non aliter inflatum esse quam
pastam fermentatam (*quemadmodum Serapio me-*
dicus ille antiquus dicebat) in qua digiti impressi
manebant; hunc cachexia correptum esse intelle-
xi. Cui, cum nauta esset, & non diues, iussi vt con-
tinua potione absinthii in ceruisia communi deco-
cti vteretur, egregie. n. prodest: & vt hæc sim-
plicia, nempe *hyssopum, saluiam, absinthium, inuam ar-*
theticam, agrimoniam, cassutam, marrubium, cete-
rach, & rad. ebuli, ireos in vino decoqueret, & vt al-
uum purgaret cum ℥ss. *diaphœnici: mox dialacca, dia-*
curcuma, & theriaca vteretur, sed & hoc decocto
prius præscripto. ℞. *cort. rad. apii, ireos, ebuli an. ℥j.*
rad. bryoniae ℥ij. rad. inulae ℥ij. ℞. hyssop. capit. ven. cu-
scuta, agrimonie, absinthii viriug. an. m. j. follic. senæ
℥j. ℞. agarici fœm. albi & lenis, rad. esulae an. ℥ss. Zin.
albi, cinamomi selecti, schoenanthi an. ℥. ℞. rhab. sele-
cti ℥j. spica gra. v. prun. damas. (q. a durioris alui) nu.
xv. vuar. pass. ab arill. repurg. ℥j. liquir. rasa ℥ss. ℞. sem.

anisi ℥ij. sem. carthami ℥j. ℞. sem. geniste ℥. ij. fiat o-
mnium decoct. in sero lactis, pro ℞. j. ℞. col. Zacch. dul-
coretur. Ex quo modo semel, modo bis in die su-
mens cyathum vnum, quotidie quinquies aluum
deponebat. Et mox cum theriacam, & alia iam di-
cta sumisset, præter spem conualuit.

S C H O L I A.

3 CVM vniuersus corporis habitus, quasi in a-
quositate diffunditur, affectus quidam ori-
tur a Græcis καχεξία, a Latinis malus corporis ha-
bitus dictus, principium hydropicarū passionum,
teste Paulo c. 47 lib. 3. existens. Vniuersa corporis
miscella laxior fit ac emollescit, vt Aetius refert c.
19 lib. 10. Vnde non vna duntaxat pars, sed totius
corporis habitus oblaxus, nempe illæ partes, quæ
oculis primæ subiiciuntur, & musculi & quæ ossa
ambunt, & cutis. Corpora inflantur, quæ premē-
ti digito cedunt; toment facies, genæ, pedum ma-
nuumq; digiti. Cuius rei causam in questionibus
Arist. percontatus est, dicens fieri ex naturalis ca-
loris imbecillitate aut alimento impuro, quod fa-
cile corrumpatur: vnde a membris abominabile
reiiicitur, neq; ob eam causam vnitur, sed tanq̃ vi-
rosum respuitur, & ad inferiora repellitur. Addūt
alii & humoris grauitate id effici, aut quod moti-
bus pedes magis defatigentur, & a caloris fonte
remotiores sint. Faciem namq; & genas, quod ra-
rioris materiæ sint, ob id facili⁹ inflari; & humoris
glutinosi materiā nō facile ab exiguo calore con-
sumi. Scrotum interdū & inguina tument, vt huic
viro: vrina vix demittitur, ac sudor ferme nullus
apparet; venter deinde inflatur, & vlcera, si quæ in-
nascuntur vix coalescunt; lente & grauitè ambu-
lant. Vniuersum etenim corpus (*vt refert Aetius*)
viore albicans redditur, ac inualidum; ita vt crura
interdum vacillent: & in principio quidem con-
coctiones impediuntur, manēte etiam dum appe-
titu; postea vero & fastidium accedit; & respiratio
ipsis fit rara ac debilis, quæ motibus & actionibus
condensatur: aluus etiā inæqualiacrementa ex-
cernit. Aliqui, vt Donatus, hunc affectum præter
naturam propter intemperatiam frigidam & hu-
midam, ad morbum referūt; vel ad symptoma, re-
spectu coloris totius habitus. Et ita secundum alios
est morbus frigidus materialis ac humidus, ex ieco-
ris infirma digestionē, sanguineā quoque sum genera-
te, qui mēbris legitime agglutinari nō potest: vn-
de membra præter naturam intumescunt, ac præ-
mollia efficiuntur. Quæ quidē totius corporis im-
modica refrigeratio ac mollities, ex nulla alia re, q̃
ex sanguificationis defectu, puenire poterit: quæ
vbi immodice amplius augeatur, generadi hydro-
pis causa erit, vt dicemus de hydrope. Et propter
ea Paulus principium aque inter cutem appellauit
hanc affectionem: & Arabum princeps Auicenna,
dispositionem antecedentem hydropisin: quo
fit, vt neq; generari idem malus corporis habitus
possit, nisi & iecur ipsum siue primario, siue per
consensum fuerit affectum, ac imbecillū redditū,
propter frigidā eius temperaturam: ob quam san-
guinem optimum generare nequit, ac pro nutri-
mento vniuerso corpori eum suppeditare: sed i-
psum

καχεξία?

Pars affecta.

Signa.

Quod sit af-
fectus præter
naturam.

Causa.

6 *psum frigidior, serosior, & (ut ita dixerim) magis pituitosum generat ac distribuit. Et propterea (ut inquit Aetius) ut plurimum hæc affectio ex longo morbo cōgregatur, aut ex viscere quopiam in scirrhum indurato consequitur: maxime hepate & splene: neq; raro in dysenteria diuturna, & affectionibus coeliacis contingit, item ob consuetam aliquam cohibitā excretionem. Sæpe numero euenit ex immodica sanguinis profusione, in viris præsertim per hæmorrhoides, aut in mulieribus per menstruas purgationes: quemadmodum & aqua intercus generari consuevit. Et (ut in vniuersum dicam) quæcunque causa accidit ipsi, ac vniuersum habitum in frigidare valent, siue interne, siue externæ fuerint, huiusmodi affectionem generare poterunt: quas dignoscere hand difficile erit, tum ex te ipso, tum etiam ex laborantium seu astantium loquela. Quæ inquam, omnia exemplis clariora euadent.*

OBSERVATIO XXV.

De cachexia ex mensibus retentis: & de altera, ex nimia mensium profusione.

1 **A**NNO 1546. mense Aprili, cum ex Gallia in patriam redissem, Cornelia Ioannis, cognata mea, ac filia auuiculi mei, cū cachexia aliquandiu laborasset, & de hydropemetus esset, & cum toto corpore pallida esset, ac mollitiem contraxisset, ob menses retentos, vix respirare potens interambulandum: cum me in consilium adhibuisset, hunc syrupum omnium primo ex huius: *℞. oxym. squillitici ℥j β aqua melissa ℥ iij. misce. capiebat vnicavice.* Deinde eandem purgavi hoc modo: *℞. diacatholici ℥j benedictæ laxa ℥ iij. cum ℥ iij. decoct. absinthii, mairicuriæ, artemisæ, fumariæ, summitatum lupul. end. cichorii, addendo mellis roscolati ℥j. misce, fiat potio, qua quinquies aluū depoluit.* Mox vena saphæna dicta in talo aperta, mediocriter sanguine effluente: & ebibito decocto *artemisæ, flor. chamomill. fabiæ, in vino Rhenensi, adiecto Zaccha. & paucocinamomo,* ad modum clari, mensibus apertis: & sumendo dialaccam & diacurcumam in tabulis, curata fuit: etiam cachexia in totum euanescente: adeo ut nō diu post viro nupserit, ac mater deinde multarum prolium effecta fuerit. At vxor magistri Theodorici, prope templum nouū Delphis habitans, contraria causa in cachexiam, mox & in hydropem leucophlegmatiam incidit, cum per tres fere annos insigni mensium profluvio fere continuo laborasset, quanquam per nos subinde restringerentur bonis præsidis ac diuersis: sæpius tamen proluvie illa redeunte, ad extremam debilitatem deuenit, & hepate valde refrigerato & debilitato cachexiam incurrit, tandemq; & hydropē, ita, ut postremo pro deplorata haberetur, pedibus supra modum intumescens, etiam facie valde inflata, ut postea neque incedere posset. Variis per me adhibitis remediis attenuantibus & vrinam cientibus, & ad hydropem facientibus, etiā post vniuersalia remedia, & quæ aquam ducerent & ad renes diuerterent materiam aquosam, subinde exhibui dialaccam & diacurcumam: quo factū est tandem, ut multam materiā, aquo-

3 sam per lotium continuo effunderit. Ad pedes supra modum tumidos & magna mole inflatos, ac cedematosos, ut hoc balneo vteretur mandauit: *℞. foliorum sambuci, sampsuchi, seu maiorana, florum chamomilla Romana, florum roris marini, vna cum floribus, saluæ, foliorum lauri ana qu. s. cum nuparum contusi, salis communis ana p. iij. fiat omnium decoctio in aqua & aceto acerrimo.* Mane balneo sic parato, in cupa mediocris magnitudinis vimen intertextum instar cancellorum supra vas vel cupam ponebatur: & pedes nudi supra eandem cupam vel vimen intertextum positi. Et vestibus vndique circumcinctis, somnum hoc modo ex vale euaporante recipiebat: & sic poris apertis sudor puocabatur. Et postea in eadem aqua pedes balneabantur. Quod quidem omni mane, stomacho ieiuno pluribus diebus fiebat. Deinde postea, cum pedes, crura & femora detumescerent, in eodem balneo immisiss & demum exsiccatis fasciis circumducebantur: quod cum continuaretur per aliquot dies, crura cedematosam miraculi instar detumescere: & paulatim non solum a cachexia, sed & leucophlegmatia, remediis ad hydropem aptis, & hæc probe curata fuit, & nunc etiam recte valet, quæ ab omnibus pro deplorata habebatur. Viuit & hoc tempore, anno 1594.

SCHOLIA.

4 **Q**uia autem ex nimia profusione mensium cachexiam incurrūt, facile in hydropem incidunt, ut in hac vltima muliere (quæquam euaserit) cōtingit. Si enim cachexia a stomacho & intestinis ortum habere videatur, tympanitem imminere demonstrat: si a felle, & aliene aut renibus ascitem portendit: si a venis demum ac aliis membris inique nutritis corpore tumoribus inæquali, hypofarcam denuntiat affectus initium. Capiuntur quoq; hac affectione maxime senes (testes Aetii) qui et maxime liberantur timore & pueri, qui facile pereunt, propter vitalis firmitatis debilitatem, & quod succi facile obraritatem cutis in eis transpirant. At qui in vigore sunt, raro in hoc malum incidunt, & facile se extricant. Cum in vrach & venter inflatur, in ascitem terminari volūt quidam; & vbi testiculi inflantur: alioqui vbi totum corpus in molem accrescit, in hypofarcam. Ideo non negligenda erit huius affectus curatio, ut dicebat Aetius: nam si diutius protelabitur, in aquam intercutem transit. Quidam aiunt, quod facile curetur malus corporis habitus, nisi padeat a causa incorrigibili, ut a pulmonis apostemate, aut aqua retenta in eo, vel ab hepatis aut ventriculi apostemate, & similibus quibus. & nos addere possemus, nisi & ab alio visceris scirrho confirmato originē traxerit. Curatio cachexiæ eadem est cum hydropis curatione, ut Valescus adfirmat: quare & agrum retinet in summa abstinentia. Ita si consuevit comedere in prandio uncias sex panis, tres tantum exhibet: & si consuevit bibere quatuor metretas vini, duas tantum propinat: iubetq; agrum a mensa cum fame & siti surgere. Sed hic causa spectanda, num vires prolapsæ ex profusione: tunc agrum

4
Signa prognostica.

5

aliquando ob imbecillitatē nutrire debemus: cum cibis tamen ēt nonnihil attenuantibus. In genere, aer eligendus ad calidum & siccum vergens: in frigidum. n. & humectō ccelo habitādum non est. Eadē de causā frigide humidæq; tempestates obesse creduntur, somnus moderatus sit ac nocturnus, lōgus autē atq; diurnus omnino vitetur. Moderatis deambulationibus, gestationibus, vociferationibus, & frictionibus. siccis per linteola ex lino crudo vtendum. Post quæ & exercitamentā moderata cōducunt, eodē Aetio teste Mæror quoq; & otii vitanda sunt: neq; a cibo statim ambulādum, nisi lēte ac suauiter. Venus damnatur. Iuuat exinanito corpore subirascei interdum. Marinę præterea narrationes iuuant, nitrosę, sulphuratę ac aluminosę, vt Ægineta aliq; scripserunt. Conuenit & thermarū vsus: sed caueant a balneis egressi statim frigidam suspectam haurire. Nec non arena litorum maris præcipue tenuis, & solibus candens, in medicina est siccandis corporib. coopertis cachecticorum, hydropicorū, aut rheumatismos sentientium. Sed velare caput a solibus necesse est; egressi pariter ab arena, frigidam non bibant, neq; cum cibum capiunt. Albus humecta sit, natura vel arte, cum clysterib. ac glandib. Dannatur cibi potusq; difficilis concoctionis, qui oppilant quique prauifunt alimentis. Cibi igitur eis offerantur simplices, & qui facile cōcoqui possunt, optimumq; sanguinē gignere. Inter obsonia perdices, auiculæ: inter quas alaude, lusciniæ & similes is laudantur: sicuti turtures, phasiani, colūbaei syluestres, & palumbes pulli; quibus cinamomū, garyophyllum apte inferimus, aut crocum: exiguo addito mastichis. Inter hortensia, pro plebe, porrum, sinapi, allium prodest cōmanducatum: & quicquid summatim attenuat, aperit & deglutinat, ex causā frigida: in iis omnibus temperamentum querendum est. Inter tragemata id vtile esse prædicat: ℞ pistaciōrū ʒ β passul. vna. anisi mund. ʒ j β. maceris ʒ j. β. cinamomi ʒ ij. zacch. lb β. Vinum autem conuenit eis album, tenue, & odorum, vt liquet ex Aetio. Aquę potus omnino vitandus est. In vniuersum, victus sit tenuis & siccus, vt inquit Paulus. Verum diata vniuersa virib. reparandis sit apta: per quam (vt refert Aetius) spes est, eos qui huic malo sunt impliciti, ad restitutionem in integrum peruenturos. Quod ad reliqua præsidia attinet, varia perhibēda prout causā sit varia. Si consuetę excretionēs sint retentę, ex iis si oritur aff. cōio, sunt prouocandę & irritandę, iuxta Aetiū: qui venam incidit in cubito, si nihil sit quod id fieri prohibeat: paulatim, partitis vicib. per triduū sanguinem detrahendo, eod. Aetio & Paulo testibus. Nos potius in nostra prima muliere in talo venam secumimus, cum affectus ex mensibus astrictis originem haberet. At si venę incisio impediatur, aut vitiosorum copia laborantęgrotantes ipsos purgare oportet (relieta vena sectione, quæ eisdem noxia est) non semel duntaxat, sed sapius ac paulatim, vbi vsus postulabit, prius præparatis & attenuatis humoribus per decocta & syr. conuenientes: cum syr. byzantino, cū aqua agrimonie & seris, si causā ad sit feruēs, alio-

qui syr. de eupat. cum aqua apii & petros. deinde si materia sit causā, cum hiera piera, cum rhab. myrob. agarico, prout materia exigat. Non desunt q. & hic vomitū laudant, ex syr. acetoso infuso cum ra, phano. Sed vehemētiora cathartica vitandi ne stomachum lædant. Demum aperientibus & vrinam cientibus, & nonnunquam vehementib. clysterib. opus est. Valde hic cōmendat (vt Paulus) absinthii decoctū. Si causā calida vitiū oriatur, calida frigidis pmiscenda, cum iis, quæ aperiunt & iecoris vires confortant: ob eam causā species diarrhod. cū nouitia rosacea ac dialacca, pro commisti humoris cōiectura, temperabis: & cū zacch. tragemata conficies, cum eupatorii aqua, seris erraticę portione, mane & vespere dabis. Ex frigida causā diaspermon, cū dialacca mane & sero, cum apii aqua & eupatorii. Eadē aliquando huius cura est, quæ imbecilli hepatis, eademq; cū affectu, quem præcedit, & quē sequitur: vt si cachexia sequatur scirrhum, & vergat in hydropem, tunc victus satis sit exsiccans & attenuans. Exsiccandum quippe ob humiditatem incipientem, aut serum, q. est factum ab intemperie & imbecillitate hepatis; attenuans autē, vt semper huius aff. cōio causā oppugnetur, ne scilicet materia crassa scirrhum faciens gignatur. Eadem est ratio medicamento- rum. Sed tum habitus vertitur in aquam, magis digerentibus, q. humidis emollientibus, magisq; farinis siccis, quam fotibus & oleis, vel decoctionibus, vtetur. Si cachexia fuerit ab immodica sanguinis euacuatione, corpus reficiendū humidis: partes refrigeratę calfaciendę, & habitus corporis siccandiuis. Cuius exemplum postea adhuc vnum adiungemus. Quod si fiat ex sanguinis retentione, hæmorrhoidas aperimus, corpus leuiter laxamus: ad quas omnes causās his pilulis cum magna experientia vtitur Rondeletius: ℞ pul. dialacca vel diacur. ʒ j. rhabarb. ʒ ij. diarrhoa. abb. diagal. ana ʒ j. cum syr. de absinth. fiant pilule parue capiat quarto quoquo die pilul. 4. mane. Quod si aff. cōio hic sit cum intemperie calida, aut fluxu immodico, fiat, vt sequitur, pro febre sic: ℞ trochis. de rhab. ʒ ij. rhab. ʒ j. agar. ʒ β. pul. diarrho. ʒ j. cum syr. capill. ven. fiant pilule; capiat sex bis in hebdomada mane: superbibendo aqua end. cich. an. ʒ j. Si febricitant, magis conueniunt syr. quam pilulæ. Sed qui tam diu vsi sunt syrupis, his minus molestæ. Syrup. cōuenientes sunt de byzantiis, de eupat capill. ven. end. compos. vel de cich. cum rhab. vel end. addendo rhab. idem præstabit. Si cum fluxu immodico sit affectus, pilulæ sic fiant: ℞ myrobal. citrin. cheb. indo. an. ʒ j. confricentur cum succo ros. rhab. electi ʒ ij. diarrhod. ab. & trionf. an. ʒ β. cum syr. capill. ven. fiant pilula. capiat duas mane in exitu lecti. Post harum vsum fere in pmi causā conuenit opiata sequens: ℞ ciner. pellis ventriculi & intestinorum gallina an. ʒ ij. cineris cancrorū marinorum, lotorum ante & post vstionem, ʒ j. conser. flor. cichor. capill. ven. an. ʒ j. pul. arom. ros. diagal. ana ʒ ij. cum syr. capill. ven. fiat opiata (quando intemperies calida seu febris adest, diarrho. & pul. trionf. loco aliorum ponatur) capiat singulis matutinis. Quod si aqua euacuata

9
Medicamen-
torum ratio.

Victuatio.

8
Vena sectio.

Purgatio.

10

11

12

cuata sit, superbibat parum vini diluti aqua graminis & asparagi. Si ad sit caliditas, aqua cichor. & end. Si refrigeratio, aqua absinthii. Si fluxus, aqua capill. ven. & absinthii. Linimenta supra hypochondria, sunt, quæ ex roborantibus iecur conficiuntur: *℞ olei de absinth. nardini ana ℥ j. olei cydon. ℥ ss. spica utriusque ana ℥ ss. cyperi, santali rub. & albi ana ℥ j. coralli rub. vsti ℥ ij. cera q. s. fiat ung.* Utatur optima victus ratione, & exercitio, nisi fluxus immodicus sit. Tunc enim frictiones fiunt in contrariam partem.

OBSERVATIO XXVI.

De cachexia ex immodico fluxu sanguinis narium.

PATER quidam seu œnobiarcha, Thomas dictus, apud Alcmarianos, cui frequenter sanguis narium fluxerat, hepate refrigerato in cachexiam incidit: cui facies tum crura inflata videbantur, cum vrina cruda & hepatis obstructione. Hæc infra scripta commode administrata fuere: quibus etiam præsidis curatus fuit: *℞ capil. ven. marrubii, agrimonie, cassiæ, scolopendrii, absinth. utriusque, mentharubæ ana m. j. sem. anisi ℥ j. ss. coquantur in aqua communi & vino Rhenensi a lb. j. ss. dulcoretur z acchar. & arom. cum ℥ iij. cinamomi; & fiat ad modum clareri. Bis in die eo utebatur. Postea & huic decocto hæc adiuncta sunt: *℞ rad. apii, petros. fœniculi, cichorii ana ℥ ss. follicul. senæ ℥ j. epithymi, polypod. an. ℥ j. in quo decocto hic nodul⁹ immergatur & exprimat, dum ex eo sumeret: *℞ rhabarb. selecti ℥ j. spica ℥ ss. fiat nodulus.* Ex eo decocto cum bis iumeret in die, alius moderate solvebatur, facie indies detumescēte, & oppilatione hepatis paulatim cessante, & digestionē vigorata. Interea sumebat quotidie ex tabul. arom. ros. paulo diarrhod. adiecto, superbibebat aquam absinthii. Pedes modo fouebat, & lauabat aqua marina, modo etiam hoc fotu: *℞ florum meliloti, chamomillæ, folior. lauri, matricariæ, artemis. caulium rub. hederæ terrestres, fursuris, salis communis an. m. j. fiat decoctio in aqua communi.* Atque ita paulatim cessauit pedum & crurum inflatio, & paucis diebus sanitatem recuperauit.**

SCHOLIA.

CVM hic ex sanguinis narium profluvio mal⁹ corporis habitus ortus esset, vinū album tenuē concessi: cum & hic victus virib. reparandis aptus sit. Sed & hoc hic meminisse oportet, q̃ perpetuo hepati succurrendum erit, a quacūq; causa oriatur: ipsumq; semper roborare oportet, cum sanguificationis instrumētum sit ac sanguinis officina. Vberius autem sequentis de aqua inter cutem idonea medicamenta pro ratione mali habitus, reperies: p̃pterea plura exempla (*quamuis varia ēt in pregnantib. habuimus, tū aliis ex mola uteri in cachexiam incidentibus, quas curauimus*) nō addemus: cum & supradicta hic satis esse possint pro tyronib. ideo ad hydropicos progrediamur.

OBSERVATIO XXVII.

De Hydrope.

COLONVS quidam, dum in Gallia praxin exercerē, hydrope diu laborans, cum nihil opis

a medicis aliis sentiret, me consilii causa accessit. Cui imperavi, cum non febricitaret, ut continuo allium comederet, quo factum est, ut multum aquositate per urinam profunderet, atque ex insperato eo remedio sanus euasit. Sed & alia mulier hydropica, cui venter & crura in maximam molē excreuerant, cum deplorata haberetur, ex alterius vetulæ consilio capiebat allii capita viridia, & cōtundebat, succumque per pannum cum iure venecis aut pulli vel caponis (*si alius ad manum non esset*) colabat; & potabat. Et breui venter tum crura derumere. Et præter opinionem curata est: nō solū illa, sed alii plurimi. Hinc & hæc dos, cuniculos, capreolos, lepores elixos, cum allii, porri & ceparum decocto, more rusticorum, Gordonius in hydrope curando commendat. Noui & alios hoc solutiuo subinde exhibito, multum aquæ per intervalla per aluum reddidisse, & sanos factos esse: *℞ folior. senæ ℥ ss. seminis anisi ℥ j. foliorum mezereonis ℥ j. ss. rad. irios viridis parum contusa ℥ iij. ss. soldanellæ ℥ ss. infunde per noctem in ℥ ix. sero lactis, facta prius ebull. mane huius fortis expressionis accipe ℥ vj. mellis ros. colati, syr. de empatorio ana ℥ j. misc. pro ij. dosibus.* Memini mulierculam etiam ab Helydio collega meo hoc modo curatam: *℞ folior. senæ Alexand. ℥ ss. irios viridis parum contusa ℥ iij. ss. mezereonis ℥ j. ss. soldanellæ ℥ ss. infunde per noctem in ℥ ix. decoct. communis: facta prius ebull. mane forti express. adde ℥ ij. mellis ros. fiat potio pro ij. dosibus.* Ego etiam cum video urinam supra modum esse tinctam, loco mezereonis pono ℥ j. ss. rhabarb. oprimi, addēdo spica ℥ j. fiat infusio in sero lactis. quo sæpe cū magna felicitate vsus sum in nosocomio Delphensi. Elideus præceptor meus hoc modo utebatur: *℞ rhab. electi pul. ℥ j. pul. soldanellæ ℥ ij. dabat vnica vice, cum decocto aut aqua conuenienti.* Cum autem rusticus ille ex allii vsu curatus esset, venit mihi in mentem alterius rustici apud Beniuenium, cui consulum erat, ut nihil biberet, eoq; per annum ad eum reuerso, ac dicente se nihil per annum bibisse, atque sic curatum, iussit ut paulatim vino assuesceret, sed mero potius quam lymphato, & eo ipso austero ac tenuissimo. Qui cum discederet, & curiosa potione vsus, ad pristinumque reuersus statum, quam mecum familiaritatem primum cōtraxit, eam (*inquit Beniuenius*) adhuc in hanc vsque diem officiosissime seruat & colit. Idem quid mirabile narrat de puero ab omni medicorum consilio destituto, qui cū aquam quātum potuit hausisset, soluta vmbilici vnitāte, tanto impetu aqua fluere cœpit, ut supra ventrem cubitos tres ascenderet. Quo sane vitam finiisset, nisi circumassilētes opposita manu aquam fluere non permisissent. Hinc medico accersito, & aqua paulatim educta, ac curioso victu, & ceteris, quæ ad rem facerent iniunctis, breui tempore in pristinam redactus est sanitatem.

SCHOLIA.

QVONIAM non raro gignitur affectus a sanguificandi facultate vitata, ex Galeni sententia: vario modo Græci hunc affectum vocāt, modo *ὕδρωσις*, interim *ὕδρωμα*, sepius vero *ὕδρον*

Aqua inter-
cutem unde
nomē sume-
rit.

Iecur semper
afficitur, siue
primario, si-
ue per con-
sensum.

Quot sint
differentia:
et cur sic
appellata.

6

7

Communis
caussa gene-
rationis om-
nium trium
differentiarū.

nuncupate: Latini autem aquam intercutem, seu hydropicum morbum, ut liquet apud Celsum, c. 21. lib. 3. A symptomate nomen sumit: siquidem aquosus humor hanc passionem necessario comitatur. Caelio Aureliano teste cap. 21. lib. 3. ac Plinio 2. lib. c. 12. Hic semper iecur afficitur, ut 5. de loc. 6. siue primario, siue per cōsensum afficiatur: ut etiā 2. Prog. decretū est: & ab Alex. c. 1. lib. 9. & a Paulo c. 48. lib. 3. confirmatum. Verum cum non vnus sit hydropis modus, ideo primum distinctio habēda est, eaque ex Gal. 4. de viētū; in qua omnes conueniunt; quarum vna *Ascites* dicitur, quasi vtricularis a Grecis ἀσκίτης sic dicta est, quod ἀσκή, hoc est vtrius modo in peritonæo humor continetur. Altera *Tympanias* vel *Tympanites*; τυμπανίτης quidem a Tympano sic appellata, quoniam in tali affectione imus venter percussus talem sonum edit, qualem tympanum, Galeno teste, comment. aph. 11. 4. lib. quo loco Hipp. ἐνθὸν ὄσφραπα nuncupauit. Tertia species ἀνασάρκα, aut ὑποσάρκα, aut κατασάρκα, aut λευκοφλεγματία, aut σαρκίτης, aut ὑποσαρκίδιον appellatur. Et tertia differentia sic appellata est, quoniā per carnē, vel sub carne, vel iuxta carnem: seu secundum carnem, vel supra carnem, seu infra carnem humor continetur: aut propter ipsam λευκοφλεγματίαν nominant, ut quæ pituita liuida cōstet, vel sui quidem ratione semper alba, sed quæ propter mixtionem quorūdam aliorum humorum verum mutet colorem, ut liquet apud Galen. comment. aphor. 29. 7. lib. Quæ nomina a similitudine dicuntur externorum. In priori quasi vter aqua plenus cernitur: in secundo genere vter tympani instar inflatur: in tertio genere speciem carnosæ molis totius referunt: ut cum quis ventricolus, & toto corpore crassus euadit. Proprie vero hydrops, iuxta Iacchinum, dicitur ascites: ceteræ vero species per huius similitudinem. De Tympania 4. aph. 11. quod ex similitudine. Ibi de tribus speciebus litigant moderni, ut saluent Hippoc. qui duas species ponit. Non est ille locus Hipp. & a Galeno, ut insufficiens, reprehenditur. O miserum laborem! Et ita quidam duas species hydropis, hoc est, aquosi humoris collectionis, esse volunt (ut Dodonæus supra cap. 13. de Rustico apud Beniuenum per annum nihil bibente) hyposarcam & asciten: cū in tympanite scilicet flatus colligatur. Communi vero modo tres species iam dictæ hydropis ponuntur. Cuius rationem etiam vide apud Donatum ab Altomari. Communis autem omnium (ut inquit Celsus) causa est humoris nimia abundantia: ob quam nevlcera quidē in his egris facile sanescunt, ut patet etiam apud Hipp. & Gal. aph. 8. 6. lib. Et communis generatio cuiusuis aquæ intercutem est, vbi sanguificationis officiū intercitat, nempe refrigerato iecinore, & ex consequenti venis omnibus, ex 5. de loc. affect. cap. 7. & 2. progn. In hyposarca per naturalis caloris debilitatem & impotētiam, pituitosior, hoc est, crudior ac frigidior sanguis gignitur, qui pervenas in corpus distributus, ipsum tumidū reddit, & albidus pituitæque emortuo colore pallens apparere efficit. In ascite vero intra peritonæum præcipue

humor colligitur, venterq; distenditur; ibi enim vitium sanguificandi adest, id est, diminuta concoctio vel vitata. Diminuta quidem, vbi aqua, vel pituitosus sanguis generatur: & sunt duæ species iā dictæ Deprauata vero, vbi in flatus vertitur, & sic in alienam qualitatem. Hyposarca rusticum laborasse verisimile est apud Beniuenum, ut etiam Dodonæus existimat, & crudis frigidisq; humoribus, per potus abstinentiam a natura concoctis, & in sanguinem cōuersis, tum & vitam eum sustinuisse, tum & sanitatem recepit. Puer autem potuit ascite laborasse, nō tamen ex refrigeratione, sed ex calida nimium & sicca iecinoris intemperie, (ut idem Dodonæus putat) quā tā grauitur quandoque iecur afficitur, ut probum sanguinem non conficiat; velut in hydrope, quæ acutos morbos subsequitur, teste Gal. lib. 4. de loc. affect. c. 1. Aduersus huiusmodi hydropem aquæ potio remedio esse potuit, iecinore videlicet refrigerato & humectato, si modo recens nata fuerit: Nam diuturnæ hydropes incurabiles habentur, diuturnitate mali iecinore aut liene corrupto ac vitato. Succedit autē nō raro acutis morbis ascites, & frequenter etiam ictero. Contingit autē non raro in hoc ascite, diffusis per vniuersam biliosis humoribus, calorem subinde tantū excitari, ut, quacūq; corporis parte scalpata cute, leuiterq; vulnerata, mox calidus, niger, & quasi adustus sanguis effluat. Ceterum hydropis per aquæ potionē curatæ exstat & exemplū lib. 2. epist. Ioan. Langii epist. 12. Vxor, inquit, barbitōsoris in Nouo foro, Palatinorū in Noricis oppido, plus sibi ipsi quam marito aut medicis morigera, cuius venter hydrope in immensum turgēbat: hæc aquā de fonte scaturiente magnopere sibi tiebat. Progressa itaq; marito in scio extra urbem ad fontem, in quo cum aquæ scaturigine simularena ebulliebat: de qua quantum manu caua apprehendere potuerat, ter aut quater deuorauit. Domum læta reuersa, rem omnē nobis recensuit: & intra biduum per fluxum ventris plurimum pituitæ excreuit; apertis quoq; sua spē in ano mariscis: vnde confertim sanguis niger effluebat: ab hydrope conualuit. At noster Colonus qui allium comedebat, nō solū per vrinam reddebat aquosam materiam, sed etiam per aluum, hoc est, quod Diosc. scribit lib. 2. cap. 145. de allio. Album, inquit, turbat, vrinas detrahit, & hydropicis vtile est.

OBSERVATIO XXVIII

De hydropico paupere.

PAUPER quidam cum continuo aquam frigidam biberet, iecur affatim refrigerari cepit: & hydropem tandem incurrit. Nam multa frigida intemperanter hausta mēbra refrigerant, subito a balneo, aut venere, vel lassitudine; vnde iecoris substantiam subito affectu lædunt. Huic autem, cum pauper esset, tale attenuans decoctum præscripsi, quod simul stomachum ex aquæ lōgo potu refrigeratum calfaceret atque roboraret: & simul aquam educeret, ac hepar refrigeratum corrigeret: ℞. rad. ireos, ebuli, petrosapii, brusci, enule campanæ an. ʒ. j. hyssopi, centaurii, absinthii, fol. sambuci, satureiæ, ceterach, cassiæ ana. m. j. medianorum corticum

coriandrum sambuci, gratiola, betonica an. m. s. rad. rubra tinctorum, calami arom. inofian. ʒ ij. sem. feniculi, dauci ana ʒ ij. sem. carthami contusi ʒ s. folio. senae Alexan. ʒ j. s. polypod. quercini ʒ s. florum genista m. s. sem. iuniperi ʒ j. soldanella m. s. uuar. passul. ʒ j. glycyrrh. rasa ʒ iij. ʒenzib. cinamomi an. ʒ j. coquantur in aqua communi, pro ʒb j. s. colature, adde syr. de byzantio, de eupatorio, de calamintha ana ʒ j. misce, fiat apozema. Quibus satis aluum reddebat, ita ut venter eo detumesceret. Deinde purgavi eum, modo cum ʒ s. diacarthami solutini in tabulis: modo exhibendo ʒ s. vel paulo plus cum ʒ iij. decocti suprascripti. Cum & has pilulas dedi: ʒ. pilul. de meze-reo ʒ ij. pilul. aggregat. de rhubarb. ana ʒ s. cum succo rad. ureos: fiant pilula vij. Deinde capiebat diacurcuma, & dialacca, cum diacina momo in tabulis. Ventrem inunximus hoc vnguento: ʒ. vng. Agrippae ʒ ij. succi ebuli vel sambuci ʒ j. bulliant ad succi consumptionem: fiat linimentum. Quibus paulatim detumuit venter; & cum non diu laborasset, ab hydropse sanatus est.

S C H O L I A.

³ *Aque inter cutem causa.* **Q**UAEVIS specierum aqua inter cutem, iecinis refrigeratione consequitur, uti antea diximus. Etenim citra eiusdem refrigerationem, impossibile est aliquem in hydropem incidere, *Gale. & Aetio testibus.* Id autem iecori accidit per se aut per colensum. Immutatur ex refrigeratione splenis, intestinorum, ventriculi, mesenterii, septi transversi, renum: nam & ipsum iecur scirrhus afficitur: vel ipsum spleni indurato seu refrigerato coafficitur: aut ieiuno, seu reliquis intestinis iuxta ipsum, aut mesenterio aut pulmone, aut renib. seu septo transverso simili ratione primario affectis: nam & renes propter eorum obstructionem, alias quoque ob eorundem imbecillitatem, serosam sanguinis substantiam non secernunt. Sic etiam ex nonnullis causis aliis iecur ipsum refrigerantibus, aqua intercutis oriri poterit: utpote ex immodica hemorrhoidum profusione, aut ex eisdem diuturno tempore suppressis: similiter ex menstruae purgationis omnimoda cessatione aut immodica vacuatione: aut ex immodico muliebri profluvio, ut liquet ex *Gal. 2. de nat. fac. & 5. de loc. aff.* Si enim calor naturalis stragulat, ob spirituum vna cum sanguine iacturam factam, pariter ex interpestita ac immodica aquae frigidae potione (ut huic nostro egro evenit) iecur affatim refrigerari potest, ac statim aqua inter cutem induci: quanquam sic affecti (ut *Gal. eodem 5. de loc. aff.* asserit) ob refrigeratum os ventriculi, vehementi ciborum desiderio teneantur, secus quam ceteri hydropici. Id magis fit, si aquam frigidam quis ingurgitet post aestum aut excitationem. Multi autem & a podagra & a coxendiculi dolore vexati, aquam inter cutem incutierunt; frequentissime etiam eos, qui cibum non sentiunt, & malo corporis habitu praediti sunt, itemque ab arquato infestatos, hydrops corripit. Item quosdam eorum, qui non nisi recta ceruice spirant, aut celiacae affectione laborant, ac dysenteria, in aquam inter cutem deduci novimus, (ut inquit *Aetio.*) Haec enim mala si diutius per-

sistant, spiritus deinde naturalis, insitumque calor nimium dissipantur. Sepe etiam febribus longis superuenit, ut refert *Paulus*, nam his qui longis febribus consumuntur, etiam insitus calor atque spiritus nimium dissolvitur, sanguificationis quoque officina intercidit. Sic & omnia illa, quae sanguificationis virtutem infringere possunt, efficiunt ne iecur chymum in sanguinem transmutare possit: atque ita hydropem efficere possunt. Interdum & hydrops morbos acutos sequitur, ex *Hip. sententia, 2. prog.* cum ex eis sanguificationis opus intercidit, adeo ut iecur cibum in sanguinem transmutare nequeat. Ascites tamen non tantum ex partium nimia refrigeratione, ut anasarca, ortum habet: sed frequenter quoque fit ob solutionem continuitatis alicuius visceris, aut vasculi quo humores contineri solent. Ea quoque ratione causae omnes, quae iecur vehementer excitant, ut ardentis febris, potentium vinorum immodicus usus, alimenta quoque multum calentia, hydropem saepe excitant: eo quod viscera, & frequentius quidem iecur, ex occurso siccitatis nimiae quasi exarescant atque rumpantur, nec non dehiscant, ut in terra ex nimia siccitate fieri solet: unde humores in abdomen facile per fissuram illabuntur in ascite, quasi exsudando atque destillando. Ex tumore duro iecoris, lienis, aut alterius partis quoque fit frequenter: contingit enim viscera sic quoque frequenter findi, propter nimiam eorum siccitatem atque humoris inopiam: unde tempore etiam ipsa membrana ambiens frangitur. sicque sensim serosa excrementa in abdominis capacitatem decidunt. Vide plura de his apud *Fernelium*, qui eos hallucinare putat, qui per angustos ceterosque poros serosum humorem transferri in capacitatem abdominis putant: sed is potius per fissuram fieri vult. *Iacchinus* tamen aliter sentit: Cum enim sanguis, inquit, exigua mutatione suscipit, maiore sui parte in aquotam substantiam vertitur, ac circa primas venas, & cavam manens, utpote tenuis & serosus, resudat in peritonaeum. Quod autem maneat, causa est, quoniam a membris & ab ulterioribus venis non trahitur: quod vero non trahitur, causa est vitium eius. Remanent etiam eo sanguine plenae venae mesenterii omnes, quibus erat aliqua vis sanguifica: unde ab iis defluit roris vice aliquid in cavitatem. Vaporis quoque humidi copia, ubi in peritonaeum tunicam inciderit, densatur atque in ipsum defluit. Talis est ascitis generatio. Fatemur tamen & aliquando in ipsius abdominis substantia aliquid aggregari, inter musculos scilicet & cutem. Necessario enim contactu aquae humescunt. Haec *Iacchinus*. Amatus vero sentit contra Arabes, ut apud ipsum longiore sermone videre licet, ceterum. 1. cur. 30. quod ascites aquosus hydrops sit inter peritonaeum & omentum, id est, inter siphac & zirbum, ut incisione saepius probatur: & non inter mirac & siphac: non autem abdomine, sed peritonaeo discisso, aqua affluit, quae inter illud & omentum vel intestina continetur. Si plura de causis hydropis scire desideres, lege interpretem *Holerii* Causa igitur ascitis est, multa refrigeratio visceris, & consequenter venarum omnium. Ideo vero aliquando

7

primario iecur patitur, aliquādo secundo. Voco autem secundarium, cum ab alio alterius membri affectu habet originē. Ita in nostro hoc ægro, iecur non primario, sed secundo patiebatur; nam immediate ex causa procatactica frigidum euaserat: nempe ex plurimo aquæ potu: ita & ex opiatorum usu, vel alius frigidis, fieri potest: sic & ex his, quæ per accidens refrigerant, ut sanguinis profluvio, (ut etiam Galen. 2. meth. cap. 10. & 5. de loc. aff. 6. ostendit,) siue e naribus fluat, siue ex vtero, siue ex hæmorrhoidibus. Ad omnes enim hos affectus hydrops ascites plerumque succedit. Vna enim cum sanguine calor deficit. Fit etiā ex propriis frigidis morbis, scirrhus, obstructione, & ex multitudine assumti cibi, calorē innatum exstinguentis. Sed per consensum aliarum partium, vel secundario affectu fit, cum scilicet partes illæ refrigeratæ vna iecur afficiunt, ut paulo ante recensuimus, 2. progn. 1. ut quia venis vel arteriis multis & magnis communicant: ut lien, cum intumescit: & vterus si scirrhum patitur vel molam, ut nos sæpe vidimus: nam etiam aliquādo aquosa illa materia non solum in ventrem, sed etiam in vterum profunditur, ut patet de illa muliere apud Fernelium, cui instante menstrua purgatione humor sub abdomine congestus, per vterum sponte ita profunde batur, ut omnis moles abdominis biduo subsideret: alius dein humor sensim proximo mense succere incipiebat, qui statim quoque tempore totus efflueret. Vel alia ratione aqua vel frigidis humoribus repletur aut contracta, aut si venter, aut septum, aut intestina afficiantur, ut paulo ante quoque recensuimus. Iam quoque fit a vicinitate, ut a renibus, vel pulmone. A pulmone non raro. Iacchinus vidit in his fieri, qui asthmate laborabant: ut & nos alias vidimus: unde & refrigeratas eas partes pituita habent. Tandem omnes in senecta in hydropem migrāt, hac de causa. A renibus vero non solum fit communicatio noxæ per se, sed ex accidenti, si aquositate non purgetur; unde multa remanet in venis; fitque sanguis aquosus, & excolatur serum. Illud in aluum. Sæpe vero & multa horum iunguntur. Fitque ascites, ut Fernelius etiam refert, ex iecoris aut lienis vulnere exiguo, quod non alte penetrauit (hoc enim repente hominem interimit) sed summam duntaxat extimamque faciem attingit. Oritur & ex ulcere, quod fere ab illorum suppurante phlegmone atque vacuata relinquitur. Tympanias vero si syncerus sit, videtur a ventre & intestinis oriri, Sic enim testatur Hippocr. 4. aphor. 11. Si dolores diu circa umbilicum & lumbos torqueant, qui neque medicamento cedant, id est, quibus tamen diligens curatio sit adhibita, transit in tympaniam. Significatur enim, inquit Gale. habitu contracta intemperies; unde & imbecillitas partium, quæ ad ventrem attinet. Sic & 3. de sympt. causis 1. Si, inquit, cruditates in ventre fiunt, ob facultatis imbecillitatem, ad morbum, qui tympanias dicitur, deveniet. Vult ergo affectum ventri ascribi. Quomodo ergo vniuersaliter dictum est in omni hydrope iecur affici, & sanguificationis vitio provenire?

Tympanias
seu tympanias
unde
generetur.

Respondet Iacchinus: Proprie sanguinandi vitia sunt alia duæ species. Non enim in venis hi flatus vertuntur, sed quia semper adest etiam admixtus humor aquosus; ideo dicitur necessario iecur & sanguificatio lædi. Contra 4. de puls. dignotione 30. Est aliquando tympania & ascitis syncera, in qua non canatur digitis cutis. Respondet idem Iacchinus: Sincerum dicitur, quando notæ admissionis evidentes non sunt. Sic medicus synceros tumores dicere solet. Quod si ab initio læsio a ventre incipit, tandem & in iecur perueniret, per consensum partium: & quia chylus male confectus, male etiam iecur afficiet, & malam coctionem in eo sortietur. I huius ergo præcipua materia flatus est (ut & Fernelius sentit) ex imbecilli coctione & cruditate genitus: qui cum multus in ventriculo aut intestinis, velut in colico dolore, coercetur, nec exitum naturalem reperit: impetu viam sibi inueniens, per cæcos tenuesque ductus inter abdominis membranas magnis cruciatibus sese infert: ac demum vario impulsus, in ipsum abdominis spatium penetrat aut deuoluitur. Rarus certe hic hydrops, iuxta eundem Fernelium, sicque syncerus flatus sub abdomine citra humoris permissionem vniquam est animaduersus. Hypofarca vero fit, cum crudus & semicoctus sanguis plurimus in corpus distribuitur; ita ut copia crudorum venarum omnes abundant; & vniuersum corpus mole augetur: atque adeo habitus vitatur, ut dignosci nequeat. Hic rursus iecur patitur, sed non adeo frustrata est coactio; sed quia vna affecta sunt venæ, ideo vteriores venæ non possunt hanc cruditatem emendare: quare nec membra si attrahant in poros, assimulabunt: unde remanet alimentum distributum & dispersum in omnes cauitates: hinc tumor. Hec 3. de sympt. causis 1. Hanc a phlegmatica cachexia seiungit sola magnitudo, ut recte Fernelius ait, quod tumidiorem habeat corporis vitiatam molem. Vna & eadem tamen vtriusque causa, immodica nimirum iecoris atque venarum refrigeratio; quæ aut primaria est, aut ex cordis, lienis, ventriculi, mesenterii, aliarumque partium coctioni seruientium vitio contracta: & insiti caloris ac spiritus nimia dissipatio, ut in principio satis dictum est. Ex causis evidentibus, quæque viscera refrigerant, natiumque calorem obtundunt, est aqua frigida & vitio læ immodicus potus, lactucarum fructuumque esus intemptius & sanguinis e naribus, vtero aut hæmorrhoides profluvium, vel coætuarum excretionum suppressio. Quæ omnia exemplis infra dicendis illustriora euadent. Et ita plus quam satis de causis dictum est. Quibus adiungere poteris ea, quæ Arculanus & neoterici de causis addunt.

OBSERVATIO XXIX.

De hydrope, in duobus prius quartana laborantibus, uno curato, altero succumbente.

ANNAM quartanā iuuenis cum expertus esset, & magnum lienem contraxisset, in hydropem tandem incidit: ad quem accitus, variis remediis usus sum, in primis hoc decocto: ℞ rad. filiris, ebuli, treos an. 3. j. rad. petros. feniculi, apu, cap. par.

par. thamariscian. \mathfrak{z} β . (quidam & his addunt rad. cyclaminis \mathfrak{z} β . cum egregie faciat ad lienem induratum) fumar. a. cicboru. summitatum lupulorum. cassia. agrimonia. folioru sambuci (egregie aqua duci, ut saepe experti sumus) capill. ven. thymi, ceterach. an. m. j. epithymi m. β . medianorum corticum sambuci m. β . soldanella \mathfrak{z} iij. sem. carthami cōtusi \mathfrak{z} β . folior. senae Alexand. \mathfrak{z} j. β . po. ypod. querc. \mathfrak{z} β flor. borag. gemistae an. p. j. sem. anisi foeniculi, carui, agni casti, an. \mathfrak{z} j. β . passul. enucleat. \mathfrak{z} j. fiat omnium decoct. in aqua communi pro \mathfrak{lb} . j. colatura adde syr. de by. an. de eupat. syr. acetosi compos. an. \mathfrak{z} j. clarificetur cum \mathfrak{z} iij. cinamomi selecti; & fiat apozema ad modum clareti, pro quatuor dosibus matutinis. Die vno atque altero intermisso purgavi eundem in hunc vel similem modum: \mathcal{L} confectionis hamech. \mathfrak{z} iij. diaphoenici, diacatholici ana. \mathfrak{z} j. diacarthami in tabul. \mathfrak{z} j. β . aquae agrimoniae \mathfrak{z} iij. syr. de eupatorio \mathfrak{z} β . misce. fiat haustus. Detur in diluculo. Interea saepe capiat diacurcuma aut dialacca in tabulis. Lieni apposui prius emplastrum de meliloto, deinde hoc vel simili fotu utebamur: \mathcal{L} rad. althae (ob duritiem) \mathfrak{z} j. rad. aza. cyclaminis an. \mathfrak{z} β . rad. filicis, thamarisci, cappar. an. \mathfrak{z} iij. centauri minor. ceterach. absinthii, mercurialis, menthastr. an. m. j. flor. chamomill. meliloti an. p. j. sem. ruta, carui an. \mathfrak{z} iij. seminis foenugr. lini an. \mathfrak{z} β . coquantur in vino & aceto q. s. & cum spongia fomentetur lienis locus; & inungatur cum oleo de capparibus, medul. vituli, adiecto ammoniaco dissoluto in aceto. Postea venit mihi in mentem similis fere casus apud Amatū, curat. 30. cent. i. descriptus de hydrope aquoso, in vxore illius de Landenara: quae cum viribus constaret, & recte se ad oblata adhuc haberet (ut noster ager) dedit ad expulsionem succi ireos \mathfrak{z} ij. mellis ros. colati \mathfrak{z} j. ieiuno stomacho; cum quo aquam illam quotidie parum emittebat. Postea vero octo interpositis diebus; catapotia ex nitro Alexand. cum trochisf. albandal mixta propinavit; nempe pilul. de nitro Alexand. \mathfrak{z} ij. trochisf. albandal \mathfrak{z} j. siebat pilula s. Cum quibus multum illius egerbat aqua. Quibus saepe interiecto temporis spatio inter vnam & alteram propinationem usus fuit. Nam sensim & paulatim vacuandus humor iste est: qui vero vna vice tantum humorem istum deponere tentant, per purgantia medicamenta, multa mala agrotanti adferunt: quia eius vires deiciunt, & iecur & interiora refrigerant. Per vices igitur & nos medicamentis purgantibus utebamur, modo decocto dicto adiciendo subinde rad. turbit. guminosi \mathfrak{z} ij. \mathfrak{z} iij. pro suo correctorio \mathfrak{z} ij. modo etiam succo illo ireos. Interea roborabamus vtrumque viscus, & iecur & lienem, modo diacurc. modo dialacca; adiectis trochisf. de capparibus. Et postea inunximus quoq; lienem cum hoc vel simili vnguento: \mathcal{L} vng. Agrippae, arthanita maioris an. \mathfrak{z} j. ammoniaci, opoponacis in aceto dissolutorum an. \mathfrak{z} β . olei cucumeris asinini \mathfrak{z} β . fiat vnguentum molle: quo tamen in tumore splenis ab exordio mali nequaquam utendum est; sed ubi iam materia mali vna cum viscere emollita fuerit. Ideo prius hoc vel simili utebamur: \mathcal{L} vngu.

arthanita maioris \mathfrak{z} j. β . gummi ammoniaci. in aceto dissoluti \mathfrak{z} β . olei cappar. lilior. alb. q. s. fiat vnguentum. Sic & Amatū in illa muliere interpellatim purgantibus medicamentis utebatur; nonnunquam lenioribus, aliquando vero vim inferentibus. Singulis tamen hebdomadis aluum etiam faciebat. Et quod mirum in modum profecit, hoc conditum fuit, quod habet rad. ireos per tyrocnestim traiecta \mathfrak{z} β . \mathfrak{z} iij. \mathfrak{z} β . mellis q. s. ad spissitudinem misce. quo saepe utebatur: & optime absque anxietate & dolore aquositate illam deponerebat. Non minus adiumenti attulit mel. ros. confectum ex floribus persicæ arboris, quod sua natura hanc deponit aquam: & id Avicenn. lenelabin de per sis, in cura phlegmaticæ, & aliis locis appellabat. Iis enim hac vsque citatis medicamentis, & nonnullis iecori apposis, sex mensium spatio hæc sanitati fuit restituta. Exterius tamen aliud vnguento splenetico dicto linebatur: quo nos loco illius vnguenti quod ex cyclamino siue arthanita inscribitur, utimur, quod multum in ascite valet, ut ex Mesue comprehenditur: quo & nos commode in nostro agro etiam ventrem oblinuimus; adiecto quoque vng. Agrippæ. At mulier illa apud Amatū, ut deinde recenset, interdum medicamenta purgantia non sumebat, diacurcumam cum vino ebibat, nonnunquam vero dialaccam: quibus & noster subinde utens tandem conualuit. Laudantur & hic pilulae de sagapeno, serapino, & soldanella; brassica marina dicta, & decoctum rad. sambuci & ebuli: quibus & nos utebamur, adiecta rad. turbit. in exigua quantitate. Guilielmus Placentinus, sua ætate medicus doctus, testatur se paucis iis ad sanitatem reduxisse Azum quendam Parmensem, hydrope affectum, quæ habent turbit. \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} iij. \mathfrak{z} β . Zacchari, an. \mathfrak{z} ij. scammonia electa pondere duorum granorum hordei, cum vino; misce. fiat conditum. Hoc autem in hebdomada illi semel deuorandum dabat, stomacho ieiuno: quo & quater & quinquies egerbat. Sed omni die ante cenam diacurcuma, quantitate nucis, cum optimo vino generoso illi bibendum dabat quibus curatus ad sanitatem reductus fuit. Regimen porro mulieri apud Amatū (uti & nostro iuueni qui non diu hydrope laborauerat; ideo etiam melius curatus) in vniuersum ad siccitatem declinabat: erat vero victus ratio, caro auicularum in dumetis vigentium; non minus vituli & gallinaceorum veruecissae. A potu vero nostris monitis abstinuit, nec alio in tempore quicquam in potu sumebat, nisi prandii & cenæ hora, & tunc quidem parum vini albi, potentis & generosi, polyphori dicti. Sed & nostro iuueni concessi ceruiliam absinthitem subinde. Ab oleribus vero in totum abstinuit; veluti fugacibus fructibus, quos horarios medici appellamus. Amygdalas tamen & sole siccatas vuas, præcipue Corinthiacas, libentissime concedebat: & assa edulia, minime vero aqua cocta. Ceterum Hippocrates in lib. de internis affectionibus, similem huic prædicto morbum, a vitiatō splene euenientem, describit; ut apud ipsum est legere folio Frobeniano 271. At alius iuuenis,

annorum 25. vel circiter, cum aliquandiu quartana laborasset, ac præter nostrum consilium medicamentum, nescio quod calidissimum, alterius medici consilio, quod inhibuisset, bibisset, in ipsa accessione subito hydrope correptus est, ac variis deinde medicamentis utens, et Paracelsicorum ei sanitatem pollicentium curari non potuit: & circiter duos annos fere hydrope laborans, tandem extinctus est.

S C H O L I A.

Facile autem liquet ex iis, quæ diximus, quamlibet aquæ inter cutem differentiam seu speciem, morbum esse in quantitate seu magnitudine. Namque ex genere præter naturam tumorum existunt, ut constat lib. De tum. præter naturam, circa finem: id quod confirmavit idem Gal. de ascite lib. 14. meth. med. Nec obstat, quod idem Galen. lib. de diff. sympt. inter ea symptomata, quæ incidunt in sanguinis generatione frustrata, hydropis vitia connumeraverit. Nam vel symptoma vniuersaliter dictum voluit intelligere; vel per vitia aquæ intercutis, eius causam immediatam intellexit, quæ quidem symptoma est incidens in sanguinis generatione (*ut ipse inquit*) non peracta, vel non rite peracta. Sed quod ad signa attinet, cum causas iam satis enucleauerimus; scire oportet, alia esse signa præsagientia, alia communia hydropen demonstrantia, alia causarum, tum causas ipsas & species distinguuntia: alia vero mera prognostica. Inter hydropen præsagientia futuram, est ipsa cachexia; quæ & sæpe hydropis initium existit. Et quædam ex his sunt magis remota, ex progressu causarum protaceticarum seu primitiarum, quæ vel hepar debilitant, obstruunt, indurant, vel abscessum inducunt tam in hepate, quam liene, aut aliis membris particularibus iam dictis. Tales causæ continuatæ hydropen inferunt, ut & icteritia diuturna, cibi que crassi obstruunt. Alia sunt magis proxima, ut si color corporis permutetur ad albedinem, citrinitatem; faciesque ac palpebræ inflentur, tum pedes ac testiculi, & inflatio abdominis appareat. At aquæ inter cutem signa communia sunt, spirandi difficultas, tumor, grauitas, & vitiatu color, ex virore albicans; cibi fastidium, pedum tumefactio, propter distantiam a corde; sitisque vehementior, propter humores falsos & putrefactos. Plurimi quoque ex hydropicis aliquando febriunt, Aetio teste. Quærit Arculanus, cur manus non tumeant in hydrope sicut pedes? Respondendum, *Manus cordi propinquiores, & facilius motus sunt quam pedes: vapores humidiores (cum fere inflatio pedum commune sit accidens omnibus speciebus) sua grauitate deorsum mouentur ac pelluntur; unde pedes magis inflantur.* Si pendeat a causa calida, adest sitis, maior inflammatio, citrinitas, vel rubedo; oris amaritudo, vomitus citrinus, aut viridis; vrina tincta, pauca (*ut fere est in omnibus speciebus*) viridis aut subnigra; febris adest pulsusque velocior; & causæ præcedentes calidæ, egregie ad dignotionem faciunt, ut & hepatis tum totius calidæ temperies. A frigida causa omnia contraria: facies discolorata, color liuidus, febris abest, vel est exigua; sitis mi-

nor, pulsus tardior, nisi magna spiritualium membrorum compressio id inhibeat. Si hepar per se afficiatur, adest tussis, tumor pedum; veter nihil vel parum egerit, adestque angustia, & ventris tumor: & ad sunt signa propria affecti hepatis, ut oppilationis, scirrhi, apostematis; quæ ex locis propriis superscriptis petenda. Ita quoque si fiat ex solutione continui, ex causis prægressis, casu, percussione, offensione in regione hepatis, vlcere, abscessu, & similibus. Si per consensum e toto, ut si febres adfuerint vel præcesserint, ardentem quidem, sit liquefactio in excrementis. Si ab euacuatione notabili menses, hæmorrhoid. sanguinis profluvio e naribus, ex ægri sermonibus & stantium patebit, & ex causis prægressis, vel a cœliaca affectione vel dysenteria. Si ab aliis membris particularibus, omnia dignoscere & haud ægre interstinguere licebit ex prædictarum partium affectarum ac prædictorum affectuum dignotione, per enarrata in propriis locis ac capitibus signa. Ut si ab iliis, lumbis, stomacho, intestinis, ex ventris fluxibilitate, siue stomachus fuerit lusus seu mesenterium. In stomacho sit fluxus cibalis; vel lientericus in intestinis, præcipue si adsit oppilatio in mesaraicis, chylosus, & aliquando sanguinolentus. Ex parte etiam doloris ventris, stomachi, vel intestinorum, qui non remouetur cum fluxu. A renibus, ex lumborum dolore, grauitate, frigido, calido, aquæ sitate regurgitante ad intestina; ex abscessibus vel vlcerebus eiusdem. Ita & si sit a splene, ex propriis signis & calore fusco; ex proprio capite de obstructo, & scirrho lienis. Ita si causæ primitiæ prægressæ, ut ex potu frigido, tum aliis, ab assistentibus & ægro dignoscet. Quantum ad signa species distinguuntia, facile quoque percipientur. Nam quæ affectus demonstrant, satis ad sensum patet. Tympania enim percussa sonum edit: gracilia remanent extrema, nec tument, & iacenti corpus distentum manet, etiam resupino. At in ascite fluctuationem aquæ æger sentit; & hoc ipsum intuitu percipimus, quoniam tumorem in latus iacentis perpetuo sequi videmus; adde, quod recto stanti, ad ima ventris plurima moles sit & tensio, aquæ descensu: at iacenti venter sentitur mollior, & tument breui crura. In hypofarca moles vniuersa transmutatur; ac propriam formam amittunt, alibentque toti. Sed dum vniuscuiusque speciei exempla plura adferemus, hæc omnia lucidiora euadent; & antequam signa mere prognostica explicemus, aliud hic exemplum prius adferemus.

OBSERVATIO XXX.

De hydrope a muliere empirica & mendica excitato, qui postea curari non potuit.

Quidam extra urbem in Castro habitans, cum tertiana febre intermittente laboraret, neque remediis opportunis uti vellet, cum tamen facile pellatur, & non diu daret, muliercula mendica cum præforibus stipem peteret, nescio quibus herbis sanitatem eidem pollicebatur: qui cum annuisset, nescio quibus herbis, inque permultis, tum frigidis quam calidis (*maxime vero urtica*) concisis & decoctis, portionem ex iisdem paratâ obrussit, &

intra

14
Quis affectus præter naturam sit aqua inter cutem.

Præsagientia hydropen

Signa demonstratiua & communia.

Signa causarum.

A calida.
A frigida.

7
Ab hepate
primario affectu.

A toto.

Ab aliis membris particularibus.

8

Signa species distinguuntia.

2 intra diem subito venter inflatus est, febre quidē illum relinquēte, sed in atrocius malum incidentē; ita ut ascitem incurrerit. Collectio autem huius humoris aquosi plurima existit inter membranam peritonæum appellatam & intestina, ut vere vtrius modo membrana ipsa repleta esse videatur. Spatium etenim, quod inter peritonæum & partes ei subiacentes est, aquoso humore impletur, Gal. teste 5. de loc. affect. aliquando vero, ubi peius habent ægri, vsq; ad femora tumor producit, ut Aetius asserit, quod huic postea etiam evenit. Quod ascites esset, his notis deprehendi: primum quod multum urina in illo generabatur & reddebatur; sed paulo post supprimebatur, & in venis remanebat, & gravitatem & pondus faciebat. Cum vero corpus moueretur, sentiebatur aqua fluens veluti per canalem. Si enim abdomen impelleremus, aut ipsemet corpus in alterutrum latus prouolueret, fluctuantis humoris sonus obaudiebatur: fluctuationes enim si excitentur in ascite, fit ex humore, qui veluti in vtre quodam cōtentus circumvoluitur. Urina admodum pauca erat, eaque fere crassa & rubicunda, cum præsertim morbo initium iecur dedisset, ut hic factum videbatur, febre subito consopita, & hepate refrigerato tandem atque læso. Erat autem huic alius tumida, eleuata, ut rumpi videretur: quam quum manu percutiebam, aqua, ut in vtre collecta, sonabat: ut merito morbus iste ascites ab ἀσцитῶν, id est, vtre denominatione induxerit. Verum licet hic morbus etiam febricitantibus contingere possit, id potius hic a medicamento perperam administrato evenit, iecore tandem & ipso oblato, sanguificationis officio intercidente. Ad hunc, cum Alcmariæ hoc tempore habitarem, læpe euocatus sum, & cum medicamentis aptis uti nollet, venter ad summam molem excreuit; ut postea necessitate coactus, ea admiserit hydragoga medicamenta, quibus venter detumesceret. Verum rursus ab iis in totum abstinendo, luna potissimum accrescente mirum in modum malum accreuit per plures menses. Sed inter reliqua pharmaca nullum magis iuuabat, quam sequens medicamentum, quod vna cum altero medico Harlemensi apud eundem agentes præscripsimus: ℞ succi ieros 3 ℔. aquæ casci 3 ℥. ℔. mellis crudi 3 ℥. (aliquando 3 j. ℔.) fiat horum levis ebullitio, & coletur; cui colaturæ adde, & in ea dissolue spicanardi 3 ℔. cinnamomi 3 j. diagridii gr. iij. misce. detur in aurora. Ex eo semper habebat ad minus octo sedes valde aquosas. Verum postea hic plane omnia remedia contempsit, vir sui cerebri; ita ut lecto omnino decumbere per multos menses coactus fuerit, ut in eius natibus ac cruribus vlcera suborta fuerint, quæ in hydropicis difficulter curantur, a quibus magna copia aquæ effluebat per lectum, etiam solaria transeundo. Tandem, postquam per octo menses lecto misere decubuisse, & miseram vitam absq; medicamentis traxisset, vltimum diem obiit.

SCHOLIA.

3 Inferiora tum pedes huic inflabantur, at superiora arefiebant, ut in ascite fieri assolet, cum & fa-

moratum pedes inflentur, & aliquando in scrotum descendat humor: in fine tamen aliquando contingit, morte instante, manus quoq; inflari, quod pessimum signum esse volunt, debilitatem cordi communicatam esse; unde cor non potest defendere manus ab inflatione. Sed quod ad signa prognostica attinet, causarum prius distinctio ponenda est, & præcipue obseruanda, cum ex iis gravitas morbi coniiciatur. Hinc communis opinio habetur. Quam & Donatus sequitur, quod tympanites periculosus sit, minus eo ascites: sarcites quoq; aliquando curabilis sit, per ea quæ curi adhibentur humorem detrahentia ac resiccantia pharmaca, ut Aetius inquit. Iacchinus aliter sentire videtur, cum ita scribit: Soluenda autem nobis (inquit) questio est, quam iuniores mouent, quæ harum affectionum sit deterior. Alii enim, ut Auerroes 3. Colliget. tympaniam dicunt: ratio, quia non est hæc sine calore, nec potest sine calore flatus discuti: unde duplex incommodum in cura sequitur, & augmentum scilicet flatus, & augmentum dyscrasie calidæ. Videte quantum proficiat ars sine experientia. Nec enim distinguit veram rationem a falsa. Miror Brachatos hos medicos primum non esse experientia innixos ad problema soluendum, mox rationibus certasse: sed tur-

6 nimis additi erant scriptoribus, ita ut nihil ab artis operibus utilitatis assumerent. Ego vero (Inquit Iacchinus) a iuuenta perpetuo euentus omnes agrorum obseruavi: vidique ceteris paribus de ætate & robore, hydropas, qui anasarca dicuntur, facilius curari: quod si contendere ratione oporteat; quia causa minus est rebellis: nam proxime hi ad sanguificationem accedunt, nec vires adeo imbecillas habent. At in ceteris membra alimento destituantur, & omnia imbecilliora. Adde quod sæpius hic casus evenit ex mala victus ratione, ut crapula, cum dimisso exercitio, aere humido, & crassis cibis: & sic videmus pueris aliquando contingere. At hæc facilius sanatur, ut veritas & Galenus restantur. Alii curati faciliorem dicunt: significatur enim robur natura, cum ad omnes partes diffunditur id, quod noxium est. Quod si tympaniam compares asciti, facilius curam hæc recipit. Ratio dicitur, quoniam a minori defectus sit, 4. aph. 11. quia humida substantia sine calore aliquo in flatus non vertitur: quare & vires minus imbecillæ factæ sunt. Sed & alia est causa, quoniam, ut diximus, malum a ventre ortum habet: & sic non est tanta læsio principis partis. Aetius tympaniam periculosiorem facit; sed nullam causam affert, nisi quod incisio adhibetur iuuans. Ad Auerrois verorationem dico, veram fuisse, si ex intemperie calida fieret. At non sequitur, Ex maiori calido sit; ergo simpliciter ex calido. Sed in veritate, si de præuitate morbi recte diiudicare debeamus, a fortitudine causæ incoandum. Stat ergo, Tympaniam a scirrho ventris factam vel mesenterii, multo deterioorem esse ascite a frigore iocinoris factæ, ob causam naturam, & fixationem. Ideo qui comparat cetera omnia, comparare debet paria, de causa, de ætate, & aliis, quæ possunt vim morbi & periculum augere. Altera questio est: quoniam posuimus ascitem a causa frig. hepatis semper fieri, ex Galeno; ideo querendum venis, num & a causa calida, ut posuit A-

Signa prognostica.

Quæ specierum sit pessima.

Medici Brachati taxantur.

6

7 Verum ascites fiat a causa calida.

uicenna, quem sectantur iuniores omnes, ponentes hydropem a causa calida. Similis sententia fuit Auerro. 3. Coll. Sed & verisimile est, hos vidisse multos calidis morbis laborantes, qui hydropem forent; ut cum intemperie iecur labore nimium calida, vel phlegmonae. Et quidem nos vidimus hydropicos, quibus aderant signa caloris in iocinore. Confirmatur hoc, quia saepe suffusi flauo calore apparent, & urina colorata valde colore rubro, vel flauo. Quare stabit cum calida iocinoris intemperie hydrops. Quod si ratione contra hos contendere velis, quoniam generatio aquae vel flatus est a calore diminuto, & ita necessario ex frigida, respectu naturalis temperiei, responderet, increuisse extraneum calorem & morbosum; imminutum vero naturalem, cuius vis est concoquere: & ita refrigeratum iecur esse calido innato; sed calidum calore extraneo. Quod vero hoc sit, patet, quoniam ad acutas febres sequitur; non alia ratione, quam quia exstinguitur calor concoquens. Haec questio necessaria est, quoniam nosse oportet, num opus sit semper procedere cum calfacientibus in hydrope: an aliquando sit refrigerandum. Profecto ego non video quomodo possit a calida intemperie gigni aqua. Scimus enim quod omnis immoderata intemperies deicit opus & facultatem 3. de sympt. caus. 1. & ita omnis vitiat coctionem: Sed diuersimode, ut Galenus ibi ait. Nam frigida frigidos semper affectus parit: calida calidos: quod est assare & in bilem vertere, & siccare. quamuis ergo calor natus sit debilis, aget tamen iecur calore quem habet, in cibos: & hic est calor acris, & mordax & exurens. Ergo plurima bilis gignetur dum ea viget intemperies: sed cessante ea, & restincto calore prater naturam, cum etiam imminutus sit calor qui secundum naturam, erit iecur frigidum: & ita frigiditas eius ad calidos morbos potest succedere per resolutionem. Ad ea vero experimenta quae adducebantur, dico primo, non esse inconueniens de hydrope tympanite, quod fiat ex calido circa viscera vehementiore: dum in ventre, ut intestinis copia adsit pituita: quod aliquando euenire potest, ubi homo calidi iecinoris usus fuerit vitu apto pituita generanda. Scimus enim quod ratione materie fit a vegeto calido flatus, 14. method. cap. de priapismo. Reliquis vero morbis calidis succedet quidem ascites aliquando, sed non comitabitur. Potest etiam contingere, ut in calido iocinore scirrhus eueniat; ut lienis vitio, vel exustione alimenti & sanguinis, unde refrigerentur mesaraica vena, & sima iocinoris, & obstruantur vena illae: unde alimentum crudum & aquosum permaneat, & exsudet in ventrem. Sed semper a frigido fiet, ut patet. Quod vero additur de urina, nihil est: ipsi enim exiguum mingunt; & urina diu detinetur, unde ruffescit. Gal. tamen 2. Prognost. 2. hydropem ponit factum ex inflammatione lactium & ieiuni. Sed vult fieri tympaniam, quia crudum alimentum delicitur per intestina, & a calore loci in flatus vertitur: & manet in ventre, ob excreticis imbecillitatem. Sed & de ea, quae ex iocinoris inflammatione fit, cap. 3. loquitur. Fieri vero ait, quoniam alimentum, & potio detinetur in lactibus: indeq; resudat. Quod vero in iecur permeat, torretur: unde biliosum fit, ex inflammatione. Quod vero in super addunt, a sicca intemperie & humida fieri, falsum est. Nam ex his non vitiatur concoctio, id est, alteratio ali-

menti, nisi ubi iunguntur frigido vel calido: quod ego supra ex Galeno monstravi: sed alias notas inferent. Haec tamen Iacchinus. Non desunt tamen praeter illos, qui Auicennam sequuntur iuniores, ut Rondeletius, aliiq; viri doctiores, qui hydropem a causa calida fieri volunt. Et sic etiam in utramq; partem disputari quoq; posse, quae nam species sit deterior. Memini enim, cum Louanii in scholis de hac re fieret disputatio, quod ego contra Licentiatum, qui gradum Licentiae acceptus erat, sustinerem hydropem omnium specierum pessimam esse, cum plurima membra in eo lederentur; quam positionem tunc contra praesidem Leonardum Hieremias doctissimum defendebat, cumque acutus esset in disputando, ita ut Leonardus paulo calidior in disputando euadens, diceret, Ego Galenum legi antequam esset natus; cui subridens Hieremias, ut erat facetus, inquit, Plura quidem legisti, sed pauca animaduertisti: Ceterum aliter disputatur in scholis, aliter in praxi re ipsa demonstratur. At omissa hac altercatione, demum ad Prognostica reuertamur. Omnes autem inueterati hydropes, & qui habitum corrumpunt, sunt periculosi; ut etiam Aetius fatetur. Iam quoq; experientia edocti sumus, aliquas causas esse prorsus insolubiles, ut scirrhum, si in vilcere eo sit; si vero in liene, aegre solubilem. Alii a tumore duro iecoris vel etiam lienis, insanabile male esse volunt: sed & quando iam aquam intercutem facit, prorsus insolubile, siue in liene, siue in vtero, siue in lactibus sit; diu enim durasse & confirmatum esse oportet. Saepem vero hoc malum, ut nunc diximus, per se incipit; saepe alteri vetusto morbo, maximeque quartana, superuenit. Inter initia tamen non difficilima curatio est, ut exemplo vnius obs. 28. praecedentis ostendimus. At si malum inueterauerit, non sine magna molestia discutitur, Celso auctore, faciliusque in seruis (si nondum radices egerit) quam in liberis tollitur: quia cum desideret famem, sitim, & mille alia taedia, longamque patientiam; promptius his succurritur, qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur, ut idem refert Cornel. Difficile vero soluitur habitualis frigida intemperies: attamen non est impossibilis. Facillime curantur, qui ex obstructione, vel ex victus ratione oriuntur: ut ex cibi multitudine: post hos illi, qui a suppressis menstruis. Curam etiam recipiunt illi, qui ex profluvio sanguinis: sed quia raro fit sine scirrhis, ideo rari euadunt. Omnis item aqua intercutem, si ex acuto morbo exsistit, mala est, ut liquet ap. Hippocrat. 2. Prognost. non enim sedat febrem, sed dolorem admodum infert, ac mortem, ut ipse inquit. Huic quoque affectioni non minus foeminae, quam viri fiunt obnoxii; pueri vero ut plurimum ab hydrope sarcite apprehenduntur, quae quandoque curabilis fit. Sed quaeret hic aliquis, quod ad aetatem attinet, quinam melius euadant? Quastio an iuuenes, quorum natura morbus est aduersus: an senes, quibus est affinis? At experientia monstrat pueros aliquos euadere; seniorum vero nullum. An eodem proposito generis causae morbificae, magis perici-

periclitantur pueri, quam senes? quia magnitudinem causæ commonstrat. Hæc enim est causæ 1. aph. 34. Sed licet senes de vita non periclitentur, rarius tamen morbo liberantur, ob vires defectas: quoniam branchi in valde senibus non maturantur. Non admodum formidabilis est aqua illa, quæ nullo antecedente morbo ceperit; deinde quæ longo: omnium periculosissima, ut iam diximus, quæ ex acuto nascitur; & quæ a scirrho confirmato, non curatur; sic etiam vix a resiccato nimis hepate: ab hydatidibus maxime. Phthisici quoque magna ex parte, eo quod iecori malum communicetur, hydrophen incurrunt: eluuius enim saniosa atque virulenta viam inueniens, in iecoris substantiam diffusa aliquando obhæret, eiusque substantiam corrumpit. Quod vero aqua inter cutem laborantibus, vice a in corpore facta difficulter sanentur, idem Hippoc. scriptum reliquit aph. 8. lib. 6. & aph. 14. eiusdem: quod sit propter nimiam humorum abundantiam: *Hydrope correpto* (inquit) *si aqua e ventris in ventrem defluerit, soluitur morbus*: quemadmodum malum esse, si eisdem tussis superuenerit, decretum est ab eo aph. 35. 6. vel quod desperati, ut liquet aph. 47. 7. Signum tamen pessimum est, ubi vacuata vel sponte vel arte materia, malum redit: causæ enim pertinax est. Ergo quod scribitur aph. 14. lib. 6. *Hydrope correpto, si aqua e ventris fluxerit in ventrem, morbum soluit*; non est perpetuum. Multis enim sponte vel arte commoto ventre, & aquosis multis inde purgatis, non superfuit salus: quomodo defectus mors contigit, siue aqua fuerit in ventre, siue in thorace. Hoc in thorace annotauit Hipp. lib. de morb. quod & experientia confirmat. Sed licet aqua sponte vel arte expurgetur, si viscera corrupta vel syderata sint, celerius moriuntur. Multos obseruauit Hollerius, & etiam nos, qui ex alui profluvio melius habuerunt; sed paulo post, manente causâ, morbus rediens interitum attulit. Aliquando etiam in nimia effusione humoris vna spiritus effunditur, quod Hipp. monet in his, qui secantur & vruntur. Ob id oportet integris viribus esse: & priusquam viscera corrumpantur, remediis vi purgantibus, deinde & aliis. Sed hæc ad curationem spectant, de quibus dicemus, cum de sectione latius loquemur.

OBSERVATIO XXXI.

*De Leucophlegmatia, cum alui profluvio
vehementi curata.*

Scribit Hippocrates, si quis Leucophlegmatia letineatur, & fortis ventris fluxio superuenerit, a morbo liberatur: ut patet aph. 29. lib. 7. Nāque (ut Gal. inquit) ex forti seu diuturno alui profluvio, soluitur alba pituita superabundantia. Hoc modo noui Alcmarianam mulierem, ad quam curandam accitus fui, hydrope aquosa seu Leucophlegmatia laborantem: quæ, cum in alui profluvio vehemens incidisset, mox ab hydrope & totius corporis mole ir fluita; miraculi instar, omnibus admirantibus liberata est.

S C H O L I A.

AVicenna contrarium de hydrope in generali dixisse videtur, quod fluxus ventris in hydro-

pe sit lethalis. Sed hoc ita distinguunt: in ascite lethalem esse, in qua virtus fere debilis est. Et sic Auicennam intelligendum esse volunt. Alioqui in hypofarca, cum virtutis constantia & robore, aliisque bonis signis, etiam si a natura fluxus factus fuerit regulariter, & non symptomatice, utilis est. Hinc & Rhases 7. *Continetis*, tum Auicenna ipse, potius laudant in ascite siccitatem quam ventris lenitatem. Attamen in hydrope anhelandi difficultas perniciem minatur: ut & si cito pariter alui superuenerit, qua nec venter obiter resideat. Hydropicis aliquando nauigatio profuit: Nam Ioanni Blancke negotiatori Parisiensi, apud Hollerium, in Angliam profecto, hyeme tumor cum miraculo quodam subleuit: euauitque morbus, nec rediit. An quod integro, aut non ita laeso viscere aqua partim calore nativo excitato, partim aere tharino resoluta fuerit? Cuidam per sudores sponte exsiccatos, & quasi distillantem aquam, curatio: Alteri mors, cum multo alui profluvio tumor subleuisset, redeunte morbo. Cuidam ad viuum relectis virgibus pedum, & frictionibus paulatim humor ille defluxit: & conualuit. Oribasius tussis signum esse mortis pronuntiauit, ad aphor. 35. lib. 6. Verum hoc distinctione quoque eget. Si videlicet id fiat ad aucto morbo, & aqua ratione, qua tam pulmonum arterias asperas occupet, unde tussis: nam si aliunde, non ita mala. Sic quoque, iuxta Gordonium, a fluxu ventris si non sequatur alleviatio hydropicis malum. Et iuxta eundem: *urina bicolor in hydrope lethalis*; sicut cum est ruffa inferius: & luens superius: aut rubra superius, & nigra inferius. Ita egestio hydropicorum tanquam sanguis coagulatus, mortem propinquam decernit: ita & anhelitus constrictio, cum solutione ventris, & vlcere oris, gingivarum, & totius corporis: uti euenit Domino de Schagen paulo ante eius mortem. Ita & religiosa morti proximæ vlcera multa in corpore apparere. Ita in ascite seu hypofarca carbunculi quasi pestiferi superuenerint, aut anthraces, mortem vicinam prænuntiant. Omnis hydrope sequens peripneumoniam, lethalis.

OBSERVATIO XXXII.

De quibusdam ab hydrope curatis.

PVer 12. annorum, ex hydrope decumbens Bononiæ in nosocomio Vitæ dicto, a præceptore meo Elideo ita curatus fuit: ℞ pul. soldanella ℥. ij. aquæ cuscute agrimonie an. ℥. j. quod illi exhibuit: & quamuis parua dosis profuit in puero. Deinde ℞ syr. byzantini, de quinque rad. ana ℥. ss. aquar. cuscute, eupatorii, cichor. an. ℥. vj. misce. Deinde iterum moderate purgatus est cum rhubar. & soldanella, cum aqua agrimon. Rursus syrup. præparante vsus. Mox soldanellam puer denuo cepit: & conualuit. Alter Mediolani decumbens, curatus est hoc modo: ℞ cass. rec. trah. ℥. j. trochis. de viol. sine scammon. Sy. pul. soldanella ℥. j. misce, cum Sacch. fiat bolus: ℞ rad. petroselinici, dauci an. ℥. j. ss. sem. fenic. anisi, dauci an. ℥. ss. lignea, cinamomi electan. ℥. j. centaur. minor pulg. calamenhi an. m. ss. rad. cucu. syluest. ℥. ss. in vino macerata per nocte &

3
Historia
quadam hy-
dropicorum
ab Hollerio
obseruata.

ita expresse addatur liquor albis, rad. azari 3 ℥. gran. iuniperi gran. ii j. bulliant simul omnia in 5 q. vini albi odoriferi, ad consumptionem medietatis. Deinde fiat horum omnium colatura; cui adde syr. de byzant. de quinquena. an. 3 j. ℥. exhibebatur omni die 3 vj. vel iij. Continuatum septem diebus; sed in homine fortiori. Prius tamen potest addi rad. cucum. 3 j. Deinde si necesse sit, dosi augenda. Potest & macerari in aceto. Vide Diosc. Deinde capiebat soldanella 3 iij. cum aqua vel succo convenienti. Intermedio tempore sumebat 3 j. diacur. ante coenam & prandium. Sed & hoc pulvere utebatur in cibis exsiccantibus: ℥ pul. seminis anisi, fenic. an. 3 ℥. pul. iros, sulphuris vivi & exstincti multoties in aqua agrim. an. 3 j. ℥. Abstinebat a potu quantum posset. Quibus curabatur. Vbi non succederet, fortius exhibebatur: addendo supradicta decoct. soldanella 3 iij. sanguina m. ℥. cantharidum gran. j. ℥. syr. byzant. de eupatorio an. 3 j. aqua agrim. cassia, absinthii, foeniculi an. 3 j. misce. ℥ trochis. de eupat. de rhab. an. 3 j. cum syr. de mentha, fiant pil. detur vna, & superbibat ex syr. Si non cedat morbus, ætate ferente reiteretur decoctum & purgans conueniens; & intermedio tempore detur diacurc. Et post tres dies huius pul. 3 j. ℥ ceterui minor 3 iij. sem. foeniculi, anisi, carui an. 3 j. misce. Si videbitur necessarium, decocto adde secundum, imo etiam tertium, granum cantharidum. Et si fiat corrosio ex dictis, iniciatur talis clyster: ℥ lactis recentis 3 vj. axungie hircine 3 j. axungie porcine olei communis & olei. an. 3 iij. cerusse 3 j. sang. drac. 3 j. ℥. aqua consolidida nara. 3 iij. misce. fiat clyster. Hoc modum præscripto vnum curatum scribitur, hisdem sæpe repetitis. Cum cautione tamen cantharides imponatur: nam in eodem nosocomio Bononiæ vidi in muliere plus obfuisse, quam vis in paupere & fortiore etiam hæc profuere: ℥ cass. rec. extra. 3 j. trochis. de viol. sine scammon. soldanella an. 3 j. pul. liquir. 3 j. fiat bolus cum lacte. ℥ rad. foeniculi, danci, petros. an. 3 j. ℥ sem. fenic. anisi, danci, an. 3 ℥. pul. galii, calamith. sabina an. m. j. rad. azari 3 j. gran. iuniperi 3 j. cantharid. gran. iij. fiat decoct. in vino secundum artem. capiebat omni mane 3 vj. Deinde istis pilulis: ℥ pilul. massic. aggregat. an. 3 j. elaterii optimi 3 ℥. omni ss. ap. de eupat. fiant pilule. quiescebat deinde per quatuor, quinque, aut sex dies; quibus utebatur pul. sem. anisi in cibo, aliisque supra repetitis. Et his æger sanitati restitutus fuit. At ego potius cantharidibus minime vtor; propterea quod ab iis viderim corrosiones; quanquam non dubitem in valde robustis prodelle. Hæc quidem vehementissima non nisi cum cautione, in robustis, & cognita natura, per vices adhibenda.

S C H O L I A.

44 C Vm autem ex prædictis constet omnem hydropis curationem difficilem esse, & plurimo artis auxilio opus habere: tamen iuxta Aetium, inter initia non ita difficilis habetur: Celso quoque auctore. Curationis vero prima & principalissima pars ratio victus existit, non solum in aqua intercutem, verum etiam in omnibus affectibus, &

potissimum periculosis; Alexandro teste. Et ideo in omni hydrope imprimis studebimus, iuxta omnes auctores, roborare virtutem hepatis digestivam, ac ipsius ventriculi; vitando cibos nocentes. Et ideo in omni hydrope omnes virtutes ac membra principalia, præcipue hepat & ventriculum, roborabimus cibis rebusque odoriferis, moderate stypticis; & mandabimus ut moderate cibis euchymis & levis digestionis utantur, mixtis aromaticis roborantibus, idque semel in die. Quæ omnes hydrope laborantes egregie iuvant. Sed hoc meminisse oportet, si quis hydrope simul & febre corripitur, quod tunc post dimissionem febris, vel tempore minoris afflictionis cibis exhiberent; atque tunc etiam remedia commoda administranda. Eaque de re communem omnibus speciebus aquæ intercutem victus rationem instituemus; & quasi uniuersalem prius aggrediemur; deinceps cuiusque particularem curationem. Ideo loci laboritas imprimis querenda est: montana loca, marina (sic quidam hydropicus inflatus ventre, manibus pedibusque & facie, a medicis destitutus, & tanquam desperatus, ad litus marinum, & nuda incola per aliquot miliaria ascendit in altum maris: & provocato vomitu: & post vomitum exercitio utens, sanitati restitutus est) aprica ac sicca regio inhabitanda. Propterea aer eligatur ad calidum & siccum vergens; moderata autem sit, & probe temperata ipsa domus, secundum anni tempus, ut inquit Aetius. Lectus non valde molle sit, iis præsertim, qui anasarca laborant. Substernantur etiam arundinum folia, & herbe resiccantes; velut est vitex, pulegium, calamintha & similia: tegumenta etiam ipsa, quibus teguntur, apparentur duriora: mirum est enim quantum huiusmodi per somnum resiccent; ut constat iam quoddam frumenti accensis obuolutos & absconditos, a somno surrexisse firmos ac resiccatos, ut liquet ex eodem Aetio. Somnus eiusdem competit moderatus, aut paulo breuior consueti: namque vigilæ moderatæ non minus conferunt, digerunt etenim, ut liquet ex Galeno 12. method. med. Motus insuper, si quid aliud (ut Trallianus refert) hydropicis conducit; præcipue qui sit per mare, equum & lecticam. Iis autem, qui viribus constant, etiam ambulatio est utilisima. Pariter frictiones hydropicis adhiberi debent: namque exteriores corporis meatus rarefaciunt, humores extenuant, ac discutunt, eodem Alexandro teste, Celsus quoque multum in ambulando, currendoque aliquando esse, præcipit; quanquam idem inter initia quietem, situm ac in ediam pro affectus curatione probauerit. Addidit etiam, quod superiores maxime partes sepe resiccandæ sunt, ut spiritum ipsum contineat: euocandus est sudor, non exercitatione tantummodo, sed etiam in arena calida, vel lagonico, vel clibano, siatilibusque aliis: maxime utiles naturales & sicce sudationes sunt, quales super Baias habemus in myticis, ut ipsi refert; modo autem vulgo sudatorium Tritumonte (ut Donatus putat) appellatur. Ac clibano ut voluit, non eo tamen modo, quo Cydonæ quædam ephebe muliercu-

55

Victus vario
communis
singulisque
inter cutem
speciebus.

Ex vomitu
in maribus
hydrope qui
dant cura-
tia.

66

77

Sudatorium
Trituli.

8 *emphum*
videtur
facis mu-
lis.
 lercula cachecticum filium seu hydropicum te-
 merario ausu deinto pane (ut scribit Benedictus
 Veronensis medicus doctissimus lib. 15. cap. 25. de cu-
 ratione in communi, & de siccis sudationibus) sub-
 iecti que tabula in furnum coniecerat, inuitum
 ac reclamantem, vicinis ad eam medelam opem
 ferentibus: nam in caput puerum intulerant: qui
 vapore occluso spiritu protinus suffocatus est.
 Remedium conferre indicio matri fuit, quod
 protinus conticuisset. Stabat ante furnum læta,
 sudoris desiderio: paulo post puerum percūctū
 rī cepit, *nunquid calor prodesse videretur?* Cum
 ille nihil responderet, suadētibz vicinis, ut pue-
 rum quiescere pateretur, ad dicacitatem rediit;
 paulo post cum puerum extraxisset, exanima-
 tum vidit, furni remedium, suamq; & vicinarum
 temeritatem exsecrando. At nos tuto has siccas
 sudationes excitamus in lectulo humili, clibani
 modo, lateritiis lapidibus modice accēsis & vino
 albo exstinctis, pannisq; innolutis, ne forte lintea
 succenderentur; atque ita ordine ab humeris ad
 pedum plantas eos lapides circumponimus, leui-
 ter candentes, exserto ac immuni a vapore capite:
 recto tamen sindone: tum sudores ter aut quater,
 interdum miro modo euocamus. Pares sudatio-
 nes idem Veronensis vtiles tradit, in specu, in
 Mylo insula, sæpe salutare: vbi vapor tantum
 queritur, sicuti super Baias inueniri tradit Celsus:
 ut paulo superius diximus. Iuxta Aponi fontes, ac
 in pluribus Italiæ locis, & in Bononiensi agro ac
 S. atiliensi, pares sudationes faciles constitui pos-
 sunt, raptō in corpora vapore, quoniam balnea,
 & humores omnes damnauere. Verum neque
 9 *ibis qualis*
esse debet.
 sudor euocandus, aut corpus valde exercitan-
 dum, nisi prius corpore perpurgato. Cibus au-
 tem debet esse ex media materia, sed tamen gene-
 ris durioris (ut refert Celsus) tamen concoctu fa-
 cilis & sufficienter coactus. Alexander laudat pa-
 nem furnarium probe fermentatum, qui semina
 frutibus discutiendis apta contineat, ut anisi, aut
 cuminī, aut fœniculi, cuius etiam copia vitari debet.
 Et sit optimus clibanites: qui salem ammoniacum, &
 fœniculum habeat admixtum, iuxta Aetium.
 Ex auibus conueniunt perdices, turtures, phasia-
 ni, turda, mortula, sturni, & reliqui minuti passer-
 culi, qui pingues non sint: interim & non impro-
 bantur gallina, ac gallinæci pulli, quamquam fere
 aues mansuetis præponi debeant, ut testatur idē Tral-
 lianus. Ex quadrupedum item carnibus modera-
 te comedant: & eas potius, quæ non sunt pingues,
 præcipue ferinas, ut ceruinæ, aprinæ, & caprearum
 ac leporum: quarum ius cum extenuante cibo pa-
 setur, apio videlicet, petros. danco, pulegio: cancali-
 de, eringio, pastinaca porro capirato, ac alliis: præser-
 tim hominibus ruralibus & nautis. Has easdem
 maxime assas, si gratæ sunt, assumere ipsos alienū
 non est. Verum tam assatis, quam elixatis semper
 10- aromatica quædam redolentia adicias præsertim
 cinamomum, aut garyophyllos. Ex piscibz gustari
 poterunt cancri, locustæ & erinacei recentes. A
 legaminibus abstineant in totum. Inter bellaria
 concedendæ sunt palmula, nuges amygdale, nucæ

pensiles, vna passa, mala panica, pyra cocta, ac carica:
 omnia tamen moderate, neq; omnia quotidie. In vni-
 uersum tamē maximā ciborū partem in cœna ac-
 cipiant. Quandoq; etiam assatas cochleas, atq; o-
 ua insuper assata gustare poterunt, ut Aet. visum
 est. Pro potu sit vinū tenue, præsertim vetus, iteq;
 illud quod vrinā ciet. Aqua in vniuersū vitāda est.
 Verum quoniā incommodus est eis plurimus po-
 tus tantū præbendum erit, quantum ad infringē-
 dam aliquo modo sitim sufficit. Namq; potio nō
 ultra danda est, quam vt vitā sustineat: optimaq;
 est, quæ vrinam moueat, ut Cels. placet. Si tamen si-
 tis intensa instet, parum quid delibandum dabi-
 mus: solatii tamē gratia. Inedia quidem in hydro-
 pe facilius fertur: sitis vero difficilima est, nec su-
 stineri potest: propterea Medrodorum ferunt E-
 picurei discipulū, cum hoc morbo tentaretur, ne-
 que æquo animo ferret intolerabile sitim, vbi diu
 abstinuisset, bibere solitū, ac deinde euomere. nā
 q; si redditur quicquid receptum est, multum tæ-
 dio demit, alioquin morbū auget: ideoq; in quo-
 libet tentandum nō est id remediū genus. Ideo vi-
 num austerum qdam dandum præcipiunt, cum ci-
 bo præparce q̄ tenuissimum, nec ultra quam vt vi-
 tam sustineat: & vt talis sit potus, q̄ vrinam tantū
 moueat. Dulcia vero vina, & vinum mulsum, vi-
 tanda sunt: namq; ex his sitis nō sedatur. Eporum
 tamen acceptum optima eisdem medela est, ut li-
 quet 1. de simpl. med. facult. Quod si velint factitiis
 vinis uti, id sit absinthites, præcipue quod spicā nar-
 di copiosiore recipit: vel apiatum: aliis autē ab-
 stineant, ex Alex. Trall. testimo & vt summatim
 dicam, (cū Gal. 4. de rat. viſt. in morb. acut.) q̄ mi-
 nimum habere & q̄ plurimum laborare prædictis
 cōfert: nempe talis viuendi modus calefacit & ex-
 siccat. Hæc quo ad communem viſus rationem
 attinet, dicta sunt satis. Quātum vero ad medica-
 11 *Communis*
medicamen-
torum ratio.
 mentorum rationem pertinet, communis etiam
 omnium curatio ab euacuatione incipienda est.
 Pauli & Alexan. testibz. Ideo sciendum, quod omni
 hydrope cōferant res euacuantes incidetes, exsiccatantes:
 ita interim adhibita quæ exterius admota. Et quam-
 quam vniuersalis methodus sit in omni hydrope,
 vt materia, q̄ morbum faciat, euacuetur, vti aquo-
 sitas: tamen in ascite, per soluentia, q̄ hepati mi-
 nime inimica sint, est procedendum: ideo cathar-
 tica vehementiora damnantur, præterquam in hy-
 posarca, q̄ vehementiores sustinet potiones, mo-
 do vires adsint & ætas ferat. In tympanite vero
 magis perdigere dīa. Ita in hyposarca purganda est
 materia pituitosa: & ea danda, q̄ aperiant & vrinā
 prouocent: idque magis in ascite & hyposarca. Sic
 & hepatis intemperies corrigenda, ac roborandū
 semper hepar, siue per consensum, siue per se fiat.
 Sic & resolutio ventositatum & humiditatum: &
 meatuum internorū & externorū apertio (ma-
 teria prius præparata, & per euacuationem expulsa)
 saltē eum. frictione ad solem vel ignem cū stuphis
 siccis, vel aliter, ut superius dictū est. omnibz specie-
 bus hydropis curabilibz videtur iunamentū p̄stare.
 Sed hoc quoq; sciendū, quod quædam medicamēta q̄ aquo-
 sos humores expellant, atq; diuretica sunt, si in p̄uenire

sumantur, subtilissime trita cum aquis vel decoctionibus propriis administranda erunt, ut facilius penetrarent. Præterea & hoc observandum, ne radio afficiantur multis remediis, quod medicamenta sapienter sunt mutanda, & varia forma administranda, ne natura assuescat uni presidio: ne medicamentum fiat uti cibis, non autem uti medicina. Et sic quoque medicamenta laxantia, roborantia, siue aperientia, quamvis sint diversarum specierum, non sunt continuo adhibenda; sed utile erit modo vnum, modo aliud administrare: subinde vero & ex toto quiescere, ut natura cibo ac potu refocilletur, a multis remediis subinde lassata. Et ita quoque inter duo solutiva ventris, præstat aliquid de oppilans aut aperiens medicamentum præbere, ut metus aperiantur, & hydragoga commodius operentur. At vnice studendum, ut abstinemus a venenatis potibus, ut euphorbio, cocco gnidio, quantum possibile; & numquam ad mezereon, laureolam, nisi cum cautione accedendum; cum mesereone apud Persas vocetur rapiens vitam; & ab aliis faciens viduas: ideo, nisi coacti, iis non utemur. Vide de hac re historiam apud Gradum de Francisco Sfortia, duce Mediolanensi, qui tamen erat robustus hydrope laborans, & bene tolerans medicamenta vehementiora: sed eius usura fuit debilitatus cum ea accepisset, ut iuraverit, se nunquam talem medicinam accepturum. Ideo, ut paulo antea diximus, talia vehementiora cathartica non laudarem, nisi in hypofarca, & in fortioribus ac robustis: cum & hæc valde calida ventrem acrius perturbent, & iecori inimica sint: quod si danda sint, ea quidem correctæ exhiberi debent: sed tutius ab iis abstinemus. Et ideo si fortiora sint propinanda, semper roborantia aliqua addemus, quæ iecur & ventriculum robovent, & propterea statim a potionibus laxantibus roborationi hepatis incumbendum, ut vis eius & conseruetur & roboretur. Observabimus quoque, ut causam ipsam, quæ hydrope efficiat, auferamus: quamobrem si ab hepate eiusq; apostemate, abscessu scirrho, oppilatione hydrope originem traxerit, talis affectus primo tollendus erit ex propriis locis, ac diligenter hepate providendum erit. Quod si per consensum hic affectus fiat, causæ omnium primo occurrendum erit, siue ex liene fuerit, siue ex aliis partibus. nam causarum quoque ratio habenda. Deinde ad id quod genitum est, erit deveniendum. Sed quia aqua collecta morbum facit & auget, ea tanquam causâ primam auferenda est, ac ne augeatur, victus exsiccatus, ut nunc diximus, instituendus. Sed & distinctio remedium a varietate causæ sumenda: nam alia conveniunt in frigida, alia in calida, ut apud Rondeletium videre licet, tum alios auctores. Curationem itaq; Græci, ut Paulus & Alexander, ab evacuatione incipiunt: quanquam ascites & tympanites purgans medicamentum duntaxat, quod aquam educat, requirant: anasarca vero interdum venæ sectionem, ut ipsi referunt. Quin imo hic solus hydrope, cum incipit (Galen. teste 4. de rat. vitæ.) interdum sanguinis detractione indiget, cum scilicet ex retentione, vel hæmorrhoidis vel mu-

liebrii, vel ex quapiam, quæ ita plethorica sit causa, inceperit. Tympaniâ vero & ascitem (ut ipse inquit) nullus per sanguinis missionem sanare est ausus. At in deiectione ventris & hoc quoque observandum: materiam prius præparandâ, & meatus aperiendos: mox alius emollienda; imo in singulis hydropicis alius servanda lenis est, si non natura, saltem aut clysteribus lenientibus aut glandibus, Quæ vero per alium infunduntur, ceteris hydropicis speciebus traduntur, præterquam anasarca: præsertim cum cathartica aut vomitiones minus iuvant. Quidam vomitum ante cibum & post in omni hydropis specie, morbi initio laudare: præsertim in ascite; sed ab imbecilliori incoandum iubent. Verum ubi vires non sunt, id remedium genus relinquunt, nam proterit plurimum vires. Cientiâ urinas iuvant etiam in ascite, si admoveantur; etiam in hypofarca, per potum, cum in ambitu corporis aqua existat. At illa, quæ sudorem prouocat, non multum profunt in ascite, quia pauca aqua est in ambitu corporis; in anasarca valde prodest. In tympanite, inquit Paul. cathartica quæ corpora colligunt, vitanda sunt, & quæ urinam vehementer ciunt: nam ea melius mouetur cibus quam medicamentis. Verum si res cogit, ex iis aliquid, quod id præstat, cibo aut potui admiscendum est; qualis est iris, nardus, crocum, cinnamomum, & alia quæ Celsus ex præclaris auctoribus adfert: qualia & Paulus fere commemorat. Hactenus communiter de omni specie dictum sit, postea ad curationes speciales transibimus: exëplo hoc prius adhuc interposito.

OBSERVATIO XXXIII.

De duabus mulieribus hydropicis casu curatis, vmbilico perrupto & aqua effluente: quæ postea tamen ex recidiva vitam finiebant.

Mulier quædam in Thessalia insula, (non autem Græciæ, sed nostra Batavia) hydrope ad desperationem laborabat, ventre ita prominente, ut dirumpi videretur. Cum autem hæc vasa esset multis remediis, præcipue empiricorum consilio (qui ad eiusmodi insulas confluere solent,) nec quicquam opis aut iuaminis sentiret, tandem pro deplorata habita est. Sed paucis deinde diebus, perrupto vmbilico, ex ingenti mole aquæ, suo pondere ventrem prementis, magno impetu aqua purissima effluxit prius: postea & paulatim usque ad congios fere 12. aut plures, ut ipsa nobis narravit. Atque sic, absque opera medicorum, vmbilico denuo occluso, præter spem multorum convaluit. At tunc nihil remedium iecori adhibuit, ne denuo recidivam pateretur; & post plures annos, cum prava victus ratione vteretur, iterum venter in molem excrecere coepit; neq; eadem fortuna, ut antea, curata est: imo remedium tunc nihil iuvantibus, ab hydrope infelix tunc obiit. Idem contigit mulieri Delphensi, ita ut quasi facto abscessu in vmbilico, aqua effluere per vmbilicum eo reterato coepit, sed non ita pura nec alba, ut in præcedente, sed admodum rubra, postea etiam instat carnis loturæ. Ideo me, tum Cornel. Heydium collegam meum, tum duos

duos chirurgos, vocari ad se iussit: adhibitisque optimis remediis, ab hydropo cum euasisse videretur, postea tamen cum stillatim rursus aqua rubra efflueret, ut in matulam vitream reciperetur vmbilico appositam, tunc remediis chirurgorum tantum utens, tandem & hæc (licet a nobis satis curata) postea (ut a chirurgis nobis relatum fuit) obiit anno 1562.

S C H O L I A.

Accidit interdum casu & fortuna sanari nonnullos, quos medicina curare non potest: uti huic priori mulieri euenit; quanquam post multos annos facta recidua, & iterum in hydropem prolapsa, eodem malo obierit. Altera quamuis fuerit quasi curata, cum tamen ex vrina etiam videbantur viscera putrefacta, postea etiam obiit. Puer tamen, de quo prius dictum est, apud Beniuenum, curatus fuit. Et sic ut idem refert, mulierem scimus, quæ dum aqua inter cutem adeo laboraret, ut nulla de salute eius superesset spes, nescio quo spiritu impulsæ, de eminente quodam loco ad terram deuolutur, & utero ad lapidem eliso dissectoq, ita prorsus omnis effusus est humor, ut quæ puerum octimestrem gestare videbatur, emixta crederes. Sed nec multo post, aut tempore aut labore donec ad hanc rem adhibitis præsidis penitus sanata est mulier. Recte dixit Argentarius ille doctissimus medicus (ut alias quoq, diximus) tria esse, per quæ officia medica fiunt, per naturæ, medicum, fortunam seu casum. Sed quæ casu fiunt, non subiiciuntur præceptis, ut de his, qui ex vmbilico exserupto ab hydropo liberantur: quamuis simile quid his accidit, quod asciticis, quib, dissectio abdomine aqua emittitur, de quo Paulus Aegineta lib. 6. cap. 1. Huius exempla postea adferemus, nunc ad anasarcam seu ἀνασάρκα, & eius curationem accedamus: deinceps & aliarum specierum particularem curationem proponamus.

OBSERVATIO XXXIV.

De virgine ex mensibus suppressis in anasarcam incidente: & de alia quæ postea ad empiricos prolapsa obiit.

Virgo quædam satis annosa, 40. annos nata, cui menses longo tempore restricti fuere, tandem cachexiam incurrebat: mox vniuersa caro huic, atque adeo totius corporis moles, spongiæ instar, laxa ac madida euasit, ac toto corpore calore quidem mortuo, ac adeo intumescente, ut vix procedere posset, illa nempe specie hydropis correpta, quam anasarcam seu leucophegmiam appellamus. Ad hanc curandam acciti: cum hic multus crudus succus in vniuerso corporis habitu abundaret, hunc necesse erat vel concoqui, vel vacuari, vel vtrumque fieri, ut methodus curandi exigit. Sed antequam illa fierent, videndum, num adhuc causam habeat fouentem: eam prius remoueri oportet. Sunt autem causæ, quæ præstunt, mensium suppressio; aut praua victus ratio, cum in qualitate cibi, tum in quantitate: similiter & quæ debilitant iocinoris concoctionem, præter scirrhus, aut obstructions magnas, & difficiles: quæ ultimæ causæ

etiam in ascite fieri possunt præcipue. Cum ergo ex retentis mensibus fuerit (ut hic erat) vel hæmorrhoidibus iuxta Hippoc. aph. 6. & 12. ubi ostendit Galenus, hoc fieri: quoniam prauus sanguis & multus vitiatu frigidu vitio, reuinetur in venis. Sed & causam respicimus: de quo aff. & Galenus loquitur in libro contra Erasist. cum hydropas sanguine misso sanatos esse ait. Sed maxime vires animaduertere opus est, ut habeant, & ut habitura sint a misso sanguine. Nam si constare videntur signum est tantam crudorum copiam non esse, quæ prohibeat venam secari, auctore Galeno in libro de vena sectione. Non aliter 4. de sanitat. tuenda, in crudorum multitudine prohibetur venæ sectio, ubi multum remota est multitudo a sanguinis natura; idque ob virium robur. Sed & modus ille seruandus erit, de quo Gal. meminit in lib. de vena sectione, ut scilicet iterato fiat: atq; interim ea, quæ humores ad alterationem præparant, propinentur, id est, incidentia, & cal. facientia & subtiliantia. Meminit vero sanguinis missionis solum in anasarca Galen. 4. de vict. & in hac solum locum habere ait. Quæ præsertim interdum sanguinis detractione indiget; cum scilicet ex retentione, vel hæmorrhoidis, vel muliebrium, vel ex quapiam, quæ ita plethorica sit causa, inceperit. At in tympania & ascite secundum eundem (ut antea quoq, diximus) nullo modo vena secanda. Ideo & nos in talo venam aperire iussimus, sanguine moderate extracto: quamuis ex ea sectione venæ menses non fluxere. Propterea recte dicunt medici illustiores, quod misso sanguine statim cogitandum erit, ut humoris frigidi copiam educamus. Id vero, cum multiplici fiat via, nempe per aluum, per vomitum, per vrinas, per insensibilem transpirationem, per chirurgiam, & per ea, quæ ex accidente corpus exsiccant; ab his est auspicandum; victu scilicet, utpote in morbo longo, (omnibus vero utendum ideo, quod in variis partibus continetur humor, & est per proxima euacuandus:) quem generatim ita instituimus: talem nempe victum, qualem scholio, Observat. 31. præcedentis descripsimus: & quod ad quantitatem attinet, talem qui vires non deiceret: & quod ad qualitatem, ut siccaret corpus, nihilque graue concoctu, ob caloris infirmitatem glutinosum, vel crassum propter obstructions; humidum actu vel potestate, ob humoris copiam, non frigidum, non flatuosum: omnia enim hæc laidunt hydropas eiusmodi. Quamobrem effeci, ut conditura ciborum optimæ essent, ex aromatis vrinam cientibus, & ea, quæ ventrem subducunt quotidie familiaria. Potu quidem quam exiguo ut vteretur mandavi: nempe vino albo tenui, prout sumtus ferre posset; & non adeo adstringenti: & summatim, ut parce viueret. Multi cum forti animo per menses aliquot solo pane alio potu abstinuissent, curati sunt; adhibito reliquo victu siccante per exercitationes, quas ferre potest, per aerem siccum. In medicamentorum genere primum deicientia aluum præscribunt medici. Hæc enim præcedere debent: quæ cum multa sint,

ea tamen eligenda, quæ experientia nota fuerint conuenire; sæpius enim hæc iteranda veniunt: potestque prudens medicus facile experiri. Constat autem curatio his intentionibus; ut plurimū operentur absque ægri molestia; & ita utimur potione & clysmate. Hic igitur, cū cruditates abundēt sæpius circa primas venas, quidam hieram eligunt, cui inest solutio modica & confortatio. Modo utuntur infusor hab. & agarici in optimo vino; quæ in hac specie plurimū laudantur; aliquando radic. turbit. addentes. Sed his vehementiora sunt quædam simplicia: de quibus sermo erit in a-scite: nam & his quoque aliquando in hypofarca uti possumus; e quibus sunt squamma aris, as. vstū, lathyris, soldanella, iris, sambucus, urina iuuenis vel capra, esula. Verum in hac nostra puella & virgine, cum ex mensibus restrictis hanc speciem hydro-pis incurrisset, cum ex vena tali pertusa menses nō aperirentur, totum scopum curandi ad an-sar-cam conuertere decreuimus (hepate iam refrigerato) vna cum iis, quæ ad menses facerent; primo humores aquosos concoquēdo, incidendo, & ad expulsionem præparando, deinde euacuando. Primo exhibuimus ℥ j. pilul. hieræ simplicis, ad ma-teria minorationem. Deinde hunc syr. ℥. syr. de ab-sinth. eupat. de artemisia, oxymel. simplicis ana ℥ j. syr. de duabus rad. ℥ j. ℞. aquæ absinthii, apii, melissæ (ob matricem) ana ℥ iij. arom. cum ℥ ij. cinamomi electi. & spica nardi ℥ ij (hæc enim costringendo modice roborat, & aperiendi facultate prædita est) misce pro quatuor dosibus. Postea exhibui ℥ j. pi-lul. de rhab. descrip. Mesue, conficiendo pilulas v. conferūt initiis aquæ inter cutem. Deinde hoc apozema præscriptum est: ℥. quinque rad. aperiti-uar. cōmunium maceratarū in vino albo ana ℥ j. cu-scute, agrimonie, pulegii, (ad menses etiam euo-candos) chamæd. chamæpit. ana m. j. absinthii, ma-tricaria, artemisia ana m. ℞. sem. anisi, apii, fœniculi, dauci, petros. ana ℥ j. ℞. flor. sambuci (si habeantur, vel eius loco folior sambuci) p. j. polypodii, quercini, medulle carthami vel seminis parum confusi ana ℥ ℞. coquantur in aqua cōmuni pro ℥. j. ℞. colatu-ra adde syr. de eupat. de artemisia, oxymellis squilli-cici ana ℥ j. arom. cum ℥ ij. ℞. cinamomi, spica nar-di ℥ ij. ℞. & depuretur ad modum clareti, de quo bis in die capiat. Deinde capiat has pilulas; ℥. pilul. de agarico ℥ ij. pilul. fœtid. rhab. optimi puluer. ana ℥ ℞. cum aqua agrimon. fiant pilula v. Deinde omni mane capiebat ℥ iij. confectiois in tabulis, hoc modo parata; ℥. specierum dialacæ, diacur-cumæ ana ℥ j. specierum diarrhod. abb. ℥ ℞. disso-lui. in aqua artemisiæ, adiectis zaccbar. albiss. ℥ ij. fiat confectio in tabulis, ut artis est. Mox illam ita purgauimus; ℥. diacarthami solutini in tabulis ℥ iij. electuarii indi, catholici ana ℥ ij. syr. de arte-misia, de eupat. ana ℥ ℞. misce, cum decoct. supra-scripti ℥ iij. sumebat in diluculo. Et multa aquo-sa deiecit: & cœpit moles corporis detumescere: cum & apozema superscriptum iterum caperet, adiecta ℥ j. folior. senæ, & ℥ iij. rad. turpeti. & cinna-momi exiguum. Crura inflata inunximus, tum ventrem, cum vnguento infra scripto: ℥. vnguen-

ti Arippe ℥ iij. succi sambuci ℥ j. bulliant in si-mplici vase, ad consummationem succi; & fiat vnguen-tum. Interea lino ventrem quotidie metiebamur, num decrederet. Id quidem commendat Benedi-ctus Veronensis, medicus doctissimus, lib. 15. cap. 26. sic scribens: Commodum est, ventrem quatuor lino metiri: ut qua comprehendit alium notum in-ponere: postero die, videre si plenius corpus sit; an extenuetur: id enim quod tenuatur, remedia sentit. Nec alienum putant, potionem & urinam me-tiri: nam si plus humoris excernitur quam assu-mitur, ita demum secundæ valetudinis spes est. Sed quod ad vomitum attinet, cum eum per in-terualla ciere decocto raphani, secundum ali-quos, optimum sit: (idque a cibo, in quo aceto com-eda comederit) cum hæc subinde nauſeam habe-ret, id semel aut bis cōmode tentauimus. Sed po-ſtea cum ægre vomeret, a vomitu abstinuimus. Et licet clysmatis siccatibus quidam uti iubent, & a-quositates ducentibus, & simul flatus, qui semper adiungi solent, & sic decoquunt carthamum, po-lypodium, cum ruta, & calamentho, & addunt vini Cretici, & urina iuuenis aliquid, & clysteris modo iniiciunt: Verum cum hæc virgo clysteres non admitteret, & quia maxima pars humoris e-rat in membris, & vltioribus venis: ideo per alia ingenia dicta reliquam curationem maxime per-ficere studuimus. Ac primo ea, quæ urinas duce-rent, (quæ non minus commoda sunt ad menses aperiendos) non modo in cibo quotidie exhibui-mus, sed etiam ut medicamenta: qualia sunt azari decoctum, quod vnice prodest: præsertim si cina-momi aliquid adiungamus: & fortiter coquamus vna, & cardamomum & labiā herbam (quæ præcipue aperit menses) & iuniperi baccas, & ru-biæ radicem: huiusmodi sunt & dialacca, & dia-curcuma, & trochisci de eupatorio, de rhab. de ro-sis, quibus & subinde utebamiur. Sudores etiā pro-uocare instituimus, & quāuis hic multa laudetur, ut superius diximus, ut sunt stuphæ, membra se-peliri calefacta arena ex marino littore: imo & Paulus iubet tales aquas calidas naturalibus immer-gi, ceteris vero balneis abstinere vult. At si lauare placuerit, nitrum, salem sinapi, & similia quidam inspergi iubent: de quibus latius in scholio sequen-ti. At nos, cum ægre ℥ j. theriacæ veteris, cum pauco vino dedissem, atque egregie sudasset: & per interualla subinde cepisset diacurcuma per se, modo dialaccam ad ℥ ij. mane; ad aperiendos menses hoc sequens balneum vtile proposuimus: ℥. artemisia, nepeta, melissa, lauandula, foliorum lauri, sabina, matricaria, florum chamomilla, me-liloti ana m. vj. thymi m. j. rad. Valeriane, apii, pe-troselinii, ebuli, ana ℥ iij. florum sambuci, vel fo-liorum eiusdem m. ij. coquantur in aqua, pro bal-neo: idque mane, vmbilico tenus; & in eo ali-quantisper immoretur. Atque pars herbarum decoctarum ponatur in sacculo quadrato, quem habeat supra pectinem; & ab egressu balnei, sudore & madore calidis pannis deterſis, ven-ter inungatur inter vmbilicum & pectinem: & pars posterior, & renum regio, tum inguina ipsa, hoc va-

hoc unguento sequenti; ℞. muccaginis alibae ℥ ij. muccaginis seminis lini, fenugraci ana ℥ j. olei sabinae, irini, meliloti, liliorum alborum, chaurini, medullae crurium vituli, butyri recentis ana ℥ j. misce. Eodem tempore in exitu balnei, cum calidum lectum intrant, valet sumta ℥ j. diacurcuma, cum ℥ iij. uris cicerum rubrum. Ac sudore euocato, & cum his hoc balneo quædam vsæ sunt, (cum viri quoque) moles corporis, tum crura ipsa multo magis detumuerunt. At nostra puella eo non utens, sed supradictis mēsis apertis paulatim conualescere cœpit, adhibitis iis quoque, quæ & hepar & ventriculum roborarent. Memini quoque Christinam Hugonis, virginem Delphensem, in hydropem ascitē seu citrinum incidisse: (quæ simul leucophlegmatia seu anasarca laborare videbatur) & multa remedia tum medicorum tum empiricorum accepisse. Cui cum ℥ ss. diacarth. solutū, cum uiro, dedissem singulis sēptimanis, mēses fluxere, & corporis moles detumuit. Sed post aliquot menses malo redeunte, prolapsa ad Empiricos, eodem malo obiit.

S C H O L I A.

QUOD autem anasarca curetur victu & exsiccante & extenuante, apud omnes medicos celebriores in cōfesso est; & quod in hac specie, iuxta Galenum, etiam subinde conueniat venæ sectio. Et licet ex sanguine frigore nascatur, & frigiditatis ratione venæ sectione nō indigeat: tamen quoniam copię detractio naturam leuat, ut hæc minorem illam effectam facile susciperet: non alienum, sed rationi consentaneum est venæ sectione uti. De quibus plura vide apud Donatum & Alexandrum Trallian. Et sic venam secant, si vires & reliqua permiserint, ex interna cubiti vena; alioqui melius ex talo, si menses vel hæmorrhoides restrictæ causam mali dederint. Hæmorrhoides fluentes sæpe profuisse constat. Ita enim Iohanni Scriccio (ut aliquando ad me scripsit Henricus a Bra, medicus Documane reipublicæ) pharmacopolæ Campensi hydropico superuenerunt hæmorrhoides: quibus abunde profluentibus conualuit; an quod corpora cachexia laborantia sanguine aquoso abundant, quem per hæmorrhoidas reiciunt, per diapedesin. Habuit idē in cura sua rusticum, cui aquæ inter cutem species ea, quam anasarcam vocant, in scēdissimam scabiē totius corporis conuersa est, & sanatus est. Ceterum si ex mēsis vel hæmorrhoidibus suppressis hyposarca ortum duxerit, recte medici venam in talo secant. Interea nec vnica vice sanguinem detrahi, sed iterari sectionem volunt, pro virium ratione. Alioqui ubi vires non permiserint, sed imbecillæ sint: aut ex quauis alia causā, quam ex iam dictis, anasarca originem duxerit, sanguinis missio vitari debet, ut in sequenti alio exemplo postea docebimus. Sed copia pituitosi excrementi per vniuersum corpus redūdantis, purgātē medicamento vacuari debet. Sic etiam ubi opus fuerit facta venæ sectione, eadem purgatione utare; quæ iterum per vices tentanda erit, ex sententia eiusdem Alexandri Tralliani: a leuioribus in-

coando, & demū ad ea, quæ paulo valentius purgare queunt, transeundo; prius tamen humore ipsō præparato, ac viis referatis: per ea medicamentā, quæ extenuandi, incidendi ac meatus aperienti vim habent. Ea sunt syr. ex absinth. eupat. de byzantiis, oxymel simplex ac scillinum, seu syr. ex hyssopo, qui exhibeantur cum aliquo extenuantium ac aperientium medicamentorum decocto; ut de obstruct. iacitoris, & de eiusdem imbecillitate diximus: quibus sæpius adhibitis, purgans medicamentum tribuendum erit, ut ex hiera, agar. irochis. hab. inde pilulis confectis. A quibus & syr. ex pluribus infus. ros. cum aqua ros. propinandus: & postea valentius purgandū, multisq; vicibus, pro ut vsus postulabit: inde ad iiciendo, quæ iecori robur adferant, ut hab. myrobal. & chebu. aspr. sertim. & pastillos de rhab. de absinthio, de eupatorio: idq; per vices: & cum a purgationibus abstinēbūt, per intervalla & arom. ros. dialaccam. diarrhodon. diacurcuma ad ℥ j. cum vino albo, aut aqua absinthii, vel eius loco mithridat. aut theriacam. Atque ea præbenda, quæ vrinam cient: velut est dancus, seseli, cardamomum, rad. asparagi, aut trifolii decoctum, trissaginis, ve. ℥ j. rad. eringis sicca, vel sem. viciis, cum vini cyathis tribus, ex Actio. ut sequenti etiam exemplo clarius euadet: quibus & eodem auctore vomitus aliquando prodest. Etiam extrinsecus adhibebimus ea remedia, quæ vim immodicam exsiccandi habent, eodem Actio teste. Quapropter, præter sales theriacales, ad insensibilem transpirationem veteres sudores prouocabant; non solum exercitiis sub sole, & loco aprico factis (cum cautione tum conuenienti, ut ieiunio, & velato capite, ne repleatur attractione calidi,) sed & arena-rū vsu, imo in puluere volutationibus. Aliquando enim arena probe a sole ignita, aut pellibus similiter a sole feruē factis, egrum occultebant: capite tantum velato, & facie cum spongia assidue extersa, eodem Act. auctore. Sepeliebant itaq; robustos viros in litore maris, cum sol maxime ferueret, vsq; ad tolerantiam: postea in lectulo reclinabant: Fluiatiles etenim ac marinæ arenæ communem vim possident omnium lapidum: siquidem exsiccant carnem tumentem ab aqua inter cutem: agroto videlicet in eis excalescētis decubente, ex Gal. auctore. q. de simpl. med. facul. Nos in domum adferre possumus arenam, & calfactam inspergere. Aliqui in tritici aceruis (ut ante dictum est) sub sole calfactis ægros reclinarunt. Post hæc aqua marina, aut aluminosa, aut sulphurea lauentur ægri: etenim aliquib. qui ad eiusmodi lauacra affluuerunt, ex ipsa aqua, tum ad deterendum morbum, tum ad habitum valentorem reddendum, suffecerunt. In hunc vsu & sulphureis aquis vi: & luto sulphureo proderit: cuiusmodi apud Italos in Vatauino agro & Volaterrano reperitur. Prodest & ex marina aqua lotio, quæ nobis ex Oceanō vicino est: vel aliter falsa, quæ a nos sæpe commodissime vsi sumus. Lege Paulum libro primo, capite quinquagesimo secundo, Galen. prim. simpli. septim. qui potum & lotionem in his aquis laudat. Quidam iis infelicitè vsi sunt, quod sine electu

Quæ incidunt, extenuant, & meatus aperiant.

Vrinam cientia.

Vomitus. Quæ extrinsecus admodum uenda.

14

15

omnes etiam in sanabiles curare volebāt; vt & alii ligni decoctum tentarunt: idq; inutiliter, quoniā sine delectu; Optime etiam conuenit & his cataplasmatum ad motio: eorum præsertim, quæ resiccare simul & visceribus firmitatem addere possunt: quemadmodum stercus babulum resiccatū, non inepte cum posca, aut aceto mulso imponitur, in farcta sulphuris quarta parte: similiter & cochleæ crudæ, tritæ & impositæ: agglutinantur etenim, neq; discedunt, priusquam vniuersus humor discedit, iuxta Aetii. & de his vide Gal. 10. de simplic. medic. Alii cataplasmata apponunt. De quibus vide apud Rondele. & alios auctores, & Aetium. Sed corporum ratio habenda; in pueris, tum aliis qui mollem carnem habet, magis reprimentia conferunt, ex malicorio, rhu. culinario, malo cotoneo, myrti baccis, & vitis pampinis, per se, vel mixta cum aliis medicamentis resiccantibus. Verum vbi prædictis affectio nō cesserit, efficacius auxilium adhibendum, quod chirurgia præstat: fixuras, inquam, circa internum talum, infligere oportet, in loco quatuor digitorum spatio supra talum eminente: ea profunditate, qua quis in venæ sectione vtatur: ita vt per aliquot dies, per eandem humor frequens feratur: quemadmodum Celfo & Aetio visum est. Neque periculum vllum hic verendum est, vel in hydropis ascitæ pertusione: non enim coaceruatim humores illi euacuantur: & si quis velit excretionem plurima facta eam cohibere, nihil vetuerit in talibus ipsas fixuras linamentis obturare, ligamentisq; constringere: atq; vbi rursus prodire quid velimus, laxatis ligamentis, & ablatis linamentis, gestatoq; ac moto agro excretionem irritabimus, vt idem inquit Aetius. Postremo itaq; medicamentis vel chirurgia vlceri infligenda sunt; quæ cum nō sanescāt nisi sanato toto, fit vt multū aquositate emittant. Fiant supra talum (vt iam diximus) parte interna, per digitos quatuor. Quidam & supra cubiti iuncturas, & supra hypochondria & femora infligūt: atque in hunc vsum nonnulli flammulæ illius, quæ & clematis dicitur, acerrimæ herbæ germinibus vtuntur. Sed hæc omnia postea exemplis lucidiora fient.

OBSERVATIO XXXV.

De muliere, ex abundante & longo menses profluio in anasarcam prolapsa, & curata.

Mulier apud Delphes, cum longo tempore mensium profluio laborasset, in anasarcam valde difficilem prolapsa est. Omnibus modis hic studium adhibuimus, vt materiam aquosam ad reñes, per eā quæ vrinas mouent, deduceremus: atque nequaquam valde aperientibus, ne menses magis mouerentur. Hoc iulebo igitur primum vti simus: ℞. syr. de absinthio ℥ iij. aquæ absinthii (quia aperit & adstringit) aquæ graminis, betonica ana ℥ iij. cinnamomi selecti, spica nardi ana ℥ ss. (aperit & lstringit) depuretur, ac ori incensius reddatur; & fiat iuleb pro iij. dosibus. Modo etiam hoc decocto vel eius æmulo vti sumus: ℞. rad. asparagi, graminis, fœniculi, petros. apii ana ℥ j. agrimonia, cuscutha, foliorum sambuci, capill. Ven.

polytrichi. ceterach. ana m. j. iunci odorati, nardi, azari ana ℥ ij. seminis viticis ℥ ss. cicerum rub. ℥ j. fiat decoctio in aqua communi, & vino Rhenano, part. aqual. pro ℔ j. ss. addendo syr. de quinquera. de biz. anti ana ℥ j. ss. arom. cum ℥ iij. cinnamomi, & fiat apozema instar clareti. Postea etiam addendo rad. ebuli. Purgauimus cum ℥ j. ss. syr. ex infus. rosarum, pallid. addendo ℥ j. ss. rhab. pulueris. dissoluendo cum ℥ iij. decocti suprascripti. Exhibui quoque ℥ j. theriaca, cum vino generoso, pro sudore euocando; aliquando & diacurcuma, & post decocta aperientia & vrinā rursus cientia. Ita eandē purgavi pilul. de agarico; de rhab. ana ℥ ss. cum aqua absinthii: fiant pilula vi i. Dedi quoque vinum absinthites. Venam nullo modo huic secari iussi, cum debilis esset. Nam licet mensium profluuium, quod diu durauerat, cessasset, cum & in hydropem hanc inciderit: postea cum iis, quæ & vrinam prouocarent, & aquam educerent, curationem absolui. Quale hoc est: ℞. seminis hyperici ℥ j. detur cum vino: quod etiam ab Aetio probatur. Capiebat etiam conseru. absinthii, adiectis speciebus diarrhod. abb. Ad roborationem hepatis regione inuncta hoc vel simili vnguento: ℞. olei nardini, absinthii, amygdalarū amar. ana ℥ ss. spica veriusque, schœnanthi, asari ana ℥ j. cypri, santali, rubr. ana ℥ ss. seminis apii ℥ ss. vnguenti santalini ℥ j. cera modicum: fiat vnguentum. Crura cum valde inflata essent, lauāri mandauimus cum aqua marina, in qua decocta erant sambucus, ebulus, lauri ac iuniperi baccæ: modo fomento & balano descripto sub finem Observatione 24. huius libri. Quibus paulatim crura detumescere ceperunt. Et supradictis decoctionibus, tum purgationibus, aliisque roborationibus aliquando repetitis, sanitatem & hæc consequuta est.

S C H O L I A.

Dictum est prius, quod in hac, sicuti in aliis speciebus, causa ipsa auferenda sit. Et ideo si ex mēsis retentis sit hypofarca, facilius curatur, quam si ab iisdem aut hæmorrhoidibus nimium fluentibus contingat. Et ideo causæ obuiandum, per suum contrarium: & eadem auferenda, antequam ad coniunctam accedamus. Ita, vt priore exemplo ostendimus, si menses retenti, aut hæmorrhoides restrictæ in causa fuerint, sanguinem ex talo, si vires ferant dimittimus, mensesque tum hæmorrhoides euocamus: hæmorrhoides quidem panno aspero fricando, aut ficuum folio, vel cœpis: menses facilius medicamentis, quæ vna mensibus euocadis ac hypofarcæ satisfaciant. Verum si hypofarca ortum habeat ex nimio mensium profluio, aut ab hæmorrhoidibus nimium sanguinem fundentibus (ex hac enim causa hoc pathema subinde contingit, vt de causis dictum est) in hoc malo curando medicum solertem esse oportet. Nimio enim aut mensium aut hæmorrhoidū fluxu spiritus dissoluantur, in bectillūque redditur hepatis: quare & hæc passio, quæ inde nascitur, ac causa esse frigida dicitur. Et sic quæ si stendis mensib. aut hæmorrhoidibus cōueniunt, hypofarcæ obsūt: & rursus, quæ hypofarcæ cōferūt sanguinis

Diligentem medicum requirit curatio hypofarca ex nimio mēstruo rum aut hæmorrhoidū fluxu.

5. sanguinis fluxum promouent, augent, & huic nocent. Videndum igitur, utro ex affectu plus periculi impendeat. Vtemur tamē aperientibus, propter hydropem; mediocriter vero aut parum aperienti vi præditis, ob sanguinis fluxum. Interea si fluxus menstruum valde irritetur, vtemur remediis topicis constringentibus, ex capite proprio desumptis. Ita etsi hæmorrhoides magis ex aperientibus & aquam educantibus fluant, hoc vel simili modo reprimemus: ℞. olei myrtini ℥j. olei cydon. mastichini ana ℥ss. misce, inungantur hæmorrhoides mane & vespere. Aut sic: ℞. balauft. psidie, gallarum, rhos obsonior. baccar. myrti ana ℥j. hypocyss. oxyacantha ana ℥ss. coquantur in vino rubro & paucō aceto ad tertias: deinde chalybs multo vicibus in eo decocto ardens exstinguatur: fumus autem per anum recipiatur. Alia ex propriis locis postea dicemus. Ceterum quod ad hypofarcam attinet curādam, materia aquosa per aluum purganda est, & etiam per urinam cientia, ut iam satis ostensum est. Quantum ad medicamenta topica attinet, quæ exterius adhibentur, resiccantia, de quibus paulo ante diximus, quæ membris tumentibus exterius admoventur, etiam discutiendi vim habentia, qualia sunt sambucus, ebulus, vrtica, & elleborus albus, in aqua lixiuii modo decocta laudantur, expressa emplastri modo imposita; vel decocta si sæpe iis abluantur. Imo folia sambuci per se in tegula candente aspersa vino, imposita & alligata valent. Prodest & lixiuium ex cerri ac vitis cinere, in quo lauri ac iuniperi baccae efferbuerint, addito nitro. Cataplasmata quoque ab Aetio commendantur, ex fermento & sale aut pane, cum puluere hyssopi, aut fabacea farina, aqua marina, & melle cocta; pari absinthii modo adiecto, quale & hoc est: ℞. carie. & fermenti ana ℥j. farina hordeacea, fabar. loliacea, fœnugraci, & seminis lini ana m. ss. rad. & foliorum ebuli, sambuci, absinthii ana m. j. ss. hyssopi & origani ana ℥iij. sulphuris ℥v. misceantur, & cum posca aut oxymel. fiat cataplasma. Vide plures & varias formulas apud alios. Sed mirabilis est historia vetulæ mulieris ab hydrope curatæ, quam Cornelius ille Roterodamus medicus, qui ante me Romæ agebat apud Gissibertum Hortium, hospitalis Mariæ consolationis medicum, præceptorem nostrum, mihi cōmunicauit; nempe, quod vetula quedam hydropica, a medicis destituta, ab altera vetula edocta, capiebat ranas rubetas dictas, easque viuas in ollam nouam coniciebat, superinfuso oleo oliuarum, illisq; sic decoctis, eo oleo ventrem inungebat, deducendo manus versus inferiora, a stomacho incipiens versus inguina, idq; calide: & secundo die tumor descendit ad inferiora, ita ut mirum in modum intumuerint pedes. Sed cum prosequeretur inunctionem, tertio die penitus delituit tumor, cum nulla sensibili euacuatione. Laudat Gradus capite proprio, si in balneis arte paratis imponantur rana viua; mirabiliter ad se attrahere aquositatem, & refert rustici historiam, qui suo tempore, cum pestis grassaretur, anno 1450. ranas viuentes scissas, & non scissas, venenosas apostematibus applicabat; & ilico rana moriebantur, & apostemata foras educebantur. Et ita extracto veneno

8. omnes liberabantur, quod audiui, inquit Gradus a fide dignis, verum esse. Et ita non est mirum, si a quositate ad se attrahant, idque etiam in ascite. Sed topica non administranda, nisi præcesserint vniuersales purgationes. Ita ego frequentissime vtor, imprimis diacarthamo solutiuo in tabulis. Quo ipso memini me vsum fuisse in Cornelia, vidua Friderici Ottonis, quæ in foro Delphico habitabat, cuius adibus Mechlinia pro insigni erat, vetula, cui pedes ac cura ulcerata erant, quibus medebatur chirurgus: quæ, cum facilis solutionis esset, singulis septimanis si ℥ii. tantum acciperet, plusquam febriles multa aquosa per aluum reddebat. Aliis dare soleo ℥ss. vel ℥ij. pro vice, qui robustiores sunt. Sic matrona quedam nobilis hypofarca affecta, his remediis curata est: ℞. absinthii, agrimonie, centaurii, nasturtii hyemalis & aquatici ana m. j. sem. anisi, fœniculi, cumini, ana ℥ij. rad. fœniculi, petroselinula ana ℥vj. baccarum lauri 9. sem. geniste ℥j. soldanella m. ss. coquatur in duobus poculis vini Rhenensis, ad consumptionem tertiae partis, saccharo dulcoretur vel melle. ℞. succi ireos cochlear vnum, detur cum cyatho vno decoct. superscripta. Vespere eiusdem diei, cum succum ireos sumisset, capiebat ℥ij. confect. mithridatica. Aliquando sumebat ℥ss. vel paulo plus diacarthami solutiui in tabulis. Quibus & hæc conualluit. Sed si febris adest (quod rarius contingit in hypofarca, sed magis in ascite) aliter procedendum est ratione febris; ut Observatio sequens monstrabit.

OBSERVATIO XXXVI.

De anasarca, cui in principio febris admixta erat.

Franciscanus monachus, cui nomen Iohannes erat, de Sancta Trudone, annos 30 natus, Alcmariæ anno 1557. ex chronico morbo prius, & fluxu ventris, quasi in hectica febre incidit, cum putredine: nam & sumto cibo incalescebat. Cui & difficultas spirandi aderat, similiter & tussis. Tandem morbi diuturnitate, quæ hyeme præcedente durauerat, ad cachexiam deuenit, & ad hydropem hypofarcam, & lienis aliqualem duritiem: ita ut primo pedes intumescerent, ac œdematismo modo molliores ac laxiores fierent, & postea facies ac totum corpus tumidum euaderet. Ad hunc accitus sub finem Aprilis, cum pro deplorato quasi haberetur, infra scriptis tamen remediis, præter aliorum monachorum opinionem curatus est. Tertio autem die Aprilis, anno 1557. cum tussis ac febris illum adhuc vrgerent, ecligma etiam ad hecticam aliquo modo conueniens, omnium primo præscripti: ℞. syr. iuiubini ℥j. ss. syr. viol. (ob hecticam, ad maiorem humectationem, licet minus anasarca conueniret) ℥ss. specier. diatrach. frig. in tabul. sacchar. penid. ana ℥j. misce pro ecligmati. Hoc sæpius reiterato, tussis (quod mirum videbatur) fere in totum cessauit. Interea cum febris ad secundam fere speciem hecticæ progressa esset, cum putredine tamen, ideo pure refrigerantibus & humectantibus non opus erat, sed simul deopillantibus, quæ & putredini resisterent. Et quia

iam fluxus ventris, qui antea eidem aliquot diebus adhælerat, paulo ante nostrum accessum cessauerat pro febre, hepatisq; deoppilatione, & lienis duritie. sequens decoctum præscriptum est, quod & tussis non obesset, quæ adhuc exigua aderat: *℞. corticum radic. feniculi, cichorii, dentis leonis, petroselin. ireos ana ℥℥. herba hepatica, vngula caballina (ob tussim) agrimonia, endiu. cichorii (ob febre & deoppilationem) buglossa ana m.j. fumar. manip. j. semin. fenicul. ℥iij. fiat decoctio in ceruisia tenuiori, pro ℔ij. ℔. & zaccbar. candi. ad dulcedinem condiebatur: quo bis in die utebatur.* Hoc autem decocto, in se complectente indicationem curandi, mixtam magis, & tam ad febre quam hypofarcam, calor ille febrilis cessare cœpit, simul & tussis, ac sitis, quæ vehementior erat. Ideo postea ad materiam minorandam, & leuiorem materię expurgationem, ne forte iterum fluxus, quo ante nostrum accessum afficiebatur, rediret, decocto suprascripto adieci folliculorum senæ ℥j. ℔. ex quo omni mane sumebat ℥iij vel v. quotidie aluum moderate deponens: dolore quoque hypochondrium dextrum, propter duritiem & oppilationem aliqualem, nonnihil occupante, paulatim etiam euanescente. Et quamuis febris & calor, ac simul tussis, sedarentur, cachexia tamen magis accrescebat, & hydrops anasarca, ut crura indices magis magisque in maiorem molentiam tollerentur, & corpus ipsum, tum facies ac palpebræ, simul inflarentur. Quamobrem, post decoctionem vnam atque alteram magis extenuantem & digerentem, iterum decocto simul expurgante, cum foliis senæ, usus sum: & 14. Maii hanc confectioem subsequenter præscripsi: *℞. specierum dialacce, diacurcuma ana ℥j. specier. triasant. diarrhod. abb. trochis. derhab. ana ℥℔. dissolutis in aqua feniculi, adiecto zaccb. albiss. q.s. fiat confectio in tabulis, sumebat omni mane ℥j. ℔. postea ℥ij. deinde paulo plus.* 15. Maii, cum aluum non redderet, hoc balneo usi sumus: *℞. puluer. hiera picra simplicis ℥j. diacridii, pul. colocynth. ana gran. iij. melle ℥j. salis parum, fiat balneus; quo satis aluum deposuit.* 18. Maii, febre declinante, remanente tamen maxima inflatione pedum & femorum, ventris ac totius corporis, magis tamen pedum, etiam sitie eundem infestante, ex apozemate sumsi bis in die cyathum vnum: *℞. corticum, radicis cichorii, feniculi, petroselin. ana ℥℔. radicis ireos ℥ij. radicis liquir. ℥℔. agrimonia, capill. vener. marrub. cichor. endiu. ana manipul. j. scolopendr. absinthii Romani ana pilul. j. sum. feniculi, anisi ana ℥j. ℔. semin. 4. frigid. maior. ana ℥℔. vuarum passul. ab arill. mund. ℥j. fiat omnium decoctio in aqua communi pro ℔ij. ℔. col. adde syr. de cich. Nicolii, cum rhab. ℥ij. syr. de duabus rad. oxyzach. simpl. (ob calorem) ana ℥j. depuretur cum oui albumine, & aromat. cum puluer. specierum diarrhod. abb. diacur. dialacce ana ℥j. misce, fiat apozema.* 21. Maii hoc præscriptum est: *℞. radicis ireos, ebuli, petroselin, feniculi, apii, cichorii ana ℥℔. herba hepatica, capill. ven. scabios. scolopendria, ceterach. agrimonia, marrubii, cichorii, end. ana m.j. hyssopi, vngula caball. ana m. ℔. sem.*

feniculi, anisi ana ℥j. ℔. follicul. senæ ℥℔. epithymi, pe-lypodii querc. ar. ℥ij. medii corticis sambuci m. ℔. paromnium decoct. in y. parib. vini Rhen. & vna parte aque, ad ℔ij. ℔. colatura adde oxymel. compos. (nam calor, sitisque iam magna ex parte cessarunt) ℥j. ℔. zaccbar. candi ℥j. aromat. cum ℥ij. specierum dialacce & diacurcum. sumebat bis in die cyathum vnum; & quotidie habuit quatuor aut quinque secessus, valde aquosos, cū maxima aquæ euacuatione, & diminutione tumoris totius corporis. 24. Maii lienem & ventrem tumidū inungi mandauimus solo vnguento Agrippæ: & accipiebat rad. iridis contulæ & exsiccatae ℥℔. aliquando ℥j. herbe lenticulæ aquæ momentum; ligentur in nodulo, & pendeat nodulus in ceruisia sua, & exprimatur: ea ceruisia usus est ad tres septimanas, cum magna utilitate, cū & multi hoc solo consilio muliercularum curati dicebantur. Postea & crura inungi iussimus bis in die vnguento infra scripto: *℞. vnguenti Agrippæ ℥ij. vnguenti martiati ℥j. misce.* Et iterum reiterata fuit confectio in tabulis, prius descripta 14. Maii. Interea suborta est magna testium inflatio. Pro qua depellenda cataplasma præscriptum ex puluere corticum lignorum quercus (coriarii vulgo *Rim* appellant) florum chamomill. meliloti, rosar. rubear. decoctis in vino Pictagiensi, addita farina fabarum, ad modum cataplasmatitis: quo equidem illico cessauit testium inflatio ac scroti. 1. die Iunii rursus reiterata decoctio 21. Maii descripta, absque folliculis senæ & epithymo, cum per se quotidie semel aut bis aluum copiose deponeret. Utebamur & vnguentis suprascriptis: quibus tandem ac potionibus iam dictis assumtis, tumores ventris ac pedum cessare cœperunt; etiam balneis ac foribus sequentibus adhibitis: *℞. florum chamomille, meliloti, furfuris, artemisia, satureia, parietaria, cumini, fabarum contusarum, foliorum lauri ana m.j. fiat decoctio pro balneo in aqua marina, quæ facile ex mari adferebatur, miliaritantum vno ab vrbe Alcmariana patria nostra distâte, vnde & Alcmariam dictam quidam putant, quod nō procul a mari Oceano distet; vel quod sit prope alecum lacum. At Adrianus Iunius, medicus doctissimus, & noster familiaris, existimat, ab vniuersitate lacum sic dictam, quos lingua Cimbrica *Meeren* nuncupamus, ac si dicas *Al meer*: quam & ab Agillo quodam viro pio filio Radbodi conditam opinatur. Vide eius historiam Bataviz. Sed ad nostrum ægrum redeamus: Cum non posset ob œdematosa crura valde inflata, humiditatem balnei ferre; iubebam spongas in hoc decocto immergi, ac denuo exsiccari, & exsiccatas apponi: & imperabam fieri fortes ligationes cum fasciis circa crura: quibus tandem derumuer. Oedemata etenim in cruribus, quæ plurimum hydropicis, ac tabidis & cachexia laborantibus contingunt, & si symptoma eiusmodi superueniat, sæpe nulla ne propria cura indigent: nam si morbi præcedentes recte curentur, sola aliquando deligatione curari possunt, ut nos sæpe experti sumus, fascias prius aqua marina madidas, & demum exsic-*

8. exsiccatas, cruribus circumadiiciendo. Ita & hic deligationes, præter linimenta iam dicta, egregie profuere: similiter & abstinencia potus, quam eadem quoque inunxeramus. Interea licet crura plane detumescerent, 13. Maii ad roborationem hepatis, tum aliorum viscerum, hæ tabulæ denuo præscriptæ sunt: *℞. specierum dialacc. diacurcum. trochis. derhab. ana ℥ij. specierum diarrhod. abb. ℥j. dissolutis in aqua hyssopi & fœniculi, adiecto zacob. albiss. q. s. fiat confectio in tabul. secundum artem.* Reiteratisque decoctionibus superscriptis, ab hypofarca curatus est: magno cum nostro honore. Sed rursus nono die Iul. pes sinister cœpit inflari, ac valde in tumorem attolli: ideo hoc linimento denuo usi sumus: *℞. vnguenti Agrippæ ℥j. vnguenti alabast. vnguenti dialthææ ana ℥j. B. misce. 20.* Iulii die hoc ipsum reiteratum est. Verum cum videremus, quod facile denuo recidivam incurreret, eo quod pes sinister non detumesceret, ac venter, qui facile solubiliserat prius, nunc non nihil constringeretur; 21. Iulii hoc decoctum sequens præscriptum: *℞. rad. apii, petrosel. fœniculi, ireos an. ℥j. B. rad. ebuli, bryonia, inula, corticum rad. cappar. thamarisci ana ℥ij. rad. esule minoris, folliculorum senæ alexand. an. ℥j. B. agrimon. cassiæ, ceterach. scolopendria, centaurii minoris, end. absinthii Romani, cicbor. hepatica, ana m. j. semin. carthamiparum confusi, anisi, carui, ameos, folior. brassicæ marinæ seu soldanellæ an. ℥j. B. sem. fœniculi ℥ij. vuar. cum arill. ℥j. fiat omnium decoctio, secundum ordinem in cerevisia communi ad lb. j. B. stentque infusa per noctem supra herbas: deinde colatura addantur syr. de byzant. de cicbor. Nicolî cum rhab. ana ℥j. B. misce pro apozemate: de quo modo semel, modo bis sumebat in die: & quotidie, cum facilis esset solutionis, semper ad minus quatuor habuit secessus, cum maxima alleviatione. Postea cum crus sinistrum œdematosum neque fomentis neque linimentis in totum detumesceret, sola deligatione forti per fascias ad me descripta, probe & egregie hic præter omnium opinionem curatus fuit, cum crura in inestimabilem magnitudinem, tum venter inflata essent. Verum istis supradictis diligenter adhibitis, ac diætâ convenienti imperata, perfecte sanatus est: & deinde sanus existens absque vlllo morbo, in annum 1561. commode se habuit: sed tunc in hyeme rursus prolapsus in eandem hydropem, in vrbē Leodiensē tunc degens, quod & admiratione dignum est, a medicis præsentibus ibidem cum sanari non posset, forte frater eius, etiam eiusdem ordinis monachus, ad me Delphos venit (nam eo tempore & ipse Delphis agebam, nempe anno 1558. in principio enim illius anni eo veneram, honorario publico & stipendio condecoratus) & oravit, ut fratri ea remedia, quibus anno 1557. per me curatus fuerat, transcriberem: quæ & tunc penes me conservata erant. Transcripsi autem eadem: tamen hac cautione, ut medici diligenter observarent, num eadem hypofarca, ut prius, laboraret. Quæ quidem cum fideliter & transcripserim, & ad medicos misissem, iidem usi sunt, cum tanta felicitate (ut frater eiusdem postea narravit, hic in cœnobio Minoritarum Delphis agens)*

ut cum pro deplorato ab aliis medicis haberetur, denuo nostris remediis ac præsidii iam dictis, integræ sanitati restitutus fuerit.

S C H O L I A.

11. Quid medici Leodienses hunc monachum, cum secundo in hanc speciem hydropis incidisset, curare non potuerunt, in causâ fuisse partio, quod forte præter causam coniunctam, antecedentem & præcedentem, tum præsentem, minus animadverterint, nempe aliquâ causam calidiorē: unde videntes forte solum calefacientibus, & anasarcam tantum facientibus, febre illa relicta, minus ægrum sanauerint: potuit enim eandem hæcticam, ut prius, coniunctam habuisse. Quare denuo cum vterentur nostris remediis præscriptis, æger sanitati rursus restitutus est: quamvis nos præsentēs non fuimus. Verum cum nos hunc monachum præ manibus haberemus, mihi in mentem venit illa animadversio: nempe si cum aqua inter cutem febris quoque complicetur, quod admodum calidis auxiliis non semper sit utendum, neque in cibis, neque in potibus aut purgationibus, aut antidotis, ut recte admonet Alexander Trallianus. Nullum enim valde calefaciens ipsos iuvare potest: nam eiusmodi medicamenta sicut ipsorum augment, & febrem incendunt, & causas inflammantes magis adhuc exurunt, intenduntque malum. Quare aqua inter cutem ex acutis morbis profecta, non potest non inflammationes habere in ipsa perseverantes. Nihil enim adeo interuallorum expers est, ut febris: ac mirum, quod neque aqua inter cutem ipsis oboriri, calorem ægrorum exstinguat, neque febris omnem aquam inter cutem exhauriat: sed ab aqua simul & igne ambo contineantur, ut vndique dubia sit curatio, siue calefacere, siue refrigerare quippiam velis. Quippe necesse est, ut refrigerantia omnino aquam inter cutem adaugeant: calefacientia rursus febrem. Satiùs igitur est, huiusmodi mixtam curationē adhibere, & ei, quod magis vrget, quatenus licet, insistere. At ubi febres vehementiores apparent, tunc refrigerantibus potius utendum est, nec metuendum ea tunc exhibere. Quomodo enim finietur febris, nisi a contrariis? Immo neque aqua inter cutem cessauerit vnquam, nisi prius calor præter naturam desierit. Etenim is si diutius immoretur, aquam inter cutem parere potest. Omnis namque siue calida intemperies, siue frigida, si longius protrahat, superetque vires, deicit & nutritionem. Itaque cum ægri alimentum, quod distribuitur, non amplius in sanguinem transmutant, necesse est, ut in vaporosam quandam & pravam substantiam conuertatur. Porro quod aqua inter cutem etiam ex colliquatione nascatur, diuinissimus quoque Galen. confitetur, ut liquet 3. de causis sympt. Videmus autem colliquationē a calore potius, quā frigiditate oboriri. Quare omnia & quæ præcesserunt morbum, & quæ nunc adsunt, observanda putamus, ac ubi præsentē intemperie internouēris, ita ad curationē audacter accedas, non autem

Aqua inter cutem cū febre curatio.

12.

13.

Hydropici interdum refrigerandi.

14.

15.

16.

Historia Nicol.

vulgariam opinionem sequaris: nempe, aqua inter cutem laborantes, quouis modo calefaciendos esse. Neque enim hoc verum est. Nam ego plerosque (*inquit idem Alexander*) etiam a refrigerantibus medicamentis interdum adiutos conspexi; atque id evenire posse constat. Cum enim omnes particulae a caliditate præter naturam orta ad bonam temperiem reuertuntur, necesse est, ut etiam iecur probum sanguinem generet, nullatenus impeditum. Quemadmodum igitur dixi, temperandum est, ut speciem morbi inuestigemus, & causam, quæ aquam inter cutem efficit, accurate deprehendamus. Nā quæ Hippocraticæ artis methodi vocantur, hæ sunt: nempe, *Contraria contrariis semper esse remedia*. Propterea & nos subinde frigidis utebamur, mixtis cum aliis, ut *endiuvia, cichorea, hepatica, id est, lichene*. Neque metuentum est, ut iam diximus, ubi febres vehementiores apparuerint, refrigerantia tunc potius exhibere. Sed quia hic febris non erat vehemens, eadem coniunximus iis, quæ ad hydropem facerent. Nam ubi invicem copulantur morbi, eatenus habebunt communem curationis indicationem, quatenus copulabuntur; nobis scilicet ad id, quod magis vrget obuiantibus; non tamen alterius cura omnino posthabita, quemadmodum *Gal. com. aph. 15. 1. lib. (de eadem aqua inter cutem cum febre complicata verba faciens)* scriptum reliquit. Postquam igitur omnibus aqua inter cutem laborantibus victum unicuique aptum præscripseris, tunc ad ea accedito, *inquit idem Alexander*, quæ ipsos purgare possunt; non confestim & una vice, sed paulatim. Ex frigida quidem intemperie aqua inter cutem affectos calefacientibus, imo neque hos cibis nimium siccantibus, aut medicamentis acrioribus statim curare; sed per vices, & a mediocribus primum incoari oportet: deinde sic ad valentiora, & ea, quæ magis calefacere & extenuare possunt, progredi. Nam calefacientia nimium, si vniuersa ac una vice assumantur, totum potius habitum colliquant, quam abundantem humorem euacuant. Ita vero etiam, si refrigerantibus uti oportebit, a mediocribus incipiens, particulatim naturæ adicere conatur. Atque hoc pacto ad magis refrigerantia accedito. Postquam igitur ipsos purgaueris, ut conuenit, etiam ad balnea & motus mediocres ducito. Sed pituitosos & temperatura frigidiores, satius est naturali balneo committere: graciles autem, siccos, & febricitantes, potabilis & dulcis aquæ lauacro, vñctione, mutatione aeris, & omni hilaritate recreare oportet. Ita namque accidit, ut congruo vrentes victu, ad pristinam rursum temperiem reuertantur; ut etiam iecur non amplius aquam, sed benignum sanguinem, in posterum generare queat. Alioqui si hypotarca, ut plerumque fit, sit sine febre & caliditate aut intemperie calida, tunc victu & aere exsiccante utendū, ut prius docuimus. Refert *Nicolus Florentinus*, de quodam comedente tantum alaude (*Gatenaria hoc vix credente*) petroselino impletas, cum pane biscocto, & modico vini subtilis, & vesperi cum pane puro intuso in vino, & puluere sequenti asper-

so, ab hydropo curato. Pulvis talis erat: *℞. cinnam. elect. ʒ. lb. garioph. galang. maior. anis. amom. lacta abluta seu lota ana ʒ. lb. misce*. Nocte vero sine potu degibat. Et sic curatus fuit. Quod ad medicamenta attinet, duas rursus intentiones habet; vnam ad materiam coniunctam, alteram ad hepatis malam dispositionem, ne noua materia aggregetur. Prima quidem absoluitur medicamentis solutius, materia prius digesta, nempe *m. l. r. oxym. simpl. syr. de duabus rad. cum aqua hyss. p. vascut. absinth. fenic. per 5. dies*. Mox materiam euacuabimus, ut iam dictum est, sed iis, quæ hepati non noceant, cum & hepar in hypotarca debile sit, vitando colocynthidem & helleborum; iisq; etiam per intervalla adhibitis, quæ hepar roborent; minime contenti vnicæ euacuatione, cum materia rebellis sit. Primo dant *hieram simpl. ad ʒ. vj. per se, vsq; ad ʒ. j. vel ʒ. lb. cum ʒ. j. agar. trochif. vel cum pil. de rhab. de quarto in quartum diem*, quibus *Nicolus* se multos curasse fatetur, ex mente *Guilhelmi*, vel *elect. diaphæni*, aut *Indo*. Vide reliqua apud *Gatenariam*. Malam intemperiem amouemus cum *ʒ. ij. diacur. cum aqua absinth. eupat. & cusc. cum hepate lupi, & rhabarb.* In calida utimur *syr. de byzant. de cichor. confect. diarrhod. abb. vel si timeamus caliditatem, trochiscis de rhab. adiungimus diarrhod. abb. ut Grad. f. cu in principe sfortia, qui ab hac agitudine curatus fuit*. Causa enim ipsa semper auferenda: ut si a frigiditate hepatis naturali fiat, reducenda ad temperamentum, calidis electuariis & vino generoso. Si ab obstructione, hepat aperiendum, ut *cap. de obstruct. eiusdem*. Si ab apostemate, curetur apostema, ut dictum est: Ita & de oppilatione splenis, & scirrho; si inde oritur, curandum, ut postea *cap. proprio* dicemus. Ita quoque, ut prius dictum est, si ex potu aquæ frigida, vel eiusdem balneo fiat, utatur cibus calidis actu & potentia, vino veteri aromatico, aliisque calidis iam dictis. Si ex fluxu ventris, recurratur ad caput *De debilitate hepatis*, ob laxitatem suæ substantiæ, & ad caput *D. fluxu hepatico*. Nunc ad propriam curationem alitis veniamus.

OBSERVATIO XXXVII.

De Ascite.

Ascite quidam laborabat istis diebus, cuius venter tumidus erat, & adeo eleuatus, ut rumpi videretur: quem cum manu percuterem, aqua ut in vtre collecta sonabat. Sed cum virtute satis constaret, & recte ad oblata adhuc se haberet, neque febrem pateretur, & ex frigida causa ortum haberet, calidiorem victus rationem huic, & egregie exsiccantem, præscripsi; & humorem serolum statim euacuare decreui, cum ab euacuatione initium curationis instituatur; venæ sectione omissa. Quamobrem omnium primo hunc syrupum propinaui: *℞. syrup. de quinque radic. de eupator. capill. vener. ana ʒ. ij. aqua decoct. absinth. agrimonia. florum sambuci ʒ. j. vel aqua earundem herbarum, si habeantur, ana ʒ. iij. misce. depuret. adiect. cinnamom. select. ʒ. ij. suauiore sapore & odore reddatur; sumat 4. diebus in diluculo*. Deinde *℞. diacartham. ʒ. ij. diaphænici, catholici ana ʒ. ij. syr. de eupat. ʒ. j. cum decocto sambuci, absinthii ʒ. ij. fiat potio, sumenda in di-*

17.

18.

19.

in diluculo. Deinde consului, ut hoc vel simile apozema caperet: ℞. rad. ireos, ebuli, apii, petros. sax. miculi, asparagi, brusii ana ℥j. agrimonia, filipendula, pentaphylli, capill. ven. pimpinella vera, vulgo beuer-nella dicta, ceterach. cassia, absinthii ana m. j. azari, cassia lignea ana ℥ij. pulu. cicad. ℥ij. β. (has Fontanonus maxime laudat) sem. apii, fenic. dauci, petrosel. ana ℥j. β. sem. genista ℥j. cicerum rubr. m. β. florum sambuci & genista ana p. j. soldanella m. β. polypodii quercini, medulla caribami, vel seminis eius contusi ana ℥vj. rhab. selecti ℥j. β. spica, schœnanthi ana β. coquantur in duabus partibus aquæ communis, & una parte vini Rbenensis, pro ℥j. β. colatura addendo syr. de eupatorio, de rad. ana ℥ij. arom. cum ℥ij. β. cinnamomi; & utatur quatuor diebus mane. Purgavi hunc cum pilulis sequentibus: ℞. pilul. de agar. ℥ij. β. pilul. de mezereo β. cum aqua agrimonia; fiant pilula v. dentur in diluculo. Postridie vero: ℞. theriaca veteris, specierum diacurcum. ana ℥β. conserua capill. ven. ℥j. β. Deinde omni mane sumebat ℥ij. vel ℥ij. diacurcum in tabulis. Postea interpositis diebus, etiam illud, quod sequitur: ℞. succi ireos ℥j. mellis rosac. colati ℥j. cinnamomi β. bulliant; & desuperetur cum ℥ij. aqua florum sambuci, vel sambuci decocti, detur unica vice, modo tantum sumendo ℥β. succi ireos. Postea ventrem inunximus unguento Agrippæ, martiato, & dialthææ simul mixtis: imposito etiam emplastro ex stercore bubulo, cum oleo irino & unguento Agrippæ. Crura vero tumida lauari iussimus lixiuo ex cinere vitis, in quo folia ebuli & sambuci decocta erant. Vomitus non prouocauimus: qui licet in principio aliquando conueniat, tamen quia malum aliquando progressum, eo minus uti licet. Sed eius loco pilulis superscriptis ut vteretur utile duximus: subinde & his, vel similibus: ℞. pilul. de rhab. ℥ij. aggreg. ℥j. β. elaterii gran. ij. cum succo rad. ireos, fiant pilula viij. His quoque tabulis: ℞. specierum diarrhod. abb. dialacca, ros. nouella, trochisc. de rhabar. an. ℥β. zacch. albiss. in aqua eupat. & cichorii dissoluti, fiat electuarium in tabulis, dosis ℥ij. vel ℥ij. Hoc cataplasma quoque, vel simile, ut ventri apponeretur proposuimus: ℞. foliorum sambuci m. j. florum chamomill. m. j. β. rad. ebuli ℥j. β. rad. bryonia, ireos an. ℥j. baccarum lauri ℥vj. seminis anisi, cumini ana ℥i. coquantur in aqua & vino q. s. ad mollicudinem, addendo rebus tuis farina lupinor. ℥ij. sulphuris ℥i. stercoris vaccini vel caprii ℥vj. unguenti Agrippæ ℥β. mellis q. s. fiat cataplasma. Atque his vel similibus sæpius cum summa salute plurimorum ægrotum vti sumus; quibus & sanitatem consequuti sunt, si statim in principio ea recte adhiberentur.

SCHOLIA.

4. A Scitis affectum licet periculosum diximus, curatio huius tamen tentanda, nam non pauci ex ea euasere, multi vero tamē succubuerunt. Quod ad propriam eius curationem attinet, si ex frigida sola iocinoris consistat, ut ex frigida, vel frigidi medicamenti usu nimio, vel ex aliqua parte affecta, cui iecur consentiat, tunc cura tentanda est: atque imprimis ad materiam proximam

respicere debemus, mox ad causas remotas, id est, affectus, quibus vel primario, vel secundo afficitur. Quod ad materiam attinet, intentiones curatiuæ eadem sunt, scilicet vacuatio. Sed alteratio hic expectanda non est. Nam serosus ille humor materia sanguinis esse nequit: ideo ut toto genere præter naturam vacuandus. Sed vacuandi modi non iidem: nec enim hic sanguis mitti debet: sed inter vacuationes maxime conuenit purgatio, ob purgandi excrementi vicinitatem. Vt natiua etiam conueniunt, quod facile aliquid aquosi humoris per renes traducitur, cum tamen in eos, tum in cauiam venam reludat. Præterea faciunt ad distributionem in iecur; ex qua impedita dicebamus, maxima ea parte colligi in ventre aquas. Sudores minus conueniunt: quoniam non est in extimam corporis superficiem humor distributus. Sat ergo erit, exercitiis moderatis uti, ad excitandum calorem: & reliqua victus ratio omnis similis sit hypofarcæ. Balnea quoque & potiones sulphureæ minus his conueniunt: tum quia his vires imbecillæ resoluuntur maxime, tum quia sudoribus non multum iuuantur. Iuuantur igitur purgatione, vrinis, cataplasmatibus, incisione. Ac primum de purgatione agendum. Hæc autem per portiones fit, aut medicamentis, quæ ad ventrem applicantur, aut clysmatis. Cum autem hæc multiplicia sint, ea afferam, quæ hodie in usu sunt, & experta. Materia vero eorum, quæ aquosos humores ducunt, hæc est: Inprimis squamula æris, vel as. vstum, quo Iacchinus se primum, quod sciat, nostra ætate vsum refert: cum tamen Baesdorpius antea eo vsum sit in Imperatore Carolo V. hydropico, cum alii medici desperarent; qui se vnum remedium habere profitebatur Carolo Imperatori, sed eo se potius malle uti in rustico, quam in Imperatore. Cui Imperator respondit, (ut nos a fide dignis accepimus.) Cogita te rusticum præmanibus habere, modo Imperatorem ita curaueris. Atque eo utens illum ipsum sanauit. Rhazes quoque eo vsum est, ut refert Gradus. Addit Iacchinus, Vtrumque optime debet conteri, atque in catapotia confirmari ex melle. Dosis a ℥i. ad drachmam vnam cum dimidia. Admisce garyophyllum vel cinnamomum. Aliud vstratum remedium est, cortex radices sambuci in succum reductus. Dosis est ad vncias duas, & tantundem vini odorati. Benedictus Veronensis; radices sambuci corticis succum ad quaternas drachmas quosdam dedisse scribit. Alii radices ebuli succum acetabuli mensura quotidie nouem diebus dederunt, decrescente luna; atque ita sanantur hydropicos: vel vnciam vnam; egregie enim aquam trahit. Vt etiam facit cortex medius sambuci. Nicolaus vna vice dat ℥vj. decoct. sambuci corticis mediani, idem dat ex succo sambuci a ℥ij. ad ℥ij. & succi ebuli a ℥ij. ad ℥i. Quidam succum ex sambuci cortice medio cum oxymelite propinarunt. Sed si sursum versus (ut quidam autumant) e ligno abradunt, vomitiones concitari; si deorsum versus, per inferna deduci tradunt. Aliud est iridis succus, ex radice express. datur cum zaccharo, quod faucibus asperitatem facit: dosim

Purgatio.

5. Urinam cientia.

Sudores curatio conueniant in asete.

Quibus asenica magis iuuant.

6. Squamula æris aut as. vstum.

Nota.

7. Radices ebuli succum.

Succus iridis.

Idem Iacchinus circiter $\mathfrak{z}\text{ij}$. vel $\mathfrak{z}\text{ij}$. esse vult. Vicia vna saepe satis fuit in robustis, *vt Observat. sequenti constabit.* Alii $\mathfrak{z}\text{ij}$. dant, sed purum, nullam fere vim habet si decoquatur. Purus esse debet, abiecto sedimento: ex zacchar. vel tyrop. violato, aut ouo sorbili delicatius sumitur; & præstâtissimum illud remedium habetur. Aliud vsitatum est *soldanella* siue *saldanella*, brassicam marinam dicunt: frequens est in Zelandia, & copiose ad nos fertur: nos frequenter in decoctis $\mathfrak{m}\mathfrak{j}$. vel $\mathfrak{m}\mathfrak{j}$. \mathfrak{ss} . ponimus. Hanc male quidam putant esse eam herbam, inquit Iacchinus, quæ appellatur *Cachile* ab Arabibus: illa enim alia ab marina brassica, & similis vineæ: & inuenitur æstate in nostro littore: qua in hunc vsu hodie aliqui vtuntur. Soldanellæ succus vel potus, vel etiam folia siccata, & in puluerem redacta, dantur. Scio quosdam, inquit Iacchinus, & aqua exstillata vsos: ergo vero nō sum vsus. Hollerius tamen refert *lib. 1. cap. 37. de hydrop.* *Aqua exstillata e purpureis floribus ireos data* $\mathfrak{z}\text{vi}$. vel $\mathfrak{z}\text{ij}$. quantitate, cum $\mathfrak{d}\mathfrak{i}$. elect. triasenta. & gran. viij. cinnamomi, efficacissime aquam hydropicorum ducit. Dosis succi soldanell. secundum Iacchinum, sunt $\mathfrak{z}\text{ij}$. ad \mathfrak{vi} . pulueris $\mathfrak{z}\text{ij}$. mane, cum exiguo vino vel mulsæ. Donatus huius soldanellæ vsu nō facile admittit, cum mirifice vetriculo aduersetur: & ipse pluries experiētia vidit noxiam inferre, potius quam auxilium aliquod hydropicis præstare, imo quosdam citius periisse obseruauit. Sed quia hic frequens, nos tamen commode hac herba vsi sumus. Præceptor meus Benedictus Fauentinus, in hunc modum dabat: \mathcal{R} . absinthii sicci, eupatorii sicci, soldanella sicca ana $\mathfrak{z}\text{ij}$. spica $\mathfrak{d}\mathfrak{i}$. fiat puluis, detur $\mathfrak{z}\text{ij}$. mane, cum aqua radices sambuci. Elideus præceptor meus, etiam Bononiæ dabat, modo cum rhabarb. modo per se, cum aqua agrimonie. Magna cum experientia in nolo comio vitæ utebatur, soldanella cum rhabarb. & passulæ; & mulieres citius, quam viri curabantur; crede propter symbolum, quia frigidiores sunt, & calidiora medicamenta melius ferre possunt. Aliud est, *Laureola* folia siccata in umbra, & mox aceto affusa, per diem vnum vel duos, & rursus siccata, & in puluerem redacta; ac conformatis melle vel succo cotoneorum pilulis, due sumantur ad ciceris magnitudinem. Aliud *esula* radix est, cuius cortex siccatus teritur: & vrimur scrupulo vno ipsius, addendo mastichen & rhabarb. cum succo rosar. fac pilulas pro vna dosi. Alia vero, quorum scriptores meminere, hodie (inquit Iacchinus) in vsu non sunt: & profecto, si his, quæ diximus, non satis vacuatur, inanis erit cura. At cucumer agrestis in frequenti vsu fuit & Græcis & Arabibus: quo sic vtendum: \mathcal{R} . corticis rad. cucumeris agrestis $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$. infusum inisperge mulsæ. Sine molestia (vt Hollerius quoque refert) pituitam ducit, nec stomachum lædit. Abominabilis licet sit vrinae potus, tamen maxime probatur medicis. Tolerabilior, si ex puero impube distilletur cum melle, & aliis diureticis. Quod ad clysteres attinet, etiam acres adhibendi, nisi venter sua sponte humescat. Tunc enim exsiccare ipsum magis cōuenit, vt inquit Paulus. Clysteres fiant ex decoct. mercur. polyp. flor. cham. ebuli fol. &

rad. & caricis. cuius \mathcal{R} . \mathfrak{ss} . adde mellis despumati $\mathfrak{z}\text{ij}$. olei anet. rutac. cham. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. hier. pic. $\mathfrak{z}\text{ij}$. benedict. laxa. $\mathfrak{z}\text{ij}$. salis communis $\mathfrak{z}\text{ij}$. vel \mathcal{R} . mercur. beta. pariet. ana $\mathfrak{m}\mathfrak{j}$. brass. marin. vel thymel. vel chamem. $\mathfrak{m}\mathfrak{j}$. \mathfrak{ss} . vel senna orient. $\mathfrak{z}\text{ij}$. flor. hyperic. genist. an. $\mathfrak{p}\mathfrak{j}$. anisi. apii. petros. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$. carcam. $\mathfrak{z}\text{ij}$. fiat decoctio, & in \mathfrak{ss} . \mathfrak{ss} . colatura dissol. benedicta $\mathfrak{z}\text{ij}$. Alii componunt ex rad. ireos, cucumeris syluestris, ex cyclamine, vel succo, cum vrina hominis, vel cum sero caprarum; & sine oleo iniungunt, vt Rondeletius facit. De vrinacis diximus. Aliqui dant polium, vel samsuchum in vino decoctum, vel iunci odorati, nardi, asari ex vino, vermes terrestres, vt Aet. vel erinaceum terrestrem excoriatum, eiusque carnis in sole exsiccatæ $\mathfrak{z}\text{ij}$. ex vino tritam præbent. Paulus exhibet cochlear vnum stercoris bubuli vsi, ex vino potum quotidie; strenue auxiliatur, quibus adlice ea, quæ de anasarca diximus. Vrimur quoque solutius exterius, si æger debilis sit, aut valde lædatur: sic & si puer sit, & medicamenta recuset. Hæc facile est, componere ex materia vehementer ducentium aquas. Sed elaterium, & cyclamini rad. & lathyrus, inter hæc primas partes tenent, cum grano Cnidio, & vnguentum de arthanita maius: quale hoc est: \mathcal{R} . succi thymelææ, cucumer. agrest. & brassica marina ana $\mathfrak{z}\text{ij}$. succi aristolochia, $\mathfrak{z}\text{ij}$. spicanardi, sene, ana $\mathfrak{z}\text{ij}$. excipiantur farina orobi vel lupinorum, & applicentur supra vmbilici regionem. Vermes quoque necant, etiam vrinas mouent. Alii eadem supra vesicam, ex oleo rutaceo, & vrina pueri, ac succo pedis columbini parant. Ea enim, quæ vrinas mouent, aliquid faciunt: ideo his vtendum est, sed non vehementer instandum, vt in hypofarca, ob dictas causas. Vnde & Rondeletius, Mouent, inquit, vrinas. Quate illud decet fieri, cum supradicta remedia vrinam prouocantia dabantur. Rhazes tamen minus probat illa laxantia emplastra, tum maiorem inflammationem inducant in membris, quam medicina debite correctæ, & in debita dosi administratæ. Verum ubi febris abest, & sit materia frigida, iis vti possemus, vt docti faciunt. Postea ad cataplasmata, quæ emplastra vocant, descendimus: ac primum ex cochleis constat, antiquum sane. Oportet prius per aliquot dies humore excrementitio repurgatas sumere, & cum testis contundere, & leuigare: postea inspergere florem asii lapidis, calamentis sicci, & ruta sicca aliquid: sinere donec sponte decidant, idque toti ventri adhibendum. Eligantur marinæ cochleæ: sin minus, quæ in montibus pascuntur genista herba. Aliud, ex stercorib. caprino, bubulo, columbino: siccetur prius modice, neq. admodum vetusta sint: postea componatur emplastrum cum sapa, addendo sulphur viuum, cyminum, lauri folia. Alii addunt spicanardi, schœnant. vel asar. vel valer. exiguum. Vltimo vero ad chirurgiam, si prædictis non curentur, deueniunt; vel ad cauteria vel incisiones: de quibus postea. Nunc aliud exemplum ascitis adferamus.

OBSERVATIO XXXVIII.

De ascitico male tractato ab empiricis, qui postea aptis remediis curari non potuit.

Petrus Candidus dictus, calcearius, ex hydrope ascite cum diu decubisset, vir crassus &

8.
Saldanella.

7.

Laureola.
10.

Esularadix.

11.
Clyster.12.
Vrinacis.Solutius exte-
rius applican-
da.

13.

14.
Topica & cataplasmata.

15.

obesus, magnus, ut si quis alius, & robustus, Delphis variis usus est remediis empiricorum; cui tandem ab empirico famoso (cui Egberto nomen erat) qui illi sanitatem pollicebatur, exhibita fuisse colocynthis & præcipitatum, ita ut indies ad maiorem desperationem suæ salutis deveniret, hepate ab eiusmodi medicamentis sine correctoriis, si ve quæ viscera roborare debeant, plurimum oblatum, indies peius habere cœpit, ita ut malum in hepate confirmatum fuerit. Vnde postea organo sanguificationis magis affecto, supra modum aquosa materia adacta, venter non solum in molem excrevit, ut in homine crasso & corpulento distumpi videretur; sed ut etiam ad crura descenderet, & tandem in scrotum quoque aqua prolapsa, in herniam aquosam inciderit, adeo ingentem, ut talem vix in vita viderim. Eo autem tempore utebatur opera Cornelii medici illius senioris Delphenis. Verum cum indies bursæ testium na excreveret, & malum augeretur, & medicus dictus illum pro deplorato reliquisset, qui eundem ad aliquot tempus tractasset, facta est consultatio, & accitus est Cornelius Ericius collega meus, ac Hugo Nicuenius medicus Haganus, atque me in tertium medicum amici adoptarunt. Proposita autem fuit incisio ipsius scroti seu bursæ testium, ut aqua hoc modo euacuaretur: inter reliqua multæ ac varix rationes adductæ sunt, ut & illud quod Iohannes Langius scribit lib. secundo epistolarum, epistola 32. *Præfens illud ex salis* (inquit) *subsidio, Hippocratis & Leonidis, ac Archigenis in hydropre remedum, animo memori reconde: qui supra internum cruris edemate turgentis malleolum, quatuor digitorum spatium, scalpello, paulo quam in vena sectione altius, & in orbem cucurbitula adacto, ex vulnuscule sale confregit, ne sanguis vel ipsa concreverent, inde iugis scaturigine aqua guttatim emanante, totam hydropre aquam inter cutem in alio sub peritonæo, vel in testiculorum oscheo reconditam, sensim educabant. Idque verum esse, mea experientia comperi.* Idem & Aetius Sermon. 10. capit. 30. & de sale libr. 6. de phlebotomia reiteranda. Alii autem in ascite, ubi aqua copiose colligitur in peritonæo, punctura utuntur, per quam aqua euacuatur, quæ per aliam regionem perfecte non potest euacuari. Nec adeo periculosa est ventris apertio (ut censebat Rondeletius) modo recte fiat. Nam videmus eos quibus vulneratus est venter, evadere; nisi vulnus penetret gracilia intestina. Præterea utilem constat esse ex eventum. Quibus enim casu per umbilicum aqua erumpit, hi sunt curati, ut alias & nos quoque, ante exemplis docuimus. Quod si quis obiiciat, hoc remedio tentato multos interisse: huic respondebimus, id contigisse, vel quia facultas hepatis in illis erat emortua, ut postea sanguinem bonum gignere non potuerit: aut quia remanserit scirrhus hepatis, aut lienis; vel quia natus erat morbus ex pulmonis ulcere (phthisici propemodum omnes in hydropem incidunt) vel quia in thorace fuerat etiam collecta aqua, quæ vacuata non est; quod ex rursi deprehendi potest. Hos desperatos esse dicit Hippocrates: sed sic intelligendum est, nisi utraque

pars pectoris aperiatur. In deploratis, qui ad extremam virium imbecillitatem deveniunt, qui scirrhum in hepate confirmatum, aut lienem, aut vlcus in pulmonibus habent, ac denique in senio confectis, non debemus hoc remedium experiri. Dum venter pungitur, non est spectandum ex qua parte, dextrane, an sinistra, malum cœperit, ut quidam religiosius observant. Nam nihil refert, utram partem secus; cum ex utraque possit commode vacuari aqua. Verum hic cum maxima pars aquæ in scrotum vel bursam testium confluerat, potius in ea incisio facienda erat, ut docet Arculanus capit. proprio de hydropre. Verum cum vires in hoc ægro debiles essent, ac malum iam confirmatum foret, tandem conclusum est, ut non fieret incisio, sed potius euacuatio humoris aquosi per convenientia medicamenta, ut succum ireos, & similia, præparatoriis & attenuantibus remediis etiam præcedentibus, & euacuatione peracta, decretum est, ut ad localia medicamenta perveniremus. Sed, quod pene omiseram, tres dies antequam fieret consultatio, prius vocatus fueram, cum Guiljelmo de Dalen chirurgo lithotomo: ac euacuatione usi ex decocto attenuantium, adiectis foliis senæ, & agarico, pro scroti inflatione fomenta adhibuimus ex decocto flor. chamomill. meliloti, absinthii, rorismarini, anethi, flor. ros. corticum quercus, & similibus, & euacuatione ex prædictis sub sella facta, paulo melius habere visus est, antequam alii medici acciti essent. Idem affligebatur insigni dolore in ano, ex hæmorrhoidibus & apostemate: pro quo symptomate mitigando, & dolorem sedando, una cum chirurgo hæc infra scripta adhibuimus: ℞. olei amygd. dulc. pinguedinis gallinæ, butyri recentis ana. ℥ss. misce. quo loco dolens inungebatur. Mox & hoc fotu utebamur: ℞. caput veruecinum integrum, una cum ossibus & cerebello, florum chamomill. meliloti, folior. rapsi barbati, foliorum malvæ, viol. anan. j. radic. althææ ℥ss. seminis malvæ, althææ ana ℥j. ℥ss. semin. fenugrec. lini ana ℥ij. coquantur omnia in aqua communi q.s. ad perfectam mollitudinem; colatura fortiter expressa, calide locus dolens fovebatur; & hæmorrhoides apertæ sunt; & apostema quod erat in ano, ruptum est, multo pure exeunte, adeo ut dolor ibidem omnis cessauerit; intus etiam assumpto ad deterfionem hordei communis decocto cum melle. Repurgato deinde apostemate bene habuit. Scrotum tamen inflatum permansit. Vnde alii medici prædicti vocati, postposita incisione, ob causas dictas, in homine quinquagenario, iam diu hydropico existente, Hugone medico tunc discedente, infra scripta una cum Cornelio Ericio, collega meo, anno 1562. 22. Nouembris præscripta sunt: ℞. florum chamomill. meliloti ana man. ij. ℥ss. summitatum absinthii communis, florum rorismarini, summitatum anethi ana manip. j. flor. ros. p. j. radic. althææ ℥ij. (ob duritiem quæ aderat) sem. althææ ℥ij. coquantur omnia in vino Picavienfi, ad mollitudinem, & expresso humore, leviter omnia hæc contendantur; cui addantur stercoris bubuli manip. ij. corticum quercus,

subtiliter contus. & cribro exceptorum man. j. farina fœ-
nugraci, semin. lini an. m. j. B. farina fabar. m. B. pul. cu-
mini preparati & cribrati m. j. omnia misceantur, pau-
co liquore decocti adiecto, & oleo anethini, ad cataplas-
matis consistentiam, profuit egregie. Interim 23. No-
uembr. infra scriptum apozema fieri mandavi-
mus: ℞. quinque rad. aperitiuarum an. ℥. B. ceterach,
capill. vener. agrimonie, cuscute an. man. B. semin. ge-
nista ℥. B. semin. fœniculi, anisi ana ℥. j. semin. petrosel.
carui, amios ana ℥. B. corticum rad. thamarisci, glycyrr.
ana ℥. iij. vuar. pass. enucleat. ℥. j. folior. senæ ℥. vj. aga-
rici optimi levis & fœminini ℥. ij. zinzib. ℥. j. soldanella
℥. B. fiat omnium decoctio in aqua communi, & vino
Rhenensi q. s. stent infusa per noctem. mane huius for-
tiss. express. accipe ℥. ix. arom. cum pul. specier. diar-
rhod. abb. specier. diacur. dialacce, ana ℥. j. addendo syr.
de eupatorio ℥. j. B. syrup. de byzantiis ℥. j. fiat apozema
pro 3. dosibus. Quibus optime aliis soluebatur;
cum detumefactione vetricis & testiculorum. Vte-
batur autem victu extenuante, exsiccante, & ab-
stinebat a potu, tantummodo parum vini Rhe-
nensis sumebat, cum satis diues esset, licet calcea-
rius. Postea capiebat ℥. j. B. vel ij. ex hac confectio-
ne: ℞. specier. diarrhod. abb. (nam vrina tineta erat,
& vix videbatur libera a febre) ℥. j. diacurcum ℥. j.
dialacce ℥. B. dissol. in aqua fœniculi, adiecto zaccar.
optimo q. s. fiat confectio in tabulis secundum artem. 26.
Nouembr. hæc præscripta sunt: ℞. radic. quinque
aperit. rad. ireos an. ℥. B. capill. vener. ceterach, agrimo-
nie, hyssopi, cuscute ana m. B. semin. anisi, fœnic. an. ℥. iij.
semin. genista ℥. B. vuar. passul. enucl. ℥. j. folior. senæ ℥.
B. agar. levis & optimi ℥. j. soldanella ℥. ij. folior. meze-
reonis ℥. B. zinzib. ℥. B. schœnanthi ℥. B. fiat omnium
decoct. in vino Rhenensi, & aqua petrosel. fœniculi part.
aqualibus; & coquantur in balneo maris, & stent infu-
sa supra herbas per noctem, pro ℥. j. fortiss. express. adde
syrup. de eupat. ℥. ij. syrup. de byzantiis, sine aceto (quia
parum tussiebat) ℥. j. misce, capiat omni die modo se-
mel, modo bis: & egregie operabatur. 28. Noiembr.
cum cyatho vno decoct. supra scriptæ sumebat
succo ireos ℥. B. pul. soldanella ℥. j. in diluculo: & ha-
buit sex sedes admodum aquosas; ventre tum re-
stibus detumescens: Facta tamen pro bursa
testium euaporatione, ex floribus chamomilla, meli-
lori, corticum querc. adiectis aliis iam supradictis, & em-
plastro seu cataplasmate precedente admoto. 29. No-
uembr. hac sola inunctione contenti fuimus; &
hernia illa aquosa, bis exhibitio succo ireos egre-
gie curata est absque incisione: ℞. olei anethini,
chamel. melilori an. ℥. B. misce. postea ad ascitem
curandam & aquam depellendam, 2. die Decem-
bris hæc præscripta sunt: ℞. rad. quinque aperit. an.
℥. B. radic. ireos ℥. ij. ceterach, capill. vener. hyssopi ana
man. j. semin. genista, anisi, fœniculi ana ℥. j. semin. pe-
trosel. ℥. B. cort. rad. thamarisci ℥. j. glycyrr. ℥. iij. passul.
enucleat. ℥. j. folior. senæ ℥. B. agarici fœmin. soldanella
ana ℥. j. zinzib. ℥. j. schœnanthi, spica ana ℥. B. fiat de-
coct. in aqua fœniculi, petrosel. & vini Rhenens. qu. suf.
stent per noctem infusa; cuius expressionis accipe
℥. ix. addendo syrup. de eupator. de byzantiis ana ℥. j. a-
rom. cum specier. diarrhod. abb. diacur. dialacce ana ℥.
j. misce. detur, ut dictum est, omni mane. Postea ℞.

succo ireos ℥. vj. pul. soldanella ℥. j. detur cum cyatho
vno decoct. supra scriptæ; deiecit meram aquam
citrinam decies. Egre gie venter detumuit, cum
maxima alleviatione. 4. die Decembr. cum ali-
quantulum tussiret, hæc præscripta sunt: ℞. syr.
capill. vener. ℥. ij. specier. diarrhod. ℥. j. B. specier. diatreos
Salomonis ℥. j. B. zacc. penid. ℥. B. misce, pro linctu, su-
mat cum baculo liquiritiæ ad libitum. 8. Decemb.
sequens sumit: ℞. succo ireos ℥. vj. pul. soldanella ℥.
j. B. dabatur cum decocto ultimo præscripto. optime ad
miraculum eduxit aquam. Interim dieb. sequen-
tibus, pro roboratione viscerum utebatur sequen-
tielect. in tabulis: ℞. specier. diarrhod. abb. ℥. ij. spe-
cier. diacurcum, dialacce, diatreos simplic. ana ℥. j. dis-
solut. in aqua agrimonie, adiecto zaccar. albiss. q. suf.
fiat electuar. in tabul. Cœpit indies tunc venter de-
tumescere, tum crura ipsa; ac paulatim melius
habebat. 16. die Decembr. rursus ex hoc decocto
sumebat: ℞. rad. quinque aperitiuar. rad. ireos ana ℥.
B. capill. Vener. polytrichi, ceterach, agrimonie an. m.
B. sem. anisi ℥. j. B. folior. senæ ℥. vj. soldanella ℥. ij. vuar.
passul. enucleat. ℥. j. liquir. rose ℥. B. coquantur in aqua
communi, pro ℥. ix. fortis expressioni adde syrup. de eupat.
de byzantiis ana ℥. j. misce. Sed tunc crus excoria-
tum est, & maxima copia aquæ quotidie efflue-
bat. Pecia lini cum vng. albo superinducta appo-
nebatur, ob excoriationem. Eo decocto absum-
to, iterum ℥. vj. succo ireos, pul. soldanella ℥. B. cum de-
coct. cepit: deinde iterum elect. in tabulis; & pe-
des detumere; & quasi curatus videbatur. Ve-
rum cum homo esset admodum crassus, mere ru-
sticus, & insignis cernisiarum potor, iterum lar-
gius cervisiam bibens, a qua diu abstinerat, cum
iam aliquot diebus curationem vltiorem inter-
misisset, iterum venter nunc in modum inflati
cœpit; & crura denuo in maximam molem ex-
crevere: adeo ut iterum 16. Ianuarii nos vocave-
rit, anno 1563. Cum vero adhuc robustus videre-
tur, vna cum Ericio hanc potiunculam exhibui-
mus: ℞. soldanella ℥. j. B. mezereonis ℥. B. semin. anisi,
carui, dauci, fœniculi an. ℥. j. B. bulliant in vino Rhenen-
si, stentque per noctem infusa. mane huius fortis colatu-
ra accipe ℥. ij. B. adde succo ireos ℥. vj. misce. Exhibita
fuit mane potio in diluculo: ex qua semel vom-
itum habuit. Sed postea per diem & noctem se-
quentem copiosissime hæc ipsa aquam eduxit: ita
ut venter omnino detumuerit, tum crura subsi-
derent. Hoc tamen medicamentum forte est,
quo non utendum nisi in robustis, quorum natu-
ram cognitam habemus: Nam & hic vir quadra-
tus & robustus, bene tulit, & optime profuit. Huic
rursus & confectioes elect. in tabulis exhibitæ,
ad viscerum roborationem: & denuo bene habe-
re cœpit: & tunc rursus a medicamentis abstinuit.
Deinde cum videret iterum crura inflati, denuo
sequutus est muliercularum consilia, quæ pedi-
bus applicarunt & cruribus bolum armenum,
cum aliis reperculsiuis: unde tam pessime habuit,
iterum facta recidiua, multo peiore præcedente;
adeo ut crura tandem in tantam molem excreue-
rint, ut ad eum vterque rursus accirus, in vita ma-
iora nunquam spectauerimus, in homine licet
magnæ

10.

11.

12.

13.

magna staturæ & valde crasso. Imo ex nimia mole cute suppurata, sub poplite ulcera valde putrida cum putrefactione subsequuta sunt: quæ nullo modo postea curari potuerunt. Et post tres septimanas magis rursus intumescere ventre, cum cruribus, subsequuta est febris, licet lenta & levis. Ita ut præhabito prognostico 17 die Februar. eiusdem anni e vita discesserit.

S C H O L I A.

Recidivam ipsa radice, diximus in lib. Obser. nostrarum de febribus, multo peiorem esse; & hic præcipue: nam postquam mulierculæ illa re-percussiva femoribus applicuissent, ea ipsa statim cum tanto dolore intumuerunt, ut nullo modo sedari possent. Mox subsequenti suppuratione sub poplite, deinde & febre, ventre semper magis crescente, tum cruribus, hic asciticus parum in fine curationis observas victus rationem, e vita decessit. Sæper enim ascitis gravis & suspectus morbus est: & hic periculosior factus, primo ab empiricis, postea in fine etiam a mulierculis. Nulla præsidia, licet videbantur hominem iam antea restituisse, postea viribus delectis vilo modo iuvare potuerunt. Quibus modis curetur ascitis, iam satis dictum est: semper habita intentione ad causam coniunctam, nempe hydropem; & ad remotionem, nempe malam dispositionem ipsius hepatis. Nam frustra, ut diximus, hydropem curamus, nisi malam intemperiem hepatis remoueamus; alioqui cito redit aquositas. Multa sunt, quæ hic commendantur a medicis: ut herar lupi, trochis. de rhab. de quibus vide Nicolum, Gateneriam, Arculæum, & alios auctores, qui maxime Auicennam & Arabes sequuntur. Quomodo autem curetur a Græcis, iam satis quoque dictum est.

OBSERVATIO XXXIX.

De ascite, ex hæmorrhoidibus constricta & lienis oppilatione orta.

Nobilis matrona, Barbara Zuzia, vxor Ioannis Heuteri, mense Octobri, anno 1578. post hæmorrhoides longo tempore restrictas, quæ consuetæ erant fluere, incidit in oppilationem lienis: & ex ea tandem in hydropem asciten. Venter huic tum pedes tumebant. Post multa adhibita remedia, ad eandem sæpe accitus sum in Hagam-Comitis, ubi tunc habitabat, & post pacificationem e Traiecto eo venerat: capiebat subinde pil. 7. ex aloe lora cum aqua saluæ, ad hæmorrhoides aperiendas, præcedentibus decoctis aperitiuis. Et ad aquam educendam capiebat pilul. tres exiguas ex mezereo, descriptionis Donati (de quibus latius in scholio agemus) ab Altomati cap. proprio de hydrope; quas idem pro ascite expertas habet. Dat autem ipse 3j. vel 4j. pro vice qualibet: sed quia hæc matrona debilis erat, capiebat tantum tres pilulas; & egregie aquam soluebant. Gualtherus pharmacopæus Traiectensis, ut nobis tunc referebatur, simili morbo laborabat, nempe hydrope ex hæmorrhoidum obstructione, quæ prius illi naturaliter fluere solebant: verum hic singulis septimanis capiebat pilulas ex aloe lora, deinde etiã istas pilul. ex mezereo, descript. eiusdem Donati.

Quibus solis remediis fuit ab hydrope curatus; & hæmorrhoides denuo eidem fluere cœperunt, mox ventre detumescere. Nostra vero matrona, postquam bis accepisset tres pilulas dictas ex mezereo, hæmorrhoides fluere cœperunt, post magnam liquidorum humorum aquosorum euacuationem. Post decocti aperitiua & pilulas iunctas, his nodulis in vino suspensis & expressis capiebat vinum, nempe cyathum vnum bis in die: ℞. z. al-saparilla ʒij. ligni sancti ʒij. tamariscentis m. j. ceterach. chamad. an. p. j. cor. rad. cappar. ʒij. cinnamomi confracti ʒij. B. fiant tres globuli seu puppa: ℞. ligni sancti ʒij. rad. fenic. brusci, asparagi, ononid. an. ʒij. chamad. salvia ana p. j. rad. asclepie seu hirundinaria ʒij. granor. iuniperi, baccarum lauri an. ʒij. B. rad. garyophyllata, polypodii quercini ana ʒij. B. comæ absinthii m. B. fiat magnus globulus seu puppa: quæ coniciatur in quartam partem cupæ ceruisiaræ: quæ ceruisia vrebatur pro quotidiano potu, tam pro lienis obstructione, quam hydrope. Huic matronæ prius bene per pilulas dictas repurgatæ post aliquos fatus convenientes pro cruribus inflatis, sequens etiam cataplasma cruribus supra modum inflatis, apposuius: ℞. rad. ebuli recentis m. vj. rad. bryonia lb. j. corticum exteriorum sambuci man. iij. folior. cucumeris asini manip. ij. caulium rub. man. vj. folior. maluar. manip. ij. folior. altheæ m. ij. furfur. macri man. v. florum chamomilla man. ij. flor. meliloti man. ij. absinthii exsiccati man. ij. decoquantur in aqua commun. q. suffic. pistentur, addendo vnguenti Agrippæ ʒij. farina hordei lb. B. fiat cataplasma, ut artis est. Hoc cataplasmate crura inuoluebamus usque ad genu: quo multa aqua effluxit, absque corrosione. Est egregium, & pro arcano retinendum. Hæc præscripta sunt in principio Decembris. 6. vero die & hæc tabulæ præscriptæ: ℞. species dialacca, diacurcuma an. ʒij. B. species arom. 10s. species diacinnamomi ana ʒij. dissolutis in aqua agrim. o. na q. s. z. sacchari albiss. ʒij. fiat confectio in tab. Lienis applicabatur emplastrum de meliloto: & venter inungebatur vnguent. Agrippæ. Quibus bene se habere cœpit. Ceterum in principio Ian. anno 1579. cœpit peius habere, curatione paululū intermissa. Tunc eam accessit quidam chirurgus Haghanus, qui pollicebatur eidem sanitatam: at vir eius Ioannes Heuterus, prudens, ei auscultare noluit. Præter alia remedia, quæ intus exhiberet, etiã proposuit vesicatoria ponenda esse sub poplite, in parte domestica, de quib. latius in scholio, idq; in vtroq; crure, cum crura rursus valde intumescerent. Cuius causa ego denuo accitus, in ea re illi assensu, modo non essent cauteria potèntialia, & cutem usque ad carnem adurètia; ea enim solent in cruribus œdematosis ulcera difficilia inferre, & subinde gangranam, ut experientia in multis vidimus. Ideo vesicatoria leuia concessi; quæ adhibuit, & vesica illata incisa fuit: ex qua multum aquæ effluxit; eaque deinde per se consolidata est. Ceterum post aliquot dies pustulæ per se in cruribus obortæ, insignem pruritum induxerunt; & me inscio, absque etiam consilio chirurgi, caules rubros apposuerunt: vnde pustulis perruptis, & vesiculis eff-

5. fractis in ambobus cruribus subsequuta est magna corrosio, & tandem ulceratio: & effluxit continuo aqua, ut vires paulatim deficerent. Ad 14. Ianuar. rursus ad eam vocatus sum: maritus denuo voluit exhibere pilul. de mezereo; sed inhibui, ob vires nimium debiles. Interea propter ulcerationem, ne accederet gangræna, imperavimus crura lauari cum vino, in quo decocta erant folia vngulæ caballinæ, aliquid mastice, myrrhæ, thuris, & lithargyrii, etiam folio vngulæ caballinæ (quod siccatum aderat, & recens nunc non inveniatur) loco ulcerato imposito, ne fluxio omnino impediretur, neq; nimium fluere. Ulcera deinde paulatim ceperunt melius habere, & dolor mitigabatur: quanquam illa semper in peius, quo ad vires (*licet venter aliquo modo detumesceret subinde*) vergebat; ita ut eam tandem morituram prædiximus. Ceterum vinum illius decoctionis, efficiebat, ne fieret gangræna in cruribus. Crura vero eo decocto & lauabantur & inuolvebantur, super vnum locum apposito folio vngulæ caballinæ, ne fluxio in totum restringeretur. Interea hoc apozemate utens, videbatur quasi curata: *℞. rad. ireos viridis 3j. rad. fœniculi, petros. an. 3℔. agrimonia, cassuthæ, ceterach, chærefolii, soldanellæ an. man. j. flor. trium cord. ana p. j. semin. anisi, fœniculi, carui an. 3j. ℔. sem. cartami contriti 3℔. medianorum corticum sambuci m. j. folior. senæ 3j. turpeti optimi 3ij. rhab. selecti, agarici albi fœmin. levis an. 3j. spica, schœnanthi, zinz. albi an. 3℔. vuar. passul. 3j. liquir. ras. 3ij. polypod. querc. 3ij. fiat omnium decoctio in tribus partibus vini Rhenensis, & vna parte aqua petros. ad 3℔. clarificetur & arom. cum 3ij. cinnamomi selecti; addendo syrup. de eupat. 3ij. fiat apozema, pro ij. dosibus matutinis.* Ex prima dosi habuit 7. secessus: ex secunda, post tres dies assumpta, habuit enormes secessus, cum magna angustia, ut putarent illam morituram. At post secessus, continuo per plures dies reddidit lotium; & venter ad miraculum detumuit, & pedes; & præter spem multorum videbatur curata, & liberata ab hydrope. Verum anno eodem 1579. in Septembri iterum venter intumescere cepit. Post præparationem materiæ, & assumtis bisterve pilulis de mezereo confectis, 13. Septembr. iterum hoc apozema præscriptum est: *℞. rad. ireos virid. 3vj. cort. rad. fœniculi, petrosel. ana 3℔. agrimonia, cassuthæ, ceterach, chærefolii ana man. j. soldanellæ m. ℔. flor. trium cord. cort. medianor. sambuci an. p. j. semin. anisi, fœniculi, carui ana 3ij. ℔. semin. cartami 3ij. ℔. folior. senæ, absque stipitibus 3vj. ℔. turpeti optimi 3ij. ℔. rhab. selecti, agar. albiss. ana 3℔. spica, schœnanthi, zinzib. albi, ana 3℔. vuar. passul. enucl. 3j. liquir. rasæ, polypod. querc. ana 3ij. fiat omnium decoctio in ij. part. vini Rhenani, & vna part. aqua petrosel. circiter 3vij. infusis per noctem. & mane fortissime expressis adde syrup. de eupat. 3ij. clarificetur, & arom. cum 3ij. cinnamomi selecti, pro 2. dosibus matutinis.* Vtebatur deinde dialacca, & diacurcuma in tabulis. 26. Septembris etiam purgata est cum diacarthami solutiui 3℔. aliquando 3vj. in tabulis etiam hæc tragea præscripta est: *℞. seminis anisi, fœniculi, cumini ana 3ij. ℔. spe-*

cier. dialacamenthæ 3j. specier. diacurcume, dialacca ana 3j. trochisc. de cappar. 3℔. cinnamomi selecti 3j. baccarum laurinum. v. puluer subtilissime, & adiecto zaccbar. albiss. ad pondus omnium, fiat tragea: dosi sit 3j. Rursus 14. Nouembr. huic matronæ nobili venter ex hydrope valde intumuit; & rursus accepit tres pilulas ex mezereo, descript. Donati & intermissis aliquot diebus hæc præscripsimus: *℞. specier. diacarthami 3ij. zaccbar. albiss. 3j. ℔. fiat confectio in tabulis, dos. 3℔. singulis septimanis: & ex vna dosi quinque vel sex aquosos secessus semper habebat, aliquando & nouem secessus, sine torminibus.* Has tabulas valde laudabat. Interea quotidie accipiebat mane cyathum vnum parum huius vini sequentis: & hora quarta pomeridiana alterum: *℞. cineris totius fruticis genistæ cochlearia duo: infunde in pinta vna vini albi Rhenani optimi: stent hæc infusa calide supra cineres calidos per noctem: mane per manicam Hippocratis coletur, idque sæpius; & fiat claretum.* Et rursus exhibita 3℔. diacarthami in tabulis, habuit quatuordecim sedes aquosas liquidas pituitosas: & non male inde habebat. Postea, cum videretur aliquo modo melius habere, curationem non prosequabatur, numero remediorum tædio affecta. Sed 19. Februar. anno 1580. denuo ad eam accitus sum. Et coepit tunc peius habere, ventre magis intumescere, & aqua ad diaphragma ascendente, & pulmonem comprimente; unde etiam difficultate anhelitus corripiebatur, tussis tamen non accedente. Et quia tunc satis secessum habebat, abstinuimus ab usu diacarthami. Bibebat tunc vinum Rhenanum bis in die, in quo decoctæ erant radices eringii, ebuli, ireos, asparagi, adiecta exigua quantitate cicerum rubrorum, & summiratum genistæ iam prius pullulantis. Et mense Martio procedebamus cum iisdem remediis, aliquando & supradictis. 19. Aprilis & hoc linimentum præscriptum, pro ventre: *℞. succi ireos, succi rad. ebuli, & radice sambuci, succi bryoniæ ana 3j. vnguenti Agrippæ 3ij. bulliant simul ad consistentiam vnguenti mollioris.* Rursus preparata materia cum decocto rad. ebuli, aspar. ut prius, 25. Aprilis ita eandem purgavimus: *℞. rad. ebuli, vel eius loco, si desit, radic. sambuci, asparagi, ireos, an. 3ij. agrimonia, cuscuthæ, ceterach an. man. ℔. soldanellæ 3j. flor. cord. o. j. semin. anisi, carui, dauci ana 3j. ℔. vuar. passul. enucl. 3℔. liquir. rasæ 3ij. coquantur in aqua communi & vino Rhenens. & in 3v. huius decoct. infunde per noctem, facta prius leui ebull. folior. senæ absque stipitibus 3℔. turbiu gummosi 3j. ℔. rhab. optimi 3j. zinzib. squinanthi, spica, cinnamomi an. 3℔. mane fortiss. express. adde diacarthami in tabul. 3ij. syrup. de eupatorio 3j. misce, fiat haustus brevis. detur mane in diluculo.* Euomuit hanc portionem, quanquam adhuc ter plurima aquosa deposuerit. Rursus utebatur tabulis roborantibus supradictis. Interea dum aliquando redirem, & cum remediis vix vteretur, ac tædio præsidiorum afficeretur, & semper in peius postea procederet, ut vix ambulare posset, Heuterus eius maritus nobis ostendit literas ab Antuerpia transmissas, de muliere hydropica ab omnibus medicis de-

8.

9.

10.

relictæ

relicta, hoc modo ab hydropo curata: in j. mediani corticis sambuci abradi, modo in poculo vno ceruissæ, modo in vino tantum infundebat, absque decoctione. Quo quidem vino continuo utebatur. Adhibito quoque vesicatorio, ad rotunditatem palmæ manus, ex fermento, cum 2. cantharid. in parte sylvestri cruris. Quib. duobus tantum præsidis hæc ipsa mulier Antuerpiana curata erat, præter omnium spem. Hæc tamen nullo modo hanc iuuabant. Et a priore potione iam dicta, materia ex lumbis supra pubem prolapsa, non poterat bene reddere lotium. Sed cum puluerem oculorum cancri sumsisset, cum exiguo vino, ad cochlear vnum, cœpit mittere. Postea, cum secundo lumeret potionem prædictam, cœpit plurimum mingere; ita vt sexies copiosissime minxerit: & deinde ter quotidie aluum deponebat, limosa purida excretiens, sed in minori copia, quasi cum tenesmo. Sed paulo post melius excreuit, semel globulo excrementitio exeunte calculi instat durioris. Ceterum postea mense Martio, cum amplius medicamentis uti nollet, venter semper in maiorem molem excreuit: & quanquam nulla spes superesset, imo ante duos annos prognosticon feceratnus apud maritum & amicos, eam ab hoc hydropo ascite morituram; attamen variis remediis, hydropica existens, cū vltima esset, ultra duos annos & tres menses vitam produxit: partibus superioribus, nempe brachii, ita exsiccatis & macilentis, vt corpus cadauerosum & præcipue facies, ante mortem cerneretur, ventre supra modum prominente, vt rumpi videretur, & femorib. ac cruribus valde crassis & inflatis: & quanquam aqua quotidie ex cruribus efflueret, nihil tamen iuuaminis inde habuit; ita vt tandem 7. die Iunii anno 1580. e vita decederet. Maritus quoque postea, anno 1581. in autumno eodem malo correptus, vitam misere vsque ad annum 1583. ætatis suæ 57. protrahens, licet aptis adhibitis remediis vtens, tandem interiit in autumno, cum per integrum annum hydropo laborasset.

S C H O L I A.

Pilulæ ex mezereo, etiam descriptionis Mesuæ, licet seorsum excrementum valenter purgant, seu aquas, & ob id hydropem iuuant; tamen illæ quibus nos sæpe feliciter vsi sumus, aliter componuntur, iuxta Donatum ab Altomari; quarum experientiam sæpius & ipse habuit, (vt refert cap. de hydropo) quæ & citra noxam pluries singulis septem vel decem diebus exhiberi poterunt: mirabiliter etenim serosos purgant humores, citra aliquod nocumentum notatu dignum. Conficiuntur autem hoc modo: ℞. foliorum plantæ, quam communiter seplastarii mezereon appellant, & proprie eius, quam nuncupat Dioscorides chamalaam, ʒij. vel iij. infundantur per viginti quatuor horas in sufficienti quantitate aceti vini albi, in quo prius mala cydonia fuerint decocta: demum in umbra exsiccantur; & iterum parato decocto expomis dulcibus & acetosis, in eodem aceto vini albi prædicta folia infundantur, & eisdem adice hieræ picæ simplicis tantundem: & cum succo radicis iri-

dis fiant pastilli, & seruentur: quorum dosis est ʒj. vel ʒij. pro qualibet vice: interim vero ʒss. agaric. trochiscati, aut rhabar. vigorati & tantundem trochiscorum ex myrobal. chebulis adicere poteris, eisdem namque catapotis, Deum testor (inquit idem Donatus: me nonnullos hac specie (nempe ascite) aquæ inter cutem laborantes, sæpius per intervalla eis exhibitis, perfecte curasse. Nec etiam parum conferunt pro curatione aliarum aquæ inter cutem specierum, vbi eadem purgatione indigeant: quemadmodum hoc in anno 1537. obseruauimus, in Illustrissimo Petro Antonio Sanseuerino, Pisignani Principe; qui cum ascite simul atque anasarca laboraret, adeo vt fere a cunctis pro deplorato haberetur, vbi ter aut quater dicta catapotia per intervalla deuorauit, liber euasit: testes sunt nonnulli cum medicis, tum magnates, qui ipsum aqua inter cutem laborantem, ac demum absolutum, & liberatum inspexerunt: quanquam non exigua etiam huic operi videretur sudatorium Tituli hodie vocatum, cuius supra meminimus. Ceterum quia hic ab hæmorrhoidibus restrictis & liene obstructo hydrops inceperat, hæmorrhoides primo aperuimus cum pilulis ex aloë: deinde pilulis de mesereo cum vsa bis esset, apertæ fuerunt hæmorrhoides: alioqui vsus fuisset illo remedio, quo frater Domini de Sprangin Haga-Comitis vsus fuit, cum hæmorrhoides restrictas haberet: detergebat enim anuro cum foliis ficum: & aperiebantur. Hoc remedium describitur a Leonello cap. proprio: *Medicamen.* inquit, *rumpens hæmorrhoidas*: Accipe folia ficum, tempore quo habentur; & fricentur primo illa folia supra linguam, quousque exeat lac: & postquam sic fuerint præparata, tunc cum eis fricentur hæmorrhoides; scilicet loca hæmorrhoidum: rumpuntur enim cum facilitate. Plura apud eundem egregia habes de curatione hæmorrhoidum. Sed de his suo loco. Verum cum hic hydrops quoque originem haberet a vitio lienis, propterea etiam quedam peculiaria eligeamus lienis conferentia, tam in decoctis, quam in purgationibus: & etiam in iis, quæ extrinsecus ad mouebantur: ita vt tamaricis decoctum in vino probatur, sic & ceterach, rad. capp. & scolopendrium adicimus, vt agnum castum, cum alia, & radic. ebuli, cum sola rad. ebuli ac cort. sambuci ex vino decocta tam lienem quam hydropi conueniant. Extrinsecus modo emplastrum de meliloto, modo ammoniacum dissolutum in aceto, cum puluere ceterach & aliis lienem respicientibus, lienem imposuimus. Et quia hæc matrona melancholica erat, eo quod diu extra patriam ob bellum Traiecti agebat, etiā multis amissis bonis, diu laborauerat lienis duritie; quæ magis confirmata, subsequente ascite minus curari potuit. Quod & marito eius diu melancholico, ob eandem causam etiam euenit, qui simili hydropo interiit.

O B S E R V A T I O XL.

De ascite ab ictero originem habente.

IDa, vxor illius Petri Cornelii ceruissarii, in cuius cupis tres Glandes quercuum pro insigni

erant, mulier quidem crassa & obesa, anno 1580. sub finem Februarii, cum in dolorem dorsi versus hypochondrium dextrum incidisset, & ventositatem esse putaret; qui magis magisque intendebatur: decoctum florum chamomillæ in ceruisia sumsit. Sed eo dolore minime cessante, multa biliosa euomuit. Tertio die tota crocea euasit, ut ex obstructione hepatis tum vesicæ fellis, dolor ille originem haberet, excrementis tum albis tum durioribus existētibus. Cum vero & hæc aluura difficulter solubilem semper haberet, quod alias in illa experti eramus, ischiade aliquando laborante, ut suo loco dicturi sumus; cumque dolor hic non solum dorsum, sed & ventrem totum nec non & hypochondrium dextrum occuparet; statim apozema sequens præscripsimus, ad eam acciti 29. Februar. ℞. folior. malue man. ij. parietarie, absinthii communis an. man. ℞. flor. chamomill. flor. cord. an. p. j. semin. anisi, fœniculi, carui ana ℞. j. ℞. prun. damasc. num. ix. v. passul. enucleat. ℞. j. liqu. ras. ℞. ij. folior. senæ ℞. ij. agarici leuis fœmin. rhab. selecti ana ℞. j. schœnanthi, zinzib. albi ana ℞. j. polypod. querc. ℞. j. sem. carui ℞. j. fiat decoct. in aqua communi: & huius fortis expressionis accipe ℞. ij. syrup. ex succo ros. solut. & ex infus. ana ℞. j. misce, fiat haustus. Altera dosis maneat in infus. Euomuit, & vix retinuit. Et cum non solueret, glande acuta iniecta squibalas tantum eiecit. Et cum clysterem non admitteret, 3. Martii hoc sequens præscriptum rest: ℞. rad. cichor. dentis leonis ana ℞. j. capill. vener. polytrichi, fumaria, folior. viol. an. man. j. (aderat enim & calor in hepate, cum obstructione) marrubii m. ℞. flor. cordial. p. j. sem. anisi, fœniculi, dauci an. ℞. j. sem. carthami ℞. ij. ℞. sem. melon. ℞. j. prun. damasc. num. ix. passul. enucl. ℞. j. folior. senæ, absque stipitibus ℞. j. polypodii querc. ℞. j. rhabarb. selecti ℞. j. squinanthi ℞. j. fiat omnium decoct. in aqua communi, huius fortiss. express. accipe ℞. ij. pro ℞. viij. addendo syrup. de succo rosar. de absinth. (ut potio minus dulcis esset: nam ipsa metuebat vteri suffocationem, in quam leui ex causa vel dulcedine incidebat) an. ℞. j. fiat haustus brevis: altera dosis maneat in infus. Rursus euomuit; & a meridie tantum vnam sedem habuit, albam, duram, & non liquidam, dolore semper augescente. Ob quam causam & venâ aperuissem: sed quia menses fluebant satis copiose, absque tamen alleviatione, a venæ sectione abstinui: & licet ex glande nihil excreuerit, tamen icteritia in lotio apparere cœpit, eratq; lotium crassum, citrinū. Cum & alteram dosin etiam euomeret, sexto Martii die hæc purgationem accepit: ℞. elect. de succo ros. ℞. ij. vix per horam retinuit, & multa biliosa cum angustia euomuit. Et glande nihil quam squibalam vnam deposuit: & cum dolor sub noctem magis tenderetur, tandem clystina sequens admisit: ℞. rad. althæe mund. ℞. j. mercurial. betæ, malue, viol. flor. chamomil. meliloti ana m. j. marrubii m. ℞. prun. damasc. num. xij. vuar. passul. enucl. ℞. j. semin. anisi, fœniculi, carui an. ℞. j. ℞. sem. lini ℞. ij. coquantur in aqua communi, pro ℞. i. colaturæ adde cassiæ pro clysteribus ℞. j. benedictæ laxæ. ℞. j. diacathol. ℞. ij. olei chamom. amygdal. dulc. anethini an. ℞. j. vitellum vnius oui,

salis gemma ℞. j. salis communis ℞. j. misce, fiat clyster. non bene recepit: & vix totum intrauit; & non habuit inde secessum. Altero mane, agre tamen, rursum admisit clysterem: & imposuimus benedictæ laxat. cass. an. ℞. j. diacatholici ℞. j. e quo habuit sedem satis magnam, sed non liquidam, at albam & duram. Et menses adhuc copiose fluebant 7. Martii hæc præscripta fuere: ℞. rad. fœnic. petrosel. cichorii, dentis leonis an. ℞. j. marrubii, capill. vener. polytr. agrimon. cuscute, dentis leonis ana m. j. flor. cord. p. j. semin. anisi, fœnicul. ana ℞. j. ℞. sem. end. ℞. j. prun. damasc. num. xij. vuar. pass. ab arill. repurg. ℞. j. liquir. rasæ ℞. ij. folior. senæ absque stipitibus ℞. j. ℞. polypod. querc. ℞. j. rhabarb. selecti ℞. ij. schœnanthi ℞. j. bulliant in aqua communi, pro ℞. ix. & fortiss. express. adde syrup. de byzantiis, syrup. ex succo ros. solut. an. ℞. j. ℞. misce, fiat apozema pro iij. dosibus matutinis. Cum vnam sumsisset, denuo euomuit; quamquam ex illa habuerit vnum secessum: & postea multa & plurima biliosa per vrinam excreuit. Menses debito ordine fluentes, postea substituerunt. Verum, quia dolor in hypochondrio dextro permanebat circa stomachum, hoc fotu vsumus: ℞. rad. althææ ℞. j. ℞. fol. malue, viol. flor. chamomil. meliloti ana man. j. flor. ros. rub. p. j. summitatum absinthii p. j. semin. malue. ℞. j. ℞. coquantur in aqua communi, pro ℞. i. ℞. expressioni adde acet. ros. ℞. ij. aquæ ros. ℞. j. specier. diarrhod. abb. ℞. j. ℞. fiat fotus cum spongia. Cum parum iuuaret, & menses nunc non fluere, venam iecorariam in brachio dextro incidere fecimus, sanguine moderate extracto: & sensit leuamen. At postea adhuc dolore circa præcordia hærente, alteram dosin decoct. ultimo præscriptæ exhibuimus: sed vix per horam retinuit. Ideo glande acuta imposita secessum habuit; & die subsequente per se excrementa deiecit, licet adhuc alba, & minus liquida. 14. Martii his tabulis utebatur, pro dolore & ventositatibus circa præcordia hærentibus: ℞. specier. diacumini, diacurcumæ an. ℞. j. specier. diarrhod. abb. trionfant. dialacæ ana ℞. j. dissolutis in aqua flor. chamomill. adiect. zacch. albiss. q. suf. fiat confectio in tabul. Tertiam dosin decoct. cum sumsisset, bene excreuit, & dolor cessauit, cum semper plurima crassa & valde citrina mingeret. Interea hoc globulo in ceruisia, qua quotidie utebatur pro potu, pendente expresso que vtens conualuit: ℞. marrubii exsiccati m. ℞. rhab. selecti ℞. j. croci orientalis gr. vj. schœnanthi gr. ij. fiat globulus seu puppa. Verum cum hæc conualuisset, ad colorem citrinum per totum corpus permanentem depullandum, varia muliercularum consilia huic mulieri proposita erant: vti lac cum semine cannabis, croci paululo adiecto: verum illud vulgare remedium mihi non ardebat, cum Diosc. referat libr. 3. cap. 141. quod semen huius in cibo largius sumtum genituram extinguat, & ex Gal. 1. de aliment. facult. concoctu difficile sit, ac stomacho & capiti noceat, & prauis succi. Ideo, iuxta Matthiolum, commen. in 3. Diosc. libr. cap. 188. grauiter errant mulieres Italicæ, cum pueris comitiali morbo laborantibus cannabis seminis decoctum exhibeant; quo tantum abest,

ut morbum curent, ut etiam augendi occasionem præbeant. Secundum erat aliud vulgare remedium radix vrticæ decocta in cervisia, qua & plurimi sanati dicebantur: licet Matth. in lib. 4. Diosc. c. 89. & Gal. 6. de simpl. tantum folia & semina in usu esse scribunt. Tertium empiricum erat radix chelidoniz, etiam in cervisia decocta: quæ magis mihi placebat, ex Diosc. lib. 2. c. 176. cum dicat, quod radix chelidoniz maioris, cum aniso & vino albo pota, regio morbo medeatur. & Gal. 7. simpl. ea vititur ad morbum regium iecoris, in vino albo cum aniso. Brabantina quædam mulier, & longo tempora icterica, cum decocto rhab. chelidoniz maioris, ad aliquot tempus vasa fuisset, aliis tamen medicamentis prægressis, & a me descriptis, ab ictero egregie euasit. Verum hæc altera agra, de qua nunc loquimur, iterum 28. Martii circa præcordia angustiam quandam sentiebat: quæ his pilulis exhibitis cessauit. *℞ pilul. aggreg. ʒij. pilul. derhab. ʒj. diag. gran. ʒj. fiant pilule vij.* egregie excreuit, cum alleviatione: & recte habuit. Verum hæc eadem mulier, cum curata esset, & iterum foras prodiret, denuo incidit in febrem, & tunc biliosa euomuit, & biliosa excreuit per se: & cum peregre esset profecta, incidit in maximam debilitatem. Quare ad eam accitus 17. Aprilis, cum omnia medicamenta respueret, ex hac mixtura capiebat. *℞ confer folior. acetosa ʒss. manus Christi cum perlis ʒvj. conferuæ borag. ʒij. syr. de limonibus ʒj. misce.* & febris eam reliquit. Sed non diu post iterum icterus illam inuasit, cum hepatis obstructione. Hoc infuso adhibito, denuo conualuit. *℞ marrubii. m. j. bulliat in aqua cichori ʒ. v. & in hac decoct. infunde folior. senæ Alexand. ʒij. seminis anisi ʒj. rhab. selecti ʒj. schœnanthi ʒss. facta vnica ebull. mane fortiss. express. adde syr. ex succo ros. solut. ʒj. mis.* habuit quinque secessus, quia tunc erat debilis, & denuo recte conualuit. Sed post vnum aut alterum mensem rursus ictero affecta, ex iecoris obstructione, postea mense Septembri ex illo ictero præcedente in hydropem ascitem periculosissimam incidit, adeo, ut pro deplorata haberetur. Atque hoc malo ultra octo menses detenta, mirabiliter tamen per me ab hydropem ascite, cum ventrem in maiorem molem excrecentem haberet, tum crura adeo inflata, præter opinionem curata fuit, iisdem remediis, quibus in Heutera vsumus, in decoctis semper adiecto marrubio, eo quod hoc malum ab ictero & obstructione originem traxerat. Sed huic vesicatoria vtriq; cruri in parte syluestri apponere iussimus, sub genu: quæ postea vlcerebantur; & effluxit perpetuo paulatim aqua, ut inde curata fuerit, cum maximo nostro honore, & omnium hominum admiratione, quamquam vlcera illa ita inducta tandem etiam agre quidem curata fuerint.

S C H O L I A.

9 *Si hydrops coniungatur icteritia vel eam sequatur, quomodo curetur.*
Recte prius diximus, cum de ictero ageremus, in signis prognosticis, quod icteritia diuturna plerumque hydropem minatur, quæ difficilime curatur, cum ad sit obstructio hepatis simul, verum hepate nondum in scirrhum permutato. Hic hydrops (ascites inquam) quamuis periculosissimus,

& curatu difficilissimus, tamen magna nostra industria fuit curat⁹. Prassium seu marrubium bene o-lens in hac curatione magnam prærogatiuam habet: quo etiam in decoctis ad hydropem facientibus semper vsumus. Vbi enim ab ictero contingat, vel simul icterus cum hydropem coniungatur, Niculus Florentinus valde commendauit succam brassi depuratum, cum vino albo, & Zaccaro vel melle. exhibet autem stomacho ieiuno, facibus prius ab intestinis eductis. Illud idem Gerardus de Solo super 9. Alman. in pauperibus hydropicis dat, sed speciatim valet, quando hydrops coniungitur cum icteritia, vel eam sequitur. Refert idem Niculus, duas se curasse mulieres hydropicas, a causa frigida cum tussi, quarum ventres in maximum molem excreuerant, tum crura ac coxæ, exhibendo eis omni mane ʒ. iij. aqua prassii, & eiusdem aquæ ʒ. ij. ante cenam per horas duas, purgando easdem de quarto in quartum diem cum succo ireos. quæ ita sanatae sunt.

O B S E R V A T I O X L I.

De muliere ascite laborante, cui pedes seu crura ac femora fuerunt scarificata.

Post vniuersalia remedia in hydropicis, crura oedematosa aliquando a veteribus scarificari solebāt. At in Anna, muliere, hospita Delphensi, cum ascite laboraret, & multa illi remedia, per nos, tum alios administrata fuissent, medicus quidam cum in hospitio per vnum aut alterum diem detinebatur, iussit in hunc modum crura tum femora hinc inde verberari & flagellari cum ramusculo viridi aquifolii aculeati (nostri vulgari lingua appellat huss.) nam ita cute vndiq; mane in diluculo flagellata, vulnerata seu scarificata, aqua e cruribus & femoribus stillatim emanabat, & demum crura ita scarificata aqua tepida abluebantur: deinde folia plantaginis aquatica applicabantur, fasciis lineis circumductis. Flagellabantur autem ita mane, & post meridiem hora quarta, ad 4. dies: ita ut crura tum femora detumescerent mirum in modum, tum venter ipse. Interim bis in die bibebat vinum Pictauiense confectum cum cinere stygium fabarum ac genistæ, quod per sacrum clarificatorium, instar clareti sæpius transfundebatur, quo remedio aliqui dicebantur curati. Quamuis hæc mulier annosa, malo in hepate confirmato, etiam dudum facto per me prognostico, quod non curaretur, licet primo videbantur remedia iuuare, attamen malo ingrauescente postea cum multis mensibus decubisset, tandem obiit.

S C H O L I A.

Inter topica contra hydropem remedia, quæ minime sunt administranda ante vniuersalem curationem & euacuationem, præter emplastra superius dicta, balnea, thermas, euaporationes, etiam sacculos e macris sursuribus, milio, panico, sale, sulphure, calidos & ita appositos, tum sacculos ex arena & sabulo vel cineribus calfactis, sæpius appressos, præter cataplasmata alia, de quibus superius diximus, & de quibus auctores perlegere poteritis, nonnulli & linapismis (ut Hollerius) & diaspirato ex stercore animalium confectis utebantur.

4 ruit & perseverante malo ad phlegmicos ex radice scrophularia, ranunculum, & similia emplastri modo imposita, vel ad vesicatoria perveniebant, & vesicas configebant, & ulcera aperta conservabant, superimposito folio brassicæ, uncto butyro vel oleo, permittentes aquam effluere ad sexaginta dies. Alii scarificatione utebantur, *ut Scholio Obser. 33. huius libri diximus.* Aliqui & cauteria ventri inducebant in ambitu umbilici, & quibus partibus tumor erat. Nam & scarificationes quoque conveniunt: sed si nihil proficerent his remediis, ad extremum præsidium, nempe Paracentesin accedebant: de qua unum exemplum, temerarie tamen adhibita, adferemus.

OBSERVATIO XLII.

De paracentesi perperam in ascitico quodam adhibita.

2 Iohannes Bokelli, vir 40. annorum, cum ebrius & vino latis oppletus ex mensa saltasset, vena magna aliqua ei perrupta fuit; unde in vomitum sanguinis enormem prorumpēbat, & copiosissimum sanguinem tam infra quam supra deiecit, ad quē tunc accitus sum. Et licet tunc temporis, præter spem multorum, cum ad desperationem venisset, a me curatus fuerit: postea tamen inordinate vivens, in hydropem ascitem incidit: multisque adhibitis remediis vexatus est a quodam Paracelsista, qui eundem tunc curabat, & sanitatem ei promittebat. Verum postea, eo malum progressum est, ut Paracelsista relicto, alium medicum & chirurgum ac me vocarint. Medicus autem & chirurgus proponebant paracentesin, & ægrotum & assistentes eo perduxerunt, ut illum hoc modo ab hydropē perfecte sanatum iri crederent: idque magnis promissis iactabant, cuius causa consultatio facta est. Ego vero tunc certas rationes in medium adduxi: nempe quod vires iam dudum ex nimia sanguinis profusione prostratæ essent, & quod inde hepate refrigerato, originem traxerat hydrops, in homine nigro, & extreme macilento, etiam ante hydropem, & nunc tanto magis, cum sese nullo modo erigere posset, in lecto decumbēs, difficultate anhelitus laborans, & quod ideo in syncopen facile incideret: & ob hæc nullo modo paracentesin in hoc ægro convenire. Hæc quidem mea opinione explicata, a curatione excludor, eo quod veritatem protuleram: nam post deos menses, cum eandem paracentesin peregissent, postquam ex profusione larga sanguinis in hydropem incidisset, atque ea ultra semiannum nunc laborasset, aqua subito effluente, altero die (*quod etiam enidam in aurem dixeram, postquam audieram paracentesin peractam, quod 24. horas non superuiveret*) cum ignominia illorum æger extinctus est, anno 1579. mense Ianuario.

SCHOLIA.

3 DE paracentesi magna olim controuersia, aliis medicis eam omnino reprobantibus, aliis approbantibus. Vtriusque sectæ argumenta colligit Aurelianus 3. *Chronicon. cap. de hydropē.* Illos enim deterrebat, quod fere moriuntur omnes, qui puncti fuerint. Hi vero remedium temperabant, ne-

que in omnibus utebantur, atque ita seruabant aliquos. Tempestiua autem est punctio, priusquam in cachexiam morbus abierit, firmis viribus, corpore iuuenili, si atrabilis hydropem non induxerit, si validus stomachus, si æger non febrit: aut si febrit, remissionis tempore. Ideo diligenter cauēnt, ne purgentur intestina, cum facultas hepatis est emortua, scirrhus, aut splenis tumore, aut cum ulcere pulmonis, aut infirmis viribus, aut ætate senili æger laboret: Hæc omnia providenda sunt, priusquam de paracentesi decernas. Alioquin temeraria via, etiam si hæc adfuerint. Quæ cum hic adessent, nempe in homine extreme macilento, atrabilario, cum ex macie niger esset, tanquam ossa tantum restarent, etiam antequam in sanguinis profusione incidere, & facultas hepatis emortua esset, & vires ad extremum deiectæ, ideo temerarie facta fuit in illo paracentesis. Erasiltratus apud Celsum *cap. 21. lib. 3.* reprobatur sectionem hydropicorum, quia semel effusa aqua, & affecto hepate, postea regeneratur. Si tamen priusquam putreat materia, & vires concidant, grauiusque affectum hepar & partes aliæ fuerint, adhibeatur, optime nutrito prius ægro, & confirmato, nihil peccatur. Sed extremum remedium est, & non nisi urgente necessitate usurpandum, & cum magna medici prudentia. Ideo demitis iis, de quibus paulo ante diximus, minus est periculi, cum natura sepe molliatur viam aquæ per umbilicum, *ut ante ostensum est:* & quibus vulneratus est venter, nisi vulnus ad gracilia intestina penetret, omnes evadunt. Præmonendi tamē semper sunt amici ægrotum, quanto cum periculo remedium tentetur. Tentarique debet, modo illa non adfuerint, de quibus diximus, ubi aliis remediis nihil profectum est. Longa tamē cautior est scarificatio cutis totius venteris, secundum aliquos, ad aponeuroses musculorum, parvis scissuris, quibus per ventrē serum refudet. Galenus, Paulus, Albucasis, Mesue in ascite pun- gunt, ad latera umbilici, qua parte illa vacua & inania sunt, & propemodum ex carnes musculi. Alii quidem dextra parte si lien, sinistra, si hepar in vitio est: alii vero ex eadē parte, qua viscus est, a quo malum primum ortum est. Rondeletius, *ut paulo ante meminimus,* ex utraque parte commode posse fieri, & aquam vacuari putat. Si vero intestina in causa sunt (*ut quidam sentiunt*) pungunt quatuor digitis sub umbilico, sed paululum reducto phlebotomo in latus. Hippocrates intercutaneos pueros incidit, *in libro de locis in homine.* Aurelianus consensu vterum, in intereute magis, quam ascite paracentesin probavit. In aqua inter cutē Asclepiades quatuor digitis supra talum, tibiam compungit, interiori parte, ea profunditate, qua vena inciditur. Qui locus compunctus si parum aquæ reddit, femora, scrotum, pudenda, si quidem intumuerint, loca etiam supra manum & articulos, incidenda sunt, *ex Leonide & Hippocrate.* Formulam vero punctiois, ex libro 6. Pauli & aliis collige. Hippocrates non solum paracentesin, seu sectionem, sed vstionem etiam probat: puto, vel pulmone affecto, ut in suppuratis, vel

et pare-

ut paretur via scapello: quemadmodum etiam docet Holerius. Hippocratem id præstare in eo libro, cuius initium est, *ἡ ὑπὸ πλάγῳ καὶ ὀπίσθῳ*: Vbi suppuratos, de qua parte pus se prodit, in dorso & pectore vritant secat, alioqui enutritos prius lacte. In hydropicis vero venas in scroto crassissimas secat: paulo post in scroto, femoribus, ac tibis frequentia vlcuscula scalpello incutit. Deinde quæ parte magis fluctuat aqua, a tertiam costam ab ultima ad os, ex quo terebra caua *τρηπὰ φ τρυ- λαντῆσι* perforat, donec exeat aliquid aquæ: ex qua linamentum indit elino crudo, spongiamq; mollem alligat, ne excidat linamentum. Quotidie semel aliquid expurgat, ad dies 12. Decimotertio die reliquum aquæ emittitur: via relinquatur, ut quod super nascitur effluat, venter cibis reficatur. Si femur & scrotum intumuerint, vulnuculis audacter configito. Sæpe hepate maximo, & prius lacte nutrito ægro, non metallo, sed alia materia, inurit, octo inde crustis factis. Nonnulli id faciendū censent buxeis fasis, feruētī oleo tinctis. Libro *de locis in homine*. Tenuissimis ferramentis circa umbilicum vrit, ac tantum aquæ quotidie trahit, quantum vires ferant. Hoc semper observato, vtendum aut secandum prius, quam pituita corrumpatur, aut viscera grauius lædantur, & vires concidant: deinde vacuationem paulatim, id est, 12. diebus, ut prius faciendam. Galenus paracentesin in hydropē laudat: vstionem, in suppuratis: duplicemq; affert rationem, cur periculosa sit vniuersa vacuatio in hydropicis: extinctionem, scilicet caloris natui, si nullo cum humore effluente spiritu: & pondus visceris, quod cum non amplius sustentatur ab aqua, septū & reliqua thoracis viscera trahit deorsum. Plura sunt apud Albucasin, Aurelianum, Paulum, *lib. 6. cap. 44*. Recentiores tutius progrediuntur. Viam parant cautioro potentiali, deinde actuali. Hinc scalpello perforant, & cannula caua, commodiore, quā linum crudum Hippocratis, sensim educunt aquam. Aculcato scalpello vtuntur, ut minor fiat perforatio, locumq; eligunt, vbi aqua deorsum in imum ventrem tendit, relicto hepate & hypochondriis, in medio musculorum aliquorum epigastrii. Partem materiæ medicamentis purgant, topicis discutunt, siccante victu absument, vires diligenter fouent. Minus metuunt a peritonæo perforato, quam a membrana succingente costas. Diligenter etiam cauent (ut paulo ante diximus) ne punantur intestina.

OBSERVATIO XLIII.

De tympanite.

Rvficus quidam Alcmariam accessit, tympanite laborans, ut a me curaretur: cui venter supra modū intumuerat, ut cōcussus tympani sonū redderet: reliquæ vero corporis partes macilentiores erant. Ideo huic omnia flatulenta inhibuimus, & ut exercitio vteretur quantum posset, & ut famem sitimque sustineret: mirifice enim hæc prosunt, cum curatio præcipua consistit in roborandis partibus, coquentibus, & in offerendo ea, quibus minime flatus exspectantur. Ideo

primum talem victum eidem instituiamus, panem & obsonia minime flatulenta: & condimenta, quæ ad flatuum iuuant discussionem, & cōcoctionem faciunt, cuiusmodi sunt *anisum, cuminum, ligusticum, imperatoria semen*. Potus illi erat tantus, ut non fluctuaret, omnino parcus, quamuis non extreme, ut in aliis. Verum hæc species similiter purgantia medicamenta, & quæ vniuersum corpus emaciant, atque etiam, quæ vrinam ciunt, exigunt. Similiter & quæ extenuare & digerere spiritus flatuosos possunt, tum extrinsecus tum intrinsecus adhibere oportet. Etenim verendum non est, in hac aquæ inter cutem differentia, simul cum flatuoso spiritu serosos quosdam humores ac tenues redundare, qui in flatuosum aerem a diminuto calore transmutantur: quinimo vanum est ac intellectu carens, sine villo humore super fluo laborantem hydropicum vocare, *Celso Aureliano teste*. Hinc quoq; celebriores auctores eisdem purgantibus medicamentis pro eius curatione vtuntur, quæ pro ascitis curatione præcipiuntur, eisdemq; redundantem humorem præparantibus, atque etiam vrinam ciuntibus: perpetuo tamen prædictis adiiciendo ea, quæ flatum dissipant, ut semen fœniculi, anisi, cumini & ammi: similiter & prædictis antidotis diacuminum, aut dianisum commisceatur. Cum autem hic circa ventriculum & umbilicum dolores tanquam colici hærent, cum hoc vitium ex ventriculo fere originem primam habeat, ideo materiam illam crudam prius purgaui cum pilulis aromaticis, & de hiera ex *℞. pilul. de hiera*, quæ materiam minorabant. Deinde hunc syrupum præscripsi. *℞. syrup. de end. compos. de quinque rad. de eupator. syrup. accios. compos. an. ℞. j. ℞. aqua apii, end. cichoru. ana ℞. iij. depuretur & arom. cum specier. diarrhod. abu. cinamomi electi. an. ℞. j. pul. diacumini ℞. ℞. fiat iuleb ad modum claret. pro quatuor diebus*. Deinde *℞. pilul. de hiera simpl. rhab. selecti. de agar. an. ℞. j. cum aqua agrimon. fiant pilule v. ij. sumantur circa noctis dimidium*. Postea hoc decoctum sumebat. *℞. mentha sicca, byssopi, betonica, absinthii, folior. sambuci. an. m. j. cichoru, end. agrimonie. an. m. ℞. flor. chamomil. an. thos an. p. j. sem. anisi, carthami. ana ℞. ℞. sem. apii, petros. an. ℞. j. sem. dauci, sem. 4. frig. maior. an. ℞. ℞. folior. sena orientalis ℞. j. ℞. agarici albi, semin. rhab. selecti. an. ℞. j. ℞. spica, schœnan. h. ℞. iij. an. ℞. j. vuar. passul. ab arill. repurg. ℞. j. fiat omnium decoct. in duabus partibus aquæ & una parte vini, pro ℞. ix. colatura adde syrup. de byzantiis, de eupatorio. syr. ex infus. ros. an. ℞. j. misce. fiat apozema pro tribus dosibus matutinis*. Deinde detur elect. in tabulis, modo diacuminum, modo diacurcumum, & capiat sæpe ex hoc puluere ante pastum. *℞. sem. anisi, fœniculi, carui, cumini in aceto maceratorum. ana. ℞. j. fiat pul. sumat ex eo ℞. ij. per horam ante prandium, & post cœnam duabus horis*. Postea etiam has pilulas ei exhibuit. *℞. pilul. mezereonis, descr. Mesu ℞. j. trochis. agar. ℞. j. cum syr. de byzantiis, fiant pilule v. capiat post mediam noctem*, libenter ei dedissem elysterem, modo admisisset, (nam in hoc malo maxime commendantur elysteres) in hunc vel similem

modum paratum. ℞ folior. sambuci, mercurialis, ruta, origani, pulegii, calamintha, furfuris, ana. m. j. flor. chamomilla p. j. soldanella, folior. malua an. m. ss. sem. anisi, feniculi, carui, deuci an. ℥ij. coquantur in aqua communi, pro ℔b. j. colaturæ adde olei rutæ ei. ℥ij. benedictæ laxat. ℥j electuarii de baccis lauri. ℥j. vitellum unius oui, satis communis. ℥ij. Sacch. rub. ℥j. ss. misce, fiat clyster. Quemadmodum enim eiusmodi clysteres, ita & glandes egregie auxiliantur, si ex foliis rutæ, cumino, ac caricis exiguoq; sale figurentur. Vel ℞ mellis despumati q. s. sem. anisi, feniculi, cumini an. ℥j agarici, salis gemmæ pul. hiera ana. ℥iij. misceantur, & fiant balani. Reliquos clysteres tum balanos inuenies, quando loquemur de colicis doloribus, qui & hic valde laudantur. Cum autem cum succo ireos, tum aliis, adiecto semper aliquo puluere diacymini, satis purgatus esset, etiam iis, de quibus paulo ante de ascite diximus, extrinsecus quoque adhibuimus vnguenta, emplastra cataplasmata, in hunc vel similem modum parata, & quia circa ventriculum dolebat subinde, apposuius ceratum stomachicum Galeni: & hypochondria inunximus, tum ventrem, hoc vng. ℞ olei rutæ, anethini. vngu. Agrippæ. an. ℥j. ss. succi rutæ absinthii, succi sambuci. ana. ℥ss. vini optimi ℥j. coquantur leniter in duplici vase, ad consumptionem succorum, adde seminis apii, petros. cumini. an. ℥ss. cera exiguum, fiat vnguentum, & tempore inunctionis adde parum vini maluatici, vel, si desit, vini albi. Ventri apponebatur emplastrum de baccis lauri, primo cingulo constricto, vel fascia. Postea & hoc emplastrum, aut ei simile. ℞ stercoris vacca. ℔b. j. pulueris tymim, & rutæ. an. ℥j. cum urina pueri incorporentur. In processu iubebam, ut adderetur salis vel nitri, vel sulphuris, ℥ss. His autem tum aliis remediis sæpe repetitis, tandem hic rusticus melius cœpit habere. Sed cum non progrediretur in curatione, iterum venter intumuit: & domum rediens, tandem mortuus est, uti & alius rusticus Scotelianus, etiam tympanite laborans, qui sanationis gratia ad nos venerat: sed cum non diu maneret apud nos, remediis aptis non subleuabatur, curationemq; relinquens idem & tympania mortuus est.

S C H O L I A.

Plus flatuum in tympanite, & minus aquæ subest, ut de signis huius mali diximus: non tamen est sine aqua, ideo iisdem fere remediis utitur auctores, quæ ad ascitem valere tradunt, adiunctis semper iis, quæ flatus discutunt. Oportet igitur laxare & aperire mediocriter, & discutere, tam sumtis, quam admotis, præsertim in causa frigida. Nam in causa calida, minus calidis utendum. Et sic, si sine febre adueniat, vel ea exigua, & sola consistat, aliam curam exigit: nempe ut flatus etiam discutiamus, & bonam concoctionem procuremus ventris & intestinorum, cum iis quæ partes roborant, & bene concoquantur, & flatus minime gignant. Robur quoque ventri addimus, ex his, quæ supra sunt posita, vnguentis, ceratis, emplastris: quibus & hypochondria comprehendere vult erit. Quidam hic pilulas aromaticas & se-

belianas in principio commendat, ut Rodericus syrupos magistrales, tum opiata, qualia apud illum inuenies. Qui Arabum decreta sequuntur, vitant ea, quæ ventositatem generant: atque iis utuntur, quæ eandem resoluunt: vitæque, institutum ad calidum & siccum vergendum docet mox intentionem curandi ad materiam coniunctam conuertunt, eam resoluendo: postea ad causam remotam oculos habent, remouendo malam dispositionem hepatis, & aliorum membrorum coniunctam causam abolent solutius, non tantum iis, quæ expellunt ventositates, verum etiam, quæ euacuant aquositatem. Incipiunt, iuxta Auicennæ præceptum, a leuioribus, ut hiera in causa calida, cum aqua apii feniculi, cichorii, & similibus: & in frigida, cum decocto carminante ex aniso, cymino, & potissimum cum clysteribus carminantibus iam dictis, ex hiera, polyped oleo rutæ, sale & similibus. Ioannes Arculanus singulare remedium asserit, si in clysteribus adiciantur elect. de baccis lauri ℥ij. Ad resolutionem vero competunt, diacalamintha, diacyminum, dianisum, diagal. & elect. de baccis lauri, & alia, de quibus egimus de dolore ventriculi ex ventositate. Exterius vero apponunt sacculos, qui flatus discutunt, iuxta Rhases. ex milio, panico, sulphure, sale, cinere calido, ut etiam Nicolaus facit. Alii malunt luximum, vel decoctum ex vino albo flor. chamomill. origan. calamintha, & aliis resoluentibus, cum sponsia aut vesica impleta, vel panno, per modum foris ventri apponere. Nonnulli emplastrum de baccis, quod habetur paratū, toti ventri imponunt, vel illud, quod ad Aristarchum refertur a Mesue. Interea etiam aliorum membrorum ratio habenda est, nempe a quo membro præcipue originem trahat, vel num per consensum afficiatur, siue fuerit hepar, lien, vel ventriculus: solet enim tympanites generari modo ex aqua frigida, modo ex vino multa aqua infracto, vel ex aliis inflantibus quæ comeduntur, ex quib. incoctio stomachi sequitur, aut iecinoris: sed stomachi (ut quidam sentiunt) peculiari malum est, sicut ascitis secundæ digestionis, & hyposarca tertiæ vitium est. Ex ea enim digestionem vapor ac ventus ab inualido calido excitatur stomachi, aut intestinorum, in quib. generatur. Ex capite item, ac aliis membris defluit materia, quæ in fumum facile conuertitur ab infirma caliditate iecoris. Incoctus a stomacho succus, ab imbecillitate iecoris, in summū seu ad caput facile ascendit, & iterum defluit. Euenit interdū in acutis febribus, ex innaturali feruore, cum antequam digeratur a naturali calore, naturali opere inuentum verti necesse sit. Iam etiam tympanites, ut plurimū inflato lieni euenit: quoniam membrum rarum est, fungosum, humoris incocti receptaculum. In ventre eodem modo continetur, ut in ascite humor, nec sine aqua is spiritus inuenitur: sub peritonæo enim fumus ille partim in aquam cogitur, partim sub forma fumi remanet derelictus. Ceterum robur ventri addimus, ex his, quæ supra sunt posita de ventriculi imbecillitate, & de eiusdem ventositate. Hepar roboramus cum diarrhod. abb. & diacurcumas quæ ad

7

Curatio tympania.

quæ ad lienem faciunt dicemus lib. sequenti. De
 vitis lienis. Quod si ab utero radix sit inflationis
 ut sæpe fit, remedia præcipue ipsis fiant, quæ spe-
 ciatim de uteri inflatione dicturi sumus. In sum-
 ma, pessis utemur, ex gallia muscata, ladano compo-
 sitis & Ziberto: Utemur & scissionibus earundem
 virium, & fotu. Si ex febre fiat, vel ea ipsa adsit, mo-
 do febris, modo hydropis rationem habere oportet,
 ut scholio Obseru. 35. huius libri abunde ex mente
 Tralliani & aliorum docuimus. Sed & illud de hy-
 dropis curatione obseruandum, quod sæpe multi
 sunt affectus, ac miscere curandi rationes oportet,
 ut aliquando omnium notæ mixtæ apparent: per-
 petuo tamen alicuius ex his notæ apparent. Ideo
 Rhases in primis curationem ponit ascitis, quæ
 cum affectu calido iungitur: atque exigua qui-
 dem adfert remedia, hanc ob causam, ut arbitror,
 quod eandem omnino difficilem vel plane despe-
 ratam iudicat. Remedia tamē vehementia adfert,
 ut pilul. de habarb nimis fortes ob thymelææ folia &
 fructum. Si vero talia signa non sunt, dat pilulas de
 mezeo dictas, & emplastro utitur ad venterem: &
 ea propinat, quæ urinas mouent. Postremo tym-
 paniam curat victus ratione, & electuaria & em-
 plastra adhibet, & clysteria. Quidam in tympanite
 vehementia cathartica vitanda esse volunt, quib.
 venter augetur: aquam tamen, quam vnā cum fla-
 tu permixtam aiunt, per aluum educendā volunt:
 qui spiritus inde generatur. Et laudant pilulas sa-
 gopenas, quæ valde aperiunt, & ad ventositates fa-
 ciunt, & menses promouent. Quod ad extrinseca
 remedia attinet, alii sacculos toti ventri apponūt:
 qualis hic est. ℞ milii, salis, & fursuris an. m. j. sem.
 anisi apii, fœniculi, dauci, cumini. ana. ℥ij. flor. cha-
 mameli, meliloti & fœnugr. an. ℥iij. folior. ruta, lau-
 ri, pulegi. an. m. ℥. contundenda contundantur, &
 fiant sacculi, qui calefacti in latere ignito, vino al-
 bo insperso, applicentur, & sæpius iterentur. Præ-
 terea etiam cucurbitulas leues crebro toti ventri
 affigendas esse volunt, ut Paulus quoque iubet, mox
 & cataplasmata, de quibus diximus (& mox etiam
 ostendemus in Obseru. sequentibus) quæ flatus discu-
 tiunt, commode apponunt.

OBSERVATIO XLIV.

De intestinis in scrotum prolapsis, cum
 hydrope.

R vpturam adeo ingentem patiebatur, pauper,
 intestinis in scrotum prolapsis, fere per men-
 ses duos, ita ut nullo modo intestina in locum re-
 duci possent, multis tentatis remediis, iisque di-
 uersis etiam a vulgaribus adhibitis. Purgationibus
 quoque variis ad rem non facientibus usus: adeo ut
 venter in insignem molem excreuerit, tanquam
 disrumperetur. Torquebatur autem insigni do-
 lore, non sine febre: inquietus erat, ut nullo mo-
 do ob ventris extensionem atque torsionem dor-
 mire posset. Tandem æger ad restim deductus ad-
 vocat chirurgum. Chirurgus vero me vocat, cum
 nihil auxilii superesse videretur. Eundem acce-
 dens, reperi ventrem tympani modo inflatum,
 non sine hydrope. Ceterum quicquid sumebat
 per os, reiciebat: alium pluribus diebus non red-

diderat. Cum parum spei superesset, sequentem
 clysterem, ut statim iniicerent, iubeo, qui & in hūc
 modum 3. die Octobris anno 1594. paratus erat.
 ℞ rad. altheæ mund. ℥j. foliorum mercurialis, pa-
 rietaria, malua, betæ. ana. m. j. flor. chamomilla, me-
 liloti, summitatum anethi. ana. p. j. semin. anisi, fœni-
 culi, carui. an. ℥j. ℥. coquantur, ita aqua communi. q.
 s. huius colatura accipe lb. j. adde benedictæ laxat.
 diaphœnici. an. ℥℥. diacatholici ℥ij. ℥. olei chamo-
 mill. anethini. an. ℥j. ℥. salis communis triti. ℥j. sa-
 lis gemma. ℥℥. misce fiat clyster. Bis ex eo ventrem
 deposuit, fecibus tantum eductis, & simul multis
 ventositatibus reiectis. Vnde dolor ventris non-
 nihil fuit sopitus, ita ut nocte sequenti melius dor-
 mierit. At ventris moles nullo modo detumuit.
 Die vero sequenti rursus dolor hominem multo
 grauius torquebat & conficiebat. Quare rursus
 clyster iniectus est, quamuis eundem nō retinue-
 rit, & is ultro effluerit, stercore adhuc retento:
 Mox alio immisso, quem retinuit, alium postea
 mediocriter excreuit, at non copiose. Die quinto
 Octobris potionem sequentem sumxit. ℞ Dia-
 phœnici ℥℥. aqua florum chamomilla, agrimonie. a-
 na ℥j. misce fiat potio. at nihil eduxit, nisi sub vespe-
 ram, glande sequenti immissa. ℞ pul. specier. hie-
 rapicræ ℥j. trochis albandal. ℥j. ℥. salis parum, mel-
 lis q. s. fiat suppos. Interea totum ventrem hoc vn-
 guento inungebat. ℞ ung. Agrippæ ℥j. ℥. succi sam-
 buci ℥℥. ebulliant in duplici vase, ad consumptionem
 succi, & fiat linimentum. Sexto Octobris sequens
 apozema præscriptum, & simul fotum pro scro-
 to, ut melius intestina reducerentur. ℞ rad. ebuli,
 iridis petros fœniculi, asparagi. an. ℥j. agrimonie, cas-
 sue, capill. ven. polytrichi, ceterach. ana. m. j. folior.
 sambuci. m. ℥. soldanella ℥j. ℥. folior. senæ a stipitibus
 repurg. ℥j. polypodii querc. ℥vj. sem. cartami parum
 contusi ℥℥. sem. anisi, fœniculi. an. ℥j. uuar. pass. mund.
 ℥j. sem. cucumeris melonum. ana. ℥j. ℥. fiat omnium
 decoctio in aqua communi, pro ix. colatura adde syrup.
 de eupatorio ℥j. ℥. syr. de byzantiis ℥℥. misce fiat apo-
 zema pro iij. dosibus. Fotus vero hic erat. ℞ radic.
 altheæ mundata ℥j. ℥. caput. unum lilii albi. florum
 chamomilla, meliloti, malua. an. m. j. sem. lini. ℥ij. se-
 min. malua ℥j. ℥. fiat decoctum in aqua communi pro
 lb. ij. pro fotu seu fomento. Cum duas doses decocti
 superscripti accepisset, nihil quicquam excreuit,
 ac tertia dosi sumta, & simul glande imposita, se-
 primo die Octobris, alius ita enormiter soluta est,
 ut prius stercora dura, mox liquida reddiderit,
 ventositatibus simul emissis, & ut tam magnam
 copiam aquæ inferiora profuderit, idque conti-
 nuo, ut tandem venter detumuerit miraculi in-
 star, præter omnium astantium opinionem, cum
 morti proximus videretur, & intestina in locum
 deducta fuere, & ita hic homo sepulcro, quasi
 in vitam reuocatus. Tale erat suppositorium.
 ℞ trochis. albandal. & ij. pulue. hierapicræ ℥j. sa-
 lis parum, mellis q. s. fiat suppositorum tenue ob-
 longius. Fece igitur dura educta, cum iam ter
 potionem sumisset, demum venter ita enormiter
 solutus est. At intestinis reductis in scrotum, im-
 peraui ut subligaculo ferreo continuo vteretur,

ne amplius intestina in scrotum prolaberentur. Aqua ita copiose per secessum effluente, moles ventris in totum subsidit: & curatus est.

S C H O L I A.

IN simili casu, & præcipue in hydrope, longa experientia didici folia sambuci in decoctis eiusmodi adiecta, egregie aquam ducere: quod & ebullus quoque præstat, teste Dios. lib. 4. cap. 165. Eadem, inquit, virisque vis, & usus exsiccans, alio detrahens aquam stomacho inutilis. Folia olerum modo coquantur, ad pituitam bilemque detrahendam, caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt, radix in vino decocta. & in cibis data, hydropicos adiuuat. Soldanella quidem, seu brassica marina, stomacho inimica, acris, vehementissime aluum mouet in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum a pingui carne: fluas enim & hydropicorum aquas & pituitas educit. Copiose apud nos nascitur in Zelandia.

OBSERVATIO XLV.

De tympanite, multo tempore per durante, & tandem mortem inferente.

VXor Petri Theodorici Ianionis Delphensis, cū ultra duos annos tympania laborasset, variisq; remediis tam muliercularum quam empiricorum vteretur, tandem cum nulla præsidia iuauerent, & indices magis venter extuberaret, nostram opem implorauit, nunquid præsidii superesset. Ad quam cum intrassem, hæc signa cum aduerterem adesse, sanitatem nolui promittere, sed tantum meam diligentiam, cum malum adeo progressum esset, vt vix aliqua spes in tam magno malo recuperandæ sanitatis adesset. Venter enim in magnam molem excreuerat, vt vix similem casum in vita viderimus: erat enim mulier vtcunque procera, & venter ita eminebat, vt dirumpi videretur: cutis ipsius ventris arida plurimum intendebatur: & tympani modo venter manu mea impulsus sonabat: vnde & huic malo (vt antea ostensum est) nomen inditum. Cetera membra arefacta, & supra modum extenuata squalabant. Deinde & huic mulieri ructus crebri, & ventris crepitus, qui plurimum videbatur ex parte iuuare, licet venter iis tamen non detumesceret, & iacere corpus distentum manebat, etiam resupina. Ex quibus signis facile cognouimus tympanitem esse, sed iam confirmatam: nam longo tempore hoc malo detenta fuerat, vt malum exstirpare eo minus posset. Verum illa instante tum amicis ipsis, hæc infra scripta remedia præscripsimus: in primis, cum minime febricitaret, victum attenuantem, ad calidum & liccum mediocriter inclinantem: & vt ab iis abstineret obsoniis, quæ flatulenta essent, aut flatus inferre possent: quem victum agre ad longum tempus obseruare potuit. 28. Septemb. ann. 1577. ad eam accitus, hoc decoctum descripsi: nam licet spiritus flatuosus superabundaret, non erat tamen absq; aqua, quæ per aluum deducenda erat, ita vt etiam simul ad ventositates expellendas cōduceret. ℞ rad. iros. ʒj. corticum rad. fœniculi, petrosapii. an. ʒj. agrimonia, calamintina, cnsuta, me-

lissa soldanella, ceterach, scolopēd. vulg. an. m. j. flor. chamomil. p. j. sem. dauci, fœnic. carui, petros. an. ʒj. B. folior. sene Alexan. ʒj. B. turbit. selecti gummosi ʒij. B. sem. cartamiparum contusi, polypod. quer. ana. ʒj. B. rhab. selecti. ʒj. agar. fœmi. albi lenis ʒj. B. schœnanthi. ʒij. albi, spica an. ʒj. B. vuar. passul. enucleat. ʒj. liquir. rasa ʒij. coquantur in trib. partibus vini Pistaciensis, & vna parte aquæ communis, pro ℞. j. stent infusa per noctem. mane fortiss. expressioni adde syr. de eupatorio. ʒij. arom. cum ʒj. B. cinamomi electi, & fiat ad modum clareti, pro ℞. dosibus matutinis. quibus multa aquosa reddidit, vna ventositates expellendo, vt venter aliquo modo diminueretur. Postea iteratum fuit decoctum, impositus ʒj. folior. mezerionis præparatorum. Interea sumebat omni mane ante cibum. ʒij. vel ʒij. diacymini. & fuit hoc modo rursus purgata. ℞ diaphœnici ʒij. dissolue cum ʒij. decoct. vltimo descripti. & habuit plus, quam octo sedes valde copiosas, cū maximo iuuamine. Deinde rursus sumebat ex diacumino. Postea 8. die Octob. ita demum fuit purgata. ℞ diaphœnici ʒj. dissolu. cum ʒij. aquæ flor. chamomille, addendo syr. de eupatorio, ʒj. misc. egregie profuit. 9. Octob. hoc elect. in tabu. præscriptum. ℞ spec. dialacca, diacurcume spec. diacumini. an. ʒij. dissolu. in aqua agrimon. adiect. ʒij. ℞ acch. fiat confectio in tabulis. dosi omni mane ante cibum & ante cenam ʒij. vel ʒj. 11. Octob. hoc decoctum præscripsimus. ℞ pulegi. sabina, ceterach. agrimonia, cnsuta, soldanella. an. m. j. rad. iros. ʒj. corticum rad. fœniculi, apii. an. ʒj. B. rad. lappæ ʒj. ligni sancti, seu hagioxyli ʒj. B. sem. anisi, dauci, carui, fœniculi. ana. ʒj. B. spica ʒj. vuar. passul. enucleat. ʒj. coquantur in aqua communi. pro ℞. j. colatura arom. cum ʒij. B. cinamomi electi, addendo syr. de eupatorio ʒij. misc. fiat apozema, ad modum clareti. 14. Octob. hæc tabulæ præscriptæ. ℞ specier. diacalamintina, diacymini, dialacca. ana. ʒj. diacurcu. diacireos. ana. ʒj. dissolutis in aqua flor. chamomill. adiecto ℞ acch. albi. q. s. fiat confectio in tabulis. Rursus præscripto decocto superiori, & exhibito diaphœnicone, cum venter aliquo modo laxaretur, breui rursus in tumorem crescebat. Libentissime clysteres adhibuissim, maxime huic hydropi accommodos, sed noluit admittere: & tandem tædio medicamentorū affecta est, quanquā etiam ventrem inunxerimus vnguento infra scripto. ℞ vnguenti martiari, emplastri de melstoto, olei castani. an. ʒj. misc. Et tale cataplasma toti ventri imponerem, quod constabat ex emplastro de baccis lauri, cum triplo pondere cyperi, etiam adiuncto stercore bouillo q. s. ad formam emplastri, quod toti ventri apponebatur intersutum cerati instar. Postea nulla remedia amplius admittere voluit: & quanquam longo tempore superuixerit, tamen, vt prognosticū feceram, tandem obiit. Sic quoq; ex tympanite, anno 1580. interiit Hadrianus Alovvinus, Delphius ceruisiarius, quū vna cum Bontio professore apud Lugdunum Batonorum, mortē amicis prædixissemus. Quare etiam ager nos reliquit, assumtis duobus Paracelsistis iactatoribus, eisdem intra 14. dies sanitatem promittentibus. Atque

que ita idem postea 13. die, magna cum illorum confusione obiit: viris quibusdā cōsularibus hoc tempore dicentibus: Nunc videbimus, quid Paracelsistæ præstent, quod Galenistæ præstare non possent. Quibus tamen respondebamus, quod vere viderent ægrum non diu supernitūrum. Exit, breui morte subsequēte, Galenistas, quos prius contemserant, & debito honore fraudauerant, in arte sua versatos esse iudicarunt.

S C H O L I A.

6 **T**ympanitem omnium specierū periculosissimam esse, communis schola medicorū recte iudicauit: præcipue vbi diu perdurauerit, vti huic mulieri euenerat: quamquam ultra tres annos hoc malo laborarit, antequam ex eo moreretur. Videbatur aliquo modo emplastrum ventri appositum iuuare: sed hoc præsidium, quia erat tædiosum, sicuti & alia omnia, respuebat. Aetius hunc in modum cataplasma componebat. *℞. stercoris capri sextantem: tantundemque stercoris bubuli, & columbini, farina fabacea sesquiunciam, calamintha, salis niri, seminis apii, seminis dauci, sem. fœniculi & eumini, cuiusque unicam vnam, panis aridi quadrantem, mellis sesquiunciam, rherebinthina quadrantem: misce, & vtilor.* Alia vide apud auctores. Interim magna ex parte hoc malum lethale est, si diu durauerit: quemadmodum etiam euenit Heinricho Amio Consuli Delpheni, vti nos vpa cum Bontio illum tractantes prædixeramus.

OBSERVATIO XLVI.

De tympanite ab utero originem habente, & casu admodum mirabili.

Imonis Ioannis, typographi Delphensis, vxor, quæ in foro piscatorio vel prope forum habitabat, post duplicem quartanam, qua per totū autumnum & hyemem laborauerat, & a me curata erat (mulier si quæ altera valde obesa & crassa) bene postea valebat, ac prægnans putabatur: nam & ipsa motum fœtus se sentire dicebat, imo obstetrix illa sagax, & magni nominis hoc tempore apud diuites mulieres Delphenses, cui Salutaris nomen erat, etiam eandem gravidam esse pronuntiabat: quamuis paulo post hæc ipsa de imprægnatione dubitauerit. Ingens moles ventrem totum occuparat, saltus maximus aderat, & murmur quoddam instar flatus hinc inde exaudiebatur aliquādo: atq; mulier hæc ipsa quotidie magis magisque obesa & crassa euadebat, quamuis propria natura, ut paulo ante diximus, valde corpulenta esset: tamen in immensum & enormē tumore venter excreuit. Verū tempus impregnationis & pariendi cum præterisset (decimum enim mensem iam exasserat, quod se gravidam & partū in utero sese habere crederet) tandē & hæc ipsa inordinate febricitauit: ita ut ad eam accedens, cū ventrem adeo tumidū, ut rumpi videretur, cernerē, eumque durū & tympani modo sonū reddentem animaduertērē, si percuteretur: & quod mirum alicui esse poterit, euident saltus nō solū sentiebatur, sed etiam oculis spectabatur, ut etiam in lecto iacenti tegu-

menta eleuarentur: & id magis in imo ventre, cum murmure quodā ac rugitu audiebatur, equidem nil aliud erat, quam spiritus flatuosus, qui sursum ascendebat, ac cor premebat. Ego molā ventosam in vtero esse suspicabar, & vna tympanitē adesse, cū totus venter intumesceret tympani modo, nō sine tamē materia aliqua aquosa, vel potius flatulenta, cum putredine quadā instar molæ, quæ vterū primo occupauerat, mox totū ventrē, & tandē hepatis quoque læsionem inferebat. Nam hoc tempore, cum eandem accessissem, vndecim menses præterierāt, quod menstruæ consuetæ euacuationes non fluxerant neque apertæ fuerāt. Tunc denuo per me accersita obstetrice, iussi ut os vteri tangeret, atque tentaret num durū esset: ea autē respondebat, nec durū esse; & quoq; affirmabat se dubitare, quod grauida non foret, quamq; illud prius affirmauerat. Cum venter vndique in tantā molē excreuisset, ut maiorem in vita nūquam viderim, & multo maiorem, quam in præcedente, in vrbe inter plebeias mulierculas varia de hac muliere opinio subsequuta est: vna referente, quod monstrum pareret: alia vero, quod arbor in ventre excreceret. Deliræ mulierculæ, ut solent, eiusmodi somniabant. Ceterum, quamquā venter durus erat, si tamen fortiter tractaretur, non solum ex tactu validiore manus, venter tremebat, sed & omnia viscera ita mouebantur, ut non solum venter aliquādo videretur attolli, sed operimenta ipsius lecti (ut paulo ante diximus) imo & lectus ipse, in quō decumbebat: & erat talis saltus in corpore, ex spiritu flatuoso (ut opinabar) irruente, tam enormi, ut simile quid in vita non spectauerim. Verum, ut paucis rem ipsam absoluam, cum hæc omnia a mola ventosa fieri indicarem: vel a ventositate instar tympaniæ, ita ut in siccam hydropis speciem confirmatam incideret: tandem medicamenta opportune adhibita meam opinionem postea confirmarunt, ita ut ab iisdem præsidiis pristinam sanitatem, omnibus admirantibus, recuperauerit. Præscripsi multa carminantia in decoctis, quibus quotidie utebatur: toto corpore prius euacuato. Præcipue & hoc sequens. *℞. sem. anisi, fœniculi, carui, ammi, eumini, an. ʒ ij sem. anethi ʒ j ʒ bulliant in aqua artemisia: cuius colatura accipe ʒ viij. addendo syr. de artemis ʒ ij. misce pro duabus dosibus.* Continuo quoque pro potu quotidiano utebatur ceruisia communi, in qua flores chamomille decocti erant: quæ ceruisia adeo profuit, ut admirari satis non potuerimus. Eam quoque per intervalla etiam prius, antequam supradicta lumeret, purgauimus cum decocto simili carminante & purgante; adiectis foliis sene, subinde cum diaphœnico. Ventrem autem primo inungi mandauimus oleo chamæmelino, & anethino: postea & circa pubem etiam oleis & vnguentis calidioribus, postquam a purgatione paulatim & febris illa inordinata cessasset. Postremo ad vteri apertionem dedimus puluerem dominarum, scilicet ʒ j. cum ʒ ij. aqua artemisia. & ʒ j. syrupi artemisia. Istis remediis sepe iteratis, menses aperti sunt, & fluxere. Deinde

tabulis infra scriptis cum perpetuo fere vteretur, miraculi instar venter paulatim detumuit, multasque ventositates per ructus plurimos superius emisit, etiam inferius per ventrem: etiam bombis, quod dictum mirum videtur, ex vtero emissis, qui vna cum murmure ac strepitu erumpebant. Et cum menses aperti fuerunt, multa putida, & ex parte corrupta excreuit; etiam quædam aquosa; idque longo tempore. Tabulæ vero confectæ, tales erant. *℞ specier. diacymini, diacurcumæ, specier. aromat. ros. an. ʒj. cum aqua melissa, adiecto zucharo optimo q. s. fiat confectio in tabulis secundum artem.* Quibus cum vteretur per duos menses, & aliis remediis supradictis sæpe repetitis, præter opinionem omnium, magna cum nostra laude euasit; & adhuc sana viuit, etiam hoc tēpore cum plulquam viginti quatuor anni præterlapso sunt, cum hæc denuo recolligerem, nempe anno 1592. mense Iunio.

S C H O L I A.

6 **S**ive fuerit mola vêtosa matricis, siue tympanites, ut ventositates ab vtero ob menses restrictos originem habens, eandē curationem requirebāt: nempe præter vniuersalem curationē, carminantia, quæ etiam conueniunt in colico ventoso per interius & exterius administrata: in potu n. conferunt calida subtiliantia: & postea etiam emplastra, q̄ simul emolliunt, & menses educunt. Quod si in principio fuisset accitus, cum menses detinebantur, aperuisset venam in talo, nēpe saphe-
7 nam. Sed potius aliis remediis vsus sum, q̄ ad mensium retentionem faciebant: cum & balnea hic conferant, ab umbilico infra, in qua decoct. *mal-
na, alibæ, fœnugraci, ruta sauina, iuniperi, menha-
stri, nasturii, & ante introitū balnei, per duas ho-
ras, exhibeatur ʒj trochisc. de myrrha.* nobis satis fuit *pul. dominarum, cum vino albo veteri etiam ex-
hibitus*, postquam eum dedissemus cum aqua artemisiæ, & syrup. artemisiæ. Et licet mola carnea difficilius sit curationis, quam ventosa, verum-
tamen inflatio si perduret, curam nō recipit, cum sæpe remaneat per totam vitam, & si malitia illius ad vltimum progrediatur, hydropē, nempe timor-
osum tympanitem inducit: uti hic euenit: tamen fuit optime curata, etiam a tympanite, nondum tamen cōfirmata, ut aliæ tympanitæ, de quib. paulo ante diximus. Et ita absoluiimus omnes species & differentias aquæ iuter cutem: & quibus modis vnaquæque species curetur: q̄ & exemplis nonnullis ostendimus. Atque ita affectib. iecoris absolutis, hunc librum finiamus, & a Lienis vitia, morbos & affectus transeamus.

Finit Libri XIX.

LIBER VIGESIMVS, DE LIENIS MORBIS, VITIIS AC AFFECTIBVS.

OBSERVATIO I.

De quodam splenetico seu lienoso.



Vir admodum niger, hirsutus melancholicus, subtristis, a quartana lienē durū habebat grauitatēque in parte fini-

stra quandam percipiebat: sitis eidem vehementior aderat, ac oris siccitas: cui accessit anhelitus difficultas: postea & circumscriptus tumor in hypochondrio sinistro apparuit, & valde durus, ex humore melancholico: mox & pedum inflatio, atq; etiam pudendorū circumspiciebatur, colorque plumbeus: cui & decubitus in sinistrum latus grauis quoq; dolor ad iuiulū sinistrum vsq; tendebat: noctuq; sudor grauis apparebat, & anima fœtebat, ac pudenda turgebant: sanguis huic etiā, ut in scurbuttis, ex gingiuis erumpebat, ut etiam gingiue dentesque magis corrumperebatur in sinistra parte: & venæ ad lienem nigricabant, cum cute squalidiorē, vlceraque maligna in tibiis, & potissimū in sinistra tibia, nascebantur, & cicatrices nigre in cruribus fiebant,) *Imo aliquos tales nominamus, in quibus ob eandem causam pediculi in corpore scatebant.* Hunc autem lienosum, splenicū, vel splenicum iudicauimus: nam horum aliqua vel omnia splenicis ostendunt. Post bolum exhibitum, *ex cassia & catholico an. ʒj. pul. ceterach & cinnamomi electi, an. ʒj. zacch. asperso:* altero die venam saluatellam in manu sinistra secari iussi, mediocriter nigro educto sanguine. A sanguinis de-
tractione hoc decoctum vel simile præscriptum: *℞ rad. petros. cichor. fœnic. apii, macera. in aceto, an. ʒj. ori. rad. cappar. thamarisci, an. ʒj. ceterach, capil. ven. an. m. j. cochlear. m. ʒj. flor. roris m. hyper. geniste, an. p. j. sem. agni casti, and. scariol. portul. acetose, sem. frig. maio. an. ʒj. rad. salicis, fraxini, geniste, an. ʒj.* Hæc n. omnia iam dicta peculiariter conueniunt lienī: præter ea quæ de oppilatione hepatis conscripsimus: & in liene abstinendum ab iis, quæ nimium calefaciunt, nisi frigidis temperetur: ideo sem. frig. incidentibus addenda) *polypodii querc. ʒj. fiat decoct. in aqua com. pro ʒj. ʒj. colat. addendo syr. acetos. simp. capill. ven. de duabus & quinq; rad. de fumo terra, de scolopend. an. ʒj. misce, pro apozemate.* Deinde eundem purgavi sepius cum decocto *epithymi, foliis sene, adiecta confectioe hameck.* Frequens vsus huic erat *capparum, asparagorum, & caulium cinara, & crethami marini maris conditi, & capparum ex sem. geniste.* Quidam & hic cōmendant *lienem bonis crematum in vase testaceo ad ʒj. cum oxymelite exhibitum, aut potionibus inspersum.* Post purgationem commodè exhibui decoctum *bekabungæ & cochlearia, cum syrup. sceletyrbico nostro, ex succo earundem herbarum cum zacchar. parato* (cuius vsum nos primo inuenimus) in sero lactis: ex cuius continuo vsu melius habere cæpit: liene quoque inuncto hoc linimento. *℞. olei de capparibus ʒj. medulla vituli, pinguedinis anatis, ammoniaci in aceto dissoluti, an. ʒij. aceti exiguum, cera q. s. fiat unguentum.* Deinde imposito emplastro de mellilotō, & emplastro de ammoniaco simul permixtis, recte habuit: & vlcera remediis intus sumtis, sæpeque iteratis, facile sunt consolidata.

S C H O L I A.

Lienis naturam, & eius vsum, in præfatione huius libri expoluimus, & in libro nostro de *urinarum incerto iudicio.* Est. n. atræ bilis sedes, & me-

Affectus
lienis.5
Ex sola in-
temperie.

6

& melancholici humori repurgatorium. Vbi autem lien inefficax efficitur, & lutosum a se sanguinem nequit expellere: tunc turget supra modum: unde lienici vel splenitici dicuntur: vel si attrahere non possit, cachexia subsequitur: facile enim lien quoque inflatur, incluso vento, aut sensim atro sanguine crasso intus constipato unde obstructio: facile quoque obstruitur & induratur: subinde & inflamatur, sed rarius, & in abscessum permutatur. Doloribus quoque afficitur, modo ex calida causa, ut phlegmone, quod rarius est: modo ex flatibus, quod frequentius: flatibus autem hi aliquando soli sunt, aliquando vero adiunctum habent superfluum humorē frigidū, id est, qui vincit a calore non possit. Sine dolore vero, vel exiguo: scirrhis tumoribus prehenditur. Etiam nuda intemperie affligitur, ut Aetius docuit, lib. 10. cap. 7. ex Philagrō: Potissimum vero frigidam & humidam sustinet. In frigida, omnis cibus & potus efficaciter refrigerans splenē laedit; constitutio aeris frigida tum alia praecedunt, & aqua frigida admota, vel lotiones frigidae frigidam arguunt splenis intemperie. Frigiditatem quoque ostendunt, cibi tardum, intestinorum murmura, quae in rictus acetosus commouentur, eamque intemperie omnia calida consolantur. Si intemperies calida, solatio eis sunt omnia refrigerantia: sitis adest, lingua arida, flauus corporis color: adest inflammatio in parte sinistra: ita concitata dolent. In sicca, omnia arida nocent, vel deuorata, & aquae marinae praecedentes, aluminosae & sulphurentes & pharmaca exsiccantia. In humida splen increfcit, ut ad ventrē pertingat ac hepar. Calida citra tumorem simplicissimis pharmacis, ac fomentis & irrigationibus corrigitur, ex rosaceo, melino, & ceratis refrigerantibus: frigida calidis, ut vng. nardino, cyprino, decocto pulegi, scorodii, &c. tum aliis medicamentis apud Aetium positus. In humida adhibet salis florem. Reliqua vide apud eundem cap. 7. & 8. ser. 10. & apud Benedictū Veronensem lib. 17. de lienis affect. cap. 2. usque ad cap. 8. in quibus non solum explicatur intemperies nuda, sed & cum materia, & quibus modis curentur: & praecipue lib. 8. cap. 10. apud Alexand. Trallianum: in quo cap. expresse de omnibus affectibus lienis agit. Ceterum, cum exemplum cuiusdam a vitio lienis curati adferat copiosius Beniuēnius cap. 105, a nostro iam dicto parum differens, his adiungere nobis visum est: Lienis (inquit) vitio afficiuntur quamplurimi: horum sinistra pars tumens ac durior prementi renititur. Quod si diu perseuerat (nam interdum perpetuum id malum est) tumescunt crura; & si viscera praeterea innascuntur, vix sanescunt; Multos nos tali vitio affectos curauimus: inter quos vnum, quem cum septennio hoc morbo vexatus, frustra multa consilia, ac pene infinita praesidia expertus fuisset, solo tandem capparī, qui tali aegritudini aptissimus cibus est, solaque vi aquae, in qua faber ferrarius saepe candens terram exstinguit, annua potione liberauimus: tanta scilicet in eiusmodi aqua contra hoc vitium inest vis atque virtus. Unde & compertum est, animalia, quae apud fabros educantur, per quam exiguos habere

lienes. Ceterum cum & illi lienici dicantur, in quibus vires ipsius lienis quaedam aut omnes vitiantur: inde & lienicus, quis fieri dicitur: sicuti stomachici & hepatici dicebantur communi nomenclatione: proprie tamen quidam eos sic appellans, ex Galeno, quibus durus lien est.

OBSERVATIO II.

De lienis obstructione cum tumore eiusdem.

Melancholicus humor si non expurgatur, facile crassescit, ac obstructionē venarum, & articularum gignit: tunc quidem sola grauitas hypochondrii sinistri, interdum & lienis dolor aegrum exercet. Verum excedens, non tantum venas, sed & lienem vniuersum implet atque distendit: dissipataque tenui illi portione, crassior subsidet, & lien totus obstruitur: & quia lien substantia rarus atque laxus, leui occasione distendi potest, quumque sanguinis feci excipiente destinatus sit, hanc omnemque impuritatem admittit: hac imbutus tumet, multo quidem, quam iecur frequentius: ac plerumque sine scirrho. Quod quidem euenit nobili matronae, cui Hester nomen erat uxori Guillemi Sonneveldii, cognati nostri, quae cum obstructione lienis, tum leui tumore, non admodum duro laboraret, consultandi causa, anno 1546. me accessit. Cui contului, ut imprimis aerem serenum quaereret, & temperatum, crasque omnes ex animo expelleret, deambulationes ante cibum admitteret, somnumque in dextrum latus temperatum: verum ut vitaret ventum septentrionalem austrinumque, crassum & pluuosum frigidumque, mororem & continuatam aestiuam, somnum quoque supra sinistrum latus: ita enim tumidum reddi lienem. Suasi quoque, ut a cibariis abstineret, qui ex legumine, milio, panico, & tritico impuro constanti: hac enim damnantur: quemadmodum & oryza, pastilia quaecumque farinacea, placenta, lens, cicer, faba, ac cicerula pisumque. Inter obsonia, bubula vetus caro, ceruina, suilla, ac hircina, vetustaeque lepus, anseres, anates, columbi palumbique vetusti, turturesque veteres, & lac omne fere, casusque vetus, falsus, & ex his condimenta, omniaque dura ac butyro frigida, piscesque palustres & molles cuis, sine squamis, duraque carnis, lienicis nocent: sicuti clibano vel craticula inassata, fructusque stipitici, acerbis as pontici. Castanearum usus, cydoniorumque offendit. Musta inflant lienem, & quaecumque crassa sunt, ac dulcia turbulentaque, & si quod nimium austerum sit: ita & aqua potius nocet: maxime vero a balneo & labore, magisque gelida vel nix iniecta, omniaque mellita, dulcioria ac sacchara, vel in condimentis. Concessi auculas montanas, pullosque gallinaceos, phasianos, perdices, passerculos, & alaudas, cibosque concoctu faciles, attenuantes succumque tenuem generantes: talia enim obstructiones eximunt, ac detergunt. Tum acida ipsa conueniunt, uti & vinum non valde vetus, ac capparēs praecipue. Quod ad medicamenta attinet, haec infra scripta administrata sunt, Rad. cichor. cum rad. ceterach, capill. ven. cassuta, scolopendria vulgaris, seu linguae ceruina; an. m. j. summatum lupul. m. ss. corticum rad. cappar. thamaris. an. 3 ss. se-

minis agnicasti ℥ ij. sem. anisi, carui, an. ℥ j. follicul. sene ℥ j. ℞. epithymi ℥ iij. uuar. pass. ab arill. repur ℥ j. fiat omnium decoctio in aqua com. pro ℔b. j. ℞. adiectis ℥ iij. aceti in decoctione, coletur, colat. adde oxymellis simplicis. syrap. de quinq. rad. & de scolopond. an. ℥ j. misce. Deinde secta est vena lienaris, in manu sinistra: quod egregie profuit. Postea denuo purgata est cum decoct. sene, ceterach. & epith. & similiter etiam cum confectioe bamech, adiect. syrap. de epithymo, & ceratum ex ℥ j. ℞. empl. de melilato, adiecto pul. rad. thamaris. capp. ℥ j. gummi ammoniacis dissoluti in aceto ℥ iij. & olei de cappar. valde exiguum, ad modum cerati lienis impositum est, & pilulae tres ex ammoniaco aceto dissoluto adhibita: & statim post pilulas deglutiendo oxymel. squillitici ℥ j. ℞. Hoc solo vidi præceptorem meum Eliudem Bononiensem in nosocomio vitæ curasse quendam spleneticum, tribus annis eo malo detentum. iussi quoque, ut uteretur vino decoct. rad. filicis: quo & idem præceptor meus uti solebat. Idem dedit Amatus centur. 6. cur. 39. ad splenis duritiem post vniuersalia remedia, ad 20. dies. minuit enim lienem: uti & fatus aceti acerrimi, in quo lapis pyrites, marcasita dictus, candens & ignitus exstinctus fuit: quod acetum spongia vel filtro exceptum, ad Galeni mentem optimum est remedium. Prius tamen, cum hæc mulier esset pituitosa & alba, inunxit lienem iis, quæ tumorem laxiorem reprimerent, nempe oleo rutaceo, & de capparibus, & nardino: verum postea, cum durior lien videretur, utebar supradictis, insequendo vestigia præceptoris nostri: ut ℞. ammoniaci in aceto scyllino dissoluti ℔ j. fiant pilulae iij. supersorbendo oxym. simpl. ℥ j. ℞. postea ℔ ij. & ℥ ij. ℞. oxymel. squillitici supersorbendo. Utebatur in nosocomio etiam hoc vnguento & cerato. ℞. succi bryonia, succi cyclaminis, an. ℔b. j. dialthææ, ammoniaci in aceto dissoluti, olei de cappar. olei amygd. dul. an. ℔b. ℞. omnia in duplici vase bulliant, & adde cera q. s. fiat vnguentum. Subinde addebat præceptor meus & hæc sequentia: ℞. pingued. anseris, mucil. alth. an. ℥ j. pul. thamarisci, ceterach, rad. cappar. rad. filicis, an. ℥ j. resina colophonæ ℥ ij. cera, resina pini, an. q. s. fiat ceratum. Commendabat puluerem thamarisci in furno exsiccati cum cinamomo, in cibis, & in potu dabat puluerem radicis filicis. Quibus & hæc nostra matrona utens egregie se habuit, tum continuo capparum esu cum aceto. Noui vetulam quandam, (cum viginti annis splenetica fuisset) tumore lienis duriusculo laborantem, solo continuo esu capparum conualuisse.

S C H O L I A.

6 **S**æpe autem vena, quæ iocinore ad lienem ducit, magna ex parte obstruitur; vel illa, quæ ad os stomachi fertur, exilior, ex crasso humore vel crasso vëto, vel sanguine ipso crasso diutius ibidem, vel in splene, retento: ex retentrice robusta, aut expultrice infirma: cum enim eo sanguine alatur, & in membri substantiam cõuertatur, quandoq; ita intus inspissatur, ut in miram crescat magnitudinem. Causæ huius oppilationis multiplices, viarum angustia, humoris crassities, aut

viscositas, vel eius exuberantia. Fit & ex pregressis causis, nempe castaneis, fungis, palmis, ficis, melle, musto, piscibus, aqua palustri, legumine, brassica, pastilibus farinaceis, exercitationibus a cibo, balneisque mensuris aut hamorrhoidibus suppressis, ex sanguine melancholico, bile notha, & pituita crassa. Signa communia habentur ex sanguine vitioso per vniuersum corpus distributo, ex colore nigro, ulceribus immedicabilibus, grauitate hypochondrii sinistri, duritie, timore, spiritus difficultate, mœstitia, melancholica, turbulentis insomniis, dolore lateris sinistri. Lienis enim, iuxta Aeginetam, os graue olet, gingivæ putrescunt: neque in cruribus vlcera perlanantur, ut prius dictum est. At attracticem effendit, si iecoris vena ad lienem fuerit constipata, si vero superior vena ad os stomachi, expultrice ledit. Si. n. vis digerendi lædatur, in omnibus partibus oppilatio contingit; ex ea enim compositæ febres, hepatici morbi: nam eo pariter affecto hydrops haud dubie oritur. Aliquādo adest oppilatio sine febre, & sine tumore: tunc totius corporis grauitas, ac magis in sinistro percipitur latere, non sine aliquo dolore. Hic aderat etiam læuis tumor. Ita quoq; si oppilatio orta sit ex febribus, vel si diuturna fuerit, sub sinistris præcordiis apparet durior: tumēt pedes, ac cutis exulceratur, ac post cibum intenduntur præcordia, sequitur anhelitus difficultas actussicula. Ex lienis vero magnitudine corpus macie cõficitur; q̃ in collo euidentius apparet: ex ea iocinoris habitus corrumpitur, & digestiua p̃sertim virtus, oppilata vena ad iecur: corporis totius hilaritas & splendor vitatur, & alia symptomata praua sequuntur. Quæ vero ad os stomachi pertinet si obstruatur, nullū adest cibi desiderium, vomūt atram bilē, acetosam, summa tellure ebullientē ac spumantē, aceti acerrimi modo. Vrina sæpe sani similis emittitur, qui si aliquando fatigetur, oblcuiat reddit: Quod si ex aliis humoribus, ut bile, vniuersum corpus calet, etiā si abest febris, oculi & vrinae per bilem coloratæ aderunt, sitis, cibi fastidium, & vigiliæ: & frigida appetunt. Si a pituita, color albus: non sitiunt, nisi falsa pituita fuerit: cibū fastidiunt, & pocula magis amant: alioqui vrina crassior & turbidior emittitur, rufusq; cum multa salua aquosa, facies decolor, aluus humida, sæpe & membra defatigata a cibo. A sanguine, inter appetentiam ciborum & fastidium medio modo se habent: reliquis magis languēt, venæ sanguine plenæ sunt, & vrina subfuluæ, etsi non parem visceris tumorem habent. Sed hic magis cõtingit ex succo melancholico: ita ut fusco colore visantur: quibus subinde aluus sicca existit: tenuis aliquādo vrina conspicitur: sed cum humor ille ad iecur retrogreditur, tum vrina crassior emittitur, sordidior: lien extenditur, grauiora membra sentiuntur, atro colore suffusa: & acida eructant, & si ex innaturali melancholia, a cibo maior grauitas, incoctæ ruetationes, ventrisq; torsiones, excrementa spumosa cū crepitu multo erumpunt, tum alia antedicta adsunt. Si attractrix male habet, coloris decor amittitur, albū oculi languide fulget. At si facies rubore aliquo suffusa decolor facta fuerit, cum

7
signa communia.Functio
offensa.8
Oppilatio ex febribus.

Mala ex magnitudine lienis.

Ex vena ad hepar oppilata.

Ab aliis humoribus.

9

Causæ oppilationis.

10

Prognost.

11

Curatio.

negligentia

maioris me

ici fere lien.

nam hepar

12

orbi lienis

agnā simi

udinē ha

nt cū mor

hepatis,

cum cibi tædio, ac in liene calor sentiatur: & si vrina spissior ac rutila reddatur, caliditatis nota sunt. Contra ex frigidity facies oculique obfuscantur. & plumbea facies cernitur; parum appetunt, lien ipse frigidior sentitur: vrina, quæ in summo clara est, in imo turbulenta subsidit. De auguriis lienicorum: Lienicus si dolet (*ut ait Hipp.*) adhuc spes est: nam a parte ægra non sentitur dolor, sed a sana, ut scribit Auerrhoes. Lienicus si superuenit dysenteria, in bonum cedere indicavit Hipp. si iudicialiter euenisse constat; tum enim paulatim lien residet atque sponte discutitur, alioquin hydrops sequitur perniciosus, nimio frigore corpus occupante; plurimum enim refert an dysentericus ille flos melancholicus fuerit. Clamat idem auctor, perniciosiorem fieri, si diarrhæam diurnam dysenteria longa sequuta fuerit: & hydrops subinde intercedat, aut henteris; tum lenisrum haberi: si splentici quoque profluuium accesserit sanguinis ac sine dolore albescentes vesicas extulerint, cū cibi tædio, secundo die interitū augurari. Interea, si ex splenis oppilatione febres sunt, pessima symptomata generantur ex ea nisi subito curetur: cū enim iccur pariter afficiat, hydrops haud dubio oboritur. At catarrho obnoxii raro splenici fiunt: nam materia aquosa fluida duritiæ non efficit: sit enim durior splen ex materia crassa & melancholica: & quo durior, eo periculosior: cum & inueterata durities, ut postea docebimus, insanabilis habeatur. Quod ad curationem attinet, & victus ratione, satis constat ex observatione præcedente, quæ vitanda, & quæ conueniant. Quod ad reliqua medicamenta attinet: quæ iocinori subueniunt, eadem ferme lien medentur: verū vehementiora conueniunt, ac asperiora. Sicuti enim membrum sine metu manu comprehendimus, ita remedia tanquam feruili membro & abiecto imponimus: sine vllaque affirmatione omnium experimentis expositus est lien: iccur vero medicamentorum vires reformidat acutas, sicuti aceti acrimonia: spleni vero conducit oxyporis additū. Cauendum est, ne ab alienis remediis obuiis iocinori iniuria non parua fiat. Licet tamen lien initio facile sanatur: verum si negligitur, ita ut obstruatur, aut indurescat, curationem difficilem facit. Opus igitur est (*teste Galeno*) attenuantibus, nec tamen nimium excofacientibus, ne crassior intus humor fiat, ac inextirpabilis: nam styptica admixta inuuant, qualis est capparidis radix, & asplenio. Tale absinthium iocinori existit: eadem cum oxymelite sumpta, tumore lienis discutunt: miro modo valent & acetum, in quo decocta sunt. Bibitur eadem quoque ex vino cocta: & imponitur quoque: ita & absinthium: portulacæ sem. ʒij ex aceto sumite, & plantag. acet. scillitum, & capparidis radix in vino pota. Recte itaque dixit Rondeletius, quod tot & tales morbi sunt in splene, quos & quales in hepate: ut in temperatura, inflammationes, tumores duri, obstructions, & morborum similitum symptomata, ut icteri, hydropes. Quare cum fiant simili modo, etiā simili methodo, & fere eadem materia medica curatur. In hoc tantum differunt, quod morbi splenis valentiora medicamenta desiderant, incidentia, non obstru-

stantiam parit (est enim tenuis & rara) sed ob maiorem terrenam & crassam, quam in se continet. In aperiendo minus vitetur adstringentibus, quia pars minus est principalis, & minus sui conseruatione indicat: quod de remediis internis velim intelligas. Nam quum ad splenis affectus fortissima remedia instituuntur, ad iccur etiā perueniunt, idque lædunt nimis fortiter aperiendo, vel dissoluendo. Differunt & in hoc, quod melancholia in splenis affectibus, præcipue expargatur, bilis in hepatis, in vtriusque vero obstructione, purior, quoniam magna ex parte facit obstructions sua crassitie. Quare eadem medicamenta curabunt intemperiam hepatis & lienis. Inflammatione laborantibus his partibus, in sanguinis missione differunt indicationes, ob situm partis atque in topicorum admotione. Nam in hepate admouetur in dextra parte circa posteriora, si in gibba sit affectus: ad interiora vero, si in caua: in sinistra & infra nothas costas applicantur splenetica. In curatione obstructionum & icteri sola medicamentorum vehementia differunt. Quare & fortissima ad obstructions & icterhos lienis præscripta, erunt splenetica. Item quæ capparides & acetum recipiunt, quæque minus adstringunt, spleni magis sunt accommodata. Quare superfluum esset, ea hic repetere. Id tantum annotare hic oportet, limaturam chalybis, incrementum lienem minueret, ut & aquam fabrorum (*de qua prius diximus*) & semen portulacæ, cum ob eius facilem relaxationem intumescent. Quæ enim constringunt cogendo: substantiam raram minuunt. Aliud etiam notandum est, quod in tumoribus & doloribus splenis status discutientia, ut agnus castus, fœli, apu & petros. semina, siacus ruta, multum iuuant. Colon intestinum spleni alligatur & incumbit, quod in flatibus distentum, & agros & medicos sape fallit. Sed hæc nota discernuntur, quod spleniticus dolor gravis sit: colicus vero distendens, acutus & mobilis: spleniticus in parte una fixus est, in colico totus venter a flatibus distentus: in splenis vero affectibus, sola pars sinistra. Sed hæc omnia exemplis particularibus multo clariora euadent, rursus assumpto exemplo, De obstructione lienis.

OBSERVATIO III.

De obstructione lienis.

Stis diebus quidam cum dolore in fixum in loco lienis, nempe parte sinistra, haberet: & valde melancholicus esset, atque grauitatē in liene sentiret, cibique melancholicis usus esset, & molestia melancholica, somniisque turbulentis vexaretur, homo niger & hirsutus: facile obstructionem in liene esse cognouimus. Cum plenitudo totius corporis adesset, viresque permitterent, & trigessimum annum ageret, tempore autumnii, quo melancholia magis viget: huic post ventris solutionem ex cassia, nempe ʒj. in bolo, adiecto ʒj. trochisc. de capparibus: altero die venam iecorariam vel potius splenicam, in cubito sinistro secari iussimus, lata venæ diductione, ut sanguis crassior efflueret. Quemadmodum etiam in altero in manu sinistra ex saluatella fecimus, cum in cubito minus apparet. Deinde per triduum hoc decoctum

& similibus fere modo curantur: nisi quod splenis validiora desiderat.

Quæ lienem minuunt.

Colici a splenico distinguuntur.

sumebat. ℞ rad. cappar. ℥j. quinquerad. commun.
aperit. in aceto maceraturū, an. ℥℥ summatarum ta-
maricis, hemionitid. ceterach. charnad. chamap. bu-
gloss. cum rad. summitat. lupul. capill. ven. polytrich.
an. m. j. vuar. passul. abaril. repurgat. ℥j. sem. por-
tulaca ℥j. ℥. seminis viticis, fœniculi, an. si, sileris,
apii, an. ℥ij. sem. 4. frig. maior. an. ℥℥. florum ge-
nistep. j. florum cord. m. ℥. follicul. senæ ℥j. ℥. polypod.
querc. ℥vj. coquantur in aqua chalybeata (lienens e-
nim duritiem dirimit) q. s. scilicet pro ℥ix. colatu-
re adde syr. de scolopend. de duabus rad. an. ℥j. ℥. mi-
sce. pro iij. dosibus matutinis. Postea purgatus est, in
hunc modum. ℞ catholici ℥vj. confect. hamach ℥
iij. syr. ex infusos pallid. cum foliis senæ, & syr. de sco-
lopend. an. ℥℥ aqua fumaria ℥iij. misce. Altero die
mane sumebat theriacæ veteris ℥ij. conf. bugloss.
℥ij. dabatur sex horis ante cibum. Deinde rursus
assumpto decocto superscripto, purgationē sum-
sit ex pilulis infra scriptis. ℞ pilul. indarum ℥j. cum
aqua bugloss. fiant pilule vij. sumenda circa noctis di-
midium. Interea adhuc buimus præsidia corro-
borantia lienem, eiusque obstructiones tollen-
tia, tam intus quam extra, ut pulverem diacapp.
cum vino: & has vel similes tabulas. ℞ pul. spe-
cier. diarrhod. abb. ℥ij. diacappar. ℥℥. sem. portul.
sem. viticis, pul. rad. filicis. an. ℥j. zach. q. s. dissolu-
ti in decocto summitatum tamariticis; fiat confe-
ctio in rotul. pōderantib. ℥ij. vna sumatur trib. ho-
ris ante cibum. Mox & hunc fotum lienem adhibui.
℞ flor. chamemeli, meliloti, florum genista, an. p. j.
summitatum anethi m. ℥. ceterach. ruta an. m. j. se-
minis viticis ℥j. coquantur in aqua: vino albo &
aceto æquis portionibus, pro ℥℥ j. & in hoc de-
cocto madefacta spongia & expressa, regio lienis
bis terue mane & vespere ante pastum fouebatur;
atque demum exsiccata, hoc vnguento inunge-
batur. ℞ olei de cappar. lilior. an. ℥℥. olei rute, a-
mygd. dulcium & amar. an. ℥j. bdellii ammoniaci
dissoluti, in aceto, an. ℥ij. seminis agni casti puluer.
ceterach. seminis portul. puluerisat, an. ℥j. croci ℥℥.
aceti & cereæ exiguum, fiat vnguentum. quo inun-
gebatur regio lienis calide, mane & vespere, mox
a fotu: hoc cerato ad linguæ bovis figuram etiam
imposito. ℞ emplastri de meliloto, diachyli ireati
an. ℥j. ℥. cortic. cappar. ceterach. sicci & puluerisati,
an. ℥ij. seminis viticis, rad. tamaricis. an. ℥℥. cum
oleo lilior. q. s. fingatur ceratum. Quibus hic opti-
me se habuit: uti & iuuenis in parte Orientali, his
& similibus curatus est.

S C H O L I A.

4 IN obstructione lienis circumspiciendum, num
obstructio sit a crassis & frigidis humoribus, sine tu-
more; tunc a venesectione abstinendum: & ma-
teria dirigenda cum decoct. charnad. ceterach, a-
grimonia, cuscute, hyssopi, calamintha. rad. irid.
cappar. tamarisci, betonica, agni casti, dulcoretur
cum zacchar. & acetum adiciatur vel oxymel &
purgetur cum hiera Russi, vel decoct. senæ & poly-
pod. adiecto agarico. Si materia sit calida, & adsit
plenitudo, vena secanda erit, ex saluatella, ut
quidam iubent, iuxta Rhaz. etiam ex præcepto Ga-
leni, vel interna sinistri brachii: de qua relatus

agemus de phlegmonelienis. Conuenit & sy. acetos.
cum aqua cichorii, scolopend. end. Et alius soluenda
cum infusor hab. & catholici. & tunc videndum,
num adsit febris, cuius ratio quoque habenda. Hic
valet & oxyzac. cum decoct. end. scariole scolopend.
fumaria. ceterach, & similibus, & alius soluenda
cum cathol. & thamarind. ac rhabab. vel sero ca-
prino, in quo epithymus maduerit. Vbi vero tumor
laxus adest, fortioribus discutientibus & aperien-
tibus, cum adstringentibus calidiorib. opus erit:
etiam exterius. Sed in duriore tumore magis
erit emolliendum, ut postea de scirrho dicemus. Vide
plura de externis remediis, tum evaporationibus
lienem obstructo conuenientibus, & potionibus ad
lienem oppilatum valentibus, lib. 17. cap. 12. apud
Alexandrum Benedictum Veronensem.

OBSERVATIO IV.

De splenis inflatione ac tensione.

1 PEDISSEQUA cuiusdam matronæ nobilis, dolo-
rem ex ventositate lienis patiebatur, post esum
leguminum, castanearum & ficuum. Cum n.
inflatio, iuxta Trallianum, ex spiritu generetur,
quemadmodum & aliis corporis partibus, ita in
liene tumor naturæ contrarius excitatur, id quod
accidit ex leguminū, aut bulborū, aut palmularū,
aut castanearum esu, aut ficuum, vel malorum, vel
mellis dulcis, vel vini usu. Hæc n. omnia non mo-
do lienem inflant spiritu, sed etiam colum, me-
senterium, ventrem & stomachum flatibus disten-
dunt. Facile autem deprehendere licet, an ex cibis
tantum inflatio excitetur. Nam si ex his nihil as-
sumtum fuerit, ad aliam causam morbus refer-
ri debet. Quod si lien flatibus distendatur, & in
amplum tumorem attollatur, & æger interroga-
tus, id se citra pondus & loci ipsius grauitatem su-
stinere, dixerit: tunc ex cibis frigidis malum ac-
cidere cognosces. Quod huic pedissequæ con-
tingebat, cum tumor loci imposita manu ad ta-
ctum cederet, & distensionem loci inferret, ac
cum manu premerem, intus ventus murmura-
ret. Cum autem ex leui causa id malum excite-
tur, facile etiam vincitur. Et ideo dedi huic de-
coctum florum chamomillæ, cum puluere dia-
cymini, cum vino generoso: & fotum exterius
adhibui lienem, in hunc & similem modum. ℞ flo-
rum chamomill. meliloti, summitatum anethi, sam-
suchi, ruta, an. m. j. rad. iridis, cyperi, an. ℥℥ bac-
car. lauri nu. vij. sem. apii, petros. cymini, an. ℥ij. sem.
fœnugraci ℥℥. coquantur in vino Rhenano, aqua &
aceto, an. partibus æqualibus, ad ℥℥. ij. & fiebat fotus
cum spongia. Deinde inungebat vng. sequenti. ℞.
olei liliorum, rutacei, amygd. dulc. an. ℥℥. olei de cap-
par. ℥ij. cereæ exiguum: fiat vnguentum molle. Nam
& altera mulier sola hac inunctione sanata est, su-
mendo per horas duas ℥ij. huius pulueris, cum vi-
no. ℞ diacymini ℥℥. trochisc. de cappar. ℥ij. misce.
& vix per tertiā inunctionem fuit curata. Leuem
hæc duritiem, & oppilationem quandam splenis
sentiebat: sed non aderat materia. Alioqui illam
purgassem. Pharmacopœo cuidam post quartanā
curatam remansit in liene tumor, cum inflatione
in latere

in latere sinistro, ab hypochondrio ad umbilicum usque; ita ut se hydropicum putaret: cui hic sacculus impositus est. *℞. florū chamomilla, meliloti an. m. ij. ruta sicca, absinthii, an. m. ij. folior. lauri m. j. sem. lini ʒ j. anisi, cymini, an. ʒ ij.* fiat sacculus calefactus in vino Gallico, & expressus calide, in quantum sustinere poterat, admotus. Post aliquot dies tumor recessit ex ventre, nonnihil sub hypochondrio manens: qui tamen de loco ad locum movebatur. Ideo sumsit continuo ex electuario sequenti: *diaprasii ʒ j. β. diacymini ʒ β.* quo maximam ventositatem emisit: & inflatio recessit, ac appetitus rediit: difficultate anhelitus etiam cessante: hoc tamen sacculo etiam imposito. *℞. ruta sicca m. ij. folior. lauri, calamintis flor. chamomil. an. m. ij. cymini ʒ β.* fiat sacculus. quem cum ter quaterue apposuisset, ab inflatione omnino curatus fuit.

SCHOLIA.

3 Spiritu saepe Lien intenditur, sicut stomachus aciecur: quæ equidem inflatio (*ut dicebat Aetius 10. c. 9. de inflatione splenis*) aut in ventre oborta ad splenem transfertur, aut in ipso adeo splene generatur. At ubi lien (*teste Tralliano*) ex toto flatibus repletur, fluctuationes, ubi paulo liberaliorem potum assumerit, experitur. Græci fluctuationes clydonas appellat, quando ut in vitrea aqua, ita in ventre copiosior potio sonitum elidit, cum agitur. Ex frigidis autem cibis acidus ructus frequenter prouenit, & post cibos singultus. Quod si nihil horum in ventre contingat, lien autem tendatur, pungaturque: citra aliquam grauitatem, flatuosos spiritus esse putato. Ventosa igitur flatus generatio, *eodem Aetio teste*, ex frigidityte membrorum ipsum producentium contingit. Quare tum ventrem, tum splenem concalfacere oportet, (*presertim his, quibus utrumque membrum est affectum*) atque id tum his, quæ forinsecus imponuntur, tum cibis ac pharmacis, quæ intra corpus deuorantur, perficiendum est. Ventri itaque auxiliabimur, si quidem per consensum sit affectus, diospoliticam cōfectionem exhibendo, atque etiā alias, quæ huic similes existunt. Diospoliticum etiā dat Trallianus, Piper enim & cuminum calefaciunt: ruta flatus discutit, & partem affectam iuuat, humoresque pituitosos imminuit: nitrū ventrem subducit: mel similiter purgat calefacitque, & humores extenuat. Pari modo etiā medicamenta faciunt: diacalaminthes, & diatriopipercon, *eodem auctore*. Nos commode vti sumus & diaprasio, quod & splenetorum angustias paragorizat, & omnium intraneorum vitis prodest, inflationes & torsiones ab eis aufert. Panis vero ac edulia vinumque, quæ in potu sumunt, ex petroselino, aniso, cuminoue similibusque conspergenda sunt, *iuxta Aetium*. Iam quoque melanthium, apii semen, anisum, & petroselinum trita, pani apud pistorum inspergi debent. Tralliano quoque auctore: *Eadem*, inquit & ille, ex vino pota lienis inflationem tollunt. Itaque liene inflato, prædictis potionibus, & epithemate diaspermatū, *ex Aetio & Tralliano*, exterius utendū: modo non adsit durities lienis, alioqui hæc nimium desiccarent, & maiorem duritiem excitarent. Potui vero dare eis

viticis semen torrefactum, petroselinanthium, anisum, non expedit, & si flatibus plenus sit lien, dantur illa ex aceto aut oxymelite, aut posca. Plura videas apud Trallianum, & Benedictum Veronensem lib. 17. c. 20. de lienis inflatione, qui & cucurbitularum usum in lienis aff. & bus commendat. Vehementius enim impactæ plurimum inuant, cum ex alto spiritum extrahant, sed non nisi præcedentibus remediis vniuersalibus, si & humores obstruentes adfuerint.

OBSERVATIO V.

De phlegmone lienis.

Vir ille, qui æstu quodam, tum febre continua, corripiebatur, simul grauitatem cum dolore & distensione hypochondrii sinistri sentiebat; ita ut hic lien proculdubio afficeretur phlegmone, sanguine ad ipsum confluente calido, & satis crasso. Ad hunc cum intrassem accitus, talem victum præscripsimus, qualem sæpius in aliis inflammationibus valere scripsimus, in principio vinū inhibendo; postea in fine aquosum concedendo: in primis diebus solo ptisanæ cremore agrum nutriendo, & etiā panata. Statimque iussimus, ut sanguis ex vena iecoraria cubiti sinistri detraheretur. Et mox a venæ sectione locum dolentē inunximus oleo rosaceo, & chamæmelino, pauco addito aceto. Oportet enim statim a venæ sectione aliquod reprimens apponere, sed neque adeo frigidum, neque valde adstringens: humor enim densatur & stipatur facile. Ideo ea incoqui debent, cum his, quæ incidunt & extenuant humoris crassitiem: cuiusmodi est acetum; quo etiā calido vult Rhases foveri. Sed si vinū austerum vetus, oleo dulci admiscueris, optimum erit fomentum: vel hoc quod rosaceo & aceto constabit; quo nos sæpe feliciter vti sumus. Verum cum post venæ sectionem etiam ea medicamenta conueniant, quæ aluo educendæ idonea sunt lenia tamē eligenda, ex eiusdem Alexandri testimonio, præsertim per initia. Lien etenim per initia purgari potest. Tamen processu temporis validiores purgationes exhiberi possunt, *ut ipse refert*. Hac namque via duntaxat lienis superflua vacuari debent, non per renes, sed superne deiectionum adhibendum, a situ societateque sumta indicatione: *quemadmodum a Gal. 13. method. scriptum inuenitur*, quamuis venter etiam per clysteres assidue elui debeat; & maxime si venæ incidendæ medela relinquitur, *ex Aetii sententia*, & præcipue in morbi initio, vel incremento, *ut inquit Alexander Trallianus*. Verum antequam purgans medicamentum exhibeatur, etiam humor præparari debet ad expulsionem, cum oxymelite, syru. e succo fumarie seu borag. cum decocto melisse, lupul. & similibus. Nos vero tali vti sumus. *℞. rad. cichorii, dentis leonis macerat. in aceto, an. ʒ j. fumarie, summitatum lupul. borag. buglos. viol. hordei mundati, an. m. j. uuar. passul. enucleat. ʒ β.* fiat decoct. in aqua communi. pro ʒ ix. colatura adde oxyzacch. simplicis, oxymel. simplicis syrup. ex succo fumarie, an. ʒ j. misce. fiat apozema pro tribus dosibus. Deinde illum purgaui, in ʒ ij. eiusdem decoct. dissolvens diacatholici, electuarii lenissimi, an. ʒ β. syrup.

ros. solut. ʒ j. misce. fiat potio. detur in aurora. Cum autem alium optime deposuisset, post inunctionem iam dictam, hoc etiam cataplasma vel simile imposuimus. ʒ. farinae hordei ʒ ij. flor. ros. rub. ʒ j. chamemeli, abjinthii, meliloti, an. ʒ ss. cum oleo ros. in maiori quantitate: adiecta exigua portione olei nardini: fiat cataplasma. Verum si caliditas magis intendatur addeimus succum portulacæ, & folia salicis. Postea vero, ubi feruor magis conquiescit, ad medicamenta plus resoluentia transibam. Oportet autem in mali incremento relaxantia siue dissoluentia augere ut latius scholio sequenti agemus. Ideo in unximus oleis sequentibus. ʒ. olei ros. chamomill. liliorum, an. ʒ ss. misce. Vbi enim feruor quiescit, parum ad medicamenta, quæ resoluunt, est transeundum: cauendo semper ne induretur, dissoluentibus. Præterea studendum est, ut robur eius seruetur. Nam ex imbecillitate, si non attrahat, vel non pellat, cacochymum redditur corpus totum, non secus atque in vesica fellea, vel renibus: ideo mistura astringentium eget: sed non æque (ut paulo ante diximus) ac iecur. Interea intus utebatur decocto scolopendri, corticis salicis, fraxini, vit. cis, folior. & sem. & rad. myricæ, cum oxymelle etiam non parum acido, vel horum amulsi. Et utebatur in cibis in ybis coctis ex aceto, & lactucis ob febrem, maxime in principio, cum amplius esset refrigerandum. Postea febre inclinante, decoctis iam dictis utebatur: etiam fotu, ex fœnugræe, sem. lini in posca coctis: additis rad. cappar. foliis maluæ, & ceterach, ac viticis semine. Quibus praesidiis dolor cessauit, & inflammatio resoluta fuit a fotu absque scirrho. A fotu quoque postea in unximus oleo amygd. amar. cui mastichis & cera parum adiunctum esset, & in fine oleo de capparibus. postea diacappar. cum oxyzacch. vel oxymelite: & ad roborationem intus fumendo diarrhod. abbatis. Quibus remediis sanus factus est.

S C H O L I A.

4 **Q**uamuis rarius (teste Alexand. cap. 12. lib. 8.) quam alia viscera lien inflammatione conflatur: interim tamē & ipsum inflammari contingit: ut liquet apud Gal. 6. de loc. affect. & 13. meth. med. & aliis plerisque locis. Et quamquam præcipue fiat ex sang. crasso melancholico, potest etiam ex aliis humoribus fieri, ut ad longum docet idem Alexander Trallianus, nempe sola sanguinis copia in lienem conflata: & tunc dolor cum tumore & tensione urget vehementer, cum multa gravitate: interim obstructio membri tunc excitatur; unde scirrhum & inflammationem plerumque contrahit; interdum etiam sine dolore augebit, durusque efficitur, quod tactu subinde cognoscere possumus. Quippe tangentibus facile apparet: item cum ex mollitie in largiorem molem deductus fuerit: attolliturque adeo, ut super masculos, qui extrinsecus ineumbunt, excrescat. Ego enim sæpius vidi, (inquit Alexander) non solum ventrem & stomachum, sed etiam dextram præcordiorum partem, & pubis pedinem, lienis tumore occupari. Hippocrates memoria prodidit, sanguinis in liene abundantia ventrem indurescere: corpus humoribus vigiliisque extenuari, & faciem emacrescere.

5 **N**am & liene ipso carnes colliquefiant, & magna sitis urget. In primis enim lienis tumor apparet humidior: dum scilicet humor adhuc fluit: ubi vero collectione facta induruerit, necesse est, ut iugulum non sentiat alimentum, & vera in musculis foras prodeant, color melancholicus aut pallidus fiat, & aqua subter eum subsequatur. Vbi biliosus fluxus in liene decumbit, totum corpus calidum esse, & sine febre videtur; oculi tincti sunt; urina copiosiores, ac æque, aut flaua aut rubra existunt; agri subundi: frigidam bibere appetunt; animo sum abiecto; cito fatigant; & habent amarum, cibum fastidiant, & vigiliis torquentur & ventrisurbatione; linguam habent flauam, a qua alia id genus similia, quæ bilem testantur, sustinent. Si humor melancholicus adsit, paulatim in his color melancholicus fieri videtur; præsertim si facta iam inflammatione, cutis & urina nigrior efficitur. In toto corpore bilis atra abundat, gingivæ nigrae apparent: si sitis urget; & agri si frigidam potum assumerint, magis cibum appetunt. **6** **A**si si humor pituitosus in liene collectus inflammationem pepererit, color pallidus, aut eius natura similis inuenitur, oculorum, lingue, & cutis corporis; agri non sitiunt, sed cibos appetunt, si pituita non falsa fuerit in liene. Hoc ergo scire licet, quod ex pituita quoties febris urget, ex bile, tertio die; ex melancholia quarto. Quod ad curationem inflammationis lienis attinet, primum (ut idem docet) utriusque humoris signa considerari oportet; atque sic tandem curatio adhiberi debet. Recidiva, ut videtur, non magna sollicitudine timenda est. Nec pluribus verbis opus est. Nam ubi semel curata fuerit, non facile reuertitur: rarius enim (ut paulo ante diximus) lien inflammatione conflatur. Hoc autem observandum est, ut pro humoris natura, ex quo generata est, conueniens, non autem contraria, adhibeatur curatio. Num enim cibi potusque aliqui morbo occasionem dederint, aut aliquid extrinsecus accesserit, omnia internoscere oportet: similiter ut si ne agri fuerint, ac exercitii ac labore se fatigaverint, an balneis frequenter, aut nunquam usi sint: & an ex accidente, an a parentibus hunc affectum sustineant. His diligenter examinatis, si inflammatio lienem exerceat, primum sanguis detrahatur, deinde purgationes adhibere, postea medicamenta extrinsecus imponi debent. De quibus videas eundem Alexandrum Trallianum lib. 8. cap. 12. de lienis affectibus. & Aetium serm. 10. cap. 10. de splenis inflammatione. Sed hæc omnia exemplis particularibus multo illustriora apparebunt.

O B S E R V A T I O VI.

De inflammatione lienis, ex sanguine crasso melancholico.

Rarissime ex sanguine optimo, ac mediocrē crassitudinem habente, ipsam inflammationem in liene oriri contingit: sed sæpius ex sanguine crassiore excitatur, fœculento, limolo, ac crasso: unde & inflammationes facile duriores fiunt, ob humorum crassitiem: hinc & dolor sinistri hypochondrii, ac etiam feruor, distensio & tumor, & multa gravitas vehementer vigens, statim apparent: & tumor ob duritiem facile tangendo deprehenditur: ex Galeni sententia, præsertim pro-

processu temporis, ut ab hinc aliquot annis in viro quodam decumbente animaduertimus. Sed hic statim, eo quod erat ex humore crasso, & in alio quodam viro, ad quem acciti sumus, etiam levis durities apparuit. Has notas itaq; considerantes, hoc modo curationē institimus; similem victum instituendo, quem in ceteris inflammationibus nunc utilem diximus: etiam cremore prisanæ tum aliis vtens, ut in priore ægro fecimus. Venamque statim ex saluatella manus sinistra incidere feci, cum magis appareret. Quod si venæ sectio omnibus visceribus inflammatis præsentissimum est remedium (*testante Tralliano*) maxime certe in lienis inflammatione adhibenda est: si nihil contra suadeat, nempe ætas, aut vires, aut locus, aut consuetudo, aut aeris constitutio, aut præcedēs ciborum cruditas, aut magnum ventris profluvium. Hæc enim sola in ista causa dilationem luadent. Sin autem ætas, aut vires non prohibeant, venam brachii sinistra interiorē secabis: si ea non appareat, media ferienda est: si ne illa quidem in cōspectum proneniat, humeraria cadenda est: si nec ipsa quoque conspiciatur, ea, quæ minimo digito vicina est, aperiri debet. Rhæzes etiam ex saluatella sinistra manus sanguinem dedit. Quod vero huius venæ in extrema manu existentis, sectio conferat pro lienis inflammati curatione, confirmavit Paulus. Id quod forte innuere voluit Galenus in lib. de curatione per venæ sectionem. Quamquam quidam negativè literè legant: nam 13. method. secatur venam cubiti sinistra. Et si vero ex saluatella, inquit Trallianus, minus sanguis euacuetur: tamen quantulumcumque inde tentata inanitio præcipuum lienis ad sanitatem adiumentum est.

Cum sanguis fluit, attendendus est, valde ne rubeus sit, & purus aut liuidus. Nam si liuidus est, aut equo rubentior, copiosior auferri: si purus ac syncerus, paucior debet. Verum sic extrahendus, ne vitalis facultas deficiat. Ideo præstat aliquando non semel quantum conveniat extraxisse, sed in duos dies id partiri satius est, ut Galenus refert. Deinde alium altero die leuiter expurgauimus cum decocto senæ & ephymæ: addendo cassiæ recens tractæ ℥ ℥. & diapruni ac elect. lenitini, an. ℥ ij. misc. Mox & hunc syrupum propinauimus. ℥ syr. de fumoteræ: viol. de ephymæ, an. ℥ j. aquæ buglosse, lupul. cicchor. an. ℥ ij. de ur. diab. vicibus. Postea purgavi hoc modo. ℥ diacathol. ℥ vj. diasenæ ℥ ij. diaprun. soluti in ℥ j. cum aqua decoct. borag. buglosse, fumariæ, scolopend. ℥ iij. fiat potus: addendo ℥ ℥ oxymellis simplicis. Interea statim a purgatione priori, ad extrinseca medicamenta peruenimus, quæ citra euidentem calorem extenuarent: admixtis quibusdam adstringentibus, iuxta Pauli doctrinam: nam ea mixte qualitatis esse debent, non solum in generatione phlegmonis, sed etiam cum nec cessat amplius quicquam: quamquam si quis in principio repellentibus tantum vtatur, non peccet, Galenus auctore 13. method. med. Communis tamen indicatio (ut idem inquit) omnibus his partibus, quarum munus eiusmodi est, ut toti corpori sit ex usu, est, ut medicamenta exigant, quæ mixtæ fa-

cultatis sint. Et propterea nec lienem tantum relaxantibus curare oportet, cum hic quoque ex incinore quicquid limosi & melancholici est, expurgetur; propterea scilicet, quod ex eo humore nutritur. Quinimo semper eius robori consulendum est, aduiciendo relaxantibus astringentia medicamenta, eodem Galeno & Alexand. testibus. Primo itaq; hunc forum, vel similem, adhibui statim ab initio. ℥ vini austeri veteris lb. j. olei dulcis, olei ros. cotoneorum, olei chamomill. an. ℥ ℥. aceti optimi ℥ j. lana succida excepto medicamento (ut Aet. suadet) vel lienis linteis sæpius sinistrum hypochondrium fouebamus: etiam hoc linimento (vel eius æmulo) inungendo post fotum. ℥ olei anethini, rosacei, cotoneor. an. ℥ ℥. paucis vino ac cera adiecta: fiat unguentum. Imposito hoc vel simili quoq; cataplasmate, ex Actio, ex hordeacea & loliacea farina, cum posca, & mellis ac olei omnino paucissima mēsurā, in quibus absinthium ac pulegiū incocta essent. Postea, cum paulo durior splen fieret, hoc vel simile cataplasma impolui, ex farina fenugrac. lini, hordei, ana. ℥ j. caricarum, aceto acerrimo maceratarum, num. v. adipis anseris, & butyr. recentis, an. ℥ ℥. olei chamomill. cotoneor. lilior. an. q. s. fiat cataplasma. exiguo oxymelite adiecto. Quibus dolor cessauit: & curatus fuit: ut neque in scirrhum transmutaretur, neque ad suppurationem veniret, quod tamen rarius contingit.

S C H O L I A

Verum, quod iam fere omissum est, cum hic laboraret lienis inflammatione, & quarto die sanguis quidem e sinistra nare eruperet, magnam attulit utilitatem. Nam quibuscunque hæc eruptio sanguinis accidit, summum id commodum laborantibus affert: quemadmodum Hippocrates memoriæ prodidit: quibus vero contra euenit, nihil iuuat, aut etiam interdum nocet, quod vires citra morbi leuamen deiciat atque exsoluat, ut lib. de curat. ration. per venæ sectionem, a Galeno scriptum est. Hæc enim ad prognostica signa pertinent, uti & hoc: Licet rarius quam cetera viscera lien inflammatione tentetur, tamen si in eo excitetur, magna cum diligentia curanda erit: alias non solum praua consequentur symptomata, verum etiam temporis processu perniciem causabit: potissimum si eadem in scirrhum vertatur. Ideo cauendum, ut non nisi corpore euacuato calidioribus vtamur: alioqui scirrhi auctores, iuxta Aetium, erimus. Quod si ad permutacionem in suppurationem repat, quod tamen raro contingit, licet aliquando periculum adferat, adiuuare tamen eam oportet, ne plura corpora putrescant: per cataplasmata videlicet, quæ pus producant, de quibus hepatis abscessu manifeste est prædictum. Hepar enim frequentissime abscessum præfert ac exulceratur: lien rarius. Hoc tamen semel in monacha Alcmariana vidimus, quæ abscessum in liene passa, pus per lotiū excreuit, & a me curata fuit: cuius historiam posuimus lib. 4. de feb. pag. 245. Ceterum ea, quæ de hepate diximus, ad splenis curationem hic transumes. Euenit quoque interdum, ut iecoris abscessus in

7
Apostematū
splenis
functio.

Causa.

Curatio
apostematis
splenis.

spleneticum conuertatur: quod in bonum cedit: materia enim ex nobiliori membro ad ignobilius conuertitur. At si e contrario contigerit, perniciosissimum est. Apostema quod totum lienem complet, malo est; e sanguine minus periculosum: durū deterius: vel si membri summā partē compleuerit. Sicuti ex nare sinistra sanguinis profluuiū, ita & p. os fluuium ventris, bonum pronuntiat, si in die iudiciali euenerit, ac signa digestionis materiae antecesserint. At ventris fluxus brevis, ex aliis pariter humorib. bonū auguriū præstat. Vrina vero facī similis, viscosa, dubiū prælagium denunciat. Neoterici vero, & qui Auicennam sequuntur, apostemata lienis penes materiam distinguunt, vel ex sanguine, vel ex aliis humoribus: quamuis plerumq; dura & melancholica existant: rara mollia, pituitosa & biliosa: si ex sanguine crasso facile ad duritiem permutantur; secundum figuram modo rotunda, lata, longa, penes situm. Et ita causæ huius apostematis aliz primitiuz, vt regimen ind. bitum rerum non naturalium, aer crassus, vinum crassum, & quæuis melancholicū succum procreantia; casus, percussio supra latus sinist. um, labor superfl. us in æstate, quo sanguis aduritur, ubique crassi Causæ antecedentes sunt humores ipsi: atque horum signa ex Tralliano adduximus. Si plura de notis distinctis huius desideres, perlege cap. 16. lib. 17. apud Alexan. Benedict. Veronensem. Vide & Arculanum. Hoc præmonito quod quinq; modis, iuxta Arculanum, terminetur: aut enim resoluitur insensibiliter, aut euacuatur sensibiliter, per vomitum, urinam, aut secessum; aut induratur, & sic perpetuo manēs, aut permutatur ad hepar, aut ad alia membra nobilia vel ignobilia, sicut ad cutem: & fit apostema difficilis suppurationis, & subinde icteritia nigra. Aut maturatur ac suppuratur & rumpitur. Signa suppurationis & collectionis constant ex iis quæ de pleuritide & abscessu hepatis diximus. Dū pus fit, fiunt dolores & rigores: & suppuratione perfecta dolores desinunt. Sic etiam phlegmone præcedente si dolor ac feruor quiescant, & durior fiat tumor, scirrhum exspectamus. De quo paulo post dicemus. Quomodo autem apostema splenis seu inflammatio curetur, nūc ex parte diximus. Neoterici & Arculanus, vestigia Auicennæ insequentes, omnium primo rationem habent causæ antecedentis, vtentes & diuersione & euacuatione: secundo vero causæ coniunctæ, in principio vtentes percussiuīs, sed nō adeo puris, ne fiat durities: in augmento vtuntur percussiuīs, mixtis resolutiuīs: in statu & declinatione, resoluētib. modo ad viam resolutionis tendat: si ad maturationē, quod raro contingit (vt diximus) iuuāda erit: alioqui si ad scirrhum & duritiem, tūc curabitur, vt scirrhus, cuius postea exempla adferemus. His adiiciunt & accidentium correctionem. Diuertendi autem & euacuandi intentio perficitur in principio cum venæ sectione. De qua iam dictum est, nempe ex basilica sinistra vel saluatella: alioqui secundum quosdam, ex saphena, si ex mensibus restrictis vel hæmorrhoidibus constrictis euenerit.

At si alius non respondeat, prius præmittunt clysterem, aut leniens medicamentum. A clystere statim venæ sectio peragenda. A leniente per os exhibito, in alterum diem venæ sectio proroganda: quæ magis conuenit in apostematibus calidis, quā frigidis, in quibus hæc ipsa suspecta est. Alioqui etiam in iis, qui nō sustinent venæ sectionem, cucurbitulis cum scarificatione naribus impositis, vel sanguifugis venis hæmorrhoidalibus admotis vtuntur. Alium autem, quod ad purgationem attinet, de qua etiam prius dictum est, molliter soluius epithymi decocto, adiecta cassia vel māna, in materia calida: in frigida agarico, adiecto electuario lenitiuo, in melancholia, diasene & diacatholico. Et si detergētibus opus est, in iis cauemus ab illis, quæ vehementer urinam ciunt. Nec a deiectione largior potus dandus, ne ad iecoris gibbum materia trahatur: tum enim sitire contumit, aut saltem parcius bibere. Iam aliter quoq; syrup. fieri posset, in materia calida ex succo, fumariz, feridis, tenerrimorum foliorum salicis, tamaricis, fraxini interioris corticis, & scolopendris, sem. portulacæ, corticis ramentorum cucurbitæ aridæ, cum zacch. addito aceti momento. In frigido apostemate, salicis eiusdem, & tamaricis tenerrimæ, fraxini, scolopendrii, marrubii, rad. capparis, fœnic. apii, buglossi, eichorii, seris, fumariz, sem. anisi, chamæd. adiecto zacch. & aceto, fac syrup. acetosum. Plura de potionibus & purgationibus vniciq; humori destinatis, vide apud Trallianum & inter neotericos Arculanū. Quod ad topica attinet remedia, Aetius vtitur fotu ex oleo dulci, & vino austero in principio, & si maior sit caliditas oleo rosæ aut omphacino. Alii in materia calida vltro fouent in decocto immerso, & expresso in decocto hordei, salicis, cum aceto, vel oleo rosæ folo, & tertia parte aceti. Vel inungunt cum oleo rosæ & chamæmel. In augmento addunt folia tamaricis, & semen agnicasti. Si magna sit inflammatio, addunt succum portulacæ vel plantaginis, vel vtuntur emplastro ex farina hordei, ros. absinthio, meliloto, scolopendr. In statu addunt schænanthum, cyperum, ceterach, flores geniste, & ficus, cum aceto infus. In declinatione oleum de cappar. ping. vituli, ammoniaci, medull. & ping. anates, & similia. De quibus latius videas & Aetium & Paulum, ac Alexandrum Trallianum, & Alexan. Benedictum cap. 18. lib. 17. quæ ipse ex iisdem autoribus: tū Arculano, mutuatus est. Alioqui auctores, vbi prædicta non sufficiāt ad phœnigmos & vstiones confugiunt. Si ad maturationem tendat, vtendum diachylo: licet maturantia varianda pro diuersitate materiae, vt in calida maluaniscus, farina sem. lini, fœnugræc. ficus pingues, oleum fœsaminum: in frigida, rad. ireos; in melancholia, magis emollientia, & non multum calida, vt mucag. sem. lini, fœnugr. althææ. Vt rumpatur, adde radic. narcissi. cape. Post ruptionem vlcus curandum, vt reliqua vlcera, & detergendum: & postea consolidandum. Si ad duritiem & scirrhum tendat, magis humectandum & mollificandum. Sed de scirrho latius dicemus. Accidētibus vero succurrunt, nempe dolori, per anodyna, vntionib. fo-

10
Topica.

15

mentis, sacculis, emplastris, vesicis: & similibus; & nunquam, nisi coacti, ad stupefacientia perueniunt: *ut ostendamus exemplo sequenti*, tum Scholio, ad maiorem enucleationem doloris ipsius splenis.

OBSERVATIO VII.

De lienis dolore.

Vir quidam quadragenarius, qui a quartana dolorem splenis incurrerat, hoc unguento sequenti optime habuit: quo utebatur, corpore prius repurgato ac euacuato, decocto senæ & epithymo, & aliis convenientibus. *℞ olei rutæ, olei liliorum, de capparibus, an. ʒ. ʒ. succi fraxini, axungie porcine, an. ʒ. iij. pulveris csterach ʒ. j. cera parum: fiat unguentum fluxibile.* Illud etiam, quod ex genista fit, commode adhibetur ad splenis dolorem: etiam ad eiusdem duritiem quod ita fit. *℞ florum genistæ ʒ. vj. butyri Malialis, axungie porcine, an. ʒ. j. terantur simul, & stent in sole: addenda cera parum: fiat unguentum.*

SCHOLIA.

Dolor splenis, qui tristis sensatio existit, per membranam eiusdem plerumq; & non per carnem spongiosam, contingit. Interea hic dolor quintuplex esse potest: *pungens, perforans, extendens, grauians & pulsans.* Pulsans magis contingit in inflammatione, ob multitudinem & magnitudinem arteriarum, quæ sunt ipso: & magis ad arterias pertinent hi dolores. Pungens ad membranam. Grauians ad substantiam eiusdem, ex materia aliqua. Extendens, ad vapores flatulentos, & ventositatem. Proforans, seu mordicans ad ulcerationem. Quidam & hunc dolorem distinguunt, in leuem, obusum, paruum, vehementem, nondiu durantem, diuturnum & agre dissolubilem, ex se incipientem, aut alios morbos consequentem, in corpore sano forte, robusto per naturam, aut debili. Vel distinguunt penes materiã, in immaterialem, vel materialem; idque cum apostemate, vel sine modo cum febre, modo sine ipsa. Sed ille dolor potest esse nuda intemperie, aut a solutione continui, aut utraq; simul, ut in apostemate, vel ab obstructione, inflatione, tumore. Ceterum inflatio ingentes dolores efficit: & qui ex obstructione fit dolor, minime continendus est, cum facile ad apostema transeat, vel tumorem inducat. Tumor hic potest esse non apostematosus siue humoralis, siue ventosus: & nõ est quidem immediata causa doloris, sed solũ mediante mala intemperie, aut solutione continui, sequente extensione. Similiter eius oppilatio doloris causa esse potest. Mala autẽ intemperies, existens causa doloris, aut est calida, frigida, sicca, sine materia, aut cũ materia, ex quocumque humore, magis tamen ex materia melancholica & sanguinea, rari⁹ ex pituitosa & biliosa. Rursus huius malę intemperiei aliquæ causę primitiue, aut plures ex sex rebus non naturalibus aut extraneis: aliquæ corporeæ, & sequentes dominiũ humoris, qui est in ipso, aut eius oppilatione, aut vapores flatulentos. Et quandoq; fit aut fouetur per communitatẽ, aut a toto: sicut in febribus, hydrope, lepra, & similibus, aut a membris particularibus, ut hepate, utero, & aliis. Ad intemperiem

etiã pertinet debilitas splenis: nõ & hæc a duabus causis in genere prouenire potest, aut a mala intemperie, aut a mala compositione, seu a laxitate suę substantię: quamuis & debilitas fiat ob solutionem continui: sed cum medici hoc relinquant chirurgis, pauca de eo admonet. Debilitatur quoque ex apostemate, ulcere: præcipue vero a calida & sicca intemperie, minus ab humida, nisi oppilando & extendendo. Et sic debilitates virtutũ cum sequantur malitiam complexionis, seu intemperiem, & intemperies causa doloris existat: ideo & debilitates sub hoc capite dolorum splenis cõcludunt illi auctores, qui supra Rhasem scripserunt. De causis externis manifestum est, quod & victus ac occurus multum calidi aut frigidi, inducãt intemperiem, & quæcumque multiplicãt vapores crassos, & inhibent resolutionem: ita aer crassus vaporis mixtus, dolorẽ splenis infert: & somnus prolixior, & animi accidentia subtristia, & quicquid humorem melancholicum crassum generat, *vel legumina, faba, lentes, caro bubula, um alia, quæ de melancholia diximus*, hæc splenem afficiunt. Quod autem apostemata dolorem inferant, satis liquet ex supradictis: quamquam hæc differant a tumore & duritie per solutionem cõtinui, quæ est in apostemate: & non in duritie, & tumore non apostematoso. Hæc ipsa distinguuntur penes materiam, & penes figuram. De quibus satis dictum est, a quibus fiant, & quibus signis cognoscantur, & quomodo curentur, in duobus scholiis præcedentibus. Dolor itaq; qui in apostemate contingit, modo causa ablata & apostemate curato, modo anodynis tollitur. Sed q̃ ad signa doloris attinet: quædam præfagiunt dolorem futurum, ut omnes causę potẽtes inducere intemperie ipsius splenis, siue primitiue faciant, siue antecedentes aut corporeæ, ut de aere calfaciente vel in frigidante lienem: quæque oppilationẽ & ventositatẽ in splene inducunt, *ut potus aqua gelida, cibaria melancholica, pedum infrigidatio*: ita de aliis causis, quæque solutionẽ continui vel apostemata præcedant. Ita percussioni præcedenti in loco lienis, subsequetur dolor. Ita in autumno magis expectamus spleneticas aggritudines; & post quartanã & febres diuturnas. Signa demonstratiua per se manifesta sunt, quia adest dolor in sinistro latere, & tristes sunt, ob vapores melancholicos a materia resolutos, & cordi vel cerebro communicatos. Color quoque is mutatur, modo ad citrinũ, viridem, pallidum, vel atrum colorem, iuxta diuersitatem causę efficientis dolorem. Signa etiã causarum, scilicet ex nuda intemperie, satis liquet ex scholio *Observ. 1. huius libri*. Sic frigida patet ex cibo & potu frigido assumto, aqua frigida, ostrea, fructib. pomaceis copiosis, cibisque crudis: calida magis in febribus, sanguine accenso in æstate, & in homine plus iusto calefacto. De quibus vide plura apud *Alexan. Trallianum, & curationẽ etiam scholio iam citato*. Ex intemperie cum humore, qualis humor abundat, in *scholio observ. 2. huius libri* diximus, & *scholio observ. 5.* cum de phlegmone ageremus. Ita ut & obstructionis & phlegmonis signa

In quib. op-
pilatio diffe-
rat, ab apo-
stemate.

Doloris di-
stinctio ex
inflatione.

Distinctio
musculorum
splenis &
colicidoloris.

7

8

9

satis dicta sint: vtriusque mali, tum obstructio-
nis, *ut obseru. 2. & 3.* videre licet: & de phlegmone
seu apostemate egimus. *Obseru. 5. & 6. in scholis*
iisdem. Sed hoc obseruandum, quod oppilationem
ab apostemate hoc modo distinguimus; quoniam in
illa meatus omnes obstruuntur, nec lien violenter
distenditur, & plerumq; sine magno dolore & febre; in
hoc vero, materia in unum congregatur locum, qui
violenter & acriter distenditur, ita ut continens ma-
teria solvatur vel scindatur. Reliqua vero signa op-
pilationis & apostematis, superius dicta sunt:
quamuis & hoc in memoriam reuocandū, quod
oppilatur via, per quam splen recipit melancho-
liam: tunc splen non erit tumidus, tumore ab hu-
more proueniente: imo potius extenuatus. Quā-
do vero oppilatur via, per quam mittitur melan-
cholia ad os stomachi, splen tumidus est, cum me-
lancholiam recipiat, & non expellat: neq; fames
more solito excitatur. Præter iam dicta, ut constat
2. ad Glauco. fit dolor & extensio ex flatibus: & est
morbus frequentissimus. Facile enim, ut prius
dictum est, *obser. 4. & scholio eiusdem huius libri,* a
crassa materia turbida, vapor turbidus & flatus ex-
citantur. Rhases de hoc affectu egit, cum ait: Si
splenensus fuerit, & cum tangitur, sentitur rugitus,
id est, sonus flatuosi spiritus collecti circa sinistrum hy-
pochondrium. Hoc modo distinguit Arculanus ab
apostemate, primo quod in inflatione non sit graui-
tas: secundo, quod incessus & exercitium in aposte-
mate, splenem dolore magis afficiant, in ventositate e
contra dolorem sedent & ventositatem resoluunt. Ter-
tio, in inflatione adest rugitus, qui non adest in apo-
stemate, & ructus, per quem ager alleviatur. Quarto
in inflatione non adest febris, quæ apostema comitatur.
Curationem inflationis, loco citato diximus:
quam & Rhases curat, primo diata, quæ ad calidum
& siccum & extenuans tendat; cibos dat minime fla-
tulentos, tenues, concoctus faciles, olera omnia abiicit,
legumina, potum aquæ, vel vini austeri. Propinat tro-
chiscos de capparibus. Extrinsecus apponit emplastrū
ventositatem dissolvens. Plura vide apud Arcula-
num, & quæ prius ad inflationem valere diximus.
Sed his & illud addendum, quod dolor splenis quo-
cunque modo fiat, differt a dolore musculorum, per
tactum externum: si enim muscoli dolent, etiam leni-
ter sit tangantur, ilico dolorem percipit ager. Sed in
splene, dolor statim a cibo sumto communicatur,
& color sæpe mutatur: quod in musculis externis
nō fit: quamuis difficiliter cognoscatur in muscu-
lis profundioribus, quam in iis, qui in superficie
positi sunt: hæc tamen supradicta non aderunt.
Vnde & Bertrutius, medicos iuniores admone-
bat, dicens; Caue ne inflationem musculorum ventris,
vel intestini coli, transeuntis super lienem, indices op-
pilationem splenis, seu apostema. Distingue ergo per
colorem corporis prædictum, & per profunditatem loci,
& urinam albam, subtilem, radiosam, vel rubram cō-
fusam, quoniam ista non apparent in doloribus intesti-
norum vel musculorum. Certius quoq; signum su-
mitur a ventris stypticitate, quæ sequitur & ante-
cedit tales dolores, & a satietate nauseatiua. Qua-
re per resolutionem excalfactoriis, ut plurimum,

soluuntur, ut cum vātris fluxu, aut alui solutione:
quod non statim contingit in apostemate vel
oppilatione splenis. Dolor immaterialis, ex nuda
intemperie, non ita grauitatem habet admixtam,
ut materialis. Sed quibus vnaquæq; intemperies,
siue nuda, siue cum materia, interposcatur, satis ex
locis iam supra citatis cognoscetur. Restat, ut si-
gna tantum debilitatæ virtutis lienis breuiter ex-
plicemus: & hæc plerumq; tria existunt. Primum
est corruptio coloris corporis, & conuersio eiusdem ad
nigredinem, quæ omnium primo & præcipue apparet
in oculorum albuginibus: quod equidem contingit
liene ad se non attrahente melancholiam ab hepate,
neq; in eo purificante sanguinis massam, cum hoc sit
eius proprium officium. Hinc si attractiua virtus de-
bilis est, materia melancholica in toto abundat, & fit
icteritia nigra, de qua prius dictum est. Secundum
signum commune est, prostratio appetitus, ob pau-
cam melancholiam acetosam, quæ transmitti debo-
bat a splene ad os ventriculi, ut appetitum incitaret.
Tertiū est ablatio vel diminutio hæmorrhoidum, quæ
oriuntur a splene ad venas eo derivatas. At si debili-
tas potissimum attractiua sequatur calidā intem-
periem, vel ab ea orta fuerit, signa aderunt calidi-
tatis, quæ sentitur in hypochondrio sinistro: & ci-
trinitas seu ruffedo quædā cum nigredine, in cute
corporis & albuginibus oculorum apparet: nigre-
do enim illa inclinatur ad ruffedinem, cum quadam
claritate: & destructio appetitus adest, cum vrina
spissa & colorata, seu rubea crassa. Si ab intempe-
rie frigida, color liuidus erit, nigredini permix-
tus, nigredine inclinante ad quandam obscurita-
tem circa alba oculorum, & liuiditatem. Et frigi-
ditas in latere sinistro sentitur: neq; adeo destrui-
tur appetitus, ut in causa calida. Vrina modo cla-
ra, modo turbida mingitur, sæpe & glauca, infe-
rius turbida, & clara superius. Quod si eueniat ob
raritatem substantiæ splenis, tūc cum signis com-
munibus prædictis apparet priuatio signorum ca-
lidorum & frigidorum: & quod splen facile lædi-
tur ex quacunque causa, postquam peruenerit ad
membranam inuoluentem: nam eius substantia
caret sensu, eo quod sit membrum carniforme, &
non neruosum. Quod si virtus nimium attrahat,
tunc fit extenuatio in toto, & spleni increfcit, ut
dictum est: sequitur sæpe caliditatem vel apostema
calidum. Si defectus sit in expulsiua, tunc priuatur
appetitu cibi, & promittudine descensus materiæ
melancholicæ ad intestina, si nimium expellat. Si
autem sit defectus in debilitate ipsius in expellen-
do, tunc etiam destruitur appetitus, retenta ma-
teria melancholica in liene. Signum debilitatis re-
tentiæ virtutis, est euacuatio atræ bilis per fluxū
vel vomitum, secundum declinationem humoris
& eius quantitatem; licet fieri potest hoc accidens ex
vigore virtutis expulsiuæ: sed tunc fit euacuatio
cum alleviatione, & plurius quantitatis pro vice, &
periodice. Signa prognostica, quod ad dolorem
attinet, huc transferenda, quæ de prognosticis
obstructionum prius diximus: illud addendo: Si
obstructio lienis remaneat, vel inducta sit post febrē
quartanam, vel etiam febrē erraticam, recidivam
minatur,

10

Dolor mate-
rialis, quo-
modo ab im-
materiali
distingua-
tur.

Signa debi-
tatis virtu-
tis lienis.

11

Signa priua-
ta attracti-
ua debilis.

Signa febr-
stantiarar.

12

Si nimium
attrahat, si-

Defectus
expulsiua.

Signa debi-
latis retē-
tiæ virtu-
tis.

Signa pro-
gnostica.

13 minatur, nisi medicus egregie in sua arte versatus superueniens splenem reddificet. Oppilationi medendum statim, alioqui hepatis infrigidationem infert: hec infrigidatio denuo indigestionem, indigestio autem hydropem periculosam creat. Antiqua vix aut nunquam recipit curationem: ita nec apostema scleroticum. Oppilatio splenis vel hepatis, dum pungit & sentitur, recens est: dum vero non sentitur antiqua & confirmata est, & non curatur, quod tamen potius de scirrhus dicendum. Prognostica apostematis iam diximus. Sed quod ad dolorem attinet, catarrhis obnoxii raro tumore splenis, & per consequens dolore afficiuntur: & spleneticus si cum duritie dolorem sentiat, melius curatur quam si non sentiret. Hemorrhoides fluentes, dolorem splenis sedant, quibus adiungere posses ea, quæ de lienis apostemate retulimus. Quod ad prognostica debilitatis lienis attinet, sciendum, quod debilitas splenis inducat oppilationem hepatis, dum sanguis non mundificatur, & oppilatio digestionem prohibet, dum calorem morificat naturalem, & humorum discursum per sua loca retardat: digestio vero prohibita agnoscat multiplicitatem & ventositatem, & sic tandem hydropem ascitum, vel febrem chronicam perniciosam inducit, cum omni moda appetitus detractione & virtutis nutritiua

14
Prognostica
debilitatis.

Curatio de-
bilitatis.

defectione. Quod ad curationem tam oppilationis, quam inflationis & lienis apostematis, satis superque dictum est, & quibus modis intemperies lienis curetur, & propterea si debilitas splenis contingat ex intemperie calida, per contrarium alteranda: & si adsint humores calidi, prius parati ac alterati educendi cum rhab. & similibus, etiam in principio, si adsit totius repletio, cum venæ sectione, & intemperies nuda tam intus quàm extra alteranda ut satis dictum est, & si adsint humores calidi, post venæ sectionem & purgationem, externa remedia applicanda, qualia ad inflammationem valere scripsimus. Ita quoque si causa frigida nuda intemperies, vel cum humore orta fuerit, ut in præcedentibus dictum est, procedendum erit. Simplex enim cum calidis tam intus quam extra alterabitur: materialis non apostemans, sed oppilans, digeratur oxymelute simpl. syr. de duabus radicibus, & aquis apri, scolopend. absinthii, & purgetur cum agarico. Remotio intemperiei completur diamoscho, dialacca, diacurt. diacapp. & fortibus calidis, ut superius dictum est. At curatio debilitatis splenis ob raritatem substantiæ, neq; requirit sectionem venæ neq; pharmacum solutiuum: sed satis fuerit topica calida styptica adhibuisse, non valde excedentia, qualia de hepatis debilitate recensuimus, uti est oleum mastichinum, cyperu, mastix, spica, nux cupressi, absinthium, calamintha, cort. cappar. ex quibus fiant fots, dentur elect. roborantia, ut diacydon. cum speciebus, nutriatur æger carnibus assis conditis cum vino granat. berberis, succo acetoso, vino styptico, capparibus conditis, & bibat vinum rubrum vel album verus, & tenue; utatur diacapparibus. Valet dialacca ad omnem hepatis & splenis oppilationem, modo febris absit. Ad debilitatem splenis conducit aqua ferrata, elect. de scorïa ferri, & de

limatura chalybis, reliqua vide apud Arculanum. 16
Quomodo dolor curetur ab oppilatione splenis vel inflatione, prius diximus, tum etiam de dolore obtingente in apostemate: nam apostemate curato, & oppilationibus, tum ventositatibus remotis, facile dolor seditur. Interea cum triplex sit cura doloris vna per remotionem causæ, secunda per anodyna, tertia, sed coacta, per stupefactionem: prima curatio manifesta est: ablata enim causa cessat effectus. Sed lienis dolor ex calida causa, salicis foliis tritis, addito sale, sedatur prius: ex frigida, iride, vel ceterach, cum aceto impositis. Si dolor sit ex lapsu vel ictu, vulnere, venæ secta ad chirurgiam confugiendum, de qua nunc non est noster sermo: sed fortasse, si Deus me superstitere fecerit, de his agemus. Quod si dolor non sedetur per remotionem causæ, tunc ad secundam intentionem curandi deueniendum, scilicet per anodyna, vtentes floribus chamomilla, meliloti, anethi, feni. lini, fenug. althææ, parietariæ, quib. propria addenda, ut ceterach, cappares, tamarix, & similia, ex his conficiendo fots, sacculos, vntiones, emplastra, & similia. Quibus si adhuc non sedetur dolor, tunc opus erit tertia intentione, ut perueniamus ad stupefactionem: attamen cum cautione, a minimis incipiendo, sumtis & ad motis, mixtis tamen cum his, quæ spleni propria remedia existunt, ne materia intus retineatur, & scirrhus eueniat. Quod si diuersi affectus fiant, ut si splen frigida, veter vero calida affectione laboret, ex meatu bilario flauam bilem excipiente, bilēq; reiectante, tunc difficilis erit curatio, teste Aetio lib. 10. cap. 14. Splene caloris fots expetente, ventre ac vniuerso corpore refrigeratione indigente, idq; eodem tempore. Tales in tristitia, cura, ira, vehementibus motibus, inedia a malo cibo auocemus, & bilem citra molestiam euacuemus, os ventris roboremus, ne quid influat. Dabimus panem cum oliuis albis, aut colymbadibus dictis, citra vllum potum. Verum ut splen illæsus permaneat, conuenit primum cibos boni succi & actu calidos præbere, postea frigidos, & os ventris corroborantes, & stomacho gratos, ut mala punica: & oleo rosaceo melino stomachum inungemus, spleni epithemata calida iam sæpius dicta, & apud ipsum descripta, apponentes. Quod si etiam tussis infestat, & acris destillatio (eodem teste cap. 15.) splenicis difficilis est curatio; si ex crassis humoribus, eadem. Sed si acris vrgeat destillatio, densanda cum theriaca recenti. Reliqua vide apud eundem. Trallianus utitur diacodio, & spleni applicat epithema extenuans, & pastillo crocode dicto, ex aceto & oleo rosaceo diluto sincypot fouet.

OBSERVATIO VIII.

De scirrhus lienis.

17
Lienem aut oportunitissimum esse ad scirrhum, veluti & iecur (quæquam lien, propterea quod rarioris sit substantia, crebrius scirrhus huius vitii affligatur, propter nutrimenti, quo utitur speciem) a Galeno decretum est, lib. 13. metho. meden. Nutritur autem (ut ante dictum est) crasso sanguine, qui velut limus purioris existit. Scirrhus autem duplicem

originem habet: vel enim per se incipit, vel medicorum imperitia paratur, id quod crebrius accidere consuevit, ubi vehementer inflammationes & erysipelata attingunt, & nimium refrigerant, vel topicis calidis vtuntur, tenui humore resoluti, vt paulo ante recensuimus, duro relicto. Sed vir quidam Alemarianus, melancholicus, cum crasso victu vsus esset, & gelidam aquam bibisset, durus tumor paulatim obortus illi est in hypochondrio sinistro, adeo etiam durus, vt cum tactu facile deprehendere potuerimus, cum ad me curandi causa accessisset. Ante duos menses prius aliquem dolorem senserat, cum quadam gravitate, vt narrabat, sed nunc malum auctum: & sine dolore scirrhi initium esse iudicavi. Cum enim durities lieni accidat, vt tangenti resistat, nec non loci quædam intemperies appareat, copia substantiæ: scirrhum lienis excitat. Nam eidem cum tumor apparet cum duritia, humor ei infixus est, aut flatuosus spiritus (vt antea demonstratum est) aut vtrique simul mixti: vnde lien præter modum augetur, & a naturali recedit magnitudine. Sed humorem & flatum his indiciis ex Tralliano cognoscimus: Si flatus est (vt dictum est prius) tactui resistit pertinaciter, & lien punctiorem tensionemque experitur: si autem gravitas cum pondere in latere ipso percipitur, ex prædictis signis flatus cum humore mixtos in liene esse scias, idque per initia. Nam postea, morbo inueterato, humoribus frigore nimio, aut siccitate induratis, scirrhus generatur: quemadmodum in hoc ægro euenit. Non tamen adeo inueteratus erat, vt vna cum tumore & duritie sub sinistro hypochondrio, os foeteret, gingivæ exederentur, & vlcera in cruribus cicatricem non reciperent, qualia inueteratis scirrhis (& splenicis appellatis) iuxta Paulum & Celsum obuenire solent. Attamen hunc scirrhum esse tumorem, facile intelleximus. Vbi enim cum renitentia, tumore ac duritie, gravitas cum pondere in sinistro hypochondrio percipitur, ex humore lento & crasso (vt hic erat) lieni indurato infixi, tumorem durum ortum iudicabimus, quem proprie scirrhum, seu scirrhum tumorem appellamus. Ideo necessarium erat, vt hic statim remedium adhiberemus, cum hic tumor, ex consentiente nimirum iocinore, potissimum vbi diutinus fuerit, aquam inter cutem generare posset, vt liquet apud Galenum 5. & 6. de locis affectis. Quapropter antequam fieret exquisitus, in curatione laborandum erat: nam exquisitus omnino incurabilis, vt idem Galen. scriptum reliquit 3. de art. curatiua ad Glaucon. Pro eius curatione huic talem victum præscripsimus, qualẽ de scirrho hepatis diximus: nam eadem victus ratio, maioris minorisque dumtaxat ratione differens, (vt idem Galenus testatur 13. meth. medendi) conuenit. Capparis itaque etiam cõtinuum, cum oxymelite, commendauimus, tanquam vtrique visceri vtilem: quamuis nec pari modo, nec similiter habeat oxymel. Nam & ipsa copiosior, & ex minus diluto oxymelite, lieni est utilior. Atq; hæc differentia est, quæ ex maioris minorisue ratione

accepta, vt idem Galenus inquit. Inhibuimus tamen dulcia omnia: nam his tum iecur, tum lien intumescere consuevit. Similiter & vitiosos, maxime vero glutinosos cibos vitandos esse consuluimus. & quod id tantum exhiberentur, qui concocti faciles essent, ac bonum & tenuem succum generarent, & vt simul cum iis offerrentur ea, quæ extenuarent, obstructions tollerent, ac detergerent: acida quoque commendabam, quæ maxime Cello auctore conueniunt. Iubebam quoque, vt potius vino veteri (modo suntus ferre posset) aquæ permixto vteretur, in qua ferrum saepe ignitum sit extinctum, vt laudat Aetius, quam vt ceruiciam crassam biberet, nisi tali aliquando vti vellet, in qua absinthium aut folia tamaricis infusa aut cocta leuiter essent. Et quia febris aberat, cum vitium hoc quies augeat, exercitium & laborem moderatum concedebam, vnctiones, frictiones, & sudores, iuxta Celsum. Plurimum namque fiducia in exercitiis ponendum: quibus ante cibum vti conuenit, corpore superfluitatibus non abundante: ex eorum autem genere ex superabundanti faciunt deambulationes, & cursus. Et noui sane aliquos, qui ex his solis ab omni affectione sint liberati, vt idem Aetius testatur. Sed cum hic splenicus ad me vt curaretur venisset, in memoriam reuocaui historiam illam Tralliani de liene indurato, quæ ita habet: Nouisti, inquit, curatum a me fuisse militem: qui dum ad me veniret, rotam lienis regionem barbaricis ferramentis inustam habebat, quem duobus tribusue diebus medicamentis per os datis purgabam: & deinde diligenter ei curam in singulis conuenientibus remediis offerendis adhibebam. Pisana cremorem quotidie in cibo porrigebam, oxymelite conditum, & pisces saxatiles. Ex auiibus autem gallinas perdices, ac alia concoctu facilia, boni succi, & probe macerata. Prohibebam ei quæcunque viscosos & crassos humores generant: similiter & carnes bouillas, suillas, ouillas, caprinas, & hœdinas: item aues, quæ in aquis palustribus degunt, omnesque pisces palustres, & pelagios: præsertim quæ duras & crassas, non albas carnes obtinent: ad hæc polypos, mulos, sepias, orphos, ostrea, conchas, bulbos, placentas ex melle, & chydro, & quacunque inflant, duræque & crassæ, vel quæ cruda sunt. Vinum improbatum crassum, nigrum adstringens: dandum autem est, quale Hippocrates præcipit, quod neque crassum, neque valde frigidum, neque calidum existat. Hoc igitur modo cibus est administrandus. Pocius vero dabam vinum, in quo capparidis radicem, scolopendrium & myricæ radicem corticem decoxeram: initio quinque singulas herbas simpliciter adhibebam, deinde ex posca aut oxymelite, aut solo aceto coctas: interdum etiam in puluerem redactas, cum supradictis liquoribus, citra coctionem, per intervalla dabam, idque non plus quam duobus vel ternis diebus. Quin & oxymel purum per totam hyemem propinabam: nonnunquam supradictas stirpes decoctas, temperatasque cum aqua calida, ante & post cibum, die & noctu, quandocunque volebat ager, potui offerebam. Vere primum inuente, cum ager multum se recollectisset, & lien decreuisset, videbatur mihi potiones medica-

medicaminum efficaciores prestari debere, qualienem euacuare possent: qui cum magis imminebat fortiora medicamenta adhibebam. Ac mox inter initia veris, sanguinem ex brachio sinistro copiose detrahebam, & post viginti quinque dies, hoc medicamento quod sequitur utebar. Spica nardi, cappar. rad. corticum myrice, folior asslenii herbe squammæ ferri. an. ℥ xvij. myrobalani ℥ x. ammoniaci suffiminis ℥ xvij. polytrichi ℥ vj. scæbad ℥ iij. scolopend. ℥ iij. Singulos drachmas pendentes, ex oxymelite fingebam, ac vinum oxymelite dilutum potui dabam. Postea vero, cum lien probe esset explicatus, medicamenta ad ciendam aluum dabam ac otiosos humores validioribus nempe hiera, diacolocynth. ℥ iij. euacuabam. Incoante iam æstate, non tres drachmas, sed quatuor exhibebam, ita ut a prædictis medicamentis nullo die discederem. Ubi sanitati propemodum esset restitutus, cyclamini rad. ℥ j. ex mulsâ deinceps semel, aut bis post singulas potiones offerebam. Nam ea vitiosos humores ex lunc per sudores expurgat: calidis exterius operimentis medicamine dato iuuandi gratia admotis. Deinde sepe lienem, potione quidem ex scolopendrio & cappare, & epithymatibus quibusdam etiam malacticis, tum alitis, apud eundem longiore sermone descriptis, ut videre poteris, corroborabat: quibus hominem eundem sanitati restituit. Verum quod ad nostrum agrum attinet, eadem victus ratione usus est: venæ sectione omissa, cum non multo sanguine abundaret, & humor magis crassus lieni impactus esset. Quare medicamenta aperientia, extenuantia, incidentia & abstergentia, tam intus quam extra adhibuimus, & quæ simul exterius emollirent, Et sic pro minoratio primo exhibui ℥ j. cassiæ in bolo cū ℥ j. pul. ceterach. Saccharo exiguo conspersam. Deinde ante purgationem corpus ita præparavi. ℥ syr. de scolopend. acetos simplicis, syr. e succo fumarie, ana. ℥ j. ℥ syr. de epithymo, oxymelitis scyllitici (quia hic durities scirrhusa aliquandiu durauerat) an. ℥ j. ℥ aqua bugloss. scolopend. capill. ven. an. ℥ iij. ℥ adiectis ℥ iij. cinamo. select. saporis gratia. Per triduum in diluculo sumantur. Postea eundem ita purgauimus. ℥ diacatholici ℥ vj. confect. hamech. ℥ iij. syr. capill. ven. ℥ j. ℥ cum decoct. communi, addendo polypod. querc. follicul. sena. an. ℥ j. ℥ florum tamaricis. p. j. fiat potio, sumat in aurora. Splenem deinde inunximus vnguento sequenti. ℥ dialibæ ℥ j. olei rutacei, de capparibus. an. ℥ iij. & altero die a potione purgatorio elect. solidum præscripsi, vel huic similes. ℥ specier. diari hod. abb. pulueris diacappar. an. ℥ iij. pulueris ros. nouella ℥ j. Sacch. dissolutum in aqua buglo. scolopend. q. s. fiat elect. solidum. dosis omni mane ℥ iij. i. rib. horis ante cibum. Rursus & hoc decocto utebatur. ℥ rad. cappar. tamarice filicis an. ℥ j. ℥ ceterach. capill. ven. agrimon. filipendule chamæd. an. m. j. sem. portulacæ, agni casti, end. an. ℥ j. ℥ florum geniste p. j. fol. sena, epithymi, polypod. an. ℥ j. ℥ vuar. passul. enucleat. ℥ j. glycyr. ras. ℥ iij. sem. carthami contusi ℥ j. fiat decoct. in aqua communi, pro lb. j. col. addendo syr. de epithymo, de scolopendrio. oxymell. simpl. an. ℥ j. ℥ misc. Deinde hoc vnguento, ut huius æmulo, inungebatur. ℥ olei amygd. dul. amar. lilacei, irini, de cappar. an. ℥ j. succi cen-

taurini minoris ℥ j. ℥ corticum cappar. myrice. an. ℥ iij. adipis asserini, gallinæ. an. ℥ iij. ammoniaci in aceto dissoluti ℥ j. ℥ cera q. s. fiat vng. Interea eundem purgavi hoc modo. ℥ decoct. suprascriptæ ℥ iij. adde confect. hamech ℥ j. ℥ diacathol. ℥ iij. syr. de pomis, oxymel. simplicis, an. ℥ j. ℥ misc. Fiebat & hic fotus. ℥ rad. & folior. alibæ. an. m. j. centaurii minoris, ceterach. an. m. j. corticum rad. cappar. rad. tamarice. an. ℥ j. ℥ bulliant in aceto & olei partibus equalibus, & cum spong. is fiat fotus: quibus sæpius admotis, vnguento suprascripto inungatur, mox & sequenti. ℥ æsypi, axungia gallinæ, olei amygd. dul. an. ℥ j. ℥ olei chamæmelini, de capparibus. an. ℥ j. ℥ misc. mane & vespere ante pastum inungatur. Postea imperavi, ut hoc arcano præceptoris mei Benedicti Fauentini vteretur ad 15. dies, quo omnis splenis durities dissoluitur. ℥ rad. filicis ℥ j. ℥ rad. cuscute ℥ iij. ℥ misc. & bulliant in ℥ viij. vini albi potentis usque ad consumptionem tertie partis vini: deinde coletur, & cu latu- ra patienti detur modo dicto. Interea colophonē huic curationi imponens, ut hoc vnguento regio lienis inungeretur mandavi, quo & alii curati sunt, & magni pretii apud me habetur. ℥ olei capparorum ℥ j. olei lilor. amygd. dul. chamæmelini, butyri recentis. an. ℥ j. ℥ succi bryoniæ, cyclaminis, ana ℥ j. ℥ bulliant olea ad consumptionem succorum, addendo ammoniaci in aceto dissoluti ℥ iij. ℥ pingued. gallinæ, crurum vituli, æsypi humida an. ℥ j. ℥ pul. corticis rad. tamarice, capparor. ceterach. rad. filicis. an. ℥ j. ℥ pul. sem. agni casti geniste. an. ℥ j. ℥ cera parum, fiat vng.

S C H O L I A.

Hic quidem affectus levis initio apparet, adeo ut ne medicum quidem rogēs: sæpe & multis annis perdurat. Noui nobilem quandā matronam, quæ ultra 30. annos duritie lienis laborauerat, & tamen in solitis operationibus non lædebatur, quod nota dignum. Vidi tamē sæpius, licet multis annis perduret, tandem ex eo affectu ad febres longas deuenisse, quæ in tabe aut hydropem transibant, & ad eos morbos nonnullos deduxisse, quos memorauimus ex caco-chymia melancholica euenisse. Lien itaq; facile in scirrhus incidit, siue quod quis ipsum infirmum habeat, quales sæpe experimur, qui crebro doloribus ea parte capiuntur, & leui de causa & errore in victu, ipsis intumescit; siue quod plurimū melancholicum humorē quis gignit, eumque crassum, unde obstructio in eo gignitur primū, mox tumor in vniuersa carne; idque vel quia natura eius corporis talis est, vel quia ex febribus est genitus hic affectus: hinc & quartanarii sæpe lienem durum incurrunt, vel ex victus ratione tum in cibo & potu, tum in exercitiis. Equidem vina nigra & crassa id faciunt: nec non & aquæ palustres lutosæ. Vnde lacchius in sua patria plurimū hūc morbum inueniri dicebat, & circa maritima fere loca. Quod & nos obseruauimus in nostra Batavia, plures hoc malo tētati, ob crassum victum & ceruisam crassam feculentam, & præcipue apud nostros nautas, qui pane nautico (biscoctum vocant) longo tempore mucidum quid redolente vtuntur, & lurido rancido, unde & Scurbuito malo dicto ac lienis duritie affi-

ciuntur, nimirum morbo veteribus incognito, *ut postea de eo dicemus.* Nostrates enim plerique crasso v. & a & melancholico vtuntur. Fit & aliquando ex crisi, natura sequestrante in magnis morbis materiam in liene. *Cur saepe sunt hi tales citrino colore.* An quia expurgatio hepatis debilis est, debilitato viscere per consensum? Causis etenim communes habet cum hepatis scirrhus, & generationis geminos modos, ut diximus, vel ex se per paulatinam collectionem, vel medicorum imperitia, ex inflammationibus male curatis, vel nimium refrigeratis: & eadem prognostica habet cum scirrhu iocinoris: & ideo quae de eo dicta sunt hic referenda. Sed quo ad curationem attinet, id quoque sciendum ex Galen. quod unus scopus generalis sit vacuatio, attamen si quis violenter insistit vacuando, proficiet quidem primum egregie, sed relinquetur contumax aff. & us, qui sanari non poterit. Quamobrē necesse est, ut iungamus ea quae calefaciunt modice & humectant, cum his quae dissolunt. Quoniam vero trassi etiam lapides incidentibus diffingis solent, optimum erit & ad dissoluendum durum tumorem illis uti. Inter haec vero maxime acetum conducit, & ea quae acida sunt, vel tenuium partium, & calida modo non adeo calore participant, ut nimium siccant. Medicamenta itaque ex superscripta methodo ad scirrhum lienis multa nobis comparare possumus, tum ebibita, tum extra applicata. Verum prius hic videndum, num vacuatio per venae sectionem conveniat. Aetius vero commodum hoc esse asserit, si praedicti laborantes multo sanguine abundanti: & tunc in interna sinistri cubiti vena secetur: quamvis multam sanguinis copiam auferri minime velit. Multos id cum Iacchino facere videmus, etiam in saluatella, si hec minus appareat, & Galenus non videtur prohibere: qui in lib. de venae sectione. *Nescio, inquit, cur multi lienosis sanguinem mittere omiserint.* Lienosos vero appellare, eos, lolet, qui scirrhu laborant. Sed ego cum Iacchino credo raro convenire: sed potius purgatione egent, praesertim si iam cacochymii sunt. Secus est inter initia, ubi crassus & melancholicus sanguis abundat: tunc enim vena secta est opus, *ut in lib. de venae sect.* Ratio est, quod in scirrhu est de materia appropriata, non educes, & vires debilitabis: nam iam influxus cessavit. Quod ad medicamenta attinet, cum plura esse possint, ea adferemus, quae nunc magis in usu sunt. Cum itaque primum tumorem dissolvere debeamus: hoc non faciemus, nisi eum prius praeparauerimus *aceto mulso. syr. ex succo fumarie. seu acetoso simplici, & melle rosaceo.*

15 Nam acetum & acetum mulsum huic visceri commoda sunt, utpote secare, & attenuare crassos humores citra calefactionem potentia, *ut inquit Galen. g. de compos. medic. secundum locos.* Vel incipiemus a potionibus: ac primum ex simplici oxymelle, cum scolopendrii veri seu ceterach & betonica decocto, idque per dies 3. vel 4. Postea purgatione aliqua leni utemur, *ut infusione senae, epithymi, & polypodii in sero decocto: sint utriusque 3. ij.* Alii purgans medicamentum propinant, pro ratione re-

dundantis succi: nam pituita redundante, illa exhibent, quae eandem expurgant: si vero melancholicus succus redundet, quae & ipsum expurgant, praebent. Deinde potiones quasdam, ac topica medicamenta, quae induratum splenem curant. Debet autem esse potiones fortissimae: ut & illa quae de foris medicamenta applicantur. Nam eas sine molestia splen tolerat, *ut 2. de art. curat. ad Glanc. a Gal. de cretum est.* E quorum numero primas partes sibi vendicant cortices rad. capparis. & scolopendrium, & myricae rad. atque germina, omnibus huiusmodi in aceto vel oxymelite coctis. Dabimus & trixiginis potionem, tum moranae, tum palustris, quam scordion dicunt, myricae folia addendo, atque haec ex acido oxymelite per plures dies Dissolcant haec & extergunt, & siccant citra vehementem calorem. Attenuantibus itaque opus habet induratus lien pharmacis, citra manifestam caliditatem; cuius gratia valde amara medicamenta ipsi offerimus, ac quaedam ipsis ex austeris miscemus, *ut eo de n. g. de compos. medic. secundum locos scriptum est.* Potui denique ieiuno dari debet absinthium incoctum, ac post cibum aqua a ferrario fibro, in qua candens ferrum subinde exstinctum sit. Hec enim vel praecipue lienem coercet. Quod animadvertum est (*ut antea diximus*) in his animalibus, quae apud hos fabros educata exiguos lienes habent, *ut liquet ex Cels.* Haec aqua, in qua ignitum ferrum saepe sit exstinctum, fabricitantibus sola, non febrientibus vero cum vino, auctoritate Archigenis, a Galen. *g. de compos. medic. secundum locos.* commendatur. Convenientissimum etenim spleni in scirrhum indurato remedium existit ferrum, aqua aut vino, aut posca exstinctum. Ea ipsa enim aqua, aut vinum aut posca in principio exhibitae, iucunda & utilissima existit, & per plures ex ordine dies datur. *Aetio teste.* Datur autem per se aqua, cyathis tribus, febri vero carentibus, cum vini vel aceti cyatho uno, *ut inquit Paulus.* Interim vero extrinsecus humectantibus humorem fundemus: quibus & incidentia admiscebimus; his enim maxime ad dissolutionem humor paratur. Fiat ergo fons ex oleo simplici, tenuium partium, & aceto, quibus & vini aliquid tenuis potes adiungere: & est facile parabile. Post haec purgabimus rursus fortiori medicamento, quale est ex helioboro nigro paratum, additis aniso & cinamomo, qualem potionem alias Iacchinos docuit: quae & multis diebus sumi poterit, modo vires aegri ferant, & leuari agrum videris. Vbi satis moram traxerit aeger, interim victus ratione utemur in cibo & potu, & exercitatione. *ut dictum est*, atque ex diarrhoda aliquid dabimus: & lienem ex unguento amygd. amar. inunges, dum a potionibus quiescit. Mox valentius siccantibus utemur. acidis admixtis, sed per intervalla etiam humectantibus. In potionibus itaque oxymel scilliticum erit cum scolopendrii decocto, aut foliorum capparis recentium. Quae vero extra admoventur, si quidem mollitus tumor manibus sentiatur (*hoc enim quotidie tentare expedit*) erunt siccantia, extergentia atque incidentia, *ut fons ex aceto, in quo ferueant capparis radix vel folia rura*

16
Qualia praebenda medicamenta sunt post purgationem.

17

Secunda purgatio.

18

Topica.

13
Curatio.

14
Vena sectio
numquid
conveniat.

Purgatio.

19 *lis ruta semen cuminum, myrica cum fenugraco & alibea radice.* A fotu vero inunges oleo ex capparis appellato. Quod si interim inimicum valde videbitur, sed durior fieri, expediet ad emollientia calida & humida verti: quorum exemplum est *œsypice ceratum ex compositis, & emplastrum de meliloto, & emuccilag. fenug. alibea, ficum, adiectis medullis ossium & adipibus.* Hæc igitur iteranda sæpius, quousque metam attingas: & semper de recidua timeto. Facile enim recidunt, ob visceris ex longo morbo infirmitatem. Sed si his nihil perficias, & iam malum inueterauerit, extrema remedia tentanda sunt. At primū potiones hæc arida capparis folia, cum oxymelite: chalybis, quod stomoma appellant, potio: cui intentioni etiam satisfacit ex auro similiter & squammæ ferri potio, de qua Aetius. Nos autem lima attrita utimur, vel elect. de lima-
20 *ura ferri*, quo præceptor meus Benedictus Fa-
uentinus utebatur. Vnde eius Empirica. Exercitia quoque inungemus, interim fomentando oleo & aceto, & victu boni succi vitædo. Post hæc his, quæ extra, utemur, ac primum cyclamine, cū suillo adipe subacta: habet enim vim maxime extergen-
tem, incidentē, sicut & scylla: ex qua similiter em-
plastrum vel unguentum confici potest. Aliud ef-
ficacius, ex stercore caprino, axungia subacta. O-
portet enim interpositis dieb. & humido aliquo
viti. Postremū omnium est ex calce viua, cum na-
sturtii semine, & fenugraco, coctis in mulla, si-
mul subacta atque imposita. Sunt qui cucurbitu-
las adhibent, atque scarificant, sale inspergentes
vulscula, alii cauteria affigunt. Sed qui superio-
ribus non sanantur, his non sanabuntur. Historia
cuiusdam est, qui per annum duravit, & iam fere
tabidus credebatur, qui sanatus est. Qui vero pror-
sus sanari nequeunt, hos in vita seruari oportet; si
vere & autumno purgentur, & congrua victus
ratione utantur. Tentarunt aliqui aquas sponte
natas: alii ligni potum: illi præseruati ab ulteriori
lapsu, non curati: hi in peius ruerunt, credo sicca-
tione nimia.

OBSERVATIO IX.

*De quartanario duritiem lienis habente: & de alie-
ro qui post quartanam in duritiem lie-
nis incidit.*

1 *V*ir quidam quadraginta annos natus, cum a
quartana liberari nō possit, eo quod lienem
durum haberet, ad eum nos in consilium adhibiti
sumus, & tunc nobis in mentem venit illud dictum
Amat. in schol. centur. 1. curat. 8. de curatione quar-
tana, quod quartana curari non possit, nisi splen prius
curatus fuerit. Proinde spleni, si durior euaserit, &
in scirrhum permuetur, & viscerib. summopere
providendum est, vngendo, illinendo; atque em-
plastrando, his quæ mollire ac laxare leniter pos-
sunt: qualia sunt butyrum, œsypus, lana succida, o-
leum amygdalinum, chamamelenum, semen lini, fœ-
nugraco, alibea, malua, adeps, medulla ossium, ce-
ra carica, & quæ tota substantia splenem iuuare
probata sunt, ut ceterach, tamariscus, cortex cappa-
ris. Potentiora sunt, quæ post apparerem coctio-
nem tuto adhiberi possunt, ammoniacum aceto li-

quatum, quod leniter decoqui debet, ne effruescat,
bdellium molle & pingue, styrax, galbanum, propolis,
semen apii, radix iridis, cuminum, ruta, anetum, flos
geniste: glans unguentaria, quam myrobalanum
Græci vocant, medicamentum præ ceteris palmarum
in iuuando liene obtinens. Ex quibus possunt con-
fici fomenta, cataplasmata, unguenta, cerota, lini-
menta & si quæ sunt alia viscera laxantia & emol-
lientia. Sed in principio leuibus & primo ordine
citatis, stante vero coctione, quod est in morbi vi-
gore, id est, statu, tunc potentioribus utimur: ace-
tum semper addentes, quod in omni topico me-
dicamento adiungi debet, quia lieni acetum ma-
xime conducit, ut testatur Gal. lib. 9. de compos. me-
dic. secundum locos, & lib. 11. & 14. meth. med. & 5.
de simpli. Acetum tamen quartanariis per os dari
non debet, ut longa oratione demonstrat idem A-
matius contra Arabes. Post purgationem itaque; ex
sena, thymo, epithymo, polypodio, & farnaria, &
lupulis, adiectis dialene vel diacatholico, interea
optimo victu attenuante utimur, iniectis herbis,
ut scolopendario, ceterach dicta, aut tamarisco: quam-
uis linguam ceruinam, dictam phyllium, a con-
fortio harum herbarum etiam idem Amatus el-
minandam putat, utpote quam contrarias vires
habere, ipse credit. Nos vero hoc fotu vti sumus.
3 *℞. rad. alibea. ℥ iij. malua m. ij. florum chamameli,
meliloti, ceterach. an. p. j. corticum capp. tamarisci,
ana. ℥ ss. sem. lini. fenug. an. ℥ i j. coquantur in aqua
communi & aceto. pro ℥b. j. ss. pro fotu, cū spongiis vel
filiro. Deinde inungatur hoc linimento. ℞. em-
plastrum de meliloto, de mucilag. ana. ℥ ss. olei de cap-
par. ℥ j. olei amygdal. amar. ℥ ij. œsyp. humida. adi-
pis gallinacci. an. ℥ iij. pulueris ceterach ℥ j. ammo-
niaci dissoluti in aceto ℥ ij. aceti parum, & cera exi-
guum: fiat linimentum. Mox apposuius empla-
strū de meliloto, & de mucilag. adiecto exiguo pulue-
re filicis, & rad. cappar. & olei de cappar. parum, cum
pauca cera, fiat ceratum spleni applicandum. Cum
iam lien detumesceret, & minueretur, decoctis
sæpe repetitis ex carduo benedicto, ceterach, rad.
cappar. & tamarisci, centaurea, borag. bugloss. sum-
mat. lupill. & fumararia, & repetita purgatione,
febris quartana mitescere cœpit: & cum iam ver-
iniret, duritie illa lienis paulatim cessante cum re-
mediis supradictis, febris illum breui reliquit, &
sanus factus est, & a duritie lienis liberatus, me-
lius deinde valuit: optima tamen victus ratio-
ne obseruata. Alius quoque, qui a quartana in
dolorem lienis ac duritiem inciderat, cum iam
non amplius quartana laboraret, iussi ut conti-
nuo cappares cum aceto comederet, & lienem o-
leo amygdal. dult. lilior. de cappar. & ruta, inunge-
ret, & ut hoc fotu vteretur. ℞. rad. alibea mund.
℥ ij. rad. bryonia, tamarisci, cappar. an. ℥ ss. flor. me-
liloti. m. ij. flor. chamomil. p. j. folior. ruta, ceterach.
an. m. ss. sem. malua, lini. an. ℥ j. coquantur in dua-
bus partibus aque communis & una parte aceti a-
cerimi, pro ℥b. j. ss. & post fotum inungatur hoc
vng. ℞. empl. de mucilag. ℥ ss. empl. de meliloto ℥ ij.
olei de cappar. ℥ ss. olei liliorum. ℥ iij. misce. & hoc
emplastro demum imposito. ℞. emplastrum de mng.*

eilag. ℥j. emplastri de meliloto ℥vj. ungu. Agrippa ℥ij. pul. rad. cappar. thamarisci an. ℥j. ducatur supra alutam, ad formam linguæ bouis, & sindone rub. cooperiatur, insuatur, ut meli⁹ cohareat. Interea & diacurcuma, & diacappar. utebatur. Et durities lienis non solum cessavit, sed et si metus erat de hydrope, sanitatem pristinam recuperavit, neque in hydropem, ut alteri evenit (qui tamen a me quoque curatus fuit) lapsus est.

S C H O L I A.

Inueteratis
scirrhis &
corporibus
agrestiorib.
que conue-
niant.

Topica.

- 5 **N**on solum his myricæ seu tamarisci radices, verum etiam folia, citra molestiam dantur eis, qui corpora habent, calidiora, præsertim scirrhus non inueterato, quibus etiam conducunt virgulta ipsius myricæ, & scolopendrium, & rumicis siluestris, maxime vero acuti semen, foliaque & radix: probe etiam facit anchusa, si rad. eius ℥j. decur: polytrichon quoque & capni decoctum, ad tertias redactum & folia salicis, & cortex maxime in principio, iuxta Aetium. A lenioribus semper incipiendum. Verum inueteratis scirrhis, & corporibus agrestioribus, atque iis, qui omnem corporis habitum habent frigidiores, exhiberi possunt triffago, gentianæ radix, calamintha, pulegium, cyclaminis radix, scordium, trifolium biumen olentis semen, hyperici coma, acori, asari & eringie rad. vitæ semen torrefactum, centaurei minoris succus, etiam si sit exsiccatus, chamæpitys, polium, sed non ante purgationem. Omniaque iam dicta medicamenta simplicia, in principio cum posca diluta coquantur, postea vero meraciore: progressu autem temporis etiam ipsa contusa & cribrata cum aceto, aut aceto mulso, exhibetur, modo ut laborent quartana, ut Amatus volebat. Et quod ad Topica, eadem seruanda methodus, quam seruari præcepimus, cap. de scirrhu iocinoris, semper etenim emollientem, & discutientiam medicamentorum facultatem præcellere oportet: quibus parum quiddam eorum, quæ astringendi vim habent, admiscendum est. Gal. auctore ac Aetio. Nisi quod tutior erit usus aceti in lienis scirrhu etiam a principio, cum naturaliter rarus sit: nec est quod metuas, ne quis nervus eius vi lædatur: quemadmodum in tendonibus, ac nervosis muscoli partibus, ut liquet 14. meth. med. In hunc usum capparis cortex ex aceto contritus illitusque confert: is enim (inquit Aetius) admixtus aliis medicamentis, ultra hoc, quod dessecat & expurgat, etiam splenem corroborat: multisque modis huic rei capparis aptus est. Nam & ipsum cum cibo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere, commodum est: quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem eius cum fursuribus, aut ipsum capparem cum melle contritum imponere expedit, ut Celsus inquit: Quemadmodum etiam non pauci ammoniacum cum aceto, ad luti crassitudinem redactum leni imponentes, eius scirrhum curarunt: idque solum ei curando sæpe satis fuit, ut liquet ex Galeno 14. meth. med. Nec non & salicis cortex consimiliter illitus & centaurei succus, ac cinis fabrorum cum cruda polenta ex oxymelite illitus, aut etiam lupinorum farina, magno opere conferunt, ex Pauli auctoritate. Etiam empla-
- 6
- 7

stra, tum unguenta superius dicta conferunt: adiectis adipe anserino & medulla cervina seu vitulina, & in processu seuum tum hircinum, tum taurinum, ac etiam caprillum adici potest, & quantitas ammoniaci augeri, adiciendo bdellium & galbanum, prius in aceto dissoluta: & styrax & opopanax, cyclami farina seminis lini, fenugraci, ac althææ, ex quibus varia medicamenta componi possunt, & prout affectus exigit, tum addere tum adimere poterimus, ea quæ emolliunt, attenuant, discutunt, & robur addunt.

OBSERVATIO X.

De scirrhu incurabili, cum variis symptomatibus.

Adrrianus Leoninus, Leydanus, urbis Delphensis Pensionarius (ut vulgo dicitur) vir doctissimus, per integrum annum hæctica febre laborauerat, & scirrhu lienis afficiebatur, ut Obfer. ix. de hæctica marasmode, lib. 4. Obs. nostrar. de feb. abunde egimus. Sed nos reliqua illa de febre hæctica, prætermittentes, nunc tantum de iis tractare decreuimus, quæ ad duritiem & scirrhum lienis attinent. Henricus Vergerius, medicus certe doctus, ut & Ericius collega meus, multa linimenta, unguenta partim emollientia, partim discutientia, ac emplastra pro scirrhu præscripserunt, ut hæc erant. ℥. mucilag. rad. althææ & seminis citii, ac seminis lini. an. ℥ij. pingued. anatis, anseris, gallinae. an. ℥j. buri recentis non saliti. ℥ij. farina seminis lini m. j. B. fursuris frumenti exacte comminuti & cribrati. an. m. j. coruscum rad. cappar. tamarisci an. ℥ B. rad. cyclaminis ℥vj. seminis agni casti. ℥ B. ficuum pinguium ℥iij. oleor. irini. lihor. de cappar. amygd. amar. ana. q. s. fiat cataplasma secundum artem. Postea præscripserunt & hoc linimentum. ℥. ammoniaci dissoluti in aceto sambucino. ℥. j. B. olei de cappar. amygd. amar. irini. an. ℥ij. adipis ceruina, gallinae, anseris ana ℥ij. pinguedinis vituli. ℥vj. cum aceto sambucino q. s. fiat linimentum. Deinde & illud quod sequitur, absque pinguedinibus. ℥. ammoniaci dissoluti in aceto sambucino ℥. j. B. olei de cappar. amygd. amar. irini. an. ℥ij. cum aceto eiusdem q. s. fiat linimentum. Mox lienem fomentarunt lapide marcasita, cum aceto acerrimo in ollâ coniecto, ebulliente, ut artis est. Deinde ad vntiones & cataplasmata redierunt, deinde ad fomentum, eo fere modo, quo habetur 2. ad Glauconem, cap. de scirrhu. Mense vero Maio ad eum accitus fui, cum antea per integrum annum & hæctica & scirrhu lienis laborasset, & varia ac diuersa remedia essent tentata, cui tunc solus aderat Henricus Vergerius, medicus egregie doctus. Quæ ad hæcticam & alia accidentia præscripta sunt eodem tempore, lector inueniet Obs. 9. de hæctica marasmode, lib. 4. nostrarum Observationum. Quod ad scirrhum attinet, de quo nunc agimus, Gal. 2. ad Glauconem cap. de scirrhu, vult, ut insistamus primo emollientibus, deinde discutientibus, & moderate emollientibus, atque hoc ipsum vicissim faciendum suadet, ut eorum usus alternatus sit, non simul, quemadmodum ibidem narrat de puero Cerciliâ, quem a tumore scirrhuoso in femore curauit: & tam diu emollien-

8

9

10

emollientibus utendum iubet, ut perfecte molli-
ties quædam censeretur, ad ruborem carnis fere
exterioris. Deinde discutientibus utitur. Nam si al-
tero tantum medicamentorum scirrhum curare tenta-
uerimus (ut idem dicebat) nequaquam sanabimus:
Quæcunque enim nimis digerunt, ob calorem vehemen-
ter digerentem, scirrhum in tephaceam duritiem con-
crescere faciunt: quæ vero nimis emolliunt, non possunt
solum præstare, ut scirrhus decreascit. Alternatus igitur
eorum usus moderatus, confert. Sed nec, quæ emolliunt,
continuo affectum curant. Opus enim est & digerenti-
bus; non quidem vehementer, sed quæ emolliendo id
commode præstent. Hactenus Galenus. At hic in
liene licet primo emollientibus sit utendum, ta-
men addenda (ut recte fecerunt medici doctissimi)
quæ roborant (liene hoc requirente, magis quam fe-
mur) & discutiunt: quia discutientia non sine
emollientibus in progressu magis augenda. Lie-
nem autem scirrhum, eodem Galeno teste 3. ad
Glauc. non solum adhibitis vehementibus medi-
camentis foris curare oportet; sed & validissimis
portionibus: nam & hæc lien citra molestiam per-
fert, ut antea dictum est: ut est radix cappatum, &
cortex, & scolopendrii, & myricæ tū radices tum
ramuli, in aceto vel aceto mulso incocta. Quibus
etiam medici expertissimi in principio recte qui-
dem hic sunt usi: sed cum viderent quod æger ca-
lore magis afficeretur, & hæctica auferetur, statim
ab eiusmodi medicamentis intro assumtis probe
abstinere. Cum vero in principio huic crura ma-
culis variegata fuissent (ut in scurbutis fieri solet) ut
medicus præfens nobis narrabat, procul dubio &
nos hoc malum (vulgo Scurbutum dictum) adesse
existimauimus, & ob hoc medicos doctissimos
tūc præfentes, commode cochleariæ decoctum
præscripsisse. Hæctica tamen magis inualecente,
coacti fuere talia decocta relinquere. Itaque cum
scurbutus hic adfuisset, ex lienis obstructione; ob-
structione illa diu perdurans procul dubio conuersa
est in scirrhum exquisitum, & qui iam ultra an-
num durauerat. Quare ego eum omnino incu-
rabilem iudicavi; eoque magis cum hæctica ad-
esset. Interea, quantum ad duritiem lienis perti-
nebat, consulebam ut medicamentis solum ex-
ternis, quibus antea usi fuissent, adhuc instare-
mus, ne intus assumpta paulo calidiora & de ob-
structione hæcticam auferent. Ideo inter me &
Henricum Vergerium medicum, qui tunc ade-
rat, conclusum est, ut ceratum emolliens appone-
remus, & deinde reverteremur ad emollientem
inunctionem, & simul dissipantem & resolu-
entem. Huic ceratum meum de ammoniaco, quo
ego utor, impositum fuit. Cuius hæc est descri-
ptio: ℞. ammoniaci dissoluti in aceto ℥j. dialthæ, em-
plastri de meliloto ana ℥ss. furfuris frumenti optime cri-
brati ℥j. pul. rad. bryoniæ sicca, pul. rad. ireos sicca, an. ℥
ss. pinguedinis anatis, anseris, gallinæ an. ℥iij. bdellii, gal-
bani ana ℥j. olei irini ℥j. bulliant leniter in mucci-
laginibus seminis lini, fenugraci ana q.s. & ut in formā
debitam cerati coeant, adde cera ℥iij. terebinthina,
& resina pini an. ℥j. ss. fiat ceratum secundum ar-
tem, plurimum emollit & resoluit duritiem scir-

rhosam, ut hoc ipsum pro arcano habeam, ac in
officina pro me semper paratum inueniatur. Quo
primum usi sumus in Godefrido Isibrandi cerui-
siario Delphensi, ut suo loco aliquando dicturi
sumus. Postea una cum Henrico Vergerio hoc se-
quens etiam unguentum præscripsimus: ℞. am-
moniæ ℥vj. bdellii mollioris & subalbi ℥ij. pinguedi-
nis anseris, gallinæ, ceni ana ℥ij. interioris rad. cycla-
minis, furfuris frumenti ana ℥j. ss. ceterach, agni ca-
sti, rad. cappar. thamariscæ ana ℥ij. olei de cappar. irini,
amygd. amar. an. ℥iij. succi bryoniæ ℥j. ss. (eo quod
deerat succus cyclaminus) dissoluantur gummi in
aceto scyllino, & olea cum pinguedinibus bulliant, una
cum succo, ad consumptionem fere succi: & ab
igne ablatis adde gummi, ne indurescant nimio
calore: & tandem pulueres exacte contriti & cri-
brati commisceantur; addendo ceræ novæ q. suf-
fiat vng. mediocris spissitudinis. Deinde intermis-
sis aliquibus diebus, lien fomentabatur cum ace-
to, cui lapis marcasita ignitus in olla aceto plena
iniiciebatur; ollam bene cooperiendo: deinde
cum spongia huic aceto immersa fiebat fotus. Ad
hunc autem modum, teste Galen. 2. ad Glauc. de scir-
rho, ministratur lapis pyrites vel molaris: igni can-
dens, aceto acerrimo perfunditur; & super va-
porem calidum, quem sursum emittit scirrhusa
pars, collocatur, subindeque versatur, ut tota va-
porem melius excipere queat. Illud autem com-
mode fieri potest in membris exterioribus, ut fe-
more ac cruribus; difficilius vero in liene: ideo
fotu usi sumus cum spongia aut filtro, ut præce-
ptor meus Benedictus Fauentinus utebatur. A
fotu mox ad unguenta, deinde ad cerata reuerte-
batur. Quibus remediis æger se ferebatur alle-
uiari, quamvis non curaretur; hæctica non solum
inualecente, sed & fluxu ventris obrepente sym-
ptomato & lethali. Sed paulo ante hoc tempus,
doctissimus ille Henricus Vergerius medicus, in
mensa sedens, cum cyathum vini bibisset subito animi
deliquio, aut subitanea suffocatione periit. Tunc
itaque solus in curatione relictus, utebar fotu se-
quenti ad lienem: ℞. rad. althææ ℥j. cort. rad. cappar.
thamariscæ an. ℥ss. cassia, ceterach, centaurii minor. flor.
cham. melil. an. m. ss. sem. lini, fenug. an. ℥ij. coquantur in
aceto acerrimo, pro fotu. Postea rursus facta est cōsul-
tatio medicorum, & Cornelii Ericii collegæ mei,
& Hugonis Nieuenii, & Gerardi senioris medici
Leydani: in qua consultatione, quæ acta sint, lib. 4.
obs. 9. diximus: Hugone medico proponente usum
ligni sancti; ad quæ prius fere accedebat Cornel.
Ericius: nos contra rationibus innixi probaui-
mus, quod nimium exsiccaret lignum sanctum, &
hæcticam auferet, neque lienem ita proficeret; cum
aliqui in scirrhu lienis (ut docte Tacchinus recenset)
huius usum administrantes pessime ægro tracta-
runt, ob nimiam exsiccationem. Ideo hoc relictum
est remedium. Et quia fluxus cum hæctica lethalis
erat: tamen ut huic ægro vitam paululum protra-
heremus, contra fluxum dedimus conseruam ros.
& semen portulac quod & lienis duritiei prodest.
Et licet fluxus aliquo modo iis sedaretur, attamen
hæctica postea auferente, & fluxu in fine magis

increfcente, confumtus hic periit: cum ante mortem vere cadauerofus haberi potuerat.

S C H O L I A.

- 16 **S**CIRRHS confirmatus quam difficile curetur, hoc vno exemplo constat: licet in principio, si nondum sit exquisitus, curationem facile fufcipiat. Sic anno 1568. mense Octobri, Iodocum Weruium, præfectum Brielenfem, & virum nobilem, curauimus ftatim, cum sentiret in liene obftructionem & inflationem quãdam, cum magna duritie, non fine dolore, fumto prius lenitio & apozemate aperiente: quibus cum parum auxilii primum sentiret, & in liene doleret, & nulum appetitum haberet, ob fuccum melancholicum in liene retentum, neque ad ventriculum tranfmiffum: vnde paucis diebus macilentus euadens, me ad fe vocauit. Ad quem accitus cum lienis duritiem perfentirem, cum inflatione & obftructione, intra octo dies in principio, quod alicui mirum videbitur, his præfidiis fanus factus eft, fumens omni mane duo cochlearia argentea, ex fyr. acetoso fimplici & fcolopendria, & oxyzacch. quia intemperies quãdam videbatur admixta. Hoc decocto etiam affumto. *℞ cort. rad. cichor. dentis leonis, fœniculi, apii, macerat. in aceto ana ℥ ℥. rad. thamarif. cappar. ana ℥ ij. fumaria, ceterach, fummitat. lupul. borag. bugloff. ana m. j. feminis agni cafti, portulacæ ana ℥ j. ℔. coquantur in aqua communi, pro ℔. j. colatura adde oxymell. fimpl. fyrup. acetosi fimplicis ana ℥ j. oxyzacch. fimplicis, fyrup. de byzantiis cum aceto, ana ℥ ℔. mifce. omni mane & vefperi inungebat lienem oleo amygdal. dulc. & de capparibus. Deinde hoc modo fuit purgatus: *℞ rad. cichorii, fœniculi, affarag. macerat. in aceto ana ℥ ℔. ℔. caffuta, agrimonie, ceterach ana m. ℔. femin. portulac. agni cafti ana ℥ j. foliorum fenæ ℥ vj. epithymi ℥ ij. cortic. rad. cappar. ℥ j. ℔. polypod. querc. ℥ ℔. rhabarb. felecti ℥ j. ℔. fœœnanthi ℔ j. femin. end. ℥ ℔. vuar. paff. ab arill. repurg. ℥ ℔. coquantur in aqua communi. pro ℥ vj. fortiff. expreff. adde fyrup. acetos. fimplicis ℥ ij. mifce. pro duabus dofibus matutinu, ex vna quinquies aluum depofuit, & cœpit melius habere, ac conualefcere, appetitu redeunte. Vtebatur tamen continuo capparibus conditis cum aceto: & pro potu, vino Rhenano lymphato, cum aqua ferrata: & cœpit lien detumefcere. Hoc condito quoque vfu eft: *℞. conferua borag. bugloffæ ana ℥ vj. fpecierum diarrhod. abb. ℔ ij. fpecierum trionfantal. tro. hifc. de cappar. ana ℔ j. femin. portulacæ, agni cafti puluerifat. ana ℔ j. ℔. puluer. ceterach ℔ j. cum fyrup. acetoso fimplici: fiat conditum. fumebat omni mane ad magnitudinem fabæ maiufculæ. Si lien non fuiffet extenuatus, perueniffem ad fortiora, de quibus in præcedentibus diximus. Habes & apud Aetium plures compositiones Veterum, & malagmata, quibus vti folebant, cap. 11. fermen. 10. de cura fplenis in fcirrhum indurati, ex Galeno, & aliis. Hæc de lienis duritie ac fcirrho dicta fufficiunt. Nunc ad fcurbutum, morbum veteribus incognitum, tranfeamus: cum hoc malum etiam ad lienem pertineat.***

OBSERVATIO XI.

De fcurbuto malo cognoscendo & curando; loco exempli aliorum morborum, ad Iordanum Forestum, & Adamum Forestum, qui feſe medicina addixerunt.

CAVTVM fuit aliquando in Aſclepiadarum familia, ne quis artem & induſtriam medendi, poſſeſſionem plane diuinam, a Deo ſolis ipſis conceſſam, cuius communem faceres, qui ab eodem non eſſet genere exortus. Id quod fuiſſe in cauſſa videtur, vt peritos artis illius *ἡνὶ ἰατρῶν παῖδας* hoc eſt, filios medicorum, Græci ſemper vocarint: ac ſi fieri vllō modo non poſſet, vt legitime quiſpiam medicinam proſiteretur, quam minime a genitoribus ſuis accepiſſet. Nec perperam quidem illi, meo iudicio, o iuuenes generoſi, factitabant: quandoquidem vel optima quæque inſtituta (vt recte & Lacuna doctiſſimus dicebat) vileſcunt & dilabuntur, variſque ſiunt obnoxia adulteriis, dum citra delectum vllum ab omnibus profanantur: multoque aprioribus ad quamcunque artem capeſſendam exercendamque ſient ii, qui a parentibus ſuis, vna cum generationis primordiis contraxerunt quandam veluti inclinationem, propenſionemque in eam artem, cui poſtea indulſerint, quam quibus natura & mens ob diuerſam genituram, ad contraria inclinatur. Recte igitur, Iordane Foreſte, & tu Adame Foreſte iuuenes nobiles, ex familia antiquiſſima Foreſtorum, prodeuntes, quaſi iure hereditario medicina vos addixiſtis, & mancipaſtis, non aliter quam præceſſores veſtri fecerunt, quos etiam imitandos proponimus, vt eam ipſam medicinam virtutibus & arte veſtra exornetis. Inter Foreſtos omnium primo (quem tamen ipſe non vidi, nec noui) Petrus quoque Foreſtus nomine, medicinam magna cum laude apud Dordracenos longo tempore exercuit: vt inſignia Foreſtorum & epitaphium ſepulcro eius appoſita oſtendunt: qua & ego vidi, nunc belli atrocis iniuria ablata. Secundus vero medicus in noſtra familia, quem & noui ac vidi, cum puer eſſem, fuit Theodoricus de Foreſto, eiufdem nominis cum tu patre, o Adame, Reuerendiſſimi domini Epifcopi Vilenſis in Polonia phyſicus & chiriurgus, cuius imaginem exſculptam eius filius Iacobus Foreſtus e Regiomontana vrbe, poſt mortem per filiam ſuam vnicam ad me transferri curauit. Medicus, ſi quis alter, inſignis: qui & longo tempore in Italia, deinde etiam apud Turcas Conſtantinopoli medicinam fecit: deinde apud Episcopum in Polonia phyſicus exſtitit, ac ibidem mortuus eſt. Hunc ſemel cum puer eſſem, apud patrem & matrem, ex Polonia reuerſum, deinde rursus eo proficiſcentem, vidi: eoque ad medicinam me adhortante, poſtea & huic arti præclariffima me totum mancipaui. At Iordanus Foreſtus, meus pater cariſſimus, non illiteratus, cuius tu nomen, Iordane, refers, tuus ac Adami Foreſti auus, tres filios medicina deſtinatos, vt in ea laborarent curauit: quorum ego ſenior primus fui, & tertius in ordine medicus ex familia Foreſtorum: & poſtquam Louanii aliquot annis medicina operam dediffem, in Italiam profectus, vt praxin addiſcerem, medicina titulum Bononia conſequutus ſum, anno 1543. die Iouis, penult. Nouembr. Deinde in Italia aliquot annis hærens, in Galliam profectus medicinam feci: ac demum in patria: poſtea apud Delfenſes honorario publico conde-

Undecoratus, medicinam (nunc excedens annum, cum hæc ad vos scriberem 69.) 46. annis exercui. **Quartus** in ordine est **Iacobus Forestus**, meus Frater, etiam vester patruus, qui **Ferraria** insignia Doctoratus adeptus in Italia, anno 1565. deinde in patriam reuersus, longo tempore & ibidem medicinam fecit. **Quintus** in ordine erat **Ioannes Forestus**, meus frater, & vester quoque patruus, qui etiam medicina operam dedit; ac post mortem patris iunior uxori copulatus, eo non est progressus, ut medicinam faceret: tamen in theoria egregie profecerat. Hi omnes ex familia **Forestorum**, ut vestri ante ambulones, non alia de causa a me vobis proponuntur, quam ut eosdem imitari possitis. Quod ut recte fiat, & probe aliquando praxin exercere possitis, institui per compendium aliqua exempla hic adferre de **scurbuto**, nouo morbo curando, uti aliquando feci de eodem malo, tum de conuulsione, fratri meo **Iacobo Foresto**, vestro patruo, cum **Louani** operam medicina daret. Sed is profectus deinde in Italiam, illud exemplar quod scripseram, cuidam Germano dedit; ac ita intercudit. Scripseram illi, (si bene memini) nunc cum theoria instructus esset, quomodo praxin exerceret: eidem proponens omnia medici officia, scopos omnes, ex quibus indicationes curandi sumuntur. Verum quia hæc habetis in libro meo, meaque manu scripto, omnes **Locos** medicina **Communes** continente, non opus est eadem hic repetere: nam & de iisdem ad longum scripsimus in lib. 3. contra **Vroscopos**, cap. 3. quod certa sit **methodus signorum** & **causarum**, tum **morborum** & **symptomatum**; & quod certis sint **scopi**, ex quibus denuo indicationes curatiue sumuntur. Id ipsum vero nunc vobis exemplis de **scurbuto**, nouo morbo, & veteribus incognito, ostendemus. Ex qua **methodo**, & **alios morbos** tum cognoscere, tum etiam curare licebit.

Nauta quidam **Alcmarianus**, anno 1555. annos 38. natus, multis mensibus **Alcmariæ** deplorate variis symptomatibus affectus decubuit: homo viribus satis infirmis, hirsutus, nigroque colore, hinc & per antiphrasin **Antonius Albus** dictus, proceræ staturæ, melancholicus, cui cholera adusta admixta erat, habitu gracili, in quo amplæ venæ & vtcunque tumidæ apparebant: quanquam nunc non nihil concidebant, ob morbi longitudinem. Hic autem sub finem æstatis primo incidit in quartanam, quæ per totum autumnum, ac hyemem sequentem, ultra septem menses perdurauit: mox tumor lienis (eiusdem obstructione præcedente) subsequēbatur, qui ita induruit, ut diaphragma tum pulmonem compresserit; febre hectica subsequente, tum spuri cruenti ac quasi purulenti exsiccatione superueniente, cum totius corporis consumptione. Aderat & anhelitus difficultas, ambulandi impotentia, scapulæ ingens dolor, gingivarum sanguifluus tumor, genu iuncti, tum totius cruris, vehemens durities scirrhosa, ac inflatio; cum cutis variegatione, & rigiditate, ut crus mouere non posset, nec ambulare. Medici & chirurgi, qui tunc præsentēs erant, eum morbo Gallico (ut solet hoc genus imperitorum, imo impostorum) laborare affirmabant. Ceterum nos, qui vltimo ad ægrum accessimus, horum omnium affectuum naturam, tum genera ipsa, differentias,

causas, euentusque per signa perfecte inuenimus; & vix homine inspecto, eum laborare eo morbo (exceptis reliquis accidentibus) seu affectu, quem alii **scleretyrem**, alii **gingipedum**, alii, ut vulgares, **scurbutum**, nonnulli **stomacatem** vocant, percepimus: ita ut postea nihil superesset quin rationem quoque agendi inueniremus, ut mox declarabimus. Nam & hoc inter interrogandum falsus est, sæpe & hoc eodem malo seu morbo se obnoxium fuisse. Cum enim in Hispaniam nauigaret, in naui hac eadem passione **scurbutica** dicta se correptum fuisse narrabat, ex laridi rancidi, & carnis non bene salitæ ac putidæ, & panis biscocti mucidi comestione. Nam hæc ægritudo, ut vsu quotidiano edocti sumus, in **Hollandorum** seu **Batauorum** ac **Westfrisorum** nauibus grassari solet; maxime vero in aeris constitutione calidâ, & aquarum dulcium penuria: aut dum corruptis aquis, in dicta aeris intemperie, vtuntur, tum crassa diæta hoc malo corripuntur. Peculiaris enim **iptorum**, qui hoc morbo afficiuntur, victus est, caro salta, laridum rancidum, pisces olidi, panis biscoctus submucidus, allia, ceruisia crassa, mali succi procreatiua. Atqui infecti hoc morbo natura victu tenuiori tunc viētes, tum ceruisia absinthie, ac eiusmodi melius valent. Ita etiam hic noster nauta, cum vtcunq; eo tempore a **scurbutica** passione euasisset, domum rediens incidit in quartanam; mox iterum in **scurbutum**, ac reliqua symptomata dicta. Ceterum, ut aliqua de hoc morbo dicamus, non solum antea incognitus fuit, sed multi eo laborantes interierunt. Ita ut olim **Martinus Dorpius**, doctor **Theologus Louaniensis**, dicto morbo multis ab hinc annis exspirauerit, maximopere admirantibus ac stupefcentibus medicis **Louaniensibus**, qui de **Scurbuto**, utpote nouo adhuc & incognito malo, nihil tunc determinauerunt; nec de nomenclatura, nec de essentia, multo minus de curandi ratione. Nos tamen hic plurimos curauimus: & quæ in iis obseruauerim aliquando signa, paucis explicabo. Certum est, **Scurbutum** chronicum esse morbum, non simplicem, sed compositum ex pluribus; ex quibus aliqui morbi tantum; aliqui morbi simul & causa rationem obtinent. Id signa hæc pathognomonica ostendunt, **præcordiorum angustia**, **crurum cum dolore debilitas**, **gingivarum pruriginosa rubedo**, ac dolor, faciei color in nigredinem vergens. Et huius principium plerumque longum est, & hoc cognitu difficilius, quo longius protrahitur, quia omnia fere signa habet cum aliis communia, uti est totius corporis tum grauitas, tum spontanea lassitudo, quæ hebetiores non sentiunt, nisi a consueto exercitio. At ubi consequitur, **præcordiorum aliqualis angustia**, **crurum debilitas**, & exiguus dolor, **gingivarum pruriginosa rubedo** ac dolor, faciei color ex pallido in fuscum vergens, hæc inquam ubi coniunctim inuenio, **scurbutum** principium adesse suspicor; eaque esse huius morbi peculiaris signa; etiam principii huius morbi: quæ eadem quoque incrementa augmentum & statum designant. Quæ ubi in principio adesse viderim, **Scurbutum** adesse iudico: alioqui subhæsitans, quousque oris graueolentia **gingivarum** peculiaris.

Scurbutus

Vbi scurbutus maxime frequens est.

Vbi melancholicus.

Quartana magna ex parte scurbutum præcedit.

Scurbutus morbus medicis Louaniensibus incognitus.

Scurbutus chronicus morbus cui & compari.

Signa pathognomonica scurbuti.

Scurbutus principium.

Scurbutus signa.

increfcente, confumtus hic perit: cum ante mortem vere cadauerofus haberi potuerat.

S C H O L I A.

- 16 **S**CIRRHS confirmatus quam difficile curetur, hoc vno exemplo conftat: licet in principio, fi nondum fit exquisitus, curationem facile fufcipiat. Sic anno 1568. mense Octobri, Iodocum Weruium, præfectum Brielenfem, & virum nobilem, curauimus ftatim, cum sentiret in liene obftructionem & inflationem quãdam, cum magna duritie, non fine dolore, fumto prius lenitio & apozemate aperiente: quibus cum parum auxilii primum sentiret, & in liene doleret, & nulum appetitum haberet, ob fuccum melancholicum in liene retentum, neque ad ventriculum tranfmiffum: vnde paucis diebus macilentus euadens, me ad fe vocauit. Ad quem accitus cum lienis duritiem perfentirem, cum inflatione & obftructione, intra octo dies in principio, quod alicui mirum videbitur, his præfidiis fanus factus eft, fumens omni mane duo cochlearia argentea, ex fyr. acetoso fimplici & fcolopendria, & oxyzacch quia intemperies quãdam videbatur admixta. Hoc decocto etiam affumto. \mathcal{R} cort. rad. cichor. dentis leonis, fœniculi, apii, macerat. in aceto ana \mathcal{Z} \mathcal{B} . rad. thamarif. cappar. ana \mathcal{Z} \mathcal{ij} . fumaria, ceterach, fummitat. lupul. borag. bugloff. ana m. j. feminis agni cafti, portulacæ ana \mathcal{Z} j. \mathcal{B} . coquantur in aqua communi, pro lb. j. colatura adde oxymell. fimpl. f. f. \mathcal{R} syr. acetosi fimplici ana \mathcal{Z} j. oxyzacch. fimplici, f. f. \mathcal{R} syr. de byzantiis cum aceto, ana \mathcal{Z} \mathcal{B} . mifce. omni mane & vespere inungebat lienem oleo amygdal. dulc. & de capparibus. Deinde hoc modo fuit purgatus: \mathcal{R} rad. cichorii, fœniculi, afparag. macerat. in aceto ana \mathcal{Z} \mathcal{B} . caftuta, agrimonia, ceterach ana m. \mathcal{B} . fœmin. portulacæ agni cafti ana \mathcal{Z} j. foliorum fenæ \mathcal{Z} \mathcal{vj} . epithymi \mathcal{Z} \mathcal{ij} . cortic. rad. cappar. \mathcal{Z} j. \mathcal{B} . polypod. querc. \mathcal{Z} \mathcal{B} . rhabarb. felecti \mathcal{Z} j. \mathcal{B} . fœchenanthi \mathcal{Z} j. fœmin. end. \mathcal{Z} \mathcal{B} . ruar. paff. ab arill. repurg. \mathcal{Z} \mathcal{B} . coquantur in aqua communi. pro \mathcal{Z} \mathcal{vj} . fortiff. expreff. adde f. f. \mathcal{R} syr. acetos. fimplici \mathcal{Z} \mathcal{ij} . mifce, pro duabus dofibus matutinis, ex vna quinquies aluum depofuit & cœpit melius habere, ac conualefcere, appetitu redeunte. Vtebatur tamen continuo capparibus conditis cum aceto: & pro potu, vino Rhenano lymphato, cum aqua ferrata: & cœpit lien detumefcere. Hoc condito quoque vſus eft: \mathcal{R} conferua borag. bugloffæ ana \mathcal{Z} \mathcal{vj} . ſpecierum diarrhod. abb. \mathcal{Z} \mathcal{ij} . ſpecierum trionſantal. tro. hiſc. de cappar. ana \mathcal{Z} j. fœmin. portulacæ, agni caſti pulueriſat. ana \mathcal{Z} j. \mathcal{B} . puluer. ceterach \mathcal{Z} j. cum f. f. \mathcal{R} syr. acetoso fimplici: fiat conditum. ſumebat omni mane ad magnitudinem fabæ maiuſculæ. Si lien non fuiſſet extenuatus, perueniſſem ad fortiora, de quibus in præcedentibus diximus. Habes & apud Aetium plures compoſitiones Veterum, & malagmata, quibus vti ſolebant, cap. 11. ſermon. 10. de cura ſplenis in ſcirrhum indurati, ex Galeno, & alijs. Hæc de lienis duritie ac ſcirrho dicta ſufficiunt. Nunc ad ſcurbutum, morbum veteribus incognitum, tranſeamus: cum hoc malum etiam ad lienem pertineat.

OBSERVATIO XI.

De ſcurbuto malo cognoscendo & curando, loco exempli aliorum morborum, ad Iordanum Foreſtum, & Adamum Foreſtum, qui ſeſe medicina addixerunt.

CAVTVM fuit aliquando in Aſclepiadarum familia, ne quis artem & induſtriam medendi, poſſeſſionem plane diuinam, a Deo ſolis ipſis conceſſam, curpiam communem faceret, qui ab eodem non eſſet genere exortus. Id quod fuiſſe in cauſſa videtur, vt peritos artis illius $\tau\omicron\upsilon\varsigma\ \iota\alpha\sigma\pi\omicron\nu\ \pi\alpha\iota\delta\alpha\varsigma$ hoc eſt, filios medicorum, Graeci ſemper vocarint: ac ſi fieri vlllo modo non poſſet, vt legitime quiſpiam medicinam proſiteretur, quam minime a genitoribus ſuis accepiſſet. Nec perperam quidem illi, meo iudicio, o iuuenes generoſi, factitabant: quandoquidem vel optima quæque inſtituta (vt recte & Lacuna doctiſſimus dicebat) vileſcunt & dilabuntur, variſque fiunt obnoxia adulteriis, dum citra delectum vllum ab omnibus profanantur: multoque aprioris ad quamcunque artem capeſſendam exercendamque fiunt ii, qui a parentibus ſuis, vna cum generationis primordiis contraxerunt quandam veluti inclinationem, propenſionemque in eam artem, cui poſtea indulſerint, quam quibus natura & mens ob diuerſam genituram, ad contraria inclinatur. Recte igitur, Iordane Foreſte, & tu Adame Foreſte iuuenes nobiles, ex familia antiquiſſima Foreſtorum, prodeuntes, quaſi iure hereditario medicina vos addixiſtis, & mancipaſtis. non aliter quam præceſſores veſtri fecerunt, quos etiam imitandos proponimus, vt eam ipſam medicinam virtutibus & arte veſtra exornetis. Inter Foreſtos omnium primo (quem tamen ipſe non vidi, nec noui) Petrus quoque Foreſtus nomine, medicinam magna cum laude apud Dordracenos longo tempore exercuit: vt inſignia Foreſtorum & epitaphium ſepulcro eius appoſita oſtendunt: qua & ego vidi, nunc belli atrocis iniuria ablata. Secundus vero medicus in noſtra familia, quem & noui ac vidi, cum puer eſſem, fuit Theodoricus de Foreſto, eiufdem nominis cum tu patre, o Adame, Reuerendiſſimi domini Epifcopi Vilenſis in Polonia phyſicus & chiriurgus, cuius imaginem exſculptam eius filius Iacobus Foreſtus e Regiomontana vrbe, poſt mortem per filiam ſuam vnicam ad me transferri curauit. Medicus, ſi quis alter, inſignis: qui & longo tempore in Italia, deinde etiam apud Turcas Conſtantinopoli medicinam fecit: deinde apud Epifcopum in Polonia phyſicus exſtitit, ac ibidem mortuus eſt. Hunc ſemel cum puer eſſem, apud patrem & matrem, ex Polonia reuerſum, deinde rursus eo proſiciſcentem, vidi: eoque ad medicinam me adhortante, poſtea & huic arti præclariffima me totum mancipaui. At Iordanus Foreſtus, meus pater cariffimus, non illiteratus, cuius tu nomen, Iordane, refers, tuus ac Adami Foreſti auus, tres filios medicina deſtinatos, vt in ea laborarent curauit: quorum ego ſenior primus fui, & tertius in ordine medicus ex familia Foreſtorum: & poſtquam Louanii aliquot annis medicina operam dediſſem, in Italiam proſectus, vt praxin addiſcerem, medicina titulum Bononia conſequutus ſum, anno 1543. die Iouis, penult. Nouembr. Deinde in Italia aliquot annis hærens, in Galliam proſectus medicinam feci: ac demum in patria: poſtea apud Delfenſes honorario publico conde-

Undecoratus, medicinam (nunc excedens annum, cum hæc ad vos scriberem 69.) 46. annis exercui. Quartus in ordine est Iacobus Forestus, meus Frater, etiam vester patruus, qui Ferraria insignia Doctoratus adeptus in Italia, anno 1565. deinde in patriam reuersus, longo tempore & ibidem medicinam fecit. Quintus in ordine erat Ioannes Forestus, meus frater, & vester quoque patruus, qui etiam medicina operam dedit; ac post mortem patris iunior uxori copulatus, eo non est progressus, ut medicinam faceret: tamen in theoria egregie profecerat. Hi omnes ex familia Forestorum, ut vestri ante ambulones, non alia de causa a me vobis proponuntur, quam ut eosdem imitari possitis. Quod ut recte fiat, & probe aliquando praxin exercere possitis, institui per compendium aliqua exempla hic adferre de scurbuto, nouo morbo curando, vti aliquando feci de eodem malo, tum de conuulsione, fratri meo Iacobo Foresto, vestro patruo, cum Louanij operam medicina daret. Sed is profectus deinde in Italiam, illud exemplar quod scripseram, cuidam Germano dedit; ac ita intercidit. Scripseram illi, (si bene memini) nunc cum theoria instructus esset, quomodo praxin exerceret: eidem proponens omnia medici officia, scopos omnes, ex quibus indicationes curandi sumuntur. Verum quia hæc habetis in libro meo, meaque manu scripto, omnes Locos medicina Communes continente, non opus est eadem hic repetere: nam & de hisdem ad longum scripsimus in lib. 3. contra Vroscopos, cap. 3. quod certa sit methodus signorum & causarum, tum morborum & symptomatum; & quod certis sint scopi, ex quibus denuo indicationes curatiue sumuntur. Id ipsum vero nunc vobis exemplis de scurbuto, nouo morbo, & veteribus incognito, ostendemus. Ex qua methodo, & alios morbos tum cognoscere, tum etiam curare licebit.

Nauta quidam Alcmarianus, anno 1555. annos 38. natus, multis mensibus Alcmariæ deplorate variis symptomatibus affectus decubuit: homo viribus satis infirmis, hirsutus, nigroque colore, hinc & per antiphrasin Antonius Aibus dictus, proceræ staturæ, melancholicus, cui cholera adusta admixta erat, habitu gracili, in quo amplæ venæ & vtcunque tumidæ apparebant: quanquam nunc non nihil concidebant, ob morbi longitudinem. Hic autem sub finem æstatis primo incidit in quartanam, quæ per totum autumnum, ac hyemem sequentem, ultra septem menses perdurauit: mox tumor lienis (eiusdem obstructione præcedente) subsequēbatur, qui ita induruit, ut diaphragma tum pulmonem compresserit; febre hectica subsequente, tum sputi cruenti ac quasi purulenti excretionē superueniente, cum totius corporis consumptione. Aderat & anhelitus difficultas, ambulandi impotentia, scapulæ ingens dolor, gingivarum sanguifluus tumor, genu liniftri, tum totius cruris, vehemens durities scirrhusa, ac inflatio; cum cutis variegatione, & rigiditate, ut crus mouere non posset, nec ambulare. Medici & chirurgi, qui tunc præsentēs erant, eum morbo Gallico (ut solet hoc genus imperitorum, imo impostorum) laborare affirmabant. Ceterum nos, qui vltimo ad ægrum accessimus, horū omnium affectuum naturam, tum genera ipsa, differentias,

causas, euentusque per signa perfecte inuenimus; & vix homine inspecto, cum laborare eo morbo (exceptis reliquis accidentibus) seu affectu, quem alii sceleretrem, alii gingipedium, alii, ut vulgares, scurbutum, nonnulli stomacatem vocant, percepimus: ita ut postea nihil superesset quin rationem quoque agendi inueniremus, ut mox declarabimus. Nam & hoc inter interrogandum falsus est, sæpe & hoc eodem malo seu morbo se obnoxium fuisse. Cum enim in Hispaniam nauigaret, in naui hac eadem passione scurbutica dicta se correptum fuisse narrabat, ex laridi rancidi, & carnis non bene salitæ ac putidæ, & panis biscocti mucidi comestione. Nam hæc ægritudo, ut vlti quotidiano edocti sumus, in Hollandorum seu Batavorum ac Westfrisorum nauibus grassari solet; maxime vero in aeris constitutione calidâ, & aquarum dulcium penuria: aut dum corruptis aquis, in dicta aeris intemperie, vtuntur, tum crassa diæta hoc malo corripuntur. Peculiaris enim ipsorum, qui hoc morbo afficiuntur, victus est, caro salta, latidum rancidum, pisces olidi, panis biscoctus labmucidus, allia, ceruisia crassa, mali succi procreatiua. Atqui infecti hoc morbo naturæ victu tenuiori tunc viētes, tum ceruisia absinthite, ac eiusmodi melius valent. Ita etiam hic noster nauta, cum vtcunq; eo tempore a scurbutica passione euasisset, domum rediens incidit in quartanam; mox iterum in scurbutum, ac reliqua symptomata dicta. Ceterum, ut aliqua de hoc morbo dicamus, non solum antea incognitus fuit, sed multi eo laborantes interierunt. Ita ut olim Martinus Dorpius, doctor Theologus Louanienſis, dicto morbo multis ab hinc annis exspirauerit, maximopere admirantibus ac stupeſcentibus medicis Louanienſibus, qui de Scurbuto, utpote nouo adhuc & incognito malo, nihil tunc determinauerunt; nec de nomenclatura, nec de essentia, multo minus de curandi ratione. Nos tamen hic plurimos curauimus: & quæ in his obseruauerim aliquando signa, paucis explicabo. Certum est, Scurbutum chronicum esse morbum, non simplicem, sed compositum ex pluribus; ex quibus aliqui morbi tantum; aliqui morbi simul & causa rationem obtinent. Id signa hæc pathognomonica ostendunt, præcordiorum angustia, crurum cum dolore debilitas, gingivarum pruriginosa rubedo, ac dolor, faciei color in nigredinem vergens. Et huius principium plerūque longū est, & hoc cognitu difficilius, quo longius protrahitur, quia omnia fere signa habet cum aliis communia, vti est totius corporis tum grauitas, tum spontanea lassitudo, quæ hebetiores non sentiunt, nisi a consueto exercitio. At vbi consequitur, præcordiorum aliqualis angustia, crurum debilitas, & exiguus dolor, gingivarum pruriginosa rubedo ac dolor, faciei color ex pallido in fuscum vergens, hæc inquam vbi coniunctim inuenio, scurbuti principium adesse suspicor; eaque esse huius morbi peculiaris signa; etiam principii huius morbi: quæ eadem quoque incrementa augmentum & statum designant. Quæ vbi in principio adesse viderim, Scurbutum adesse iudico: alioqui sub-

Scurbutus

Vbi scurbutus maxime frequens est.

Vbi scurbutus melancholicus.

Quartana magna ex parte scurbutum præcedit.

Scurbutus morbi medicis Louanienſibus incognitus.

Scurbutus chronicus morbi sui & companionis. Signa pathognomonica scurbuti.

Scurbuti principium.

Scurbutus signa peculiaris.

Hæc omnia habent melancholicum de-larabant.

Imperitorum medicorum iudicium facile inapertum.

Scurbutii in-
gravescentis
signa.

Quidam de-
linquentes ani-
mo ex scurbuto
subito perie-
runt.

Varia scurbuti
symptomata.

Varia etiam
symptomata in
aliis morbis
eueniunt.

Proprium no-
men scurbuti
adhuc incogni-
tum est.

Hac aliquo
modo videntur
conuenire scur-
buto.

laxus sanguifluus tumor, dentes vacillantes, & orurum macula plumbea, purpurea, nigra violis obscuriores, lentigines innumerabiles grisea seu pulla, aut circa os vel sola crura superuenientia symptomata, opinionem meam comprobarent. Quoties vero passio magis ingrauescit, sequitur & ambulandi impotentia, anhelitus difficultas, potissimum dum se mouent aut erigunt: & si aliquandiu erecti sedere conantur, quasi deficiente spiritu semianimes deliquio afficiuntur: rursus decumbentes reficiuntur, ac respirant liberior. In his rarissime deficit appetitus, frequenter cibum appetunt, & decumbentes se sanos asserunt: sed quia fieri non potest, vt sine omni motu decumbant, eo fit, vt aliquando quasi delinquentes animo langueant: quo deliquio aliquos extinctos noui. Hoc modo prætor quidam in Castricomio pago obiit, quem Ioannes Gallus medicus Harlemensis in curatione præmanibus habebat. Cuius quidem filius postea in prætura patri succedens, etiã hac passione deplorate laborauit: sed is a me curatus euasit, magna nostra industria, (vt sequenti obseruatione dicemus) quemadmodum & alii plurimi. Præter hæc iam dicta in nonnullis obseruaui, motum aggrauationis quarto plerumq; die; aliquibus & tertio in paucioribus, singulis diebus, interpositis spatiis inordinatis. Aliqui simul febriunt, vt hic nauta, qui postea hecticam habuit. Plurimos autem prius habuisse quartanam obseruaui, quæ in scurbutum transit, vt in nostro hoc etiam ægro euenit. Nonnullos quoque per totum decursum morbi *aluum constrictam* habuisse animaduerti: quosdam vero continuo ventris fluxui fuisse obnoxios. Interdum vidi maculosa illa crura sic intumescere, vt elephantiasin Arabum quispiam opinaretur: rursus vero aliorum crura ita attenuata, vt nuda cutis deturpata ossibus affixa videretur. Ceterum nihil mirum est, quod sæpe varia & quasi ex diametro pugnantia symptomata in eodem morbo obseruaui, & diuersa signa; id enim scurbuto cum plerisque aliis morbis commune. Sic in pleuritide modo sursum, modo deorsum dolor vergit, modo venter adstrictus, modo immodice fluens, &c. Hactenus de symptomatibus: quæ cum a scurbuto, tanquam a causa procedunt, merito eius signa esse constat. Sed quo nomine hic morbus proprie appelletur, vel num apud veteres cognitus fuerit, adhuc sub iudice lis est. Alii Scelotyrbem Plinii esse putant, alii ad alios morbos referunt; quales Auicenna tetigisse videtur in eo loco, vbi de signis apostematum lienis differit in hæc verba: *Et quandoque denigratur lingua in duritiem splenis, & sentitur durities eius absque rugitu, cum premitur, nisi aggregetur ei inflatio. Et non est cum ea febris inseparabilis. Imo quandoque est secundum ordinem, & quandoque cum ea multiplicantur vlcera crurum, & corroduntur dentes, & gingiua, propter grossitudinem sanguinis, qui descendit in vlcera crurum, & propter corruptionem vaporis qui ascendit in omnes partes gingivarum & dentium. Et quandoque est in vlceribus crurum crisis illius.* Horum pleraque cum nostro scurbuto familiaria comperimus. Alii ad scirrhum splenis

referunt: quod tactu facile innotescit, explorato scorbuto sinistro hypochondrio. Celsus libr. 2. cap. 6. *At quibus lienes magni sunt, his gingiua mala sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit, e quibus si nihil euenit, necesse est in cruribus mala vlcera, vt ex his nigra cicatrices fiant.* Aegineta quoque eadem scirrhii splenis notas ponit, libr. 3. cap. 49. Hoc pressis vitio os foetet, gingiua exeduntur, vlcera in cruribus cicatricem non recipiunt. Alexander Trallianus similia fere libr. 3. cap. 23. sed de phlegmone ex atrabile prodiit, hisce verbis: *Facta iam ex atrabile inflammatione in splene, laborans paulatim atrabilario colore suffusus, nigricare videtur; nec tam cutis quam vrina nigricat. Lien per se friget, nec increfcit admodum, sed durefcit: melancholicus humor redundat in omni corpore, gingiua acriora videntur: & siti vexantur, qui si frigidi poculi copiam habent, plus ibi appetunt.* Alii icteritiam nigram referri volunt. Ceterum de nomine non multum refert, num etiam veteribus fuerit morbus cognitus, nec ne. Videte de his Balduinum Ronseum, medicum doctissimum, veterem nostrum amicum, in commentario suo edito, de scurbuto. Satis est, quod nomen ab essentia cognoscimus, scurbutum morbum esse ex vitio splenis aliquando obstructi, aut intemperati; aliquando etiam cum incipiente scirrho, qui præpedit eius attractionem, ac consuetam sequestrationem atrabilariæ redundantia, ex hepate venisque mesaraicis: eoque vitiante corpus, coloris humore aspergit. Sed peculiariter crassiore feculentia, crura; & euaporante acredine, gingiuas contaminat; vt Echtius addit in sua epitome eadem libello adiuncta: cum & eadem olim fere ad verbum in epistola scripserat ad Blienburchium, medicum Traiectensem, anno 1541. quam & eodem fere tempore eruditissimus ille medicus Colonienfis, nostri amantissimus Cronenburchius ad me misit, & simul alias duas epistolas Blienburchii ad Iohannem Echtiem scriptas, vnam dominica post Cantate, anno 1541. ex Traiecto: alteram 5. Septembr. anno 1541. Ex quibus epistolis quædam decerpta, olim ad patruum vestrum anno 1558. scripsi, & nunc iterum eadem ad vos mitto, cum quædam & hic referuntur ex duabus epistolis illis Blienburchii de scurbuto, quæ nequaquam omittenda esse duximus: & etiam ex epistola Echti: quæ postea in epitomen (vt diximus) redacta sunt, & in fine libri Ronsei etiam impressa. Quare rursus redeamus eo vnde digressi sumus. Raro autem fit, quin lien maxime afficiatur: quanquam in D. Assendelphio, Hollandiæ præside, (vt nos conspeximus) hepar maxime affectu fuit: nam in dextro crure etiam plures maculas magisq; variegatas habebat. Sæpe etiam animaduertimus in eodem morbo diuersa symptomata (vt antea diximus) quemadmodum abhinc vno mense in prægnante, quæ etiam varices in crure habebat, quæ per se in venis erosæ fuere, & aperitæ per se; vt ex eis ultra duas libras sanguinis emanasse viderimus: & nisi nostra ope sanguinem profluentem restrinxissemus, actum fuisset de vita prægnantis. Neque hæc postea abortiit. Adest itaque statim

Quædam
magnos con-
sequuntur.

Phlegma est
atrabile.

D. Assendel-
phius scurbuto
laborabat.

Varices in crure
simul cum
scurbuto.

Varii affectus
præternatu-
ram in morbo
scurbuto.

13.

Expultrix de-
prauata.

Qualitas mu-
tata.

Continui solu-
tio.

14.

Intemperies
inæqualis.

Principium
scurbuti.

Quædam
status scur-
buti.

15.

Magnitudo
aucta vel di-
minuta.

Scurbutus causa
antecedens.

statim in principio scurbuti, morbus in confor-
matione, lienis videlicet obstructio, cuius sym-
ptoma est præcordiorum angustia. Ex hoc sequi-
tur deinceps, tanquã ex causa, morbus in nume-
ro, quippe multitudo humoris melancholici in ve-
nis portæ vel mezentarii, qua lien eam materiam
attrahendo sanguinem depurare erat solitus; quæ
homini secundum naturam adesse non debeat. I-
gitur superfluous est, & morbus in numero. Neque
solum in hisce venis, sed etiam in iis, per quas ex
liene in ventriculum melancholia transmittitur.
Et huius symptoma quoque vnum est, vt supra,
præcordiorum angustia, ad operationem læsam
pertinens; vel, si libet, ad qualitatem præter natu-
ram in sensu tactus. Alterum symptoma est, expul-
trix deprauata, quippe cū vna cum sanguine fer-
tur humor per corpus totum, vel ad crura præcipue:
quia a liene attractus, partim ipsum nutrire, partim
in ventriculum transfusus, per ipsum euacuari de-
bebat. Ex hoc symptomate aliud nascitur, in qua-
litate mutata; nimirum color ille faciei ex pallido
fuscus, qui in reliquo etiam corpore vel in cruribus
efflorescit. Item ex eadem expultrice deprauata,
symptoma oris, rubedo pruriginosa, dolorque o-
riginem trahunt: quæ omnia ad qualitatem muta-
tam pertinere, cum visu percipiuntur, tum etiam
tactu; quo ad dolorem & continui solutionem re-
feruntur. Ex eadem adhuc oritur crurum debi-
tas, ad operationem tactus læsam pertinens. Hosce
morbos inæqualis intemperies proculdubio sta-
tim sequitur: quæ quidem intemperies ex humo-
re prædicto diutius præcordia obsidete gignitur:
ita reciprocatione quadam, etiam hepate male af-
fecto eum humorem deinceps assidue gignit. Hi
morbi prædicti principium scurbuti constituunt.
Qui si egrotorum negligentia, curantisve in scitia,
iam augmentum vel statum attigerit (nam diligentia
medici proculdubio, vt nos in multis quotidiana expe-
rientia experti sumus, prohiberi potest, ne eo discrimi-
nis res adducat) ex symptomate gingivarum na-
scitur vlcus earundem, ad continui solutionem
pertinens. Ex crurum vero symptomate, operatio
eorundem animalis, vel naturalis, vel vtræque si-
mul auferuntur. Potro animalis operatio, scilicet
motus crurum, ablata, vel saltem læsa comitatur
morbum in conformatione; nempe in nervis,
tendonibus ac musculis tanta materia imbibita,
vt vel facultati animali transitus intercludatur, vel
membra illa ad motum inhabilia, propter humo-
rem, etiam si facultas prædicta transeat, reddan-
tur. Huic modo adest magnitudo crurum aucta,
modo diminuta, vt diximus. Sunt quandoque
& alia symptomata crurum, consistentia in qua-
litate mutata; vt maculæ illæ diuersi coloris, non-
nunquam & crurum durities, ad scirrhum perti-
nens. Hi sunt plerumque affectus præter natu-
ram, qui scorbutum sequuntur. Nunc quadam de
causa dicamus. Morbi scurbuti causam antece-
dentem docti illi medici supradicti, humorem me-
lancholicum, in mezaraicis præcordiisque abun-
dantem putant; qui deinde lieni, prius in hepate
eum sanguine procreatus, obstructionis causa

existit. Potest autem vtrumque fieri, vt primo
sola crassitie peccans lienem obstruxerit, deinde
impedita eius visceris attractione copiam in præ-
cordiis ac mezaraicis auxerit; vel vt primo copia
sua in hepate vel venis præcipue portæ, deinde lie-
nem obstruxerit. Id autem grauitas præcordio-
rum distinguet, vel hypochondrii sinistri aut de-
xtri pondus. Sed vt vt sit, nihil aut parum ad cu-
rationem attinet, siue huius humoris causa sit præ-
cedens in hepate, ex malo victu eum humorem
copiose generante; siue in liene. Procatartica
causa, seu primitiua, vel extrinseca, est victus præ-
cedens melancholicus, aer ambiens calidus, tum
alia, vt vigiliæ, labores, curæ, quæ melancholiam
augent: & etiam febres præcedentes) vt quarta-
na) potissimum talia præstare possunt, Galeno id
confirmante tertio, de locis affect. cap. 6. quod non-
nulli per morbos febriles melancholicum humo-
rem contraxerint. Quod si hepar ipsum etiam
continentem causam seu coniunctam facere ve-
lis, parum laboro, cum calidum magis humores
melancholicos assiet. Ceterum, vt iam diximus,
cū diuersa subinde symptomata habeat hæc scur-
butica passio, ad ea conuertamur, quæ in nostro
hoc ægro, seu casu, loco exempli adduximus. Bre-
uiter affectus illos omnes præter naturam, qui huic
scurbutu aderant, explicemus. Qui sex numero
sunt: primo febris hectica primæ speciei: secun-
do sputum cruentum, & quasi purulentum: tertio
durities lienis, & eiusdem obstructio: quarto do-
lor scapulæ ingens, ita, vt dormire æger nō posset:
quinto gingivarum sanguifluus tumor: sexto ge-
nium durities scirrhosa, & inflexibilitas, vt ambu-
lare non posset; cū colore nigriculo, sed paucis
maculis, quas crura affecta habebant. Hæctica ita-
que, cum duplex eius causa existat, incipit non-
nunquam per se, nullo morbo præcedente, com-
munem causam cū ephemeris habens, ex ira, las-
situdine, tristitia, ardore solis, aliisque causis proca-
tarticis: nonnunquam vero ab aliis febribus, ma-
xime ab ardentibus; vel ex aliis longis affectioni-
bus, vt phthisi, empyemate, diuturnis nobilium
partium inflammationibus, vt hepatis, stomachi,
lienis; etiam ex diarrhœa, lienteria, colo, renibus,
vtero, vesica, & similibus: vnde totum corpus ex-
siccatur, & præcipue cor ipsum. Non est igitur mi-
rum, quod hic præcedente quartana tam longa,
deinde scurbutu superueniente, & liene ita obstru-
cto & indurato, hæctica superueniret ad secundam
speciem tendens, tamen cum putredine; nam ex-
quisita hæctica non erat. Iste itaq; morbus intem-
periem sequitur ex adustione, & ex accidente to-
rum corpus exsiccante. Sputum vero cruentum &
quasi purulentum, propter defluxum catarrhi ob-
ortum esse puto; similiter etiam dolor illum ve-
hementem scapulæ, qui vsque ad os adiutorii ten-
debat: talia enim, nō tantum ratione febris quar-
tanæ & longitudinis morbi, tum lienis affecti,
quam catarrhi, similiter euenire poterant. Ratio-
ne enim longitudinis morbi, membra, nutritiua,
præsertim hepar, lien, stomachus, debilitata fuere;
vnde concoctio minus perfecta, causa multarum

16.

Causa scurbuti
procatartica
seu extrinseca.

Causa continui
est.

17.

Affectus præ-
ter naturam in
hoc ægro sex.

Hæctica.

18.

Hæctica cum
putredine.

Sputum cruen-
tum unde or-
tum, cum dolo-
re scapulæ.

superfluitatum existit: ex quibus tandem vapores multi eleuati, cerebrum petentes, catarrhum induxerunt, ac cerebrum multum humectarunt ac debilitarunt. Et sic facili de causa, materia illa catarrhalis fuit origo sputi cruenti ac purulenti, tum tussis: quæ quidem partim fluens ad concauitatem pectoris, (*materia etiam melancholica in liene retenta sursum euaporata, & demum ad partes inferiores fluente*) eius sputi origo fuit; partim a capite defluens ad scapulam, dolorem auxit. Et licet hic aliquis dicere possit, quod melancholia ita fluxibilis esse non posset: huic respondemus, quod facile aduratur, etiam ex bile: unde ad gingiuas pars subtilior tendit in hac passione scurbutica; & quæ magis crassa, fæculenta grauis existit, ad inferiora, tum crura descendit. Si itaque pars leuior gingiuas petit, verisimile est, ad cerebrum ascendisse; & mox per neruos ad scapulam, multo minori negotio ad pectoris concauitatem. Quomodo sit facta obstructio in liene, & durities ex quartana præcedente tum crasso humore melancholico, iam dictum est. Durities tamen illa non fuit legitimus scirrhus; alioqui fuisset incurabilis. Gingiuarum vero sanguifluus tumor, tum vlcera, causam habuit ex acriore subtilioreque sanguine melancholico, aut subtilioris materie fæcalis melancholicæ portione, quæ vel a natura cricante, post febrem quartanam; vel a calore sursum sublata, tenera loca humidaque facilius erodendo depascebat. Malum autem ipsius cruris vel genu, cum sit dispositio mala, & non vnius generis; causam habere dicimus cõiunctam, ex crassa melancholia in genu imbibita, quæ eius operationem impediuit: antecedentem vero redundantiam humoris in superioribus membris, ut liene, venis meza-raicis, atque ad ignobiliora, nempe ad crus & genu, a natura transmissi. Magnitudo vero, tum durities, habet crurum intemperiem præsentem, ex humore ibi iam collecto, & causam tum intemperiem factam; fientem vero ex superiorum intemperie & humorum multitudine. Tum etiam habet causam illa durities scirrhusa ex humore glutinoso crasso, qui particulis induratis impactus est: quique tamen eo defluxit, & ibidem induratus difficulter solui potest. Quoniam itaque horum omnium affectuum genera, differentias, causas, tum signa, utcumque enucleauimus, nihil restat nisi ut quæramus (*quod in principio maxime pollicemur*) agendi rationem, & curandi; omnibus istis inuentis. Quum itaq; omnis medendi ratio perficiatur certis quibusdam scopis, & his, quorum beneficio scopos illos assequimur; constat, quod ad scopos attinet, eos vniuersos proponendos esse, tanquam necessarios. Videndum enim in primis, an agendum sit; deinde, quæ & quot præstanda; tertio quid ex multis primo loco faciendum; & sic deinceps, percurrendo nouem illos scopos, *de quibus alias diximus*. Redeundo itaq; ad primum; hunc per indicationes hoc modo assequemur. Cû enim natura affectuum, de quibus nunc agimus, maximam in curando diligentiam requirat, ita lienis obstructio & præsertim durities lienis, quæ

a quartana cœperunt, tum reliqua symptomata, & potissimum hectica, curatu difficilia sunt. Attamen non est plane desperandum, cum etiam scurbuticos extreme laborantes, & plurimos ab aliis deploratos habitos curauerim. Et quanquã sciam hecticam adiunctam cum putredine, eoq; magis difficilem curatu; tamen quia nondum transiit ad tertiam speciem, nec sputum perfecte purulentum est, unde ad phthisin nondum peruenit; spem aliquam concepimus ægrum ab affectibus dictis posse sanari. modo præceptis nostris auscultaret. Quod quidem fecit: & nos diligentes fuimus in cura, omnia indagantes: sic optime omnia, præter mentem aliorum, successerunt. Igitur cum natura affectuum, *de quibus agimus*, talis sit, ut nec lethales sint omnino & desperati, nec tamen adeo leues, ut solius naturæ beneficio abigi valeant; indicat plane a medico aliquid agendum esse. Quid vero & quot præstanda, ex differentia & numero malorum indicatur. Quoniam vero omnia illa sunt præter naturam, indicabunt primo sui ablationem. Sunt autem sex potissimum affectus, vel septem, qui peculiarem actionem propriaque remedia indicant. Tumor, *inquam*, lienis & durities, & eiusdem obstructio, febris hectica, sputum cruentum, & quasi purulentum, dolor scapulæ gingiuarum sanguifluus tumor, & vlcus, genuum rû totius cruris durities scirrhusa, & eiusdem inflexibilitas; & vltimo horum omnium causæ. Quapropter ex numero affectuum generatim indicantur necessaria esse septem auxilia, quæ septem malis succurrant. Ex quo patet, numerum indicantium numerum remediorum ostendere. Nam tumor indicet, quæ illum auferant: qui, quoniam durus est, mollientia ostendit necessaria: febris, quæ refrigerent: sputum cruentum, id quod fluit, intercipiendum; quod vero fluxit, euacuandum. Quod purulentum est indicat deterfionem, mundificationem, & tandem sui consolidationem, si quid exulceratum est. Dolor scapulæ mitigationem indicat. Gingiuarum vlcus, absterfionem, consolidationem & corroboracionem, ne amplius humorum fiat confluxus, desiderat. Durities cruris scirrhusa, tum emollientia tum discutiencia indicat adhibenda. Causæ quoque vniuersulque mali, sua similiter indicant peculiaria auxilia. Sic multitudo humoris melancholici, quod euacuet; partium intemperies, quæ noxiam materiam procreat, quod illam auferat: humoris acrimonia, ut in gingiuis, quod eam obrundat; si, quæ sit cruditas, quod concoquat: & ita de aliis. Ceterum cum hi morbi sint atque affectus sibi inuicem contrariantes; statim inuestiganda sunt contraindiantia: & quæcunque singulis repugnent ponenda. Primo enim morbus, qui maxime pertinet ad scurbutum, obstructio lienis est: atque hic morbus iam factus, suo contrario, nempe aperiçione, tollitur, quæ per subtiliantia & abstergentia perficitur. Sed quoniam hæc fere viribus calida sunt, hectica non conueniunt; quæ frigida & humida indicat. Secundus morbus scurbuti, scilicet multitudo humoris melancholici, sui

Scopus omnium primus consolidandus, ut morbus curabitur.

22.

Conclusio ægrum curari posse.

Indicationes omnes generatim ad scopos consequendos indaganda. Septem hic esse præter naturam quibus indicationes sumende.

23.

Numerus indicantium numerum remediorum ostendit.

Dictorum omnium affectuum generatim indicationes.

Causa morborum, tum symptomatum etiam indicant peculiaris auxilia.

24.

Post indicationem, contraindiantia inuestiganda.

19.

Quæstio.

Solutio quæstionis prædictæ.

Obstructio lienis unde.

Gingiuarum sanguifluus tumor.

20.

Malum ipsius cruris unde ortum habuit.

Magnitudo & durities.

21.

Scopi crudi semper proponendi.

evacuacionem indicat. Hæctica contraindicat, id non tuto posse fieri; & propter consumptionem, restorationem desiderat. Hæc & eiusmodi consideranda sunt, antequam ad præsidia veniamus: ut possimus non solum victus rationem, sed & ea, quæ circa res non naturales versantur, recte præscribere. Ita hic largius dictandum, cum id morbi longitudo, tum hæctica, indicant; sed per vices. Quæ autem victus ratio attenuat & incidit, lienis obstructioni convenit. Sed hæctica refrigerantem & humectantem victum contraindicat. Hæc, ut & remedia, moderanda sunt iuxta quod affectus indicant vel contraindicant. Vel quædam omittenda, quædam vero adhibenda, vel moderanda: quod in iudicio excellentis medici, & in artis operibus exercitati consistit. Propterea talem victum præscripsimus, qui etiam partim nutriet, partim incidet; pectus mundificat, abstergeret, ad lienem aperiendum faceret; absque tamen caliditate, quæ hæctica febris contraria erat. Vtebatur igitur aliquando hordeato, aliquando amygdalato, ex amygdalis dulcibus, quibus nonnullæ amaræ, propter aperiendum, adiectæ erant, etiam ex seminibus quatuor frigidis maioribus, quæ abstergunt, aperiunt, & non calefaciunt, imo infrigidant ac humectant, & ad melancholiciæ adustionem faciunt. Vtebatur & pineis, fisticis, quæ aperiunt, abstergunt & nutriunt: pomis assatis, in sculo puli, in sculo etiam aliquando pisorum, sine leguminibus; quæ & vim aperiendi & abstergendi habent; etiam hæc immutando, aliqua præscribendo, iuxta indicationes affectuum præter naturam: modo exhibendo ea, quæ magis inciderent, modo, quæ magis nutrent, humectarent, aut refrigerarent, semper indicante proposito quod magis vrgeret. Sunt enim statim ab initio ponenda universa rerum genera, a quibus auxilia omnia emanant, siue res naturales, siue medicamenta, vel alimenta, ut libet appellare. Porro eorum genera apud Galenum quatuor esse constat, ut docuit libro primo, de sanitate tuenda circa finem. Vnum, inquam, quod ea continet, quæ in corpus quomodocunque assumuntur: aliud, quod ea comprehendit, quæ extrinsecus adhibentur: tertium, ea habet, quæ a nobis geruntur; vel partim a nobis, partim ab aliis: in postremo vero ponit ea, quæ aliquid educunt a corpore, aut in eo retinēt; & horum omnium species. Et appellat hæc quatuor, admoventia, educenda, facienda extrinsecus incidentia. Admoventorum quidem nomine, cibus, potio, & si quid medicamentorum intro sumitur, etiam aer attractus, intelligitur. Facientorum vero, frictio, ambulatio, vectio, equitatio; denique omnis motus & exercitatio: huc etiam referuntur, somnus, vigilia, venus. Foris vero incidentium primus est etiam aer nobis circumdatus, deinde quæcunque lavantium vngentiumve cuti propinquant. Educendorum vero, quæ ex corpore aut partibus educuntur. Ab his igitur quatuor fontibus exhaurietis omnia præsidia: nec unquam deerit, quod opitulari posset, quantum admittit nostra hæc facultas. Iam igitur in

scorbuto videndum, nunquid tale reperiri possit; interea, quæ impulso agunt, vel nos ambiunt, vel admoventur, vel appenduntur aut circumligantur, inunguntur, balneantur, & similia, quæ nos sub primo fonte ponamus, eorum, quæ extrinsecus agunt: quod si quid sit, id in medium proferre oportet. Deinde purgemus ad secundum fontem, qui ad facienda pertinet: atque spectabimus, nunquid aliqua actio corporis, ambulatio, & cuiuscunque generis exercitatio, conveniat: & denique vitæ conditionem, & animi corporisque omnes actiones expendemus, nunquid huic nostro morbo aliisquæ affectibus præter naturam, qui adsunt, prodesse aut obesse possint. Tercio deinde succedet *Secundus font.* fons, qui continet alimenta & medicamenta, quæ in corpus sumuntur, per quamcunque illius partem, & quocunque modo: nam quædam immituntur, alia deuorantur, alia manduntur, alia bibuntur, alia inspiciuntur, quædam lambuntur, alia paulatim destillantur, alia suguntur, alia aliter forte in corpus sumuntur: quorum vim perspectam habere oportet: & ea capere, quæ ad abigendos affectus præter naturam qui adsunt, faciant. Quarto demum sequitur fons, in quo continentur, quæ aliquid e corpore euacuant sensibilibus, vel insensibilibus: æqualiter vel inæqualiter: idque vel ab universo, vel a quibusdam distaxat partibus: quod cum educitur, utrum utile sit videndum; & quid quoque retineri debeat, quid vero educi. Quibus quidem fontibus exhaustis, protinus acquiescet animus, tanquam nullum remedium genus omiserit, quod nostra exhibeat medicina. Et in his victus, medicamentorum, aeris, cibi, potus, somni, vigiliæ, inanitionis, repletionis, animi corporisque motus (*ut aliorum omnium*) mentio fit: sed multo sane felicius, & cum maiori compendio, ut memorie inhaereat, quam hæcenus quidam tantum practici scribunt, quid sit observandum in rebus non naturalibus. Nam etiam hæc omnia iuxta indicantia vel contraindicantia, & quædam in principio morbi, non tamen in fine, ut aliquando diximus, conveniunt: ut ambulatio cruri ita affecto non convenit: postea tamen ad discutendum aliquo modo convenire potest, sed motus scorbuticis non convenit, quum facile animo delinquant. Et ita de aliis omnibus erit ratiocinandum: quæ potius ingenio & iudicio medici exercitati, quam calamo per scripturam comprehenduntur. Nam omnia illa in unoquoque scopo, mente quidem tacite percurrere oportet: & siue victum, siue remedia agro vestro præscribere velitis, id nunquam faciendum, nisi proposito indicante. Stultus enim & indoctus videbitur esse medicus, si præsens apud ægrum, vel in consultatione, ubi alii medici periti etiam conuocati sunt, fortasse dicet opus esse adstringentibus, vel euacuantibus, vel sanguinis missione, vel calefacientibus, aut auerrentibus, aut vino, vel aqua; aut alio denique præsidio: item morbos singulos certo numero auxiliorum abigi: si tamen interim nihil proponat ille, aut colligat, ex his, quid sit quod suadeat illud esse faciendum, vel omnino relinquendum.

25.

25. *Quibus ratio indicatur, nempe ab affectibus sam dicta præter naturam, & præcipua multatio a vitiis, quæ sui conservationem indicant.*

26.

26. *Ex quatuor fontibus omnia præsidia emanant.*

27.

Nota.

Primus fons.

Secundus fons.

28. Tercius fons.

Quartus fons.

29.

29. *Ex illis quatuor fontibus omnia præsidia deprehendenda.*

30. *Multa ingenii medici percipiuntur, quæ calamo exarari non possunt.*

30.

30. *Medici impetum vitiis indicant, & contraindicant, & ignorant.*

Nota pulcerrima.

Quod quidem fit eo, quod indicationum vis, & usus ignoretur: sine quibus nulla agendi ratio in medicina constare, nec aliquod medici officium, Galeno etiam auctore, exerceri potest. Igitur medicus, antequam ad consultationes veniat, prænouiſſe debet, quæ & quot sint, quæ indicent: quid præterea vnumquodque indicet, quid singulis repugnet, quid vnumquodque admittat: ut quid indicet conſervationem, quid ablationem, præſervationem, reſtaurationem, mitigationem; quid victum, quid remedium, quid alimentum, quid cibum, quid potum, alterantia, vacuantia; & quid in ſingulis generibus ſingula oſtendant. Ut in vacuatione, quid ſenſibilem, quid inſenſibilem; quid ſanguinis detractum, vel purgationem, aut aliud denique, quo vacuet, inſinuet. Poſtea vero, quid his repugnare valeat, tenendum eſt: ut alia, quæ coindicant & admittunt. Ex horum enim conſideratione (ut iam antea oſtendiſimus) inuenimus an agendum; quid, qua materia quali, quantaque ſit opus; quo item modo, quoque ordine & tempore, & in quo corporis loco ea uti poſſumus. Nunc itaque exemplo ſcurbuti docuiſimus, qui ſint affectus in eo præter naturam, & quid generatim, tum cauſæ eorundem, indicent; quid etiam ſingulis repugnet; & quæ remedia generatim præſcribenda ſint, cum ad inferiores actiones deſcendendum eſt. Poſtquam affectus & cauſæ inuenta ſunt, quæ ſua indicant remedia, ſtatim videndum cui prius ſuccurrendum ſit, cui ſecundo, cuique deinceps? quod ordo malorum oſtendet: quid prius præcedere debeat, ſine quo reliqua fieri nequeunt. Cum itaque obſtructio indicet ſui ablationem, per ſubtiliantia & abſtergentia, & cum illa calida ſint, nec hæclicæ conueniant, neque corpori pleno tuto adhiberi poſſint, propterea multitudinem prius amoliri tentemus. Neque enim febris, nec obſtructiones, nec tumor, nec intemperies tolli poſſunt, niſi prius multitudo humoris auferatur. Hæc autem cum ſit morbus partim factus, partim ſiens, duplicem habet indicationem, partim curatiuam, partim præſeruatiuam; Quod enim factum eſt curabitur per euacuationem; quod adhuc ſit, per prohibitionem generationis talis humoris, & retentionis ſi quid forte iterum genitum fuerit. Prohibitio autem generationis fiet per intemperiei iocinoris & lienis curationem, & per cauſarum procatareticarum ablationem, ne talia ſumantur, quæ melancholiam augere aut fouere poſſent. Retentionem vero impediemus per meatuum reſeruationem, & ſplenis poſtea confortationem. Ita prohibitio retentionis, duplicem præſtabit uſum; præſeruationem nimirum multitudinis, & curationem obſtructionis. Reſeratio namque, retentionis eſt prohibitio: intemperies quoque, eius quod factum eſt per contraria ablationem indicabit: quod vero ſit, per ſuæ ablationem cauſæ auferetur; nimirum humoris multitudinis; & deinde per roborationem viſcerum. Et ſic etiam ablatio humoris duplicem & ipſa præſtabit uſum; curationem ſui, & obſtructionis præſeruationem. Sunt itaque generatim quatuor intentiones cu-

randi: apertio, euacuatio, alteratio & confortatio. Inter quas ſecunda, quæ eſt euacuatio, omnium primo (ſi tuto & uſiliter velimus procedere) exſequenda eſt. Deinde apertio; quia magna ex parte obſtructio cauſa eſt intemperiei. Deinde alteratio. Vltimo vero confortatio. Hæc autem in ſcurbuto ordine iam dicto plerumque exſequenda. Quanquam hic in noſtro agro, ob hæclicam admixtam, vna quaſi vice alterandum ſit, & aperiendum, cum eiulmodi, quæ magnam caliditatem non habent, ut in proceſſu curæ patebit. Ex ipſius itaque Galeni, & aliorum medicorum excellentium doctrina concludimus, ſcurbuticos, quo ad methodum medendi, non prius exoptatam ſanitatem nanciſci, niſi quatuor illa prædicta præceſſerint: niſi enim plenitudo ſit amota, & obſtructio remota, & intemperies ablata, atque lien roboratus, æger nunquam curabitur. Quod proſper ſauitatis ſucceſſus, adeo euidenter edocuit, ut illis quatuor adhibitis infinitos ſere ſcurbuticos curauerim, & ab omnibus præter naturam affectibus liberauerim: qui tanquam umbræ poſtea ſublatis abiire, vel leui negotio, ut etiam gingivæ tum crura maculoſa perſanarentur. Verum tamen ſubinde morbus ex morbo naſcitur, & morbus ſit morbi cauſa: & eadem rursus nunc cauſæ, nunc morbi, nunc ſymptomatis rationem obtrinet. Itaque pro huius varietatis ratione, & curatiue indicationes variantur. Quæ omnia ex prædictis notiora ſunt, quam ut in præſentiarum altius repetere conueniat. Ad exemplum igitur curati accedam. Quoniam itaque demonſtrauiſimus, a vacuatione curationem incipiendam eſſe, ita indicante cauſa, quæ ſibi primum locum vindicat, de ea primum dicendum: quoniam vacuantium plura ſunt genera & differentia; alia enim eſt vniuerſalis, ut ſanguinis miſſio, eique proxima purgatio; alia eſt particularis. Sed illis omiſſis, conſtat æquali, ac ſenſibili utrum eſſe vacuatione; & propterea adhibenda eſſe, quæ id præſtare poſſint. Igitur aſpiciendum erit a ſanguinis miſſione. Hic forte aliquis dicet, hanc indicari a morbo, humore, ætate, viribus, regione, cœli ſtatu, corporis habitu, anni tempore, vitæ conditione, & ab aliis huiusmodi infinitis: quum tamen ex Galeni doctrina, vnicum duntaxat ſit quod indicat: reliqua vero omnia vel coindicare, quod eſt oſtendere id quod indicat; vel impedire primo, quod eſt contra indicare; vel ſecundario, quod eſt correpuerare, dicantur. Propterea hæc diligenter inquiramus, & diſtingamus: ut ſit loco exempli aliorum remediorum. In primis ſanguinis melancholici multitudo ſanguinem de mœdum eſſe indicat: atque hic vnus ſcopus eſt qui indicat. Aetas vero, venæ utcumque tumida, vitæ conditio præſens: (nam quartana præcedente ſanguinem non miſerat, attamen conſuetus ſubinde ſanguinem mittere (anni tempus (nam in autumnio etiam hæc conuenit, quamuis melius in vere) niger color, ſanguinem etiam abundare demonſtrabant, in corpore macilento, ubi venæ etiam magis apparent, vrina craſſa, rubea. Hæc inquam miſſionem ſanguinis

33.

Quatuor intentiones generales curant ſcurbutum, & quæ omnium primo exſequenda.

ſcurbutici non poſſunt curari, niſi plenitudo prius amoveatur: deinde obſtructio lienis: vltimo verò intemperies: ad demum reliqua ſymptomata ſubſequentia ſcurbutum.

Nota.

34.

Cauſa indicat omnium primo hic euacuationem fieri debere.

Sanguinis miſſionem præmiſſendam.

35.

Conſaſa diſtinguenda: Quid indicat ſanguinem mittere.

31. Ex quibus cognoscatur quid agendum, tum reliqui ſcopi actionum.

Cauſa & affectus indicant remedia.

Considerandum inuenta indicationibus quid prius agendum ſit.

32. Multitudo humoris primo auferenda.

Contraindicantia, corre-
pugnancia.

Hac maxime
distinguenta
& in usum
ducenda.

Quantitatem
indicant, vel
contraindicant.

Qualitatem
indicant vel
contraindicant.

Locus indican-
tium, locum in-
dicant remedia-
rum.

Qua tem-
pus indicant
vel contrain-
dicant.

Quid tandem
ex omnibus si-
endum con-
cludatur.

Græci fere
semper in cu-

guinis fiendam coindicabant. Hæctica vero con-
traindicabat. Iam etiam vires imbecillæ correpu-
gnabant. Si vires coindicassent, tunc referendæ vi-
res erant ad signa indicantium: iam vero ad signa
contraindicantium. Corporis igitur habitus iam
consumens ob morbi longitudinem, etiam cor-
repugnabat. Cum igitur vires sint nondum pla-
ne prostratæ, sed infirmæ; non omnino prohi-
bent, nec prorsus admittunt, sed tolerant: interm-
tamen quia hæctica non facile admittit, pro imbe-
cillitatis quantitate, & aliis conditionibus repu-
gnant quantitati vacuationis, modo, tempori, lo-
co, qualitati. Magnas enim vacuationes, & confer-
tim factas, & magnas incisiones venarum, per quas
spirituosa substantia exhalat, dissolviturque ro-
bur, non ferunt infirmæ vires: nec quo tempore
admodum laborant eo admittunt detractionem
fieri: sed prius sui restorationem postulant. Sic
igitur contraindicantia ad rem ducenda sunt: ac
in omni auxilio, singulisque scopis spectandum,
quid per se repugnet, quid per accidens, quid ve-
ro admittat vnumquodque. Habitus vero corpo-
ris, color, venarum tumor, ætas, anni tempus, o-
stendunt quomodo sint vires affectæ, docentque
sanguinem abundare, & illius qualitatem, & quo
in loco redundet; & reliqua, quæ postea scopos in-
dicant: & propterea illa tanquam coindicantia, &
correpugnancia commemorantur. Sanguis ita-
que multus multum euacuari postulat, indicante
scilicet copia humoris, quantitatem sui præsidii.
Verum licet hic abundet, parum educi debet; nec
ita abundat, ut in principio, propter longitudi-
nem morbi & quartanam præcedentem: & pro-
pterea magis affatus est & crassus; ideo latam se-
ctionem indicat: nam qualitatem remedii quali-
tas humoris indicat. Sed omnino lata sectio fieri
non potest, ut diximus, ne spiritiosa substantia exha-
let, viresque, quæ iam debiles ex longo morbo sunt,
dissolvant. A vena autem extrahendus est sanguis,
quoniam in venis abundat. Secunda autem inter-
na sinistri cubiti, aut ea, quæ est inter annularem &
auricularem digitos sinistræ manus; maxime ut a
liene, fomite malorum, humore educatur. Hæc
nim modo locus indicantium, locum indicabit
remediorum. Eo vero tempore sui vacuationem
postulat sanguis, quo facile & commode exire po-
test. Hæc quanquam magis conveniant in princi-
pio; tamen si morbus progressus est, relinquere
non oportet, modo vires tolerant. Et quanquam
hic quædam indicabant, quædam contraindica-
bant sanguinis missionem; quædam vero coindi-
cabant, quædam correpu gnabant, ut iam satis o-
stensum est; hanc etiam ob causam ex saluatel-
la seu vena lienari manus sinistræ, quæ est inter
auricularem & annularem digitos, parum sangui-
nis admodum crassi & feculenti extraximus; sed
in parva quantitate, ob vires debiliores, & mor-
bi longitudinem, & ob hæcticam cum putredine,
quæ tamen in principio erat. Profuit etiam
ad sputum cruentum, ob diversionem sanguinis.
Sed hicaliquis rogabit, quare non in cubito? nam
Græci fere semper in cubito miserunt sanguinem,

& non in manu. Huic respondemus, nos ab expo-
rientia edoctos hanc venæ apertionem in scurbutico
maxime prodesse: quanquam etiam in illis in cubi-
bito quoque misimus. Nam perinde puto, siue in
cubito siue in manu fiat. Sic enim in filio illo præ-
toris Castricomii, in cubito misimus; ac æque con-
tulit. Postea venimus ad reliqua remedia, nempe
ad apertionem & alterationem, etiam leuem eua-
cuationem; nam materia melancholica rebellis
est, & per vices educi debet: deinde etiam ad con-
fortationem, & supradictas intentiones; eodem
modo indicantia & coindicantia, contraindican-
tia & correpu gnancia perscrutando; ut de missio-
ne sanguinis: quæ quidem missio sanguinis sit loco
exempli aliorum: nam omnia repetere non opus
est. Et cum post sanguinis euacuationem opus sit
purgatione humoris melancholici, qui crassus est;
prius aperientibus opus erit: & sic quo ad secun-
dam & tertiam intentionem: quarum una est a-
pertio, primo executioni mandanda; quoniam
obstructio ex parte causata est intemperiei: deinde
vero alteratio administranda; vel utræque hæc in-
tentiones simul peragenda. Apertio autem in re-
mediis primæ intentionis magna ex parte etiam
adimpletur, ut phlebotomia, quæ iam præmissa est,
hæmorrhoidum apertione, si opus est, purgatio-
ne, potionibus præparantibus, sanguinem deni-
que mundificantibus. Si quæ autem obstructionis
adhuc reliquæ supersunt, vel seorsim, vel una cum
tertia intentione principali poterunt extirpari.
Tertia enim intentio principalis, cum sit altera-
tio; alterabitur intemperies facta per contrario-
rum applicationem; siens vero adhuc, partim in
euacuandi aperiendique intentionibus prohibe-
bitur; partim etiam diæta boni succi, & attenuan-
te, quantum ad lienis intemperiem; humectante
vero & refrigerante, quantum ad febrem, altera-
bitur. Et dum hæc fiunt, etiam corroboratio o-
puserit; quæ est quarta intentio, quæ scilicet de-
bilitatem membrorum ex intemperie propulsa-
bit: & hæc fere simul in alteratione perficitur, &
post eam, secundum viscerum exigentiam exse-
quenda. Nam fieri non potest, quin stomachus &
hepar in hoc casu maximam confortationem requi-
rant: tum quod in ipso scurbutico debilitantur,
tum quia fieri vix potuit, ut in præmissarum exe-
cutione intentionum nihil labefactarentur. Istis
itaque præmissis, iam ad particularem materiam
remediorum, ad singulas intentiones facientes,
veniamus. Statim itaque a missione sanguinis de-
coctum infra scriptum bibendum mandavimus:
*℞. corticum rad. cichorii. petroselin. per noctem in ace-
to infusarum, & leuiter expressarum ana ℥. j. infunde-
bamus in aceto, ut magis inciderent, & ad apertio-
nem lienis facerent, & minus calidæ forent: Gly-
cyrrhizæ rasæ ℥. vj. propter tussim, & quia sputum
purulentum etiam aperit: Vngulæ caballinæ viri-
dis m. ij. ad sputum purulentum & cruentum va-
let; imo phthisi opitulatur, & hæcticæ prodest,
& bechicum est: Viol. ob febrem hæcticam: nam
humectat & infrigidat. Capill. ven. pectori con-
uenit, & lienem aperit, nec calorem inducit: nam
herba*

bito sanguis
miserant.

In reliquis
medicis eadem
perscrutando.

Reliqua inte-
tiones quam
do etiam eis
ploranda.

Apertio.

Alteratio.

Corroboratio.

Potio præpa-
ratoria similis
ter aperiens
& alterans.

herba est satis temperata: Scabiosa: pectori enim prodest, ulcerationi & cuius apostemati interiori, *an m. B. bekabunga, cochlearia*, a proprietate valent ad scurbutum. Fumiterræ; melancholiam mundificat: Hyssopi; pectus aperit: ceterach, scolopendrii vulgaris: Ceterach. maxime spleni confert: & scolopendrium licet non ita aperit, tamen ad lienem valere experientia constat, *ana m. B. florum cord. puar. enucleat. anap. j. coquantur in sero lactis, pro lb. j. B. Zacchar. candi, hac potio dulcoretur, quæ fuit præparatoria.* Interim pro alteratione, cum incallescere, utebatur lacte ebutyrato, in quo cochlearia & bekabunga incocta erant. Quando minus videbatur febricitare, etiam hæc coquebantur in lacte dulci: & summo diluculo capiebat cyathum unum. Hoc faciebat ad hecticam simul & ad scurbutum (*nam plurimos solo usu lactis dulcis, decocti cum cochlearia & bekabunga, qui non febricitabant, curavi*) & quoque ad sputum cruentum. Utebatur etiam pro potu ceruicia tenui, in qua vngula cabell. cum rad. incocta erat. Nonnunquam & his adiciebantur scolopendria, fumus terræ, cochlearia, bekabunga & ceterach. Post potionem supradictam præparatoriam, eum leuiter purgauimus: & licet hecticæ per se contra indicat, nam hecticis non conuenit purgatio; quando tamen est cum putredine, leuis purgatio dari potest, idque per vires, ob debilitatem virium: etiam ratione melancholiæ, quæ rebellis est, & vnica vice euacuari non debeat, maxime in corpore consumpto ob longitudinem morbi. Portioni itaque supradictæ adieciimus, *folior. colurca, id est, senæ ʒ j. poly-podij quercini, epychimi ana ʒ. ij. misce.* capiebat omni mane cythum unum. Deinde reiterata est decoctio absque sena, nonnunquam etiam in ceruicia communi: nam obseruatione hoc percipimus, melius ad scurbutos valere aliquando etiam si magis incallescere æger, ob hecticam, in aqua vngulæ caballinæ & communi incoquebatur. Pectus autem ob tussim & hecticam inunximus butyro recenti, oleo amygd. dulc. & olea violaceo: etiam vnguento pectorali nostræ descriptionis, quod alemariæ in officina paratum habebamus. Ad sputi facilitationem *syrup. liquiritia, viol. cap. ven. simul mixtis utebatur*, etiam tale ecligmate: *℞ succi vngula caballina optime depurati ʒ j. B. succi bekabunga depurata ʒ B. syrop. capill. ven. ʒ. j. Zacchari penidierum ʒ. j. B. zaccharum cum succis post depurationem vnica vice ebulliebat, ut in loch seu ecligma concrederet.* Præscripsimus etiam pullam Benedicti Fauentini præceptoris mei, quæ valet ad hecticam & præseruationem a phthisi: & pro sputo cruento, in principio decoctum portulacæ cum vngula caballina: deinde decoctum hordei mundati, & vngulæ caballinæ, & alia quædam, quæ in practica Benedicti Fauentini habentur in sua empirica cup. de phthisi. Et tandem hecticæ desit, nec amplius tussiebat: & a sputo cruento & purulento curatus est, & calor febrilis maxime sedatus: & vrina, quæ erat valde passæa, subrubea, nigra, crassa, feculenta, incepit minus esse tincta; ita, ut febris iam euanesceret: tunc de-

num ad magis lienem aperientia, & tumorem discutientia deuenimus; simul decocto superiori addentes illa, quæ viscera & stomachum magis corroborarent, ut absinthium Romanum, & hoc modo: *℞. corticum rad. cichorii, petros. an. ʒ. B. scolopen. cichorii, ceterach, bekabunga, cochlearia, fumiterræ, agrimonie, absinth. Romani ana m. B. florum cord. anap. j. sem. anisi ʒ j. sem. endiuia. agni casti, ana ʒ B. puar. pass. enucleat. p. j. corticum rad. cappar. ʒ iij. fiat decoctio in aqua communi, pro lb. j. B. colentur. adde syr. sceletyrbic: nostri, syr. de fumoterra, de endiuia, de cichor. cum rhabarb. ana ʒ B. misce.* Syrupus sceletyrbic noster conficitur ex succo bekabungæ & cochleariæ, cum zaccharo. Nullum præstantius empiricum in scurbuticis inueni. D. Sasbotus consiliarius regis Haghenfis, cum scurbutica passione deplorare laboraret, & medici sui præsentis, D. Antonius Henricus Vergoir, & D. Hugo, medici Haghenfes, de eo desperarent; superuenit illis Doctor Nannius, medicus Amstelrodamenfis doctissimus, qui inuenit eundem laborare scurbuto; & breui eum, præter opinionem aliorum, restituit. Fuit tamen semper postea huic passioni obnoxius, & vndique quærebat consultationes. Huic igitur, ut hoc syrupo nostro vteretur, bis aut ter in septimana, consulimus: & nostra ope in posterum præseruatus, ita, ut quotannis pro eo ac aliis amicis talem syrupum in officinis mihi parari iusserim. Tabulas etiam alterantes, aperientes & confortantes (*cum ex decocto supradicto, cui sena incocta erant, usus fuisse noster nauta*) similiter ei dedimus, ita præparatas: *℞. specierum diarrhod. abb. ʒ ij. specierum trionsant. trochiscor. de cappar. ana ʒ j. dissolutis in qua agrimonie qu. l. adiecto zaccharo, fiat confectio in tabulis, ut artis est.* Ceterum istis præcedentibus, quanquam ipsius scurbuti valentiora symptomata non cessarent, permanente lienis duritie, & cruris scirrhusa dispositione, tum dolore ingenti in scapula. Autumno crescente, ne ad hydropem vel cachexiam tenderet, ad dicta symptomata amouenda, præhabitis dictis intentionibus, accessimus; etiam ad particulatiora remedia deueniendo, quæ ex quatuor fontibus iam supradictis hausimus. Durities enim illius lienis, tum obstructio, post febrem quartanam relicta, præcipue auferenda erat, antequam ad cruris duritiem, tum nigritiem, curandam accederemus. Obstructione enim ablata, reliqua accidentia facilius (*ut diximus*) curabuntur, tanquam ab hoc trunco procedentia: nam illa rigiditas coxæ, tum color ad nigrocinem declinans, cruris tum etiam totius corporis, non solum accidit propter attracticis, quæ est in liene, imbecillitatem: verum etiam quando meatus, per quam atrabilis feculentus humor ex iecore in lienem deriuatur, obstructus est, & lien in tumorem eleuatus, impurus ac vitiosus sanguis subinde in vniuersum distribuitur corpus, illud ipsum nigredine afficiens, ac nonnunquam immedicabilia vlcera proferens. Sed quia ista materia fuit hic multum tenax & viscosa, potius rigiditatem cum nigredine, quam vlcera in cruribus produxit: nam alioqui materia illa melan-

Decoctio
magis aperi-
ens, discuti-
ens, corrobo-
rans.

Syrupus sce-
letyrbicus
noster.

Tabula alte-
rantes, ape-
rientes, con-
fortantes.

Processus ad
lienem duritiem

78 *Infuso sena, gassia, confectio hamech.*
 cholica fuisset acris ac fuliginosa. Est itaq; ut diximus, hæc obstructio lienis, tum durities, cuncta reliquorum symptomatum, tum oruris, tum gingivarum sanguifluarum, tum doloris scapulæ. Igitur illa prius amouenda præ ceteris extenuatoriis; & propter tumorem, attenuantibus & discutientibus; & propter duritiem, etiam mollientibus & discutientibus. Et sic præcessit sanguinis missio, deinde potiones dictæ, ex ceterach. cap. Ven. bekabunga, cochlearia, in principio pectoralibus (ab hecaticam, cum spurum) permixtæ. Sed hecica iam ablata, paulatim ad pute lienem aperientia devenimus: ad rad. capparum, chamamisci, ad ceterach bekabungam, nasturtium aquaticum, laurifolium, cochleariam, & similia: & purgavimus subinde cum infus. senæ, aut cassia, etiam tandem cum confectio hamech, secundum quod nobis videbatur utile. Demum confortavimus cum electuariis, ut speciebus diacapparis, & similibus. Extremus vero lienem inunximus oleo cappar. mox linimentis, quibus vis emolliendi, attenuandi, discutendi, corroborandi aderat: *℞. olei amygd. dul. olei de capar. emplastro de meliloto an. 3j. ammoniaci in aceto dissoluti 3ij. pulv. corticem, rad. cappar. ceterach ana 3j. pulv. scolopend. sicca, rad. filicis an. gr. v. vera q. fiat linimentum, vel unguentum pro lienis.* Talibus & similibus procedendo per duos menses obstructio & durities tandem ablata fuit. Si autem scirrholam dispositionem lienis incurtisset, fortioribus usus fuisset, ut cerato nostro ammoniaco. Vixit etiam ad miraculum, ad topicos minores, duos & scirrholos, & maximè honoreta ex eo sæpe habui, & lucrum. Nam cum zythepse cuidam in scroto, seu, ut barbari loquuntur, in bursa testium tanta durities esset, cum apostemate, ut nullo modo nec emolli, nec maturari posset, hoc tamen prædicto cerato effeci. In scirrholo autem lienis, ut Galen. etiam docuit, lib. 2. ad Glauc. cap. 2. scirrholo, utimur primo solis emollientibus, deinde discutientibus: nam alternatus eorum usus prodest. Sed nostris prædictis remediis, durities tum obstructio cessavit. Interim eodem tempore pro dolore scapulæ, qui ad os adiutorii tendebat, & ita vehemens erat hoc symptoma, ut sui quoq; mitigationem statim uniuersalibus remediis præmissis, indicaret, & ob defluxum humorum per nucham ad scapulam, nucham inunximus oleo chamomillino & myrrino; scapulam vero oleo anethino & chamomillino. Sed dolor ita increvit, ut multas noctes insomnes ageret. Inunximus postea nostro unguento alabastrino; sed frustra: etià unguento dialthæa. Tandem applicuimus sacculum quadratum interstium, ac repletum sale tosto milio, tosto, furfure & floribus chamomillæ: & eo sacculo calide admoto instar incantamenti dolor sedatus est. Iam adhuc duo pathemata scurbuti restabant, sanguifluus tumor gingivarum, cum ulceratione: & crurum durities scirrholosa. Affectus iste præter naturam non potuit curari, nisi sanguinis missione peracta, & purgatione, tum iis, quæ lienem aperirent, ac causam scurbuti prius, tum intemperiem amo-

uerent. Illa cum iam præmissa forent, gingivas ablui iussimus variis decoctionibus, ex plantag. consolida minore, rosis, cimisi rubi, bekabung. & cochlearia. Quibus colatis, tum mel. rosaceum, tum rob diamoronis adiecta fuere. Etiam hoc puluere in pollinem redacto gingivas post lotionem confricabat: *℞. alum. vsti, salis vsti, gallarum exsiccatarum, cornu cerui vsti, salvia, exsiccat ana 3j. in pollinem conterantur.* Aliud quoque vsti sumus: *℞. peruinca, plantag. cum rad. cimari rubi, matricaria, salvia ana m. j. cortices arantii vnius, bulliant in lb. 2. ceruisti veteris clara, & lb. j. vini Pictavi. vel rubei Gallici & sgyptici, ad dimidium fere in olla aenea. colatis adde mellis ros. 3ij. eo os abluatur, ac gingivæ confricentur: ℞. alum. vsti, 3j. salis vsti 3ij. gallarum, cornu cerui vsti an. 3j. maceris 3ij. foliorum salvia sicca, num. iij. in pollinem conterantur eodem modo & pulueres cochlearia & bekabunga exsiccatarum valent. etiam si gingivæ solo succo cochleariæ confricentur: vel cochlearia & bekabunga cocta cum lacte, & eius decocto gingivæ sæpe abluantur. Noster vero patiens ex sola aqua destillata cochleariæ & bekabungæ, eaque abluens sæpe gingivas, fuit curatus. Vltimum autem symptoma erat totius femoris sinistri, tum cruris, & præcipue genu, tumor ac durities propemodum scirrholosa, ac in lapideam materiam conuersa. Eandem intentionem desiderabat qua scirrhus curatur: emollientibus primo, deinde discutientibus, & moderate emollientibus: vicissim iis utendo, ut Gal. lib. 2. ad Glauc. narrat de puero Cercidii, quæ a tumore scirrholoso curauerat: tam diu utens emollientibus, donec mollietates manifesta sentiantur, & caro exterius ruborem quendam extendat: mox ad nonnulla discutientia deuenit: demum ad emollientia, absq; discutientibus: tandem ad maiora discutientia: vicissim tum his, tum illis utendo: nam si altero tantum medicamentorum scirrhum curare tantum fecimus, ut dicebat Gal. nequaquam sanabimus. Quæcumque enim nimis digerunt, ob calorem vehementem, digerentem, scirrhum in tophaceam duritiem concretum faciunt: quæ vero nimis emolliunt, non possunt sola præstare, ut scirrhus decreseat. Alteratus igitur eorum usus moderatus confert. Sed nec, quæ molliunt continuo affectum curant. Opus enim est & digerentibus; non quidem vehementer, sed quæ molliendo commode id præstent. Cum itaque crus ob tumorem & duritiem ita inflexile erat, ut non nisi scipionibus incedere posset, hunc affectum vltimum præter naturam, aliis præmissis uniuersalibus, hoc modo topicis & localibus medicamentis curavimus. Primo inunximus oleo liliaceo & amygd. dul. postea adiecitimus parv. olei chamomillini: deinde oleo liliaceo; & propter dolorem, etiam ad discutendum, simul cum unguento alabastrino, mox dialthæa, cum mucilaginis, & angia virulina & felina, aliisque emollientibus. Postea fomentavimus totum crus cum decocto pedum vituli & intestinorum, spongia in eo immersa fouentes. Postea iterum inunximus linimento composito ex oleo chamomill. & emplastro de meliloto. Tandem ad varia cataplasinata, cerata, em-*

Quomodo g. a. g. u. a. sanguis. si fuerint curati.

Experimenta ad ganglias sanguifluas scurbutis.

Processus extra tumorem scirrholos si ipsius cruris.

Scirrhi perfecti curatio, ex Galeno.

Transitio.

Fomenta.

Cerata.

Infuso sena, gassia, confectio hamech.

Quæ sunt in infusis appi.

Prædictum cerat. am. am. m. m.

Quomodo scirrholo curatur.

Processus in illis, q. a. l.

Nota sacculum.

plastra maxime emollientia deuenimus: idq; longo tempore. *Vt est ceratum de mucilaginis;* quo ego vtor etiam in doloribus, & tumoribus duris inuiscatis, quales etiam in Gallico morbo laborantibus apparent tophacei: etiam nostrum ceratum de ammoniaco hic confert. Sed istis omnibus parum profecimus: quanquam illo tempore non videbar cerato ammoniaco nostro, cum eius inuentionem nondum haberemus; sed hoc Delphis nostro Marte, & egregia obseruatione inuenimus. Cum autem crus eque rigidum maneret, per multos dies per os dedimus omni mane cochlear vnum; postea dosin augendo, ad quatuor cochlearia, aquæ cochleariæ distillatæ in arena. Et coxam tum femur inunximus oleo laurino. Et ne nimis incalesceret, parum adiecimus olei rosacei completi. Deinde iterum ad emollientia deueni: mox ad discutientia. Et quotidie omni mane iussimus crus tum femur ac genu euaporari hoc decocto:

*℞ parietaria, meliloti, florum chamomilla cum toto, absinthii communis, foliorum & summitatum althæe, malua, vrticæ vrentis ana m. ij. sem. fenugraci, lini an. ℥ ss. rad. althæe ℥ ij. incidenda incidantur, & contundenda contundantur; & coquantur, in aqua q. s. ac ponatur pes nudus super vasculum decoctionis dictæ: & vndique pannis tegatur; vaporemque ascendentem ex aqua decoctionis calida, per horam integram matutino tempore suscipiat; idque per plures dies continuando, vt totum crus sudore madescat & perfluat. Deinde absterfo sudore calide obliniatur. Deinde oleo castorino, & deinde pannis laneis fovebatur calidissime totum crus: idque continuando per plures dies. Illoque euaporatorio vtens, paulatim ad miraculum hic noster patiens a symptomate dicto conualuit; & potuit tandem crus mouere: ita vt illo medicamento diuino cessaerit tum tumor, tum durities; vt relictis scipionibus optime inambulauerit. Attamen cum iam cōualuisset, ac obambulare posset, pro confortatione iuncturarum, tum neruorum; & ad reliquias durities emolliendas, tum discutiendas, circa genu iussimus applicari ad tempus *emplastrum de oxycroceo*. Nigrities autem totius corporis, tum cruris, ex assumptione per os aquæ cochleariæ distillatæ in arena, eiusque solius vsu quotidiano euauit. Sed hoc etiam addendum, quod fere omiferam, in decocto euaporatorio postea etiam adiunximus *cochleariam, bekabungam & nasturtium laurifolium*, quod vulgares loco cochleariæ intelligunt. Et ita egregie hunc nautam, ab aliis pro deplorato habitum, tum alios multos a simili duritie scirrhusa crurum in scurbutica passione persanauimus. Ita & Cornelium Buscopium, organistam Delfensem insignem, cui femora & crura ex scurbuto per totam hyemem indurata fuerant. Memini me quoque aliam mulierem a simili duritie scirrhusa in crure curasse, quæ tamen parum tendebat ad œdema, ex scurbutica passione; missione sanguinis præcedente, tum purgatione, & decocto cochleariæ, bekabungæ, & similibus: & his infra scriptis duritiem postea curasse: primo totum crus inungendo (*quia non nihil incalescebat*) duabus*

partibus vnguenti popul. & vna parte olei chamomil. deinde hæc, quæ sequuntur cruri applicabantur: *℞ florum chamomilla, meliloti, florum lupulorum, florum anethi, foliorum ebuli an. m. ij. artemisiæ m. j. cumini, anisi ana ℥ ss. pistentur, postquam cocta fuerint in cereuisia communi ad mollitudinem extremam; & adiecto butyro recenti, in formam cataplasmatismis coeant: & cruri apponebatur. Tumor statim paulatim desit; hoc subsequenti emplastro adhuc admoto: *℞ stercoris bouini lb. iij. farina fabarum m. j. butyri recentis, olei rosacei, olei chamomilini ana q. s. pro emplastro; quo totum crus inuoluatur. idque continuando per aliquot dies, sana euasit: quanquam hoc malum inueteratum non esset: nam a quartana in scurbutum, & deinde in cruris duritiem incidit. Sed præmissis vniuersalibus, ab affectu cruris præter naturam breui prædictis localibus remediis conualuit. Medicamenta vero ante topica adhibita, hæcerant: Primo a venæ sectione, sanguine pauco demisso, ex vena lienari in manu sinistra, in pituitosa ac melancholica muliere, vt cunque debili; hoc apozemate hæc ipsa bis in die utebatur: *℞ cort. rad. feniculi, apij, petroselin. glycyrrhizæ ana ℥ j. fumaria, scolopend. ebuli, nasturtij aquatici, cochleariæ, bekabungæ, cassiæ, chamæd. chamæpiticos ana m. j. ss. florum cordialium p. j. seminis anisi ℥ ij. ss. sem. quatuor frig. maior. & minor. ana ℥ ss. cort. rad. thamaris. cappar. ana ℥ j. ss. polypodij querc. ℥ ij. trochis. de cappar. de rharbarb. simul ligatorum in nodulo, ana ℥ ij. coquantur in aqua communi, ad lb. ij. stent deinde infusa per noctem: mane expressioni adde syr. de scolopend. de fumo terra an. ℥ j. ss. syrup. de end. ℥ ss. misce. Postea adhuc semel reiteratum fuit: & imposita ℥ j. ss. folliculorum senæ. Eoque finito decocto, eandem hoc modo purgauimus: *℞ confectiois hamech ℥ ij. diacathol. diaphœnic. ana ℥ j. ss. cum ℥ ij. vel iij. decoctionis radicis filicis; fiat potus. Quo septies satis copiose aluum deposuit. Lienem vero bis in die inungi iussimus cum oleo de capparibus. Et quod ad crus attinebat, tandem ad topica supradicta accessimus. Mulier hæc, vxor, erat illius Iacobi cognomento Magni, quæ ad viam vulgo dictam *Lutkeonteropiam* Alcmariæ decumbebat. Eodem modo & alius quidam, crus induratum habens ex scurbuto: vt multis mensibus inambulare non posset, hoc fomento tum linimento subscripto, pristinum statum recuperauit: *℞ florum meliloti m. ij. florum chamomilla m. j. malua cum toto, artemisiæ ana m. j. ss. bekabungæ, cochleariæ, fumiterre ana m. j. sem. fenugraci ℥ ss. rad. althæe ℥ j. sem. ammeos, petroselin. an. ℥ j. coquantur in aqua communi, pro fomento. Primo recipiebat euaporationem: deinde calide lauabat crus: mox lineis pannis instinctis calide crura inuoluebat. Idque continuando per aliquot dies, demum totum crus linimento sequenti inungebat: *℞ emplastri de meliloti ℥ ij. olei amygd. dul. olei lilior. olei chamomil. ana ℥ ss. misce. atque ille similiter conualuit. Huic tamen; tum mulieri, præcessit quoque missio sanguinis. Hic tamen non febricitabat, nec admodum incalescebat, cum scurbuto afficeretur. Ideo præcedentibus portionibus præparatoriis, antequam cruribus******

Aqua cochleariæ mira efficitur.

53.

Cruris enaporia gerium.

Oleum castorini.

54.
Emplastrum de oxycroceo.

Alia mulier scurbutica a duritie cruris quæ adematosa curata.

Emplastrum.

55.

Aliud emplastrum.

56.

Alius nautæ a simili symptomate a nobis curatus, annor. 48. robustus. Fomentum. Linimentum.

57.

ribus remedia apponerentur vsus est, hoc modo:

℞. nasturtii aquatici, cochlearia, bekabungæ, fumi-terra, scolopend. cuscute, chamed. chamæpit. ebuli cum toto, apii cum toto, an. m. j. flor. cordialium p. j.

Potio prap-
ratoria & si-
militer eua-
cuans.

*rad. liquir. brusci, asparagi, petros. an. ʒ ss. semin. ani-
si ʒ j. ss. sem. quatuor frig. maior. an. ʒ ss. folior. senæ
ʒ j. ss. epithymi, polypod. quercini an. ʒ ss. hellebori ni-
gri ʒ ss. cicerum rub. ʒ ij. coquantur in sero lactis, pro
lib. ij. dulcoretur sacch. potio. sumebat bis in die,
quia fortis erat nauta & robustus. Deinde pera-
cta venæ sectio in manu sinistra, post ij. dies, ex ve-
na lienari. Deinde eum hoc modo purgauimus:*

Purgatio.

*℞. confectiois hamech, cassiæ recentè extracta an.
ʒ ss. feri lactis ʒ iij. syr. sceletyrbici nostri ʒ ss. summo
diluculo exhibitum. Et excreuit plus octies. Huic
gingiue non erat admodum vlcera: & ideo
solo decoct. cochleariæ, bekabungæ & nasturtii
latifolii curabantur. Mox ea quæ diximus, cruri
adeo rigido vt flecti non posset, applicuimus: ho-
minemque dictis remediis breui curauimus. Vi-
detis quod numerus malorum numerum reme-
diorum ostendat. Et quod non semper in omni-
bus iisdem remediis vsi sumus.*

Gingiuæ cu-
rata.

58
Numerus
malorum nu-
merum re-
mediorum
ostendit.

*Habetis itaque exempla curatorum, in aliis etiam
morbis vobis imitanda; vt iam vestro Marte,
modo diligentes esse velitis, omnes scopos curandi as-
sequi possitis, tum instrumenta, quibus scopi inueni-
antur; eo modo quo nos inuenimus scurbutum cura-
ri per indicationes, vel etiam ratiocinationem, in his,
quorum naturam & vim certo percipere potuimus.
Sic per indicationem in scurbuto inuenimus multi-
tudinem humorum melancholicorum prius esse a-
mouendam, deinde obstructionem tollendam; tum
reliqua omnia per ordinem transigenda; affectu præ-
ter naturam, tum causa eorundem ita indicante.*

Que per in-
dicationem
in hoc mor-
bo inuenta.

Que per ob-
seruationem.

*Iam etiam quedam inuenimus (in quibus indica-
cio locum non habuit, nec vis ipsa aut natura certo
percipi potuit) per obseruationem seu experientiam:
vt cochleariam, bekabungam huic morbo vi qua-
dam occulta conferre: quæ etiam a plebis habui-
mus, sed in meliorem formam redegitur, vt in sy-
rupos: vel iisdem in decoctis aut etiam in fomentis
exterius vsi sumus. Tertio etiam quedam inueni-
mus per analogismum, cum adhuc sub iudice lis sit,
ad quem morbum referri certo debeat: ita vt etiam
medici præstantiores hætenus de eius essentia dubi-
tarint; præsertim qui non adeo multos scurbuticos
præ manibus habuerunt, ac nos in nostra regione, v-
bi plurimi scurbutici inueniuntur, ac melius resti-
tuuntur. Ideo etiam Haghenfes medici, licet ex-
pertissimi, in Sasboto de scurbuto, ne cogitabant
quidem, nisi postea, Nannio medico Amstelro-
damensi accedente: nam & Amstelrodami inter
nautas morbus magis notus est: sic & nobis Aloma-
rianis. Ergo cum naturam affectus, tum causam,
non ita perfecte cognita haberemus, similitudine af-
fectus admoniti, hæc quæ lienæ conferebant adhi-
buimus.*

60
x hoc ex-
mplo alia
scenda.

*Habetis ad amissim, cognati carissimi, vt spero,
exemplum curandi, quod in omnibus aliis morbis
imitari possitis, vt in expertos medicos enadatis, no-
stra diligentia, qui hæc in compendium colligimus.*

*Valete. Prima scripta fuit epistola 1558 ad fratrem
meum Iacobum Forestum, nunc denuo anno 1590. ad
vos rescripta.*

Petrus Forestus; Reipubl. Delfensis
medicus, patruus vester.

SCHOLIA.

IVenesisti cum insignia Doctoratus in Acade-
mia Patauina cum honore consequuti essent;
anno 1594. mense Iunio, feliciter & incolumes
in patriam redierunt. Ita vt iam intra centum an-
nos sex medici ex familia nostra Forestorum ex-
stiterint.

Ceterum scurbutus morbus, fuit veteribus in-
cognitus: de quo Ronsseus, vetus noster amicus,
cum quo Louanii quodam familiariter viximus,
medicus si quis alius eruditissimus, nostra ætate
libellum edidit insignem, de magnis lienibus Hip-
Pliniique stomacace. At stomacace & sceletyrbe
veterum, videtur esse scurbutus. Scripserunt au-
tem de stomacace & sceletyrbe Plinius lib. 25. cap.
3. & Strabo lib. 16. sua Geographia. Græcorum ti-
men & Arabum regioni ignotus hic morbus fuis-
se videtur, quia Pliniana appellatione nusquam v-
tuntur. Sceletyrbe autem, quæ depingitur ab au-
ctore definitionum medicarum, diuersum omni-
no est malum ab affectibus crurum, qui in scur-
buto visuntur. Apud Auicennam tamen, cent. 3.
fen. 13. tracta. 2. cap. 5. vbi differit de signis aposte-
matum lienis, possumus quasi inuenire congeriem
symptomatum, quæ in scurbuto visuntur. Et Æ-
gineta scirrhi notas ponit, & Alexander Trallia-
nus, vbi agit de phlegmone ex atra bile: quamuis
nec icteritia nigra est; nec etiam volutulus hæma-
tites, vt Johannes Langius putabat, vt etiam longo
sermone docet idem Ronsseus c. 4. contra Lan-
gium. Atque is vult, quod maxime accedat ad illa;
quæ Hippocrates de magnis lienibus scripsit. Vul-
gares nostri scurbutum vocant, a Schorbuck,
quæ dictio Danica est, sed a Saxonibus etiam v-
surpata, nostra lingua vulgari Schuerbuck appel-
lata. Scribit Blienburchius in epistola ad Echium
scripta, de qua antea diximus, suo tempore quo-
dam Regnerio Snoy, multæ eruditionis & exerci-
tata praxis medico, vocatum fuisse Gingipedium,
a gingiuis & pedibus corrupto sanguine infectis;
coq; sanguinem mundificantia recte ad curandi
rationem adhiberi. Non tamen in hoc malo sem-
per gingiue & pedes inficiuntur: quin & brachia
infici possunt; quod in Nosocomio Delfensi in
quodam agro decumbente ex scurbuto, obser-
uauimus; cui brachia purpurea, violacea, plumbea
& variegata erant: quemadmodum & in Corne-
lio Iohanne Bokello, ceruifiario, & vrbis consu-
le, anno 1565. mense Aprili conspeximus. Adeo vt
etiam gingibrachium, aut πινχουρβαν dici possit.
Causæ & signa ex præcedentibus obseruationi-
bus satis innotescunt: & etiam ex parte curatio;
quibus modis recta methodo perficiatur. Quam-
uis hæc ipsa adhuc clariora euadent ex obserua-
tione sequenti, ac scholio etiam subsequente;
nonnullis simul exemplis adiectis eorum, qui
probe curati fuerunt.

61

62

Gingepedii.

63

OBSERVATIO XII.

In qua agitur de quinque agris a scorbuto curatis.

PRAETOR Castricomius, annorum triginta, vir admodum crapulae deditus, sine vxore viuens, Veneri valde addictus, & egregius potor ceruissarius; victu vtens inordinato, ceruissis admodum crassis faeculentis, & diata correpta; post quartanam in scorbutum incidit. Huius enim mali causas procaciticae sunt (*ut diximus*) primo diata crassa & corrupta, vt in nauibus nostrorum Batauorum, seu Hollandorum & Frisorum, fieri a solet. Hinc nauta ille, de quo egimus obseruatione precedente, in scorbutum incidit. Vfus quoque aquarum corruptarum, in aquarum dulcium penuria, hunc morbum creare potest, praesertim in aere calido, quo citissime aquae corrumpi possunt. Ad hoc facit & caro suilla, a coctura etiam fabolida, caro venatica putida, pisces crassioris substantiae, panis biscoctus submucidus; allia, ceruissia mali succi; quibus omnibus hic ager perpetuo fere vsus erat. Huc accedebat secunda causa, aer ambiens calidus, sanguinis subtiliores partes resoluens, & reliquam sanguinis massam crassiorem relinquens: Vigilae quoque, labores, curae, febres praecedentes: nam quidam, teste Galeno 3. de loc. affect. cap. 6. per febriles morbos melancholicum humorem contraxerunt. Non fuit igitur mirum, quod hic praetor in hunc morbum incidit. Haec enim vltima possunt generare humorem melancholicum, causam videlicet progumenam huius morbi; etiam si praua victus ratio non praecessisset: & id quidem hic tanto magis, quod omnes causae concurrerent. A quartana itaque cum in scorbutum incidisset, integris tribus mensibus lecto ex scorbuto decubuit, antequam me vocaret: vsus tamen fuerat opera illius Ioannis Galli dicti, medici Harlemonensis, sed frustra. Qui simul & patrem huius, multo tempore, vt per annum dimidium, in lecto decumbentem eodem malo, curare non potuit, cum subito syncope oborta scorbuto obierit, vt filius nobis postea narravit, patri quoque succedens in cura praetoria, eodem morbo tanquam hereditario correptus, post Galli abitum nihil sentiens commodi, varios deinde consuluit medicos, verum potius empiricos, quam vere rationales: ex quorum numero quidam ex his, conspectis cruribus maculosis, hominem Gallica lue infectum dicebant, *ut solet hos gentis nebulonum*, inscitia vel imperitia eo pertractum, vt incognitos morbos Gallicum malum iudicent; vel potius impostura, vt aegros eo melius nummis emungant: qui omnes misere corpus huius aegri suis medicamentis truculentis, vel carnificiis, ita macerarunt, vt ad restim deductus videretur. Dederant autem empirici illi, & succum bryoniae: bis carnifices. Quibus & accessit tandem presbyter quidam Alcmarianus, egregius ouroscopus, quanquam homo insulissimus, plebeis tamen, tanquam caecis de coloribus male iudicantibus, gratus: qui & laxantia caustissima superaddidit: ex quib. postremo durities

haud exigua lieni superuenit, cum maxima virium imbecillitate. His denuo relictis, lotium spectandum ad me deferri curauit; quod vineum passumque erat, quale signficare solet sanguineum humorem plerumque affari, vel in rubeam aut atram bilem transmutari; lienis oppilationem, solutionem quartanae, icteritiam, *ut Actuarius de urinis docuit*. Ideo cum vrinae nequaquam fidentum sit, vt alias etiam tribus libris ostendimus, latorem coepi interrogare de dolore hypochondrii sinistri, de morbi longitudine, de quartana, de anhelitus difficultate; & vt paucis absoluiam, per interrogationes per me factas intellexi scorbutum morbum adesse: quo & diuersis temporibus antea quoque (*ut nuntius referebat*) laborauerat. Instat itaque nuntius, vt medicamenta praescriberem: quod difficulter annuebam, cum vtilius foret aegro prius inspecto id perficere. Attamen vt illi obsecundarem (cautione adhibita, vt si medicamenta non proficerent, neque inuarent, me ad aegrum potius deduceret) hoc decoctum sequens praescripsi: *℞. cort. rad. cichorea. petros. ana ʒ. ss. scolopend. ceterach. cichorea. cochlearia. fum. terra an. m. j. agrimonia. flor. cord. anap. j. semin. anisi ʒ. j. ss. sem. end. agni casti ana ʒ. ss. vuar. pass. ab arill. mundat. p. j. corticum rad. cappar. ʒ. iij. fiat omnium secundum ordinem decoctio in aqua communi, ad lb. j. ss. coactura adde syrup. de fumo terra, de end. de cichor. cum rhubar. ana ʒ. j. ss. misce: ℞. rhab. incisi ʒ. ij. ss. specier. diarrhod. abb. ʒ. j. ss. trochis. de cappar. grana v. ligentur in pupparara; & pendeat in dicta decoctione, sumebat bis in die*. Postea rursus lotium misit, quod videbatur minus tinctum. Sed cum in eodem statu permaneret, nuntius me ad aegrum deduxit: ad quem veni quarto die Mali, anno 1555. quem inueni ad summam desperationem lecto decumbere: nam si sese leuissimo motu erigeret, in syncope cadebat; ita vt saepe pro semimortuo reputaretur. Illud enim signum scorbuti inualecentis est, vt scilicet sequatur, ambulandi impotentia, anhelitus difficultas, potissimum dum se mouent aut erigunt, vt in hoc aegro erat: si enim aliquandiu erecti sedere conantur, quasi deficiente spiritu (*ut diximus antea*) semianimes deliquo afficiuntur: rursus decumbentes reficiuntur. Aderant huic & reliqua signa dicta in Obseruatione precedente, quae scorbuti ingrauelcentis signa esse solent. Et ideo ego metuebam eidem, ne ex syncope subito, vt pater eiusdem, vitam finiret. Crura autem habebat attenuata, sed non maculosa, quae antea maculosa fuerant, *ut idem narrabat*. Interim gingiuas sanguinolentas experiebatur. Similiter & dolorem intensum in hypochondrio sinistro sentiebat. Ob quem dolorem, ex vena nigra sinistri brachii tantum ʒ. iij. sanguinis detrahare iussi. Quo dolor cessauit: nam plus mittere, ob virium imbecillitatem, ne syncope obreperet, tutum non fuit. Illo quoque decumbente sanguinem extrahere mandavi: nam erectus sedens syncope incurrere solitus erat. Cum dolor iam remissus erat, hoc decoctum sequens praescripsi: *℞. rad. liquir.* (aderat enim tussis, cum sputo tenaci; pecto-

pectoris que angustia, ex scorbuto, ob tumorem
 lienis comprimente diaphragma & pulmonem)
cort. rad. feniculi an. ʒ. ʒ. cochlearia, bekabungæ, sca-
biosa, ungula caball. ana m. j. scolop. hyss. piana m. ʒ.
capill. ven. ceterach, florum cord. an. p. j. uuar. pass.
enucleat. ʒ. j. coquantur in sero lactis ab ʒ. j. coletur &
colaturra dulcoretur & accharo candi pro sapore. Bis
lumebat cyathum in die, & ilico (quod mirum
erat) sensit alleviationem. Interim gingivæ san-
guifluas abluebat sæpissime lacte decoct. cochlea-
riæ & bekabungæ: quibus fluor ille cessabat, &
gingivæ viceratæ curatæ fuerunt. Lienem indu-
tatum inunximus cum oleo cappar. amygd. amar.
& liliorum. Deinde 9. Misi ad sanguinem me-
lancholicum purificandum, & faciem melanco-
licam purgandam, sequenti decocto usi sumus:
ʒ. cort. rad. feniculi, bugloss. liquir. rase an. ʒ. ʒ.
ungula caball. (pro tussi) capill. ven. ceterach, sco-
lopend. scabiosa bekabungæ, cochlearia. hyssop. borag.
summitatum buglossæ (omnia viridia erant,
quia in malo eramus) an. m. ʒ. cort. rad. cappar.
ʒ. ij. uuar. pass. enucl. ʒ. j. seminis anisi ʒ. ij. folliculi
jena ʒ. vj. (quia debilis erat, & facilis solutionis)
epithymi, polypodii querc. an. ʒ. ij. ʒ. fiat decoctio
secundum ordinem in sero lactis, pro ʒ. j. colatura
& acch. cand. dulcoretur. Eo decocto utens modo
semel, modo bis in die, cum alium subinde
deposuisset, hic præter spem omnium a diuturno
& deplorato morbo convaluit: gratia diuina no-
bis adfistente,

Henricus quoque ille Cernisiarius Delphen-
 sis, qui in Nola habitabat, postquam trimestrem
 febrem prius tertianam, mox erraticam, deinde
 quotidianam habuisset, scorbuto correptus est,
 ita, ut omnes de eius salute desperarent. Imperavi,
 ut quotidie uteretur decocto bekabungæ, absin-
 thii communis & Romani, & nasturtii aquatici &
 cochleariæ in ceruisia. Dentes & gingivæ con-
 fricabat aqua bekabungæ, & plantaginis: cui alu-
 minis vsti momentum incoctum erat, simul quoque
 cortices granat. & balaustior. adiectæ. Atque hoc
 pulvere deinde inperfo: ʒ. aluminis salis vsti, cor-
 ni cerui vsti, gallarum, maceris, foliorum salviae, an.
 ʒ. ʒ. in pollinem conferantur. Cum idem tussi affi-
 ceretur, ʒ. diapenid. spec. er. diatrag. frigid. ana ʒ. j.
 dissolu. cum aqua bekabungæ, & ungula caball. ad-
 iecto & acch. optimi q. s. fiat confectio in tabulis. uti-
 tur ad libitum. Et hic, quia temperatura calidiore
 erat, perpetuo sumebat decoctum bekabungæ,
 cum syr. ex succo bekabungæ: postea etiam addito
 succo cochleariæ, in minima quantitate. Et sic
 præter hominum opinionem convaluit.

Sebastianus quoque Isbrandus anno 1565. in
 foro frumentario, per plures menses ex scurbu-
 to decumbebat. Huic crura erant variegata, valde
 dura. Accedebat & animi defectus, si se erigeret:
 neq; se erigere poterat, quin in lipothymiam inci-
 deret. Gingivæ parum corruptæ erant: lotium
 valde crudum. Cum autem ad desperationem diu
 laborasset, neque chirurgorum opera curari pos-
 set, nos eundem restituiamus, sæpius hoc iulebo
 exhibito: (nam asperissima hyems erat, ut viridibus

uti non possemus.) ʒ. syr. sceletyrbici nostri ʒ. ij. aqua
 cochlearia ʒ. iij. aqua bekabungæ ʒ. j. misce pro
 duabus dosibus. Fuit sæpe reiteratum, cum conti-
 nuo sumeret. Crura pannis lienis intinctis in in-
 frascripto fomento moderate calido, & expressis
 involuebantur: mox panno laneo fasciisque in-
 volutis circumducebantur: ʒ. rad. althææ ʒ. ij.
 (& quia magna durities ad rat) foliorum malvæ m.
 iij. flor. chamomill. m. j. flor. meliloti, folior. absinth.
 communis ana m. j. bekabungæ m. iij. coquantur in
 ʒ. q. aqua communis, pro ʒ. vj. addendo aqua beka-
 bungæ, cochleariæ an. ʒ. ij. misce. Hanc curationem
 ita prosequeremur ad sex septimanas. Verum cum
 circa talum & pedium ex scorbuto duritiem to-
 phaceam quasi incurreret, accep. flor. meliloti m.
 ij. flor. malvæ m. ij. decoxi in ceruisia crassiuscu-
 la, & cum panno in ea intincto pedum involue-
 bam. Cum autem durities prædictis emollita es-
 set: denuo fomento consueto superius scripto, ad
 finem curationis utebatur. Sed hic post longam
 fomentationem, cum cutis rarior evaderet, vesti-
 cæ exortæ sunt, instar bullarum: deinde subsequen-
 ta est levis corrosio epidermidis, seu cuticulæ ex-
 ternæ: a quibus materia calida humida emanabat.
 Ideo imperavi ut chirurgus unguentum de ceruisia
 supra pannum lineum induceret, ac cruribus
 apponderet. Quibus hoc symptoma facile cura-
 tum est. Verum & in Aprili mense, cum herbæ
 iam e terra prodirent, relicto iulebo, ad finem cu-
 rationis decoquere mandavi nastur. latifolium,
 bekabungam, cochleariam, in ceruisia communi,
 quā perpetuo bibebat: & instar miraculi cum fotu
 superiori curatus est. Interim gingivæ abluebat
 quotidie cum aqua cochleariæ, bekabungæ, cui
 aluminis parum incoctum erat: deinde syr. scele-
 tyrbico nostro adiecto, parum ebulliendo. Qui-
 bus gingivæ confricabat. Hic absque missione
 sanguinis, cum in principio in hyeme essemus,
 ac debilis esset, egregie curatus est.

Eodem modo, & eodem fere tempore, Elidius
 pelli Delphensis, vicinus noster, scorbuto quo-
 que correptus est. Hunc bis purgavimus: sed a mis-
 sione sanguinis abstinuimus, eo quod corpus ca-
 cochymum esset. Purgatio constabat ex decocto
 senæ, cochlearia, bekabungæ, & similibus. Herbas au-
 tem dictas in sacculo confutas, & decoctas, cruri-
 bus ex fotu admouimus. Cum & gingivæ male-
 olentes putidas muccosæq; haberet, ac sanguifluas,
 & flaccidas: sequenti linimento ut sæpe confrica-
 rentur, mandavimus: ʒ. salviae exsiccatæ & pulve-
 rizatæ ʒ. j. aluminis ʒ. ʒ. cum succo cochleariæ, be-
 kabungæ, & melle q. s. fiat mixtura. Quibus gingivæ
 confricatæ, sanguine emanante tandem perlanatæ
 sunt. Ad finem autem curationis similiter utebatur
 decocto cochleariæ, bekabungæ, nasturtii aquatici
 & latifolii, in ceruisia communi. Quibus remediis
 & hic sanatus est.

Nicolaus Volckerus, pictor, triginta octo an-
 norum, aut circiter, qui apud templum antiquum
 Delphis habitabat, in femoris sinistri scirrhusam
 duritiem incidit: quæ in maximam molem ex-
 crevit: ita ut per totum autumnum præcedens,

achyemem subsequenter in ambulare non posset: verum perpetuo sedere ac decumbere coactus fuit; neque adhuc medici consilio vlus erat. Tandem ad vigesimum Februarii diem, anno 1566. lotium ad me (*ut fieri male consuevit a vulgaribus*) misit: postea vero & me vocauit. Crure autem inspecto quod valde liuidum ac purpurascens erat, & in tophaceam duritiem quasi concretum, ingētis magnitudinis spectabatur: ilico scorbutum esse suspicatus sum: lotio quoque nigriusculo existente, & valde rubro. Sunt enim signa scorbuti remotiora, & communia aliorum morborū, quæ etiam Obseru. precedente recensimus: quæ sex numero fore consistunt. Primum est, corporis totius grauitas; Secundum, spontanea lassitudo: quam tamen hebetiores non sentiunt, nisi a consueto exercitio. Tertium, præcordiorum aliqualis angustia. Quartum, crurum debilitas. Quintum, gingivarum pruriginosa rubedo ac dolor. Sextum, faciei color ex pallido in fuscum vergens. Hæc vbi coniunctim inueniuntur, scorbutum adesse iudicare licet. Hic vero præter illa suprascripta signa remotiora, etiam hæc propinquiora & certiora signa aderant: de quibus etiam mentionem fecimus præcedente obseruatione. Primum signum aderat, oris graueolentia. Secundum, gingivarum laxus sanguifluus tumor: gingivæ enim inspectæ sub tumida paræm erant, ad liuidum suppurascens: meamque de scorbuto opinionem confirmabant. Tertium, dentes vacillantes. Quartum, crurum macula plumbea, purpurea, nigris violis obscuriores. Quintum, lentigines innumerabiles griseæ, sine pullæ: aut solum circa os, vel sola crura superuenientia symptomata. Verum huic durities liuida subpurpurascens (*ut diximus*) totum sinistrum femur occupauerat, a genu vsque ad coxam, dextro illæso, neque indurato: & dolor similiter sinistrum hypochondrium, sed minime effatu dignus, affligebar. Id magis in sinistro crure, per consensum (*ut opinor*) lienis frequenter euenire animaduerti: quanquam in Domino Assendelphio, etiam in pede dextro idem conspexi: cui & hypochondrium dextrum duriusculum erat, non sine scirrho hepatis. Cuius & antea memini. Verum, quod mirabar, in hoc pectore, licet sinistrum femur non solum duritie sed & colore liuido subpurpurascens infectum foret, in brachio quoque dextro liuor exiguus paululum supra cubitum apparebat, sine duritie tamen ac dolore. Sed quanquam fere semper in scurbuticis (*ut antea diximus*) coxæ vel tibix nigro quodam liuore suffundantur: brachia vero rarissime, quod setatim semel vidisse Balduinus, amicus noster, qui de scurbuto scribit mihi narrauit: mihi tamen hæcenus non semel, sed iam ter hoc vidisse contigit: Primo in agro illo, qui in nosocomio Delpheni decumbebat, de quo scholio precedente diximus; cui non solum crura, sed & brachia liuore multo inficiebantur, etiam in ventre tum pectore stigmata illa variegata liuida subpurpurascens conspeximus. Secundo hoc animaduerti in Cornelio illo Bokello, Ceruisiario Delpheni,

sexaginta fere annorum: ut etiam eodem scholio recensimus. Hunc autem Ericius noster præmanibus habebat: huic quoque brachia liuida erant. Tertio vero in hoc pectore brachia variegata conspeximus: verum minus quam in duobus suprascriptis. Sextum signum proprium scorbuti, est passione magis ingravescente, ambulandi impotentia. Septimum, anhelus difficultas, potissimum dum se mouent, aut erigunt: & si aliquandiu erecti sedere conantur, quasi deficiente spiritu semianimes, deliquio afficiuntur. Octauum signum est, quod rursus decumbentes reficiuntur, ac respirant liberius: imo decumbentes se sanos asserunt. Sed quia fieri non potest, ut sine omni motu decumbant, sic interdum ut delinquentes animo langueant. Nonum signum est, quod in his rarissime deficit appetitus, & frequenter cibum appetunt. Decimum est, quod obseruatur hic aliquando motus aliquis aggrauationis: in pluribus quarto quintoque die; in aliquibus, tertio die: in paucioribus, singulis diebus, sine tamen omni febre; aliqui, simul febriunt. Sed hic ager febre carebat. Undecimum, præcesserunt aliquando febres, quæ quasi per crisin in scorbutum terminata fuerunt. Hinc sæpe post quartanas, ut iam exemplis ostendimus, vnde etiam talis scorbutus natus, contagione serpit in totas familias. & in tota monasteria: definitque in lethalem dysenteriam commutatus, ut Blienburchius ille, alique doctiores obseruarunt, & nos quoque sæpe animaduertimus. Aliquoties deficiunt subito ac mortali deliquio animi: sicuti & pater pectoris suprascripti obiit. Duodecimum signum quibusdam aliis per totum morbi decursum est constricta, ac ad egerendum difficilis: contra alius moderate fluit, ut Sebastiano illi ffrando euenit: ita ut in eodem non fuerimus vsi aliqua purgatione. Quidam & continuo ventris fluxui obnoxii sunt: ut quidam diarrhœa corripiantur lethali: quemadmodum euenit filio Iacobi Heemans Alcmariano. Alii & licetia corripiuntur, ac moriuntur: ut euenit mercatori Comen Ruchio, etiam Alcmariano: de quo alias dicturi sumus. Hunc autem endemium aliquando morbum esse vult Ronseus noster, ex aere patrio, vel aquis: aliquando epidemium & pestilentem, ex humida cœli constitutione. Sic enim cum anno 1556. pluuiæ imbresque grassarentur flante austro ac fauonio, insequente anno plurimos scelerybe ac stomacace inuasit: atque ita inuasit, ut multos in vitæ discrimen redegerit. Similiter & anno 1562. Decimum tertium signum est, quod interdum maculosa illa crura sic intumescunt, ut elephantiasin Arabum suspicari possis; rursus vero aliorum crura sic attenuantur, ut nuda cutis deturpata ossibus affixa videatur. Alii in molem accrescunt, dura & scirrhusa euadunt: ut in hoc pectore: alius œdematosa, ut in muliere, de qua ante dictum est: alius varicosa, ut non semel conspexi. Nec mirum: quia etiam aliis morbis contraria aliquando superueniunt symptomata, ut in pleuride aliisque vñuenire videmus. Decimum quartum, macula aliorum in nigras, aut pullas squamas resoluntur, uti morphea & Grecorum lepra affolet: aliorum

aliorum vero leues, aequales, splendentes permanent, cum quodam vestigio ad impressionem digiti. Decimum quintum: item morientibus quibusdam delitescunt maculae, quibus a morte uberrime efflorescunt. Decimum sextum: Conspicitur etiam aliquando, licet perraro, varicosa venarum plenitudo. Id vidimus nos in Arnolda muliere Delphensi: & in alia virgine ac famula. Sic & sub tota lingua minutissima etiam venae varicibus similis, & similes in inferiori labio varices visae fuerunt. Quod in Henrico illo zythepia (de quo paulo ante diximus) etiam conspeximus. Ceterum in hoc pectore cum totum sinistrum femur durum esset, ac gingivae subtumidae (ut diximus) quae ex obstructione lienis eveniebant, ad eam tollendam imperavimus inter reliqua remedia, ut bekabungam & cochleariam decoqueret in sua ceruisia, nec alio potu, quam eo vteretur, etiam tempore prandii aut coenae. Et his remediis infra scriptis intra paucos dies sanus evasit: & similiter a cruris symptomate, magno cum meo honore. 20. itaque Febr. hoc die decoctum primo praescripsi: ℞. fumiterre, capill. ven. ceterach, agrimonie, bekabungae, cochleariae (habebat enim has duas ultimas herbas virides apothecarius) ana m. j. scabiosae m. ss. flor. cord. p. j. liquor. ras. ʒ. vj. cort. rad. cappar. ʒ. iij. sem. anisi, foenic. carui an. ʒ. j. folior. senae ʒ. j. rhab. selecti, myrob. indor. an. ʒ. j. vuar. pass. enucleat. ʒ. j. hordei mundati p. j. foenanthe ʒ. j. coquantur in aqua communi, pro ℞. j. maneat infusa per noctem, colaturae adde syr. sceleribici nostri ʒ. ij. syr. ex infus. ros. ac cich. Nicoli, cum rhab. an. ʒ. ss. misce pro tribus dosibus matutinis. Hoc decocto quotidie ter quaterve multa melancholica foetida exercebat. Deinde 21. Februar. ℞. olei amygd. dul. ʒ. j. olei irriani, pingued. gallinae an. ʒ. ss. cerati nostri de ammoniaco ʒ. ss. misce pro linimento femoris. Linem inungebat oleo de capparibus. Postea 24. Februar. cum nulla medicamenta sumeret, ex vena saluatella in manu sinistra (nam ea, quae in brachio erat, minus apparebat) ad uncias quatuor aut quinque sanguinem detrahimus valde nigrum. Plus detrahre non erat tutum, eo quod paulo debilior esset, & quia aestate praecedente ter quaterve, cum ophthalmia laboraret, ex praescripto Hugonis Nieuenii medici Haghani, sanguinem demississet: deinde Delphos veniens in scurbutum inciderat. Sed quia nunc faciem subtumidam habebat, quasi cachecticus, parum sanguinis, licet nigerrimi ac visceridi, ad lienis obstructionem tollendam, vrina quoque rubra & nigra existente, detrahre mandavimus. A cuius detractio bene se habuit. Deinde altero die sequenti hanc sequentem purgationem exhibuimus: ℞. confect. hamech, elect. lenitini an. ʒ. ss. dissolue cum iij. decoct. bekabungae, cochleariae: addendo syr. de opithymo ʒ. ss. misce. fiat potio: qua multa melancholica pituitosa, pauca vero biliosa, deinde plurima aquea excrementa deposuit. 27. die Febr. a purgatione hoc sequenti fotu pro femore vti sumus: flor. chamomilla, meliloti an. m. iij. folior. absinthii communis, folior. malvae, cochleariae, bekabungae an.

m. ij. folior. artemisiae m. j. rad. althaeae ʒ. ij. cymini ʒ. ij. conquassata, coquantur in aqua communi q. s. & in fine adde aceti vini Rhenani opt. m. ʒ. iij. misce pro fomento, ad ℞. iij. summo deluculo & hora quarta pomeridiana fomentabatur: mox unguento sequenti femur inungebatur: ℞. unguentum superius descriptum cui adde emplastri de meliloto, unguenti Agrippae an. ʒ. ss. misce. fasciā intincta in fomento supra scripto, expressoque, totum femur bene cingatur. Quo remedio egregie crur sanatum est. Interim & hoc decocto, quod sequitur in principio Martii vti est: ℞. fumiterre capill. ven. agrimonie, scolopendriae, bekabungae, cochleariae an. m. j. sem. foeniculi ʒ. j. folior. senae ʒ. vj. agarici foemin. rhab. selecti an. ʒ. j. ʒ. iij. b. albi, foenanthe an. ʒ. j. vuar. pass. enucleat. ʒ. vj. liquor. rasae ʒ. ss. coquantur in aqua communi, pro ʒ. vii. stent infusa per noctem. mane fortissimae expressioni adde syr. sceleribici nostri ʒ. ij. misce pro duabus dosibus matutinis. Bene excrevit: & valde profuit. Sed quia circa lumbos non nihil dolebat, eos unctione sequenti inungi mandavimus: ℞. pinguedinis gallinae, olei amygd. dulc. olei anethini, resacae, mucilag. althaeae extract. cum aqua malvae an. ʒ. ss. misce pro linimento. Interim cum vitium gingivarum exiguum esset, statim a purgatione solo decocto bekabungae & cochleariae persanatum est. Alioqui ad fortiora devenissem: quale hoc est: ℞. balanst. aluminis de pluma, scissilis dicti, an. ʒ. ij. myrrhae, olibani, masticis an. ʒ. ss. fiat pul. pro gingivis inspergendus. In viceribus gingivarum & sanguifluis fluxu frequenter eo vti sumus.

S C H O L I A.

DE causis scorbuti protacartiacis, in utraque Observatione praecedente satis diximus: similiter & de signis: & etiam de causis proegumentis, & coniunctis, quae a protacartiacis generantur; potissimum Observat. octava. Sed ut haec omnia in compendium contrahamus: Primus morbus assignatus fuit in eadem Observatione, obstructio lienis: huius causa proegumena est, vel antecedens, primo hepar, copiose generans humorem melancholicum, ut retulimus: secundo, humor melancholicus, in mesaraicis praecordiisque redundans. Causa continens est idem humor melancholicus, lienem iam infarctus, vel copia, vel crassitie sua obstructionem ipsi visceri afferens. Secundus morbus assignatus fuit, multitudo humoris melancholici. Huius causa proegumena & continens, primo hepar generans humorem melancholicum: secundo obstructio lienis. Tertius morbus assignatus fuit, intemperies inaequalis: quae si fuerit sine febre, causam principem & continenter habet frigidam & siccam: si vero cum febre, calidam seu adustionis participem, & siccam. Quartus morbus assignatus fuit, gingivarum vlcus: huius causa proegumena & continens est acrior subtiliorque materia peccantis portio, quae vel a natura criticante, ut sic dicam, vel a calore sursum sublata, loca tenera humidaque facilius corrodit. Quintus morbus assignatus fuit crurum mala dispositio: huius causa proegumena & con-

Causa proegumena & coniuncta.

tinens est humor melancholicus crassus, magnitudinem augens & motum impediens; unde crura maculosa ita intumescunt, ut elephantia in Arabum quispiam esse opinetur: huiusmodi autem magnitudo aucta causam habet intemperiem crurum, ex humore presente factam, & fientem inuicem, & prius confluxam: postea debilitatum membrum facilius recipit, & sua ponderositate eo depellitur. Item antecedentem habet causam ex superiorum intemperie, & humorum multitudine. Magnitudo vero crurum diminuta, causam habet atrophiam, atrophiam autem, operationes abatas sequitur. Summa summarum causa princeps seu proegumena, atque adeo fere coniuncta scorbuticæ passionis, est humor melancholicus, id est, multitudo faculenta bilis atra in hepate cum sanguine procreata; aut putidus sanguis ex prava atque putri victus ratione procreatus. Quod ad signa attinet, ea iam diximus. Et quod ad indicationes curativas, primus morbus tollitur a pertione, qua per subtiliantia atque abstergentia perficitur. Secundus, videlicet multitudo tollitur partim intentione curativa, videlicet euacuatione eius quod iam factum est: partim præservativa eius quod fit, idque bifariam; primo prohibendo, ne talis humor amplius generetur, quod fit per curationem intemperiei iecinoris, & per ablationem causarum procatarcticarum; secundo, prohibendo ne retineatur, si quid forte iterum genitum sit: quod fit per meatuum refectionem, & per splenis confortationem. Ita prohibitio retentionis duplicem præstabit usum; nempe præservativum in hoc secundo morbo, videlicet multitudine; curativum in primo morbo, videlicet obstructione lienis. Tercius morbus, videlicet intemperies, tollitur partim intentione curativa, videlicet correctione facta intemperiei per contraria, partim intentione præservativa similis adhuc intemperiei: idque bifariam, primo per ablationem suæ causæ, nimirum humoris multitudinis; quod fit partim euacuando, partim aperiendo, partim diæta attenuante, & boni succi; secundo per roborationem viscerum. Ita ablatio humoris duplicem & ipsa usum præstabit, nempe curativum in secundo morbo, videlicet multitudine, & præservativum in tertio morbo. Sunt igitur quatuor intentiones: aperiens, euacuatio, alteratio, confortatio. Euacuationi debetur primus locus, quæ partim uniuersalis, partim particularis esse debet. Secundus locus cedit a pertioni; deinde repetetur aliquoties euacuatio. Tercio loco succedit alteratio, quæ etiam corroboracionem ex parte exsequitur. Nam corroboracionis quoque est, debilitatem membrorum ex intemperie propulsare. Priuatim tamen magis exsequitur viscerum indigentiam, nempe lienis, hepatis & stomachi. Quo modo hæc particulatim, tum aliarum indicationes perficiantur, ad longum diximus Observat. II. precedente; & iam quoque exemplis multis ostendimus: ut non opus sit eadem hic reficere. Ideo qui de scorbutico morbo plura desi-

In indicationis
ca. ratione.

derat, quam hic scripsimus, Balduinum Ronsseum, amicum nostrum legat. Verum quoniam hic frequenter mentionem fecimus syrupi sceletyrbici nostri, quem nos primum in usum deduximus, is hoc modo paratur: ℞ succi cochlearia, bekabunga an. lb. iij. zacch. optimi lb. ij. cum oui albumine depuretur, coquantur simul, colat. & fiat syr. secundum artem. Non desunt nunc & alii quidam, qui syrupum conficiunt ex radice raphani. Quidam syrupum ex solo succo bekabunga parant: sed mihi non ita placet, cum & cepæ, quæ ab aliis bekabunga dicitur, aquea sua, quæ pollet, humiditate, ex crescentiæ lienum porius materiam suppeditet. Ideo & Ronsseus, in libello suo perstringit eos, qui solius decocto bekabunga, id est, cepæ, sanitatem scorbuticis pollicentur: quo ille nihil alienius esse dicit, utpote cum aquea sua humiditate, ex crescentiæ lienum, si intro sumatur, augere soleat. Ad oris certe & gingivarum ablationem admittit, cum particeps alicuius adstrictionis sit; unde & gingivas firmiores quodammodo reddit, atque atram illam bilem sua humiditate refrenat ac compescit. Cum cochlearia tam intus assumptam, quæ vim habet detergendi, aperiendi, ut eius acrimonia declarat, utilissimam esse experior; si nempe bekabunga succus cochleariæ addatur, quæ sua tunc adstrictione leui lienem roborat, & caliditatem cochleariæ refrenat. Hinc cum tanta utilitate hoc nostrum sceletyrbico syrupo usi sumus, ut etiam nunc a Brabantiois medicis, & Flandricis expetatur; ut maximam copiam huius syrupi pro amicis annuatim confici iubeamus. Mittimus etiam aliquando integras libras huius syrupi ad Liuinum Sanderium, reipubl. Gandensis medicum, amicum nostrum singularem: cum quo vix in eisdem ædibus Bononiæ in Italia diu habitavi. Est autem hæc herba apud nos valde frequens. Conficimus & ex ea conservam valde utilem. Balduinus autem cochleariam Telephium esse putat: hinc & vlcerum sceletyrbica Telephia esse existimat, quæ & Telephi opera indigeant: unde de scorbutico cap. vii. de vlcere sceletyrbico agens, vult hanc cochleariam Telephium Dioscor. esse, Britannica, quæ utitur Plinius ad stomacacem & sceletyrbem, cum nondum intumuerit, eius loco utitur Ronsseus bistorta, quæ Britannicæ facultatibus plane respondet: nam & vim adstringentem habet, & ad oris & tonsillarum vlcerum depascentia accommodata est. Habemus autem & multa alia remedia experta: quæ hoc compositum medicamentum est: ℞ plantaginis, bistortæ an. m. j. ros. rub. ʒ ij. aristoloch. rotunda ʒ j. ʒ myrrha ʒ j. iudis ʒ j. aluminis ʒ ij. coquantur in lb. ij. vini rub. styptici ad dimidium: in olla ænea exprime, cola: adde mellis ros. colati, diamoronis ana ʒ j. ʒ misc. Reliqua vero apud Ronsseum videas. Possem & hic infinitas historias adferre, eorum, qui a me curati sunt: sed exempla iam supradicta sufficiunt. Atque ita plerisque omnes, aut præcipuos saltem morbos ac affectus lienis recensuimus. Laborat præterea lien interdum

Syrupus sce-
letyrbicus.

Britannica

*De palpitatio-
ne & pun-
ctio-
ne in lie-
ne post cur-
sum.*

dum palpitatio-
ne, & dolore punctorio, quem
multi sentiunt post cursum; & tunc de punctio-
ne in loco lienis conqueruntur. Dolor autem
iste non est punctorius, alioqui ad membranam
lienem succingentem pertineret. Sed est potius
pulsans dolor, de quo dolore nos in Schol. Obser.
7. De lienis dolore, statim in principio egimus.
Et eiusmodi dolor pulsans, quando vehementior
est, contingit in inflammatione, ob multitudi-
nem & magnitudinem arteriam in ipso liene ex-
sistentium. Atque hic dolor pulsans palpitatio-
nis instar, pertinet ad arterias. Ex cursu igitur
facile inflatur lien, ob arterias: & sentitur quasi
palpitatio vel pulsatio, propter motum arteria-
rum in ipso liene insertarum. At ubi paululum
homo quieverit a cursu, facile cessat illa palpi-
tatio, seu pulsatio. Quare nec medici de ea ullam
mentionem faciunt, nisi dolor ille continuo pul-
sans manserit, ut in inflammatione lienis contin-
git. Sed cum talis affectus non sit effatu dignus,
non putavi operæ pretium, ut de eo observatio-
nem aliquam peculiarem conscriberem. Hanc
etiam ob causam falluntur vulgares, qui nugan-
tur, cursoribus magnatum & Principum lienem
excisos esse; & ob id eos velocius currere posse.
At recte dixit Benedict. Veronens. medicus do-
ctissimus, 2. lib. de partibus corporis humani cap. 12.
de liene: *Cursoribus, ut traditur lien peculiare impe-
dimentum: propterea quandoq, nonnullis laborantibus
splen inuritur. Ad id posse homini sine vita periculo,
verisimile non est.* Et bene Galen. noster nullam
humani corporis partem sine munere aut natu-
rali utilitate esse probavit. De munere lienis ac
utilitate, satis superq; egimus in princ. lib. 19. in præ-
fat. ad lect. Quamobrem & hoc viscus non minus
quam reliqua alia custodiendum est, ne villo mo-
do afficiatur: atque etiam omni cura, ut cetera
membra, potissimum interna, sanari debet.

Sic itaque hunc librum de affectibus lienis fi-
nire decreueramus, ad mensenterii vitia, tum sæ-
ua intestinorum tormenta transeundo: Verum
nuper ad me doctissimus Henricus a Bra, Reipub.
Campensis medicus, epistolam scripsit de morbo
quodam incognito, proxime ad scurbutum acce-
dente, quoad membra, quæ exterius læduntur,
longe tamen aliter, quam in scurbuto. Operæ
pretium igitur duxi, epistolam illam ad me scri-
ptam hic inferere, antequam ulterius progredia-
mur, quæ ita habet.

EPISTOLA HENRICI A BRA,
Reipub. Campens. medici.

De morbo quodam novo & incognito, Westphalis,
Geldris & Frisis quasi endemio; quem illi die
Barenii vocant, diversis symptomatibus agros in-
festante.

Cl. V. D. D. PETRO FORESTO
S. P.

Non dubito, Clarissime Foreste, quin ex postremis
meis literis intellexeris, de reditu meo ad Cam-
penses. Jam biennium est. Toto eo tempore nihil quic-

quam a te literarum vidi. Sed ignosco tibi propter
commune bonum; nam suspicor, te totum nunc esse
edendis tuis Observationibus & Curationibus Me-
dicinalibus. Faxit Deus, ut feliciter, quod præ mani-
bus adhuc est absolvas. Nisi nuper carmen in libros
tuos de pectoris & pulmonis affectibus: sed quia non est
additum, puto serius allatum. Nunc ne omnino a-
symbolus ad te veniam en tibi, quod a data occasione in-
feras Observationibus tuis, si placebit, si minus, con-
ceperas. Legenti mihi nuper locum Galeni, qui est in
lib. 6. locor. aff. & dor. cap. 3. ubi agit de Dracunculis, in
quodam Arabia loco in tibus hominum natis, venit in
mentem morbus nobis vicinisq, Westphalis & Geldris
quasi endemus pluribus quoq, fami iis hereditarius,
populari lingua die Barenii dictus. Hic se prodit cum
vagus doloribus, valde excruciantibus, in omnib⁹ cor-
poris membris, potissimum in dorso & lumbis, primum q,
unam aliquam solet invadere particulam deinde cele-
ri motu & discursu vicinas quoq, partes occupare. Si-
quidem videre est, ut in hac lue sæpius doloribus pedum
ilico scapula afficiantur; illis tranquillæ & vestigio ma-
nus crucientur; ac ita per omnes artus malum ipsum
diffiliat. Unde etiam cum Epitheto die loopen-
de Barenii nominant. Plerumq, tamen unum ali-
quod membrum, quod per intervalla excruciat, obsi-
dere comperitur. Doloris speciem statuunt ipsi agri ex-
edentem corrodentemq, qui vermiculum, musculos
& alias partes subito, ac nonnunquam momento, variis
simul locis permeantē depascentemq, arguere videtur;
ab inseparabili proprietate ipsius morbi. Etymologia
deducentes: siquidem Barenii patria lingua singulari
quoddam lumbricorum genus denotat. Morbi hu-
ius due statuuntur differentie: quarum prima cran-
tore circa de articulationes copulatur, qui ubi diu
perseverat, profert tandem plerumque maculas & li-
curas, scorbuto nois non valde dissimiles, quæ interdum
suppurare in ulcus convertuntur malignum, imprimis
circa pedes, ex quo vermiculi instar ascaridum educi
videntur. Interdum quoq, tota materia unam in par-
tem aliquam decumbit: unde, corpore toto doloribus
liberatur, abscessus excitatur, qui in fistula malitiam
desinit. Altera differentia est absq, tumore: sed cum
priori participat dolore. Hæc interdum peculiarem
habet corporis maciem, & quasi marasmodè, cum
aliqua articulorum impotentia coniunctam. Uniq,
commune est, quod dolores noctu magis exercebantur.
Febris aut lenta, aut nulla comitatur. Alius in plu-
ribus adstrictior. Urina non admodum discrepat ab
urinæ sanorum; nisi quod interdum vermiculi, in-
star illorum, qui e putridis caseis prorepunt, in fundo
matule innatare, sicut & alii excrementis misceri,
videantur; estq, hoc illis certissimum indicium huius
morbi. Cibum atq, semper bene appetunt, alij enim
omnino respuunt. Hæc variant iuxta humoris pec-
cantis & corporis affecti diversitatem.

Causam morbi statuunt in omnium humorum Causa
ichoribus, non quidem uno in subiecto coniunctam, sed
pro cuiusq, temperamenti varietate. Quicquid sit id,
quod hanc luem causare possit, certum est, materiam
essentialem & turgidam, non tam quidem simplicem, sed
alicuius virulentia malignitatisq, participem. Mine-
ram morbi statuunt nervosum genus, per quod humor
fecta

Signa.

Differentia.

Curatio,
qua vulga-
res videntur.

ille subtilis & malignus diffunditur. Itaque his potissimum incidis confirmant: tum quia in dorso ac lumbis propter substratam medullam valde luxuriat dolor; tum quod facultatis motricis actio laeditur; denique quod a confirmantibus respicientibusque nervos inuariantur hac lue infecti. Ad curationem quod attinet, simul ac aliquem hac lue affici contigerit, protinus ad certa quadam alexipharmaca seu Bezoartica medicamenta, nulla corporis vel humorum praemissa preparatione, sine ulla methodo vel ratione praescripta, pro regionum diuersitate, incolarum observatione & experientia, decurrunt. Inter alia commendant, tanquam praesentissimum remedium, lumbricos terrestres, maxime quorum collum annulis & cingulis cingitur, quos diuersimode cum superstitiosa etiam nuxeri observatione preparant. Alii talpam vinam in olla comburunt, donec in cinerem conuertatur: de hoc puluere exhibent cum ceruisia aut vina, diebus aliquot, crescente Luna; & itidem in eius defectu. Alii spem totius curationis ponunt in exhibitione venenosi cuiusdam vermis, quem patria lingua Menywurm vocant, Itali Cantarello nominant. Alii alia huiusmodi vehementia & virulenta remedia propinant, quibus curationem pollicentur: ut sunt oua pauonis; solanum somniferum, ossa sturionis dicti piscis. Noui qui extractis esulae & ellebori vterentur. Sunt qui ex salvia, ruta, betonica & aliis huiusmodi herbis nervos respicientibus potiones conficiunt: quibus lumbricos terrestres vino prius ablutos, dein contusos, & per setaceum traiectos admiscunt: aut etiam citra eorum admixtionem exhibent septimanas aliquot: semper operam dantes, ut ab assumpta potione sudor prouocetur: quod cum primis in hoc morbo utile praedicant. Rectius faciunt, qui vacuato primum corpore; sequenti haustu vel apozemate laxatiuo, potionem infra scriptam propinant. Haustus talis esto. ℞. pul. senae solut. ℥ ij. infunde horis 12. in aqua beton. ℥ iij. a forti expressione, adde diacartham. ℥ ss. ut fiat haustus Apozema tale esto: ℞. rad. polypo. querc. ℥ j. salvia, beton. ana m. j. s. abio. ruta, abrotan. ana p. j. sem. anis. citr. ana ℥ ij. passul. munda. ℥ ss. coq. in aqua ℥ ij. ad remanentiam medietatis: aamiscendo in fine coctionis folior. senae Alexan. ℥ x. stent in infusione per noctem, hinc liquor a forti expressione clarificetur: cumque eo per colum transmittantur lumbrici vino abluti, numero nouem: Zachari quantum placet, ad cōseruationem ter in die sumat agrotus. Potionis forma talis esto: ℞. rad. succisa ℥ j. aristoloch. rot. ℥ iij. salvia nobilis, beton. ana m. j. abrotan. ruta, vinca peruinca, sabina ana p. j. coq. in aqua flumi. ad consumpt. medietatis: cum huius decoct. expressi ℥ iij. pro vice traiciantur lumbrici terrestres, circulis in collo insigniti, vino prius abluti, & triti, num. v. deinde miscetheriacae electae ℥ ss. pul. cinnam. ℥ j. zacchar. q. placet, exhibeatur mane calide, & corpus contegatur ad sudorem. Repetatur potio hac diebus aliquot continuis.

Si in abscessum permittitur, quid agendum.

Cura huius morbi aliquando in septimanas plures extenditur. Quod si vnā aliquam in partem virus procumbat, & abscessum excitet: is ut aperiatur, plantaginem cum sale in mortario contusam applicant, abscessu aperto, unguentum ex radicibus cicuta aquatica conficiunt, quas lino vel stuppa madida inuolutas sub cineribus coquunt, & contusas cum melle

miscunt in formam unguenti (putantque vermes dulcedine mellis Artici & cicuta virtute sua interfici) indeque applicant. Alii cataplasma ex radicibus sigilli Salomonis, cum aqua vel ceruisia componant: cui quandoque radicem filicis quercina miscunt. Noui nobilem matronam, quae inspergebat puluerem de talpa, combusta ut supra.

Habes breui, doctissime domine Foreste, Luis tam virulenta descriptionem, partim ex Casparis Hoffmanni medici Brandenburgici, partim ex meis observationibus cōsarcinatam. An veteribus hic morbus cognitus fuerit, & quo nomine, ex te, pro ea, quae es doctrina & humanitate, data occasione scire desidero. Ego omnino nouum morbum existimo, nec quicquam cum Graecorum Dracontis aut cum Bartapalia venositate perambulante communicare: multo minus arthritidem ex tenui materia ortam dixerim. Bene vale. Vir clarissime, & me, ut incepisti, amare perge. Ignoscas quod prolixior fuerim. Si quid habebis ad me literarum, Melchiori Wintges huius aliquando Reipublicae Monetarii filio, nunc apud vos ceruisario ad inter signum Ciconiae, committes. Iterum feliciter vale. Campis ex Museo nostro, die 28. Aprilis, Stylo veteri, Anno 1594.

Tuae dignitatis studiosissimus.

Henricus a Bra, D. Reipub. Campensis Medicus.

Clarissimo Viro.

D. D. HENRICO A BRA.

S. P. D.

Iter a tuas, doctiss. D. Doctor accepi simul & historiam illam de morbo quodam incognito, de quo iudicium nostrum exspectas. Vellem equidem voto tuo satisfacere, & quid certi de hoc malo in medium adferre, praesertim cum ipsemet dubitem, quantum ad signa attinet, quae docte a te explicantur, dracunculum esse. Scio equidem Galenum de dracunculo mentionem facere lib. 6. de loc. aff. cap. 3. qui in Arabia quodam loco (ut ferunt) in tibiis hominum dracunculi vocati nascuntur, nervosa natura, colore crassitudineque lumbricis similes. Tamen Galenus eodem in loco ait, multos audisse, qui sese vidisse dicerent: ipse vero ingenuè fateatur, se nunquam vidisse. Idcirco se neque de ortu, neque de essentia ipsorum exacte conicere posse refert. Ita & ego, ut veritatem proferam, hoc genus morbi (quanquam Anno 1595. mense Martio instanti quinquagesimus agitur annus, quod medicinam fecerim) nunquam vidi: neque quemquam nominari audiri, nisi te, qui dracunculum viderit; modo idem sit malum, de quo Arabes (cum in Arabia fiat) forte scripserunt. Conferam tamen de hoc morbo cum viris doctis. Interea remedia, quibus vulgus ad hoc malum depellendum & extirpandum utitur, de quibus scribis, licet ea ipsa varia sint ac diuersa: tamen ut mihi videtur, mere empirica, & sine ratione & methodo tam inuenta, quam usurpata videntur; quamuis ea ipsa, quae tu adicis, multo meliorem rationem sequantur: & ob hoc mihi magis placent. Non nego tamen, aliquando experimentis nos contentos esse debere, ubi ratiocinatio locum minus habeat. Recte tu quidem facis, quod nostra studia promoueas; & gratias maximas tibi habeo, quod nunquam

quam symbolus ad me venias. Historiam hanc addā Observationibus meis post scurbutum malum. Inter ea unicuique liberum relinquemus de hoc morbo suam adferre sententiam. Vale raptim Delfis 15. Maii. Anno 1594.

Petrus Forestus, Reipubl. Delphensis Medicus.

Cum hanc Epistolam D. Henricus a Bra mihi remisisset, una cum epistola D. Iohannis Heurnii V. Clar. Medicinæ in Academia Lugdunensi professoris celeberrimi, nostri amici dilligentissimi, ad eundem D. Hen. a Bra scripta: placuit eandem hic in gratiam studiosorum adiungere. Illius enim viri iudicium plurimum apud me semper valuit: licet, ut antea quoque ingenue fassus sum, noui hunc morbum nunquam viderim, quāuis hoc mēse Martio artē medicam 50. annis exercuerim.

J. Heurnius.

D. D. HENRICO A BRA.
salutem dico.

Clarissime ac ornatissime D. Doctor, pergrata mihi fueret uel uera, et ob argumentum, et ob amorem in me tuum. Hic facit, ut tibi, quantum in me est bene uelim: illud, ut te maximam faciam, qui tam accurate perpēderis atrocissimum, quod apud vos crassatur, symptoma. Vtinam cuncti pāides iatropi hoc agerent, ut singuli, qui singulis populis Endemij ac inquilini sunt morbi, ita examinarent, ac patria usque deprehensa remedia proderent ad illa mala. Quod de dracunculis quæris, idem mihi morbi genus olim valde monstruosum legenti visum fuit, dum viderem, Galenū id genus morbi nunquam uidisse nec eius causam intellexisse, sed in quodam Arabia loco vagari asserere. Scribit etiam Julius Pollux in Ethiopia (et maxime, ut scribunt alij, in regione ad mare rubrum) dracunculū existisse, qui crura hominum et femora edebat: Ethiopes solos fere, inquit, exercens, raro aliis molestus. Adest his vicus, cui eminet quid neruosum putridū. Et dubitante notabam Aeginetam 4. lib. cap. vltimum sint animalia, vel eorum solum ideam præ se ferētia. Nam Auicenna titubabat valde de horū specie. Jurarem fere Aetium animal id fuisse existimasse: idem de Rhaſe dixerim. Sed Soranus Ephesus medicus secta methoia a qui Galenū temporibus vixit, cuiusq; scripta Caius Aurelianus latina fecit, negant dracunculū animal esse, sed eum cuiusdā nerui, qui medicis et agris motu quodam cum videtur, sub cute condensationem. Manardus hoc nasci ait ex uredine succi crassi. Corraus negat, nos de his iudicium posse ferre, quod nunquam occurrat. Auctor definitionum medicarum et Guido, ad varices referunt. Quid tandem dicas? rem incertā. Quidquid sit, tumor est tibias occupans colore ac crassi udinis lumbricis similis: hoc est teres et longus. Nunquam puto protendi illum tumorem in obliquum et in anfractus trahi, ut dracunculorum imaginem præ se ferat. Sed patrius ille tuus Varen locū mutat, quo refert, maculas aufert. Causā quam tu sorbis eandem et ego puto esse, orgasmū succi venenosi, tenuisq; ac aduste pepasmi que expertis bilis flatulenta. Vtriuscūque tale quid patiuntur etiam, vocant die springende Gicht: quasi articulare dicas insipientem dolorem. Ita cuique fere regioni sua

sunt et mala et bona. Illi qui Americanum aut gere nuper litus, ibi familiare obseruauerunt malum Tonditum, quod dgitos pedum, pediculi animalculi idea excedit, sub unguibus se insinuans, ac in gangrenam conuertit, oleo rubro ex fructu cuiusque succurrunt. Sic referunt Aretæus et Lucretius elephantiasin morbum Egypto vernaculum existisse, Podagras Athenis, in Achaia ophthalmias. Erat etiam huiusmodi morbi genus Leucophlegmatia, quam narras Aeschines, in epistolis Græcis Philocrati, se uidisse in cunctis, qui in Delo insula habitabant, qui uulnus et capillos albescentes habebant, collo et pectorē intumescabant, sine febre, sine dolore ullo, nec inferiores partes quicquam immutata fuerant. Atque hæc Apollinis ira sibi euenisse putabant. Nos fuga capta nocte aufigimus, nos ipsos inter ab eadem dum percunctantes, an quisquam colorem et pilos quos domo gestauerat, haberet. Refert etiam Caius Aurelianus, huiusmodi etiam morbum Roma interdum existisse. Veteres hos morbos Inquilinos vocabant. Quin mala quadam morbifica se toto orbe spargunt: inueni ista illa Venus ex nouo orbe perfecta argumento est, et maximū fuit. Quin peculiaria quadam ac inuisa mala hominem interitum occupant: adeo ut recte scripserit Celsus, monstra in medicina euenire. Audi quaso doctissime D. Bra, Crateri summi medici meminit Cicero in epistola quadam ad Atticum, de Attica tunc agrotā loquens: Commouet me Attica, etsi assensio Cratero; et Horatius in Satyra tertia, secundē libri; Non est cardiacus, Craterus dixisse putato. Hic æger. Et Persius; Sed quid opus Cratero magnos promittere montes? Huius Crateri seruis in nouum inauditūque morbum incidit: idemque admirabile quadam curatione sanatus est, ut memoria prodidit Porphyrius Tyrinus in primo libro πείρα σποχῆς περὶ φάρμακων. Cum huius caro discessisset ossibus: nec medicamentis quicquam profici potuisset, vispera, piscis in morē conformata, deuorataq; ab eo liberatū eum ipso morbo narrat. Ita namq; carnē ossibus hæere cœpisse, ac conglutinatā esse. Scribit Iosephus decimi sexti Antiquitatū octauo, Herodē Magnum, Antipatri filiū interno astu flagrasse, quē tamē foris posita partes nō sentiebāt; fames illū in perpetuos cibos cogebat pudendore fœtor aderat cum satyriasi vemiculosa. Balnea naturalia, et illa ex oleo, hunc non inuauerunt. Tanto tadio affectus, ut tandem cultello sibi manus intulisset, nisi ab astante cognato ictus exceptus fuisset. Mirum etiam, quod refert Plutarchus libro De Claris Mulieribus, capite undecimo, ubi de morbo, qui inuaserat virgines Milesias, cuius nullum remedium, inquit, poterat inueniri. Fanaticam quandam contagionem ab aere infusam putabant, quæ eas in insaniam abigeret, adeo ut mortis cupidine tactæ, se ipsas strangularent. Tanta, inquit, mali erat calamitas, ut neque parentum lacryma, neque amicorum monitus, aliquid remedij attulerint huic malo; tantaque erat furoris immanitas, ut omnem custodientium diligentiam superaret. Nullum mali huius remedium inuentum, ante quam decerneretur, ut virginum, quæ sibi mortem conscuissent, per medium forum nuda cadauera efferrentur. Ea res virginum furorem non solum compressit, verū

etiam sedauit & exstinxit. Tantum ignominia metus
 valuit, ut quas humorum malorum grauissima mors
 non auerterat ab instituto, turpitudinis species com-
 mouerit. Mirum si ab aere hoc illis euenit solis. Scimus
 ab aere miasmatisbus sedato, & ab eo, qui propria
 substantia corruptione in vitio est, monstrifica non
 raro vitia pullulare. Scribit Ammianus Marcellinus
 libr. 23. historia sua, monstruosam rem. Post hanc,
 inquit, Seleucia, ambitiosum opus Nicanoris Seleuci,
 quæ per duces Veri Caesaris expulsa, auulsum s. dibus
 simulacrum Comæ Apollinis, perlatumq; Romam
 in ade Apollinis Palatini deorum antistites collocarunt.
 Fertur autem, quod post direptum hoc idem figmentum
 incensa ciuitate, milites sanum scrutantes inuenere
 foramen angustum, quo reſerato ut pretiosum aliquid
 inuenirent, ex adyto quodam concluso a Chaldeorum
 arcanis labes primordialis exſiluit, qua insanabilium
 vi concepta morborum, eiusdæ Seueri Marci Antonini
 temporib. ab ipsis Persarum finibus ad vsque Rhenum,
 per Gallias, cuncta contagies polluebat & morib. Hæc
 illere & verbo monstruosa. Ita quadam mala se spargunt
 toto mundi theatro: quedam rursus angulo al. quo
 mundi habitant, raroq; in alias regiones migrant. Hoc
 de dracontis præſcine scribit Pollux, ubi ait,
 αὐτὰρ ἐπεὶ τὰς αἰῶνας ἐμπεριόμηνον. Αἰθίοψ δ' ἐνο-
 χλῶν. Frustra ergo ad aliena conamur, sæpe reuocare
 mala nostra. Sunt certa vitia, certæ terrarum parti,
 membrisque hominum certis auctore Plinio; vel etatib.
 & etiam fortunis: tanquam malo eligente, hæc proceres,
 illa pauperes sentire. Hodie in Stiria & Carintia, ob
 aquas metallis tinctas, homines struma ac bronchocæle
 voce fere priuantur. Ante Pompeii tempora,
 Elephantiasin non nouit Italia. Carbunculus Narbo-
 nensi prouincia familiaris: & primū in Italiam, venit
 L. Paulo, & Q. Martio censoribus. Mentagram
 ante Tiberis principis tempora Italia non vidit. Ge-
 murſa morbus olim grassabatur, tam esse desiit. Ita
 noua interdum exſplendescunt in nobis, alia in nobis
 deſinunt. Ita Varen Transſulaniſ peculiarẽ dicemus?
 Sed ne a quæſuam & sit epistola hæc, te ſcire velim,
 optimū quoddam remedium ac v. v. v. nuper ad
 me veniſſe. Accipimus radicem ellebori albi crassi-
 ſcule cõtuſarū ſemunciã, ſiole indimus, ac affundimus
 vini Hiſpanici, quod Petrus Semenſ vocatur, librã.
 Solibus aſtiuis exponimus. Damus cochlearium
 vini. Valide vomitum mouet, nec affligit admodum.
 Interdum ſemicochlearium miſcemus cum aliis laxã-
 tibus, præclare abducit aluum ſine vomitu. Quin
 linctibus, in empyemate guttulas aliquot miſcemus,
 ac copioſiſſime expectoratum moueri hinc videmus.
 Sed quid tu interim? quin pergis in lucem, qua
 methodo ſolebas, ſimplicia morbis peculiariter dicata
 proferre? Ego totus in Hippocrate vertendo & breuib.
 commentariis illuſtrando ſum; ſed vereor ne, ante-
 quam amphora exierint, vita mea, ut in Alexidis
 verſu eſt ἐπεὶ γὰρ ἔγωγε. Quod ſummo Deo Jeſu
 placuerit fiat, facilis iactura ſcripti noſtri. Interim
 ſubciſuiſ horis, particulares exercitationes ſcribo.
 Quas de capite nuper dedi, ac nobiliſſimis ordinibus
 Hollandiæ & Weſtphriſiæ dicaui. Vale, ac me ama.
 Suuollentem medicum ſinoſti, admoneas quaſo, ut
 interdum ad me aliquid literarum mitat; ac dicas,
 ſi aliqua re illi opus ſit, quæ apud nos mea in ma-

Curationio.

nu, graue mihi fore, ſi non confecero. ſ. n. prope ſangu-
 ne iungitur uxori meæ, cuius auus maternus erat Ge-
 rardus Lyſtrius, magni Eraſmi in ſtudiis ſocius, illiq;
 amiſſiſſimus. Anno cl. l. xciv. die v. Maii.

CVRATIO LXIV. LIB. VI.

apud AMATVM.

In qua agitur de Dracunculo in tibia nato: quem
 Arabes venam Medenam appellant.

A Ethiops maris præfectus, ſeruus iuuenis 18.
 annorum, cum primum ex Memphi, Egypti
 celebre ciuitate, Theſſalonicem aduectus eſſet,
 ilico de cruris dolore conquiſtus eſt: in quo iuxta
 talum primo vlcus excitatū eſt, in quo venę modo
 caput conſpiciebatur. Quod aduertentes Turcæ
 morbum cognouerunt; periculoſumq; eſſe in Aegy-
 pto & India, ac reliquis regionibus quib. innatci-
 tur, ſignificarunt, quæ Arabes, præcipue Auicen-
 na, venã medenam ſen. 3. lib. 4. appellari tradit; ve-
 luti Abinzoar, & ceteri huius doctrinæ homines,
 quibus morbus hic ſatis cognitus & familiaris
 erat, pro cuius curatione accerſitus medicus Para-
 hyas, linguę Arabicę doctus, ita oriſus eſt. Primo
 debita victus ratione propoſita, partem extremam
 vena, aut verius neruoſa cuiuſdam ſubſtantia, ſubti-
 li ligno alligauit, quam paulatim ligno traheret, ro-
 tabatur: adeo, ut ad eius ultimam partem, hoc eſt, ad
 trium cubitorū lōgitudinē, poſt multos dies perueniret.
 Vnde Aethiops a doloribus & anguſtiis, morboq;
 ipſo liberatus eſt nullo ſuprapoſito cataplaſmate,
 concoquendi vim habente, aut calida ſuperfuſio-
 ne aliqua: quæ ex Sorano & Leonida, Paulus vl-
 timis verbis libr. 4. ſuæ medicinæ, huic morbo
 auxiliari tradit.

SCHOLIA.

Vena, aut neruus, vel lumbricus, morbus hic
 ſit, in dubium vertunt auctores. Ego vero o-
 culatus teſtis, multis auritis verior, teſtor morbum
 hunc tanquam lumbricū conſpici, album, ſubti-
 lem, tinea contortæ modo, qui ex ſe foras prodit,
 & pars extra miſſa cum areſcit, eam neruū exſic-
 catū quiſ dicet; qui ſi abrupti cōtingat, intenſos
 excitat dolores, & non leues animi anguſtias con-
 citat. Naſcitur autem morbus hic frequēter apud
 Aegyptios, Indos & Arabes: ſed præcipue apud
 Mediam, iuxta Perſidem: vnde nomen venæ
 Medenæ traxit, quam Galenus Dracunculū ap-
 pellat, & nunquam vidit, ut memoria commendauit
 lib. 6. de locis affectis. Euenit autem morbus hic
 forte, ut in renibus pili a materia craſſa lentaque,
 quam calor plus iuſto calefecit, exſiccauitue: vnde
 medicamentis & remediis atram bilem reſpicien-
 tibus purgantibuſue, morbus hic curari tractari-
 ue debet: prout imperat Auicenna, & ceteri Mau-
 ritani illi aſſentiuntur.

Hæc autem pro Coronide huius libri de liene
 poſt nouum morbum ſcurbutū, de nouo hoc
 morbo Endemio adiūgerelibuit. Vnicuiq; tamē
 liberū iudiciū relinquimus, nū ſit dracūculus, de
 quo Gal. tum Auicen. præcipue, ac reliqui Arabes
 ſcripſerunt. Quanquam fortaiſſe eidē locus aptior
 dari poterat, de morbis externis, ut alii faciunt.

FINIS LIBRI XX.

Liber

LIBER VIGESIMVS PRIMVS, DE MESENTERII, ET INTESTINORVM AFFECTIBVS; ac de colicis & iliatis doloribus; deque vermibus.

OBSERVATIO I.

De duritie ac tumore Mesenterii, in ea parte, quæ Pancreas appellatur.

Quidam sub umbilico scirrhum tumorem sentiebat intus inflar nodulorum penitioribus locis delitescens. Hic cum nec hydropē laboraret, neque de ea suspicio esset, ut tactu deprehendere poteram; ideo suspicabar tumorem esse in mesenterio, in ea parte, quæ Pancreas appellatur. Ad hunc igitur curandum, procedebam iis remediis, quæ emollirent, & partim discuterent, longo tempore: & ut se inungeret mandavi, hoc sequenti linimento: *℞. olei trini, liliiacei, anethini, chamomill. dialthæana 3 ℥. olei de meliloto, emplastri de meliloto ana 3 ij. misce.* Deinde etiam adiunctis pinguedinibus, tandem tumor durus mollior factus, postea cum discutientibus resolutus est. Prius tamen etiam statim ante linimentum, ne maior fieret humorū conflusio ad loca prædicta, purgatione conuenienti vti sumus, ne quoque abscessus suboriretur. Alter vero, qui durum quoque tumorem in ventre similiter delitescens habuerat, cum diu ex nostro consilio supra ventrem portasset ceratum de muccilaginis, tumor tandem delituit, & sanus factus est. Venit autem tunc mihi in mentem historia illa Beniuēnii. De abditis morborum causis cap. 33. de quodam ex abscessu mesenterii mortuo, cum ita scribat: *Julianus quidam, iuuenis alioqui optimus, alui torminibus vexabatur: inq. dies magis magisque dolor vni capiebat: tantumque aberat, ut huiusmodi doloris abdita causa deprehendi possent, ut nullis unquam præsidis tolli, aut saltem lenari hoc malum potuerit. Omnia enim viscera sana videbantur: hepar, lien, intestina omnia nullam doloris notam ostendebant. Sed ille nihilominus, magis magisque indies, quam ut tolerari posset, urgente dolore ipso, tandem e vita discessit. Quare mortui corpore inciso, ut scilicet tanti mali causas dignoscere-mus: & sanis omnibus, ut putabamus, inuentis visceribus, in eo intestina amoueri. Quæ cum gladio discindi minister, in abscessum magnū incurrat. Quo præciso, materia multa nigrior, foetensque profluxit, encæsto sutorio similis. Ex qua manifestam mortis causam deprehendimus. Attra enim bilis eo confluent, huiusmodi abscessum paulatim effecerat.*

SCHOLIA.

Antequam ad intestinorum tormenta accedamus & morbos, de Mesenterii malis hic primum agendum est. His locis & glandulis tempore exaggerantur varii humores: qui primum laxum, mollemque tumorem; deinde siccescentes, renitentem, durum ac vere scirrhum (ut doctissimus Fernelius asserbat) ingenerant. Durus vique adeo deprehensus est interdum, ut penitioribus sub umbilico partibus, vel os, vel calculus concreuisse putaretur. Hic autem tumor Melen-

terii, quoniam alte sepultus est, non nisi pressu animaduertitur: nullo dolore affligit, quod pars ipsa doloris sit expers. Quin etiam sua is mole intestina premens atq; coarctans, sæpe efficit, ut aluus pigrior sit, tardiusq; fæces descendunt. Vtrum præterea tumor vniuersum Mesenterium, an partem duntaxat, & quamnam occupet, mollis ne sit an durus, tactu etiam internoscendum. Ceterum quis nam in Mesenterio humor exsuperet, iam non tactu, sed iis ipsis notis, quibus in iecore, aut in liene proditum est, cognoscitur: sed quæ tamen tum obscuriores tum leuiore existunt. Hæc autem obscuritas multis causis fuit ignorantia, & cur harum partium affectus prætermitti fuerint, nec veterum scriptis celebrati. Ego tamen (inquit Fernelius) hoc affirmo & profiteor, cholera, melancholia, diarrhœa, dysenteria, cachexia, atrophia languoris, lentarum, errantiumque febrium, latentium denique morborum causas me in his plerumque sedibus animaduertisse: quorum depulsione salus redderetur. Iam & callus in venis mesaraicis inuentus est; ut testatur Beniuēnius cap. 37. De morborum abditis causis, sic scribens: *Petrus Aldimarius filium habuit, qui cum octauum iam æget annum, in corruptum incidit appetitum, quo calculos ruderaque comedens, in lentam tandem scibriculam diuenit. Indeque procedente tempore, & ventriculus non continere, & venter fluere cepit. Adeoque duobus his malis vexatus est puer, ut paucis etiam diebus e vita discesserit. Huius nos cum annuente patre emortuum corpus incidissimus, reperiuntur est callus inter venas, quas mesaraicas appellant: a quo cum vena ipsa adeo obstruerentur omnes; ut ferri inde sanguis ultra non posset, necesse fuit puerum e vita migrare. Quod aliquando inflammatio, ac deinde abscessus in Mesenterio gignatur, his quoque verbis docte & eleganter scribit Ioannes Fernelius lib. 6. de part. morbis cap. 7. Vera quoque inflammatio in Mesenterio incidit, quæ ab exesit, aut ruptis illius venis sanguis excidit, & in aliqua sede præter naturam collectus putrescit, tandemque suppurans abscessum facit. Eius inflammatio sine manifesto dolore est. solumque grauitatis sensum habet, nisi forte vehementius prematur. Febris admodum leuis & lenta, sine siti, sine grauib. symptomatis, nec omnino agrum prosteruens, nec quotidianas functiones interpellans. Principio sanies quedam rubra, facto deinde abscessu, pus album defluit ab aluo; & vtrumque modo permixtum alui fecibus, modo serosum & syncerum, ut quum inflammatio in postrema intestina denegit. Tum quippe pus per venam proximam in recti aut coli intestini capacitatem influit, sincerumque magna interdum copia redditur, nullo sensu doloris: quod aliquando celebres Medicos magna admiratione & controversia torfit. Sed non aliunde id, quam affecto Mesenterio damnare facile nosci poterat. Neque enim ab inflammatis intestinis, neque a ventriculo potest sine vehementi dolore prodire. Ex iecoris vero aut lienis inflammatione, febris vehementior affligit, omniaque symptomata sunt grauissima: Neque tam sincera sanies seorsum ob-*

4
Callus in
venis mesaraicis.

5
Inflammatio & abscessus in Mesenterio.

longiorem viâ tractum exit. *Renes etiam affecti non illac, sed per urinas repurgantur. Itaq; unum mesenterium reliquum est in abdominis capacitate, quod sub illis notis inflammatione tentetur.* Hactenus Fernelius. Nouit & quandam Dodonæus, cui inflammatio in mesenterio nata fuit: & initio male habuit, sed posteaquam inflammatio suppurata & in abscessu conuersa, melius habens, sana sibi visa est. Interim singulis diebus per annum bis terue purulenta admodum fetida, sincera, nullisq; excrementis permixta redduntur. Et quidem nunc quartus agitur annus, a quo sic se habet. Hæc Dodonæus. Nunc ad intestinorum morbos procedamus.

OBSERVATIO II.

De colico dolore.

- I**ohannes Sangantius dictus, mercator Pitruensis (tunc enim in Gallia praxim exercebam) anno 1545. mense Nouembri, grauissimo colico dolore affectus, quo solitus erat, laborare, hoc solo clystere iniecto per me curatus fuit: *℞ mercurial. florum meliloti, florum chamomill. florum stæchados. maiorana ana m. j. sem. anisifœniculi ana ℥ ij. ℞. bulliant in aqua communi, pro ℞ j. col. adde elect. hieræ picræ, benedictæ laxat. ana ℥ ℞. diacatholici ℥ ij. olei chamamelini ℥ ij. mellis rosæ. colati ℥ j. salis ℥ j. misce pro clystere.* Verum hic licet ab illo dolore statim euaserit, post duos tamen menses in idem malum incidit, & in dolorem adeo intolerabilem, ut astantes hominem ilico moriturum putarent. Tertio die prius ad illum accitus sum; cum mulierculæ frustra illi exhibuissent medicamenta calidissima, & ventositatem carminantia. Sed iterum male a pharmacopœo iniectum clysterem, parum aut nihil excepit. Alius deinde iniectus, parum auxilii attulit. Vetula quædam & garrula ante nostrum ingressum ei persuaferat, pulmonem ad ventrem & intestina delapsum esse, apponens calidissime albumen oui, cum pipere tenuissime contrito: unde auctore dolore, se a vetula necatum esse vociferabatur. Denuo accedens, amoto emplastro a ventre, ut sequens enema iniiceretur mandauit: *℞ folior. maluæ mercurial. florum chamomill. meliloti, summitatum anethi ana p. j. rad. althææ ℥ j. semin. lini, fœnugræ. carui. ana ℥ j. ℞. folior. senæ ℥ ℞. fiat decoct. prop. j. in aqua communi, adde expressionis benedictæ laxat. ℥ vj. elect. hieræ picræ. diacatholici ana ℥ ℞. olei anethini, chamamel. ana ℥ j. ℞ vitellum vnius oui, Sacch. rub. ℥ ℞. salis communis ℥ j. ℞. misce.* Ex eo ter pituitosa & valde mucicola deposuit, flatibus quoque multis expulsis: ac dolor, qui intestina occupabat, sedatus est. Sed qui circa ventriculum hærebat, ob cataplasma mulierculæ impositum, nondum sedabatur: unde & continuus dolor stomachi aderat; qui hoc fotu; tum inunctione sequenti cessauit: *℞ florum chamomill. meliloti ana p. j. semin. fœnugr. lini ana ℥ j. ℞. coquantur in aqua communi pro fotu, & statim inungat. ℞. olei mastichin. corone. ana ℥ ℞. pul. menthe sicca, cortic. granator. sumach. hypocist. ana ℥ ℞. cera modicum, fiat unguentum.* Quibus præsidis a vomitu & omni dolore liberatus, sanus deinde permansit.

S C H O L I A.

Intestina variis morbis afficiuntur, quamuis non admodum intemperie infestantur: sed horum morbi grauiore sunt, obstructio, adstrictio, inflammatio, abscessus, & vlcus. De quibus ad longum videas Fernelium, medicum doctissimum. *Morbi ac symptomata intestinorū.* Iam quoque non paucis dirisque symptomatis intestina torqueri solent: qualia hæc fere sunt: dolor tum colicus, tum iliacus, tarda alui deiectio, & ileus, profluens aluus, quæ aut lienteria est, aut coliquatio, aut diarrhœa, aut dysenteria, aut tenasmus: ad hæc cruenta aut purulenta deiectio, lumbrici quoque & ascarides. Nos autem incipiemus a doloris affectibus, nempe colico dolore, cuius nunc exemplum adduximus. Hoc enim vitii genus, quod in laxiori intestino (a Græcis colo nuncupato) gigni consuevit, a Paulo καλὴν διάρρœαν nominatur, a Latinis vero colicus affectus, seu colli, vel colicus dolor: quanquam Celsus morbum intestini plenioris eum appellet cap. 14. lib. 4. vulgus autem medicorum colicum. Denominationem habet a parte affecta, nempe a colo intestino, quod hic oblesum est. Colum intestinum quum sit amplum & laxum, anfractibusque multis sinuosum, varias sane materias excipit, quarum exuberantia distorquetur; dolorque fit, quem ab affecta sede colicū appellamus. Causæ sunt quatuor numero, crassus pituitosus humor, cum intra coli membranulas subsidet: spiritus crassus ac flatulentus præter naturam in colo retentus, qui nec illic transmitti potest: vel inflammatio, cum iam dictum intestinum male habeat; aut acris mordaxq; succus ipsum infestans ac vehementer affligens. Sed hic colicus dolor, quo noster ager laborabat, videbatur esse partim ex spiritu flatuoso, partim a pituita crassiore: nam præter id, quod per totum abdomen in alto excruciabatur, tormina quoque illum affligebant, tanquam intestinum ipsum perforari illi videretur. Tormina, inquam, & illum affligebant, ructus, nausea, & vomitio, cruditate præcedente. Interim etiam extensionem experiebatur, atq; rugitum: simul flatuoso spiritu tentabatur, colum infestante, cum olera fructusque ac cibi flatum generantes præcessissent. Verum hæc ipla aliis exemplis clariora erunt: quale subsequens est, præcedenti haud dissimile.

OBSERVATIO III.

De colico dolore ex materia quadam flatulenta pituitosa.

Magister Hieronymus, sacerdos Alcmariensis, vxoris meæ auunculus, in colicum dolorem vehementiorem incidit, otio deditus, mense Septembri anno 1548. ex materia flatulenta, vtcumq; pituitosa: nam & nausea hunc dolorem, tum vomitus præcedebant, a quibus tamen dolor non demulcebatur. Ad hunc accitus, modo clysterem admittere vellet, ilico illum sanatum iri proponebam, ut adhuc eodem die contubernium sacerdotum accedere posset sanus, quod tunc celebre erat: & libenter huic adfuisset. Sed clysterem ab-

sterem abhorrens, Æmilium senioremedicum, qui tunc Alemarię habitabat, in concilium vocat. At is institutum nostrum de clystere iniiciendo probabat: & statim iniectus est. & ventre simul inuncto, ilico curatus est. Neq; me fefellit mea prædictio, nam sanus mane factus, contubernium illud celebre accessit: admonitus tamen, ne se nimium vino aut cibis obrueret. Clyster talis erat: *℞. malua, beta, mercurialis ana m. j. furfuris m. ss. florum chamomille p. j. rad. althææ ꝑ. j. sem. careos, anisi, ammi ana ꝑ. j. ss. sem. feniculi ꝑ. j. fiat decoctio in aqua communi pro ꝑ. j. adde elect. hierapicra ꝑ. j. ss. Zacch. rub. ꝑ. j. ss. (erat autem facilis solutionis) olei communis, chamomilla ana ꝑ. j. ss. salis communis ꝑ. j. tepide iniiciatur. Habuit ex eo tres secessus: & vëtositatibus emissis ilico curatus fuit, ventre inuncto, oleis sequētib; simul mixtis: *℞. olei anethini, chamomill. lilior. ana ꝑ. j. ss. misce.* Et ita egregie ab omni dolore liberatus est, vt aliis remediis opus minime fuerit.*

SCHOLIA.

3 **B**oni & fidelis medici, & Deum timentis officium est, celeriter quoad fieri poterit curare; quoniam ab omni arte aliena est cōperendinatio; potissimum ab arte medica, in qua omnis procrastinatio vitæ periculum infert. Vnde Mesue in exordio suæ Praxeos inquit, *Auxiliari ne differas: quia semel perenti nulla postea suffragia profunt.* Poterat autem crudelis medicus huius viri morbum in longum protrahere tempus, eumque in reditu habere, quem nos duabus horis tantum ad sanitatem reduximus, tuto, iocunde, ac celeriter curantes, vt optimus quisq; medicus facere debet: vt Cornelius Celsus lib. 3. ex sententia Asclepiadis dixit, & Hippocrates & Galenus lib. 1. de morbis vulg. & 14. methodi medendi. Ceterum signa huius mali sunt adeo inter se confusa ac permixta, & numerosa, vt ex eisdem vix haberi possit vera notitia, nisi cum coniectura quadam artificiosa, vt Galenus demonstrat. Percipi autem potest affectus hic ex vehementissimo dolore in intimo ventre, terebro perforanti simili, aut per quē palus videatur in dolente loco infixus, vt 2. de loc. affect. patet. Aliaq; apparebūt symptomata, quę ad affectū iam dictum intestinum pertinent. Nam protinus inflatio quædam & extensio, & flatus complures & tormina, ac excrementa, si ab aluo deiiciuntur, flatibus plena videbuntur. Ea autem discernere licebit, si super aquam natent, ac bubulo stercore simulentur. Quin etiam, vt inquit Gal. eod. 2. de loc. affect. cibi tum cupiditas, tum concoctio deterior euadit, & præsens & quę sequitur. Accidit enim in hac affectione, & ventriculus male affici, vt qui parti primario affectu continenter adhareat. Insuper & eosdem colicos nominatos affectus, magna ex parte præcedit cruditas, & spiritus flatuosus, & vomitus & nausea, quę multo tempore inanis permanet: nec non in præcordiis mordacitas, fastidium, & indigentia plurima, vt ibidē ex Galeno patet. Et quoniam ab ea parte, qua dolor sentitur, nullum iudicium sumi potest, an magis colon,

quam tenue intestinum dolor afficiat, licet minor sit, eo qui in tenuioribus consistit: propterea quomodo sint interstinguendi, dicemus tunc, cū de ileo agemus. Nunc autem eo, quod hæc eadem doloris species euenire potest, cum lapis in renib; aut vreteribus fuerit impactus, hoc discerni non potest, nisi quis accidentia, quę postea consequuntur, expectauerit, vt habetur 2. & 6. de locis affectis. Quo fit, vt non solum vulgares, verum etiam peritissimi medici decipi soleant: adeo difficilis est ab initio horum affectuum distinctio: quemadmodum & ipse Galenus deceptus fuit, qui cum crederet, se a calculo in altero vreterum impuncto dolore affici, iniecto sibi rutaceo oleo grauissimo cum dolore excreuit humorem vitreū (a Praxagora sic appellatum:) statimque dolore sedato cognouit, neque lapidem fuisse causam, neque in vreteribus aut renibus locum fuisse affectum, sed in intestinis potius, præcipue vero crassioribus. Ea de re, vt quibus indiciis, & quomodo hic affectus interstinguui possint, percipiatur, hic ea adferam, quę Donatus ab Altomari a Galeno tum aliis collegit. Quamuis autem ob eiusmodi ignorantiam, circa doloris potissimum initium, quantum ad doloris mitigationem attinet, nullam laboranti noxam inducamus, si iisdē medicamentis utamur: siquidem vtriusque doloris præsidia omnia communia sunt, & quidē calorifica in primis, siue ea extrinsecus adhibeantur, siue iniiciantur. Tempore tamen subsequente oportet diuersa auxilia adhibere, vt Galeno præcitatis locis visum est. Symptomata itaque quorum magna est in illis affectibus copia, diligenter intueri oportet. Nam in coli dolore sæpe numero dolor veluti circuire videtur, atq; plurima loca occupare, q. modo in hac, modo in illa parte vehementior sit: Nephritis vero dolores eodem in loco stabiles, iugiter infestant. Quod si dolor in loco fuerit renibus altiore, manifeste colicę indicium portendit. Sed quamquam in vno loco, vbi scilicet renes ponuntur, stabilis constiterit: nihil tamen ad notitiā potest positus ipse cōferre. Et proinde alię notę considerandę sunt: nam & nausea & vomitus multo grauiores, & magis assidui aderunt dolente colo, euomuntque ita laborantes & biliosa & pituitosa quædam atque corrupta, quib; præsumti cibi aliquid admixtū videtur: ac retinent etiam magis excrementa: vt nec flatum quidem, neque ructum excernere possint. Quę omnia, iuxta Galenum de locis affectis, colicis duntaxat euenire solent: sed alia quidem magis, alia vero minus. Insuper & colicorum cruciatus, multo magis, quam Nephriticorum, lenientibus mitigantur clysteribus: & si quid ab aluo deiiciatur (vt diximus) id flatuosum quodammodo est, & sæpe numero aquę supernatare consuevit, similem habens bubulo stercore consistentiam: quemadmodum si lapis dolorem excitauerit, ipse interdum solus, interdū vero vna cum cruore excernitur, maxime si vel asper, vel acutus fuerit: ac si postea vrinas inspexeris, fabulosa quę

Quib; signis colici dolor a renum dolore & calculo distinguatur.

dam subsidere inuenies: licet nephritici ab initio dilutas purasque reddat urinas: quo sit, ut nephritici cum urina lapide exeunte a dolore liberentur. Verum si in colo affectus constitit, neque lapis, neque cruor, neque arena, sed humor aliquis pituitosus ac crassus subsidere videbitur: *ut eadem Galeno visum est 2. de locis affectis*. Et licet coli dolores vehementes dextra magis parte eueniant, omnino negandum non erit in sinistra quoque parte eos gigni posse, cum colon ipsum a dextris partibus, quas Graeci *λαγώας* nuncupant, ad sinistras cincturæ modo adferatur, *Paulo auctore cap. 43. lib. 3.* & adeo ab infernis sinistris partibus ad superiores dextras reuertitur, ut sæpenumero & lienem & iecur attingat, atque etiam ventriculo continenter adhæreat, *Galeno teste, cum 2. tum 6. de locis affectis*. Quod & nos sæpius propriis oculis inspeximus in Anatomicis administrationibus. Quod autem in colico tum vomitus & nausea, fastidium (*licet utrique communia, ob consensum ventriculi*) sunt assidua & magis vehementiora, causa est quod magis consentit venter in colico. Interea tamen nephritici dolores, in quibus nec arenula (*ut dicebat Fernelius*) nec calculus exturbatur, sæpe colicorum specie eludunt. Colici tamen dolores facile mitescunt ceduntque iustis remediis. Alii insuper cruciatus quadam similitudine & vehementia colici nuncupantur (*iuxta Fernelium*) quibus tamen non in colo sedes est, sed vel in peritonæo, vel in membranis, quæ abdomini ventrisque partibus obtenduntur. Hi sane grauissimi sunt & admodum diuturni, ac neque clysteribus, neque medicamentis, neque fomentis, neque iis remediis: quibus qui veri sunt colici dolores, deliniri solent. Eorum materia aut flatus est tenuis, aut humor acerrimus & æruginosus, membranarum spatiis conclusus, e quibus detrahi vix potest. Succedunt diuturnis febribus, aliisque biliosis morbis, quorum est difficilis solutio. Natura quippe crisin noxiique humoris depulsionem in aluum molita, quum nusquam vacuandi viam promptam & expeditam nanciscitur, illum e vasis & visceribus in membranas sæpe auertit: ubi dolores exsurgunt priore morbo grauiore. Obseruaui (*inquit idem Fernelius*) & continuas & tertianas, sæpius vero quartanas febres hisce doloribus finiri qui diu circuitu certo exacuebantur, paremque accessionum ordinem retinebāt.

OBSERVATIO III.

De colico dolore & spiritu flatuoso, cum retentione excrementorum.

Colicus dolor sequitur aliquando retentionem excrementorum durorum in ventre: unde intestina copia recrementorum & flatuum distenduntur. Sic Balduinus quidam calcearius, cum aliquot diebus non excreuisset: & venter distenderetur, vehementiori colico dolore, annos triginta natus, mense Decembri, cum & frigore laboraret, in nocte correptus fuit: & cum rugitus sentiret, & flatus detinerentur & tensionem experiretur, ex spiritu simul flatuoso & fecibus retētis coli dolorem originē habuisse cōiectabam. Vnde

& clystere sequente, & fotu, ab omni dolore præter mentem aliorum liberatus est: *℞. rad. alibæ mun. ʒ. ij. folior. maluæ, parietariæ, beræ ana m. ij. flor. chamom. meliloti ana p. j. coquantur in aqua communi, pro ℥. j. ℞. cassia mundata pro clysteribus, benedicta laxat. elect. hierapicræ ana ʒ. ℞. philonii Romani (propter intolerabilem dolorem) ℥. j. olei amygd. dulc. olei scorpionis ana ʒ. ℞. olei viol. chamomell. ana ʒ. j. ℞. acch. rub. ʒ. ij. salis communis ʒ. j. misc. Primum itercus durissimum excreuit: deinde adhuc bis liquidiora pituitosa, sed flatuosa, stercoris bubuli instar: & multos crepitus vna cum ventositatibus emisit. Mox adhibuimus hunc fotum: *℞. flor. chamomell. meliloti ana m. j. sem. lini, fœnugraci, maluæ ana ʒ. ij. sem. anis. ʒ. j. coquantur in aqua communi pro ℥. j. ℞. pro fotu*. Quibus duobus remediis sanus factus est.*

S C H O L I A.

Omnia quæcunque obstruunt, colicum dolorem generat: sicuti & ventus cōclusus: quod etiam ex cibis quibusdam natura flatulentis contingit, ut castaneis, glandib. filiquis, cucurbita, vna, vino multa aqua diluto, & aqua frigida: præcipue si Venus laboriosa subsequatur, aut nimia corporis lassitudo. Iam quoque fit a stercore in ipsis intestinis remorante, si vis expellendi infirma, fuerit vel medicamento aliquo torpida reddita: aut ventris musculis aut præcordiis percussis, vel frigore offensis. Fæces vero multis modis exsiccatæ a cibis assis, frixis, siccis, aromate, longa mora, in iis qui aliis rebus occupantur, & sui obliuiscuntur: item ex debilitate musculorum ventris, & in vtentibus multo coitu, infrigidatis, debilib. & longa ægitudine laborantibus, vel ex stupefactionibus, aut ob bilis paucā effusionē ad intestina, hepate & mesaraicis venis omnem humiditatem ad se trahentibus: ob sudorem nimium & exercitia vehementia, corporis raritatem, temperiem calidam. Etiam ab aere calido æstiuo, ab hæmorrhoidibus, vlcerebus, apostematibus, & hincsteris. Colli vesicæ, matricis, læpe feces retinentur. Et sic etiam præter quatuor causas iam dictas *Scholiopra* cedente, aliæ sunt causæ primitiue: ut omnia ole- *Causa pri-* *mitiua.* ra, maxime cucurbita, melones, pepones, omnesque fructus horarii, & legumina: aqua gelida, vel vinum maxime plurima aqua mixtum: coitus nimius, ventositatis retentio, lapidi frigido diu insidere, *ut Aucenna protulit*, & frigidos pedes habere. Sic frater meus Theodorus quotiescunque illi pedes frangebant, statim colicum dolorem incurrit. Idem efficiunt & medicamentata venenosa: quanquam magis ileum producant. Causæ vero corporeæ, *ut ab humoribus calidis, rariis tamen: & sequitur tunc biliosus morbus: & sic fit ab iletero quandoque.* Ab oppilatione, *ut in apostemate calido per viam defluxus: vel ab humore frigido, viscoso, pituitoso: a ventositate, a vermibus.* Sic nos rusticum ex pago vulgo Coedikio dicto non procul ab vrbe Alcmaria patria mea, præ manibus habuimus, qui ultra triginta vermes in colico dolore eiecit, & a me probe curatus fuit: clystere parum iuuante, *sed*

Distinctio doloris non in colo sed in peritonæo existētis.

Causa corporea.

5
Cent. I. cur. 33.
sed magis decocto absinthii, florum chamomillæ & centaurei minoris, in ceruisia communis : quâ perpetuo bibebat. Habes similem historiam apud Amatum, de Diana vxore lapidicæ in colicum affectum solitum incidente ex lumbricis, quæ curata fuit primo clystere iniecto ex lacte & melle, quo dolor remittebatur, vt illa asserbat, lumbricis ex partibus superioribus ad inferiores deductis. Mox & altero clystere iniecto, ex decocti rutæ \mathfrak{z} xv. olei rutacei \mathfrak{z} iij. salis nitri \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} s. alces non lotæ \mathfrak{z} ij. hiera picra \mathfrak{z} j. Sequenti die bolum dedit: \mathfrak{z} s. specierum de hiera Gal. \mathfrak{z} ij. diaphœnic. \mathfrak{z} iij. sem. fantomici, lumbricorum dictis, \mathfrak{z} s. \mathfrak{z} s. Zacchar. q. s. fiat bolus. Hoc quinquies egeffit, & dolor ex toto leuatus est : & sic intra 2. dies sanitati restituta fuit. Postea vero octo sequentibus diebus quolibet mane ieiuno stomacho comedebat rotulam ex arom. ros. super aqua vinum ex absynthio confectum bibebat, & sic sana cito euasit. Sed etiam ex lapide in intestinis generato quandoque fit, inducendo colicum dolorem, vel extendendo, vel soluendo continuum, vel prohibendo exitum ventositatis: quod euenit domicellæ Vanderanæ, stercore rotundo in lapidem concreto: quæ tamē per me, exhibito pharmaco leniente, curata fuit.

6
Gradi hist. ria.
Refert Gradus, se in vxore Dom. Antonii de Canibus Papia, in colico qui nullo modo poterat curari, tandem lenientia medicamenta per clysteres immisisse, & per os exhibuisse, quibus tres lapides magnos durissimos egeffit: quorum quilibet fuit quantitas vnius oui gallinacei, erantque cinerei coloris tanquam viderentur feces indurata. Causæ autem primitiæ ex sermone ægrotantium habentur: aliæ causæ tum a prægressis quoque, tum ex iis, quæ adsunt, dignoscuntur: si enim ab obstructione, & tēsiōe afecibus, ex præcedentibus significatur: vt quoque si icterus præcessit, vel alias æger non deiecerit multo tempore, quod aliquādo conualescentibus euenire diximus: quoniam plurimum in corpus distribuitur. Flatus cohibiti ægri sermonibus aliquando habentur: nam & cohibendi flatus consuetudine (inquit Fernelius) non paucos dissectione animi aduertimus, quibus dilatatum colon intestinum brachii amplitudinem adequabat: alios quibus ex imo ventre flatus toto anfractu in ventriculum resiliens ructu emittebatur, & quib. pro crepitu ructus erat: alios quoq. aliis ex causis hoc symptoma continenter affligi, vt his plures ructus, quam verba essent. Flatulentus dolor colicus ventrem distendit: vagus est, & instabilis, in variasque ventris sedes se contorquet: sæpe obmurmurat, & arcte conclusus, nec ab ore nec ab aluo erumpit. Hunc causæ flatus effectrices præcesserunt. Et sic vbi a flatulento spiritu coli dolor fiat, tensionem magis experiuntur laborantes, atque rugitum sentiunt, præcessitque flatus generantium ciborum, ac potuum vsus, velut sunt olera, & fructus, aqua frigida, & reliqua huiusmodi. Verum si humor crassus, ac pituitosus coli dolorem excitat, tunc ægri per totum abdomen in alto excruciantur, ac intestinum ipsum pertundi, seu perforari quasi sentiunt. Tormina quoque affligunt,

8
ructus, nausea, vomitio, cuiuslibet humoris, sed pituitæ potissimum. Alius grauiter impedita nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Stercus etiam (vt paulo ante dictum est) quandoq. excrementum bouino simile videtur, leue, & flatus plenum, ex Pauli testimonio; præcessitque continuus ciborum quam maxime frigidorum, crassique succi vsus, satietas, cruditas, otium: & id genus similia, vt ipse inquit: grauiusque dolorem hunc irritabunt frigidiores cibi, ac potus assumti, veluti ex contrariis sedari percipies. Sic enim a crassa, pituita lentaque, & præsertim a vitrea, quæ non modo huic intestino adherescit, sed & ipsum corradit, dilacerat, atque in id plerumque perforantis terebelli more se infigit, colicus etiam dolor exercet. Hic sæpe fixus est, & alte excruciat, nauseam & pituitæ vomitionem ciēt: neque ructibus neque flatibus ex iis demulcetur: habuitque originem a crapula & otio, quæ cruditatem, crassumque humorem progignunt. Ab acri vero erodentique humore, aut etiam inflammatione quisquis ortus fuerit dolor colicus, fixus etiam est, sed cum febricula, ardore, siti, vigiliis: irrita ur esculentis, potulentisque calidioribus, a quibus etiam sumit originem. Alii hæc addunt, quod multa excernantur, & sine flatibus vel his exiguis, eaque colore biliola. Et omnino hic affectus secundum quosdam dysenteriam præcedere solet. Adde sitim & æstum, bilis vomitum, & singultum, & quod a colicis dictis præsidis læduntur, cuius exemplum Galenus affert. Nam acres mordacesque succi sicut eos, qui ob inflammationem eundem dolorem experiuntur, magis excruciant: sic etiam hos ardor, sitis, vigilia torquebunt, sed minus ad illos: imo & febricula aderunt. Vrina reddetur acris, & biliola deicient: & alui deiectio maiorem excitabit cruciatum: grauiusque irritant calidiores cibi, potusque assumti, ex eiusdem Pauli decreto: veluti e contrario magnopere leuantur ægri ex contrario tum cibo, tum potu. Id autem magnopere attendendum est pro huius affectus dignotione: quod agnitiones affectuum, quæ ex coniecturabilibus notis incipiunt, cum eorum, quæ prosunt obsuntque, cognitione sunt coniunctæ, & aeno auctore 12. method. medend. Ita quoque, si ab inflammatione coli dolor excitetur, Si ex infla- matione fiat indicia. internum quendam feruorem ægri sentient, aderitque febris non ignaua, urinæque retentio, simul & stercoris: pulsus iuxta ventrem molestabit: similiter sitis, ardor, nausea, bilis potius vomitiones, quæ nihil leuant malum, vigeant. Et sic iuxta alios, qui Auicennam sequuntur, si ab apostemate, iam febris necessario aderit, & dolor fixus: qui nullis colicis remediis iuuatur, sed augeatur potius, & sitim & calorem circa partem inducit. Et in hoc sæpe errant medici, remedia calida adhibendo sine discrimine.

OBSERVATIO V.

De colico dolore, ex pituita crassa vitrea.

V Ir quidam Alcmarianus, annos quinquaginta natus, cum dolore colico laboraret, & illi

medico quinque clysteres admodum fortes iniecti essent, tandem vix dum alius illi soluta est: & quanquam a colico dolore, eo tempore liberatus esset, tamen in paralyfin incidit, ut manus paralytica indicabat: & nihilominus ab illo tempore ex leuissima causa colicum dolorem incurrebat. In quem cum denuo more consueto incideret, & imple accitus fui, cum gravissimum dolorem experiretur, tanquam palus intestino colo infixus esset, idque ex pituita vitrea. Alius huic vna cum stercore cohibebatur, vrina cruda & alba existente. Ita ut ex crudis succis hoc malum originem cepisset. Itaque statim emolliens enema præscripsi, quod & leniret, & feces molliores redderet, & simul pituitam euacuaret. Præstat enim initio uti leniente clystere, ob stercorea in pilæ modum sæpius compacta, & imponere aliquid salis gemmæ, quod stercorea dura eliquare solet: quod cum medicus, aliqui doctus, non observasset, quinque fortia enemata iniecti, quo factum est, ut colicus dolor in paralyfin sit permutatus. Sal autem gemmæ proprietate quadam, ut sæpe experti sumus, squibalis emollit; quod & ante nos egregius ille medicus Henricus Vergerius Haganus, cū prius Harlemi habitaret, observavit: Amstelrodami enim accitus ad quandam colico dolore affectū, cui eo tempore aliqui M. Ioannes Tiengius, medicus suo tempore celeberrimus, quinque clysteres admodum fortes iniecerat: qui cum nihil operarentur, superveniens Henricus medicus prædictus, emollientem clysterem, in quo sal gemmæ impositum erat, iniecti: & statim squibalis eiectionis ac duris stercoreibus, mox & multa pituitosa subsequuta sunt; & ilico ægrum, maximo cum suo honore sanitati restituit. Nos etiam eandem rationem sequentes, ut hic clyster iniiceretur mandavimus: *℞ rad. alibæ mundata, rad. brancæ vrsinæ ana ℥ss. folior. malvæ mercurialis ana m. j. florum chamomillæ, meliloti, folior. ruta (ad pituitam incidendam) ana m. ss. seminis anisi foeniculi, carui ana ℥ij. fiat decoct. in iure pulli pinguis ad ℔j. in qua dissolve cassia mundata, elect. hiera picra ana ℥ss. benedicta laxat. ℥ij. olei amygd. dulc. olei anethini, chamomill. ana ℥j. salis gemmæ ℥j. salis commun. ℥ss. misce, fiat enema. nihil effecit.* Interea etiam ante & post clysterem per os dedimus iura pingua. Cum clyster non operaretur, glandem adhibuimus, quamvis frustra. Ad ructus vero expellendos sumebat ex decocto florum chamomillæ incensisa, nihil inuabat. Ideo ad clysteres fortiores transiimus; non tamen vnum clysterem super alium statim immittendo, ut stolidi facere solent, qui singulis horis fere indifferenter enema iniiciunt, quod minime fieri debet. Ratio est; quod eiusmodi enemata materiam agitant non educendo febrem inferentia, ac alia nocumenta; stomachum quoque debilitantia, & hepar, ex quib. potest aliquando fluxus subsequi immoderatus, quæ admodum & Arculano medico insigni evenit, ut de se ipso testatur. Vnde acuta non sunt toties iteranda, si non solvant; & ab ipsis abstinendum donec materia sit digesta; & post maturationem acutiora administranda. Ideo exspectavimus in alterum diem. Et tunc decocto superiori addentes ficus pingues & passulas, & ℥j. folior. senæ. & post collaturam eadem lenientia & laxantia, addendo butyri ℥j. & loco olei anethini, rutaceo vti sumus: alii nucum accipiunt, ob partium tenuitatem. Hic tamen clyster etiam nihil effecit. Ideo sex vel pluribus horis intermissis, in eodem decocto pulpæ colocynthidos in nodulo raro ligatæ ℥j. agari electi ℥j. ss. & huius decocti accepimus ℔j. addendo benedicta laxat ℥j. cassiamundata ℥ss. elect. hiera picra ℥ij. philonis Romani, ob ingentem dolorem. ℥ss. olei chamamelini, anethini, amygd. dulc. ana ℥j. salis communis ℥j. ss. salis gemmæ ℥j. iniiciatur moderate calide. Quo tandem quinquies egressit valde pituitosa, cum multis ventositatibus, & dolor ex parte sedatus est. Die vero sequenti in diluculo exhibui ℥ij. theriaca optima, & specier. diagal ℥ss. cum ℥ij. aqua hyssopi, idque calide. Egregie dolorem sedabat, sudore subsequente. Sed hora 5. vel 6. post meridiem, cum dolor iterum rediret, cum hoc fotu vteremur, ructus cessavit, neque amplius rediit: *℞ florum chamomillæ, meliloti ana m. j. seminis malvæ, lini, carui, anethi ana ℥j. coquantur in aqua, pro fotu cum spongia.* Dolo-
lore non redeunte, ad reliquias ventositatum depellendas, tum ructus auferendos, ad ventriculi & intestinorum roborationem ex elect. sequenti sumebat idque omni mane, ad magnitudinem castaneæ: *℞ conferva flor. rorisma. ℥ij. conferva ros. specier. diacumini, diagalanga ana ℥ij. cum syr. menthaceo, fiat ad modum conditi.* Quibus prædictis fuit ita sanatus, ut malum illi consuetum intra septem deinde annos eundem non inuaserit. Verum tunc iterum, nempe anno 1551. mense Septembri, eodem malo redeunte, ad illum rursus accitus, prius iniecto clystere emolliente, deinde altero die sequenti etiam hoc iniecto, rursus per me curatus est: *℞ rad. alibæ ℥ss. malvæ, viol. betæ, caulium rub. florum meliloti, chamomill. pulegii sativæ, parietariæ ana m. ss. seminis anisi carui, foeniculi ana ℥ij. ss. (agar electi ℥ij. colocynthida. ℥j. ss. ligatis in nodulo) coquantur in aqua communi, cuius ℥ss. ℔j. adde benedicta laxat ℥j. hiera picra, diacarb. ana ℥ss. vitellæ ij. ouorum, olei chamamelini ℥ij. olei anethini ℥j. salis communis ℥j. ss. salis gemmæ ℥ij. misce.* A clystere eiecto, multa que pituitaeducta, sanus factus est.

SCHOLIA.

Quod autem a veteribus scriptum est colicum dolorem transire in paralyfin, id rarum apud nos, inquit interpretes Hollerii: familiare quibusdam populis, ut Britonibus. Sacerdoti cuidam annorum quadraginta, ex assiduo prope dolore colico paralyfis nata dolorem soluit; sed mansit paralyfis annis aliquot. At huic nostro agro ex primo colico dolore mansit per totam vitam manus paralytica; quamvis postea rursus colico affectus per me curatus fuit. Sed & prætori Leydano, ad quem nos vna cum Vergerio medico Haghano acciti eramus, a colico dolore etiam paralyfis

Colicum do-
lor quo mo-
do permuta-
tur aliquan-
do ad paraly-
fin.

nata

nata est: de quo postea. Hinc & Arculanus. *Multoties, inquit, colicus dolor permutatur ad paralyfin, & sanatur per eam: materia enim dilatata perit nucham, aut aliquos nervos aliquibus membris particularibus deseruientes, & similiter aliquando permutatur adiuncturas: quæ permutationes aliquando accidunt, propter medicos inepte operantes, qui, ut dolorem sedent, faciunt balnea sive semicupia nondum materia minorata, & adhibent alias medicinas colligantes: esset enim minus malum, ut stupefacerent. Primum vidi (inquit Arculanus) in fratre Domini Episcopi Veronensis, qui post paralyfin universalem mortuus est sequenti die: secundum in potestate Leniati, qui longo tempore arthetica laboravit: hæc enim illico sequuta sunt post balnei administrationem. Et sic desinit, quanquam raro (nam bis hoc tantum vidi) & in paralyfin. Et visum est nostra ætate, inquit Iacchinus. Paulus dicit, si rumpatur materia ad spinam. Huius meminit lib. 3. cap. de paralyfi, & post. Sed & Arculanus hoc idem animaduertisse videtur, cum scribat, colicum phlegmaticum, & sanguineum sæpius permutari ad dolorem dorsi, idque ob materiam magis subtiliorem factam per caliditatem dolorosam: quod communiter fieri ait in Ilaca; cui confert venæ sectio, cum ibi sit vena chyli, quæ dorso materiam suggerat, quæ per phlebotomiā inanitur. Modo ad hydropem commutatur, corrumpendo intemperiem hepatis. Quando vero prolongatur retentio fecis, venter inflatur propter fortem extensionem fecis & interficit: Quosdam vidi (inquit idem) in quibus intestina rumpuntur: & fæces egrediens replet concavitatem ventris, & fiunt sicut hydropici, & foetent odorem stercoreum: & quosdam vidi, qui post retentionem fecum, nempe ad sextum diem, & postea incurrunt fluxum ventris & lenteria moriuntur in tribus diebus: nam propter fortem extensionem & malam intemperiem impressam vis digestiva & retentiva intestinorum est ablata. Sæpe succedit etiam ad fluxum ventris, materia subtili enacata, crassa remanente. Et multoties cura colica remouet singultum, materia ad intestina delabente: modo peruenit ad singultum, ob magnum nocumentum ori ventriculi communicatum: modo ad perturbationem rationis & spasmum: significat enim materiam cerebro communicari & nervis, ob doloris vehementiam. Modo associatur tremor cordis maximus, ut pectus indigeat retentione cum manu, ob sympathiam cordis in vehementissimo dolore. Ob vapores quoque malignos ad cor eleuatos sæpe fit, ita ut tandem syncope superueniat: cum tremor via sit ad synopen: & postremo peruenit ad sudorem frigidum, & mortem. Nihil equidem aque virtutem posternit ac foetor & dolor. Hæc quoque ad signa prognostica pertinent, quemadmodum & subsequenter: à illa, quæ ad malum tendunt, sunt ex his, quæ magnitudinem doloris significant, id est, quæ vires euerant, ut vel syncope, vel quæ præcedant syncopas: item signa ex pulsibus & colore, & calore vel sudore. Species quoque affectus id monstrat: nam phlegmone statim magnus morbus erit, & periculosus: mitior a flatibus, hoc mitior ab acri hu-*

more; mitissimus ab obstructione cavitatis D. finit aliquando in rupturam peritonæi: & nos vidimus rumpi circa inguina, vel umbilicum: vel quia flatuum multitudo acervata intus est, quæ tendit, ut prægnantibus aliquando evenit; nam ex partu fit obnoxium. Sic facit aliquando herniam seu rupturam, & modo ex iis quoque ortum habet; & tunc non curatur, nisi reducto intestino in suum locum. At ex fece obstructa secundum plurimum etiam curatur. Et colica sequens apostema in intestinis crassis, curatur: sed in gracilibus, ut de ileo dicemus, magna ex parte letalis est, non tamen semper, ut suo loco dicemus. Et colicus dolor ex ventositate, magna ex parte recipit curationem; modo non prolongetur: nam tunc transit in tympanitem. Inter omnes tamen colicas affectiones, ea quæ ex inflammatione ortum ducit est gravissima, Panko teste, ut quæ in Ileon transitionem minetur. Vchementissimi quoque coli dolores periculosiores sunt, quam mitiores, ut pote qui a leuioribus causis fiant, Galeno auctore 2. de locis affectis. Vbi non omnino excrementa detineantur, neque in vna ipsius coli parte fixus dolor sentiatur, adhuc minus periculosus erit coli dolor. Similiter & minus minatur periculum, cum clysteribus injectis aliquod excrementum deiecitur, aut flatuosus quispiam spiritus, cumque ex illa deiectione dolor leuatur; quam si nec quicquam per eos excernatur, nec dolor leuetur. Alexander vero cap. 1. lib. 10. sic de colico affectu scriptum reliquit, quod gravis quidam morbus, & dolorificus sit, ac vehementes cruciatus inducat, quia intestinum colum dictum densum est, crassum, nervosum, ita ut nihil quod in illum confluit, tam facile discuti possit, ac in tenuioribus intestinis. Colicus dolor itaque damnatur, si alius ex toto suppressa est, si vomitus perseverat si feci reclusus ac excrementum per os fertur, & tormina antecedunt crudella, sudoresque frigidi glutinosi, ac animæ defectus. A vermibus si fiat, iis deiectis facilius curatur. Ita & lapide in intestinis reiecto. Quibus spasmus superueniat, delirium portendit. Si stranguria superuenerit, magis tamen ileo, 7. die intereunt, nisi vrina copiose fluxerit. Si vero a vacuatione critica, aut sola refrigeratione nondum confirmata fiat, adhibitis remediis facile sedatur. Si hæc non ad sunt, non flatus, sed cancer, aut abscessus aliquis dolorificus metuendus; periculumque imminet, ne marcor hominem e medio tollat. Quod obseruatum est ab Hollerio in D. Zolin medico, & aduocato Gilot; cui colica, qua parte vicinum est reni sinistro, collecta veluti cartilagine, durum in scirrhum obduruerat, interiore cavitae eo tumore intercepta, ut nihil transcurreret. Itaque neque clysteribus, neque medicamentis iuuabatur, etiam fortibus. Parte dextra colum ad instar magnæ vesicæ dilatatum & extensum, medicamentis datis & potionibus plenum. Superiecti, viciniq; muscoli abdominis, & peritonæum, saniosa. Post longa & multorum annorum

tormina, e quibus tamē non decumbebat, sexto, a quo decubuit die mortuus est sine febre, nisi quo die obiit, *nimirum s. Martii, 1555.* Magister Hieronymus Germanus, apud illum ipsum, interna inflammatione, & putrilagine colico morbum similem passus est. 4. die obiit, extremis ante frigescentibus, languescente pulsu, & sanguineis spectris ob oculos obuersantibus.

OBSERVATIO VI.

De vehementissimo colico dolore, vno clystere & inunctione ex instanti curato.

Theodorus Hentici, frumentorum mercator, qui Delphis in insigni calcaris commorabatur, colico dolore, eoq; vehementiore, correptus, a sororibus suis tum mulierculis persuasus, cum clysterem admittere nollet prima vice, tandem tamen dolore singulis horis aucto, sequens enema, nostris rationibus eo deductus, excepit. Hic enim, cum ciuilibus actionibus intentus esset (*ut aliquando fieri affolet*) excrementis tum ventositatibus retentis, in hoc malum incidit. Enema vero tale erat, quod 12. Augusti die, anno 1564. nostro consilio a pharmacopœo injectum fuit: *℞. fol. parietaria, malua. mercurialis, beta, florum chamomill. meliloti ana m. j. sem. anisi, fœniculi, carui. danci, ana ℥ j. ℞. coquantur in aqua communi pro ℞ j in cuius colat. dissolue diacatholici, diacassia pro clyster. ana ℥ ℞ benedicta laxat. ℥ ij. zacchari rub ℥ ℞ olei chamamel. anethini, amygd. dulc. ana ℥ j. vitellum unius oui crudi (ut feces magis emolliantur) salis ℥ j. ℞. misce fiat clyster.* Mox, facibus eductis, & flatibus per clysterem emissis, ventre inuncto cum oleo chamæm. & amygd. dulc. anet. statim a dolore liberatus est, & colico curatus.

SCHOLIA.

Curatio colici doloris, si rite procedat, a causa debet incoari. Nam alia est, quæ symptomati solum incumbit quam & coactam dicimus. Et sic aliquando sedamus dolorem, dilata ad tempus vera curatione, quæ causæ debetur. Cum itaque dolorem a flatuoso spiritu, & crassa pituita genitum tollere volumus; necesse est primum partes laxare, per quas hæc excrementa ferri debent; & deinde excrementa ipsa extenuare, ut facile partem penetrare possint. Quare medicamenta optima erunt, quibus vis est calefaciendi, unde rarefiunt partes; & quæ tenuatoria sunt, id est tenuium partium: & tertio quæ siccant, & digerunt non strenue, si quid calefaciendo liquarint atque dimouerint. Hæc igitur affectus indicat. Pars affecta ex situ monstrat usum medicamentorum; debere scilicet ea per sedem iniici: quoniam ex ea parte magis est proxima. Plus ergo iuuabitur, quam per ebibita: quanquam neque hæc negligenda erunt, sed illis quoque utendum. Sic & quæ extrinsecus admouentur, certum est, debilem vim exercere posse, ob corpora interiecta. Hæc igitur vniuersa est methodus. Verum quia in eligenda particulari materia errari potest: Ideo primum considerandum Galen: præceptum, sepe repetitum 12. meth 8. Si quis in hoc casu, inquit, vehementer calfaciente cõtendat, affectum laedet: quan-

do ab his, crassi & frigidi succi in flatu vertuntur. At nihil nobis æque nocet a quæ ea, qualiquare & in flatu vertere possint, digerere vero nequeant. Hinc colligit, debere medicamenta esse tenuantia & digerentia, non vehementer calida: ab his enim, concoquitur, extenuatur atq; inciditur materia omnis. Talia vero omnia etiam siccabunt, & flatu discutiet. Ponit ibidem Galenus exempla eorum, qui acriter a vehementibus calefactoriis prouocantur. Vnde reprehendit errorem, quem saepe committunt medici & ægri, dum talia adhibent extrinsecus in principio, nondum diminuta materia, credentes se dolorem leuate, & sæpius augēt: falsi, quoniam aliquando vbi flatu soli erat, adiuti sunt. Optima ergo erunt, quæ rare faciunt, solum extra admota, ut ex milio, sale, dulci oleo, vel anethino. Sed ad particularem materiam descendentes, his scopis ducibus; Primum statuamus colicum, cui febris non adsit, neque suspicio aliqua adiunctæ phlegmones: sitque dolor ex flatibus cum humore crasso & frigido impacto: statim considerandum erit, num aliquis alius affectus subsit, qui curationem moretur, ut obstructio facta a stercore, ut in nostro hoc ægro erat. Hæc enim antea remouenda erit, idque humidis, ut dulci oleo calido infuso. Sunt qui oleum dulce in hunc usum potuit tradunt, vel amygdalarum dulcium; & est egregium remedium, non modo ad hanc obstructionem, sed ad laxandum corpora, & leuiter extenuandum. Non ergo ordo Rhasis accipiendus, qui a solutiuis incoat, & quidem fortibus. Sed dices, *tamen usus est benedicta laxativa, quæ satis fortis est?* Verum quidem. Sed interea adiecimus in maiori dosi & diacassiam & diacatholicum: est enim diacassia seu cassia pro clysteribus extracta, lenitiua ventris & lenis, & est medicina pro delicatis, carens acritate & mordicatione, & omni excessu, ladente. Diacatholicum etiam emollit. Hinc quoq; vbi stercore dura deiecerint, vel adhuc retineantur, aliqui addunt butyrum: nos vero eius loco etiam vitellum oui, aliasq; herbas emollientes in decocto addimus, ut parietariam, maluam, & betam. Interea & sales adhibent, ut irritent: interim & ventri quoque mollia fomenta humida. Sed nobis satis fecit oleum amygdalar. dulc. cum camomil. & anethino. Atque hæc etiam cura colicæ est, præcipue, quæ leniter emolliunt & mediocriter laxant, exhibere. Prout igitur varia sit causa, varia quoque adhibenda remedia. Quæ exemplis supradictis, licet aliquo modo illustrata, tamen aliis dicendis curatio particularis illustriore uadet, sumto rursus exemplo curationis colici doloris, ex crassis ac lentis succis irritati.

OBSERVATIO VII.

De colico dolore, ex crassis & lentis succis orto.

Mulier admodum crassa, obesa, & pituitosa, tempore hyemali cum multis ostreis vsa esset, incidit in colicum dolorem ex crassis & lentis succis, cum tanta exacerbatione, ut abdomen totum in alto exaceraretur, ac intestinum perforari videretur. Ad hanc curandam accitus, postquam intellexissem, quod frigidis cibis, iisque crudis, & potissimum

potissimum ostreis, stomachum offenderat. unde ei colicus dolor obortus erat, qui facile irritabatur a frigidis cibis & potibus; ideo cum victus ratio utilis esset calidior ac siccior, & tota diæta attenuatoria, ut *Paulus* suadet, attamen cum per initia morbi melius sit a cibo abstinere (*Nam, nisi finito tormento neque cibis, neque potione recte absumitur, ut Celsus precipit:*) ideo ut nihil sumeret mandavi: licet postea cibi offerrebantur, qui boni succi ac concoctu faciles existebant; ita ut satietas, cruditasque vitarentur, ut idem *Paulus* admonet, quæ vim habebant extenuandi & incidendi.

2 Et quod ad medicamenta attinet, valde calidis, ut dictum est, & a *Galeno* 12. *meth. docetur*, uti nolimus, cum humores crassos liquescant & in flatum mutant. Neque iis hic tam facile utendum, quæ torporem inducunt, cum humores crassiores ex iis ad motum ineptiores reddantur, unde spatio longiore curantur. Et ideo medico, qui in arte sit exercitatus, est opus, ut idem fateatur *Galenus*: nam ab imperitis medicis malum hoc sæpe fit. insanabile, ut post longa tandem rædia pereat æger. Et propterea qui generosi animi, fortesque sunt, si mediocri utantur victu, tutius in longiori tempore procurantur, quam qui violenter calefacientibus, aut etiam torporem inducentibus medicamentis utuntur, ex eiusdem *Galeni* sententia. Noui ego egrotantem, in quo medici stupefacientibus in initio vsi erant, nempe philonio; cui dolor quidem sopiebatur, propter somnum inducuntur: sed postea licet clysteribus aliquo modo iuuari videretur, tamen idem obiit. Et ideo si ex pituita crassa malum originem habeat, & dolor vehementissimus fuerit, præstat initio uti clysteri ex communi oleo, *Paulo auctore*: sæpe vitream simul cum fecibus pituitam expulit, ac dolorem subito finiuit talis clyster. Aut uti licet eodem oleo, in quo prius fuerit decocta ruta, seu semen aliquod, quod flatum dissipet, ex *Galeno* 2. *de locis affect.* & 12. *methodi med.* & ex *Paulo*, liquato prius in prædicto oleo adipe anserino, in cuius penuria gallinaceo utendum: curandumque in primis est, ut expers sit salis, nec admodum vetus, ut patet eodem 12. *method. med.* Nec minus & clysteres parari possunt ex oleo chamamelino vel anethino, cum eodem adipe anserino, seu gallinaceo, aut etiam recenti butyro. Vel utemur iis, quæ mediocriter leniunt ac dolorem mitigant. Ceterum cum libenter clysterem iniecissem, mulier hæc, ut plerumque solent nostri, non admittebat. Ideo decoctum flor. chamomilæ exhibui cum ceruisia decocta: quo decocto sæpius dolorē mitigauimus, præsertim si cum pituita etiam flatu adessent. Sed euomit etiam pituitam, & nihil profuit. Tandem dolore fatigata, clysterem admisit, qui in hunc modum parabatur: *Rad. b. f. malua. lilior. ana ℥j. foliorum ma. uæ. alibæ. mercurialis. beta ana m. j. anethi. ruta. pulegii. florum chamameli. florum anibos. anap. j. seminis lini. fenugraci. ana m. ℔. seminis anisi. fœniculi. cumini. ana ℥ij. fiat decoctio in aqua pura, pro ℔b. j. adde mellis ros. ℥j. electuarii de dactylis, elect. hiera picra simplicis ana ℥vj. olei chama-*

mil. anethini. rutacei ana ℥j. salis communis ℥iij. misc. fiat clyster. ter exonerauit aluum, cum magna alleviatione. Hoc eodem tempore etiam præscripsimus, hunc in modum: *Rad. alibæ ℥j. ℔ foliorum malua. alibæ ana m. j. florum chamomilla. meliloti. summitatum anethi ana m. ℔. seminis fenugrac. lini ana ℥℔ seminis anisi. cumini. fœniculi ana ℥j. bulliant in hydrelao, & cum spongiis duabus alternatim. partibus dolentibus applicentur. Deinde inungatur linimento infra scripto: *olei anethini. chamamelini. rutacei ana ℥℔ butyri recentis. adips anser gallinacei ana ℥ij. ex quo cremore alibæ seminis fœnig. & lini adiecto. misc.* Dedi quoque postea medicamentum diatrion pipereon: & post vnum atque alterum diem & theriacam; qualia & *Paulus* commendat. Vbi vero pituita satis erat extenuata, iuxta *Paulum* & *Aetium*, purgans medicamentum exhibui, ut hieram. Post enim septem dies quidam exhibent hieram *Archigenis*. At nostra ægra, post clysterem iniectum & per os exhibitam hieram & theriacam, optime habuit.*

S C H O L I A.

5 **Q** Vanquam in principio præstat a cibo abstinere; postea tamen offerendi sunt cibi boni succi, & concoctu faciles, quique extenuent ac siccant. Et iuxta *Aetium* sit panis neque aridus, neque calidus, sed in clibano coctus. Is si non adsit, in furno. Ex carnibus conueniunt in primis volucrum, secundo loco piscium quorundam in petris degentium: & consueta magis eligenda, ex volucribus carnes gallinaceæ, perdicum, turturum, columbarum iuuenum, phasianorum. Vitanda in aquis viuentia. Inter olera eligenda fœniculum, apium, asparagus, oreoselinum in iure cocta. Etiam exigua quantitas sampsuchi, serpilli, thymi, satureiæ, pulegii, origani, modo febris absit; quo iure dumtaxat iam aucta causa colicos nutrire conuenit. Leguminum vsus vitari debet, pti-fana excepta, quæ cum lapathio in eo colliquato commoda existit, ut *Aetius* refert; aut eius vice satureia, serpillio vel hyssopo. Prædictorum ciborum quantitas moderata existere debet; ne venter in multis cibis conficiendis fatigetur. Carnes præterea ac pisces elixati potius, quam cocti præbeantur, ne siccitas excrementa apprehendat: iucunditatis etiam, & gratificandi stomacho gratia. vua alba, dulcis præ ariditate corrugata cum pane præbeatur, *Aetio auctore*; ac ficus maturæ, cuticula euulsa; porra item, allia, ac cæpæ exhiberi poterunt; maxime iis, qui talibus non offenduntur, ut *Paulus* inquit. Sed dicet aliquis, prius nimium calida ex *Galeno* prohibebas; licet idem *Galenus* iis utatur: laudat enim summo opere alium 12. *methodi meden.* præsertim ubi dolor intestinorum circa febrim fuerit; cum ipsum ex eorum ciborum genere sit, qui & flatum discutunt, & minime sitim generant, & propterea ipsum agrestium theriacam appellabat, & *Paulus*, ut paulo ante diximus, consuetis commendabat. Utitur etiam *Galenus* & rutaceo oleo & laurino. At hæc omnia sunt vehementer calida:

quo pacto igitur in colico dolore conferre possunt? Respondeo cum Iacchino doctissimo, primum vituperat vehementer calida, quæ solum liquare possint, non discutere & digerere. At quæ enumerata sunt, calida quidem sunt, sed siccantia & attenuantia, unde flatibus accommodatissima. Vel dic inter initia, cum multa est materia, non conuenire; postea ea diminuta conuenire. Contra flatum calorem excitabunt, inquis. Respondeo, Aliquot excitabunt; sed una flatum, & flatuum materiam dissoluent. Vnde de rutaceo oleo Galenus ait, multi ab eo iniecto constistantur vehementius: sed non multo post excernunt una flatum & humorem ac liberantur. Auicenna ideo bene consulere videtur, vt licet dolor calidis augeatur, non desistamus iis vii: sed contra tendamus nauiter. Secundo dico, dammare eum extra posita emplastra, vel cataplasmata. Nam si vehementer calefaciunt, cum prope partem affectam non attingant, non valent extenuare nauiter & digerere; sed liquabunt solum. Contra euenit ex iis, quæ comeduntur; vt patet ex historia rustici, qui alliis vescabatur, & merum potabat. Sic & de iniectis pater in Galeno ipso, 2. de locis affectis. Reprehendit ergo talia, quæ extrinsecus in principio nimium calida admoventur. Ideo optima erunt, quæ rarefaciunt solum extra admota ex milio & sale, & dulci oleo, vt dictum est. Ceterum & his vinum conuenit, quod sit subastringens, album, tenue, perlucidum, mediocri tate, temperamento dilutiore; modiceque bibatur vt ex Aetio liquet. Quod si sitis a cibo accedat, aqua calida præbeatur infensissima enim ipsis frigida existit, vt ipse inquit. Similis quoque ratio de aliis rebus non naturalibus habenda, vt videlicet attenuent, calefaciant, exsiccent. Talis enim qualitatibus aer eligatur, calidior & siccior. Reliqua ex aliis auctoribus, vt Arculano, tum Grado, aliisque practiciis, inuenies, qui hanc rem longiore sermone explicanti præcipue apud Alexandrum Trallianum lib. 10. c. primo. Habes apud eundem plura & diuersa medicamenta. Qualia hæc esse debeant, ex parte diximus; vt latius videre licet apud Galenum 12. method. meden. quæ attenuent & non vehementer calida sint; abstinentes ab iis ubi humores frigidi ac crassi in causa sunt, quæ torporem inducunt, ex quibus tunicae intestinorum densantur frigiditate, minusque flatum redduntur, humoremque crassorem & ad motum ineptiorem faciunt. Valent itaque in principio clysteres lenientes, & qui ex oleo communi constant, vel in quo oleo ruta sit incocta, ex Galen. 2. de locis affectis. Adiectis subinde pinguedinibus, vt ex Galeno 12. method. medendi dictum est: semper lenibus præmissis. Si nihil adhuc egeratur, ad fortiores deveniendum. Scopi ergo erunt, præmollitas facces attrahere, extergere inhærentem pituitam, extenuare flatum & pituitam; idque citra vehementem calorem. Materia clysmatum multa sese offert, si bene calleamus vim simplicium. Sed nos ea, quæ magis vsui nobis sint proponemus; qualia & in præcedentibus exemplis descripsimus. Vel hoc aut simile paretur: 4

rad. lilior. ʒj β. (nonnulli addunt rad. bison. lue & bryonia, vel angelica) mercurialis, betæ flor. char. o. mill. meliloti (nonnulli adiungunt flor. anihos & flor. chados) ana m β (etiam centaurei, puleg. & marrubii, abrotani) ana m j. sem. liri. fœnug. ana ʒ β. anisi, fœniculi, seselsos (alij & cumini & nigelle) ana ʒ ij. coquantur in iure pingui carniū (alij decoquant in aqua & vino) q. s. pro lb. j. vel lb. j β. in quibus dissoluit benedicta laxat. ʒj elect. elefoph ʒj. vel ij. aut si difficilis sit aluo, indi maioris, vel diaphœn. vel hierapicra, vel hiera colocynthid. olei rutacei, chamomill. lini ana ʒj. vel olei nucum: est enim præstantissimum oleum nucum, ob tenuitatem. Nonnulli etiam butyrum antiquum addunt, vel pingued. subinde loco oleorum, salis communis ʒj. vel plus, vitellum vnius oui: etiam parum addentes (quod nonnulli faciunt) elect. de bacis lauri, quod tamen magis facit ad ventositates. In medio tempore nonnulli (vt Rondeletius consuevit) vt minus trahant & magis concoquant, vtantur eodem decocto absque laxantibus; addita magna quantitate vel butyri, vel olei, vel pinguedinis; addito parum mellis vel Zac. h. vt semper aliquid detergatur, vel ex solis oleis & vino. Extergentia vero sunt mel coctum plerimum, & terebinthina resina anethino oleo dissoluta vel amara. ar. ygd. Decoctum vero easdem habebit vires, vtpote ex aniso, cymino, semine imperatoria & chamamelo hac inter iniuria. Quibus si stercorea deliciantur, aut modica quantitate, nec æger leuetur, clystma simul, extenuatorium & attractorium, simulque deterforium componemus; vt scilicet ex vi sua naturali pituitam trahat a tunicis & qualitate aperta eam extergat & ad exitum paret. Decoctum itaque; apparabimus ex centauro minore, & ruta & camino: vel si ruri sumus, rutam & calamentum aut lauri baccas sumito. Materia vero iuncta sit aquæ & olei partibus æqualibus: excolatis adijce hieram simplicem & mel despumatum. Si vero ad fortiora transeundum, hieram logadii addemus, vel aliquid agarici; quo tamen nonnulli in clystere vti nolunt. Vbi itaque; multa deiecerit, quidam ad morbi reliquias tollendas vtuntur per infusa rutaceo oleo, apparato ex vino cretico. Huius libram i. Infundunt cum vino earundem virium. Imo & aliorum decoctum infundunt: sed cum odor multos offendat, vix eo vti vellem. Neque hic audiendos velunt, qui Rhazem sectati, clysteres faciunt pondere vnciarum sex vel octo. Quomodo n. ad sedem affectam peruenire poterunt, nisi ad minus circiter lb. ij. in magno corpore infundas? Plura vide de vsu clysteris, eiusque forma, apud Arculanum. Interea hic & vomitus, si quis facile vomat ante cenam præ omnibus auxiliatur, Aet. teste. Istamen vtilis est tantum, si colicus dolor accidat post cibum assumptum vel in stomacho fluctuantem, qui potius vomitu, quam clystere crudus attrahatur. At in stomacho debiliore & intestinis gracilibus debilibus, & si multi humores ad sint infarcti, & stercorea dura, minus conuenit vomitus. Interea etiam purgans medicamentum, ubi pituita satis extenuata sit, exhibet, tum

Medicamentorum ratio.

Clysmata.

Vomitus.

Purgans medicamentum.

12 tum alia iis præbent, qui ex frigido & pituitoso humore dolent. Dant igitur diaphœnicon, vel aliud quippiam. Imo euacuatis utcunque recrementis crassis, induratis ab intestinis, & vomitione utcunque purgato ventriculo crudis illis humoribus, nonnulli pilulas de hiera simplici præscribunt, vel de benedicta, quæ neque mirobalanos recipiunt. Vel hoc modo: *℞ pilul. de hiera simpl. vel de arom. ℥ ss. castorei ℥ ss. cam. syrupo e stœcha. vel de byzant. aut artemisia, fiant pilule v. Potiones.* Dant & alias poriones, ut ex diacymino, vel ex elect. de bacc. lauri, ex vino forti calido; vel si non adsit, ex meraciore mulsâ, vel ex nuce muscata trita, & vino cretico calido; aut ex castorei ℥ j. cum vino similiter: vel terebinthinæ potus, aut salsarum & sulphurearum aquarum: vel lupinum stercus quod in spinis pependit: ut galerita auis, quâ describit Aetius, & est nobis alaуда galerita dicta: hæc comeditur obsonii vice in albo iure. Alii commendant cornu cerui vstum in olla, & in puluerem redactum epotum drachmæ pondere. Vel ius veteris galli, quod cartamo & aromatibus coquatur: *℞ gallum antiquum, quatuor ad minus annorum, quem defatigatum interficias; cum fuerit exenteratus, in eo pone salis gemma ℥ iij. seminis cartami, cnici dicti, polypodi quercini recentis & contriti, hyssopi herba ana ℥ j. seminis dauci anethi, ameos ana ℥ ss. turbit. ℥ iij. misce, & in lb. 12. aqua fiat decoctio ad medias; cuius ℥ vj. pro vice bibat: & ex eadem decoctione clyster interdum paretur.* Et ita ad colica proprie dicta deueniemus. Illud quoque animaduertendum, quod ubi vehemens dolor vrgeat, ita ut non possit æger quiescere, donec remedia applicemus, Galenus cucurbitulam afficit: idque ita, ut totum umbilicum comprehendat. At in lib. method. non meminit umbilici: sed dicit, in omnibus patientibus partibus utilem esse. Aetius ait loco dolenti applicandam esse cucurbitam. Forte vult in medio coli intestini affigi, ut materiam in vno loco fixâ in partes laxiores trahat, & flatus. Considera igitur si his non sedatur, & tunc colicos clysteres adhibebis: sed prius vomitum prouocabis, nisi sponte plurimum vomuerit. Laxatur enim intestinum stomachi vacuitate, & dimotione illa calefit, & extenuatur tardi motus humor & flatus egrediuntur. Prohibemus etiam ne a supernis excrementa eo trahantur, vnde obstructio augeatur. Sed & si cibatum ægrum offendas, vomere iubero. Quod si ob dolores etiam clysteres non retinuerint, glans alio immittenda, ex Pauli decreto, quæ ex melle cocto, cumino, seminis fœniculi, ruta, hiera, salis gemma, agarico parari potest longiuscula digitorum fere sex. Hoc etiam tempore fomentum siccum ex milio adhibendum est, Galeno teste 12. method. meden. vel humidum cum spongiis, quale descriptum est Obseruat. præceden. Vel ex milio, furfure, chamæmel. floribus, meliloto, fœnugræ. lini semine, & anetho, sacculi componantur, & in calfactis lateribus, vinoque albo irroratis prius calefiant, & applicentur. Insuper & infessus valde vtilis sunt, ex decoctio. fœnugræ. althææ, cha-

mameli, artemisia, anethi, lauri, & similium, ut inquit Paulus. Item in oleum calidum, aut hydre-læon descendere alienum non est, ut ipse refert. A balneo vero bibant absinthii & cumini equa portione decoctum, vel vinum absinthites. Conferunt & cataplasmata ex malua b. smalua farina seminis lini & fœnugræci, mili seminis anisi fœniculi, cumini, cum oleo chamæmelino, auritaceo, & oxymelite, &c. & vnguenta in hunc vel similem modum parata: *℞ axungia gall. butyr. recentis, olei chamomill. aneth. ana ℥ ss. terebinthinæ ℥ iij. seminis apii, petros. galangæ, spica ana ℥ ss. cera parum, fiat vnguentum, addendo vini vel aquæ vitæ parum tempore inunctionis.* Rondeletius nobilem matronam curauit, cum grauissimo dolore coli detineretur ex pituita, & nihil ad manum esset, solo viro Hippocratico dicto iniecto. Sic & rusticus, qui vinum aromatites emerat ex melle ad hilaria celebranda, curatus fuit. Sed & alium rusticum alio contrito & oleo curauit: & alios erysimi decocto cum vino. Nam qui & grana vj. castorei ex vino bibunt, cito curantur: aliqui & euphorbium eadem quantitate infundunt: attamen lacrymæ periculosa, ob lentorem, quia adherent, & non possunt expelli, & occidunt, ut ex morte nobilis viri Gubernatoris Monspeffuli D. Gaudeti constat quod & eidem Rondeletio fuit compertum. Nam pharmacopola cum medici officio fungi vellet, insciis Gailberto, Griffio, & Falcone, qui illum curabant, iniecit sagapenum, ammoniacum & alia dissoluta; quibus immixtis subito & repente mortuus est. Habes historiam pulcerrimam apud Amatum cent. 1. curat. 3. 2. de colico dolore ex pituita vitrea, in muliere prope Castellum Nouum, ad quam multi medici conuocati vti sunt clysteribus ex oleo rutaceo, anethino, laurino, libacco & similibus modo adiecto melle ros. & salis gemma, tro. bis. alhandal ℥ j. vitella duorum ouorum, modo ℥ j. diaphœne. adiecta; ubi docetur non semper a mitioribus incipiendum, cum periculum in mora sit, morbo ita urgente. Alioqui in morbo in quo non impendet periculum, a mitioribus incoandum. In quo vera quidem Erasistrati opinio est. Alioqui in extremis morbis, iuxta Hippocratem, extrema remedia tentanda.

OBSERVATIO VIII.

De colico ventoso.

Pater Regularium monachorum Harlemensium, sæpe dolore ac torminibus ventris multis annis obnoxius fuerat. Pro quo malo depellendo puluerem semper paratum habebat ex speciebus diagalangæ, & electuarii de baccis lauri, quem ei præscripserat Adrianus Iunius medicus doctissimus, & amicus ac familiaris noster. Hic vero septuagenarius, cum in cœnobio prope Alema-riam esset, 24. Septembr. anno 1555. colico dolore ex ventositate correptus adeo vehementi, ut intestina disrumpi sibi clamaret. Ad illum accitus, cum & nauseam pateretur sine vomitu, & ex ructibus aliquod leuamen se sentire diceret;

Balneum.

15 Cataplasmata.

Vnguenta.

Historia Rodelitio de muliere nobili a colico dolore curata, & de rustico curato.

Cautio.

Historia Amati de muliere colico dolore laborante.

glande prius aluo irritata, cum electuarium de baccis lauri ad manum non esset ℥j. pulueris diacumini cum vino Rhenano calide propinaui. Ex quo flatibus tam supra quam infra emissis, & sudore in lecto operimentis euocato, ab omni dolore statim liberatus est.

S C H O L I A.

2
Si ex spiritu
flatuoso fiat
curatio.

SI flatulentus spiritus doloris auctor fuerit, eisdem medicamentis vtendum, vt de crassis glutinosisque succis diximus, vt patet eod. 12. meth. med. Poterimus tamen tam clysteribus, quam reliquis medicamentis extrinsecus adhibitis, ea que magis flatum discutunt permiscere, ac eorū quantitatem augere, vt cuminum semen foeniculi, pulegium, origanum, calamintham, fursur, basilum, careum, daucum, anethum, & similia. Insuper ℥j. dianisi, aut diacumini, seu diacalaminthæ, cum pauco vino albo præbere poteris. Propriam tamen curationem quandam sortitus est is dolor, qui spiritum flatuosum comitatur; ex cucurbita scilicet cum flamma copiosa subinde admota, teste G. I. no 12. meth. med. Videbiturque tibi (vt ipse inquit) præsidium hoc in huiusmodi affectibus incantamenti cuiusdam simile quid efficere siue in intestinis siue in quauis alia corporis particula fuerit excitatus: illico enim cucurbita admota, qui spiritu flatuoso cruciantur, tū a dolore liberi, tum omnino sani redduntur. Quod nuper in colicis ex ventositate bis rerve expertus sum. Quos vero nō spiritus modo flatuosus, sed etiam humor quispian, vnde flatu oritur male habet, iis illico ad tempus dolor sedatur; redit tamen, vel in sequenti nocte, vel postridie, vel etiam tertia die similis dolor, ac potissimum vbi in victu aliquid deliquerunt, aut importunius particulas excalfecerunt. Tibi quoque hoc maximum indicium affectus erit, ac curationem pro ratione prosequeris, nec impense particulas excalfacies, extenuatoria curationis ratione vtens, vt dictum est: sed dolorem tamen prius per cucurbitulam sedabis, cum per eam ventosus digeratur spiritus: quod si tamen cum spiritu humor frigidus magis abundat, eodem modo humore expurgato per clysteres, & alia medicamenta, cucurbitula vti poteris; inanito corpore, ne magis humorem attrahat. Ceterum cum a flatibus fiant dolores intensissimi (vt dictum est) qui modo in intestinis retinentur, modo extra intestina, vt in mesenterio; prima species, iuxta Rondelium, facile curatur supra scriptis ad pituitam; ad autem seminibus flatu discutientibus, in clysteribus, vnguentis, cataplasmatibus, & aliis. Retinentur autem ob feces induratas. Quare primus clyster emolliens erit, & fortiter euacuans; in hunc vel similem modum: ℞ rad. bismalua, liliorum, bryonia ana quar. j. pulegij vtriusque, marrubii, abrotani, ana m. j. flor. chamomill. meliloti, sampsoci vel anthos, vel stœchados ana p. j. sem. lini, fœnugraci ana ℥ ss. seminis anisi, foeniculi sesel. ana ℥ ss. fiat decoct. in aqua communi, pro ℥b. j. benedicta laxat. ℥ j. hierapicra ℥ ss. butyri, olei anethini, rutacei ana ℥ j. salis ℥ j. ss. misce; fiat clyster. Secundus debet esse discutiens & euacuans, vt ℞ malu. cum rad. bismalua ana m. ij. beta.

mercurial. orig. ana m. j. sic. pass. par. xx. sem. lini, fœnugrac. ana ℥ j. anisi, fœn. carui, cymini ana ℥ ss. flor. anthos, stœchados, chamomill. ana p. j. fiat decoct. in aqua & vino; & diu decoquantur herbæ, vt flatu deponant: in ℥b. j. dissol. mell. anthosati, sacch. rubei ana ℥ iij. benedicta vel hiera ℥ ss. olei rutacei vel nucis ℥ iij. Rondelius relinquit salem. Præstat tamen addere, vt fiat stimulat. Idem vult vt in primo decocto tantum accipiantur ℥ vi. j. ob plenitudinem distendentem. Dosis laxantium auget vel minuit secundum operationem prioris clysteris, & plenitudinem excrementorum. Sal tamen in primis clysteribus addi potest (inquit idem; quamquam formulæ sunt absq; sale impressæ) quia sollicitanda est facultas expultrix. In vltimis non est addendum, quia sua acrimonia dolorem excitat. Tertius clyster debet esse discutiens, & relaxans, hoc vel simili modo: ℞ apii, petros. aneth. cymini ana ℥ ss. flor. chamomilla, meliloti, sambuci ana p. j. fiat decoctio in oleo & vino antiquo, vel chamamelino, vel rutaceo, vel nucum; & huius colatura uncia decem vel duodecim inuiciantur. Idem ait cōuenientissimum esse vinum hippocraticum, maluatium aut claretum (quod ex melle, pipere & cardamomo fit) si per se vel cum aliis iniiciatur. Olea tamen magis relaxant & dolores sedant.

OBSERVATIO IX.

De colico insigni dolore, ex fecibus in intestinis retentis.

VI quidam in colicum dolorem vehementiorem inciderat, ex stercore retento ob meatus biliarii constipationem. Huic clysteres emollientes omnium primo inieciimus, ex pingui iure, butyro, oleo amygd. dul. cum decocto herbarum emollientium, vt malu. bismalua, rad. branca vrsina, cum cassia fistula & sale gemma. Deinde acutiores prescripsimus, additis fortioribus laxatiuis; simul & per superiora adhibitis medicamentis, que ad icterum valent: nam hic constipatam aluum habebat, cum ingenti colico dolore; quem etiam antea diximus ab ictero quoque posse fieri, atque iisdem remediis curari, quibus mulier illa ex colico dolore ob icterum cum fecum induratione curata fuit; de qua egimus obs. 20. lib. 19.

S C H O L I A.

EOs vero (inquit Alexander Trallianus) qui ob stercoreis duri obstructionem colico dolore vexantur, multo hydrelao potissimum & mulsæ curare oportet, atque eadem propinare ipsis conandum est. Ita namque stercus exsiccatum iam induratumque si fuerit, ex continuo iniectionum usu humidum exadens, ad infernas partes delabi & excerni potest. Ac omnem victum humidum his conuenire notum est, maxime eum qui ventrem subducere creditur: ut sunt olera mollia, veteris galli ius. Oportet autem ventre ipsius galli explicato, saleque & anethi coma repleto, coniectum in aquam copiosam tam diu decoquere, donec admodum dissoluatur & intabescat. Si vero cum eo quoque polydii unciam co-

5

1

2

Lib. 10. ca. 11.
De colicis
qui ex ster-
coris duri
obstructione
dolent.

Veteris galli
iui.

4
De clysterum
varietate.

De folle fo
brili etiam
meminis A.
matus cur.
95. cent 4.

xeris ius magis adhuc alio ducenda erit ; si uinum
etiam aut mulsum adieceris, multo ipsum suauius
& ad alui defectionem efficacius reddes. Si neque
hac uiuant, neque infusa, idem utatur folle fabrilis,
modo absit febris & inflammatio : etiam in iliosis.

3 Accommodatur autem usus ipsius in hunc modum.
Canalem medicum folle fabrilis adaptato : & cum hoc
feceris, ipsum aperito quousque totum spiritum reple-
tum conspexeris; atque tunc demum spiritum emittito,
ut re compresso. Post hac ex momento nitri &
hydreleo clysterem mox iniicies. Nam omnia, quae
in ventre & in intestinis continentur, una cum clystere
euacuabuntur, ut admireris : siue stercus, siue
humor, siue spiritus flatulentus fuerit id quod inclusum
erat. Hæc Trallianus. Galenus infundere
suadet quæ stercus emolliat ; & ventuosa iniicere,
quæ lubricum reddant ventrem : atque acutis
clysteribus mox detrahare. Alii & potionibus
emolliunt, & iure galli veteris, quo aluum effica-
cissime inaniri vidimus. Sed prius exagitandus
ac vexandus est gallus, & ad cursum incitandus,
donec ex lassitudine cadat ; in coctura salem
adiicimus, & anethum, & polypodii momentum.
In eo iure quidam & cassiam immiscunt, vel oleum
amygd. recens. Lubricum ventrem etiam reddit
ius ciceris cum pullo columbaceo coctum, cum
anetho & salis plusculo. Quidam caricæ præpin-
gues decoquunt, & carthami nucleum immiscet,
& vrticæ semen. Alii & in eodem iure galli veteris,
semen carthami enucleatum, polypodium,
& vrticæ semen coniiciunt. Sed cum hunc
virum præmanib. haberem, venit mihi in mentem
historia illa Amati de Mercatore quodam, cui
ventris ingens erat dolor ob durum retentum
stercus : pro quo depulsando clysteres plures
pararunt medici præsentis, quos absque fructu &
processu iniecerunt. Ad quem cum peruenisset
Amatus, ex oleo communi ad manus habito, sed
parum tepente, ilico nulla interposita mora
clysterem parari iussit & immitti ; interea dum
clyster hic parabatur, & clysteres emolliendi vim
habentes concinnabantur; deinde potentiores.
Emolliens talis erat: *℞. malua, branca, vrsina, foliorum
caulis, betæ ana p. j. caric. num. xv. in aqua fiat
decoctio. & huius ; ℞. ℥. j. ℞. cui addæ butyri, olei,
seminis lini, mellis ros. colati ana ℥. ij. salis ℥. j. misc.*
Acutus hic erat : *℞. centaureæ minoris, chamæpit.
chamad. ana m. j. seminis carthami, vrticæ, ameos,
sileris montani ana ℥. j. ficuum ping. num. xij. in
lixivio leniori fiat decoctio, cuius : ℞. ℥. xv. addendo
mellis ros. colati, olei rutacei ana ℥. ij. diaphænitæ
℥. j. trochis. albandal. ℥. ij. vitell. ouor. num. ij. salis
℥. j. ℞. & fiat clyster.* Exterius quoque aluum
inungebat vng. de Agrippa & althææ, & sanatus
est. Cum autem & in Iliaco malo frequenter ex-
crementa duriora retineantur, quibus clysteribus
emolliatur, etiam tunc aliis exemplis declarabimus.
Non solum in his, sed etiam in ictericis solet
aliquando stercus indurari : & sæpe icterus (ut
libro præcedenti ostendimus) in colicum dolorem
conuertitur ; & rursus colicus dolor in icterum.
Si igitur ab ictero ob feces retentas fiat, fecibus

Si ab ictero
& fecibus
retentis.

eductis per clysteres, facilius tunc & colicus
dolor curatur ; & simul ablata causa, rursus
bile ad intestina fluente etiam icterus curatur.
Colicos igitur dolores a cauitatis obstructione:
nempe a fecibus facta, vel vna phlegmate, vel
etiam lapide, iniectione humidorum ac leni-
entium sanabis : aut etiam his ebibitis & extra ad-
motis.

Si dolor fiat
ab obstru-
ctione fecis
vel phleg-
mate vel la-
pide, quo-
modo cure-
tur.

OBSERVATIO X.

De quodam ex leui occasione in colicum
dolorem incidente.

Ioannes Georgii (qui nunc in insigni Glandis
habitat Delfis) sæpissime colico dolore afficie-
batur, tam noctu quam die, modo ex refrigera-
tione, modo ex pituita coaceruata, modo ventro-
sitatibus retentis: ita ut neque ventositatem, ne-
que excrementa per inferiora reddere posset.
Hic plusquam quinquies in idem malum rela-
bens, hoc solo, vel simili clystere semper sanita-
tem assequutus est : *℞. rad. althææ mundata ℥. j. pa-
rietaria, mercurialis, malua, betæ, florum chamæ-
mille, meliloti, summitatum aneth. ana m. j. sem. anisi,
carui, fœniculi ana ℥. j. ℞. sem. lini ℥. j. fiat omnium
decoctio in aqua communi, pro ℥. j. colatura adde
cassia pro clysteribus ℥. j. benedictæ laxat. ℥. ℞.
elect. hierapicra ℥. j. ℞. olei chamæmel. anethini, a-
mygd. dulc. ana ℥. j. vitellum unius oui salis communis
℥. j. salis gemmæ ℥. ℞. misc.* Hoc clystere semper
fuit curatus.

S C H O L I A.

Colica phlegmatica (ut scribunt Neoterici qui-
dam practici) sæpe cum ventosa mixta est, q̃
etiam ut plurimum contingit: qualis hæc erat.
Et ideo curam eius communem ponunt, habentes
respectum ad pituitam educendam, & simul ven-
tositates: quo dolore & hic æger laborabat: nam
cum tantum est ex ventositate, facile carminan-
tibus sedatur: verum ubi admixta est pituita vel
alius humor crassus & frigidus, ut plerumque
contingit, tunc considerandum quoque erit,
num faeces retineantur vel aliquo tempore re-
tentæ fuerint, & ideo omnium primo ventrem
leniunt cum clysteribus, interea addentes ali-
qua, quæ etiam pituitam & simul ventositates ex-
pellant. Hic dolor colicus frequentissimus esse
solet: & sunt plurimi, qui ex leui causa in hunc
affectum incidunt, quibus & præcautio valde ne-
cessaria est. Sic frater meus Theodorus Forestus,
sæpe hypochondriaco malo obnoxius, coacerua-
to humore melancholico cum ventositatē, sub-
inde etiam incurrebat colicum dolorem: quam-
uis ex humore melancholico rarius contingat, &
ideo medici, præsertim Græci, de eo mentionem
non faciunt. Neoterici, ut Arculanus scribit, me-
lancholicam colicam & fieri & curari putant iis-
dem præfidiis quib. pituitosa curatur, præter hoc
quod euacuaria & digerentia debent esse melā-
choliæ propria, & carminantia ventositatem vehe-
mentiora, quia hæc ventositas est crassior ac de-
terior. Quorum medicamentorum copiam in-
uenies in ægritudinibus splenis, & huc potissimum

Arculanus
de colica me-
lancholica
curatione.

Præcautio.

conferunt illa, quæ ad eiusdem oppilationem & inflationem valere scripsimus. Hinc si venter ob colicum dolorem retineretur, & ob flatum alui deiectionem impediens, post clysterem emollientem & fæces melancholicas educentem, dabam per os decoctum senæ cum carminantibus: quibus statim adhibitis (initio etiam pulvere diacymini cum vino tenui & aromatico exhibitio) emissis ructibus ilico curabatur: iuuabatur etiam subinde glande immissa, si fæces non redderet, calidisque pannis ventri admotis. Et quia tales maxime consueti sunt recidivam pati, ut etiam hic æger iam dictus, maxima præcautione opus erit: & præcipue abstinendum a nimia cibi plenitudine, & ab alimentis flatulentis, & fabis, castaneis, pis, musto: non erit malum frequenti vomitu uti, vel vacatione ex hiera: qua feliciter usus sum in Theodoro fratre meo prædicto. Aluique sollicitanda vel clysteribus, vel glande, si recrementa aliquo modo retineantur: & oportet uti discutientibus: ut in fratre meo, si ructibus vel ventositatibus laboraret, utebar diacymino, aut aromatico ros. superbibendo parum vini albi diluti. Balduinus Kerckveruius, Brielenfis, solitus affici colico dolore, ita ut ad eum sæpe accitus fuerim, clysteribus iniectis curatus fuit: adeo ut ab eodem malo præservaretur. Vbi dolores aliquos futuros præsentiret, ex electuario prædicto capiebat ad magnitudinem castanæ, vel paulo plus: ex quo ilico sentiebat leuamen, erat enim durioris alui, & homo procerus, valde macilentus & melancholicus: ℞. folior. malua, viol. mercurialis ana m. j. calamint. mentha, melisse, pulegii, nepitæ, ana m. j. capill. vener. polytrichi ana m. ss. hordei mund. flor. cordial. flor. chamomilla ana p. j. seminis anisi, cartami, fœniculi ana ℥ ss. sem. carui, dauci, cretici ana ℥ j. ss. seminis malua ℥ ij. folior. senæ Alexand. ℥ j. ss. polypodii querc. ℥ ss. thymi, epithymi. an ℥ ij. glycyrrh. rasa ℥ ss. coquantur in aqua communi q. s. In hac fortiss. expressione decoque prun. damasc. lb. ss. passul. ab arill. repurg. ℥ iij. vuar. corinth. ℥ ij. substantia per lacteum extrahatur: addendo cassiæ extractæ cum decoctione superscripta ℥ iij. cinnamomi selecti pulueris sat. ℥ ss. diacinnamomi, diagalanga diacymini ℥ j. zacch. albiss. ℥ ij. fiat elec. secundum artem. Dimidia pars conficiebatur: postea quarta pars. Hic idem, quando incidebat in colicum dolorem consuetum, statim in principio hoc potu sumto, sudore provocato & emissis ructibus curabatur: ℞. sem. dauci, fœniculi, carui ana ℥ j. seminis lenistici ℥ ss. confusa bulliant in aqua flor. chamomill. & ℥ iij. vel v. huius express. calide exhibeantur, & sudor quantum potest tegumentis provocetur. Quo potu a dolore liberabatur. Sed & hoc pulvere in posterum præcauebat, ne amplius in colicum dolorem incideret: ℞. seminis anisi, fœniculi ana ℥ j. sem. carui ℥ ss. seminis lenistici ℥ j. specier. diacalamint. diacymini ana ℥ j. diacinnamomi, diarrhod. abb. specier. ar. ros. ana ℥ j. zacch. ad pondus omnium; fiat pul. subtilissimus. Capiebat ℥ j. cum cyatho vini vel ceruisiæ. Quando persentiebat aliquem leuem dolorem.

statim sumebat: & singulis mensibus semel. Et non amplius laboravit colico dolore: sed & hoc pulvere in aliis felicissime usus sum. In præcautione laborandum semper, ne alius durior sit, præsumtis prunis dulcibus: acida ventrem lædunt, & colicum dolorem faciunt. In præcautione non solum, sed & in curatione laborandum, ne pedes frigore afficiantur: nam & ego ipse anno 1566. 27. Martii ex frigore pedum in grauissimum & pene intolerabilem colicum dolorem incidi: adeo ut ex eo fere deliquium animi incurrerim. Assumtis tabul. diacymini, multos ructus per superna, & per inferna ventositates, vna cum crepitu (honor sit auribus) emisi, dolore tamen minime sedato. Non vero dolore magis ingrauescente, post clysterem assumptum, ventositatibus multis excurrentibus, in somnum suaviorem solutus deinde conualui. Enema tale erat: ℞. folior. malua, beta, mercurial. flor. chamomilla, meliloti, summitatum anethi ana m. j. sem. fœniculi, carui, dauci, ana ℥ j. ss. coquantur in aqua s. ad lb. j. adde cassiam mundatam pro clysteribus, benedicta laxat. ana ℥ ss. olei chamomill. anethini, amygd. dulc. ana ℥ j. vitellum unius oui, salis communis ℥ j. ss. misce. retinui per quartam partem horæ: deinde per alium deposui: & fui curatus. Verum mane sentiens adhuc gravitatem quædam sub hypochondriis in ventre supra umbilicum accepi ℥ j. elect. lenitum, cum ℥ j. diacymini in bolo: & rursus ter alium deposui: & ab hoc tempore, usque in hunc diem, anno 1594. 23. Iulii, cum hæc rescriberem, non amplius passus sum colicum dolorem. Quamvis Rondeletius dicat cassiam non esse ponendam in colicis doloribus, vbi ventositates admixtæ sunt, nisi in inflammatione, eo quod flatus gignat: tamen cassia mundata, vna cum benedicta (quæ ob multa semina, quæ continet flatus discutiat) hic nihil obfuit, imo multum profuit, ventrem etiam simul leniendo.

OBSERVATIO XL

De colico dolore ex phlegmone seu inflammatione intestinorum.

Vir valde sanguineus, & multo vino potenti vitens, intense febricitabat, plurimum sitiebat, ac toto corpore æstuabat, vomitionesque biliosas experiebatur, quæ nullum morbo leuamentum præstabant: dolorque ac ardor vehemens ventrem inferiorem circa umbilicum exercebant: & alius omnino adstricta erat. Ad hunc cum ingressi essemus, colicum dolorem ab inflammatione adesse, recte suspicati sumus, cum & in loco doloris venter pullarent: nam & pharmacum, quod ab altero acceperat, euomuerat, & dolor magis irritabatur, & inflammabatur post assumptum medicamentum, ita ut vestimenta iniecta non sustineret. Metuimus vero cum acciti essemus, ob grauiora accidentia, quod in iliacum dolorem malum mutaretur. Ideo statim venam internam, quam iecorariam dicimus, secari iubeo, sanguine ad uncias octo extracto. Enema etiam hoc iniectum est, ad mitigandum dolorem: ℞. folior. malua, viol. mercurial. parietaria, hordei mund. ana m. j. sem.

2 *sem. malua, coton. ana ʒj. ʒ. lactuca. m. ʒ. sebesten. num. v. fiat decoct. in aqua communi. pro ʒj. col. addendo cassia recens extracta ʒj. olei viol. ʒ. ij. vitell. onor. num. ij. salis ʒʒ. ex eo bis aluum reddidit, dolore, plurimū mitigato, præcipue vero & loco affecto inuncto cū oleo ros. viol. & momento olei chamomill. Pro cibo utebatur hordeato. Altero die redeunte dolore, ita ut propter magnitudinē inflammationis vrina supprimeretur, sanguinē iterum detrahete mandauimus, vena saphena dicta pertusa: ex qua sanguinis 4. uncias fluere permisimus. Deinde ex fotu decoct. folior. althææ, malua, viol. seminis lini, foenugræci, chamomill. dolor denuo mitigatus est. Purgationem nolui adhibere, cum neque per initia hic, iuxta Trallianum (de quare in Scholia latius) conueniat venæ sectio. Postea syr. viol. ex infus. ros. cum sero lactis solum dedi: & pro potu ptisanam. Quibus præsidus ac victu humido refrigerant, hic ager ab omni dolore euasit, & ab inflammatione sanatus est.*

S C H O L I A.

3 **I**N colica, quæ ab apostemate fit. Græci tantummodo inflammationis meminerunt, Arabes vero in ea omnis generis apostemata cōplectuntur, de cuius curatione vide Arculanum. Apostema enim per se causa doloris, tam per malā intemperiem quam per solutionem continui, colicam infert per viam defluxus, & illa apostemata, ut plurimum sunt calida: vel per viam paulatinæ congestionis, & illa sunt frigida. Phlegmonem scimus per se dolorem facere, tumores vero a pituita ex accidenti solum, cum prohibent sæcum & pituitæ ac flatuum expurgationem. In colico apostemato calido materia communes retentæ educuntur clysteribus frigidis & humidis, ex aqua decoct. hordei sebesten. viol. & oleo viol. cum lacte, & oleo viol. & pauco saccharo, & cassia, si opus est lenitione, & si magis infrigidandum, addatur muccago psyllii, vel aqua solatri, fiat tunc venæ sectio basilicæ: si vero sit magnum apostema calidum, adeo ut vrinæ retineantur, etiam saphenæ. Per os detur aqua hordei, cum muccag. psyllii, vel aqua end. solatri, cum cassia & manna: sed non in principio. Et inungatur oleo viol. & ros. in augmento addantur resolutiua & emollientia cum percussione: aqua decoct. hor. d. pass. sebesten, fol. althææ, tam pro clysteribus quam pro assumendis: potest addi oleum sesaminum & amygd. Circa statum fiat decoctio ex florib. chamomillæ, sem. maluauisci, lini, & similibus: in clysteribus addendo oleum sesaminum, aut amygdalinum, aut parū vini cocti, & si sit abstergendum, addatur ʒj. sacchari rub. Si tendat ad maturationem, addantur adipēs: & si post maturationem rumpatur, regatur cura vlceris intestinorum, de quo suo loco. Et veluti eo tempore prodest intrinsecus aqua decoct. sebesten, hordei, pass. al. ficuum, sem. bis malua, cum saccharo, ita exterius confert oleum ros. chamæmeli: quibus potest addi pinguedo gallinæ, anatis, & muccag. althææ, lini, foenugræci. In frigida leniatur venter primo, & fiat venæ sectio: & ea quæ in augmento calidæ conferunt, possunt in principio frigide

adhiberi: & quæ in statu, hic vtilia erunt in augmento. in declinatione addantur magis calida, oleum de spica, laurinum, adeps anseris, & similia. Rhases vero solum phlegmonis meminit: Si apostema fuerit, inquit, vena secetur, & cassia cum succo herbarum, id est, endiuiæ depurata, deitur. In his ergo omnibus maximum periculum versari diximus, ob febres & dolorem, a quo sudores frigidi oriuntur & syncope ob os ventris: sed etiam periculum est ne superueniat iliaca passio, ut vocant, de qua mox sumus acturi. Cura ergo horū quod ad venæ sectionem) curæ phlegmones ventriculi similis erit. Rhases alia remedia non ponit. Aui-cenna vero ad omnes intentiones respexisse videtur: qui etiam in principio adstringentibus utitur: quem scopum Paulus dimisit, cum tamē prohibere augmentum apostematis oporteat. Primum medicamentum est succus psyllii conquisitum cum oleo rosato, in quo etiam leniendi dolorem vis inest, & succus granatorum, vel potius oxyzach. dictæ nobis: & extra in loco tumoris itidem aliquid adstringens. Postea in vsum veniunt abstergentia i. horas & dolorem, & morsum sanierum sedantia, per clysterem ex succo hordei, cassia: & potus similiter horum: & clysmata ex lacte, & eius potio: postea decoctum foenugræci, seminis lini & althææ infusum, & supra ventrem appositum. Verum, iuxta Trallianum, si colicum affectum ob inflammationem intestini fieri contingat, nequaquam purgationem in his, præsertim inter initia, & cum illa nondum ad concoctionē peruenerit, exhibere audebis, Qui enim medicamenta ventri ducendo apta præbere non dubitarunt, ægrotantibus periculorum, & mortis auctores exstiterunt. Accidit namque, ut datum medicamentum humores ex illæsis ac sanis particulis trahat, & transmittat affectus. Cum autem hæc id quod illatum est, nequeant propellere, necesse est dolorem, vigilias, & tormina augeri, ac iis omnibus incrementibus, in ileosum morbum incidere. Neque enim aliud est Ileos, quam colici affectus intentio, ac incrementum. Quia propter purgatio inflammatione tentatis danda non est. Venæ autem sectio adhibenda: & paulatim ex toto corpore vacuatio tentanda: eo quod vniuersa in initio tantum præsidii non adferat, quantum quæ paulatim fit. Ita & Galenus 12. meth. meden. protinus sanguinem mittit, ubi vires valentes fuerint, in cubito etiam, ex Pauli decreto, ex vena interna. Porro si propter inflammationis magnitudinem etiam vrinas supprimi contingat, venam & in talo & in superiore pedis parte, secare non est alienum: Sape enim cum hoc (inquit Alexander) fecissemus, & alui & vrinæ excretio secuta est: quod & nostro ægro euenit. Speciatim vero eo victu uti poterunt ægri, quem cap. de ventriculi inflammatione instituiimus: victu enim tenui ac febricitantium proprio vtendum erit, quousque inflammatio discutiatur, Paulo iubente. Alexander vitur cremore ptisanæ aut auenæ mediocriter, item iniectione per aluum ex cremore ptisanæ, chamemelo, succo lini seminis, & hy-

Rhases.

5

Lib. 10. ca. 1.
de colicis do-
lorib. ob in-
flammati-
onem intesti-
norum con-
tractis.

6

drelao, praesertim si etiam febris vehemens vigeat. Rarum namque est colo inflammationem sustinente, febrem non oboriri. praedicta item ad-moueri possunt praesidia, praeterquam quae acria sunt, & valenter pugant, magisque lenientibus clysteribus est utendum, cataplasmatibus, irriga-tionibus, si dolor per sanguinis missionem seda-tus non fuerit, sed adhuc persistat: hoc enim pro-fecto indicat in aegrotante particula aliquid im-pactum esse, quod contristat: nec minus patet, quod curatio ipsa per digerentia medicamenta sit molienda, *ut liquet praeditato, libr. 12. meth. medic.* Cōponantur itaq; lenientes clysteres. *℞ folior. malua, alibea, viol. ana m. j. hordei p. j. ℞ fiat deco-ctum: cui adde olei viol. vel amygd. dulc. seu ros. ℥ ij. Zacch. rub. aut violacei mellis ℥ ij. pulpa cassia noui-ter extracta ℥ j. adipis recētis anseris vel gallinae ℥ ij. fiat clyster.* Procedente vero tempore, fenug. cha-mamelum, semen lini aut anethum adicies prae-dicto decocto: similiter vice olei violacei, vel a-mygd. dulc. seu ros. chamamelino interdum vel anethino utendum. Non minus etiam confert circa initia si asininum lac cum cassia fistula, & o-leo amygd. dulc. per sedem infundatur. Quae ex-trinsecus imponentur, *iuxta eundem Trallianum*, sint temperata, nihil acre habentia: eorum nu-mero est etiam chamamelinum oleum, & ex fari-na hordeaceae, linique semine epithemata: nec non cerata similiter, quae componuntur ex cha-mamelino, cera, rosaceo & luteis ouorum. *cera ℥ v. chamameli ℥ ij. ℞ farina fabacea, ros. ana ℥ ij. ℞ lu-tea ouorum v. vel j. succi sem. lini q. s.* qua & farina laeuigentur: atque tunc ceratum refrigeratum in-iciatur: ac omnia subigantur, quousque inuicem commixta fuerint. Hoc & renibus & vesicae in-flammatae pulcre auxiliari potest. Balnea quo-que continua priusquam totū corpus recremen-tis vacuatum fuerit, adhuc bēda nō sunt. Post san-guinis autem vacuationem, etiam si dolor vigeat, balneo uti absurdum non est. Si vero vires refra-gentur, in aluam aegri descendant, corpus oleo chamamelino illinentes. Quantum igitur ad ca-taplasmata, irrigationes, sacculos, fotus, infusus, balnea, ac reliqua topica medicamenta attinet, praedictis uti poteris, ea quae minus acria, & quae magis lenientia sunt eligens. Nec minus in oleum descendere cōuenit, *ut Paulo visum.* Vino, si in-flammatio adhuc feruet, & febres praepollent, ab-stineant. Vbi concoctionis notae apparuerint, & si vires imbecille videantur non alienum est (*in-quit Alexander Trallianus*) ipsi vinum tenue & a-quosum propinare. Scio igitur, quod si quis prae-dictis curandi methodis utatur, non vllō alio ex-trinsecus remedio opus habebit.

OBSERVATIO XII.

De colico affectu, ex calidis biliosisque humo-ribus orto.

IVuenis biliosus cum colicum dolorem patere-tur & illi consultum esset a mulierculis, ut vinū pipere iniecto & puluerisato biberet. multo ma-gis quam antea intolerabili cruciatu afficiebatur.

Ad hunc cum accitus essem, facile percepi hūc colicum cruciatum ex calidis biliosis & acribus humoribus ortum habuisse: dicebat enim aeger interna morderi, & exuri, quae & lancinari vide-bantur, aderat eidem & lingua arida: sitisque, & vigiliae eundem urgebant: eratq; vrina aeris. Cum autem idem non sine febre esset, accibus calidio-ribus, portionibus, & medicamentis magis malum irritaretur, tertio cognoui ab acribus humori-bus hunc dolorem exortum fuisse. Vnde Gale-num imitandum nobis proposuimus, ex quo & facile huius curationem comparare poteramus. Recitat enim is primum historiam quadragenarij, in quo coniecit acres humores tunicis intesti-norum immerfos, quoniam calidis omnibus coli-corum remediis irritabatur: & est argumentum ab his, quae iuuant vel nocent. Tales autem con-trariis nimirum curare conuenit, quae refrigera-re & humectare possent: & ideo quae contristant vacuare statim oportet: & propterea statim per sedem iniicere conuenit ea, quae eluere huiusmo-di humorem apta sunt, talia autem deterisua esse oportet: sed cum plerumque mordicantia sint, commodissime ex iis, aliquod deligitur, cui mor-sus absit. Eius generis maxime est ptisanæ cre-mor, *ut patet apud Galenum 12. meth. medendi:* vel cremor ptisanæ cum rosaceo seu succo lini in-fundatur, *secundum Paulum.* Nos autem deco-ctum hordei mundati primo inieci-mus, nempe libram vnā, addendo vitellum oui crudum & mellis viol. & zacchari rubei ana ℥ j. ad aeter-sionem lenem. Inieci-mus & alteri simili malo labo-ranti clysterem ex lacte, cum Zaccharo, & optime iuuabat. Lac etiam omne iniiciendum in omni dolore, qui sit ab inflammatione, vel ab acribus humoribus, addito zaccharo, ne retineatur. Va-let & clyster, ex lacte, in quo decocta sit radix alibea. Verum cum post iniectionem clysterum ex hordeo, dolor quidem non omnino aegrum relinque-ret, quamuis mitigatus ex parte videretur, talem clysterem vel similem, ut adhuc iniicerent, man-davi. *℞ alibea, malua, cum radic. foliorum viol. ana m. j. folior. lactuca, cucurbita. ana m. ℞ florum. chamameli. p. j. sem. lini fenugrac. ana ℥ j. ℞ fiat o-mnium decoctum in aqua communi, pro ℞ j. adde pulpa cassiae recens extracta ℥ j. oleo ros. ℥ j. pingue-dinis gallinae ℥. ℞ vitellos oui num. j. fiat clyster.* e-gregie iuuabat. Per os quoque accepit yrup. ex infus. ros. pallidarum. ℥ j. cum ℥ iij. feri lactis. Et sic tandem, optimo etiam victu viens (*de quo latius in scholio*) curatus fuit. At alteri, si simili malo labo-ranti cum clysteres praedicti non iuuarent, nec sufficerent, ut mordens humor vacuaretur, quia in ipsius tunicis imbibitus esset, purgans medica-mentum iuxta Galen. (*de quo latius in scholio*) ex-hibui, nempe hieram picram & curatus fuit, uti & frater meus Theodorus Forestus, *de quo paulo antea memini*, qui etiam saepe huic malo obnoxius fuerat.

S C H O L I A.

Galenus. tū alii, si colicus dolor sit a causa ca-
lida, & ab acribus humoribus, refrigerantia re-media

media exhibent, & idem (vt in historia illa de quadragenario constat) curationem ab alimento incipit (a quo Aetius, & Paulus & Auisenna curationem sumserunt) quoniam isti humores debent per Epicrasin sanari, quod fit alimento. Erat enim verisimile ad affectum locum hinc perpetuo confluere tales succos: ex quo diu durabat affectus: & præterea remediis exacerbatus erat: ad hæc ex partis intemperie & prauitate succorum corrumpi, etiam alimentum necesse erat. Quamobrem cibo vititur, vt medicamento temperante. Quapropter tum cibus tum medicamentis, qui temperate humorem possunt contemperare, vti oportet, vt ptisanæ, intubo, cichoreo, lactuca, syrup. etiam viol. rosaceo, seu ex succo cichorei, vel endiuia paratis. Similiter & balneis ex dulci aqua vtendum, vt Paulus refert & Trallianus, de quo postea. Erit ergo cibus frigidus exhibendus. Sed quia est ab occursu prauis succi facile corrumpetur. Galenus eligit ob hoc non facile alterabilem, verbi gratia ptisanam, vel alicam, vel coctas lactucas, adiectis mali punici granis: in summa, cibos boni succi, & qui non facile corrumpantur. Trallianus cremorem ptisanæ per se offert, nullam habentem mixturam aut porri aut copiosioris salis: nam absq; sale calorem refrigerare & biliosum abstergere, si quid aliud potest; præsertim copiosior & sæpe exhibitus. Ad hæc ouorum recens positorum lutea assumpta huc etiam conducunt. Olera his commodissima sunt, si & cocta & non cocta exhibeantur: his adhuc magis lactucæ grædes & auctæ, si probe refrigeratæ exhibeantur. Dari autem debent hæc iis potissimum, quos vigilæ vrgens, & calidior temperamento præditis, & ætate vigentibus. Porro omne pomum, quod refrigerare & humectare potest, his datur vtiliter: nec vlla suspicio est ægros hinc offensus iri. Ego (inquit idem Trallianus) noui non solum iuniores, sed etiam senes, paucis diebus huiusmodi victu curatos fuisse. Ad hæc frigida aqua vsus sum, in quibus vires robustas, & principales particulas illæsas deprehendi, ac scio leuasse me omnino dolorem, & totum morbum, ne amplius reuenteretur, prohibuisse, idque cum æger antea crebris accessionibus corriperebatur. Illi vero immunes ab accessione postea manserunt, qui præterquam quod vino abstinerent, etiam ab acerbis omnibus in posterum se continebant perseverabantq; in aquæ potionis & victus refrigerantis vsu. Huius quoque habemus historiam apud Amatū, de vxore Gasparis Centurionis Genuensis, ex colico dolore decumbente: quam medici præstantissimi, vt Dionysius regis Lusitanie medicus quondam, & alius Lusitanus apud Antwerpienses diu agens, tanquam ex frigida causa ortum curabant. Verum Amatus animaduertens, quod ex calida causa dolor esset, venam in cubito secuit ad 3 viij. qua sectione dolor remittebatur. Sed post fluxam & occlusam venam dolore cæpit vt pridem. Ideo iecori & parti dolenti imposuit linteolum rubrum tepide succis sequentibus intinctum: ℞. succi endiuia, cichorei, lactuca. ana lb. ss. acetos. 3ij. misce, pro epithemate. Hoc

sæpe renouato dolor remitti cæpit. Vespero clysterem sequentem immitti iubet. ℞ hordei, malua. ana 3j. viol. pariet. ana 3j. in duabus lib. coquantur: & huius tepentis decocti. ℞ 3 xiiij. olei viol. ros. ana 3j. ss. vitellos oui duos quassatos, diapysyli 3vj. salis 3 ss. zach. rub. seu ex insula S. Thoma 3j. misce. bilis plurimum excreuit, sed dolor eo penitus non cessauit, & in nocte intendebatur. Secta vena malleoli plurimum iuuat, dolore tamen redeunte. Rogat igitur Amatus aquam illi bibendam dari: concedit lubens: & vix poculo exhausto, subito incantamenti instar dolor leuatus est, neq; amplius rediit. Sequenti tamen aurora, cassie fistularis 3 ss. pulpa cum rhab. 3j. in aqua endiuia dissolut. bibendum propinauit, quo medicamento sanitati sigillum dedit. Idem quoque centur. Alia Histo. i. cur. 38. in dolore intestinorum a causa calida, in filio Falconis, annos xxxi. nato gelidam dedit, & in super pannum lineum frigida aqua immersum, ac manu pressum vmbilico admoventi iussit: nec non & diapapau. in rotulis dabat, ac desuper aquam endiuia. Quibus paucis sanus intra triduum factus est, non sine multorum admiratione, & artis medicæ decore. Similem quoque historiam habemus apud Paulum Aeginetam lib. 3. cap. 43. de Italo medico, cum multi Romani cõtatione quadam pestifera colico dolore afficiebantur, ex eiusmodi humoribus acerbis, quos fere omnes frigidis remediis curabat, vt apud eundem loco citato videre licet. Interea tamen (vt Alexander Trallianus admovent) in quibus aut principalis particulæ inflammationem suspicatus erat, aut vires infirmas esse animaduertebat, aquam frigidam dare metuebat. In his etiam, inquit, rosaceum copiosum me inieciisse noui, ac plurimum profuisse. Adieci etiam subinde adipem anserinum, ac præsidium attulisse sensi. Porro ob bilis acrimoniam & immoderatam rosionem, nec non ramentosa, quæ per aluum excernuntur, probe facit cremor ptisanæ, vna cum chamæmelo iniectus, & lutea ouorum simul cum rosaco bis per aluum indita. Ex piscibus sumi debent durior carne præditi, vt ceris, orphus, glaucus, scorpius, caris, coryx, sepia & loligo. Ex testaceis, pectines, ostrea, cochleæ marinæ. Vtilis Cibi qui vtilis etiam ipsis erinacius existit, vt qui præterquam, quod contemperet, refrigeretq; , præterea etiam stomacho gratus est, aluumq; & urinam mouet, quibus nihil est præstantius. Ex carnibus potissimum dare conuenit, quæ difficulter cõficiuntur, vt pedes bubulos & ventriculum: item suum vuluam, & ungulas, pbe coctas, refrigeratasq;. Inter fructus melopepones omnib. aliis pomis præferendi sunt. Ne autem os ventriculi subuertatur, miscere ipsis aceti paulum oportet, cum assumentur. Ad hæc aliud quoduis pomum a flatibus alienum & dulce modice voluptatis gratia sumere alienum non est. Ex placentis aut bellariis, nihil prorsus offerri debet, qui a bile roduntur, & colico dolore cruciantur. Exercitiis autem, gestationibus, omni- Exercitia vitanda. que motu per interualla morbi, neque multis, neque validis vtantur. Neque enim ferunt, sed statim intemperati & aciores redduntur, vbilar-

Balneum.

gins exercitiis vfi fuerint. Abftineant autem ab
 ra, omni que cura, quatenus licet, & omnis gene-
 ris afflictiōnibus. Ita namque temperanter, ac in
 omni hilaritate degentes moleftum & excrucian-
 tem colli dolorem euadere poterunt. Balnea
 quoque dulcis aquæ hic adhibeantur, præferim
 ætate vigentibus & calidiore temperamento præ-
 ditis, fit autem temperatum & calidæ aquæ so-
 lium. Ceterum partes quidem affectæ vngantur
 chamæmelino totum vero corpus hydrelæo: fed
 prius acris humoribus eductis. S. d. cantant æ-
 gri acriora fomenta, aquas falſas nitroſas, & re-
 uerſa balneo non ſtatim vinum bibant, ſumant
 autem cremorem priſanæ, aquamue tepidam: in
 medio vero cibi ſi velint, recentatam dictam bi-
 bere, iſtis permittendum, iſſamque aquam frigi-
 dam, ac potu eius iuuantur. A vino ſi in totum
 abſtinere poſſent, vtile eſſet: ſi autem nolint, eo
 quod ex toto vini abſtinentiam ferre nequeant,
 concedendum iſtis tenue & aquoſum. Si autem
 per infuſa non curentur, tunc etiam purgandi e-
 runt, & acris bilioſusque humor educendus: ſed
 ab acris medicamentis abſtinendum, quæ eu-
 phorbium aut enidium granū, aut ſcammoncam,
 aut lathyridas, aut veratrum ſuſcipiunt: hæc enim
 omnia præterquam quod nihil hos iuuant, præ-
 terea etiam tormina & roſionem pariunt, & aliam
 bilem excitant: Rhazes non incommode caſſia v-
 titur, diſſoluta his quæ purgant bilem & tempe-
 rant, vt prunis. Sed illa dulcia eſſe debet; acida do-
 lorem inteſtinorum procreant. Valet & ſyr. roſi
 laxatiuus. Sed dicis, Galenum prius curaffe per ci-
 bum, aliam & lactuſas coctas: & mox pu gaffe. Nō
 ne præcedere debuit purgatio: At nō erat probe cer-
 tus naturæ ſtatus: vnde quaſi tentans dedit ci-
 bos eos. Quamobrem ſubdit: ex quo viroſos hu-
 mores purgandos iudicauit, cum minus hunc crucia-
 tum poſt tale viſum intellexiſſem amoueri. Medi-
 camentum autem fuit hiera. Ideo vbi clyſteres
 ſtatim eluentes bilem & contemperantes & leui-
 ter abluentes non iuuant, & in iſtis tunicis imbi-
 bitus ſit humor, vt erat in illo quadragenario Ga-
 leni, purgans medicamentum exhibendum erit.
 In quem uſum aptiſſimum eſt amarum medica-
 mentum, quod ex aloë componitur, vulgo pi-
 crū appellant, ex Galeni decreto, cum 1. de loc. af-
 ſect. tum 12. meth. med. quem ſectati ſunt Paulus
 & Aetius: idque aut ſemel tantum exhibent, vt
 hominem iuſte purgare poſſit, viribus conſen-
 tientibus, aut in quibuſdam interuallis, vt paula-
 tim, & moderate purgationem faciat. Idem Tral-
 lianus aſſertit, inquiens: vtile igitur hic eſt antido-
 tum quod Picra dicitur. Si namque bilis, quæ do-
 lorem roſionemque inducit, inteſtinorum ipſo-
 rum tunicis affixa tibi videatur, iſſa per ſe picra eis
 dari debet: ſi autem non ſolum in tunicas abſor-
 pta eſt, ſed etiam in ſpatio continetur, ac aliunde
 frequenter inſluit, tunc antidotum non per ſe ex-
 hibere, ſed adiectis ei ſcammonii lacrymæ ſcu-
 pulis duobus, aut paulo ampliori, aut minore mo-
 do, oportet vt iſſos purges: nec non Theodoro
 admixta ei ſcammonij lacryma. Quod ſi æſtas

Purgatio.

fuerit, etiam rhodomelici, aut rhodomele, aut hy-
 drorofato: iſſam picram adiiciendo purgare iſſos
 conuenit. Valde enim iuuantur, non ſolum quod
 infeſtate dolore leuentur, ſed etiam quod totum
 priuſ affectū euaserint. Sed vbi in tunicas non
 abſorpta fuerit bilis, cum illa facile purgetur flu-
 tuans, nos poſſumus abſtinere a lacrymæ ſcam-
 monii & potius vt ſola caſſia & prunis, vt Rhazes
 iubebat: vel poterimus iſſam hieram cum torido
 melle aut caſſia fiſtula, zaccharo viol. ſeu ſyrup. ex
 plurib. infuſ. viol. vel roſarū permiscere, vt Dona-
 tus ab Altomari recte facit, aut in eundem uſum,
 mellis roripit, id eſt mannatis ℥ j. vel ℥ j. β. cum a-
 qua hordei præbere, aut ℥ j. caſſia extracta vel ℥ v j.
 diacatholici cum aqua eiſaem, aut aqua caſer, ſeu
 ſero lactis: vel ℥ j. ſyr. ex infuſ. roſ. pallidarum, vel
 ℥ j. β. ſyrup. ex roſ. pallid. cum rhob. qui ſyrupus in
 noſtra officina ſemper paratus habetur, cum aqua
 cichorei, vel hordei, vt lubet. Si his non curetur
 dolor, ad ea medicamenta conſugiendum, quæ
 torporem inducunt, vt liquet apud Galenum 12. Medicamen-
 ta corporum inducentia. Eſt enim hoc commune præſidium, v-
 bi res urgeat ad narcotica conſugere, de quibus,
 & eorum uſu hæc ſentit Galenus: Hæc ſane ſunt
 omnium differentiarum doloris communia me-
 dicamenta, vbi alia non conſulere. Sed plus utili-
 tatis & minus incommodi afferunt, vbi dolor eſt
 ex erodente humore quod minus lædant, cauſa
 eſt natura horum humorū, qui cum calidi ſint
 & tenues iuuantur a frigidis & ſiccis: cuiusmodi
 ſunt medicamenta narcotica. Quare & duplici ra-
 tione proſunt: primum, quod lenſum tollendo,
 vel hebetando dolorē leniunt, de hinc quod hæc
 humorem craſſant, & cogunt, & refrigerant. Que
 ſane qualitates, aduerſæ ſunt his, quæ oberāt. Ob-
 erat enim materia calore & tenuitate partium,
 qua maxime fit mobilis & diſſecans & mordens:
 incræſſant enim, & vehementem calorem infrigi-
 dant. At vbi ex humoribus craſſis & flatuoſo do-
 lor fiat (vt dictum eſt prius) oberunt hæc pluri-
 mum: primum quod tunicæ inteſtinorum fri-
 gore denſiores fiunt & ita minus admittunt fla-
 tuum exitum, & humor ſit craſſior, & ad exitum
 ineptus magis. S. d. neque ſic proficies. Nam non
 multo poſt reuertitur dolor, rursus in flatus mu-
 tato humore: niſi interim medicus bonus, & ex-
 ercitatus proſpiciat. Nam ſi inquit, quis ſine re-
 cta ratione curet, in periculum ægrum ducet, dum
 ſæpe cogetur ea rursus propinare, donec pars in
 malum habitum perueniat, & inde vniuerſum
 corpus. Et qua eſt dicet iſta curatio rationalis? Re-
 ſpondeo vt ab aſſumpto medicamento, & dolo-
 re tranſiſper ſedato, incipiat cum laxantibus mo-
 dice calidis, & extenuantibus procedere, ne rur-
 ſus dolore excitato cogatur dare medicamentum.
 Conferunt igitur anodyna potius, vbi humores
 craſſi & flatuoſi adſunt: vbi vero acres ſunt, minus
 lædunt torporem inducentia, imo iuuant, humo-
 rum tenuitatem incræſſando, & vehementem ca-
 lorē refrigerando. In quem uſum ℥ j. aut ℥ ij. phi-
 lonii Perſici aut Romani exhibere poteritis, aut
 tantundem eius compositionis quam Tripheram
 magnam,

OBSERVATIO XV.

*De colico dolore cum nervorum contractione,
& variis symptomatis.*

ANno 1559. per totum mensem Ianuarium, Februarium, Martium, Nicolaus Berendrechtius, prætor Leydanus, dolore colico & perpetuo cruciatu, vigiliisque & nervorum contractione misere affligebatur. Variis remediis cum vñus esset, ex consilio Huberti medici sui domestici & præsentis, & Henrici Vergerii, deinde Hugonis Nieuwenii, ita vt neque clysteribus, neque anodynis, neque etiam stupefacientibus dolor mitigari posset, ad hunc tandem subinde & ego accitus sum. Communi nostro consilio Philonium Romanum ad ℥j. additum fuit in clysteribus: ex quo aliquid commodi sentiebat, sed dolor in totum leuari non potuit. Sed cum hæc parum proficerent, postremo inspecta eius genitura & reuolutione, more Astrologorum, prædiximus dolorem futurum mitiorem post vñdecimum Martii diem, & secundum nostram prædictionem dolor iste paulatim, tunc per se mitigari coepit; & adhibito & propinato stercore lupino, quod ex Antwerpia trans mittebatur, cum hic nō reperiretur, tandem colicus dolor in totum cessauit; remanente tamen contractione in brachiis, manibus & cruribus: pro qua curanda multa præsidia adhibita, vt decocta intestinorum vel tripurum, vt *Barbari loquuntur*; pro fotu, balneis vñsumus. Ad contractionem & siccitatem corrigendam præscripsimus illi *oleum ranarum & amygdal. dulc. & oleum vermium terrestr.* quo loca affecta inungebantur & fouebantur: post tres septimanas adieciimus *olea mastichis & hyperici*, ad roborationem nervorum: & administrauimus compositionem magistralem, ex *caniculis iunioribus secis, insisi, & decoctis cum herba paralytis in vino rubro, in balneo maris per horas 12. ad carnis putrilaginem; & per setaceum expressis, additis oleis vermium terrestrum ad ℥ ij. & mastich. ad ℥ j.* Hac compositione partes aff. & inunctæ sunt, & manus ac crura lota cum residuo decoctionis: & mox etiā inuncta sunt, & inuoluta pelli a cane extractæ. Quibus prædiis se melius habere, quam plurimis amplis literis ad me missis significauit; sed tamen in stomachum imbecilliores incidisse. Sed eo inuncto oleo nardino, mastichino, & assumptis tabulis ex aromat. ros. & diarrhod. melius habuit. xix. Aprilis rursus ad me literis transmissis rogabat, numquid propter imbecillitatem ventriculi vti posset *pilulis ex hiera simpl. Galen.* quibus aliquando commode vñsus fuerat? Rescripsi vt iis vteretur: sed quia valde biliosus erat, aliquid rhabarb. adderet, in hunc modum. *℞. pilul. hiera picra simpl. ℞ ij. rhab. optimi ℞ j. cum aqua betonice, fiant pilule viij.* Referebat & nuncijs contractiones propemodum curatas. Quare vt & linimentum superscriptum prosequeretur mandauit. Verum hic mense Maio thermas Aquenses accessit, & a contractione integre conualuit.

SCHOLIA.

STercus lupinum est ex propriis medicamentis, quæ colicis indifferenter exhiberi possunt. *Quæ indifferenter colicis præberi possunt.* Scribit Galenus 10. de simpl. medic. facult. *Horum quosdam ego vidi, non amplius inuadi, & qui erant inuasi non amplius grauius passos, sed nec post paucum temporis.* Accipiendum est etiam albidius potius *Stercus lupi.* stercus, quale vbi ossa comederint, solent excernere, & quod in terram non delabatur, sed in spinis, fruticibus, vepribus, herbisque altioribus hæret. Ea enim est luponum natura, quæ canum, vt suspensio altero posteriorum crurum meiant, & cacent in eminenti quopiam loco, & eleuatione. Inuenitur etiam in illorum stercore non nihil ossium deuoratio animalis: quod idem ipsum contundens, ac conterens cum iam dicto stercore præbeto. Hoc enim lupinum stercus a tota substantia conducit, ex vino albo & tenuis consistentiæ epotum; interdum vero ex aqua; idq; nō tantum in ipsis paroxysmis, sed etiam in interuallis, potissimum si phlegmone vacent ægri. Galenus autem istud stercus lupinum alterius medici auctoritate commendat. Auicenna vero & intestinum *Intestinum lupi.* lupi magis laudat, quam stercus lupi, vt videre licet *sen. 10. lib. 3. canonis, cap. 14. iradlat. 4. quod & Amatus experientia comprobauit, centur. 3. curat. 12. sic scribens. Nobilis Romanus, qui prope Capitolium, non procul ab ara Cæli cænobilignipedum Franciscanorum habitabat, colica affectione grauissime torquebatur, ad quem plus minus quinque vel sex medici inuensendum venimus. Contra quem dolorem cum multis & selectis medicamentis vñssemus, præcipue per clysmos iniectos, nullum præstantius aut diuinus remedium, pro eo propulsando inuenimus, quam lupi intestinum in pollinem et cinem redactum, & vino generoso exceptum, ac calidum epotum, breui opus suum compleuit, & ipse ager sanus euasit.* *Nota.* Cu-
rent igitur medici intestinum hoc apud pharmacopolas semper, vt habeatur: & stercus quoque lupinum, quo noster æger optime habuit. Poterit & idem stercus, ex eiusdem Galeni sententia, instar amuleti ægroti partibus vacuis, quas Græci *λάρυκας* vocant, alligari, vinculo confectio ex lana ouina, quæ a lupo esset lanata. Quod si talis non *Amuleti.* adesset lana, ex pelle ceruina lorum confici posset, quo stercus contineatur, ac prædicta loca præcingantur. Modum autem illigationis reperies apud Galenum præcirato loco. Hoc quidem medicamentum alligatorium, certum eius periculum faciens, Trallianus comprobauit: nempe stercus lupi ossa vorantis (modo inueniri posset) in canalem includebat, ac in dextro brachio, aut femore, aut lumbis per accessionem gestandum dabat; cauens ne dolente parte, neque terram, neque balneum æger attingat. Alauda, vt prius dictum est ex *Actio*, ex iure simplici decocta assidue cum iure accipitur, vel assata in cinerem redacta & *Quæ tota substantia inuuant.* trita ternis cochlearibus ex aqua calida per triduum sumta: vel ipsa comesta, iuxta Trallianum. Thraces (vt idem refert) viuentem adhuc alauda cor eximentes, alligatorium faciunt, femori sinistro ipsum circumdantes. Aliud comprobatur:

Ex porci intestino ceco, id quod mammosum est accipio, ac myrrha inuolutum, ligatumque in pelle lupina, aut canina dat gestandum, luna abeunte a sole: ac miraberis. Umbilici infantis nuper nati præcisi, paululum in argentum aut aurum includito cum modico sale. Qui gestat hoc alligatorium medicamentum, dolore pro suis non corripitur. Jecur caprillum combustum, laugato, datoque ex vino potui: multum ipsis auxiliatur. Alios annulos, sed nimium superstitiosos, gestandos idem commemorat. Plinius Secundus lib. 2. cap. 30. tanquam expertum commendat cochleas tres in olla noua clausas, & circumdatas, ac in furno combustas, si earum puluerem in vino, aut ubi volueris, dederis. Alii (ut Aetius) menthæ viridis decoctum ad tres dies exhibent vel marrubium in vino mulso decoctum. Quibus præsidii (ut ferunt) liberantur; neque postea in eandem affectionem incidunt. At tractatu de colicis doloribus nunc ad finem perducto, ad Iliacum dolorem & cruciatum saeuissimum nunc transeamus.

OBSERVATIO XVI.

De fleo.

Vir quidam ingluuiei deditus, cum diuersis ferculis & malis cibis longo tempore usus esset; & post vehementiorem exercitationem frigidam aquam largus bibisset, in ileon morbum grauissimum incidit; cui cibi tedium statim accedebat, deinde vomitus, ut neque cibum neque potum contineret; & quod postea euomebat phlegma, corruptum erat, & venter eidem plurimum adstringebatur, ut ne flatum quidem seu ventris crepitum emittere posset. Cruciatu vero intolerabilis ventrem circumdabat, & maxime circa umbilicum, qua parte intestinum gracile voluitur, ad latera sub hypochondriis mirum in modum ægrum infestans. Ad hunc itaque ingressus, animaduerti statim ex signis præsentibus hunc grauissimo ileo laborare, præsertim cum ab eo intellexissem, quibus cibis usus esset. Nam causa huius affectionis, teste Aetio lib. 4. cap. 28. de voluulo ex Archigene) existit continua ciborum corruptio, præsertim si multi accipiantur, variique & ii, quibus non adsueuimus, & maxime ex pinguibus carnibus. Præterea etiam ex frigore vehementi & aceruata frigida potione, maxime si ab exsudantibus accipiat. Quæ omnia, cum hic præcessissent tum ex iis omnibus, quæ aderant, talem affectum adesse cognoui. Illico igitur, cum omnia superius euomeret, & flatu & stercora detinerentur, libenter eidem clysterem præscripsissem: sed cum eum nescio, qua mala persuasione adductus, admittere nollit, ideo glandem prius iniicere coactus sum, cum medicamenta per superiora adhibita non retinisset. Itaque glandem longiusculam præscripsi ex pul. hiera, pauco adiecto ex trochisc. albandal. melle & sale. Ita enim, iuxta Aetium, glandulas longiusculas facere oportet, quæ ad strictiorem internam ani partem, sphincterem Græcis appellatam, transire queant: quibus appositus podex per spongas calidas foueatur, qui-

bus lane (eodem teste) cyclamini succus vtilissime sulcipitur. Glandes ipse parat ex semine rutæ, & nitro, cuminoque ac melle. Nos etiam parum pul. cumini melli imposuimus ad ventositates expellendas. Sed ex glande nihil nisi scibalas eiecit. Ideo eum rursus hortati sumus, cum stercus durius in intestinis hære coniectaremus, ut clysterem admitteret, qualem & Aetius ex Archigene laudat, ex althea fœnugræco, cum cariis decoct. butyroque & anethino oleo. Tandem dolore magis increcente clysterem admisi, qui ita parabatur. ℞ rad. altheæ seu bismalua ℥j. malua, altheæ, mercurialis, beta rutæ, an. m. j. florum chamomil. meliloti (ob ventositates & dolorem mitigandum) an. p. j. caricarum pinguium num. v. j. coquantur in iure pulli pro lb j. & colatura adde electuarii lenitiui, diacatholici, an. ℥ss. butyri, olei anethini, an. ℥j. vitellum oui, salis ℥j. fiat clyster. & præcepimus, ut eum quam diu posset retineret. Id etiam iubet Aetius, ut & per fistulam ampliorem largius infunderetur, iuxta corporum rationem, aliquando usque ad duarum heminarum menturam. Oportet autem (uti & nos fecimus) iuxta eundem hæc infusa ante cibum infundere. Ex hoc clysteri tres habuit secessus, prius stercora dura excernens, ultimo vero parum liquidiora, deinde vomitu aliquo modo cessante exhibui electuarii lenitiui, & cassiæ recens tractæ, an. ℥ss. cum ℥iij. aqua florum chamomillæ, ob ventositatem & rursus habuit secessus. Imperavi quoque, ut ℥j. olei amygdal. recent. sumeret. Hoc vnice valet, & multis profuit. Dedi autem calide, non tepide, ne euomeret. Quibus hoc minus placet, vel illud abhorrent, soleo dare ius caponis vel gallinæ, vel galli decrepiti: mox etiam mannatis selecti ℥j. & cum iure veruecis vel pulli: ut istis diebus egregie profuit mulieri fere sexagenariæ ileo malo laboranti, cui & decoctum florum chamæmeli, (uti & nostro agrotanti, de quo supra diximus,) commodè adhibui; quod quidem, ut si quid aliud, hypochondriis ac reliquis visceribus, quæ circa hypochondria sunt, gratum existit, condensata corpora rarefaciens, indurata emolliens ac tensa relaxans: doloresque sedat ac mitigat, Galeno teste 3. de simpl. medic. facultat. uti & lini semen, quod tamen minus gratum est minusque calidum. Talia, inquam, medicamenta & voluulo ex humorib. crassis & cruditate conferunt: exceptis iis, qui ex inflammationibus infestantur. Et quia hic erat etiam crassus humor ex cruditate, post clysteres & leues purgationes etiam dedi cum cassia aliquid diacatholici & electi de dactylis seu diaphœnici: in hunc modum. ℞ cassiæ recens tractæ, diacatholici, diaphœnici, an. ℥j. syrup. ex infus. ros. ℥ss. aqua florum chamomill. ℥j. misce. Ventrem inunxi oleo amygdal. dulc. chamomill. anethino, & fœtus adhibui ex decoct. folior. maluar. altheæ, chamæmeli & sem. lini, in aqua per spongas. In fine exhibui ℥j. theriacæ. Nam ante somnum etiam antidoti valent, ex Aetii mente, ut theriaca; & post eam Mithridat. Atque his remediis sanitatem consequutus est.

SCHO.

magnam, seu eius, quam Requiem magnam nuncupant. Tutius tamen erit ea prius cum iis, quæ per sedem infunduntur permiscere: ubi non suffecerint, eadem deuoranda permittas. Vult tamē Arculanus, vt rarissime ad narcotica veniamus, nisi fortissimo dolore inducias nō dante: & ea necessitate probat narcotica cū solutiuis permisceri, vt simul vtraque cura perficiatur. nec iis vtendū, omnibus medicis suadentibus, nisi re in summa desperatione posita, & causa calida: & potius per glandes & clysteres progrediendum, quæ tamen multo tempore non permaneant, filoque appenso potius suppositoria extrahantur: neque hæc conueniunt in colico dolore ex ruptura, neque ex frigida causa, Sintque etiam cum calidis & suis correctoriis repressæ: & ideo illis nō vtuntur, nisi casu quasi desperato, vt per infusum in iure pulli ʒj. philonii Romani iniecta. Et si glandibus vtamur, ea filo adhærente extrahantur ad libitum, um aliquando acciderit, quod ager ob nimiam dimissionem, mortē incurrerit, referente Gatendaria, Papiz in quadam muliere euenisse, superueniente caro seu suberhi & apoplexia, ex qua moriebatur. De his vide plura, & apud Gatendariam Gradum & Arculanum, & eos, qui Auicennam sequuntur.

OBSERVATIO XIII.

De colico dolore ex medicamento acre & venenoso.

Romboldus Tielmanni adolescens, qui apud patrem D. Iphis habitabat in domo illa contigua, in qua Libra publica pendebat, anno 1568. mense Nouembri cum torminibus intestinorum afficeretur, ad se chirurgū vocauit: qui eidem purgans medicamentū acre & satis venenosum propinauit, ex quo plurima egressit, & multa euomit: vnde & a torminib. in colicum dolorem crudelissimum prolapsus est. Et post hunc alius accedens (*cui Volckius nomen erat*) chirurgus, qui se Paracelsi lā profitebatur, cum vino eidem oleum anisi exhibuit, quo quidem dolore magis exacerbato coactus fuit & me vocare. Adhibui statim hordei decoctum, cum syr. ros. rub. per infusionem parato, pro medicamento venenosi deterfione; mox dedi quoq; cremorem hordei, & pro alteratione ac siti imperaui, vt frequenter acciperet *syr. de ribes, cum sacch. rosaceo seu perlato*. Ad eluendum acres humores a medicamento venenoso concitatos & dolorem consopendum, continuo utebatur hordeato ex *hordeo mōdato, amygd. dulc. & semine papæ parato*, ita vt intra duos dies ab omni dolore liberatus fuerit, alioqui hac cum vitellis onorum crudis tepide cum clysteri infundere iussissem. Sed & ante hunc mulier quædam Alcmariana, cum ei empiricus medicamentum venenosum dedisset, fluxum ventris subsequenter passa est valde biliosum & acrem, cum mulier biliosa esset: vnde & acris humore a toto corpore magis deficiente ad intestina, non solum in tenesmum cum corrosione incidit, sed etiam in colicum dolorem venenosiorem circūmbilicum. Ad hanc accitus sub finem mensis Augusti, an-

no 1552. dedi iuleb sequens. *ʒ. syrup. ex infus. ros. syrup. cotoneor. an ʒ. ʒ. aqua decoct. hordei non excorticati ad deterfionem ʒ. iij. misce.* Altero die dedi pilulam unam, confectam ex ʒj. pilul. de cynoglossa vel alchabea dicta numero quatuor. Mox duo vel iij. cochlearia superbibebat ex decocto sequenti. *ʒ. sem. cotoneorum, psyllii, sem. 4. frigid. maior an. ʒj. sem. papæ. albi ʒj. ʒ. sem. hyos. yami, anethi. an. ʒ. iij. bulliant in ceru sia, quæ & acch. candi & penid. dulcoretur.* Somnum induxit per diem integrum, cum antea præ dolore multis noctibus atque diebus prægressis dormire non potuerit: atque statim hoc præsidio omnis dolor etiam consopitus est. Vires hic constabant: & ideo ob dolorem intolerabilem pilulā vnā dedi, & erat quarta pars vnius scrupuli. eiusmodi pilulæ obtinent vim in tenuibus sistendis distillationibus, ac doloribus mitigandis: quæ cum cautione, vti omnia soporifera & narcotica, danda sunt.

S C H O L I A.

POnit similem fere Historiam Galenus, illius *De colico* scilicet, qui a causa procatactica patiebatur *dolore ex* colicum dolorem, nempe ex scammonii potu, quo *scammonii* nam portio aliqua eius intestinīs inhæserat, & eo *potu.* attrahebat praua excrementa ex toto corpore. & quidem mordacia, quoniam scammonium vehementer trahit bilem. Huic alicam cum punici granis propinat, & rhois succo diluto potat. Nos iuleb habemus dictum de ribes, ideo commode priori ægroto syrup. de ribes dedi: vult autem hoc reprimere & exulcerationem sanare. Cremor amygd. dulcium cum extergat & temperet, conueniebat. Conueniet & in hunc usum ptisanæ succus infusus, & oryza, & alia quæ temperat: de quibus infra de dysenteria sermo erit. Galenus his rhois succum propinat: quod etiam reprimat, & exulcerationem tollit. Poma etiam austera offert, mala, pyra, punica. Quarto die theriacam bibit, & perfecte sanus fuit. Vfus eius ad tollendam noxam scammonii, quoniam proprium eius est & experimentum bonitatis, si biberat vim pharmacorum: cum & theriaca (*eodem teste*) quatuor mensium, quæ nouitati est vicina, virtutem habeat oppi: vnde eiusmodi theriaca somnum inducit, humores fluentes desiccet, & aliquantulum incalescat: vt in Romana illa muliere nobilissima catarhum fortem & nimiam tussim curauit. Sed de iuvene illo, qui ex succo scammonii purgatus erat, vide 32. *meth. med. capit. 7.* vbi & quatuor exempla diuersa colici doloris ponuntur, quæ etiam recensentur apud Campegium *libr. 4. historia 16.* Primum est de illo, qui per interualla sumens hieram, in 40. diebus curatus fuit, cuius historiam posuimus *Scholio precedente*, cui mordaces humores in tunicis intestinorum infixi erant. Secundum est, de quo nunc diximus. Tertium est huic fere simile, tempore æstate siticuloso, cui & frigidum potum concessit Galenus. Quartum rustici est ex flatu laborantis, & cum esu alui curati. Pro diuersa enim causa variatur curatio, vt iam supra dictis exemplis ostendimus. Ita quoque si *Ex veneno,* a procatactica causa euenerit dolor colicus, vta

Ab aere ve-
noso.

veneno sumto, curatur simili fere modo, quam-
quam statim utile erit omnium primo vomitum
prouocare cum aqua calida & oleo sisamino, vel
potius oleo amygdalino (*quod & confert veneno &
colico dolori*) vel cum decocto sem. anethi. rapha-
ni, vt vomitus facilius concitetur. Lenientia quo-
que & ablutoria exhiberi possunt. Postea curatur
vti venenum, in potu dando Theriacam, & alia
antidota vnicuique veneno propria, vt est tormen-
tilla, diptamnium, & similia. Et si fuerit aer veneno-
sus, qui multis communicetur, & colicum dolorē
inferat, vtendum erit cordialibus præcipue, & aer
alterandus ad contrarium, & mutandus locus, in
quo non sit ista aeris communicatio, a crasso &
turbido ad subtiliorem sese convertendo: & præ-
terea theriacam, mithridatum, & alia similia ad-
hibere oportet.

OBSERVATIO XIV.

*De colico dolore ex ruptura & fecibus in intestinis
una in scrotum dilapsis.*

FRATER Ioachimus minorita, vir fere septuage-
narius, in collegio Diui Francisci apud Del-
phenses agens, anno 1568. die 27. cum enteroce-
le multis annis laborasset, tandem ex ventositate
& stercore ibidem indurato in colicum dolorem
incidit: adeo vt chirurgus accitus intestina in lo-
cum proprium deducere non potuerit, & quam-
uis externis remediis vteretur, & glandes impo-
sisset ad feces reddendas, tamen nihil profecit.
Vnde cum malum ad rectum deperiisset, me vo-
carunt. Tandem tamen clysteri sequenti per me
descripto & iniecto, senex ille ab orci faucibus in
vitam reuocatus est. ℞. foliorum malua. parietariae,
mercurialis, florum melilot. chamomill. ana. m. j. ra-
dic. alibae ℥. j. ℞ sem. malua. anisi, fœniculi. ana. ℥. j. ℞.
folior. senae ℥. j. ℞. vuar. passul. ab arill. repurg. ℥. j. ficuum
pinguium num. v. fiat. omnium decoctio in aqua com-
muni q. s. cuius colatura accipe ℔. j. adde diacatholici
℥. j. benedicti laxat. ℥. j. olei amygd. dulc. chamamelini.
an. ℥. j. ℞ vitellum vnius oui, salis communis ℥. j. salis
gemma ℥. j. fiat clyster. quo ter quaterue aluum de-
posuit & ab omni dolore liberatus est. Chirur-
gus facile intestina in locum debitum reduxit, li-
gaculis, vt artis est, iniectis.

SCHOLIA.

Curatio co-
lici doloris
ex ruptura.

Dolor colicus si fracto peritoneo, enterocela-
rum vitio, contingat, intestinum in propriū
locum reducendum, modo possit: sin minus, ster-
core indurato vel ventositate inhibente, clyste-
tes adhibendi, & foci ad relaxationem, & ventosi-
tatem resoluendam, imponendi, cum spongiis
ex mollificantibus: deinde compresso intestino
manibus leuiter impulso, & reducto, plumaceo-
lus vino styptico, decoct. balaust. nucum cupressi.
gallar. infusus superligandus: etiam imposito em-
plastro contra rupturam, sed hæc ad chirurgiam
spectant, vt & hoc; quomodo commode reducā-
tur intestina, si ex ruptura colicus dolor accedat.
Post vsum clysteris, si eo opus est, non tamen acu-
ti, sed emollientis & ventositatem carminantis, &
exterius appositis mollificantibus & ventositatē
carminantibus, ægro supino iacente, & aliquali-

liter eleuato cum parte, ad quam facta est luxa-
tio, dislocatio, vel ruptura, vt commode impo-
ni possit: & ante reductionem non dentur soluti-
ua per os: & diætā sit valde tenuis & leniens. Re-
ducto intestino ruptura consolidetur, adhibita
ligatura brachiali (*vt vocant*) & reliquis intro as-
sumtis & extra impositis quæ consolident. Si co-
licus dolor sit ex torsione, vel malo si u intesti-
norum, tunc corpus extēdatur supra ac deorsum, Ex malo si-
tu.
& crura: deinde minister oleo liliaceo & amygd.
dulc. leuiter tractabit partes ventris, inclinando
modo in dextrum, modo in sinistrum, sursum de-
orsumque: & subinde infirmus contrahat crura,
rursum subleuet secundum ilia, modo de latere in
latus se voluendo, atque diuerso modo, dimissis
clysteribus fortibus & solutiuus, reducat Deo
volente. Reliqua vide apud Arculanum. Et sic in
omni colico dolore causa ipsa dimouenda: vt si Omnis caus-
sa doloris co-
lici amonen-
da.
stercus sit induratum in intestinis, feces emolliende
& educendæ cum clysteribus emollientibus, ita
quoq; & lapides si in intestinis, hæserint (*Sic Ma-
riotta vt antea quoque recensuimus, Palla pharma-
copola lapis clystere emolliente, & continuo foci, apud
Benuenium columbini instar oui ab aluo proiectus:
sic & apud Gradum, tres lapides quoque durissimi e-
iecti*) clysteribus emollientibus & lenientibus e-
ducendi. Scribit Rhases Iudæum quendam plu-
res in stercore lapides eiecisse, facta aliqua molli-
ficatione cum clysteribus lubricantibus, humi-
dis, abstergentibus, quibus & aliqua lapidum frā-
gentia adiecta erant: si in superioribus intestinis
hærent lapides, eos lenitiuis per os exhibitis de-
pellebant, si in inferioribus per clysteres. Ita quo-
que si vermes in causa fuerint, vt prius quoq; di-
ctum est, interficiendi & educendi sunt: vt vxori
lapidæ apud Amatū colico cruciatu afflictæ cō-
tingebat, quæ post varia & multa remedia adhibi-
ta mithridatico antidoto epoto, teretem siue ro-
tundum aut longum dictum lumbricum per os
reiecit, & sana facta est. Si ex sanguine in intestinis
cōgelato fiat, educatur iuxta Arculanū: si in inte-
stinis inferiorib. sit, clysteri abstergēte molliente Si ex sangui-
ne in intesti-
nis, conge-
to.
ex aqua decoct. hordei & furs ℔. j. adiectis ℥. iij. oxy-
mel. simplicis vel scyllini: si in superioribus, detur
aqua hord. calida, cum oxymel. simpl. vel scyllino,
vel admisceatur, sumtis per os gr. s. coagulati in cly-
sterib. ad ℔. j. Si fiat a vulnere, curetur vulnus iuxta A solutione
continui.
Antic. & si ab humore erodente bilioso vel sal-
so, aut cibo acri, curetur, vt de bile & humore acri
dictum est. Si ab vlcere, curetur vlcus, & si a com-
munitate ab aliis membris, habeatur ratio mem-
bri mittentis & recipientis. Ita quoque si a caus-
sa primitiua, siue a potu aquæ frigida, balneis, les-
sione supra lapidem, vel alia quacunque causa, ca-
remoueat, & dispositio impressa corrigatur.
Quidam in declinatione tam in curando, quam
præseruando etiam cauterio vtuntur, quæ cum ad
chirurgiam pertineant, de his vide Gradum, qui
tantum dicit conuenire in colica pituitosa, in a-
liis vero minus. Reliquam curationem colico-
rum vide apud Arculanum, qui hanc rem fusissi-
me tractauit.

OBSER-

S C H O L I A.

Sæpe vero & in tenuiori intestino affectus quidam oritur, quem Græci *ἰλεός*, & interdum *χρόδα* & *φω* appellant: Latini voluulum seu Ileum. Similis quodammodo hic dolor est illi, qui plenius intestinum, id est, colum infestat: sed loco solum differt. Ileus enim, quem Latini vocem voci reddentes, voluulum dicunt, sedem affecta, (ut Galen. inquit 6. aph. 44.) habet tenuia intestina, id est, infra ieiunum, qua parte circumuolui incipiunt. Celsus tenuioris intestini modum appellat: barbarâ sectantes medicinam *Iliacam* passionem nominant. A symptomate (inquit Gal. 2. method. meden.) nomen sumit: nam *ἰλ* est verbum Græcum, Latine *Verto*, seu *Voluo* significat; inde *ἰλεός* quasi *Perfus*, seu *Circumvolutus*, quoniam ægris dolor circumuolutus accedit. Aetio testea. 28. lib. 9. & a quibusdam barbaris & vulgaribus *Miserere mei*, ob insignem & acutissimum dolorem, vocatur propter circumactionem intestinorum circa vmbilicum. Nec minus, si *χρόδα* & *φω* appelletur, & nomen a symptomate sumit: nam *χρόδα* verbum Græcum, idem Latine significat, quod *in hordo*, *implico* seu *uretio*. Quare cum in hoc affectu tumor emineat in tenuium intestinorum parte, ut videatur intestinum ad chordæ similitudinem conuolutum (Galenus auctore 6. de loc. affect.) propterea non ab re ab hoc symptomate, si *χρόδα* & *φω* appelletur, nomen sumpsit. Quod vero morbus si peracutus, qui grauissimos mouet dolores, liquet ex Paulo lib. 3. cap. 44. seu quod affectus sit intestinorum lethalem dolorem inferens; ut etiam patet apud Aetium loco citato. Pars affecta facile etiam constat ex aphor. iam citato, nempe gracilia, sublimia & tenuia esse intestina subleuata. Estq; voluulus symptoma in genere noxæ functionum naturalium ipsorum intestinorum, excreticis videlicet proprie ipsius ablatae ut lib. de diff. & 3. de causis symptomati non patet. Namque in eo nihil (ut habetur comment aph. 44. 6. & 10. 7. lib.) exit inferius, ne siquidem quispiam acerrimo utatur clystere. Atque hoc proprium est atque inseparabile huius mali signum; idque ex inflammatione sapissime. Vomitus autem, & semper adest: at ubi exitialis stercoris quoque vomitus aduenit, dolores aderunt ad præcordia, potum continere non possunt, & tormina cum doloribus in ventre sentiunt. Est autem affectus idem cum colico, scilicet dolores faciens, & quidem vehementissimos, ut 6. de loc. affect. 2. Et quamquam Galenus dicat, dolores in colo vehementiores esse ob crassum humorem, densumq; corpus, quod ideo magis tenditur, & difficulter vacuatur; non tamen sibi ipsi contrariatur, quod in se ipso consideratus dolor, qui in voluulo excitatur vehementissimus non est, ut is, qui colum cruciat. Sed pro signorum declaratione proponenda est historia Hippocratis scripta 3. epidem. 2. agro sexto. Mulieri (inquit) quæ apud Tisamenum decubebat, ileosus affectus gravis incidit. Vomebat multum, potum continere non poterat. Quasi dicat, alimentum non continebat: solis enim potibus aluntur.

Dolores circa præcordia, & infra circa ventrem tormina continua: non suebat, superuenit febris: extrema perpetuo frigida: inquietas, insomnis, urina pauca, tennes, diæctiones crasse tennes: non fuit remedio locus, perit. Hic, iuxta Galeni expositionem, signa habemus affectus & affectæ partis demonstratiua, & insuper prognostica. Ea quæ assident, demonstrant, & quæ inseparabilia sunt, ut doloris situs, quo significantur intestina gracilia: & dolor, qui tormina infra faciebat, id est, circa vmbilicum, qua parte intestinum voluitur, & ad latera sub hypochondriis. Quamuis enim in vna parte dolor primo sit, potest tamen plures efficere continuitate substantiæ. Vomitus quoque multas affectum locum designat. Nam licet in colo vomitus & in nephritis, tamen his addidit, multus: quoniam magis proprius est huic affectui: siquidem & ex vicinitate consensus est, & ex colligantia ad ventrem. Hæc igitur respiciunt partem affectam. At affectum demonstrabant quæ sequuntur: nempe incalescere, aut multum febricitare, (viroq; enim modo intelligi potest) affectum significat fuisse inflammationem intestini, quæ febrem inuehit necessario. Quod addit, extrema partes perpetuo frigida, id affectum significat inflammationis, tum moris eius, id est, malignum esse. Hoc enim est ex symptomatis, quæ malignis febribus superueniunt. ut 4. aph. 48. in febre continua, si extrema frigen, interiora uruntur, lethale. vnde mos significatur. Sed & affectus, ut in composito Galeni: quoniam hoc accidit, quando inflammatio magna partes internas oblederit: vnde ex magnitudine eius periculum coniicitur. Inquietudo, & insomnia sunt ex superuenientibus, & signum prauis moris sunt & causæ mala, quoniam vires destruant. Quod vero ait, non situnda vel situculosa erat, Galenus non exponit. Sed vel adiectum, ut rarum exemplum in hoc morbo, quoniam siis sit in hac inflammatione intestinorum; vel (ut solet) significare voluit prauitatem, quando præfente causâ sitim faciente, potum non expetunt. Cetera quæ addit de urinis, significant in crudis humoribus venarum febrem esse accensam: & ita duplicem esse affectum: quamuis enim non sit ex ipsis bonis multa salutis spes in hoc morbo, ex ipsis tamen malis multum significatur periculum. Præterea enim diæctiones propriæ sunt huius morbi symptoma. Sed num aliquid deiicitur in voluulo? nam Galenus sexto aph. 44. & 7. aph. 7. scribit in ileo nihil infra excerni. Respondetur, nihil infra excerni, est ex his quæ maligna, valde ileo superueniunt: sed necessario ob loci angustiam, & tenuem excernuntur. Fit autem loci angustia facile ob gracilitatem partis. Cum vero extremum est malum, tanta sit angustia, ut stercus vomant: nam tunc, cum intestina ad inferna trudere nequeant, ad superna conuertuntur. Fit vero & in hoc singultus, compassione ventriculi, & conuulsiones, ut 7. aphorism. 10. dicitur. Habemus & hic indicium, quod scilicet lethalis valde est morbus, & prognosticus acutissimus ut secundam aut tertiam diem non transeat. Tunc vero præcipue lethalis iudica-

Deiæctiones praua sunt proprium symptoma ileos morbi.

Ilei doloris prognosticus cum.

tur, cum stercus euomunt. Sed hæc ad prognostica pertinent, & ad sæuissimum genus ilei. Est ergo hic affectus primus, id est, inflammatio. Videtur autem & coli inflammatio etiam hæc symptomata facere posse; & ideo quoque *voluulus* dicitur, sed accidentia nō erunt adeo sæua, in vomitu præsertim, neque sunt ita mali mortis, *ut Galenus inquit*: demum erit *voluulus* per similitudinem, & non vere. De causis ilei postea agemus, cum ex aliis causis etiam secundum quosdā fieri possint; nempe ex flatibus, ex obstructione humorum, & cruditate, ut in hoc nostro ægrotante contigit: etiam ex descensu intestini; tum veneno, ut postea de causis latius dicemus, atq; exemplis eadem clariora reddemus. Sed rursus, quod ad signa attinet, Aetio quoq; visum est, quod talibus ægris dolor circumuolutus accedat, stomachi nimia humectatio, ex solutio, ructus inanes, nihil iuuantes aut leuantes, murmura intestinorum, cohibitio perfecta stercoris, & flatuum. Si vero intendatur affectio (*ut ipse inquit*) omnia sursum feruntur; ob idq; & vomitus pituitæ ac bilis accedit; frigiditas totius corporis: dolorque plurimus: etiam spirandi difficultas. Morituris autem amplius aduenit sudor frigidus, urinae difficultas, podex ita adstrictus, ut neque specilli extremum suscipere possit: aliquando & stercus vomitu eiicitur. Euenit autem id, quoniam intestina media sui complexionem, seu constrictionem (*quam latius seu transversis suis fibris perficiunt*) cum nec pondus nec acrimoniam excrementorum tolerare valent ea excernere expellereque quam longissime a se ipsis nitantur; ac potissimum id intestinum, in quo affectus hic oritur. Cum vero prohibetur sit indeorsum fieri, & per se non potens sit se hac via exonerare, propter factam in partibus inferioribus obstructionem, ideo cogitur contra naturam violenter mouere, & ad loca superiora materiam noxiam (*etiam Donato exponente*) extrudere, quoniam motus hic constringendi, complectendiq; inferne incipit. Ad quem etiam modum & acer succus, & crepitus quoque descendere prohibitus, interim ex tam violenta intestinorum constrictione ad ventrē præter naturam reuertitur, deinde ad exitum properat, quemadmodum apud Galenum constat commento præcitati aphor. 10. lib. 7. & lib. 3. de facult. naturalib. & 3. de causa sympto. Quod vero interclusa via exitus iam dictorum excrementorū hæc affectio fiat, omnium fere medicorum consensu testatur Galenus *præcitato comment. aph. 44. 6. libr.* Sed de iis postea cum de causis agemus. Nunc aliud exemplum proferamus.

OBSERVATIO XVII.

De ileo lethali.

VIr annos triginta sex natus, Delphis voluulo seu ileo grauissimo laborabat, anno 1558. mense Martio, adeo ut omnia, quæ sumeret per superiora reiiceret. Huic intestina in scrotum longo tempore collapsa erant, & stercora indurata: nec adhibitis fomentis lenientibus & ventositatem carminantibus, in locum redire intestina

potuerunt, nec stercora dura inde dimoueri clysteribus emollientibus, ita ut alius ei neq; clysteribus neq; glandibus impositis solui posset. Venter autem eidem in immensum excreuit, & sane ægrum veneno subito affectum dixisses. Et licet cataplasmata & fomenta emollientia anodyna scroto imposito aliquo modo iuuare videbantur, dolor tamen in ventre atrocissimus ægrum conficiebat: adeo ut tandē per quatuor dies excrementa per os reiecerit, neq; clysteribus neque balneis iuuantibus, cum & medicamenta per os exhibita, tum omnia reiiceret. Tandem cum se veneno infectum clamaret, exhibita est theriaca in exigua quantitate, qua melius se habere putabat, vomitu nonnihil cessante, sed die vno intermisso rursus stercora euomit: & præhabito prognostico mox obiit. Vti & Prior ille apud Monachos Egmondanus Cantharopolitanus (*qui literas egregie pingebat*) septuagenarius eodem malo interiit. Quemadmodū & puella illa, de qua in lib. de febribus egimus, quæ ex ileo ab inflammatione gracilium intestinorum orto decumbebat: cui nulla remedia nec venæ sectio, nec alia præsidia contulerunt, & ipsa, ut prædixeramus, etiam periit.

S C H O L I A.

Diximus autem ileon acutissimum malum & *Causa ilei* plerumque lethale esse, & quod potissimum causam habeat præcipuam ex inflammatione. Sed num ex aliis quoq; affectibus, ut flatibus? Galenus negare videtur, 6. de loc. 2. Quoniam exhalant (*ut etiam attestatur Iacchinus medicus doctissimus*) facile ex tenuibus intestinis spiritus flatuosi; neq; contumaciter detinentur, ob molliem, & raritatem substantiæ eorum. Fiunt igitur dolores ex flatibus in his, ut aliquando vidimus: sed colicis non assimiles, & potius ex cavitatibus & ex his, quæ in cavitare quam ex iis, quæ intra tunicas continentur. Num ex obstructione crassi & visci humoris: non est probabile hoc, inquit Galen. 6. aphorism. 44. Ratio, quoniam tranfluunt continuo & dimouentur. Nihil tamen obstat fieri in ictericis, ubi ea non expurgantur. Quare sæpius fit a facibus duris, & erit leuior, vel a tumore præter naturam, & erit grauior. Hic autem est plurimum inflammatio, cuius sequenti obseruatione exemplum ponemus. Potest tamen & durus aliquis tumor hæc facere. Verum alias quoque causas habemus a scriptoribus. Aetius de mente Archigenis, a quo & Paulus sua accepit, fieri ex obstructione humorum ait, cum cruditates multæ præcesserint, & corrupti in ventre retinentur. Cuius exemplum dedimus *obseruat. 16. huius libri.* Hoc tamen, iuxta Iacchinum, Galenus non facile admittit. Attamen cum via exitus excrementorum dictorum interclusa (*ut paulo ante diximus*) hæc affectio fiat, ex omnium medicorum consensu, & cum meatus seu viæ possint intercludi ac aboleri, propter coalitum, angustiam, obstructionem, compressionem, ac subsidentiam, propterea quæcunque causæ tales possunt in cavitatibus, seu meatibus intestinorum affectus excitare, possunt etiam

Differentia
inter coli in-
flammatio-
nem & ilei.

Signa ex Aetio.

Quæ sit
causæ, quod
stercus vo-
mitu reiicia-
tur.

iam ileum, seu voluulum gignere. Cunctæ autem reducuntur, vel ad intemperium, vel ad collectiones aliquas non naturales ipsius intestini tenuioris, vel ab ipsa, quæ in eo continentur excrementa, *eodem Galen. teste 3. de causis symptomat.* Quapropter, licet idem Galen. in comment. præcitati aphorism. inflammationem, scirrhum, vel abscessum, ac obstructionem stercoris sicci & duri, in aliquod iam dicti intestini volumen impati tantam posse facere loci angustationem, ut nihil possit ad inferiora transmitti, & per consequens ilæum moriri, fateatur; de reliquis vero causis, ut puta de humoribus crassis atq; tenacibus, dubitare videatur: tamen liberum relinquit (*ut & Donatus ab Alomari sentit*) cuiq; si libeat hanc inter causas ilei ponere. Et etiam si quid aliud dicatur præter hoc, nihil refert: non enim negauit Galenus ex aliis causis, quam ex inflammatione, vel obstructione aridi stercoris posse voluulum excitari; sed frequenter, ac sæpe numero, ac magis probabiliter, & a plurib. confirmatum esse, quod a prædictis excitetur causis, ita *ut & de loc. affect.* sic scriptum reliquerit: *Itaque non ab re visum est medicis antiquioribus, vel ab inflammatione, vel obstructione aridi stercoris huiusmodi tenuium, intestinorum affectus oriri:* de voluulo seu chordaplo verba faciens. Concludimus itaque cum Galeno (*quod & Donatus facit*) quod quamuis prædictæ duæ causæ præcipuæ sint ipsius voluuli, inflammatio inquam & obstructio sicci stercoris: tamen quæcunque alia valent adeo intercludere viam exitus, aut tantam facere loci angustationem, ut nihil possit ad inferiora transmitti, sufficientia sunt voluulum ipsum excitare, siue dicta interclusio sit per coalitum, siue per angustiam, siue per obstructionem, seu compressionem, aut subsiditiam. Et propterea ab Aetio præcitato loco nonnullæ narrantur voluuli causæ (*ut paulo ante ostendimus, & huius exemplum quoque posuimus*) ut continua ciborum corruptio, præsertim si multi, aut varii accipiantur & non assueti, maximeque ex pinguib. carnibus; similiter & ex plagis quibusdam, frigore vehementi, & acervata frigida potione, maxime si ab exsudantibus accipiantur, affectus hic excitari potest. Item contingit his, quibus intestinum in scrotum vna cum stercore delapsum est, indeq; violentur retrusum ex eoq; inflammatum existit: ut evenit his duob. ægris, de quibus in superiori Obseruatione diximus. Et sic causa esse potest descensus intestini in scrotum, qui aliquando a dolore colico orrum habuit, scilicet ruptione, vel laxatione membranarum, quod intestinum illud non repositum inflammatur, & pereunt ileos; ut istis duobus evenit & seni presbytero, *ut narrat Iacchin.* Alii cum temere fasciis adstrinxissent male repositum intestinū, inflammationem fecerunt: unde ileos præuenit occlusa stercorum via. Vidi, inquit idem Iacchin. aliquando euenisse ex lapsu ad inguen intestini: erat autem manifestus extra tumor. Sed hic cum ad stercoris vomitum peruenisset curatus tamen est præter spem omnium, reposito intestino. Ita & nos

mulierem ab exomphalo in idem malū prolābentem & stercus euomentē curauimus: cuius historiam postea ponemus. Fit interdum eodem Aetio teste, ob veneni potionem: quod etiam contigisse scribit Iacchinus puellæ, quā dixerant sponte cepisse Aliam quoq; vidit Luca intrahoras paucas obiisse. Frigida erat, sine pulsu; stercus tamen non euomuit: hoc enim fit, si aliquandiu perdurent. Sunt autem venena, buprestis, lithargyrium. Alia causa, potus frigidus in calido post exercitia: ut euenit ægrotanti de quo *ubi diximus*, vidit & Iacchinus talē semel diei spatium obiisse. Imaginantur vulgares, causam esse ex malo intestino: ū situ, a flatibus causato: unde cauitas obstruitur, & exitus prorsus impeditur. Plura de causis vide apud Arculanum. Singulæ autem prædictæ causæ facile dignosci poterunt: externæ quidem ex ægroti seu astantium loquela; internæ autē ex teipso propriis signis, ac eorum, quæ præcesserūt, perperensione, & reliquis, quæ subsequuntur. Sic enim inflammationē ab obstructione aridi stercoris proprie fecerunt, aut si propter eius delapsum in scrotum ortus sit voluulus vel etiam quisq; a aliis redundās succus, potissimum frigidus, crassus & lentus: licet nō admodum probabile sit, *ut diximus ex sententia Galeni*, ex prædictis succis adeo fieri prædicti intestini coangustationem ut nihil valeat ad inferiora transmitti. Quod si fiat a bile multa asseruata in gracilibus intestinis, ut aliquando fieri solet, & sepius quam ex crassis succis tunc signa huius succi prædominantis apparebūt: & ubi a cibo corrupto & cruditate, crapulæ & alia præcesserunt, & vomitus humorē crudum indicat. Etiam si retinentur excrementa propter obstructionem, vel ob tumorem inflammationis, dolorem vehementissimum hæc omnia excitāt, tum ob materiæ acrimoniam, tum ob partis sensum: magis enim sentiunt quam crassa intestina. Et licet intestinis ob peritonæi, rupturam aut propter relaxationē cū recrementis plena sint, in scrotum deuolutis ileon intestinum non deuoluatur: tamen a similitudine symptomatis dicitur ileos, cum & vomitus stercorosa adsit, & materia dura in scrotum deuoluta, & inflammata, quæ nota propria est ileo. Vnde etiam si prius sit colicus dolor, ex eadem causa, malo progressu fit ileos. Et ideo signa prælagientia colicum dolorem eadem possunt esse signa passionis iliacæ prælagientia, cum & eadem causæ vehementiores ileon producant. Et sic qui enteroccele, bubonoccele, exomphalo, vel ruptura laborant, nisi recte custodiantur ab aere frigido vel vento, facile ileon grauissimum incurrunt, & quibus naturaliter tenuia intestina frigida sunt, & qui fungos comedunt, vel aqua frigida in potu vtuntur, vel cibis admodum stipticis tardæ concoctionis, & non solum macilentis; sed & crassis, potissimum ab exercitio vehementiori refrigerati, quemadmodum euenit Bartholdo Simoni cerusario Alemariano, cognato nostro, viro admodū crasso; qui ex leuissima causa modo in colicum, modo in iliacum dolorem incidebat: sed a me statim in principio adhibitis bonis remediis curatus fuit.

Signa causarum.

Signa prælagientia.

Quod ad prognostica signa attinet, decretum reliquit Hippocrates, quod ab ileo vomitus, singultus, desipientia vel conuulsio malum sit, *aphor. 10. lib. 7.* Nam vomitus (*inquit Galenus in eodem loco*) non semper in ileis adest, sed quando exitiales sunt: & si vehementius distorqueantur, *ut ipse ait*, stercus eis superiora petit, atque singultuunt: quidam vero desipiunt & conuellantur, compatiens nervorum principio, stomachi passione, *ut ipse refert.* Si autem vomitus stercoris contingat, exitialis erit affectus, a quo vix unquam quis potuit sanus euadere: *ut eodem comment. aphor. 44. & 6. de loc. affect. liquet.* Quod vero hic voluulus acutissimum sit malum, ac quod periculosus sit omnis voluulus, *idem Galen. testatur de morb. vulg.* rationem superius explicauimus. De quo & Paulus sic scriptum reliquit: *Qui hoc malo sunt oppressi, miserabili tandem morte pereunt, stercus per os reddentes.* Familiaris autem hæc affectio existit ætati pueruli, *ut Aetius inquit*, euadunt tamen beneficio humiditatis. Senibus non valde familiaris est: si tamen ipsi in hanc affectionem incidant, fere nunquam conualescunt. Iliacorum vero passio acuta est, & sub angusto tempore periculosa, *Theodoro Prisciano auctore cap. 9. lib. 2. ad Timotheum.* Arabes & eorum affectæ hæc addunt, quod magna ex parte occidat: Vidit & Arculanus in 5. hominem occidisse; quod & nos vidimus in illo molitore, qui ex enterocoele in ileo lapsus est; & sceditate excrementorum ex ore tandem effluentem miserabili morte interiit. Tamen alii addunt *iliacam ventosam & pruriosam aluiam fuisse febre superueniente, minusque periculosam esse ex flatibus, cum dolor de loco in locum permutetur, & facilius resolvatur, quam cum sit ex humoribus aut apostemate seu inflammatione.* Bonitas quoque urinae non adfert fiduciam sanitatis: quid igitur de mala urina iudicandum? Bonum quidem autumant, *ut Gordonius*, si symptomata minuantur, & medicamenta sumpta per os, descendant, & per inferius operentur. Iuniores autem infra 40. annum, non ita cito ab ileo succumbunt, ut senes in prima vel secunda senectute: id quidem ex robore virtutis contingit, hoc vero ex imbecillitate. Sic & in ileo ventositas per crepitum inferius exiens si multum foetet, malum est; sed eo deterior ructus foetidus: omnium vero pessimum excrementum vomitu eiectionum, & sudor exiens foetorem stercoris olens, aut anhelitus instar recrementorum foetens. Iliacus dolor quandoque urinae profluvio finitur: sic dicente Hippocr. 7. *aph. 44.* Quibuscunque ex stranguria ileos innascitur, hi in sex diebus pereunt: si non febre superueniente urina multa fluxerit. Galenus fateatur tamen se ignorare, quæ in hoc aphorismo. Hippocrates dixerit, & putat ab alio esse interpositum, & quamvis legitimus esset, nihil habet, quod dicat. Multitudinem igitur humorum crudorum, una cum multa frigiditate, melius est talium in ileo casuum, qui dicti sunt, causam arbitrari. Sic enim tantummodo febris esset medicina dispositionis, & retentorum urinarum euacuatio: sic enim consuevere crassæ & plurimæ,

atque omnes simul ipsi concoctis euacuari. Vide eius commentum in hunc aphorismum, multa vitia adfert, ex quibus causis ileos fiat.

OBSERVATIO XVIII.

De ileo intolerabili, ab inflammatione tenuioris intestini orto.

Vir annos triginta excedens, cum valido exercitio usus esset, & post illud refrigeraretur, in dolorem pene intolerabilem incidit circa umbilicum, ructus inanes illi aderant, qui nullo modo dolorem leuabant: murmura quoque intestinorum oborta. Quibus symptomatis & stercoris cohibitio ac fluxum accessit. Hæc cum validissime eundem torquerent, tabulam ligneam mulierculorum consilio (quo uti consueverant in omnibus doloribus ventris) quam calidissime loco dolenti apposuit: unde dolor auctus est, materia magis attracta & minime resoluta: & tandem dolore semper magis crescente, etiam in febrem satis continuam incidit. Ad hunc tandem accitus, cum nihil contineret, & omnia euomeret & valde biliosa, & supra modum sitiret, & tumor adisset satis eminens in tenui intestinorum parte, tãquam intestinum ad chordæ similitudinem conuolutum videretur, eundem ileo ex inflammatione laborare certis signis conieci; quod & febris continua, tum reliqua supradicta symptomata indicabant. Itaque tabula illa lignea calida a ventre amota, & cum aluum intra 24. horas non deposuisset, & omnia euomeret, statim enema sequens, ut immitteretur mandavi, quod & aluum emolliret, & aliquo modo ob inflammationem refrigeraret. ℞. folior. viol. malua, althææ, ana m. j. ℞. hordei mundatij sem. malua, phylli ana ℥j. pran. damasc. dulc. an. viij. fiat decoctio in iure pulli pinguis ut magis emolliret stercora) pro ℞. j. ℞. adde cass. recet. tracta, za chari rub. an. ℥j. mellis viol ℥j. i. uicellum unius oui, salis communis ℥j. m. sc. quo clystere semel aluum deposuit, & stercora dura reiecit. Sed cum ab iuncto clystere nondum se daretur dolor, sanguinem detrahare iubeo, ex vena interna cubiti dextri, nam ad partem dextram dolor paululum inclinabat. Extractæ sunt sanguinis circiter uncia septem: & a venæ sectione febris mitior facta est, & dolor minus vehemens ægrum afficiebat. Ventrem inunxi omnium primo ob inflammationem oleo ros. & amygd. dulc. simul mixtis. Die subsequenti dedi cassiæ recens tractæ ℥j. cum ℥iij. decoct. communis, addendo syrup. viol. ex infus. ros. an. ℥j. ℞. m. sc. & retinuit, ac aluum deposuit. Postea & oleis dictis adieci chamomillæ, id enim in augmento convenit; uti etiam in statu oleo anethino, amygd. dulc. & chamomelino inunximus. Postea cum rursus aluum non satis deponeret, dedimus ℥j. manatis, cum cassiæ extracta, diacatholici, an. ℥iij. cum ℥iij. serilactis, & habuit v. secessus. Deinde admoto hoc emplastro ab omni dolore curatus fuit. ℞. rad. althææ ℥ij. folior. malua m. j. florum chamomill. meliloti, an. m. j. coquantur in aqua communi ad mollitudinem, adiectis farinis sem. lini, fœnugraci, an. ℥j. ℞. olei chamomill. amygdal. dulc.

dulc. q. s. fiat cataplasma. At Comes Philippus de Alta flamma, chiliarcha, Geertrudebergis ex gravissimo ileo decumbens, cum pilulas nescio quas accepisset a medico quodam, dolore intolerabili cruciatur vomitu enormi, aluo plane restricta. Hic post clysterem iniectum venæ sectione per me, duobus aliis præsentibus medicis, curatus fuit. Sed dolore sæpe redeunte septem clysteribus vti necessum fuit, præter medicamenta commoda per os exhibita, cuius mentionem fecimus lib. 7. obseruat. Scholio Obser. 4. de symptomatis febrium: qui magno cum nostro honore curatus fuit, cum Illustrissimus Dominus Princeps, piæ memoriæ, medicum Antwerpianum mittere volebat: sed scriptis per nos literis, quod melius haberet, missus non est. Aderat nobis tunc in curatione Franciscus Marcellus medicus Dor-dracenus amicus noster (qui post aliquot annos & ipse tabe obiit) & alius quidam ex Neomago ad Comitem quoque accitus.

SCHOLIA.

A Vicenna & qui eum sequuntur dicunt, iliaca in causis, signis & curatione cum colica communicare. Vnde & Valescus *forores* nominat, cum in vtrisque minus excrementa exeant. Quare & Rhases sub vno capite de vtrisque scripsit: vti & Gradus a alii multi. Differunt tamen in causis, signis atque iuuamentis remediorum nonnihil, *vt annotauit etiam Arculanus*: qui frequentius iliacum fieri vult a causis primitiuis & externis, vt ex aquæ potu vel aliter ob ventriculi vicinitatem, & ob aerem pestilentem, ob cordis vicinitatem, vel a veneno, tam ob ventriculi, quam cordis propinquitatem; vel ob inflammationem, tam ob hepatis vicinitatem, quam multitudinem venarum melsaraicarum in gracilia intestina sese insinuantium. Contingit & crebrius ob vehementiam virtutis retentiæ, cum gracilia sunt magis ordinata ad retentionem: crassa vero ad expulsionem. Colica autem frequentius contingit a causa corporea, ventositate, phlegmate, stercore sicco, vermibus, & similibus, cum sint frigidiora ad horum expulsionem ordinata intestina, & sic accidit in iis frequenter ob defectum expulsiuæ. Dolor quoque in ileo est magis pungens, ob bilem, & magis intensus: quamuis in vtroque intestino quælibet species doloris accidere possit. Estque dolor in ileo supra vmbilicum, & in hypochondriis magis: colicus autem dolor infra vmbilicum, magisque extendens, grauans, perforans, et si aliquando pungens; idque ob vermes, & licet remissior sit, magis perdurat, ob longam materiæ retentionem ex ipsorum spissitudine & carnositate: præterea circa pectinem magis hæret dolor, minusque nocumentum communicat partibus superioribus nobilibus. Differunt quoque in exeuntibus. In ileo per anum fere nihil egreditur, & per vomitum quiuis humor reicitur; imo aliquando stercus cum vermibus, quod in vetula vidimus, a me curata, *vt postea dicemus*, & est malum vt plurimum lethale. Et est vrina magis tincta, ob inflammationem vel bilis retentionem, quæ

ad gracilia intestina dimitti consueuerat: sudor quoque maior & frigidior virtutem dissoluens. In colico enemate & balanis facilius excernitur pituita viscida, stercus, squibala, pituita inuoluta, ventositas crassa sonat, & vermes: si vrina in eo tingatur, hoc fit ob dolorem inflammantem, per consensum renum, non autem ob bilis regurgitationem. Differunt quoque in remediorum iuuamento. Iliaci magis per superius exhibita iuuantur: colici per inferiora clysteribus iniectis & balanis. Quinto differentiâ sumit idem Arculanus a symptomatis & accidentibus: Nam casus virtutis, mentis alienatio, spasmus, instantia vigiliarum, cordis palpitatio seu tremor, syncope, extremorum frigiditas, singultus & mors magis in ileo; & inflatio oculi, & multo difficilior colico. In curatione, iliaca maiorem festinationem curandi exigit, quam colica, eo quod acutior morbus est & inducias non ferat: Ebibita quoque magis iuuant, cum enemata & glandes ad gracilia intestina non ascendant. Licet tamen vtraque in hac etiam sint necessaria; cum & Arculanus recte incipiat a clysteribus & balanis, vt tandem ebibita melius descendant. Valescus duo simul administrat, prius enema, & statim quæ per superius laxant (*id nos in ileo, quo Comes ab Alta flamma laborabat aliquando fecimus*) idque si clyster non operetur. Tamen præstat in principio prius clystere vti: deinde altero die purgatione: quod nos initio in Comite fecimus. Postea, cum plures clysteres immissi essent, & postea venæ sectio adhibita, postremo semel iniecto clystere, & superius vna exhibito medicamento, non tamen forti, plurimum, adiutus fuit, & postea curatus. Clysteres autem hic debent esse in maiori quantitate, vt altius ascendant, & Rondeletius etiâ primo acres iniici iubet, quibus repurgentur intestina. *Nec metuenda*, inquit, *est acrimonia, quoniam malum est in superioribus intestinis, procul a sede.* Sed idem dicit, *Si ileos ab inflammatione, minus conueniunt medicamenta laxantia, sed clysteres fortiores postquam desistit defluxio, vt id, quod est impactum parti per inferiora trahatur.* A principio non sunt dandi acres, neque trahentes, ne materia ad partem affectam trahatur, *vt Galenus docuit 13. meth. med.* In aliis causis, quæ sunt citra inflammationem, licet etiam fortioribus vti iniectionibus. Nam Galen. tantum prohibet in inflammatione & affectibus, qui fiunt per defluxionem. Præterea in ileo magis necessaria est venæ sectio, quam in colico dolore, modo in eodem non sit inflammatio aut apostema. In ileo magis conducit venæ sectio, propter fortem dolorem & multitudinem venarum melsaraicarum venientium ad gracilia intestina; quæ etiam ideo magis apta inflammari ac apostemari (*vt ita dicam*) quam crassa. Similiter facta oppilatione in tenuibus, humores quoque consueti euacuari magis sparguntur per corpus. Istis præsuppositis, ad curationem magis particularem ipsius ilei deueniemus. Quod si malum ab inflammatione (*vt hic erat*) ortu sit, aliis consentientibus, a venæ sectione exordienda erit curatio, vt omnes consen-

In remediorum iuuamento.

In curatione.

Colica & iliaca quomodo in causis, signis & curatione inter se communicant, & in quibus differant.

In causis.

In dolore.

In exeuntibus.

Curatio sive inflammationis fiat.

Vena sectio.

tiunt, & ratio dicat. Incidatur autem interna cubiti vena, eadem victus ratione instituta, ac reliquis medicamentis adhibitis, quæ in cura coli doloris ex inflammatione præcipimus. Id tamen seruabimus tam in ileo orto ab inflammatione, quam ex quavis alia causa, quod medicamenta, quæ per os voranda præbentur, hic magis competunt, quàm in coli dolore (vt modo diximus) sumpta a posito indicatione, prout capite de dysenteria recensebimus. Curatio itaque, si ex inflammatione fiat, post missum sanguinem per eadem remedia administrabitur, quæ in colicis conducunt: sed ebibitis iuuantur citius iliosi. Sic etiam Rondeletius: *Si ileos fiat ab inflammatione intestinorum gracilium, sanguis est mittendus e brachio*: verum quod in secunda dictatione dixit, *vsque ad deliquium animi*, id tamen non sine cautione aut nullomodo fieri debet. Interea pars inferior exoneranda balano, vel clysteri detergente & emolliente, qualis apud eundem est descriptus capite de inflammatione coli. A missione sanguinis imperanda, eodem auctore, inedia ad 24. horas, quo ad certum sit, detracto sanguine, inflammationis magnitudinem fuisse remissam. Quod si necessitas vrgeat, cibus dandus est, isque medicamentosus, vt *iusculum galli veteris: cuius venter infarctus ficibus sit, passulis, & sem. frigidis, ac butyro. Passula & carica dolores inflammationum mulcent*: butyrum lenit & aluum relaxat. Si aluus durior est, vt hic erat, clystere emollienda. Sic & a venæ sectione, vno vel altero leniente clystere adhibito (quod & Donatus admonet) prout de colico dolore diximus, confestim medicamentum leniendo purgans exhiberi debet, *ceu est manna, castia fistula, saccharum violar. seu syrup. ex pluribus infus. violar. & interdum cum aliquo prædictorum ʒ ss. vel ʒ vij. diacatholici*, adiacere possumus. Sæpe etenim id auxilii latis est; tumore præsertim in vmbilico existente. Ego tamen potius vtor *syr. ex infus. ros.* quam viol. si vomitus adsit, qui plerumque adesse solet, cum syrupus viol. nauseam faciat, & stomachum relaxet, vnde vomitus magis irritatur. Vbi autem vomitus non adsit, in principio violaceo recte vtemur. Nam & ipse Rondeletius a missione sanguinis etiam vomitum prouocari vult sola aqua tepida, vel oleo viol. adiecto: quod idem efficit, & præterea calorem temperat. Vomitu idcirco purgantur superiora, ait, vt ad partem inflammata non defluant excrementa. Attamen cum tales plerisque vomant, tunc ab iis omnino abstinendum censeo. Et sic vomitus si a natura non adsit, optimum iudicat eum leuiter prouocare aquæ tepidæ potione, cum oleo violaceo. Nam pars media per inferiorem, & superiorem partem expurgari potest. Interim & inunctiones faciendæ sunt supra partem dolentem ex relaxantibus & emollientibus. vt *℥. olei amygd. dul. liliorum, an. ʒ. ss. butyri recentis, axung. gallina, vel anatis, ana ʒ ij. mucilaginis sem. psyllii ʒ iij. cera parum, fiat linimentum*. Vomitus non est compescenda, donec tota cacochymia fuerit euacuata. Fetus ex decoct. herbarum emollientium faciendi; & præcipue quos scripsimus facere ad colicum

Purgatio.

Vomitum.

Topica.

dolorem ex inflammatione; quo loco etiam satis de topicis remediis diximus. Etiam eodem modo iliacus biliosus curatur, facta purgatione cum seris decocto & cassia. Reliqua vide apud Arculanum, *de curatione colica ex apostemate calido*. Quantum ad topica, nos in principio recte vsi sumus hic inunctione *olei viol. & ros.* in augmento adiacientes, *oleum chamamelinum*; in statu vtentes *oleo anethino, amygdal. dulc. & chamamelino* simul mixtis. Quibus licet Leonellus vtatur in colico ab apostemate calido; tamen iis etiam in dolore iliaco ex eadem causa, cum in inflammatione vti possumus. Verum cum hic adesset retentio stercoris duri, omnium primo clysteri emollienti vsi sumus. Et ideo si ileos fiat ex stercore duro, similiter mollire oportet, & oleum propinare. Etenim si ex siccorum stercorum multitudine, facta obstructione ileos excitetur, quæ stercus ipsum emolliunt atque humectant, & per aluum subducunt tribuenda sunt: veluti est ius pingue gallinarum, seu pullorum, aut phasianorum, aut in eorundem iure decocta ptisana, vel ius galli antiqui, vel oletum amygdal. dulc. Pariter conueniunt lenientes clysteres, etiam post prædictorum assumptionem. vt: *℥. folior. mal. viol. mercurial. althæa, an. m. j. florum chamameli, fenugraci, ana m. ss. salis communis parum, bulliant in aliquo prædictorum iurium: cuius decocti per colum transfusi assumpta sufficiente quantitate, adicias olei communis aut amygdal. dulc. aut chamamel. aut anetheni ʒ iij. mellis ros. ʒ ij. fiat clyster, interim poteris butyri recentis, aut adipis anseris ʒ ss. addere*. Vbi prædicta non suffecerint, audacter aliquod medicamentum purgans, eorum, quod meminimus, præbeto. Nam obstructio, quæ fit a stercore duro, quod intersepit intestinum, (vt Galen. testis est lib. art. med.) primum quidem habebit duritiæ remedium ex humidis, pinguibusque clysteribus, deinde ex acribus euacuationem exposcet: in hunc etiam vltim, (vt pote vtrumque perficiens) confert ius galli a Mesue descriptum. Extrinsecus insuper irrigationes, fomenta ac cataplasmata, quæ emolliendi vim habeant, ac leniendi, applicentur; quorum copiam inter colicorum remedia reperies. Commodum est etiam in oleum calidum descendere, aut in balneum desidere, aqua & oleo refertum. In aqua vero prius decoqui possunt malua, aut althæa. Sic etiam vbi adsit inflammatio, nihilominus omnia remedia tentanda sunt, licet hic affectus magna ex parte lethalis sit; vt balnea, quæ ex anodynis & relaxantibus fiunt: & non in principio, sed post euacuationes, & postquam defluxio constitit, aut partes inferiores & superiores euacuatae sunt: alioqui enim dolorem, & humorem ad corporis habitum trahunt. Ita & post clysteres & euacuationes æger (inquit Rondeletius) balneo emolliente & refrigerante, vt ex malua, althæa, violacea & similibus, vel anodynis. Non probatur eorum consilium, qui ex alto tepidam ventri affundunt. Nam etsi eiusmodi embrocationes in doloribus capitis laudat Galenus, non tamen in ceteris partibus, & præsertim ventre conueniunt.

Curatio ilei ex
stercore duro,
vel si fiat ex
stercorum mul-
titudine.

Quando anody-
na & balnea
conueniant.

Tepi-

Tepida enim facile refrigerantur, sicque calorem cum sanguine & spiritu intropellunt, unde augeatur inflammatio. Satiùs vero fuerit, si propter balneum aliud remedium placeat, illinere ventrem iis, quæ modice calefaciunt & laxant, *vt oleo chamamel. viol. mucilag. sem. lini & similibus.* Reliqua de colicis doloribus inuenies. Sed hoc, quod fere omisimus, post clysteres, balanos, & venæ sectionem in inflammatione ilei quidam & cucurbitulas in inguinibus, vel circa inguina apponunt, etiam cum scarificatione, *vt & Rondeletius iubet.* Alii si ex stercore duro fiat, oleum recens propinant, & prohibent ne vomant, cum cucurbitula, tum gratis odoribus, & frigida inspersione. Si vero ex flatibus a frigido potu fiat, secundum Galenum libro de facile parabilibus, oleum anethinum bibat; mox mica panis calida accepta: præstat tunc uti decocto flor. chamomillæ, & iis, quæ de colica ventosa dicta sunt. Si sint humores, clysteribus utendum, maxime iis, qui vehementer attrahunt in principio ob distantiam; & demum humores purgandi prout biliosi vel pituitosi fuerint. Erit si contingat ab humorib. crassis ac tenacibus, simili modo curari debet, quo & curatur coli dolor ex eadem causa. Si ex cruditate ciborum, seu corruptione, & adhuc crudus ventri insideat, confestim æger cogendus est, ut vomat: si nihil horum in ventre contineatur, clysteres adhibendi, & per superius medicamenta putgantia, *vt obseruatione sequenti clarius patebit.*

OBSERVATIO XIX.

De ileo seu voluulo ex ciborum corruptione.

Matrona nobilis, verula, cum vna cum amicis cœnobium accessisset, & diuersis ferculis vasa esset, & cerasis, & lacte, & crema, & vino rubro & albo, & fragis humi nascentibus, in voluulum ex cruditate seu ex ciborum corruptione incidit. Ad quam accitus, cum adhuc crudus seu corruptus cibus ventri insidere mihi videretur, statim eam cogebam ut vomeret, sumta aqua tepida cum syrupo acetoso, vel huic simili. Verum, cum pauca euomeret, & dolor in ventre remaneret, clysterem adhiberi iussi, cum nec illo die nec præcedente aluum deposuisset: & post reiectum clysterem, cum pauca tantum, eaque dura excreuisset, dedi medicamentum purgans, quod sequitur. *℞. diacatholici, hierapicra. diaphœnici, an. ʒ ij. aqua florum chamomilla ʒ iij.* quo medicamento cum aluum probe reddidisset, ventre quoque inuncto oleo chamamelino & anethino, præter spem multorum curata est.

SCHOLIA.

Si ex cruditate seu ciborum corruptione voluulus fuerit excitatus, vomitus statim imperandus, præsertim si cibus corruptus ventri adhuc insidere videatur, idque aqua mulsa tepida. Verum si nihil ciborum crudorum in ventre contineatur, omni conatu (*vt inquit Aetius*) emittendum est, ut tum flatibus, tum stercora infra trahantur: idque per glandes, illitionesque & clysteres, ut i-

pse refert: atque magna diligentia in singulis adhibita purgans medicamentum, ubi prædicta non suffecerint, exhibeatur, ex hiera videlicet, & confectione de dactylis aut diacath. cum aliquo prædictorum lenientium medicamentorum composito. Est etiam vsitatum in hoc negotio anethi decoctum potum, *ex Pauli & Aetij auctoritate.* A potu autem panem in aquam feruentem conice, eiusque frustra calida confestim edenda præbe; *vt iidem inquirunt;* idque præsertim, si ab inflammatione voluulus ortus non fuerit. Item si anethum ipsum in aqua & oleo decoquatur, atque ita bibatur, deinde frustra panis ex aqua feruenti præbeatur, mirum in modum ægri iuuantur, *ex Oribasi sententia.* Commodum est etiam maluæ semen tritum ac potui inspersum, *eodem Aetio teste,* & chamomæli decoctum, *ex Galeno 3. de simplic. medic. & iuxta Aetium, vt prius dictum est.* Fouendus insuper & podex erit per spongas calidas, indifferenter voluulis ex quauis causa ortis, nec solum eo tempore, quo glandes fuerint appositæ, *vt Aetius inquit,* sed in reliquis quoque temporibus, ut ex eis, qui ad imum intestinū positus est musculus, relaxetur, nec ab ipso cōstrictionis motus incipiat. Ex foliis itaque maluarum, althææ, chamæmeli, ac sem. lini, decoctū in aqua & oleo paretur, ac per spongas calidum applicetur sæpius. Vel in eodem decocto insideat æger. Doloribus vero adhuc perseverantibus, & maxime quibus infusi clysteres non infra rursus prodeunt, etiam ea, quæ dolorem leuant exhibenda sunt; item conuenientes antidoti ante somnum, *ex decreto Aetij,* ceu ex viperis theriaca existit Andromachi, post eam vero, quæ methridat. nomen habet. Et ita quoque si dolor a materia cruda fiat, erit post clysteres & medicamenta per os exhibita, iidem vnctionibus & cataplasmatibus, aliisque topicis concoquenda, *vt in colico dolore dictum est.* Diligentissime obseruandum, ut & alimenta & medicamenta in forma liquida sint; melius enim alimenta descendunt, & melius conficiuntur; ita & medicamenta melius quoque descendunt. Quod si obstructio fuerit soluta, non erit inutile (*vt Rondeletius sentit*) dare aliquas pilulas, quæ ventriculum & intestina detergant, citra magnam calfactionem, maxime cum a putredine & cruditate sit. Non desunt, qui pilulas Iliacas dictas, quæ a Rhasi lib. ix. ad Almanzorem describuntur, commendant, ut Dodonæus amicus noster, in suis Obseruationibus, cap. 36. de Ileio sic scribens: *Pharmacopœus maximo Ileio, tertio quoque die, dolore torquebatur, quo fauente febris aderat satis vehemens, & umbilicus vna cum circumuicinis partibus in tumorem attollebatur. Iniecto autem in ipsis doloribus enemate satū acuto, expurgatisque vitiosis, admodum viscidis, crassis, fetidisque facibus, dolor conquieuit, febrisque cessauit. Quod cum sæpius contingeret, & nec desinerent huiusmodi tertiana exacerbationes: nec enemata, nisi cum adhiberentur, prodesse, de aliis remediis deliberatum. Tentata quadam sunt: sed cum nec his dolores integre sedarentur, pilula Iliaca a Rhasi descripta ad Almanzorem occurrerunt. Harum scriptulus in die quietis exhibitus, ad-*

Quibus podex fouendus.

Historia Remberti Dodonæi, de ilei dolore.

modum prauos, & vehementer foetentes humores eduxit: quibus expurgatis, ilei dolor multum sopitus: cum autem in vniuersum non cessaret, eadem paulo maiore dosi exhibitæ: quibus reliquis humoribus eductis, ilei dolor omnino conquieuit. De istis pilulis (inquit idem) in cap. de colocynthide scripsimus in nostris de stirpibus historiis. Earundem vero singularem facultatem sæpius, in ructu autem molestissimo valde mirificam compertam habemus. Hispano cuidam militi molestus ac difficilis erat assiduus ructus, vt in extremis versari videretur, cum ad eum vocarer. Vsus fuerat admodum multis remediis: sed frustra omnibus: nec quicquam per hac profecerat, nisi quod vires eius insigniter forent deiectæ. Huic initio exhibuimus pilulam vnā decem granorum pondere, per quam vitiosis humoribus nonnullis expurgatis, melius habere videbatur: postea paucis diebus interpositis data grana quindecim: tertio vero scriptulus vnus: quo assumpto, & expurgatione prauorum humorum succedente, qui antea lecto affixus veluti moriturus iacuerat, surrexit, & quocunque libuit, ambulauit, & cibum potumque cum appetentia assumpsit.

OBSERVATIO XX.

De ileo ex bubonocoele orto, cum vomitu enormi.

Vxor Nicolai Adriani ceruisiarii, pro cuius foribus Delphis Petafo seu Perna intersignium erat, mulier si quæ altera pulcherrima, post partum alias longo tempore præcedente in bubonocoelem seu ramicem inguinis inciderat, vnde coacta fuit ligamentis idoneis intestina in locum suum reducta retinere. At cum hæc aliquando fluxu diuturno ventris laborasset, ex dolore & torminibus, tum etiam ex flatu præcipue, quem inter alium noctu sæpius excernendum exceperat, tandem & intestinis a loco suo remotis, & in inguina prolapsis, cum quadam duritie renitente, vt in locum redire intestina non possent: tandem in dolorem iliacum intolerabilem incidit, cum vomitu enormi & continuo, ac cruciatu vehementiore totius ventris, maxime circa, vmbilicum vt ab astantibus animam agere existimaretur. At hæc maxime empiricis & medicastris mulierculis dedita, misera mulier, monacham quandam medicam, apud mulieres, etiam dirissimas quasque Delphenses magni nominis, ad se vocat. Varia dum attentantur remedia, tum medicamenta, quæ omnia per os reiciebat, etiā balani impositi sunt per anum, quibus licet aluus irritata fuerit, tamen nihil quicquam his profecerat: adeo vt coacta fuerit tandem me vocare. Igitur 26. die Aprilis, anno 1560. ad eam ingressus, & huius symptomatis, & morbi causa probe perspecta, facile intellexi eorum intestinum refrigeratum, ac spiritu flatuoso repletum, tum stercore induratum, atque extra rupturam propulsum, quo minus in locum redire posset: vnde & tandem gracilibus intestinis ileo affectis & coangustatis, stomachum comprimantibus, vt nihil retinere posset, omnia vomitu reiciebat: & inde affectum tandem ileosum ortum; quod dolor circa vmbilicum quoque indicabat. Cum autem causam huius affectus i-

leosum ex inguinis ruptura esse cognoscerem, omnibus modis studui eandem remouere, & in locum cõsuetum intestinum prolapsum reducere, quod cum manu fieri non posset, id fomentis linimentisque, quæ vim emolliendi, inflationem tollendi, atque dolorem leuandi haberent, perficere tentauim. Sed quia aluum non probe reddebat, libenter enema inieci, verum cum id non admitteret, glande satis oblonga & acuta aluum excreuit. Mox tentauim vt intestinum in locum suum deducerem, prius inungendo locum affectum tum ventrem oleo chamæmelino, anethino & liliaceo simul mixtis; inunximus & locum rupturæ, cum non adesset magna inflammatio, nec febris, sed exigua ob dolorem vehementiorem. Quare & hoc fotu emolliente & flatum dissipante bubonocoelem seu locum rupturæ continuo foueri mandauimus, in hunc modum, vt intestina reducerentur. ℞. folior. malua, florum chamomilla, anethi, sem. lini, ana m. j. coquantur in lacte bubalo, semine cymini in exigua quantitate adiecto. Fiebat autem fotus cum spongiis, vt assolet. Quibus præfidiis ilico dolor sedatus est; & intestinis in locum suum manu facillime reductis, subligaculisque debite iniectis, (ne rursus extra peritoneum intestina reuoluerentur) sanitati restituta fuit. Sed quia ructus & ventositates experiebatur, floribus chamomillæ & fursure ligatis in nodulo raro, & decoctis in ceruisia communi, atque expressis, cyatho vno ebibito maximam copiam pituitæ euomuit, simul multis ructibus ac ventositatibus per os emissis, ex quibus magnum iuuamentum sentiebat. Secundum vero cyathum retinuit, ructusque multos emisit sine vomitu: intestinisque ex linimento & fotu, manu deinde leuiter in locum reductis, præter mentem multorum conualuit, atque per totam sequentem noctem dormiuit, cum longo tempore antea ob cruciatum vehementiorem dormire non potuerat. Et ita magno cum meo honore a dolore liberata, sana facta est.

S C H O L I A.

Sicuti colicus dolor ex enterocoele (cuius exemplum posuimus obseruat. 14. huius libri) fieri potest, ita & iliacus dolor, si diutius duret: atque eodem fere modo curatur. Sic etiam aliæ species ramicis, vt bubonocoele, & epiplocele, id est, inguinis ruptura, & omenti prolapsus, ita & exomphalon (vt postea exemplo ostendemus) in ileon conuertri poterunt. Quod si ex intestini in scrotum prolapsu voluulus contingat, eodem modo curatur, vt de enterocoele dictum est: Confestim enim tentandum est, vt decubitu sursum (teste Aetio & Paulo) vergente adornato, delapsum intestinum ad inguinum partes retrudatur, atque post leniter citra violentiam, ac compressionem ligamento adhibito contineatur. Quod si stercus aliquod durum vel ventositas adhæreat, aluus clysteri emollienda; & si ventositas adsit, quædam carminantia ventositatem (vt in Scholio obser. 14. huius libri præcedentis diximus) addenda. Eodem modo alia

aliæ ramices seu herniæ sunt tractandæ, vt latius suo loco dicturi sumus. Enterocoele paulo difficilius reducitur: primum tamen tentandum, vt decubitu sursum versus vergente adornato, cruribus elatis, æger collocetur. Bubonecele facilius reducitur (*si ex inguine non valde propendeat, vt huic mulieri euenit*) quam enterocoele; epiplocele difficilius: grauissimum vero malum est, exomphalum si valde excedat, & ileum inferat, vt paulo post duobus exemplis declarabimus. Si vna ventositas adest, malum auget, stercore etiam indurato: id facile constat ex historia Romberti Dodonæi, viri doctissimi & nostri familiaris, de tonsore, qui ex colo flatu distento cum multorum empiricorum medicorum opera vsus, vehementia medicamenta, ac violentissimas purgationes sustinuerat: sed cum huiusmodi remediis malum non rediret, tandem defecit. Huius intestinum colon a dextro in sinistrum, ex qua parte ventriculi fundo incumbit, flatu omnino distentum erat, & ab omnibus excrementis vacuum: reliqua intestina fecibus plena, ex quorum superioribus cum feces descenderent, impetu quodam violento per distentum colon ferebantur, ventriculi fundo compresso. Vnde factum est, vt cibi potusque portio ad os subito regurgitaret. Refert quoque Beniuenius, Lodouicum Nicolinum, generosi cuiusdam equitis filium, ex solo vento, viscera & stomachum impetente adeo in monoculo afflictatum, vt miserabili angustia tertio die (*nihil conferentibus auxiliis*) e vita migrarit. Inciso autem eius cadauere, & viscera (inquit) omnia vento plena conspeximus, & in sinistro cordis ventriculo obduratum callum inuenimus, qui nunc magnitudinem æquaret. Quare vt illum, hoc est, ventum, mortis ipsius, ita hunc, scilicet callum, aduersa hominis valetudinis causam fuisse arbitrati sumus. Quibus modis colicus vel iliacus ventosus curetur, in præcedentibus dictum est.

OBSERVATIO XXI.

De Ileo exomphalo orto, in muliere, cui excrementa per os reiciebantur, curato: sed rursus post aliquot menses redeunte, iterumque post annum reuerso ac curato: deinde denuo redeunte, rursusq; sublato.

Ex quo ipso tandem redeunte eadem mulier obiit.

Mulier admodum annosa, septuaginta fere, si quæ altera valde obesa, crassa & pituitosa, (uxor illius Petri Florentii, qui sepulcris conficiendis præerat) cui nomen Mariæ erat, e regione Templi Antiqui, siue Diui Hippolyti Delphis habitans, multis annis exomphalo siue vmbilici ruptura laborauerat, vt intestinum sæpe in eandem rupturam illapsum ad magnitudinem capitis exomphalon extra propenderet: ob quam causam frequentissime iliaco dolore afficiebatur, idque leuissima occasione, nempe si solum refrigerata esset, vel si sese aeri, ventoso, nebuloso, pluuioso, vel tempestuoso commisisset, & si exiens a frigore aut vento seipsum non satis muniret. Ceterum quamuis vetula esset, pro suo tamen more satis agilis, & valde laboriosa ac sollicita circa sepulcra constituenda mortuorum erat, cum huic officio

multis annis præfuisset, & loca constituta, in quibus amici sua sepulcra consueta habebant, probe cognosceret. Tandem eo malum deuenit, vt intestinum in rupturam vmbilici illapsum puluinaris instar ex ventre propenderet, ita vt maius exomphalon in vita non viderim. Hinc factum est, vt hæc vetula nimium forte officiosa, ex frigore aut vento concepta, anno 1560. decimonono die Septembris in grauissimum ileon prolapsa sit, ex intestinis in rupturam eandem illapsis, longo tempore ita propendentibus, nunc autem refrigeratis, vt nullis modis, aut arte chirurgica, seu manu in locum retrahi ac deduci possent, stercore quoque indurato; adeo vt malum ita increuerit, ac omnia sursum ferrentur, & cibi potusque portio regurgitaret, & subito per os exsiliret, vomitu continuo & pituitoso, deinde etiam valde bilioso, subsequente, tandem & per tres continuos dies excrementa fœtida & male olentia per os reiciebat: fuitque podex ita adstrictus, vt neque specilli extremum recipere posset; & successit febris vehemens, spirandi difficultas, ac urinæ ægre exhibant, vt in grauissimo ileo fieri asolet. Ad hanc tandem accitus, cum iam extrema & sacra inunctione (*vt vocant*) a sacerdotibus esset munita, quam solent morituri & deploratis sacrificuli administrare, podicem spongia madefacta in decocto emolliente & relaxante cum fouissemus, vt glans melius imponeretur, sequentem glandem subiici iussimus. ℥. pul. hiera picra ʒ. ss. salis communis & salis gemma parum, cum melle, fiat balanus seu suppositorium, vt vocant; sed ob stercus induratum vix iniici potuit, nec quicquam effecit. Et quia iam tres dies præterierant, quod excrementa per os reiecisset, ideo enema iniiciendum esse proposui, eadem tamen non illico admittente: sed cum clysterem extremam anchoram salutis in curatione esse dicerem, atque in hoc cardine eius vitam versari, & si annuere non vellet, proculdubio eandem esse morituram prædicerem, nec aliud remedium ad sanitatem recuperandam nisi hoc solum superesse; tandem ipsa, partim doloris vi coacta, partim spe salutis adducta, enema sibi iniici ægre tamen concessit. Ita vt sequens 20. die Septemb. immissum fuerit. ℥. decoct. prun. vuar. passul. ab arill. repurg. seminis anisi, cum iure pulli (*vt magis stercora dura emolliret*) ℥. j. vel circiter ℥. j. ss. cui adde cassia mundata pro clysteribus ʒ. j. ss. olei amygdal. dulc. olei oliuar. recent. an. ʒ. j. ss. salis communis ʒ. j. ss. misce, fiat clyster. Verum, quod fere omiseram, pharmacopœus senex, vir bonus, cum illi iniunxissem vt hora 10. ante meridiem clysterem iniiceret, dixissemque me rediturum hora secunda post meridiem, cum vetulam accessisset, & illam adeo extreme laborare videret, dixit mulieri, non audeo clysterem iniicere; verebatur enim illam interim; dum clysterem iniiceret, morituram; & sic re infecta discessit. Me autem hora secunda pomeridiana redeunte, & vetulam in eodem statu inueniente, roganteque, num clyster opus suum peregisset, intellexi ab illa, enema, ob causam iam

dictam & rationem a pharmacopœo illatam iniectionem non fuisse. Iubeo itaque pharmacopœum reuocari, petique ut libere diceret, *nunquid clysterem aliquo modo obesse posset, existimaret.* Ille respondit, *minime, cum & nutriret, & solum emolliret: sed se tantum timuisse, ne ex motu deficeret mulier.* Verum cum illa ipsa diceret, *Meipsam mouebo, anhelans sanitatem,* imperauimus, ut me præsentem clysterem iniiceret: quod quidem fecit: quamuis difficulter, ob podicem astrictum & stercora dura, imponere potuerit: sed tandem omnem liquorem clysteris recepit; & per duas horas retinuit; & tunc primo scybala dura seu (ut medici licet barbare loquuntur) squibalas, seu stercora dura in modum parue pilæ coacta deiecit: deinde noctu subsequente bis egregie aluum deposuit; & cessauit vomitus stercoraceus seu excrementorum, & singultus qui antea aderat (quem in præcedentibus, cum de signis loqueremur, ex aphorism. decimo, lib. septimo malum esse Hippocrates pronuntiavit) repressus est ac cessauit, & dolor atrocissimus mitigatus est. Sed 21. & 22. Septembris habuit fluxum ventris per se copiosum, vomitu non amplius redeunte; & deinde quotidie ad minus quinquies aluum deponebat, & nocte aliquando ter liquida aquosa & biliosa egerebat, cum sedatione doloris: verum viribus deiectionis nonnihil debilior facta erat. Pro siti & linguæ scabritie, quæ tunc aderat, & virium restauratione, 21. Septembr. hoc eclegma a me fuit præscriptum. *℞. syrup. viol. oxyrach. simplicis, syrup. de corticibus citri, an. ʒ j. manus Christi cum perlis ʒ vj. probe misceantur.* Ex quo subinde capiebat cochlear dimidium. Interim raro, noctu præcipue, sine febre erat: aliquando noctu bis febricitabat; & nonnunquam etiam interdum, paroxysmis certum circuitum non obseruantibus, quasi hæc febris modo duplex, modo erratica fuerit. Fluxus autem perseverabat, quem tamen nolimus constringere, cum dolor iliacus & sæua illa symptomata ac quasi lethalia per illum fluxum consopita essent. Verum 23. Septembris, cum magis & plurima liquida excerneret, eaque minime cocta, ut in cœliaca affectione fieri solet, pro ventriculo roborando linimentum sequens præscripsi. *℞. olei coton. menthacei, mastichini, an. ʒ ʒ. cera modicum: fiat linimentum pro stomacho.* Ceterum cum & aphthæ non solum in ore & circa labia, sed & in palato ubique oborirentur, (quod ex fæore & corruptione fecis reiectæ prius euenisse arbitrabar) 25. Septembris, ut hoc gargarismo vteretur præcepi. *℞. hordei commun. seu non excorticati, folior. violar. malu. flor. rosar. rub. ana. m. ʒ. fol. plant. man. j. rad. liquir. ʒ ij. coquantur in aqua commun. colentur: & adde sem. coton. ʒ j. ʒ. & iterum ebulliant, ac leuiter colentur: cuius colat. accipe ʒ j. ʒ. addendo diamori, syrup. ex ros. siccis, syr. viol. an. ʒ ʒ. misce pro garg.* At cum fluxus ventris perseveraret, pro abstersione 28. Septemb. hunc syrup. propinaui. *℞. decoct. hordei mund. ʒ ij. syrup. viol. ex infus. ros. rub. commun. an. ʒ ʒ. misce.* Postea ad maiorem roborationem & leniorem restrictionem, & pro abstersione si-

militer imperaui, ut conserua rosacea frequenter vteretur. Et quia febris subinde recurrebat, incertis tamen periodis, sequens decoctum ebibit. *℞. corticum rad. cichorei, dentis leonis, fœniculi, macerat. in aceto vini optimi, an. ʒ ʒ. hordei mundati p. j. glycyrrh. ras. ʒ ʒ. coquantur ad hordei crepaturam ad modum ptisanæ, pro ʒ j. sumsit tribus vicibus.* Victus tunc erat amygdalatum. His præfidiis non solum ab inflammatione & febre, sed ab ileo lethali, cum vomitu etiam stercoris, singultu, & aphthis, præter omnium mentem egregie curata fuit. Verum hæc ipsa anno 1561. mense Martio subsequenti ex eadem causa in idem malum seu in iliacum dolorem multo sæuiorem, quam antea prolapsa est, adeo ut per quinque pluresue dies vomitu per os recrementa denuo reiecerit, prius reiecto cibo crudo, tum potu; postea & bile viridi in maxima copia reiecta, subinde & prassina, mox excremento ipso, cum tanto horrore & fœtore, ut se odore stercoris interficiendam misere clamaret: idque quinque pluresue dies durauit. Sed infra scriptis remediis, nostra industria, cum ad eandem 21. Martii accitus essem, denuo conualuit, cum etiam eo tempore pro deplorata haberetur. Omnium primo hoc suppositorium iniectionem fuit. *℞. pul. specier. hiera picra ʒ ʒ. pul. trochisc. alhandal. ʒ ʒ. salis gemma parum, mellis q. s. fiat suppositorium.* nihil effecit: ideo eodem die sequens enema iniectionem est. *℞. iuris pulli bulliti cum prunis, visci passul. & modico semine anisi, ʒ j. cassia pro clysteribus ʒ j. ʒ. olei anethini, rutacei (quia valde pinguis & pituitosa erat) olei chamomill. an. ʒ ʒ. olei amygdal. dulc. ʒ j. olei communis recentis ʒ ʒ. vitellum vnius oui, salis communis ʒ j. ʒ. misce. fiat clyster.* nihil eduxit, nisi squibalam vnam aut alteram vix effatu dignam. Eodem die rursus glans satis oblonga indita, hunc in modum parata. *℞. pul. hiera picra ʒ ʒ. agar. trochisc. trochisc. alhandal. diacymini, an. ʒ ʒ. salis gemma, parum, mellis q. s. fiat glans.* nihil effecit. Eodem die sub noctem & hoc enema iniectionem est. *℞. decoct. suprascriptæ ʒ j. cassia mundata, benedicta laxat. ana ʒ ʒ. elect. ex hiera picra ʒ ij. olei anethini, chamamel. ana ʒ j. ʒ. salis gemma ʒ j. salis communis ʒ ʒ. misce.* neque hoc quicquam eduxit, & materia clysteris regurgitabatur, neque integre ingredi potuit, ob stercoris duritiem. Decimo tertio Martii die, iterum suppositorium prædictum, infricatis aliquot granis diacridii inditum est. Sed frustra, ne squibalis quidem subsequenteribus. Quare hoc clyisma iterum infusum est. *℞. decoct. suprascriptæ ʒ j. ʒ. cassia mundata ʒ j. benedicta laxat. ʒ ʒ. olei amygdal. dulc. olei communis, chamomilla, ana ʒ j. ʒ. salis gemma, salis communis, ana ʒ j. vitellum vnius oui, misce.* Sed dimidia pars vix infundi potuit: ita ut tres supradicti clysteres nihil operati sint. Idcirco glandem sequentem præscripsi. *℞. pul. specier. hiera picra, sena, ana ʒ j. trochisc. alhandal. ʒ ʒ. diag. gr. x. salis gemma modicum, cum melle, fiat suppos. oblongum.* Hoc solum tantum leuaminis attulit, ut liquorem clysteris ad se

ad se attraxerit, sed minime feces induratas. Quamobrem 14. die Martii fotum sequentem præscripsi. *℞. rad. althææ ʒij. folior. malvæ, m. j. florum meliloti, chamomill. an. m. j. sem. althææ ʒss. coquantur in aqua communi ad molitudinem: & tota substantia confusata, postquam bullierit vna cum liquore, calide in vesicam coniectatur, adiectis olei amygdalar. lini, chamomill. lilior. a. ʒj. & calidiuscule cum vesica bene constructa locus dolens, venter, pecten, anusque, & inguina sæpissime foueantur. Quo facta tandem dolor cœpit mitigari aliquo modo. Post fotum pauco tempore intercedente, indurum est suppositorium ultimo præscriptum satis oblongum: & reiecit primo stercora dura, pilæ instar coacta, mox & excrementa molliora: & soluta est alius; ita vt post noctem sublequentem habuerit infinitos secessus, liquidos & valde biliosos, & aquosos; vnde & vomitus & singultus, qui aderant, etiam sedati sunt. Sed quia 16. Martii fluxus perseverabat, lotium sequens propinavimus. *℞. decoct. hordei non excocti ʒij. syrup. ex ros. rub. commun. ʒj. misce. & materia bene detecta, vt & amygdalato sequenti vteretur iussi; idque sub noctem, vt & melius dormiret. ℞. amygdal. dulc. depilat. ʒij. sem. 4. frigid. maior. mundat. an. ʒij. sem. papau. albi ʒj. cum aqua fer. furuq. s. fia. amygdal. ad pintam vnam, pauco saccharo ad saporem iuncto. Pro siccitate linguæ, qua etiam laborabat, tres globulos præscripsimus, hoc modo. *℞. sem. cydon. ʒij. sacchar. cand. ʒij. fiant tres globuli, & panno lineo raro constricti infusi in decoct. hordei mundati, supra linguam denoluantur & ore sugantur. Interea pro alteratione & calore febrili sumebat subinde cochlear vnum ex syrup. de acet. citri, & de limonibus simul commixtis. Postremo 20. Martii die pro ventriculi imbecillitate hoc linimentum præscriptum est. *℞. olei absinthii, cydon. an. ʒij. olei maceris ʒj. misce. Atque his remediis secunda vice per me denuo curata fuit, magno cum nostro honore, cum ex morte in vitam reuocata haberetur. At, proh dolor, misera hæc mulier quatuor mensibus interpositis, optime valens denno eodem anno 1561. die 19. Augusti in idem malum prolapsa, rursus tres continuos dies excrementa per os reiecit, aluo ac vrina in totum repressa ac retenta. Quamobrem rursus ad eam ingressus, hoc enema statim iniici iussi. *℞. decoct. pulli, bulliti cum prunis damasc. vuis passul. mandatis, & pauco sem. anisi ʒss. j. cassia pro clysteribus ʒj. s. olei chamemel. anethini, an. ʒss. olei communis, olei amygdal. dulc. ana ʒj. salis communis ʒj. salis gemmæ ʒss. vitellum oui, fiat clyster. Deinde iterum adhibita vesica, vt supra, & suppositoio indito, ex ʒss. pul. hiera picræ & ʒss. diag. & salis gemmæ parum, & mellis q. s. iterum secessum habuit, vomitu cessante: demum libere lotium reddebat. Adeo vt tertio die post ingressum meum cum admiratione omnium iam tertio euaserit. Sed infelix & miserrima vetula, post tot dolores & fœtores perpeßos, a quibus semper curata fuerat, rursus eodem anno 1561. 27. die Decembris, asperissima hyeme, quarta vice in idem malum crudelissi-*****

mum & extremum relapsa est. Et cum duobus diebus iterum continuo excrementa per os cum fœtore teterrimo reiecißet, non tamen me statim vocauit, nisi cum post duos dies doloribus enecata videretur. Atque tunc iisdem remediis supra scriptis vsus sum, & clystere iniecto, ac ventre inuncto cum emollientibus & anodynis, nempe pingued. gallinæ vituli, oleis chamomil. & meth. aliisque similibus. Clystere autem iniecto circa 10. horam mane ante meridiem, liquore tantum reiecto absque excrementis, & cum vires deficerent, a meridie ad tertiam horam rediens animaduerti febrem ardentissimam eam occupasse, cum vomitu & rigore vehementiore superveniente: quo quidem rigore cum febris non solueretur, mortem instare prædixi, iuxta aphor. 46. lib. 4. in quo Hippoc. ita scribit: *Si rigor incidat, si bre non deficiente, agra iam debili, lethale est.* Deinde cum valde sitiret, & membra externa frigida permanerent, certiore signo de morte prædictionem feci: cum illud idem non minus lethale, quam præcedens signum sit: sic Hippocrate dicente aphor. 48. lib. 4. *In febris non intermittentibus, si partes exteriores frigida, interiores vruntur, & sicim habent, lethale est, multoque magis singultu & vomitu stercoris perdurantibus, secundum aphor. 10. lib. 7. ab ileo vomitus, singultus desipientia (vt de signis Prognosticis antea quoque diximus) vel convulsio malum.* Ideo cum hæc omnia adessent, in vetula, virib. iam prostratis, nec clysteres iniekti aut alia remedia iuuarent, iam morienti rursus reiterare clysteres, aut quippiam medicamentorum nolui: videbam enim mortem instare. Et sic, prognostico facto, quod non diu superuiveret, eodem quo vocatus fueram die, sub noctem vitam cum fœditate finit.

S C H O L I A.

Vmbilicus (teste Paulo, libr. 6. cap. 51.) indecore prominere solet: quod vitium Græcis exomphalon dicitur, interdum a membrana, qua abdomen finit (peritoneum appellatur.) illic dirupta ac procedente, aut omento, aut intestino; interdum colluie otiosi humoris sub umbilico contracta, interdum vero carne subnata; aliquando sanguine irumpente, propter venæ, aut arteriæ rupturam, vt in aneurismatis, interdum non sanguine, verum spiritu solum irrumpente. Verum has species omitramus, de quibus suo loco tractabimus, cum etiam ex parte ad chirurgiam pertineant. Hic intestinum prolapsum fere capitis magnitudine rum ilium atrocissimum induxit; & licet ter ab hoc malo liberata, & a me curata fuerit, quarta tamen vice malum vetula euincere non potuit, cum & quivis dolor iliacus senibus superueniens, ex decreto Archigœnis apud Aetium, mortem inferre soleat, quamquam hæc vetula ter per nos gratia diuina curata fuerit. Ita & quædam alia vetula sexagenaria, valde febricitans, in ileon grauissimum collapsa etiam fuerat, ex inflammatione tenuium intestinorum, non autem ex ruptura, vt præcedens, adeo vt octo diebus excrementa per os reiecerit, & similiter

Quidam ex
volutulo cum
clysteres per os
reieceret, mira-
biliter curatus.

quatuor vermes, quod signum erat magnæ putredinis: sed tamen per me curata fuit, nec amplius recidiuam passa est: cuius historiam posuimus lib. 7. *obferuationum nostrarum de symptomatu febrium*, Obferu. 4. quam hic repetere non opus est. Cum autem hanc mulierem præ manibus curandam haberem, in mentem mihi venit historia nobilis illius in Italia, qui cum voluulū patiebatur, nec ullis remediis atque clysteribus acutis curari poterat, imo ipsis clysteribus per os reiectis: tandem veniens quidam medicus Hispanus, propinavit eidem iusculum pingue, quod prima vice tum secunda euomuit: tertia vice cum cepisset, retinuit. Hæc tamen hanc mulierem, cum quarta vice recidiuam passa esset iuuare non potuerant. Romæ mulier quædam Spolerana, cum deplorata haberetur, & stercus per os euomeret, neq; ullis remediis sanari posset, tandem sumit omni die iusculum maluæ, & sanitati restituta fuit, ut constat ex arcanis Cornelii medici Roterodamensis, qui apud Gubertum Horstium medicum Nosocomii Mariæ Consolationis agebat; apud quem & nos egimus post eius discessum: qui Cornelius etiam eidem Nosocomio longo tempore præfuerat; sed reuersus Roterodamum iuuenis obiit. Nihil æque stercora dura emollit, quam iuscula pingua, ut ante dictum est. Sed nunc aliud exemplum huius atrocissimi mali, ex vmbilici quoque ruptura orti, referamus.

OBSERVATIO XXII.

De altera muliere excrementa per os reiciente, ex ileo ab vmbilici ruptura orto.

PETRONELLA de Berendreht, matrona mehercle proba, vicina nostra, annos supra sexaginta nata, mulier, ut si quæ altera crassissima & pinguiissima, non minus quam illa, de qua superiori obseruatione egimus, quamuis minus annosa. Hæc autem Delphis quoque habitans, anno 1564. 19. die Octobr. in ileon grauissimum prolapsa est, ex vmbilici ruptura, qua multis retro annis, ut præcedens, laborauerat, ingentis quoque magnitudinis, ita ut tandem recrementa per superiora reiecerit admodum fœda & male olentia. Post muliercularum experimenta, quibus vsa fuerat, cum res ad restim deuenisset, me vocauit; & hoc sequenti enemate ex nostro consilio solum iniecto a grauissimo ac fœdissimo malo liberata est. ℞. rad. althææ ℥ j. folior. maluæ, viol. mercurial. florum chamomill. summitatum anethi, an. m. j. sem. anisi, carui, an. ℥ j. B. sem. althææ ℥ ij. prun. damasc. num. ix. vuar. passul. ab arill. repurg. ℥ j. folior. senæ ℥ B. coquantur in iure pulli vel verueci pro ℥ j. addendo cassiæ mundatæ pro clysteribus ℥ j. benedictæ laxat. ℥ B. olei communis, olei anethini, chamomill. an. ℥ j. vitellum vnius oui, salis communis ℥ j. salis gemmæ ℥ B. misce. pro clysteri. Aluo soluta vomitus ille fœdus cessauit, & sanitati restituta fuit. Cum iam diu ab hoc malo tuta fuisset, iterum anno 1566. 18. die Martii, in idem malum acutissimum & fœdissimum collapsa, ut excrementa per tres continuos dies per os reiecerit. Hoc autem tempore cum in Haghham Comitatus euocatus essem ad Domicellam

de Bombergen Antwerpianam, morbo vterino correptam, Petronella supradicta cum deplorata laboraret, Hugonem apothecarium suum ad se vocari iussit, & ei mandat, ut clysterem rursus pararet, quo anno 1564. per me curata fuerat. Bis iniectus est, sed nihil excreuit. Vbi ego reuersus essem statim me accersiri iubet. Excrementa vero, quæ tunc per vomitum reiciebat, valde biliosa, fœrida, ac sincera erant; vrina similiter tincta magis quam prius: similiter febricitabat: & vna aderat oris siccitas, tum amaritudo, ut & aphthas futuras in ore metuerem. Dolebat autem præcipue, non solum circa vmbilicum, vbi ruptura erat, sed & per totum ventrem, vsque ad ventriculum. Ventrem inunximus oleo anethino & chamæmelino simul mixtis: & pro alteratione capiebat decocti hordei mundati ℥ iij. syrupi acetosi simplicis ℥ j. Plurimum vero debilitata ex dolore sæuissimo, enemate tamen sequenti descripto rursus iniecto, ex nostro consilio, hoc ipsum egregie choleram & materiam petuitosam per inferiora deduxit, & ventositates multas vna propullauit; quo & probe curata fuit. ℞. maluæ, viol. parietaria, flor. chamomill. meliloti, summitat. anethi, hordei mund. an. m. j. centaurii minoris m. B. rad. althææ ℥ B. sem. anisi, fœniculi, carui, fenugraci, an. ℥ j. B. sem. maluæ, althææ an. ℥ j. prun. damasc. num. vij. vuar. passul. enucleat. ℥ B. folior. senæ ℥ iij. coquantur in aqua communi pro ℥ j. colatura addendo cassiæ mundat. pro clysteribus ℥ j. elect. de dactylis, benedictæ laxat. diacatholici, an. ℥ ij. olei amygdal. dulc. viol. anethini, an. ℥ j. vitellum vnius oui, salis communis ℥ j. salis gemmæ ℥ B. misce, & fiat clyster. Eoque retento per tres horas, paucum liquorem clysteris deiecit, absque fece tamen: & noctu plurima biliosa stercora liquida bilis instare euomuit. Mane vero aluus soluta est, primo paucis stercoribus duris excretis: postea vero & multa liquida pituitosa aquosa excernens, præter omnium astantium opinionem iterum sanitati restituta est. Deinde rursus aliquot menses frequenter in idem malum recidens, iisdem fere remediis ope diuina per nos semper curata fuit: quemadmodum & anno 1568. 24. Februarii (cum tempus esset niuosum, tempestuosum) in eundem affectum grauissimum prolapsa hoc clysteri sequenti demum sanata fuit. ℞. foliorum maluæ, viol. parietaria, mercurial. flor. meliloti, chamomill. an. m. j. prun. damasc. num. xij. vuar. passul. ab arillis repurgatarum ℥ j. foliorum senæ ℥ B. sem. anisi, fœniculi, anethi, an. ℥ j. B. rad. althææ ℥ j. coquantur in iure pulli, pro ℥ j. B. adde cassiæ mund. ℥ j. benedict. lax. hiera picra, an. ℥ ij. olei amygdal. dulc. anethini, an. ℥ j. B. vitellum vnius oui, salis communis ℥ j. salis gemmæ ℥ B. misce. Verum hæc eodem anno 1568. 6. die Octobr. recidiuam passa iterum: ut hoc truculentissimo malo decumberet, & tandem stercus per os multis diebus euomuerit, neque inferius quicquam deicere potuerit, sed in loco rupturæ non ita dolebat, ut antea. Cum autem nec intestinum in locum suum intromitti posset,

posset, malumque singulis horis accresceret, & iam tribus aut quatuor diebus decubisset, nec me vocasset, clam me ignorante (forte ad rem magis attenta) a pharmacopœo clysterem suscepit: eo non operante, & malo in peius succedente, me tandem vocauit misera matrona, cum omnia remedia frustra tentasset. Glandem satis longam tunc statim iniicere iubeo, paratam ex pul. specier. hierapicræ, trochiscor. alhandal. ana ℥j. pul. cymini ℥℥. salis communis & gemmæ parum, cum melle q. s. fiat suppositorium. sed nihil effecit. Interim clyster hic parabatur: qui statim quoque infusus est. ℞. rad. althææ ℥j. malua, mercurialis, beta, parietaria, flor. chamomilla, meliloti, an. m. j. furfur. macrip. j. sem. lini, fœnugrac. malua, sem. anisi, fœnic. ana ℥j. ℞. coquantur in aqua communi pro ℥ij. in cuius colatur. dissolue electuarii lenitiui, hierapicræ, benedictæ laxat. ana ℥℥. olei amygdal. dulc. chamomill. anethini, ana ℥j. salis gemmæ ℥j. salis communis ℥℥. vitellum vnius ouis, fiat clyster. nihil eduxit, vti prior, quem proprio instinctu susceperat. Altero die mane, scilicet 10. Octobr. & sequens enema iniectum est. ℞. decoct. prun. damasc. passul. enucleat. sem. an. st. cum iure pulli ℥ij. cassia mundat. ℥j. benedicta laxat. ℥℥. olei amygdal. dulc. anethini, chamamelini, ana ℥j. salis gemmæ ℥j. salis communis ℥℥. misce, pro enemate. neque illud aliquid eduxit. Glande rursus immissa eodem die ex trochisc. alhandal. ℥j. pul. hierapicræ ℥℥. salis gemmæ & communis parum, cum s. q. mellis, fiebat suppositorium in cuspide aliquot granis diagnetempe tribus impositis. Attraxit tantum liquorem clysteris, sine excrementis. Aggrauabatur malum, stercore per os exeunte, cum maximo fœtore. Urina vero perturbata erat. xi. die Octobr. hoc medicamentum per os exhibitum fuit. ℞. folior. senæ. ℥ij. rhabarb. selecti ℥j. ob bilem. semin. anisi ℥j. schœnanthi ℥j. bulliant in ℥iv. decoctionis communis: & fortiss. expressioni adde electuarii de succo ros. ℥ij. cinamomi selecti ℥℥. fiat potio brevis clareti instar. vt melius retineret. Retinuit autem ultra tres horas, sed tunc euomit. Cum itaque medicamenta non iuuarent, eandem pro deplorata habui. Aduocatur & secundus medicus Ericius collega meus. Conclusum, vt denuo clysterem iniiceremus. Ego proposui decoctum faciendum, ob stercora dura inferius retenta, cum iure pingui; medico refragante, & dicente non opus esse nutritione; & ideo in aqua communi herbas decoquendas. Ego contra, non ob nutritionem id faciendum, sed potius ad aluum magis emolliendam, & stercora dura remollienda; quod & medici docti suadent, & experientia sæpe comprobatum est, in hac tum præcedente muliere ac aliis, quibus magis profuere. Cui rationi assensit collega: sed tamen cum ad manum non esset ius, in aqua decoctio facta est. Vomitus tunc erat enormis, & singultus admodum molestus illam pene interficiebat. Tale itaque enema vna præscripsimus. ℞. rad. althææ ℥j. fol. malua, mercurial. parietaria, florum chamomill. meliloti, ana m. j. furfuris p. j. sem. anisi, carui, fœniculi, fœnugrac. an. ℥j. ℞. siuum pinguium num. viij. fiat decoct. in aqua communi, pro ℥ij. ℞.

colat. adde elect. lenitiui, benedictæ, laxatiuæ, an. ℥x. olei rutacei, anethini, chamamelini, ana ℥j. salis communis ℥j. salis gemmæ ℥℥. misce. pro clystere; retinuit satis diu. At postea non nisi liquorem clysteris emisit. Duodecimo die Octobris, cum nullo modo secessum habere posset, ac ipsa consueta esset aliquando pilulas deuorare, quas & libentius se sumere velle proponebat, quam potionem; vt has pilulas caperet vna consulimus. ℞. pul. rhabarb. selecti ℥ij. trochisc. alhandal. ℥℥. pul. cinnamomi gr. iij. cum syrup. ex infus. ros. fiebant pilula v. Sumsit autem commodissime, & retinuit per quatuor horas: deinde more consueto iterum vomuit, nec secessum habuit: & quicquid sumebat, etiam potum ipsum, vomitu vna cum stercore reiciebat. Sub noctem singultus magis increbuit, & virtus ex continuo vomitu, tam chymi, quam excrementorū, deiecta est; ita vt remediis locus non esset. Obiit vero sequenti die cum miserabili illa fœditate, matrona mehercle probissima.

S C H O L I A.

MVlier hæc (vt etiam præcedens) quamuis ab eiusmodi seculissimo & fœdissimo malo sæpe per nos curata fuerit, tamen cum toties reciduiam pateretur, impossibile fuit hostem tam sæuum & atrocem superare. Vno atque altero die ante mortem clamabat intestina supra vmbilicum conglutinata esse, quo minus probe medicamenta descenderent. Libenter ob hoc corpus incidissemus, vt huius mortis causam recte inueniremus. Sed nescio, qua superstitione negantibus cognatis & amicis, voti compotes fieri nequimus. Venit mihi tunc in mentem historia illa Beniuenii, monialis cuiusdam intestinorum dolore mortuæ. In cœnobio (inquit) Diui Donati, quod in agro Puluerose est, religiosa mulier & eius cœnobii professa fuit: quæ intestinorum doloribus multis iam mensibus vrgebatur: & alius nil nisi agre & durum, idque tantum decimo quoque die reddebat. Cumque nullis conferentibus auxiliis diu multumque hoc malo vexata, tandem natura concesserit, mortuæ corpus incidendum curauimus: & inuenta sunt intestina altiore callo constricta: adeoque iter angustum relinquebatur, vt deiectiones agre transmitti possent. Hoc tamen nos malum, propterea quod aluum prementem nescio quid durum renitebatur, etiam ea viuente præferamus. Hactenus Beniuenius. Vbi itaque stercora dura sunt, nihil est præstantius quam emollientibus clysteribus primum educere: nam postea, si nimium diu expectent ægri sine præsidiiis, & stercora deinde per superiora relinquantur, raro vel cum magna difficultate euadunt. Memini rusticam quandam in Berckel pago sic dicto, anno 1580. 23. Ianuarii, cum per quinque aut plures dies ex ileo omnia per superiora reiceret, (quam tamen non vidi, sed amici cum lotio ad me consultandi causa venientes hoc mihi narrarunt) nec purgationes nec quicquam potus seu edulii retinere potuisse: tandem agre admodum concesso clystere sequente, eo ipso a

De abditis vici-
rum causis
cap. 34.

morte, quasi ad vitam reuocata est. ℞. radic. althæamundata ʒj. folior. viol. malua, parietaria, florum chamom. meliloti, an. m. j. prun. dulc. num. ix. sem. althææ, malua, an. ʒj. summitatum anethi p. j. coquantur in aqua communi pro ℞. j. colat. addendo cassia pro clysteribus ʒj. benedicta laxat. ʒ℞. olei amygd. dulc. chamomill. anethini, an. ʒj. vitellum vnius oui, salis gem. ʒj. salis communis ʒ℞. misce, pro enemate. Theodorus Clutius pharmacopœus, cognatus noster eo profectus, cum clysterem inieciisset, aluo egregie soluta, rustica hæc ab omni dolore statim, incantamenti instar, liberata fuit. Hæc quidem exempla de ilei curatione adduxisse satis esse arbitror. Vnum adhuc restat, de ileo ex venenata portione originem habente, vt ita huic tractatui finem imponamus.

OBSERVATIO XXIII.

De ilei dolore ex veneno assumpto.

MVlier, quæ arsenicum sumserat, in tormentum intestinorum lapsa ilei instar, circa umbilicum & ventriculum dolebat. Statim ad vomitum illam cogebar (*cum male ex al. erius consilio aquam frigidam bibisset*: & butyrum cum oleo communi, vna cum ceruisia, quæ ad manum essent, propinaui. Mox oleum amygdal. dulc. dedi in magna copia; & egregie vomuit, quod oleum cum sæpius cepisset, maxime contulit. Oleum enim amygdal. dulcium recens expressum, quædam proprietate (*vt in aliis experti sumus*) arsenici excoriationi resistit. Mox theriacam dedimus, & a torminibus fuit curata. Quod si non iuuissent hæc remedia, dedissem proprium antidotum, vt crystallum verum. Dedi prius iura pingua; quibus, cum illi etiam aluus solueretur, melius habuit.

SCHOLIA.

Contra ileum ex veneno, valet oleum, theriaca, vel lac: oleum calefactum bibendum frequentipotu; & ad vomitum ægri cogendi sunt, aut ius pingue propinandum, vt sæpius euomant. Post aliquot dies Theriaca in potu datur utiliter. Nos hic oleo amygd. dulc. commode vsi sumus. Si venenum cognoscatur, præstat post euomitionem & eiusdem expurgationem propriis antidotis vti. Si vero a venenoso pharmaco, quis in voluulum incidat, aquam tepidam bibendam dabimus, vomereque cogemus. Deinde oleum calidum in potu dandum, aut iura pingua, vt denuo vomant ex moderato eorum potu. Deinde ita parum perquiescant, & postea theriacam accipiant cum vino dissolutam: quemadmodum Aetius & Paulus præcipiunt: & si adhuc perseverauerit, purgante medicamento vtare, aliquo eorum, quæ supra commemorauimus. Ita quoque si ab insalubri cibo, vt fungis comestis, contingat, vomitus confestim prouocetur, hunc in modum. ℞. sem. raphani, sem. atriplicis, anethi, an. ʒ℞. decoquantur, huius iuris decocti accipiantur ʒvj. oxymel. simpl. ʒj. ℞. misceantur, & tepide bibantur. Vbi vomuerit laborans, sumat theriacæ veteris ʒj. ex vino. Neque hoc semel fecisse satis est; sed repetatur diebus aliquot proxime sequentibus. Sed vbi ve-

nenum sumptum est, nequaquam ab initio theriaca danda; vt quidam pharmacopœus nuper faciebat, sed post vomitum: ita neque vinum ab initio conuenit, vbi adest excoriation. Tunc potius lac tepidum dandum est, si subsequatur excoriation intestinorum. Et ita si venenum aut venenosa medicamenta excoriationem intestinorum proferant, venenositate prius deterfa & abluta, excoriationi succurratur, vt latius de dysenteria dicturi sumus. De venenis quoque in propriis locis dicemus. Nunc addamus quædam, quæ proprietate iliatis resistunt. Resistit autem ileo discepti vespertilionis sanguis ventri illinitus: item senectus serpentium decocta cum rosaceo in vase stanneo, si ventri illiniatur, vt apud Plinium Secundum legitur lib. 2. de re medica, cap. 33. Quidam Ileosum conclamatum, a summa desperatione liberavit, gallinaceo fimo duntaxat albo ex vino vel syrupo vna poto. Ex antiquis auctoribus cuminum Ægyptium intestinorum dolores & inflationes discutit, vti & anisum ex mulso cum obulis duobus castorei ad inflationes ventris datur. Plura vide apud Benedictum Veronensem, qui & in fœda excrementorum vomitione aquam gelidam in potu vberius datam commendat: quia sitim sedat & fœditatem retroagit. Eo remedio (*vt idem testatur*) quidam medicus ileosus a medicis destitutus, salutem restitutus fuit. Hæc de tormentis colicis & iliatis: nunc ad alia intestinorum vitia transeamus.

OBSERVATIO XXIV.

De quibusdam aluum agre excernentibus.

Senex singulis tribus septimanis aut aliquando mense aluum semel reddebat: qui & in toto corpore pruritus patiebatur, & potissimum circa pectus; & nocte sudore perfluebat: alioqui non ægrotabat. Huic consulebam vt pinguis iusculis vteretur, in quibus & malua incocta esset. Romana quædam mulier vetrica tenella ex oleo & sale comesta aluum sibi soluebat. Cornelius medicus ille senex, qui Delphis prope templum Nouum habitabat, vt mihi ipsi narrauit, sanus existens, singulis octo diebus tantum semel aluum deponebat, quod & illi familiare erat; vti & Iosepho Michaeli, medico clarissimo eueniebat, quod & ipsum nobis retulit. Pictor quidam Alcmarianus ob apostema in musculis abdominis cum feces cum intolerabili dolore retinerentur, nec aluum lenientibus & purgationibus fortibus ab Empiricis & mulierculis præscriptis, exonerare posset, clystere emolliente ex nostro consilio aluum deposuit. Plurima huiusmodi exempla posuimus lib. 2. obseru. nostrarum de feb. obser. 34. & præcipue in scholio obseru. eiusdem. Sed & fœmina paralytica apud Benedictum Veronensem 30. diebus continuis ventrem non exoneravit, eodem ventre supra modum intumesciente. Alterius quoque a conceptu ad 45. diem aluus suppressa est magno naturæ incommodo. Alba Caucha ex patricia Venetorum gente, ad partum vsq; aluo adstricta fuit, vt vix septenis diebus paululum excrementi aridi capri- no similis emitteret, post partum quatrduo ceteris aluum

Quæ a proprietate ileo resistant.

Curatio ilei ex veneno.

Curatio sifiat voluulus ex deuorato veneno pharmac.

Ab insalubri cibo, vt fungis, vel venenoso.

aluum exoneravit, excrementitio fluxu. Iuueni
xxvii. annorum 25. clysteres per intervalla infu-
si nihil præstiterunt, neque medicamenta laxati-
ua apud Valescum.

SCHOLIA.

Tarda atque pigra alui deiectionis est, qua faeces
& cibi reliquiae raro, nec pro assumptorum ra-
tione descendunt. Per hanc faeces necessario ob-
durefcunt, quod diutius cohibita caloris vi con-
tinenter siccescant, ab hisque nonnihil succi sem-
per exsugant mesenterii venae, non modo in tenui-
a, sed in crassiora intestina distributa. Tarda
deiectionis intestinorum quidem symptoma est, sed
quod alios deinceps morbos excitat: quocirca in-
ter euidentes morborum effectrices causas refer-
tur. Illius siquidem vapore caput tentatur, cor-
pus ingrauescit, ventriculi concoctio offenditur,
ac reliquae functiones deteriores euadunt. Saepè
ex viuendi errore nascitur, velut ab esculentis sic-
cioribus; acerbis, & astringentibus, quae præter-
tim prima mensa assumpta sunt: ad hæc ex immo-
derata ciborum copia, quam paucò tempore na-
tura neque vincere neque distribuere potest: ex
otio denique & decubitu, somnoque multo. Ce-
terum non hanc, sed eam, quae morbi soboles est,
tardam deiectionem perquirimus. Huius causa
a doctissimo Fernelio, triplex statuitur. Prima,
sensus obtusus, qualem infligunt veterius, apoplexia.
Secunda, *stimuli penuria, & quum flauibilis, quæ ob-
iter intestina ad excretionem irritat cohibetur, hocque
crebro fit in ictero, vt diximus, ideo & fortiora laxan-
tia (vt ostendimus) requirit.* Tertia causa est inte-
stinorum vel obstructio vel astrictio: quæ ceteris est caus-
sis frequentior. Astrictio a mesenterii aut visce-
rum tumore nascitur, qui intestina pressu coan-
gustat: nonnunquam & ab enterocoele, & huius
curationem paulo ante diximus. Obstructio
vel a duris siccisque faecibus, vel a crassa lentaque
pituita, vel a concreto calculo. Quomodo hæc
tollatur, cum de colicis doloribus loqueremur di-
ximus. In quibusdam ergo pigra multum ac tarda
est aluus, vt in eo quem nouimus non nisi duode-
cimo quoque die excrementa faecesque deicere,
& aliquando citra manifestum corporis functio-
num detrimentum dies totos quadraginta, sine
excrementorum deiectione permanere: & præ-
fectum quendam in Heyloe (*de quo egimus lib. 2.
obser. 34. de feb. quartana continua*) intra tres men-
ses & tres dies, nihil prorsus ab aluo reddidisse me-
mini; sed in his causa quidem neque a consuetu-
dine, neque a natura, sed ab iis, quæ nunc recen-
sui vitiis, petenda. Quin etiam tumor præter na-
turam in intestino genitus, imo callus (*vt apud Be-
nuiuenium de abditis causis, ca. 31. inuentum post mor-
tem tenuius intestinum obcalluisse, vnde mors*) id
in totum obstruit, faecisque prolapsus prohibet.
Causæ igitur obstructionis & astrictionis tollen-
dæ, si fieri potest; ita & stercora dura emollienda,
& clysteribus emollientibus educenda, *vt iam ex-
emplis quibusdam præcedentibus ostendimus:* & non
exhibendum catharticum, nisi aluum prius cly-
steri emolliente leuiter subdlexeris: mox lenientia

dabimus, & ea quæ leniant ex cibis prima mensa,
aluis quoque inunctionibus emollienda: vel su-
pra vmbilicum emplastra ab auctoribus laxantia
descripta imponenda.

OBSERVATIO XXV.

De citra alui deiectione.

Andreas Guilhelmi de Oosthoren, vir si quis
alius ditissimus, cognatus noster, lubricum
ventrem habebat: adeo vt saepe citius aluum de-
poneret, cibo nondum concocto exeunte, cum
humida siccis & constringentibus præponeret in
prima mensa. Huic victum contrarium consu-
lui, vt mala cydonia vel quippiam adstringens pri-
mo comederet, deinde rursus humida: quæ enim
astringunt, si in prima mensa sumantur aluum co-
hibent, ne cito cibi humidiores descendant: si
post ceteros cibos, ventrem laxant. Vt huius rei
causam melius intelligeret, in medium adduxi
historiam Galeni, *lib. 2. de alimentis capit. 21. de o-
ratore, qui ab austeris pyris malisque sibi ventrem
laxari prædicaret.* Huius rei experientiam faciens
Galenus, ei continua esse exoptauit: & cum pyra
ac mala post alios cibos liquidos comederet, caus-
sam inuenit. Igitur vt illa prius comederet impe-
rauit; & ita constricto stomacho debiliore, minus
ventrem laxabat. Iucunda quidem hæc est hi-
storia; quam legere poteritis: vt & de muliere,
quæ scammonia deuorataangebatur, & venter
laxari non potuerat; sed malo punico aut pyro su-
pra assumpto, symptomata cessarunt, & aluus solu-
ta fuit.

SCHOLIA.

Citra alui deiectionis contrariis fit ex causis, qui-
bus pigra alui deiectionis fiat, cum nimirum ci-
bus liquidus vel lubricus vel pinguis nimium est,
cum is sua copia ventriculum & intestina, quasi
pondere grauius onerat; & præterea quædam a-
crimonia eum pungit atque vellicat, siue ea ex me-
dicamentorum genere, siue cibis sit corruptus, si-
ue biliosum & acre corporis excrementum sit, ali-
unde eo confluens, aut etiam illic genitum, *vt re-
cte docuit Fernelius.* Hæc quippe etiam aluum red-
dunt, quæ & liquida, & saepius quam ex consuetu-
dine deiciunt. Exiis autem, quæ exeunt profluui-
orum differentia statui debent, de quibus postea
suo loco libro sequenti dicemus. Adquam etiam
in primis pertinet Cœliaca affectio, de qua prius
dictum est; & lienteria, de qua, tum etiam aliis
profluuiis, postea agemus. Ceterum quum ali-
quando eueniat, quod resolutis musculis ani ex-
crementa vltro exeant, nec retineri possint. Ideo
quoque Auicenna proprium caput ponit *de rugitu
& exitu ventositatis inuoluntario:* & solus, vt puto,
inter neotericos Arculanus huius meminit, ante-
quam de colico dolore & iliaco scribat; quem le-
gere poteritis. Cum autem fiat ob cibos flatuo-
sos, aut malam ventriculi coctionem, vel ex frigi-
ditate ac paucitate caloris innati, eandem curam
vult esse, quam de ventositate ventriculi & intesti-
norum diximus. Alioqui si contingat ob resolu-
tionem intestini recti, vel musculorum sphincte-
ris, eadem curatio erit cum paralyti. Sed quod ad

Citra alui deiectionis causa.

De rugitu & exitu ventositatis inuoluntario.

alui deiectionem voluntariam attinet, cum ad genus profluuiorum alui pertineat, de ea postea dicemus. Nunc de vermibus exempla adferamus, cum & in colicis ac iliaticis malis (*ut prius dictum est*) aliquando appareant, & præterea etiam in alui profluuiis, tum in aliis morbis. Ideo post colicos & iliaticos dolores, antequam de profluuiis alui agamus, de vermibus nunc sermonem faciemus.

OBSERVATIO XXVI.

De puero octo annorum multos vermes deiciente.

PVer octo annos natus, Pithueris in Gallia agens (*in qua vrbe tum praxin exercebam*) a multis iudicatus phthisi ac hydrope laborare, cum vnicus filius esset, a patre ad me deductus est anno 1545. mense Decembr. animaduerto ventrem insigniter inflatum habere ac valde prominentem; qua inflatione per totum annum (*narrantur patre*) laborauerat; adeo ut etiam bursa testium seu scrotum valde inflatum cerneretur; at membra reliqua, quasi macie absorta spectabantur: oculos autem concauos habebat, tussimque etiam sibi subinde valde molestam. Quæ, inquam, omnia iam dicta non semper tabem aut hydropem notant, verum & vermes, Aetii ac Pauli sententia. Plerisque enim (*ut vterque ait*) aliis cibos corruptos deiecit, & tympani modo inflatur: reliquum vero corpus sine ratione contabescit, neque inedia præcedente, neque immodica euacuatione facta. Hæc cum in puero diligenter obseruarem, cum optime comederet, quamquam ex cibo parum nutritur, puerum vermibus laborare conieci, licet altero Normanno medico hoc ipsum negante. Pater tamen nostris rationibus auscultans, puerum curandum mihi tradidit. Cui hæc præscripta sunt. ℞. decoctionis herbae centaurii minoris lb. j. adde oxymel. simpl. ℥. iij. misce. Post septimum diem hanc purgationem propinaui. ℞. endiu. cum radic. centaurii minor. summatum lupul. ana m. j. flor. buglossa p. j. coquantur in aqua communi q. s. & huius colatur. accipe ℥. iij. addendo diacatholici ℥. vj. pul. contra vermes subtilissim. triti ℥. j. syrup. absinthii ℥. ℞. misce. & sexies puer aluum deposuit, & vna xij. vermes, eosque longiores & crassiores, per inferiora deiecit, ventre mirum in modum detumesciente. Et, quod mirum videbitur, semel aut bis iterum decocto centaurii & absinthii communis propinato, plures rursus deiecit vermes, & venter, qui per annum ita inflatus fuerat, omnino detumuit, hac portione adhuc semel ebibita. ℞. decoct. supra scripta collata ℥. iij. addendo diacatholici ℥. ℞. electuar. de dactylis ℥. j. pul. contra vermes ℥. ℞. syrup. absinthii ℥. ℞. misce. Interea in hoc puero victu utebamur ad vermes necandos & expellendos conuenienti, abstinendo ab omnibus lacticiis: vnguento stomachico ventre etiam corroborato, pristinae sanitati restitutus est puer. Vnguentum hoc erat. ℞. olei absinthii, mastichini, ana ℥. ℞. pul. mentha sicca, cornu cerui vsti, aloes. cortic. granat. puluerisatorum, coralli rub. ana ℥. ℞. cera modicum, fiat vnguentum.

SCHOLIA.

PVerilis autem magna ex parte hic affectus est: sed tamen & seniores a vermibus quandoque vexantur. Hippocrates, aut quisquis auctor lib. 4. de morbis, lumbricos non modo latos, sed & rotundos in pueris ait, dum adhuc in utero sunt, nasci, quia aliquando cum recens natorum excrementis visi sunt excerni. Eosdem vero vermes & alios parere ait ibidem Hippocrates; quod quidem & quandoque contingere obseruatum: nam per medicamenta expulsi reperti aliquando nonnulli sunt alios in ventre habentes. Atque hinc fit, ut post expurgatos vermes alii subinde iterum in intestinis renascantur, veluti mulieri cuidam apud Dodonæum, quæ singulis mensibus præseruationis causa hieram picram assumens, tamen aliquot semper vermes aut vermiculos excreuit, quadraginta plus minus. Sic & apud Beniuenum Laurentii Lanii filius, septimum agens annum, triduo cum ex nimia lumbricorum vi ferre mortuus iacisset, solo potu ex gramine, aceto & zaccharo puer reuixit: & quarto die ex medicamento ex aloe, myrrha & croco ei propinato, duodequingenta supra centum vermes per aluum deposuit, & statim conualuit. Lumbricos Græci ἐλμινδας nuncupant, quamquam communi vocabulo quidam (*ut etiam Galenus i. de loc. affect.*) omnium lumbricorum differentias intelligunt; quod & longiore sermone Donatus cap. de lumbricis explicat: quamquam variae sint lumbricorum species seu differentiae, pro varia putrescentis materiae figura. Alii longi sunt ac teretes, in superioribus gracilibus intestinis orti, (quos & Galenus cum Hippoc. 14. meth. ἐσθλὸν λῆς seu teretes nuncupauit, ita & Paulus:) e quibus, ut Fernellius refert, dum cibus descendit, obnituntur & sursum plerumque irrepunt in ventriculum, quem grauib. torquent symptomatis. Inde per gulam os ipsum conscendunt, e quo hiantes profiliunt; clauso vero dormientibus per palati cauum obrepunt in nares, forasque prodeunt, ut nos sæpe quoque vidimus. Alii breuiiores sunt & cucurbitæ feminis effigie, quorum procreatio est vel in cæco intestino, vel in coli cellulis: atque hi sæpe mira serie inter se coherent. Alii exigui sunt, & tenues (*ascarides appellant*) quibus ferre sedes est in recto intestino & extremo sphinctere: adultis nonnunquam horum multitudine faeces consperguntur. Hos sæpe aduertimus interdum ab ano pruritu quodam emergere, hincque in femora natesque quoquoersum serpere. Celsus vero duas tantum differentias vermium ponit, latorum & teretium: Alii quatuor genera recensent (*ut aliquibus placet apud Rondelletium*) scilicet rotundos, longos, & alios paruos albos similes vermibus casei. Tertium genus est illud, quod a latitudine latus vermis dicitur; ab aliis quoque tinea appellatur. Nam Græci tineam appellant fasciam oblongam & albam. Hic vero trium aut quatuor digitorum est, aut quinque, qui secundum longitudinem intestinorum extenditur, vel circūplicatur, ut longiores aliquando sint ipsis intesti-

Multitudo
vermium reia-
ta.

Lumbrici.

Αἱ σπογγύ-
λαι.

Αἱ πλα-
ταί.

Αἱ σκαρί-
δες.

intestinis, ut qui tricenum sint pedum, vel plurimum, teste Plinio. Tæniam Valeriola vidit longitudine nouem pedum, aut etiam amplius. His itaque præter latos quartum longissimum quidam adiciunt, eumque Tineam nominant, quamquam sub latis comprehendi potest. Sic & cucurbitinos a latis separant, quod neque illius fœtus esse possint, ut quidam arbitrantur, neque partes animalis, cum ipsi sint animalia. Fernelius vero latos ad cucurbitinos refert: Amatus ad ascarides. Sic non desunt, qui quinque genera vermium ponant, & eosdem a se inuicem distinguant. Rotundi siue teretes in superioribus intestinis, tinea, longi, lati, cucurbitini extensi per intestina: licet cucurbitinos a latis oriri volunt, quod alii negant: at ascarides iuxta anum. In qua diuisione, cum ex rei natura sumpta non sit, & membra simul permisceri queant, nihil mirum confusionem reperiri & controuersiam. Constat enim longos & rotundos in superioribus intestinis contineri, & per os reici. Anno 1553. in collegio Diuæ Barbaræ, puer annos 12. natus interuallis vomere solebat, longos vermes, albos, e ventriculo. Musa scribit senem annorum 82. in extremis possum accidentibus, quæ vermiculosis pueris accidunt, & cum graui halitu, qualis pueris esse solet, plures quingentis excreuisse, medicamento ex scordio & corallina. Rusticæ cuidam mulieri plures prodierunt, cum antea incredibili palpitatione & fluctuatione ventris laborasset, inde assurgens & tumens, ut in grauidis consuevit robusto fœtu. Puer apud Amatum centur. 6. cur. 3. trecentos egessit iustæ magnitudinis; sed idem postea mortuus. In Auinionis balneis, quæ sunt in agro Senensi, inquit Beniuennius, mulierem vidimus, quæ continuis septem diebus aqua epota, quam plurimos tandem ex iis, quos medici, propterea quod cucurbitæ semina imitantur, cucurbitinos vocant, vermes reiecit: qui ita inter sese (dum scilicet alter alteri mordicus inhareret) iungebantur, ut cum sua ipsi serie quatuor cubitorum longitudinem excederent: vnum tantum corpus, vnum duntaxat vermẽ putares. Hic per vermes cucurbitinos latos intellexit, quamuis & cucurbitini etiam dicuntur, quod quædam ab hoc abrupta cum excrementis alui quandoque excernuntur. Latum autem lumbricum permutationem esse pelliculæ intestina intrinsecus ambientis, in corpus quoddam viuum, Aetius scribit. Hunc quoque; iuxta Hippoc. de morb. connasci pueris in vtero materno, postea augeri cum puero, constat: de his vide plura apud Donatum. Vide, (inquit Dodonæus amicus noster) & curauit olim honestum virum ab huiusmodi verme male habentem, qui quandoque ab assumpta portione purgante ex ano suo lati lumbrici vlnas duas aut tres extraxit, & post aliquanto tempore melius habere sibi videbatur. Pallidus autem hic erat, & cibum quandoque vehementer appetebat, alio tempore fastidiebat. Memini puellam (inquit idem) nouem annorum ab assumpto verme pellente medicamento non lumbricis, sed eruci similes vermes reieciisse, aliquanto tamen breuiiores, multipedes, & quidem adhuc viuentes. Sic quidam (ut Henricus a Bra, Documana reipubl. me-

dicus mihi scripsit) nuper de cordis dolore fere perpetuo duobus annis grauitè conquestus, assumpto medicamento vomitorio, vermem erucæ similem excreuit: quem cum euomisset, perfecte sanatus est. Narrat & Cornelius Gemma de diuinis characteribus lib. 1. cap. 6. varias vermium species, tum & alia per alium excreta. In puella catocho laborante, glande ex melle indita, sine sordibus duo & quadraginta vermes (apud Alexandrum Benedictum) in globi modum reiecti, unde hæc ad vitam rediit. Quamquam vero lumbrici ex omnibus corporis partibus maxime intestina occupare soleant, exiguos tamen interdum & ipse Fernelius in renibus genitos vidit cum vrina profusos, & in pulmonibus, & in auribus, & in dentibus: sæpe etiam in neglectis abscessibus, vlcerebus sordidis. Ita & Tharantanus inquit: Dico, quod vermes etiam in aure aliquando generantur: & ego vidi expellere ab aure vnus iuuenis febrem habentis acutam, duos aut tres vermes ad formam granorum pini: erant tamen grossiores: & sanatus fuit homo. In auribus autem vermes gigni satis ex iis constat, quæ apud Dioscoridem, Galenum ac Aetium, de calaminthæ facultatibus scripta sunt: sed tunc præcipue quando diuturnis vlcerebus laborant; ut in Euporistis Diosc. plane ostenditur, his verbis: Vermes in diuturnis vlcerebus generatos interimunt hæc: oleum amygdalinum, calaminthæ succus, &c. Idem non minus apertis verbis 7. de simpl. medic. facult. apud Galenum etiam habetur. Vermes quoque e naribus proiectos & nos vidimus. At vomitu vermes reici frequens est: sed vtrum in ventriculo (ut Amatus existimat) possint generari, difficile fuerit affirmare. De his vide longiorem sermonem apud Donatum, qui multis rationibus id non posse fieri demonstrat. Vermes per intestina excerni sæpe vidimus in febribus putridis, malignis ac pestilentibus, ac sæpe etiam per vomitum reici, ut ostendimus multis exemplis in libris nostris, de febribus. Sed magis mirandum est per vmbilicum excretos, ut retulimus lib. 7. de feb. symptomatis, obser. 35. in scholio. Sic etiam (ut mihi scripsit Henricus a Bra) videre mihi contigit puellam bimulam, cui vermes per vmbilicum, diebus aliquot ante mortem, exierunt: siquidem sæpe vermes corrodunt perforantque intestinum, quo concluduntur, ac inde in varias partes alui penetrant, adeo ut aliquando per inguina, alias per vmbilicum perrumpant, via exedendo facta. At mulier nostra, de qua diximus obs. 35. lib. 7. vermes per vmbilicum reiciens curata fuit. Vermem quoque e nare proiectum habes apud Beniuennium c. 100. & vermem ex pectore propulsum idem scribit c. 77. In eadem annotatione refert Dodonæus, vermem in vesica posse nasci: & in quodam viro vidit per penem reiectum. Vidimus & nos puellam Brielsen anno 1568. duos scarabeos vomitu reieciisse, vno per duos dies superuiuente: sed & animalculum viuum reiecit instar vermis parui, lōgitudine dimidii digiti in capite duo cornua habens, ad rufedinem tendens. Reiecit autem per colatorium. Reiecit etiam vermes alterius formæ per nares. A-

Vermis longitudine nouem pedum.

Car quidam quinque genera vermium ponant.

Vermes longi albi e ventriculo vomitu eieci.

Quingenti vermes a senereieci.

Trecenti vermes reieci.

De abd. mor. caus. cap. 87.

Historia Dodonæi.

Vermes eruci similis reieci.

Vermes in auribus.

Lib. 4. cap. 30.

Vermes e nari proiecti.

Ex pulmone & vesica.

Scarabei reieci.

lius quidam (*vt idem Henricus a Bra mihi scripsit*) ab assumpto vomitorio hirudinem excreuit. Alius assumptis pilulis Ruffi vermem per posteriora reiecit duorum cubitorum, plurimis spiris quasi cingulis rubeis æquali interuallo distinctum. Nunc ad alia exempla progrediamur.

OBSERVATIO XXVII.

De adolescente octodecim annorum ex vermibus laborante.

I. **A**dolescenti octodecim annorum, eodem tempore, cum vermibus afficeretur, summa cum laude exhibui cochlear vnum succi granatorum, & cochlear dimidium olei oliuarum simul commixta: eo quidem (*dictu mirum*) quinque sedes habuit, multosq; vermes simul deiecit. Nobilis quidam Gallus, D. de Chamou, hoc arcano utebatur, dicebatque Reginam Galliæ solitam esse hoc remedio vti in pueris suis. Elideus præceptor meus in pueris dabat *puluerem corallina, rhabarb. electi, ana ʒ j. cum aqua graminis, syrup. viol. exiguo adiecto*. Lucas Chinus medicus Bononiensis, amicus noster familiaris, millies per se expertum iureiurando mihi affirmabat vsum solius succi herbæ Graligæ dictæ.

S C H O L I A.

2. **C**ommunicant autem diuersæ vermium differentia in materia generationis quodammodo; quoniam, iuxta Aristotelem, in excrementis oriuntur, adhuc intra animantem contentis; & secundum Galenum *commen. aphor. 26. lib. 3.* communicant etiam in generatione ex putredine, in crassa pituitosa materia, putredini accommoda, *ex Paulo*, non vero ex bile aut bilioso succo, cum amaritudo potius eos perimat, neque ex sanguine aut atra bile. Si vna flaua bilis cum lumbricis infra aut vomitu eruperit, humor biliosus ventriculi os aut aliam quampiam partem mordicat. Ex crassa potius pituita (*etiam dicente Fernelio*) & lenta, quæ in intestinis frequens corrupta præparataque fuerat, ab vberissimo infuso calore suscitatur, vitamque sumunt, eorum animalium exemplo, quæ ex putri materia cœlestis caloris ope vitam habent. Lumbrici enim, vti & anguillæ, sine coitu gignuntur; quod Benedictus Veronensis exemplo quodam docet. Fiunt autem (*inquit Rondeletius*) a pituita vel a chylo viscoso. Quod si talis materia continua sit & extensa animatur, non vt Aetius putauit, quando tunica intestinum interior abscedit: nam impossibile tunicam illam abscedere, & accipere vitam. Aliqui quoque putarunt cucurbitinos esse fœtus lati lumbrici, sed id falsissimum est: nam nulla est sexuum distinctio, & ex putredine generantur. Alii autem dixerunt cucurbitinos esse frusta lati vermis: sed neque id verum est: nam cucurbitini videntur esse animalia, non partes animalis. Fiunt omnes ex putredine. Conueniunt quoque in agente, qui calor est non absolute putridus. Etenim sola putredo non est sufficiens ad eos generandos, *vt inquit Galenus*; sed & calore plurimo indiget, naturali inquam, qui materiam obtineat idoneam ad talium animalium generationem. Non itaque imbecillus

ac exiguus requiritur calor innatus pro lumbricorum generatione, sed validus ac plurimus, *vt patet 14. aphor. libr. 1.* ratione ætatis, cum humiditate permixtus, *vt 3. prognostic.* Conueniunt & in loco, quod omnes in intestinis generentur, non autem in ventriculo, *vt quidam volunt*: de qua re ad longum vide Donatum ab Altomari: quamquam fiant in sacco magis, quam in alia parte. Ascarides circa sedem: Lati secundum longitudinem coli. Si multi sint, qui chylum assumant, corpus minuitur, aut laborant quasi boulimia, ob assumptionem alimenti. Si quiescant in suis locis, alimentoque abundant, nihil noxæ adferunt: sed si soluantur ab intestinis, & ventriculum ascendunt, potissimum teretes, per os & nares reiciuntur, vel si os ventriculi mordeant, animi defectionem inducunt. Differunt tamen etiam inter se, si quis magis particulariter scrutari voluerit, tam in materia, quam in agente: quoniam licet ea putredo sit, vnam speciem quam alteram, a maiori vel minori putredine ortum habere reperies: sic etiam ex multa, vel pauca materia putrefacta maior aut minor putredo apparebit: & quamuis eorum omnium generatio a calore plurimo fiat, tamen idem calor respectu diuersarum differentiarum lumbricorum iam dictarum, quandam habebit in eius magnitudine differentiam. Ita quoque in loco licet vniuersaliter communicent, quoniam non nisi in intestinis generari possint; differunt tamen, quoniam teretes in superioribus magis intestinis generantur: ascarides in parte maxime inferiori crassi intestini: ipse lumbricus latus, qui longissimus quoque est, sæpe per tota extenditur intestina, quamuis, rarior sit eius generatio, *vt inquit Galenus comment. aphor. 26. lib. 3.* licet intenuibus præsertim oriri incipiat, *Aetio auctore cap. 40. lib. 9.* Quo fit vt propterea diuersa sit eorum forma, seu figura. Ex his dictis patet, quod intestina afficiantur, licet in teretibus intestina gracilia præsertim; in ascaridibus crassum & rectum, in latis, vbi in longum extendantur, tam tenuia quam crassa affecta sint. Patet insuper morbos esse in numero, tota substantia præter naturam, *quemadmodum Galen. testatur lib. de diff. morb. & 14. meth. meden.* Constat enim ex supradictis, quæ sit omnium trium communis causa ac vniuersalis, nempe putredo ipsa, *ex Galeni testimonio*. Paulus autem crudam, crassam pituitam ac putredini accommodam omnium generum originem ac causam esse scripsit. Interea & aliæ sunt causæ, quæ omnibus materiam suppeditant, vt cruditas & crapula, deinde eorum vsus, quæ facile putrescunt, vt lactis, casei, fructuumque dulcium & fugacium. Itaque pueri quam adulti his multo sæpius affliguntur, quod illorum calor humidior sit, confertioreque halitu perfundantur. Sicuti autem phlegma causa est materialis vermium, ita causa immediata est indigestio ex debili calore procedens, in comparisonem ad cibaria iam dicta, iisque similia, sumpta, vt sunt fructus cibi que viscosi, fabæ, recentes fructus, pisces lacunales, & alia: quæ facile putrescunt & corumpuntur.

4. *Quod in loco etiam conueniant.*

Quibus inter se differunt dicta tres lumbricorum differentia.

5.

Partes affecta quæ sit.

Quis affectus præter naturam sint lumbrici.

Communes lumbicorum causa.

Causæ adiuvantes.

OBSERVATIO XXVIII.

De Vermibus e nare proiectis.

Vermes autem e naribus aliquando proiectos constat. Sic puella quædam (vt refert interpres Hollerii) ad portam Diui Iacobi Parisiis album vermem, latumque, palmo maiorem, satis crassum reiecit per nares, nulla tussi, nullo vomitu antecedente: præcesserat huic puellæ acerbissimus capitis dolor per duos dies. Ego etiam cum puer essem, vti sæpius postea adolescens a matre mea carissima audiui, plures per nares reieci. At cum mater sæpe mihi puluerem contra vermes, cum zaccharo dedisset, ab hoc fædo malo liberatus fui. Iuencula quædam, filia ministri Hasselensis, lumbricis laborans (vt mihi aliquando scripsit Henricus a Bra medicus Reipublicæ Doccumana) motus aliquos conuulsuos perpeffa, vermes duos ex nare eiecit: quæ postea dextre adhibitis remediis elinithagogis perfecte sanata est. Id tamen frequentius fit, cum vermes ab intestinis ventriculolum tubeunt, deinde per gulam os ipsum conscendunt, e quo hiantes profiliunt; sed ore occluso per palati cauum obrepunt in nares, forasque prodeunt. Sed rarius exemplum esse videtur, si a cerebro descenderit in nares. vt apud Beniuenum ca. 100. legitur de abditis rerum causis, qui & cephalalgiam præcedentem, cum in septimo mors expectaretur, expulso verme per nares, sanauit. Dodonæus existimat vermem vehementis doloris capitis causam in cerebro natum fuisse, quamuis forte e ventriculo, deinde per gulam repens per nares prodierit. At Dodonæus, vt hanc suam opinionem confirmaret, hunc Iacobi Hollerii locum adducit, e lib. de morbis internis 1. cap. 1. vbi hæc scribit: Quibusdam, inquit, vermes generantur in cerebro. Id rarum esse scribit Auicenna: quod tamen memoria nostra visum est. Et eundem Italo ex frequenti odoratu basilica herba natus scorpio in cerebro, vehementes dolores & longos, ac mortem denique attulit. Sed de his alias diximus scholio obseruat. 2. lib. 9. cum de capitis dolore ageremus.

SCHOLIA.

Communis quidem opinio medicorum est, (vt nunc antea diximus) vermes in intestinis generari, non autem in ventriculo, vt quidam autumant; Amato in contrarium sentiente, vt paulo antea dictum est. Gradus vero, qui hanc quæstionem longo sermone prosequitur, refert, vermes non tantum in ventriculo, sed in singulis partibus, præterquam in corde, posse generari. Vide mirabilem historiam apud Beniuenum, de verme longitudinis digitorum quatuor vomitu reiecto capite rubro laui rotundoq., quod pisi magnitudinem non excederet: cetero corpore lanugine quadam contexto, cauda fureata ad similitudinem nouæ lunæ: pedibus nixus quatuor, duobus in dexteriores, totidem in sinisteriores partes coaptatis. De causis satis diximus. Verum quod ad signa attinet, aliquando adeo obscura sunt, & symptotaata adeo multa, & cum aliis morbis communia sunt, vt doctissimos aliquando medicos fallant. Sic apud Beniuenum legimus cap. 29. de puero quodam lumbricis laborante ac satiato,

qui nullo modo quiescere poterat: sed ita semper hinc inde temerario quodam impetu & inordinato motu ferebatur, vt etiam stare volens iterum titubaret & caderet, medicis iudicantibus huius mali causam distensionem cum saltu esse: coniectura facta ex quodam tumore, in quem paucis diebus puer incidisse dicebatur. Sed iis nihil proficientibus, in manus Beniueni deuenit: qui nullam aliam causam inuenit, quam lumbricos: & hac intentione curandi vermibus expulsis, puer breui pristinam recuperavit sanitatem. Sic Ioannes Francisci, puer 12. annorum, de quo nos egimus lib. 6. obseru. nostrarum, obseru. 38. qui per duas septimanas ex vermibus in febre pestilenti obmutuerat, & a me curatus fuit. Ita & puella in Cornelie familia apud Benedictum Veronensem lib. 5. cap. 15. (cuius & antea nos mentionem fecimus) octo diebus muta permanebat, rigentibus oculis; & emissis XLII. vermibus sine sordibus vna conuolutis, liberata fuit. Iacent aliquando, vt mortui illi, qui vermibus laborant, vt filius illius Ianii, apud Beniuenum, vt scholio Obseru. 26. huius libri diximus. Præterea in morbis epidemicis & peste multos vermes deiectiones vidimus, cum variis symptomatis: vt ad longum poteritis videre lib. 6. obseruat. nostrarum de morb. epidemics & peste. Fuit & aliquando morbus epidemicus Saraguse, quem & famem appellabant, cum omnes ex eo correpti saturari non poterant; & cum infiniti morerentur, medicus quidam sagax propinauit omni mane bolum armenum: verum modo per se, modo cum theiaca: quibus per anum infinitos & in orbem coactos vermes deiecerunt; & præter mentem quam plurimi restituti sunt. Id quoque experimento declarat historia illa de verme apud Alexand. Trallianum lib. 7. cap. 6. de boulimo, de muliere immodica assumente, quæ saturari non poterat; sola hiera vermem eiecit, longitudine duodecim cubitorum. Quam historiam & antea, cum de ventriculi affectibus ageremus, etiam retulimus. Hinc lumbricorum signa ita varia, & diuersis notis a medicis describuntur, quæ in vermiculosis aliquando apparere solent: qualia sunt ventris distentio, cum murmure atque torsione: quibusdam & lientericum profluuium adest, corporisque dissolutio, faciei pallor, oculorum suffusio, vel suggillatio, narium pruritus. Quumque sursum obrepunt, agitati (maxime per mediam & cibi penuriam) intestina morsu aut suctu feriunt. Adeo nos aliquando acutos vidimus subulæ instar, mirum quod intestina non perforant: & interdum adeo feriunt, vt nonnulli conuulsi perierint siccam tussim etiam mouent, aliquando & oris ventriculi præcordiorumque punctione animi defectiones, syncopas, epilepsias: ascensu vero tremorem, deuorandi conatum, & strangulandi merum inferunt; quibus malis multi infantes misere cum maximo vlulatu sunt extincti. Qui autem tentantur a vermibus, iis initio statim translucent oculi, nocte sudore profluunt, in somno obloquuntur, dentibus strident, ori digitos admouent, sæpe tussunt; & commanducare videntur. Si quando

Stos medicos aliquando sal. lant.

Puer lumbrici vexatus qui escere non potuit.

Muti ad tempus ex vermibus.

Puer iacens, quasi mortuus ex vermibus.

Morbus epidemicus cum vermibus.

Verme longitudine duodecim cubitorum eiectionis.

Lib. de abditis morbor. & auffs. cap. 2.

Signa vermium adeo obscura, adeoque multa symptotaata, & cum aliis morbis communia sunt, vt doctissimos aliquando medicos fallant.

ad fauces usque penetrant lumbrici, tum subito pauore expergiscuntur. Pruriunt præterea nares, ut diximus, aures sibilant, aut murmura sentiunt interiora. In ventrem facilius accumbunt: contra lethargici supini iacent. Interanea murmurant, asthmate graui tentantur. Increfcente morbo cor supra modum palpitatur, oculi semiaperti cernuntur, aut oculis apertis non conniuentibus stupent. In somno saluant ora infantibus, die sitis magis accenditur, lingua labiaque arefiunt: Si acuta febris adfuerit, aliena loquuntur. Horum multa exempla posuimus in *libr. nostris de febribus*; Furore agitantur, & in supremo cruciatu, distentionibus comitialiter ore spumante torquentur: venter veluti tympanicis intenditur, ut in illo puero, de quo supra dictum est *obseru. 26*. Aliis & intercisiones, tormina, vel colici dolores adfunt, modo alius cita est, modo supprimitur. At communiter symptomata noctu magis sæua sunt, quam die, reuocato ad interna calore: quo tempore & rotundi vermes magis infestant. Magis sæuiunt percepto alimento aut consumto: tum enim acrius mordent, escam quæritantes. Ita pueri quidam initio protinus cibi tædio excruciantur, & crebris vomitionibus affliguntur. Tum vero lumbrici magis affligunt fame victi: nam ventrem morfu lacerant. Quosdam pueros fames vexat, sed raro id euenit. Alii somno profundo tenentur: aliqui in somniculosis tota nocte existunt, quos ictus vermium inquietant. Quidam & subito metu, formidineque vana excitantur, vel nocturnis quibusdam paucioribus, umbrarumque terriculis falsis profiliunt & clamant: tales sunt, qui natura timidi existunt, candidæ cutis, ac carne molliores. In supremo cruciatu venarum pulsus subducitur; quando reuocatur, tenuis subsultat, nam & frigore extrema corripuntur. Varia itaque inducunt symptomata. Nam chylum consumendo corpus minuunt: in ventriculo, ut iam diximus, vomitum, famem, syncopen mordendo adferunt; & aliquando iugulare videntur. In recto intestino pruritum excitant, & tenesmus: in ventre medio fluorem alui, lienteriam, ventris inflationem. In omnibus aliquando inducunt febres quotidianis similes, inordinatas & horrificas; & si arrodant intestina, sæpe interficiunt. Hæc eadem vermium signa sunt, sicuti anhelitus foetens, tussicula inanis & sicca, & summatim clamore expergiscuntur ægri, arctius dormiunt, strident quodammodo dentibus, adest morsus, nausea, fastidium & similia. Sed hæc exemplis subsequenter clariora euadent.

OBSERVATIO XXIX.

De puero per tres menses in lecto decumbente & contabescente: qui deiectis vermibus mox conualuit.

ANtonii poculorum fusoris, cognati nostri filius, annos nouem natus, cum anno 1547. Alcmariæ per tres quatuorve menses lecto decubisset contabescens, neq; vllum dolorem sentiret, nisi exiguum quendam in ventre circa umbilicum; & cum idem dolor ne effatu quidem di-

gnus esset, & naturales secessus quotidie haberet; (*puero tamen indies magis magisque contabescente*) nulum medicum pater consuluit. Verum cum tandem puer adeo macilentus fieret, ut pro D. Hieronymo extreme macilento depicto haberetur, pater me in consilium adhibuit, ut curari posset. Puerum cum spectassem, non potui non genus morbi abstrusum admirari, puero optime comedente, quamquam ex cibo nullum nutrimentum caperet, & vrina sano similis existeret, ac boni coloris, licet tenuis & substantia crudior. At dolor exiguis ille circa ventrem, & fames, de vermibus mihi suspicionem quidem præbuere, sed obscuram. Ideo tentandi causa decoctum sequens omni mane ad cyathum vnum duabus horis ante cibum, & hora quarta pomeridiana, propinaui; & ilico puer vermes infinitos deiecit: & hoc solo decocto miraculi instar statim puer, maxima cum nostra laude, sanus factus est, ita ut statim a cibo sumto, corpori nutritio ac augmentum accesserit, & ex macilento, crassus & bonæ constitutionis euaserit. Tale erat decoctum. *℞. hyssopi, maioranae, feniculi, ana m. ℥. fumariae exsiccatæ* (nam in hyeme eramus, mense Ianuario ad puerum acciti) *centaurii minoris, absinthii communis, ana p. j. coquantur in aqua communi, pro ℥ j. colatura addendo oxymel. simplicis, syrup. de fumo terræ, mellis rosæ. colati, ana ℥ j. misce.* Statim a medicamento epoto quotidie tres quatuorve vermes deiciebat puer, & cibo assumto nutrirî cepit: nec alio opus habuit, quam hoc simplici remedio, cum & ventrem naturaliter per se deponeret.

S C H O L I A.

MAgis nota fuerunt signa in illis pueris, apud quos diuertebat Amatus, qui vermium morsu lancinabantur: nam capite dolebant, tremore corripiebantur & frigore, ac inordinata febris affligebantur. Ex quibus nonnulli nares scalpebant: digitos in os mittebant: & quæ comdebant, euomebant. Omnes vero sanitati restituti sunt; præcipue ii, qui aliquid iam comdebant. Alii lactentes tantum alia excogitata via incolumes quoque perseverarunt. Primis semen lumbricorum zaccharo incrustatum pondere dimidiæ vnciæ dedit; & non febricitantibus vini pauxillum generosi: febricitantibus aquam portulacæ, graminis, aut in qua semen coriandri incotum fuit. Deinde singulis ℥ ℥ diasebesten in bolo aut rhab. ℥ j. exhibuit. His per secessum omnes emittebant vermes: & sanitati pueri omnes restituebantur. Qui lac sugebant, nutritibus singula iam citato ordine dabat, aucto pondere. Sic enim docuit Hippocrates lib. 6. *Epidem. Mulier, capra, cucumerem agrestem comedentes, pueris purgatio.* Cui postea subscripsit Galenus lib. 3. *aliment. cap. 14. & lib. 5. de tuenda valetud.* A quibus omnes postea medici hæc mutuati sunt, & in libris suis inseruerunt. Quam varia sint signa tam in pueris, quam adultis vermes habentibus, multis exemplis videre licet in *nostris commentariis de febribus*. Ceterum, ut hæc notiora fiant, scire oportet alia esse signa præsagientia vermes, alia demonstratiua; alia vero vniuersa-

4.
Signa præfagi-
enda.

Signa demon-
stratiua.

5.

Signa cum ali-
is morbis com-
municantia,
quomodo di-
stinguenda.

6.

Signa Specie-
rum.

Teretum lumi-
bricorum signa.

vnus cuiusque speciem indicantia; alio vero me-
ra prognostica. Sic in pueris post dentium eru-
ptionem expectamus vermium generationem:
in senioribus ob humiditatem: & in his qui sese
replent; & vtuntur rebus facile corruptibilibus,
vt 6. epid. cap. 7. & 11. Continentis cap. 6. præcipue
in his, qui lac & pisces non perfecte salitos come-
dunt, vt & in autumno ob vsum fructuum recen-
tium. In iuuentute magis infestant, quam in sene-
ctute. Plinius & in quibusdam regionibus magis
afficere vult, vt Ægypti, Arabiæ, Syriæ & Cilic-
ie populis magis familiares sunt vermes: sed Th-
racibus & Phrygibus minus. Signa autem demon-
stratiua quædam communia & magis absolute, a-
lia vero magis propria vnicuique speciei. Com-
munia quatuor ponit Auicenna: Primo, *cursum
salina, & humiditatem labiorum in nocte: & eorum ex-
siccationem in die: ratio, quod caliditas die expanditur,
noctu coarctatur.* Secundo *rixam & horribilitatem
locutionis, iracundorum instar, & malorum morum, &
mentis alienationem, & paraphrenitidem ex vaporibus
a vermibus sursum elatis.* Tertio, *stridorem dentium,
magis noctu: & sæpius videntur aliquid masticare, vt
dictum est: ex vaporibus enim elatis sunt motus spas-
mosi in lacertis mandibularum, hinc dentium & simul
labiorum suctio & manducatio.* Quarto, *ponit pun-
ctiorem & morsum circa ventrem: quamuis hoc si-
gnum minus certum sit, cum ex biliosis humoribus in
intestinis retentis etiam fieri possit.* Mutatur & his
color faciei subinde ad liuidum, modo ad subrubrum,
ex retracto calore. His subinde accedunt & caros,
syncope, febris, frigida membra extrema, manus ex-
tensa, cum interiectione lamentabili, sudoreque frigido.
Venter quoque si tangitur durus est: mouetur quoque
sub manu subinde, pulsusque debilis & diuersus: cui ad-
dere poteris, & fetorem anhelitus, & tussiculam ina-
nem & siccam, & alia supradicta. Licet autem nunc
quædam signa dicta communicent cum phre-
nitide, epilepsia, colica; facile tamen distin-
guuntur: phrenitis enim continua deliria ha-
bet: vermes tantum per intervalla, ex solis va-
poribus sursum elatis. Non ita venter in vermi-
bus constipatus est, vt in colica: pallent quoque
magis colici. Ab epilepsia licet strideant denti-
bus; id quidem per intervalla; nec ita continuus
est ille stridor, vt in spasmo aut epilepticis paroxysmis.
De signis vero specierum, primo teretum, seu ro-
tundorum notas explicemus, cum inter alias fre-
quentiores fiant cum febribus & citra febres, at-
que speciem habeant omnibus perspicuam, Pau-
lo teste. Similes namque sunt vermibus in terra or-
tis, quos Græci *πτερυγῆς*, hoc est, intestina terræ
appellant, vulgus oñisculos vocat. Hoc sequitur,
incredibilis morsus stomachi, ventris ac intesti-
norum, tussis exigua cum siccitate irritantes. In
somno tremunt, & præter rationem exsurgunt
nonnulli, & cum clamore expergescunt & ite-
rum sopiuntur: quidam singultiunt, & quidam
linguam foras protendunt, oculosque claudunt,
& taciturni sunt, excitarique se moleste ferunt,
ob imbecillitatem vigilare nequeunt; & den-
tibus frendent, ac superuacue mandunt, præter-

tim si infantes fuerint; & quidam eorum neglecti
motu pulsus destituuntur, ac refrigerantur, atque
eorum instar, qui animo linquantur, tenuem
quendam ac frigidum sudorem exsulant, & plu-
rimum liuescunt; modo & facies fit rubicunda,
maxime circa malas. Verum color hic rursus in
pallorem solito maiorem transit. Quidam etiam
pulsus inæqualem habent, obscurum, deficien-
tem, ac recurrentem. Aliis etiam appetitus perdi-
tio accedit, & febres augescunt inordinatæ; quæ
cum extremorum perfrictione, tertia & inter-
media quarta die, vel nocte accessionem sine ratio-
ne habent. Alii instar delirantium peregrina in
somnia loquuntur, interim cum clamore præter
rationem exsurgunt, citoque rursus collabuntur.
Alii decubitus transmutant, continuè dormien-
tes, angoreque vexantur, & ex loco ad locum sese
vicissim proiectant: atque multi inuocales omni-
no persistunt: interim præter id, quod cibum auer-
santur, si quid acceperint, reuomunt, aut nause ab-
undi vix deglutire possunt. Plerisque vero alius
descendit, corruptos cibos egerens, & tympani
modo (vt in puero illo 12. annorum ostendimus) ven-
tere eis inflatur, & quidam etiam oculos sanguine
suffusos habent. Cuncta vero hæc accidunt, tum
ab ipsis animalibus in intestinis obuolutis, seu
cum per eadem serpunt, ac rodunt & morsum in-
ferunt; tum ex febrili calore transmittente præ-
uios vapores ad cerebrum, exhalantes ex putrida
in ventre collecta humiditate, vt Paulus refert. Ex
ea item, quæ præcessit victus ratione poteris lum-
bricorum generationem percipere. Namque vbi
crassiorum, & quæ difficulter conficiuntur, ali-
mentorum usus præcessit, ac eadem largius inge-
sta fuere, & maxime frumentacea, de lumbricis
suspiciari poteris: eosdem item comperies balneis
a cibo usos fuisse, vt testatur Aetius, ex quo tum Pau-
lo & Aegineta, hæc desumpta sunt. Lari vero lumbrici,
cum aliquando sint valde longi, & sæpe incre-
dibili longitudine, & quia tenuia intestina occu-
pant, in his, qui febre carent, abundant: quando-
que & in longis & diuturnis morbis etiam cum fe-
bre accidunt. Propterea non ab re continuo sto-
machi morsus inferunt, & ad cibos incorrigibi-
lem appetitum. Teste Paulo obiectum alimen-
tum rapiunt, & nisi assumerint, intestina rodunt.
Quæ accipiuntur non subcenturiata, seu copiose
digeruntur, sed cito excernuntur: iis occupatos
comitatur corporis gracilitas, etiam impotentia
seu imbecillitas cum tarditate. Nam quod viui-
ficatum est in intestinis, vbi recens exhibitum ci-
bum consumsit, postea solidum corpus rodit. At
certissimum & minime fallax est indicium, si cum
recrementis quædam semini cucurbitæ seu cucu-
meris similia excernantur, auctore Hippocrate lib. 4.
de morb. & Galeno 1. de locis affectis, quibus & Pau-
lus & Aetius consentiunt. Lari facile ventriculum
ascendunt, & ipsum mordent, vt diximus, & syn-
copen inferunt. Ascaridum vero lumbricorum v-
na species circa extrema intestini, & ani fibulæ i-
nitio *ασκαρίδης* Græcis appellatum, consistit; (vt
liquet ex Aetio & Paulo) vehementem pruritum

7.

8.

Lari lumbrici
signa.

Ascaridum
signa.

9. *illis locis inferens: quod ex vehementi huius loci pruritu, ac assidua ad egerendum irritatione, & ipsi dignoscere poterunt. Hi quoque, ut plurimum ab excretionem melius se habent. Apparent autem manifeste in iumentis male cibum concoquentibus, quorum malam coctionem foetor indicat excrementorum Galeno auctore comment. praecitati aphorism. Quapropter & eorundem indicia, (ut Aetius asserit) potissimum ex graueolentia excrementorum sumuntur. Indicant enim prauos assumptos cibos, ac eorundem corruptiones & frigiditates, quibus species haec lumbricorum generatur, vel eadem Aetio, tum etiam Paulo visum est. Degunt enim in ano conglobari infiniti, qui ob frequentem illam motionem aut succum malignum tenesimum faciunt, & ani pruritus. Imo aliquando pruritus adeo fortis est (teste Auienna) ut syncopen inducat.*

OBSERVATIO XXX.

De nigra deiectione, cum vermibus.

R. Efert Amatus Centur. 2. Curat. 41. de puella ad caput montis aegrotante, quae vigente aetate post vermium tam supra, quam infra reiectionem, cum rem magnam atramento similem euomisset, paucis sequentibus diebus eandem obiisse. Hoc autem signum lethale esse in vermibus existimat. Quamquam nigra reiicientes cum vermibus non semper moriantur; uti euenit puellae Brielenfi, de qua alias diximus; quae similia euomit vna cum vermibus, licet non obierit, & per nos curata fuit. Est tamen pessimum signum: nam alios vidimus in febribus malignis & pestilentibus talia deiectione paulo ante quam morerentur: & magis in principio febrium quid mali praesagiunt.

SCHOLIA.

2. Signa prognostica.

Q. Uod ad prognostica signa attinet, de iis, qui vermes deiciunt, nullum signum simpliciter bonum esse volunt; praesertim illi, qui Arabum decreta sequuntur, cum semper ex materia putrida in corpore humano fiant: & ideo siue febris adfuerit, siue non, semper mali significatio existit. Vnde & Gordonius argumentatur, quod ex sui natura semper vermes mali sint, & ex toto genere praeter naturam: ideo neque per se, nec per accidens quid boni significant. Scribit tamen Celsus, lumbricos aliquos sub finem morbi descendere, nihil nocere. Hippocr. quoque dixit 2. Prognosticorum lumbricos teretes eunte in iudicationem morbo descendere idoneum esse: interea tamen magnam curam habere conuenit circa eorum curationem praesertim teretum. Nam multi, nulla lumbricorum cura habita (ut inquit Paulus) exesi ab ipsis sunt, & conuulsi interierunt. Alii tradunt se lumbricos vidisse, qui ex inguinibus agri eruperint, ut ipse refert: nos quoque vidimus ex umbilico erupisse, ut in septimo lib. de febrium symptomatibus, scholio obser. 35. recensimus. Quod autem in infantibus, & pueris, atque iis, qui ad pubertatem accedunt, maxime abundant teretes lumbrici, scriptum reliquit Aetius, ex Herodoti auctoritate: item quod peiores censentur maiores minoribus, paucis multi, & albis rubri. Viuentes etiam

mortuis deteriores sunt. Aliqui tamen ex ii continentis contrarium iudicant, quod viui meliores sint mortuis, si cum febribus exeant; quamquam nec viui boni habentur: & ideo deteriore est significatio, inquiunt, si emissi fuerint viui & mortui ante declinationem; post vero saltem significant fortitudinem virtutis expulsiua. Nam & idem Rhazes refert, ubi cum febribus per superiora exeunt mortui, mortem significant. Signum quidem est magnae putredinis in febribus malignis & pestilentibus: & quamquam vidimus tales fuisse curatos, plurimos tamen vitam amisisse vidimus, propter symptomata maligna aderant; magis tamen circa initia quam circa finem. Circa initia autem morborum, praesertim febrium, substantiam suam, ex subiacente corruptione capiunt: circa vigorem vero ex malitia morbi: circa declinationem autem ex permutatione omnium in melius; qui sane citius separantur. Natura etenim ipsos reliquorum recrementorum instar, foras propellit; ut idem auctor, simul & Paulus, fatetur. Interim peiores sunt cum febribus quam sine iis: Magis enim indigent cibo (teste Auienna, qua ex ii. continentis a Rhaze sumit) magisque excitantur ad morsum, & ex putrefactione fiunt maligniores, & febres augent, & symptomata seu accidentia maligna, quae & fortiora fiunt ob febrim, dum febris consumit cibum vermium: hinc moti ad quaerendum ipsum, magis figuntur in intestinis, cum non inueniant cibum: & ratione febris acutae & malignae, bilis ad eos confluit magis, vnde & irritantur humiliter pungunt, & magis famelici fiunt. Et sic febris addit maiorem putrefactionem, acuitatem & afflictionem. Interea cum Hippocrates 2. Progn. tex. 18. dixerit lumbricos etiam cum excrementis sub finem morbi descendisse, nihil nocet: quocumque modo cum febribus eiiciantur, vel clysteribus exeant, si morbi & accidentia minuantur, bonum signum habetur, cum causa febris aut ipsius morbi per eos euacuetur. Et quamquam multi, comparatione eorum, qui numero pauciores sunt, sint deteriores; tamen aliquando tales euadunt. Et non obstante, quod latius deteriores sint, qui in folliculo inuoluti, ob multitudinem eorum simul se iuuantium in nocendo, & maiorem difficultatem in expellendo habeant; nihil tamen obest, quo minus ut dicere coepimus, iisdem laborantes sanitatem consequantur interdum, ut apud Amatam pueram Cent. i. curat. 40. nos quatuor natus, cum lumbricis afflicta etur totus nauseabundus, cum appetitus prostratione incedebat, nec in vno loco permanebat: seu hinc inde tanquam insanatus movebatur. Corruptus adeo inaequalis erat, obscurus, deficiens, & recurrens, ut omnes ipsum moriturum praedicerent: ita ut omnibus tentatis remediis ipsum medici tamquam pro deplorato reliquerint. At cum sic in agone esse videretur, alius illi subito citata fuit, & vesiculam pilae modo rotundam egressit. Quamquam mater coram multis assistentibus aperiret, vermium paruorum myriades, non sine admiratione viderunt: ad quos visendos ipse quoque Amatus vocatus,

vocatus, puerum postea paucis vires reficientibus, ad sanitatem reduxit. Sic rursus exigui numero malum quandoque portendunt, licet comparatione facta ad plures minus periculosi sint, ut diximus. Vnde & Valescus inquit, si vermes in teneffimo aut dysenteria pestilenti, exiguo numero exeant, neque æger inde alleuietur, malum signum est, siue viui siue mortui exeant. Inter omnes tamen lumbricorum species minus periculosi esse censentur ii, qui ascarides nominantur, quamuis forte ex deteriore gignantur materia, tum quia tenues & exigui sunt, tum etiam quod in loco generentur a principibus partibus remotissimo, intestino inquam recto. Sed tamen ideo minus nocent ascarides, quoniam alui deiectionibus facile excernuntur, & quia adhibita medicamenta statim eos attingunt. Minus vero quam teretes ii in pueris gignantur: teretes autem ipsis peculiare sunt, ut ex Galeno & Paulo liquet. Inter reliquas autem duas differentias, latos videlicet & teretes, lati peliores sunt, quam teretes, Celso auctore. Sic igitur ascarides cum fece crassiore facile expelluntur (qua & equos infestant, & ad maciem ducunt, & in ceruino capite inueniuntur, ut ait Aristotelem, & sub lingua in canibus) nec opus est multis medicamentis ad eos expellendos, cum transiente excremento per viam angustam eisdem natura rapiat & educat. Inter latas vero parui & cucurbitini, minus mali sunt quam longi, cum facile inferius descendant cum excrementis: longi vero facile sursum ascendant ad ventriculum, & per os educantur. Longi enim inhaerentes sua fixatione plus nocuum intestinis inferunt. Et lati si non expellantur & remaneant ac maiores fiant, tunc (Aulicenna teste) omnibus deteriores sunt, cum sint ex materia magis maligna & putrida.

OBSERVATIO XXXI.

De quibusdam pueri vermibus laborantibus, cum variis symptomatibus.

ANno 1557. in autumno, pueri, præsertim gulosi, vermibus tentabantur: nonnulli ex iis a somno garriebant, & stridorem dentium patiebantur: alii masticabant, tanquam cibum in ore habuissent. Excitabantur aliqui terribiliter, cum inquietudine & ira: alii vigilabant, naresque scalpebant, & delirabant. Erant, qui per nares vermes reiciebant, sed exiguos. Hæc paulo ante illud tempus apparuere, quo morbus quidam epidemius grassabatur, de quo alias diximus libr. 6. obs. nostrarum de febr. publice grassantibus & peste. Inter alios tunc erat puer duorum annorum, filius Bartholdi Simonis zythepæ Alcmariani, cognati nostri, cui & fluxus aderat, ita ut ultra quadraginta vermes deiecerit. Cui sæpe propinaui ʒ ss. cornu cerui vsti, cum ceruifia communi: & ventre inuncto hoc vnguento, curatus fuit. ʒ. olei cotton. absinthii. ana ʒ ss. pulu. cornu cerui vsti, coralli rubri, mastice, ana ʒ j. cera modicum: fiat vnguentum. At filiolæ alterius, quæ ex vermibus ventrem distentum ac durum habebat, cui alius non fluebat, & simul tertiana febris capiebatur, hanc confe-

ctionem dedimus: & vnguento ventre peruncto, plures vermes deiecit, & sana quoque facta est. ʒ. specier. diarod. abb. ʒ j. rhab. selecti. & pulu. ʒ ss. dissolutis in aqua agrimonie, sacch. adiecto. q. s. fiat confectio in tabulis. ʒ. olei absinthii, zizamini. amygdal. amar. & dulc. vnguenti dialibæ. ana ʒ ij. felis tauri ʒ j. aloes ʒ ss. pulu. colocynthid. gran. ij. cornu cerui vsti ʒ ss. cera parum, fiat vnguentum pro ventre. Aliis pueris febricitantibus commode exhibuimus hoc iuleb. ʒ. aqua portulacæ, graminis, agrimonie. ana ʒ j. syrup. de limonibus. ʒ j. ss. misc. deinde ʒ j. rhab. pulu. exhibui cum aqua graminis vel agrimonie. Quibus medicamentis omnes pueri per secessum emittebant vermes, & sanitati restituebantur.

SCHOLIA.

Vermes inducunt horribilia symptomata, ut iam diximus: & sane id hoc tempore certa experientia vidimus: nam aliqui modo quasi maniam, modo stuporem, modo epilepsiam, modo caninum appetitum, aut boulimon incurrebant, quidam & syncopen, nonnulli & iliacum & colicum præcipue: & quibusdam venter durus erat, quibusdam nimium fluebat. Sic etiam tempore Bertrutii, in autumno (vbi & nunc eueniebat) plurimi colico & iliaco dolore simul cum vermibus afficiebantur, satietate nauseatiua præcedente, præcipue fructibus, oleribusque putridis, prunis atque cerasis comestis, & persicis, atque pomis crudis, ac piscibus corruptis deuoratis. Et sicuti pueris gulosis in autumno, tempore Bertrutii, continebat dolor colicus cum vermibus, sic etiam tunc plurimi, ut nunc, oris fetorem experiebantur, plura comedebant, & pauca egerebant: quibus & habitus macilentus accedebat, & multitudo saliuæ ex ore emanabat, ac ventris inflatio exigua. Quibusdam tempore famis dolor augmentabatur, oculi graues fiebant, cum frigiditate parium ac pruritu, ob fumos ad nares ascendentes, quibusdam & spasmus & epilepsia superueniebat, deinde mors. His omnibus primo lac in potu dabat: deinde vermes interficiebat cum amaris medicamentis, tenellis pueris lac amygdalarum præbebat, confectum ex amygd. dulcibus atque amaris, & ex nucleis persicorum: dabat cum aqua calida: quibus venter eorum soluebatur, & simul vermes deiciebant. Sed quia de colico tum iliaco cum vermibus diximus, antequam de curatione omnium dicamus, omnium primo victus ratio vniuersalis, ac omnibus speciebus iam dictis communis, diligenter instituenda est: nam sæpe vehementioribus remediis adeo irritantur, ut pueros ad conuulsionem, syncopen & interitum pertrahant. Aer itaque eligendus ad calidum & siccum parum vergens, modo febris absit: somno mediocri vtantur potius nocturno quam diurno, eoque non statim a cibo, sed per duas saltem horas, frigora vitent, aquilones & plana loca: nec nudis ambulent pedibus. his enim cruditates incrementum. Sic otia longa, & somni longiores, ac vita desidiosa ledunt. Exercitium vero, idque ante prandium, confert. Aluus sit lenis, sponte vel arte, balano aut clystere. omnes

Vermes in iliaco & colico dolore.

4. Lumbricorum curatio.

Victus ratio.

animi affectus immodici declinandi, potissimum ira, tristitia, timor & perturbationes, præcipue a cibo. Cibi autem sunt probi sicci, & qui facile in membra digeruntur ac distribuuntur, nec lumbricorum effectricem causam foueant vel adaugeant, nec etiam vires superari permittant. Hoc quoque scitu dignum, quod assumpto remedio contra vermes, equitatione opus est, aut cursu, quibus corpus concutitur: facilius enim emittuntur acri exercitatione aut labore: sed hæc intelligenda, si febris absit. In victus genere damnantur lac, pisces, legumina, & quicquid materiae frigidae fuerit, ac seræ concoctionis, panis non fermentatus, & dulciaria omnia humida, & quæ facile in ventre corrumpuntur. Mirum in modum iuuat secundarius panis, addito aniso, cymino, fœniculo, vel sale subactus. Auiculæ esui dantur, & syluestres aues, pullus columbaceus, ius gallinæ veteris, vel galli, cicerisque attriti, ac brassicæ, capparis, oliuæque salsa commanducata: & cum sinapi cetera sumant obsonia. Acetosa item & oleosa laudantur ad tineas, panicum quoque & milium in cibariis, lupini, nasturtium, beta, mentha, apium, & raphanus. Muria, cappares & colymbades cum aceto, & inter olera vtrumque intybum, sonchus, ac senecio competunt, præsertim si cum carnibus iam dictis & dicendis decoquantur: in quibus etiam ea, quæ extenuandi vim possident, misceri possunt, potissimum si febris non adsit: veluti perpetuo vitari debent, quæ infrigandi vim habent, ac crassam lentamque pituitam gignere possunt, vt caseus, tum alii cibi iam supradicti, & qui ex iis parantur. Faba autem ac cicer tineas pellit, ex aceto, sale, & addito oleo. Alii cicer prius in vino maceratum & coctum pueris dedere singulis diebus, vt eos a lumbricis tuerentur. Paulus dat vinum aquosum pro potu: sed hoc in febribus vitandum. Liberalius oportet ipsos nutrire, ne alimenti expertes lumbrici rationes pariant. Dabitur autem cibustum præcipue cum non omnino innati fuerint, vt ipse inquit. Alii dicunt, quod in omnium vermium genere abstinentia prodest, quæ generatio omnino prohibetur. Alii quantitatem ciborum multam pro vna vice esse non volunt, sed sapius exiguo cibo vtendum consulunt. Ideo cum infestant, exiguo cibo sed frequenti vtendum est, qui maxime conuenit cum lacerasse desinunt. Si cum febre venter quoque profusus est, acetosæ potiones, qualis est aqua, in qua rhus decoctum sit Syriacum, vinumque mali punici, & similia offerenda sunt. Hinc si insimul alui profluuium adsit, ex quo lumbricos magis abundare sciendum est, cibo non distributo, sorbiles ægris cibi dari debent, admixtis quibusdam etiam adstringentibus, verbi gratia, pyris, sorbis, aut malis punicis, præcipue acidis: iidem etiam sorbiles cibi infantibus præbendi sunt, præsertim iis, qui cibum auersantur, eodem Paulo auctore, veluti sunt contusæ pullorum aut gallinarum carnes, seu eorundem iura, in quibus iam dictæ carnes prius liquatæ sunt, brodia consummata vulgus appellat. Reliquæ prædictorum pullorum, gallinarum, phasianorum,

starnarum, columbarum iuuenum, turdorum, merularum, & aliarum paruarum auium montanarum carnes exhibeantur. Talis autem victus ratio facit tam ad præcautionem quam ad curationem vermium: nam & quidam recte duplex vitæ institutum, nempe ad præcautionem & curationem instituunt. Primum enim consistit in præuisione, ne vermes generentur, & conuenit iis corporibus, quæ facile vermes concernant, quibus hæc omnia prædicta, & quæcunque pituitam, vel materiam crudam aut corruptam, producant, sunt vitanda. At exercitium forte commendatur a Rhafi, quo multos & præseruatos & curatos viderit *u. continentis*. Idem commendat panem cum sinapi, cibosque calidos & detergentes, ius caulium, hyssopi, cicerum rubrorum, & carnes iam dictas exsiccantes. Interea diligenter obseruandum, præcipue etiam in curatione, quod licet victus supradictus tum alia conueniant, tamen multi medici, præsertim imperiti, in hoc delinquant, cum procedant in victus ratione cum iis, quæ materiae quidem contrariantur, sed interim virtutem ægri, tum alia symptomata, quæ irrepunt, negligant, & ita ægros subinde in perniciem præcipitent. Et licet vermes sui ablationem indicent, cum sint toto genere præter naturam, & ideo e corpore expellendi, (*ex Galeni decreto 14. meth. medendi*). (idque eos necando cum amaris medicamentis, cum viuentes obstant intestinis hærentes: & licet mortui subinde vna cum stercore expellantur, expelluntur cum his etiam viui sed stupefacti, & vt quispiam dixerit, semimortui, ita vt teretes (*de quibus postea dicemus*) vehementiora medicamenta desiderent: sed tamen symptomata, tum febres, si adsint, talia non admittunt. Quando igitur vermes (*vt recte etiam admonuit Rondeletius*) reiciuntur in morbis acutis, vt in febribus ardentissimis, & aliis morbis senum & puerorum, non statim debemus ad illos nostram totam intentionem conuertere, vt mulierculæ faciunt, & medici mulieribus infernientes: nam hoc facit vt ægri intereant, cum neglecto morbo, magis ad vermes curationem conuertunt quam ad morbum: vt si febris continua, aut alius morbus biliosus, aut fluxus ventris aliquem occuparit, aut si quis in morbis acutis in principio vermes reiecerit, semen contra eos dare solent, quod tamen febrem maiorem accendit, vel corallum, vel alia quæ adstringunt, ad vermes occidendos oportuna solent administrare. Quæ omnia affectibus præcipuis aduersantur, vt multum amara, febri & fluxui ventris, astringentia & exsiccantia, febribus. Quare oportet medicum diligenter distinguere, *vtum febris a vermibus dependeat, an vero vermes reiciantur ob aliam causam, qui semper continentur in ventre*. Quod si cognouerimus febrem aliunde fieri, quia quartana, vel tertiana, vel vera quotidiana est, nullumque quod virgeat, symptoma ostendit, negligendi sunt: vel ea tantum medicamenta præscribenda, quæ effectui præcipuo & vermibus conueniant, laxantia, amara & leuiter astringentia in fluxu & vermibus. In febribus ab ob-

7.
Prouisio.

Cautio in curatione.

Medicamentorum ratio.

8.

Error medicorum notatus.

structio.

structione & vermibus dare possumus *syrup. de byzantius & acetosum*, cum decoctione graminis & portulacæ. Etiam poterimus adhibere topica remedia supra umbilicum, quæ vermes interficiant & protrudant, si vermes cum febre iungantur, tunc oportet esse amara & laxantia, ut quæ parantur ex pulu. agarici, fellibus, farinis amaris, aceto, succis herbarum, ut exemplum in febr. ostendimus. modo non ad sit fluxus ventris: tunc enim abstinemus a laxantibus. Sed hæc tum alia exempla infra scripta docebunt.

OBSERVATIO XXXII.

De rustico quodam infinitos vermes per inferiora deiciente.

RVSTICVS quidam in pago vulgo *Cocdyk* dicto, non procul ab urbe Alcmariana, qui maligno cibo utebatur & putrescibili, ut lacte & piscibus, sine febre existens, quam plurimos vermes deiciebat, circiter sexaginta, ut tunc dicebatur. Huic allii esum concessi, cum non febricitaret, iussique ut, si pisces comederet, semper sinapi adderet. Omnium primo generationem vermium inhibuimus cum victu paulo ante dicto, ac vitæ instituto: mox materiam genitam, quæ causa vermium erat, nempe pituitam ipsam, cum illis, quæ phlegma digerent & vermibus contraria essent, iuxta Leonellum Fuentinum, in hunc vel similem modum digessimus: ℞. *syrup. de absinthio* ℥ ij. *syrup. de acetos. citri. syrup. de byzantius, cum aceto. ana* ℥ ss. *aqua graminis, absinthii, agurionis ana* ℥ ij. *fiat syrup. pro ij. dosibus.* Deinde eundem purgaui. Sed hic quaeritur, num purgatio conveniat: de qua quidem quaestione, ut refert *Hollerius*, nequaquam dubitandum. Repurgata enim materia, unde vermes generantur una cum ea vermes excluduntur. Et sane hic conveniebat purgatio, quia cum vermibus non aderat diarrhoea vel lienteria. Veteres laudant rhabar. hieram simplicem, tum colocynthida. Sed quia hic fortis erat, dedimus pilulas has sequentes, vel similes. ℞. *pilul. hieræ simplicis* ℥ ss. *pilul. ex aloe* ℥ j. *trochisc. albandal. circiter* ℥ ss. *misce.* alioqui & hæc compositio pilularum in ditioribus commendatur. ℞. *aloes succrocin.* ℥ j. *myrrha* ℥ ss. *croci gran.* 12. *rhab. selecti* ℥ j. *agarici trochisc.* ℥ ss. *turbith. elect.* ℥ ij. *zinzib. salt. gemma. ana gran.* iij. *omnibus pulu. cum syrup. absinthii, fiat massa pilul. de qua sumat* ℥ j. *conficiendo* 5. aut 7. pilulas, sed non danda febricitantibus. Rusticus & cum pilulas aliquando solas ex hiera sumisset, & mortuos & viuos expellebat vermes. Post purgationem solebant medici practici vermes interficere & expellere. Quod etiam pilulæ supradictæ faciunt, & utramque intentionem absolunt. Interea occiduntur cum his, quæ contrariantur eorum complexionem & materiam, nempe calidis, siccis & amaris. Sed inter remedia domestica apud Galenum tum alios est cornu cervi vstum, ita & folia ac succus persicorum in potu, vel umbilico imposito succo: & semen caulium ad ℥ ss. exhibitum, & radix graminis. Inter ea remedia quædam sunt calida, ut mentha, nasturtium, porri semen, persici mali nuclei, & folia ru-

ta & filicis radix, semen apii, aristolochia, calamentum, dictamnium, absinthium, zedoaria, gentiana, brassica semen, & aloe, & apud Italos, iuxta Benedictum Veronensem, picris sine panella herba. Rustico vero, quia tenuioris fortunæ, decoctum centaurei & rutæ & absinthii dedimus: Inter frigida numerantur coriandrum, portulaca, herba, & semen atriplicis, hypocystis, terra lemnia, sem. plantag. & folia feris, cichorea, dens leonis, acetosa, rubi mora, & cauliculi cocti ex aceto. Hæc magis in febribus conveniunt, uti & succus citri, tum alia multa: sic si ad sit fluxus, etiam sumach. Ex quibus & varia conficiuntur remedia apud auctores, etiam composita pro varietate vermium & symptomatum. Quibus adiunguntur externa remedia in frigida causa, folia persic. arboris, prassium, centaurium, absinthium, mula & rad. ireos. Et refrigerantibus, cortices salicis tritos, myrtum & atriplicem: ex quibus fiunt emplastra, fomenta, inunctiones, adiectis farinis lupinorum, tum aliis in emplastris. Nos hoc unguento vel simili vsumus supra umbilicum. ℞. *olei absinthii, rutacei, amygd. amar. ana* ℥ ss. *succi absinthii, ruta ana* ℥ ij. *tormentilla, diptami albi, zedoaria. ana* ℥ ss. *fellis bubuli* ℥ iij. *aloes.* ℥ j. *pulveris sentur pulverisanda, & cum modica cera fiat unguentum.* Necati vermes expelluntur deinde: nam mortui retenti, iuxta Avicennam, causæ essent sæuorum accidentium; eo quod ab iis eleuentur fumi putridi & venenosi. Et ideo quæ vermes necant in primis adhibenda, quo minus noceant, cum difficulter etiam expellantur, ut diximus: & cum interfecti fuerint, protinus ex aluo extrudendi, alioqui retro virulentoque vapore cerebrum afficiunt, & corpus pariter inflammant. E-uacuant eos & expellunt illa, quæ inimicantur iis, ut aloe & absinthium, tum pilulæ supradictæ. Valet & agaricus sua amaritudine, non tamen, ut rhab. cuius ℥ j. vel ij. necat vermes & expellit, iuxta Gatenariam, idque sua amaritudine, licet auctores de rhab. id non dicant. Oleum nucum commendatur a Grado, quod & matrone Mediolanenses ex consuetudine semel in hebdomada infantibus dant pueris, cum pane affato infuso in oleo nucum cum modico vini. Vaccinus talus in pulverem redactus, & cum vino potus, & omphacium oleum, pro infantibus occulta quadam vi valent: ut & pilulæ communes, quas & rusticus noster quandoque accipit, & curatus fuit. Inter cetera commendatur succus graligæ sæpius exhibitus, & guttula una olei sulphuris, sed cum cautione exhibenda. Et theriaca bibitur per se, vel cum aceto, qua & nos felicissime etiam in aliis vsumus. At delicatulis, & qui medicamenta non ferunt, colocynth. ℥ vj. terantur, & cum felle bouis & vino imponantur umbilico, vel eo inungantur. Hoc ventrem deicit, & vermes expellit. De his plura in Scholio subsequenti.

SCHOLIA.

Quidam hic ante curationem vermium nonnullos canones generales præmittunt, atq; iis

8.
Canones aliquos
observandi in
curatione ver-
minum.

vermibus in intestinis inferioribus generatis siue defluxis magis amara & in maiore quantitate exhiberi volunt, etiam per superius, ne vis eorum in itinere longo deficiat, & sic quoque ascaridibus & cucurbitinis (*qui quidem vermes sunt fortiores & maioris resistentia, ut patet ex soliditate eorum substantia*) fortiora antidota propinari volunt, ut ita moriantur & destruantur. Quod etiam ad præcautionem attinet, iubent abstinere a cibis pituitosis, & ut aliquando intestina a pituita repurgentur. In curatione vero prius necandos consulunt, deinde expellendos: causam diximus *observat. præcedente*. Medicinæ calidæ in tertio gradu, modo absit mala qualitas venenosa, neque febris aut inflammatio vel apostema adfuerint, plurimum iuvant, ex *Auic. 10. tertii, tractat. 5. cap. 4.* Hora necandi

6. convenientior post abstinentionem, & ventriculo ieiuno. Vti calida & amara mortem inferunt vermibus, ita dulcibus vinctuosis nutriuntur: sed commixtis iisdem cum amaris facilius inescantur, strictione narium coadiuvante. Dum vermes medicamentis per os occidas: venter exterius leniatur emplastris stypticis & amaris: sic melius præcipitantur per circulum inferiorem. In superioribus intestinis vel stomacho per antidota superius sumta facilius necantur & expelluntur: in inferioribus, per clysteres & glandes: in mediis vero existentibus, utroque modo. Verum cum stomachum inungunt cum amaris, tunc addunt styptica propter stomachum, alioqui tantum vmbilicus amaris inungendus. Interea sciendum, quod ascensus etiam vermium ad partes superiores sit prohibendus: quam intentionem (*ut Gatenaria docet*) absoluunt cum roborantibus stomachum & stypticis, ut *oleo cotoneorum, absinthii, & similibus*. Dant amara per superius, ut vermes fugiant, vel acetosa, vel acetum acre. Naresque inungunt theriaca cum aceto. Attamen si aliquando ascendunt vermes versus stomachum & mery, & titillationem faciunt in œsophago, bonum est eos adiuuare per vomitum cum potu aquæ decoctionis sebesten, *ut habetur 11. Continentis*, & ponitura Grado, vel fauum mellis ori imposito, deglutendo, quoniam ad os ascendent & egredientur. Sic etiam cum vermes descendunt, ad inferiora, facillime alliciuntur & educuntur enemate ex dulcibus parato, & ita quoque Gatenaria attrahit vermes a partibus superioribus ad inferiores, balanis vermibus gratis: alii clysterem ex lacte probant, alii rursus vituperant, quod facile coaguletur & corrumpatur, febremque inducat: ideoque potius laudant clysterem ex carniū iure, cui mellis, ubi adsit febris, 3 j adiecta sit: alioqui eius loco zacch. 3 j. Dulcibus enim & vinctuosis delestantur vermes. Alioqui si in ano sint, *glans inuoluta cotone & oleo omphacino tincta, aut aloë vel felle vaccino, aut carne pingui porcinæ salita, filoque appeso in anum dimittatur*, ad quam vermes conuersi, eaque retracta, adhærentes educuntur. Si myxa ex aqua deferbueris, & decoctum cum butyro recenti infuderis, tineas a superioribus ad inferiora detrahes. Si in stomacho, idem decoctum potum

valet, nam per vomitiones eas extrahit. Sic rotundas mel in ore detentum tineas ad se allicit. Sed & abrotani decoctum infusum cum melle & olei exiguo, latas tineas detrahit, & quod ex marrubii succo conficitur, & centaurei decocto infuso necantur tineæ rotundæ minutæ, quæ in aluo ima sedem habent: oliuarum quoque muria ac falforū piscium infusa. At si ex febre vel vermium tetrīs vaporibus aut fumidis medicaminibus, quæ caput perunt, ita ut dolore plurimum afficiatur tum bregma, hoc est, sinciput, tum frons & tempora, rosaceo illinitur efficacissime, vel acaciæ succo, vel hypocystidis admixto.

OBSERVATIO XXXIII.

De infante, vermiculatione laborante.

I Nfanti apud Delphenes, cum vermes deiiceret, fel tauri cum butyro & pulvere cornu cerui vsto, vmbilico apposui: & statim bene habuit. Rhases apponit cyminum puluerisatū, cum felle tauri: quo & Sebastianus Austrius usus, puerum curavit lumbricosum: ex cuius appositu, & vermes ab intestinis proliciebantur, & per vmbilicum incomparabilis multitudinis aqua saniesque profluebat.

SCHOLIA.

N ON solum topica remedia vmbilico apponuntur in infantibus & pueris, sed in adultis quoque ad interficiendos vermes & expellendos etiam: si vermes cum febribus iungantur, tunc amara laxantia applicantur, quale hoc est: ℞. *succi persicariae vel aizoi minoris 3 j. extrahantur cum aceto*. In quibus succis dissolue fellis porci vel tauri, 3 j. agarici. 3 ij. farina lupinorum. q. s. ad inspissandum cum terebinthina, fiat ad formam cataplasmatidis, applicetur supra vmbilicum. In hoc nos abstinuimus a portulaca, corallo & farina lētium, quia hæc omnia adstringunt, quibus non utimur, nisi cum vermes fluxui immodico iunguntur, quem compescere volumus, & post magnas evacuationes. Nam in principio etiam licebit, uti supradicto aut alio calidiore, si febris non adsit, ut *myrrha, aloë, bitumine, petroleo, & aliis vehementer calefacientibus*, sed iis abstinemus ob febrem, quibus in aliis utimur, cum sine febre vermes infestant. Si vermes in causa sint fluxui ventris, egeatque corpus purgatione, non est verendum uti aliquo medicamento purgante, & præcedente cataplasmate. Quod si pueris longo fluxu, aut vomitione multa, corpus redditum fuerit imbecillius, & si diarrhœa adsit, tale conveniet. ℞. *olei cotton. 3 ij. succi portul. 3 j. B. extrahantur cum aceto, farina lentium 3 j. B. coralli rub. cornu cerui vsti. an. 3 ij. incorporentur simul, & cum pauca terebinthina, ut adhæreat, fiat ad formam cataplasmatidis*. Quod si voveris vnguentum facere, coquatur in oleo succus, & minue quantitatem farinæ, aut eius loco adde ceræ q. s. fiat vng. In his omnibus topicis remediis (*ut dicebat Rondelerius*) acetum convenit ad penetrandum: sed maiorem addimus quantitatem, quando vel constringendum est, vel refrigerandum, ut in febribus. Si autem lenteria sit, calidior

Prohibitio assensuum vermium ad superiora.

7. Quando competit vomitus in vermibus.

Attractio vermium quibus perficiatur.

Educensia vermium per inferiorem.

Ad dolorem capitis ex vermibus.

2. Topica.

Si diarrhœa adsit cum vermibus.

3.

Si lenteria adsit cum vermibus.

calidiora, & quæ plus roborant ventriculum, eligenda sunt, vt facultas retentrix & concoctrix simul reficiantur, & corroborentur. Fit autem hoc pacto. *℞. olei absinthii ℥ j. olei nardini ℥ ℥. succi menthae ℥ ij. myrrhae ℥ ℥. aloes ℥ j. B. mastich. coral. rub. ana ℥ ℥. ceræ parum, fiat unguent.* tempore inunctionis, adde parum aceti vel vini maluatici. Oportet etiam secundum illam rationem interna remedia inuenire, quæ vtrique affectui profunt. Quod si sine istis accidentibus pueri vermibus torqueantur, remedia etiam calidissima & efficacissima præscribenda sunt. Itaque si latus lumbricus vel teres sit, medicamenta laxantia & amara in principio danda sunt, vel amara in principio, vt occidantur, & postea laxantia, vt occisi expellantur. Confectio illa, quæ diacarth. dicitur, potentissimum est remedium, datum pueris ad vermes deiciendos, & ad pituitam vel chylum corruptum, ex quo generantur & nutriuntur: sed in exigua quantitate, quia fortiter soluit. Præterea infuso agatici in oxymelite plurimum valet: & rhab. quando vel fluxus ventris, vel bilis purganda est. Potiones ad occidendos vermes parantur ex decoct. portul. absinthii, graminis, additis syrup. conuenientibus, quales sunt *syrup. acetos. simplex, de byzantiis*, si pituita extenuanda sit, vt in febris, vel *syrup. de limonibus, de acetos. citri*, quando obstructions aperienda; & cum refrigerandum, *syrup. de endiu. compositus*: si ventriculus & intestina detergenda & corroboranda sunt, *syrup. de absinth.* Si vero refrigerandum & adstringendum, *syrup. endiuæ simplex*, magis conuenit. Fiant hoc modo. *℞. syrup. acetos. simpl. vel de byzantiis ℥ j. vel ana ℥ ℥. B. aquar. graminis, asparag. ana ℥ j. aquæ absinthii ℥ ℥. misce.* pro vna d. si. Vtatur per tres aut quatuor dies, quibus finitis dentur medicamenta laxantia. Interim dum vtitur istis syrupis, iniiciuntur clysteres ex lacte zacc. melle: si febris adsit, ex hydromelite, vel iure pulli, & zacc. vt dictum est: si fluxus ventris sit cum febre, ex decocto hordei & zaccaro: si fluxus adsit sine febre, ex lacte chalybeato, & pauco zaccaro rosato. Die vero ante purgationem addantur aliqua laxantia in prædictis clysteribus, si sine fluxu sint, vt succus cyli, vel mercurialis, aut parum benedictæ, vel hieræ picæ. Omnes isti clysteres parentur iuxta Rondelletium sine oleo, nisi quando iam attractos volumus euacuare, & medicamentis laxantibus vtimur. Maxime si aluus sicca & adstricta sit. Nunc seorsum dicamus quæ singulis speciebus magis conueniant, prius adducto exemplo de teretibus & rotundis.

OBSERVATIO XXXIV.

De lumbricis teretibus ac rotundis.

I. **I**VVENIS quidam teretes vermes, eosque rotundos, deiciebat: eisdem absinthii decoctum commode exhibuimus. Galenus 14. method. hoc ipsum probat, si pueri non fuerint. Absumatur autem cremor ipsius. Idem præstat & abrotani decoctum, ex Aetio. Pueris autem magna cum utilitate myxarum decoctum præbuimus, mentha admixta. Illud quoque ab Aetio commenda-

tur, febre non existente, aut si eadem sit exigua. Magna cum utilitate etiam in pueris vsus sum semine contra vermes, zaccaro incrustato, vel sine zaccaro, modo pueri ita deuorare velint. Cunctis vero infantibus, & adultis febrientibus, vel non febrientibus, ex eiusdem Aetii testimonio, confidenter exhiberi possunt, etiam si trin estres fuerint infantes, vermes terreni cum sapa: si vero sapam non admittunt, cum hydromelite, aut vt libet præbeto; nihil veritus, neque utilitate contenta, eos septem numero dato. Donatus cum syrup. acetos. citri infra scripti puluisculi ℥ j. indifferenter infantibus ac adultis febrientibus & non febrientibus exhibet. *℞. sem. quod lumbricorum vocant, ℥ ij. cornu cerui vsti. sem. citri. portulacæ, ana ℥ j. B. fiat puluis.* Dabat idem magno cum successu ℥ j. acetos. citri, & ℥ ℥. succi menthae. Ex theriaca quoque, terra lemnia, luto armeno, aqua rosa. ac aceto medicamentum parans, id temporibus, naribus, iugulo, carpis vtrisque applicari præcepit. Et ex vnaque mentha & absinthio ac perficæ foliis insimul contulis, adiecto aloes pulueris, lupinorum farina, atque torrefactis micis panis cum aceto & aqua rosæ medicamentum ventriculo imponendum parant; interim chiam, mastichen ac cynamomum adicientes: insuper ex absinthii ac perficæ foliis contulis, felle taurino, aloë ac farina lupinorum adiectis, cum aloë, oleo de absinthio, amygd. amar. cataplasma ex oxymelite componunt, vmbilicoque imponunt; quibus & nos feliciter vsi sumus, cum pharmaca lumere non possent, & in adultis post aloë vel pilulas eiusdem deuoratas. At puerpera non sine febre continua & pestilenti, cum deliraret, & peregrina in somnis loqueretur, & in ventre valde torqueretur, & vna cum fluxu vermes teretes deiceret, cui cum exhibuissemus puluerem sequentem cum ceruicia, vnica vice quinque vermes teretes rotundos per ventrem reiecit. Puluis talis erat. *℞. pul. cornu cerui vsti ℥ ℥. sem. portulacæ, zedoariæ an. d. B. misce.* Ne autem lemen zedoariæ, quod calidum erat, febri noceret, semen portulacæ adiecimus, & quia debilis erat. Statim a puluere exhibito dolor ventris, qui adeo vehemens erat, in puerpera, vt ventrem præ doloris atrocitate rumpi clamaret, illico mitigatus est, & quinque vermibus vna cum excrementis liquidis reiectis, sana euasit, febre desinente, & similiter fluxu quo afficiebatur. Ita & puer quinque annorum, cum & febricitaret, & simul fluxum haberet, ac vermes deiceret, solo decocto polygoni, seu centumnodii, cum alia remedia non iuuarent, curatus fuit.

SCHOLIA.

TERETES non ita vehementia medicamenta desiderant, quemadmodum lati & ascarides, vt patet 14. meth. medendi apud Galenum. Id quoque in primis obseruandum, num febris adsit: tunc enim eorum curatio coincidit cum ea, quæ febricitantibus conducit. Mitioribus ac simplicioribus sane remediis vti oportet, quemadmodum & de febribus multis exemplis per nos demonstra-

Teretum lumbricorum medicamenta.

tum est. Ab acribus autem magis exacuuntur. Potui igitur dat Paulus chamæmelorum vel myxariorum decoctum, aut ipsamet mixaria esui præbet: eorundem chamæmelorum decoctum Aetius propinat. Item fereos succus, aut coriandri semen cum aqua calida, vel cum posca datur: aut auriculæ muris decoctum, vel cornu cerui ramentum, & olei immaturi amarissimi cochlearia duo absorbeant. nam qua amarum est (vt idem Paulus fateretur) lumbricos occidit, qua lubricum, detrahens ipsos cum stercore reddit. Sunt etenim amara omnia non solum ad interfaciendos lumbricos idonea, verum etiam ad foetum viuum enecandum & mortuum eiiciendum, quemadmodum liquet, & de simplic. medic. facul. cap. de filice, ac etiam cap. de myrrha. Et propterea idem oleum omphacinum cum prisana decoctum præberi debet. Cataplasma insuper (ex Aetii testimonio) confici potest ex lupinorum farina in hydromelite decocta, illudque imponendum. Umbilicus felle taurino illinatur, & spina vniuersa ex medulla ceruina. Humido etiam fotu ex oleo chamæmelino, vino, absinthio & aloe præcordiis accommodato (vt inquit Paulus) vtare, præsertim si ægrotantes inflammationem, seu distensionem in visceribus experiantur. Si autem febres non molestant, quinimo ad integritatem, aut totius morbi declinationem ventum est: acrioribus ac efficacioribus medicamentis vtendum erit, præsertim robustis corporibus. In quem vsum seriphii decocto, vel calamenthæ, seu ptereos vtendum: vel cardamomi semen, vel mali punici acidi radice ius ad tertias redactum præbeto, vel santonicum, vel abrotanum, vel etiam ambo simul cum melle in catapotio coacta (vt inquit Paulus) aut brassicæ, seu crucæ semen læuigatur, seu absinthium solum, quod etiam frequenter abunde fuit. Præterea si terni lotæ aloes scrupuli præbeantur, remedium est laudatissimum, eodem auctore. Acetum etiam scyllinum, præsertim ætate prouectioribus confert, vt ipse inquit, chamæpiteos, marrubii, ac etiam helenii decoctum, thymi & pulegii. At Celsus contritum semen vriticæ aut brassicæ, aut cumini cum aqua, vel mentham cum eadem, vel absinthium decoctum, vel hyssopum ex aqua mulsa, vel nasturtii semen cum aceto contritum, pueris dari iubet. Prodest insuper ab inferioribus partibus mulsam iniicere copiosiore, quo lumbrici mellis dulcedine illecti deorsum descendant, vt idem Paulus inquit. Donatus in hunc vsum consuevit cum pauco sale & saccharo lac per clysterem iniicere asininum aut caprillum: quandoque vero ex gallinarum seu pullorum iure, zacch. & ouorum luteis clysterem componere iubet. Si autem putrefacti lumbrici in alto corporis, aut per pharmacorum portiones enecati non excernantur, sed potius vapores sursum mittant, educendi sunt, aut aloes (inquit Paulus) aut medicamenti amari ex ea confecti portione. In quem etiam vsum, si febris valida infestet, rhabarb. cum manna in myxarum ac tamarindorum decocto dissolutum præbendum. Quandoque etiam, febre valida non exsi-

stente, agaricus imponi potest, ac cum prædictis commixtus exhibendus. Neque enim (vt ipse Paulus refert) expers præsidii erit mediocris alui euacuatio: & in vniuersum omnia, quæ lumbricos educunt: aut per acredine occidendo, aut per amaritatem subducendo, aut ad excretionem irritando, aut per consequentem ad eam, quæ exhibentur, lubricitatem efficacia cognoscuntur, vt liquet ex Aetio. At si qui sunt, qui lumbricis cum alui profluuiio infestentur, eos fluorem inspissando, & cōcoctionem, tum per cibos, tum per cataplasmata in melius permutando curare oportet. In quantum enim fluxiones inualescunt, tantum etiam lumbricorum generatio augetur, vt idem Aetius testatur, & a Donato citatur: Qua de re præporationibus vtendum erit, inter quas plantaginis succus est præferendus, ipsamque plantaginem aridam absumant, nam ex æquo vtrique & fluori, & lumbricis efficax est. Licebit autem & in hoc casu vermibus terrenis, quemadmodum dictum est, vti. Coniicienda item sunt in cataplasmata ad fluxiones sistendas concinnata, ea, quæ ad lumbricos sunt prædicta, & quæ fluorem nō exacerbant, velut est absinthium, abrotanum, santonicum, malicorium, acacia & balaustium, galla, pteris, eisque similia, cum cruda hordeacea que farina, (vt liquet ex Aetio & Paulo.) In super extrinsecus ventri imponatur medicamentum ex aloe, melino, & vino, (hoc etiam apperentiam excitat) sæpius autem & absinthium cum eisdem misceatur, vt etiam Donatus ex Paulo annotauit.

OBSERVATIO XXXV.

De infante duorum fere annorum, vltra centum vermiculos per aluum excernente.

INFANS duorum fere annorum, filiola Adriani Ioannis zythepse Delfensis, in cuius cupis Calix pro insigni erat, mense Februario anno 1566. cum vermiculos aliquos excerneret, longitudine medii fere digiti, nec longiores, latiusculos, paulo depressiores, modo viuos, modo mortuos, ad hanc tandem accitus sum, cum etiam in febrem satis vehementem incidisset, simul & in alui fluxum ac tussim validam, vt ob tussim subinde cruenta expectoraret. Postremo adeo angicæpit, vt pro deplorata habita fuerit. Reddebat autem excrementa liquida, aquosa, & valde biliosa, vna cum vermibus iam dictis. Cum ægre potum admitteret, imperaui, vt dentem leonis vna cum radi. liquiritiæ decoctum in ceruicia tenuiori, modo admixta aqua tussilaginis, seu vngulæ caballinæ (ob tussim) modo agrimonie vel portulacæ, ob vermes, sumeret. At neque serapia nec aliud quicquam gustare voluit. Tandem puluerem cornu cerui vsti passulis arillis extractis impositum continuo deuorabat: atque ita dulcedine passularum illecti vermes, quo solo remedio, dictu mirabile, continuato, vltra centum vermes per aluum deiecit: & ventre inuncto oleo coton. & absinth. puluere cornu cerui vsti immixto, & exigua cera adiecta, a vermibus, iisque modo viuis modo mortuis per aluum reiectis, tum a fluxu alui ac febre liberata est. simul & ven-

Amara enecant vermes & alium viuum ac mortuum eiiciunt.

4.

Quando acriorib. ut liceat.

5.

Quomodo enecati excernendi.

6.

Vermes cum alui profluuiio.

1.

& venter breui detumuit, & magno cum nostro honore perfecte conualuit.

SCHOLIA.

2. **V**TRVM essent vermiculi isti teretes, multum dubitabam, an lati, qui tamen longiores esse solent. Videbantur referri posse ad rotundos, licet parum depressi nec longi forent. Neque erant cucurbitini, quos aliqui partes latorum esse volunt. Quales autem fuerint, perinde est, cū & in omnibus vermibus (*precipue vbi etiam fluxus ventris adest*) pro comperto habeamus nullum præstantius remedium esse, quam cornu cerui vstum vi quadam occulta, pueris tum infantibus ac adultis exhibitum. Memini enim, quod loror mea Maria Foresta, cum adhuc iuuenula existens vermiculatione laboraret, exhibito hoc solo medicamento simplicissimo, nescio quot vermes vltro ex ano eiecerit, qui decidebāt in terram vini: ita, vt per cubiculum ambulando, nec decumbens nec febricitans, ab hoc fædo malo curata fuerit.

OBSERVATIO XXXVI.

De quodam adolescente latos vermes habente.

1. **A**DOLESCENS cum circa vmbilicum valde torqueretur, & nauseabundus esset, & febre careret, cum excrementis suis quædam seminibus cucurbitæ vel cucumeris similia deieciebat. Quare cum latos vermes habere coniectabam, cum illud latorum vermium, *teste Gal. lib. 1. de loc. aff.* certissimum sit signum. Cui cum decoctum centaurei & absinthii propinassemus, & pilulas aloeticas exhibuissemus, latos vermes adolescentem laborare, res ipsa tum exitus ac experientia probarunt: nam ab exhibito decocto præcedere, vermes miræ longitudinis deiecit per anum, in muctronē tanquam fibulæ definentes; qui equidem vermes miro modo intestina prius lancinarant & lacerarant. Sed iis remediis repetitis, & aliis comestis, & radice raphani cruda, tum sinapi ac decocto suprascripto vtens, vltra duodecim vermes admodum longos reiecit, & tandem optime valuit.

SCHOLIA.

2. **L**ATI vermes, vt prius auctoritate Celsi diximus, multo peiores sunt quam teretes. Sed horum curatio licet cum præcedenti concordet, ex *Aetij & Pauli testimonio*, ita, vt iam dictis vti possimus; tamen, vt *Galeno visum est 14. methodi*, (id quod etiam videretur confirmare Celsus) vehementiora medicamenta lati lumbrici desiderant, quam teretes; quemadmodum & Donatus de iisdem quoque annotauit. Huiusmodi est filix (*inquit Galenus*) maxime radix eius, vt loco citato constat apud eundem: & 8. de simpl. medic. facultatibus; latum enim lumbricum interficit, si quis eius ʒ iij. in melicrato ebibat, vt ipse refert. Ad quem modum mirum non est partum viuum enecare, & mortuum eiicere. Item centaurei decoctum (quo & nos feliciter vsumus) potum, & ab inferioribus partibus inditum, calaminthæ, dictamni, vel pulegii confert, vt ex Paulo liquet. Poterunt etiam & in potu vermes terreni (vt dictum est) exhiberi. Proprie autem ad ipsos facit auriculæ muris succus, duorum cyathorum mensura, cum vno zythi cyatho
- Latorum lumbricorum curatio per medicamenta.
- 3.

potatus. Celerrime namque ipsos educit, vt liquet ex *Aetio*. Nec minus aqua potari debet, in qua lupini, aut cortex mori decoctus sit, aut cui adiectū sit contritum vel hyssopum, vel piperis acetabulum, vel scammoniae paululum, vt *Celsus testatur*. Verum licet veteres scammonio vti sunt, nunc licebit vti granis quatuor diagridii (iuxta *Hollerium*) cum aqua absinthii, aut simili. Sed purgatio commodior est, vbi in superiore intestino vermes sunt: ʒ. decocti sebesten ʒ iij. cornu cerui ʒ j. mentha sicca & piperis ana ʒ ij. latos etiam expellit rhab. ʒ j. aquæ graminis aut absinthii ʒ ij. spica nardi gr. iij. Vel in hunc modum (ex *Aetio*) medicamentum paratur: ʒ. cortic. rad. mali punica acida in suprema parte delibrata, piperis cuiusq. ʒ iij. cardamomi ʒ vj. marrubii ʒ ij. mellis despumati q. s. prabe ex eo cochlearium. Post alii comestionem (vt ipse præcepit) id quoque medicamentum Paulus scriptum reliquit. Verum, vt ex toto affectus discutiatur, vt idem inquit, theriacen quoque exhibebis. *Hollerius* clysteres ex vini lb. j. olei absinthii ʒ iij. pulu. hieræ ʒ ij. componit. poterit etiam adici ʒ j. mellis & ʒ j. salis. Nam & sal deglutitū ascendentes vermes ad stomachum, deorsum pellit. Videndum tamen (vt idem admonet) ne odiosa vermibus per sedem iniiciamus, cum ad superiora eorum motus est. Tum enim iucunda potius, vt mellita & dulcia iniicienda sunt, aut eiusmodi glandulæ subiiciendæ. Bibenda vero, quæ eosdem vermes deorsum pellant, Nam aliquando, vt dictum est, ad ventrem vsque ascendunt, & stomachum lancinant, vnde syncope, conuulsio, mors. Eadem ropica prius dicta vmbilico imposita etiam iuuant. Non solum theriaca, sed & methridiatum, si nulla febris adsit, vermes enecat & excludit.

OBSERVATIO XXXVII.

De vermibus Ascaridibus dictis.

1. **M**ATRONA nobilis & religiosa, iuuenula, in cenobio Campo regio dicto, prope suburbium Delphense; mense Augusto, Anno 1558. præter ascarides quibus laborabat, insignem ani pruritum experiebat. Post multa tentata remedia etiam per alios medicos, decoctum (ad illam accitus) ex absinthio communi & seriphio, ac centaureo minori propinaui. Ac illam purgaui cum hiera simplici. Mox clyster quoque injectus ex iure pulli, cum zaccharo; paucis prodeuntibus vermiculis, quales in caseis reperiuntur. Postea & hūc clysterem iniicere mādauimus per pharmacopœi uxorem: ʒ. absinthii communis, centaurei minoris, calaminthæ, florum chamomilla, caulium rub. pulegii, marrubii ana m. ss. seminis coriandri preparati, santonici (quod vulgo semen lumbricorum vocatur) ana ʒ j. fiat decoctio in aqua communi, pro lb. j. adde hieræ picæ ʒ ss. benedictæ laxat. ʒ iij. olei absinthii, amygd. amar. ana ʒ ss. olei oliuar. ʒ j. salis ʒ j. ss. fiat clyster; ex quo ter secessus mucosos & pituitosos habuit. Sed eo tempore in excrementis vermiculos illos anum pungentes non conspeximus, quamquam eo clystere dolor & ani pruritus cessarūt, neque amplius illis vermiculis tentabatur. Quod si ascarides eo modo non fuissent extractæ ac expul-

2. *sa, medicamento Aetii vti fuisset, quod & pueris, & iis qui perfectæ sunt ætatis, conuenientissimum esse scribit. Id vero est tale: carnem veterem salitam pinguedine derafa, sublongam & rotundam formabimus, atq; ita adaptatam podici astrictiore parte intrudemus, ligamentoq; adhibito, quam diu sustinere possint, inditam sinemus, deinde soluemus, huicq; carni extractæ solent adherere vermes. Verum post clysteris operationem hoc linimento circulum ani etiam interius inungi mandauimus. ℞. olei myrtini, coroneorum an. ʒ. ʒ. acacia, hypocystidis pul. semin. plantag. an. ʒ. j. aloes ʒ. ʒ. cera modicum. Quibus iam dictis remediis cessauit pruritus, & ascaridum generatio. Verum cum huic longo tempore mentes defecissent, ad eos excitandos decocta propria præscripti, vt ex pulegio, sabina, quæ similiter vermes pellunt. Et sic ab hoc cædo malo non solum liberata fuit; sed postea etiam menses fluere cœperunt, & optime deinde valuit: quæ & hoc tempore adhuc viuebat, cum hæc rescriberem, anno 1591. mense Ian.*

S C H O L I A.

3. **A**SCARIDES potius sunt vermes, vt dictum est, quam lumbrici, in recto intestino & sphinctere nati. Hoc etiam genus in foeminarum pudendis nasci posse auctor est Hippoc. lib. de morb. mulierum. Garcia Lopus Lusitanus medicus com. 13. de varia rei medicæ lectione, testatur, se vidisse eos in collo vteri matronæ, & multitudinem eorundem expulisse; quæ liberata fuit post multos cruciatus. Gal. tamē 1. de loc. aff. in intestinis fieri voluit, & 4. Meteor. Bertrutius ait in ano generari ex materia putrida, pituitosa, viscosa, atque signa eiusdem aut ani pruritus frequentem esse; suntq; vt tineæ parue in caseo: & forte non apparent (inquit) nisi anus inuersetur cum ventoso. Et licet sint parui omnes, variantur tamen in colore, & figura, pro materia diuersitate, ex qua sunt. Si vero reperiantur similes seminibus cucurbitæ, non sunt geniti in ano, sed in colo & longanone, quæ descendunt ad anum; quorum curationem idem dixit cap. de cura colicæ ex vermibus. Diligenter autem curandi sunt, cum ægrum ad teneismum deducant cum excoriatione, & forte ad rhagadas ani, & vlcerâ corrosiuâ, fistulosa, aut dysenteriam perniciosam. Sic etiam ex labore & dolore tandem febris incitari quoq; potest. Duplicem intentionem curandi habent, Leonello teste, vna respicit causam coniunctam, & vermes ipsos; alia antecedentem, phlegma ipsum considerantes ex quo gignuntur. Prima interficit vermes, & repurgat anum a phlegmate crasso, abluendo anum cum ʒ. iij. aceri optimi & oxymell. simplicis ʒ. ij. cum peciis lineis infusis, aut in sessu huius decocti: ℞. absinthii, prassii, fol. persicæ, stæcha. arab. an. m. ij. amygd. amar. parum pistarum ʒ. ʒ. bulliant in s. q. aquæ, & cum ano infideat: demum exsicceatur, & ita liniatur: ℞. olei amygd. amar. absinthii, ex nucleis persicorum ana ʒ. ʒ. aloes non lotæ ʒ. ij. colocynth. interior. agar. ana ʒ. j. puluerisanda pulueriscentur, & cū oleis prædictis bulliant; & modica cera adiecta fiat vng. Secunda intentio, ad causam præcedentem, nempe pituitam, ea ipsa digerenda cum syrup. de duab. rad. oxymell. scillitico admixtis aquis absinthii, & similibus: deinde pituita repurganda cum

diaphœnic. elect. indo, ex hiera & similib. Aliqui & clysmata iniiciunt, ex succo vel aqua porri, scordii; vel potest iniici, quale nos præscripsimus, balanis inditis cum lana molli ex bombace, & felle raurino inuoluta. Reliqua vide apud Bertrutium. At pari modo vt lati, & qui ascarides nominantur, vehementiora medicamenta desiderant, ex eiusdem Galeni decreto, minimeque eorum curatio negligenda est; sed citra dilationem perfici (vt inquit Aetius) debet. Quare acri muria infusa, aut absinthii decocto, oleo admixto vacuandi sunt, vel centaurii decocto, cum nitro, & melle: aut absinthii, aut chamæleonis, aut hyssopi, vel pulegii, seu calaminthæ, aut lupinorum. Infantes vero glandibus ex melle cum salis momento vacuari debet, vt inquit Paulus. Poteris & in prædictis glandibus (vt etiam admonet Donatus) adicere stercoris murium, salis gemmæ, agarici, ac pul. hieræ simplicis parum. Vbi vero recrementa prodierint, affectus locus illinendus est simplicibus quibusdam medicamentis, vt acacia, hypocystidis rhoisq; succo, cum alumine liquido, aut alio eiusdem generis adstringenti medicamento. Contra enim ab adstringentibus affecta pars corroboratur, aptitudinemque ad animalculorum generationem amittit, atque ascarides ipsos excludit, vt liquet ex Aetio. Eadem quoque & similia adstringentia, in aqua maris, aut adstringenti vino decoquantur, & eo calido aluius foneatur, ac irrigetur. Vel post carnem inditam ex Aetio, vt in obser. diximus præcedenti, prædicta iam infundemus, atq; illinemus. Idem etiam remedium sæpius reperemus; in quam etiâ figuram, casei, præsertim quod vulgus Italorum (vt refert Donatus) Siculum nominat, portio quædam si redigatur, melleq; illinatur, ac sæpius immittatur, confert; vt idem Donatus non raro expertus est. Conducit quoque ad teretes educendos, etiam infantibus. Nos poterimus vti nostro caseo aliquo modo recenti, non autem valde sicco, melle obliniro. Plura apud Aetium legito, lib. 9. cap. 41. de Ascaridibus.

Et ita omnem curationem de vermibus absolui-mus, & huic libro finem imponemus, transeuntes nunc ad geneta profluuiorum alui, de quibus libro sequenti agere institui-mus, cum & vermes aliquando non sine eiusmodi alui profluuiis ægros tentare soleant.

FINIS LIBRI XXI.

LIBER VIGESIMVS
S E C V N D V S.DE DIVERSIS GENERIBVS
profluuiorum alui.

OBSERVATIO I.

De fluxu ventris diuturno.



Vt diuturno alui fluxu laborabat, & omnem suam substantiam frustra in medicorum ope consumserat, consilii causa, vt ab hoc malo liberari posset, me accessit: cui consilium

Vermiculi in collo vteri reperi & expulsi. Tract. 5. sect. 3. de vermibus in ano.

Prognostica.

Curatio.

Ascaridum medicamenta ex Gal. Aetio & aliis.

5.

6.

filium dedi, vt mespila etiam immatura in maxima copia deuoraret: quibus comestis alui profluuium paucis diebus cessauit. Vti & cuidam euenit mercatori Zelando, ad Ioannem Spirinchium; quondam medicum Louanensem celebriorem profecto, vt ab eo curaretur: qui cum multis mensibus laborasset profluuium, & tandem etiam dysenteria, neque ab vllis medicis curari posset, tandem mespilis comestis, ex eiusdem medici consilio, sanitatem consequutus est, & medico trecentos aureos pro sola mespilorum præscriptione numerauit; quibus solis in pristinam sanitatem fuerat restitutus.

S C H O L I A.

2. **R**ECTE dixit Iacchinus, *difficilem esse tractatum de fluxu ventris, propter iuniores, qui multa capita fluxuum fecerunt sine ratione*: nominantes fluxus etiam a causa remota, vt *cerebrales, oppilatiuos, loriuos, hepaticos, spleneticos*; cum breuius diuisionem facere expediret, ad inueniendos affectus, qui curari debent. Et sic tres tantum apud veteres positi sunt profluuii modi, sumti a ratione eius quod excernitur. Vel enim cibum excerni videbant, & appellabant lienteriam; vel sanguinem, & dicebant dysenteriam, vt 3. de sympt. causis: vel humores alios, quicunque essent, excepto sanguine, quæ omnia diarrhææ nomine dicebant. Hoc vero genus, & differentias sumebant ex eo quod excernitur. Vel enim chylum refert, id est, cibum in ventre concoctum, sed non distributum; vel alios humores, vt bilis genera, vel pituitæ, vel atræ bilis: & in his nomina propria non imposuerunt semper; sed neque expedire exillinat Iacchinus, atque sat esse nosse affectus, a quibus talia profluua fiunt, quibus etiam curatio debetur. Cum itaque cuiuscunque generis fuerint profluua (*postquam de tormentis intestinorum & de vermibus tractatum absoluerimus, & de cita alui deiectione, eiusque causis generalibus*) etiam pertineant ad affectus & vitia intestinorum, de iis nunc dicere institui-
mus: factio initio de Diarrhæa, id est, *alui profluuium*, seu ventris fluxu. Vbi enim liquida est aluus, & sæpius quam ex consuetudine fertur, affectus quidam exoritur, qui Græcis, *διάρρεια* communiter, simulque ab Hippocrate *aphorism. 26. & 30. 3. lib. 40. 32. 6.* aliisque plerisque locis appellari consuevit. Quamquam ab eodem Hipp. & Gal. quandoq; *ρῶδης* nuncupetur, vt patet 1. de morb. vulg. A Latinis autem Diarrhæa seu alui profluuium appellatur: quamuis a Celso, *cap. 19. lib. 4.* ventris fluxus nominatur, qui copiosior fluxio est alui, diuturna, sine phlegmone, & exulceratione, vt lib. defin. medicinal. scriptum est, vel (*vt liquet apud Galenum eodem 1. de morb. vulg.*) deiectio est, vt semper & assidue humidorum excrementorum, sine dictis affectibus (*vt ipse inquit*) qui affectus prius ab eo descripti erant, dysenteria videlicet, lienteria, & tenesmus. Cum itaque aluus fluxione laborat, seu humidior efficitur, citra cruentas deiectiones, tensionem, ac incoctorum ciborum excretionem; alui profluuium est, & dicitur. In quo tamen pars affecta, vt longiore sermone docet Dona-

us ex Hippocrate & Galeno) dubia est: cum constet in diarrhæa non perpetuo vnâ affectam esse partem, neque etiam ventriculum, aut intestina duntaxat: sed interdum iecur, aut lienem, seu cerebrum, aut corpus totum affectum esse, citra ventriculi aut intestinorum oblætionem. Interdum vero contingit, quod ventriculus ipse aut intestinorum aliquod afficiatur, corpore toto, aut reliquis eiusdem corporis partibus bene valentibus. Et quoniam tunc pro prognostico (*vt recte quoque dixit Donatus ab Alto mari*) tum etiam pro curatione huius affectionis, magnoperè conducit determinatæ partis primario affectæ cognitio, veluti in cunctis aliis præter naturam affectibus necessarium esse, sæpe demonstratum est; quare de ea re hic agendum omnium primo. Interstingues namque si a toto corpore diarrhæa fiat, quoniam aderunt alicuius redundantis succi in toto signa, siue in toto habitu fuerint, aut in vniuersis vasis, qualiscunque etiam fuerit redundantis succus. Particulariter autem ea conscripta reperies apud Galenum, cum libro *de plenit.* tum etiam 4. de *sanit. tuenda*, ac aliis plerisque locis. Præter id, quod oriosa quoque vita præcessit, consueti exercitii dimissio, ac ingestorum ciborum & potuum copia, aut consuetæ alicuius excretionis retentio; neque vllum aderit signum particularis partis affectæ. Verum si a toto fiat, propter eiusdem corporis liquationem, cum portio carnis, quæ colliquatur, in ventrem defluit, tunc per aluum excernitur deiectio exigua, glutinosa, opima, admodum graueolens. Pariter si propter vniuersi corporis re-
tentricis facultatis imbecillitatem, ex totius corporis extenuatione præcedente, ardentissimaque febre, seu hectica, seu etiam tæbe, id coniicere poteris: quemadmodum Hippocrates scriptum reliquit *aphorism. 11. 12. & 14. lib. 5.* Huius exempla posuimus in libris nostris. De febribus hecticis; & etiam de fluxu colliquante, nempe *obseruat. 40. lib. 2. de febr. colliquante & obser. 7. lib. 4. de fluxu in febr. hectica, & obser. 9. de marasmode.* Cerebro autem affecto spumosa aderunt excrementa, vt *idem inquit Hipp. aphor. 30. lib. 7.* nec minus & imbecillitates eius apparebunt, ac destillationes, & quandoque dolor. Quæ omnia scripta reperies cap. de dolore capitis ac destillatione. Consuevit quoque vitio cerebri orta diarrhæa in somno, potissimum longiori, magis, quam in vigiliis generari. Sic excrementis iudicare possumus, ex qua parte fluat: nam spumosa & pituitosa a capite; & ex iis agnoscitur, quæ circa caput apparent, vt grauitate, multitudine sputi, & quod mane magis fluat & nocte, quam alio tempore: & hæc species diarrhææ longo tempore durat; & qui hac laborant, sentiunt ob pituitam fluentem ad ventriculum, dolorem, cruditatem alimentorum; non multum sitiunt, & sunt somnolenti: de spumoso tamen excremento Galenus monet non necessarium esse, vt adsit in profluuium alui a capite orto, vt longius annotat interpres Hollerii, cum & in dysentericis materia commota & calore astuante agitata, videamus spumosas deiectiones fieri, ideo illa sunt adiicien-

Pars affecta dubia est.

Quod non una duntaxat pars semper in diarrhæa afficiatur

Quibus indiciis dignoscenda sit pars affecta in diarrhæa

5.

A toto corpore

A cerebro

6.

A iocinore.

da signa, quæ circa caput apparere diximus. A iocinore vero, ubi ortum fuerit alui profluuium, ut plurimum chylosæ erunt alui deiectiones. Probe tamen ventriculi coctione celebrata, potissimum si attractrix iocinoris facultas oblæsa fuerit, idque non ob aliud (ut dictum est, cum de iocinoris affectibus loqueremur) quam propter distributionis imbecillitatem, nisi plus cibi fuerit absumtum, quam hepar indigeat, aut citius fuerit deiectus propter ventriculi & intestinorum retentricis facultatis imbecillitatem. Id quod dignoscere valebis ex iis, quæ de lenitate intestinorum dicemus. Interim quoque bilis multitudo in deiectionibus apparebit; ac signa aderunt inflammationis, aut immodicæ caliditatis eiusdem: quemadmodum si ab eius obstructione proueniant, obstructionis quoque aderunt signa. Sic si alius quispiam affectus iocinoris, præter iam dictos, adfuerit, ex propriis eius notis id manifestabitur, ut in præcedentibus, cum de affectibus hepatis loqueremur, fusissime pertractauimus. Ideo ubi alui excrementa biliosa sunt, & male olentia, tunc considerandum, an adsit febris, vel iecoris inflammatio. Nam odor ille grauis putredinem semper indicat; putredo autem semper febrem adfert, ut & interna inflammatio. Cum tale apparet recrementum, considerandum, quo tempore cœperit fluere, (ut recte admonuit Rondeletius,) & morbi naturam, & partem. Nam multum refert, si in principio vel declinatione talia reddantur, & si in inflammatione hepatis, vel pulmonum; vel si fiat in hydrope, & phthisi, & febre hectica, vel aliqua specie febrium biliosarum. In febribus biliosis utilis est talis diarrhœa, si in declinatione, apparentibus signis coctionis, incidat; & in principio etiam cum magna plenitudo adest. In morbis autem, qui cum tale & atrophia iuncti sunt, mortem indicat, ut Hippocr. scripsit de tabidis, aphorism. 14. lib. 5. quod non solum de phthisi est intelligendum, sed omni atrophia, ut in febr. hectica, hydrope, & aliis multis. Significat enim summam imbecillitatem partium naturalium, & potissimum facultatis retentricis. Fere omnes hydropicos diarrhœa mori obseruaui. Partem vero inflammata considerate oportet, quia in inflammationibus hepatis, splenis, ventriculi & omnium partium naturalium diarrhœa in declinatione est utilissima, si notæ concoctionis appareant. Quod si in inflammationibus pulmonum & costarum accadat, inutilis est, imo periculosa; quia nihil a partibus inflammatis euacuat, & corpus liquefacit. Id quod prudenter monuit Hippocrat. aphorism. 16. lib. 6. Morbo laterali, vel peripneumonia correpto, &c. Sed quoniam idem iecur non solum sua ipsius excrementa, saniemq; & humores præter naturam demittit in venterem, sed etiam corporis totius; quandoquidem venter per id omnibus corporis partibus copulatur, ac per illud recipit excrementa earum, ut liquet ex Galen. 2. progno. Propterea id distinguere poteris ex signis iam traditis. Si totum corpus fuerit affectum, aut si aliæ partes quædam, ex earundem partium affectarum propriis indiciis id cognoscas. Et sic fiunt multæ aliæ

fluxiones, vitio alicuius visceris, ut inflammatione hepatis, tumore lienis, & similibus, quæ ad alia capita referri debent. Hollerius (ut in Scholiis suis annotauit) scribit, se fluxum quandam diuturnum in multis obseruasse, in quo varia, opima, nigra, carulea, viridia, sat corpulenta excernebantur. Ex quo alios euasisse, ut Aduocatium De la Vergne, Anglum, pædagogum, &c. vidimus; alios interiisse, ut duces celebrem peditatus in exercitu, fabrum argentarium, & similes. Omnibus fere vitium in visceribus, & vlus in postremo intestino. Quidam post sextum annum, quo eo morbo laborauerat, interiit, obfesso hepate multis vomitis, syderata parte mesenterii. His qui conualuerunt, interuallis idem morbus rediit, vel dysenterica excrementa. Verum si a splene Diarrhœa proueniat, ut plurimum deiectiones ad nigrum vergentes, aut etiam nigrae erunt, patebuntq; particulares eius ægitudines ex propriis earum indiciis, de quibus a nobis loco proprio mentio facta est. Accidit interdum ab oris seu linguæ affectione alui profluuium: ab ore quidem, ut in pueris cum dentire incipiunt, maxime cum caninos edunt dentes, quoniam alimentum non bene concoquitur, neque distribuitur, ut patet aphorism. 25. lib. 3. A lingua vero, ut in blæsis, quemadmodum liquet aph. 32. lib. 6. quoniam iis, qui balbi natura sunt, contingit aut cerebrum habere humidum, aut linguam, aut vtrumque, atq; inde fluentes humiditates in ventrem suscipi; unde & longis profluuiis capiuntur, quemadmodum Galenus scriptum reliquit comment. iam dicti aphorism. At si nullum aderit vniuersi corporis affectus, aut prædictarum partium affectarum signum, ventriculum seu intestina affici putandum est. Alimenta quoq; interim non probe concocta cum humidioribus deiectionibus, admodumque aquosis apparebunt. Neque tale alui profluuium determinatas habebit periodos; deiectiones tamē aderunt crebrae, & exiguae, & ut plurimum albæ, & pituitosæ. Interdum nausea, & vomitus infestabunt, ac alia quædam symptomata, quæ imbecillitatem ventriculi & intestinorum significabunt, ut de vomitu ostendimus, & de lienteria dicturi sumus. Verum inter reliqua, ubi diuturnum fuerit alui profluuium, propriam ventris passionem indicat, ex Galeni decreto comment. præcitati aphor. 32. lib. 6. Si recrementa putrida fuerint, & febris non adsit, neq; sentiatur dolor in aliqua parte, argumento est, illa fuisse diutius retenta a constrictione alui, vel a corruptis alimentis fieri. Confirmabit coniecturam nostram, si quibus alimentis prius fuerit æger vsus, sciamus; ut si facile corruptibilibus, qualia sunt pepones, cucurbita, lac post cibos alios assumptum. Vel si comederit carnes perdicum diutius asseruatas, & aliarum auicularum, quarum substantia facile alteratur: aut nimis humida, quæ cum facile corrumpantur, a natura reiciuntur, ut pisces. Alimenta acris & salsa diarrhœam aliquid faciunt, cum corpus recrementis abundat. Fit aliquando Diarrhœa ob ventris constrictionem externam, vel a medicamentis, vel ab aere nimis constringentibus. Ea causa procatartica

Holler. Hollerit.

9.

A splene.

Ab oris & lingua affectione.

Si ventriculus aut intestina afficiantur signa.

A corruptione alimentorum.

Ab alimentis acris.

7. Biliosa deiectiones quomodo consideranda.

Quibus utilis diarrhœa, & quibus non.

Etica facile dignoscitur ex præcedentibus, & maxime fit post medicamentum purgans, si aeri frigido exponant, vel si medicamentum effrene fuerit, *vt colocynthis male preparata*. Tunc iudicamus ventriculum esse causam diarrhœæ, aut intestina, si nulla ex prædictis causis præcesserit, nullusq; dolor in alia parte sentiat, & sit ventriculus supercalfactus. Nimis etiam alimenta corrumpit, aut propter intemperiem frigidam, multitudinemq; cibi non potest concoquere. Sed illa causa magis lienteriam facit, quam diarrhœam. Intestinorum etiã laxitas, imbecillitas & intemperaturæ in causa esse possunt. A multitudine humorum agnoscitur fieri, si singulis annis bis aut ter soleat fieri, natura sese exonerante liquidis & serosis humoribus; ac si notæ illius redundantie apparuerint, præcesseritque victus ratio gignens. Nulla talis euacuatio subita retinenda est, nisi in phthisicis & quibus minus conuenit, vt in inflammatione pulmonum & costarum. Sed hæc omnia iam dicta exemplis multo clariora euadent.

OBSERVATIO II.

De diarrhœa seu fluxu ventris liquido, cum serosis humoribus.

1. **Q**UOD A M singulis fere tribus mensibus subito fluxu laborare solebat admodum aquoso, idque ex multitudine humorum, natura sese exonerante ab humoribus liquidis & serosis; præsertim si olusculis humidis vteretur, vel cucumere, aut peponibus, quib. maxime delectabatur. Ad quem ingressus, cum causam huius profluuii probe intellexissem, cum vires illi non delicerentur, nolui hanc euacuationem cohibere subito, interea tamen iussi, vt ab iis alimentis abstineret, quæ nimis humida essent, & ventrem conturbarent. Concessi vsum lactis cocti, postea etiam chalybeati, cum paucis zaccharo. Lac vero minus coquitur in principio, vt magis detergat, postea multum; vel ferro candente, vel lapillis serosa substantia absumatur. Conuenit autem caprillum, vel ouile, vel vaccinum, non asininum, quia nimis ventrem turbat. Exterius vero ventriculum roborauimus cum iis, quæ parum constringerent, & robor adderent, exsiccarent, & modice calfacerent, vt oleo rosaceo, omphacino, mastichino, & absinthii, paucis vino in principio postea cum aceto; hoc enim modo, vt nardinum, conuenit partibus ventris inferioris inungendis. Non oportet tamen hanc euacuationem retinere subito. *Quod si moliaris* (inquit Rondeletius) *ad retentionem in principio oportet sint imbecilliora remedia, vt quæ ad extra ponuntur, & datis quibusdam leniter astringentibus alimentis ad faciendum, vt id, quod in gracilioribus intestinis iam defluxit, non retineatur.* Vbi igitur a multitudine humorum fiat, fluatque sufficienter, danda erat opera, vt corpus crassioribus alimentis nutriatur, potius quam vt medicamentis retineatur. Vbi iam cognouerimus purgationem sufficienter factam, tunc medicamentis aliquibus constringere tentabimus: & quo securius ista astringentia adhibeantur, vtilissimum erit prius dare lene aliquod medicamentum laxans & adstringens, vt si quid restat
- 2.

euacuandum, euacuetur; vt certius cognoscamus euacuationem esse factam humoris defluxi. Sunt autem conuenientissima remedia, quæ parantur ex *rhabarb. myrob. mastiche.* ex quibus pilulæ confici possunt, quæ in omni defluxu ventris, iuxta *Rondeletium*, tuto dantur: *℞. myrob. citrinorum, chebul. ana ʒ ss. mastichis ʒ j. spicanardi gr. vj. cum syrup. rosat. fiant pilulæ, de quibus capiatur ʒ ss. pro prima vice, deinde ʒ j. si opus fuerit reiteratione.* Nos hoc ita composuimus, cum potius hic esset materia liquida pituitola: *℞. myrob. chebulorum ʒ j. mastichis ʒ j. spicanardi gran. v. cum melle ros. fiant pilulæ, dedimus ʒ ss. pro vice.* Si fluxus perseveret, appareatque humorum abundantia, certissimum indicium perfectæ purgationis est, si ægri fuerint citra febrem, vt *Hippocr. de medicamentis dixit lib. 4. aphorism. 19.* In his optimum est, clysterem deterforium ad ablutionem iniicere, & statim post, astringentia supra ventrem & circa sedem apponere. Apposui etiam ventriculo ceratum ex mastiche, ad ventriculum roborandum; quod & alteri profuit post pilulas mastichinas exhibitas. Non oportet enim naturæ motum noxia expellentis reprimere; imo aliquo modo adiuuare eam debemus, & deinde virtutem ventriculi & intestinorum medicamentis tam assumtis, vt *diacytonite, cum speciebus;* quam exterius, vt *oleo mastichino, nardino, menthaceo, (adiectis puluisculis mentha sicca, caryophyll. & corall. rub. & cera exiguo)* vnguenti instar ad motus roborare. Et ita hic curatus fuit. Victum eidem probum institui, ne in idem malum denuo delaberetur.

S C H O L I A.

QUOD vero quodlibet alui profluuii symptoma sit in genere excretorum immodice, nemo est qui contrarium sustineat. Nam quæ in eo excernuntur, aut tota substantia, aut quantitate, aut qualitate a naturali statu recedunt. Item quod (velut reliqua symptoma) omnino morbis succedat, vel cōtinenter, vel aliis symptomatib. intercedentibus, cuius patet: etenim semper causam aliquā habet præter naturam, quæ ad talem motum seu actionem naturam stimulat, ex *Galen. sententia 2. de caus. sympt.* Ad hæc etiam, quod ex necessitate ventris profluvia eueniant, vel coctione vel distributione frustrata (nisi ad intestinorum exulcerationem consequantur) liquet apud eundem Galenum, comment. *aphorism. 25. & 30. lib. 3.* Non tamen necessario aut retentrix, aut expultrix facultas (vt recte annotauit *Donatus*) in eis oblata est, ex eiusdem *Galen. auctoritate lib. de diff. symptom.* Nam cum alimentum non bene concoquitur, neque distribuitur, consuevit alui profluuium euenire. Imo absque iis fieri non potest: tamen cum ipsum, aut non probe concoctum sit, aut non distributum vt decet, interim symptomatice, hoc est, non ad animalis commodum, neque tempestiue excernitur: interdum autem tempestiue, & ad animalis cōmodum, cum prouidentia scilicet de eius salute, & cum virtutis robore: id quod maxime in hac affectione attendendum est, pro eius curatione. At quomodolibet fiat alui profluuium, crebriores, ac li-

quidiores deiectiones aderunt, cum leuiori, ac tolerabili interdum dolore, interim autem grauissimo, *vt Celsus fatetur*. Verum nunquid ea, quæ deiciuntur bonæ sint secretionis indicia, aut secus, sic interstingues. Nam si madens, seu aquosa deiectio crebro, & paulatim, aut vniuersim, & sæpe deiciatur, ac cum stridore, grauissimoq; dolore, symptomatis ratione obtinebit, ac symptomatica erit, natura non per se expurgante, sed ab aliquo irritamento stimulata. Neque inde utilis vlla prouenit, imo talis euacuatio (*de febr. alias diximus*) prauæ dispositionis erit signum, *vt liquet comment. aph. 2. 4. lib.* Idque potissimum, vbi in principio apparuerit, nulla concoctione præcedente, & in febr. At si multo interposito tempore, ac vniuersim, citra stridorem, cum exiguo aut nullo dolore excernatur, præcesserint concoctionis signa, ac proportionata corporis dispositioni fuerit alui deiectio, ægerq; facile toleret & iuuetur ex tali euacuatione, leuius se habens, virtusq; robustior euadat, tunc bonæ secretionis indicium erit. Natura enim expellit per se atq; expurgat noxios redundantes succos, qui corpus infestabant. Vtunque vero fiat diarrhœa, eius causa erit, aut male cōcoctus, aut male distributus cibus in inferiori vêtre; vel humor quispiam ad eum confluens a toto, vel aliqua corporis parte, critice aut symptomatice, diductione a finibus concidente: & propterea a iocinoris vel reliquarum corporis partium concoctione, seu distributione oblata, tale quoq; fit alui profluuium; cum & quælibet madens deiectio fiat, *vt testis est Galenus eodem 2. prognost.* Propterea quod non fuerit ex ventriculo diductio ad iecur, vel quia de iecore, vel liene aliquid defluerit in eum. Cum namque humorum superabundantia per aluum expurgatur, alui profluvia fiunt, *ex eiusdem Galeni testimonio, comment. aphorism. 16. lib. 3.* Ex quorum permixtione cum alui deiectionibus (*vt diximus*) variari contingit, non solum deiectionum colorem, verum etiam consistentiam, atque odorem, item & copiam: neque etiam seruabitur tempus secretionis assuetum. Verum si quis velit non proprie, sed vniuersaliori vocabulo hanc affectionem alui profluuium nuncupare, cum in ea nec concoctio ventriculi, nec intestinorum distributio, ex eodem ventre inferiori ad iecur, fuerint per se læsæ; vel si velit quispiam fateri in hac quoque affectione concoctionem aut distributionem ventriculi vel intestinorum oblata esse (*& propterea alui profluuium dici*) licet non per se & primo, *ex Donati opinione*, non reclamabimus. Et sic nos vna cum eo diarrhœam seu alui profluuium dicimus quamcunque humorum excrementorum crebram deiectionem, *iuxta Galeni sententiam 1. de morb. vulgar. vt superius annotauimus*. At vbi admodum aquosa deiectio fuerit, minimeque graecolens, ad candidum potius vergens, quam croceum seu nigrum; & interim spumosa; alimenti non probam concoctionem, seu eiusdem imperfectam distributionem indicabit: aderunt nonnulla signa eorum, quæ ventrem ipsum affectum ostendent. Verum si ex

alimentorum copia, aut eorundem mala qualitate talia fiant excrementa, ex ægro, seu assistentibus id percipere valebis. Quo casu nec coctio, nec distributio per se oblata erunt. Vbi vero ruffa seu admodum crocea deiectio fuerit, bilem esse causam iudica; potissimum, si ætas, temperamentum, habitus biliosi fuerint, ac tempus anni, regio, aeris constitutio, ad calidum vergant, similiter & anteacta vita. Sic si pituitosæ, aut melancholiæ deiectiones fuerint, ac modo dicto ad pituitā, vel melancholiam vergant, pituitam, aut melancholiam alui profluvii causam esse putabis. Quod si syntetica fuerint alui excrementa, id quod in calidissimis ac pestiferis febribus contingit, (*& horum exempla plurima de feb. posuimus*) si in corporib. generetur humidis, ac mollibus & pinguibus, *vt liquet 10. meth. med.* colliquationem tum carnis, tum adipis significabunt; habebuntque diuersum curationis modum: cum iis videlicet, quæ refrigerant, & humectant corpus, nutrientibus, ac quam primum frigidam exhibendo, *vt fufius diximus, cum de febr. sermo haberetur. Hæc ex Donato hic adiecimus.* Plura si de causis profluvii alui desideres, lege Iacchinum supra Rhas. & alios auctores, tam de causis procatarcticis, quam corporeis.

OBSERVATIO III.

De diarrhœa & alui fluxu vltra tres annos perdurante.

VI R quidam consularis, macilentus, niger, hirsutus, cum tribus annis diarrhœa laborasset, neque vllis remediis a ventris fluxu admodum aquoso & liquido curari posset, eadem cum pulrem ex glandibus comederet, aluus ei restricta est, cum alia præsidia non conferrent. In pauperibus, si fluxus non cōstringeretur, post vniuersalia remedia, soleo commode exhibere 3 j. sem. plantag. exsiccati cum ceruisia vel ouo sorbili: idque post deteriora medicamenta, & lotiua dicta.

S C H O L I A.

PLVRES sunt differentia fluxus, *vt diximus*, tam ex parte materiæ, quam membrorum; ex parte materiæ, vt lientericus, diarrhoicus & dysentericus, & ideo erat hic fluxus diarrhœæ. Rursus ex parte membrorum a quibus defluit materia ad intestina, velut a cerebro, stomacho, liene, aliisque membris, *vt dictum est*. Causas & signa diarrhœæ, de qua prius dicere institueramus, tum eius signa, *Signa demonstratiua.* ex parte iam diximus: & quod ad demonstratiua attinet, facile cognoscuntur ex iis, quæ euacuantur & a corpore exeunt, siue sit materia humoralis, quæ diarrhœam demonstrat, siue sit cibus non concoctus aut chylus. Signa causarum etiam diximus. Nam vt signa generum fluxus modo cognoscuntur per relationem infirmi ex præteritis, modo ex his, quæ concomitantur fluxum; ita & fluxus facti ob causas primitivas, habentur quoque ex iis, quæ præcesserunt: & per ægri sermones, siue sit ex cibis comestis, vel medicamentis quoque acutis, clysteribus, veneno. At ex quibus humoribus fiat diarrhœa, iam quoque dictum est. Restant adhuc signa prælagientia & mere prognostica. Sic Hippocrat. 3. aphorism. 12. hyeme, australi

itali existente & pluuiosa, alui profluuia expectanda pronuntiavit, vere sereno & sicco superueniente, & 17. aphorism. Austrinas constitutiones aluos humectare prædixit. Sic & ex dispositione corporum, lib. 2. aphorism. 20. Quibus inuenimus, inquit, adhuc aluus humecta est, his senescentibus exsiccatur: & quibus iuuenibus adhuc aluus sicca est, his senescentibus humectatur. Iam & dentire incipientibus pueris alui profluuia contingunt, vt li. 3. aphor. 25. & balbi ab alui profluuiis maxime capiuntur, ex aphor. 32. lib. 6. Alii addunt. Ex vrina alba, subtili, translucida, in febribus acutis, prius colorata vel crassa, laseone non consistente in aliis membris particularibus, materia ad intestina deriuata, acuta, fluxus expectandus. Sic & corpora cerebrum habentia humidum, & stomachum & intestina debilia, facile in fluxum incidunt, etiam ex materia assumpta: vt ii, qui mustum bibunt vel vinum crassum dulce, eo facile tentantur, & iuxta aphor. 73. lib. 4. Quibus illa suspensa murrant, lumborum dolore superueniente, his alui humectantur, nisi flatus erumpant, aut vrina multitudo proueniat: hæc vero in febribus. Quod ad signa Prognostica attinet: Sic cum fluxu (teste Auicenna) remanet appetitus, & caussa eius non sit bilis acuta, bonum censetur. Et Hippoc. lib. 1. aph. 2. In perturbationibus ventris & vomitibus spontaneis si talia purgantur, qualia oportet, confert & leuiter ferunt: sin minus, contra. Et in profluuiis alui, inquit, mutationes excrementorum iuuant, nisi ad mala mutatio fiat. Quibus in febribus aures obsuruerunt, sanguis ex naribus fluens, aut aluus turbata, soluit morbum. Lib. 2. aph. 14. A longo alui profluuiis habito spontaneus vomitus superueniens morbum soluit. Lippientem alui profluuiis corripi, bonum. Qui alba pituita detinetur, si forte ventris fluxus superuenierit, a morbo liberatur. Qualia fuerint vesica & alui excrementa, & ex carnibus, & sicubi alibi a natura corpus exierit, si parum, paucus est morbus: si valde multum, lethale. At fluxus (iuxta Auicennam 16. tertii) si non minuat nec auferat, facit tamen debilitatem: at si stringatur, infert inflationem, si fit cibalis vel chylosus, & omnis fluxus subito eueniens post ægritudinem, significat mortem: addunt alii, modo non sit criticus, vel signa coctionis adsint. Vno autem die fluere aluum (inquit Celsus) sæpe pro valetudine est, atque etiam pluribus, dum febris adsit, si intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus (vt ipse inquit) & quod intus læsurum erat utiliter effunditur. Verum spatium periculosum est: interdum enim tormina ac febriculas excitat, viresque consumit. Alexander quoque cap. 5. lib. 8. dicebat, alui profluuiis in febribus difficiliorem esse curationem; animaduersionemque & coniecturam requirere. Sed de eiusmodi egimus in libris nostrarum obseruationum, & exempla plurima posuimus. Interea & hoc sciendum, (vt paulo ante dictum) quod longo alui profluuiis si spontaneus vomitus superuenierit, teste Hippoc. aphorism. 15. lib. 6. morbum soluit. Sed & exigua deiectio glutinosa, candida, sub crocea mala, potissimum vbi levis fuerit; exitiosior vero, si nigra aut liuida, aut opima, aut fetida; diuturnior, si versicolor sit, sed nihilominus

etiam exitialis. Idem & Hippocrat. scriptum reliquit 2. prognosticorum. Et 5. aphor. 12. Quibusunque tabe laborantibus capilli a capite defluunt, his alui profluuiis superueniente, moriuntur. & 14. aphor. A tabe habito, profluuiis alui superueniens lethale. & 34. Mulieri in vtero gerenti, si aluus plurimum profluat, periculum est ne abortiat. Et 6. aphor. 16. A morbo laterali vel pulmonia habito, alui profluuiis adueniens malum. lib. 7. aphor. 6. In morbo diuturno, fastidium cibi, & deiectiones syncere malum. & 17. eiusdem libri. A puris sputo phthisis & fluxus; cum vero sputum retinetur moriuntur. Omnis singultus in fluxu quolibet, & maxime cum sequitur tenesmus, est lethalis, cum magna ex parte talis singultus sit ex inanitione, ideo mortis signum. Sic & Hippocrat. lib. 5. aphorism. 4. Ex superflua purgatione singultus aut conuulsio superueniens, malum. At lippientem capi diarrhoea, bonum est. 6. aphorism. 17. Et sic diarrhoea ex interuallis venientes, vniuersum corpus aliquando expurgant.

OBSERVATIO IV.

De diarrhoea ob ventriculi imbecillitatem.

Nobilis matrona, vetula, cum aliquo tempore alui profluuiis laborasset, tandem me in consilium adhibuit: & imperavi vt excrementa reseruaret; quæ liquida erant, valde aquosa minimeque graueolentia, & ad candidum colorem potius, quam croceum vergentia, interim & spumosa. Quæ cum vidissem, & stomachum imbecillum haberet, iudicabam alimenti non probam fieri concoctionem, & imperfectam fieri distributionem, ob imbecillitatem retentricis ventriculi & intestinorum. Cum igitur adesset imbecillitas retentiuæ, ab astringentibus curationem incoare oportebat; alioqui non repente deiectio sistenda erat. Et cum indies vires labefactarentur, vinum austerum concessimus, cum minime febricitaret. Ventriculum exterius roborauimus cum cerato stomachico roborante & constringente. Auiculas, nempe perdices, phasianos, merulas, turdos, turtures & alaudas, cum stypticis præparatas dedimus, vino rubro vel mali granati, ac in gelu conditas, cum rhu obsoniorum. Aslas quoque laudauimus, malis cydoniis infarctas. Atque istis cum aliquantulum vsa fuisset, breui sanitatem recuperauit, fluxu tandem cessante. Cum autem bibendi abstinentia omnem fluxum sanet, egregie profuit huic matronæ quod interdum nihil biberet; & etiam dum cibum sumeret, valde parum. Iam quoque cibi frequentia nihil deterius: ideo paucis cibis vtens eoque facilis concoctionis, & adstringente iam dicto, ventriculo confirmato, & intestinis corroboratis optime se habuit.

SCHOLIA.

Quod ad communem curationem attinet omnium fluxum, non solum competit vera curatio, quæ respicit causam, sed etiam coacta, quæ rationem habet accidentis, prout est fluxus: nam cum ita debilitat virtutem, cogimur aliquando statim fluxum constringere, quod & hic coacti fuimus, cum vires huic matronæ collapsæ essent.

Et quanquam in principio fluxus non sit cohibendus, tamen ubi tam diu durat, ut vires deficient, eundem constringere oportet. Sic in illo qui anno 1567. mense Ianuario, diarrhoeam experiebatur, & variis remediis usus erat, nec fluxus restringi posset, quantumvis efficacioribus praesidiis, tandem hoc sequenti medicamento exhibito, restrictus fuit: *℞. sem. plantag. parum exsiccati & pulveris. boli armeni veri ana ℥ ij. trochiscorum de terra sigillata, de spodio* (non obstante quod aliqui omnes medicinas factas cum spodio, uti & Iacchinus facit, reiiciunt) *cum semine acetosae ana ℥ j. omnia pulverisentur tenuissime, & misceantur cum ℥ j. diacydonii sine speciebus, & conserua antiqua rosacea ℥ lb. adiecto succo plantaginis fiant boli tres, & datur vnus ante cibum per dies tres sequentes, & ita a fluxu curatus fuit.* Interea tamen, quantum ad curationem spectat, animaduertendum quod licet alui profluuium, tum in febribus, tum citra febres eueniat, & in febribus difficilior sit eius curatio, ex *Alexand. & Aetii sententia*; tamen si citra febrem contingat, neque facilis eadem erit: nam ipsa diarrhoea, seu alui profluuium (ut saepe in libris nostris de febribus diximus) aut per viam symptomatis, ac euacuationem symptomaticam, vel per modum iudicationis prouenire potest. Et propterea non semper eodem modo curanda erit. Diarrhoea, quae per crisin fit, cum totum corpus ea expurgetur, aut pars aliqua eiusdem, ut exemplis etiam in nostris commentariis de febribus ostendimus, ea non est impedienda nec constringenda, ne materia in aliam conuersa partem prauos alios affectus generet, veluti phrenitim, aut lethargum seu perniciosas parotidas, ut eidem *Alexandro ab Aetio visum est*. Et ideo cum salubriter a natura aliena euacuantur, aut vsque quo eadem omnem curam suam impenderit, expectare oportet, aut ipsius etiam motus adiuuare. Nam (ut idem *Alexander fatetur*) vidit quandoque ventrem initio affectus, ad quartum diem, quintumue profluxisse, & postea fluorem, aut per se, aut medici auxilio substitisse. Vnde aegri in magnum periculum inciderunt, utpote in aliquem praedictorum affectuum. Et ita fluxus quoque non statim ab initio, etiam si sine febre fuerit, constringendus. Sic Dominus Sasbotus, consiliarius adhuc eo tempore, cum Amstelrodami ageret in comitiis, & in alui fluxum incidisset, consilii causa accedens Nannium medicum doctum & insignem, amicum nostrum haud vulgarem, dicebat inter cetera se habere consilium contra alui fluxum. Cui respondens medicus, & apte quidem, *Habes, inquit, & remedium contra febrem?* Minime, inquit alter. *Ideo neque fluxus in principio restringendus, ne in febrem incidas*; respondebat Nannius. Quod Sasbotus cum intellexisset, *Curabis me, inquit, quod tibi videbitur commodum*. Recte quidem. Et ideo Leonellus Medicus insignis volebat, ut nullus fluxus restringeretur, nisi materia pro maiori parte euacuata vel minorata fuerit; quod verisimile ait esse, in termino octo vel nouem dierum, vsque ad duodecim dies. Tamen certum tempus praescribi non

potest: nam si interea virtus deficeretur extreme, tunc constringendus esset. Neque haec locum habent in fluxu qui fit a medicamento violento; sed potius in fluxu humoralis. Nam virtute constante talem fluxum nunquam coercere oportet, nisi prius humore efficiens, vel maior eius pars fuerit educta. Qui potiones constringentes assumunt, (inquit *Galenus, & citatur ab Alexandro Veronensi*) non repurgato humore, profluuium magis irritant: nam eum importune suspendunt. Ita nec fluxus diuersorum colorum nunquam restringendus est, virtute constante; quia ex hoc arguitur diuersitas & multitudo humorum a toto. Praeterea fluxus qui symptomaticus est, non semper protinus sistendus est, ut exemplis quoque docuimus in libris nostris, *De febribus*: scilicet quam diu aeger facile ferat. Interea tamen membra concilianda sunt, ne effreni impetu profluat materia. Sed haec omnia dicta, exemplis subsequenter multa clariora euadent. Et quanquam de fluxu critico saepius multa exempla posuimus in libris nostris, *De febribus*, tamen vnum adhuc his addemus vel alterum exemplum, ob tyrones, ut promte ad manum habeant exempla curationum; quae & ipsi recte in curando imitari possint.

OBSERVATIO V.

De fluxu ventris decretorio.

VIR quidam ex plebe, cum in febrem continuam & acutam incidisset, lotium ad me misit, quod admodum rubrum erat. Sed nec eo contentus quod vidissem lotium, cum pauper esset, ultro eum accessi. Cum morbus in principio esset, & vires constarent, & aluus resisteret, lenitiuum medicamentum propinaui: & die sequenti vena ei secta fuit, sanguine utcumque extracto, & iulebos conuenientes dedi. At septimo die, apparentibus tamen signis coctionis in vrina, pulsus huic occultabatur, & intestina eidem obmurmurabant, tormina quaedam & morsum, mordicationesque circa ventrem & umbilicum sentiebat; quae quidem fluxum ventris futurum praesagebant, bombis quoque ventosis erumpentibus, neque mordicatione cessante. Audacter itaque fluxum criticum per aluum futurum praedicebam; qui statim apparuit, astantibus nostram predictionem plurimum laudantibus, ita ut multa biliosa per noctem & diem excreuerit aeger: & paulo post nullo adhibito remedio & hic sanus euasit. Idem alteri euenit, sed multo copiosius materia fluebat, & per plures dies. Cui decoctum hordei communis, pro ablutione, cum *syrup. infus. ros. commun. dedimus & saccharum ros.* Et quia vires postea magis deficiebant, febre tamen omnino diminuta, & quasi eum omnino relincente; zaccharum perlatum exhibuimus, deinde conseruam rosaceam. Sed cum indies debilitaretur, ad maiora constringentia deuenimus; licet & hic quoque fluxus criticus esset, qui non erat constringendus, quatenus conferret & natura bene toleraret. Verum cum superfluus esset, licet criticus, eundem restringere coacti sumus: nam multoties natura incoat ad bonum quidem, sed materia mora,

aut

1.

2.

5.

4.
Qua attendenda circa eius curationem.

aut propter multitudinem materiæ, aut acuitatem, effrenitat nimis (*vt medice loquar*) & non potest regia natura: ideo medici etiam celebriores, si adeo enormis sit fluxus, & superfluus, vt virtutem deiiciat, consulunt constringendum esse. Sic nos admonuit Guainerius suo tempore in praxi egregie versatus: Nullus fluxus (*inquit*) criticus, modo conferat, & ager bene ferat, intercipiendus est: sed vbi modum excesserit, etiam in die critica, signis concoctionis quantumvis bonis apparentibus, si aduenerit, ilico sistendus erit: nam sæpe natura bene incoat, sed humorum mordicatione & venenositate, nequit illos in tempore continere; unde effreni fiunt, equorum more, naturam violentam inferentes: ideo ilico eiusmodi agris succurrendum est; alioqui eiusmodi fluxus, quamuis a natura concitatus, viribus deficientibus agrotantem perderet. Quod cum in hoc secundo agro fieret, fluxum tandem medicamentis efficacioribus & magis constringentibus reprimere necesse fuit. Quibus & hic quoque ager curatus fuit.

S C H O L I A.

Fluxus ventris decretorius est, seu criticus, qui in die decretorio contingere solet, natura, quæ superuacua sunt & noxia, expellere tentante. Quod quidem alii profluuium, si in die decretorio fiat (*vt huic agro primo euenit*) tunc ager optime tolerat, & perfectam sanitatem recipit. Verum nunquid ea, quæ deiiciuntur, bonæ sint secretionis indicia, aut secus, sic interstingues. Nam si madens seu aquosa deiectio, crebro & paulatim, aut vniuersim, & sæpe deiiciatur, ac cum stridore grauissimoque dolore, symptomatis rationem obtinebit, ac symptomatice erit; natura non per se expurgante, sed ex aliquo irritamento stimolata. Neque inde utilitas vlla prouenit, imo talis euacuatio præuæ dispositionis erit signum, *vt liquet commentar. aph. 2. 4. lib.* Idque potissimum vbi in principio apparuerit, nulla concoctione præcedente, & in febribus. At si multo interposito tempore, ac vniuersim, citra stridorem, cum exiguo aut nullo dolore excernatur, præcesserintque concoctionis signa, ac proportionata corporis dispositioni fuerit alui deiectio, agerque facile toleret, & iuuetur ex tali euacuatione, leuiusque se habeat, virtusque robustior euadat, tunc bonæ secretionis indicium erit: quia natura expellit per se, atque expurgat noxios redundantes succos, qui corpus infestabant. Talis erat hæc deiectio critica in hoc primo agro: ideo totum negotium iuuratione reliquimus Naturæ, *iuxta decretum Hippocratis aphorism. 20. lib. 1. sic dicentis: Quæ iudicantur & iudicata sunt integre, neque mouere, neque nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando; sed sinere oportet.* In eiusmodi, Galeno teste in commento eiusdem, & secundum alios auctores, nihil aliud agemus, quam victum conuenientem instituere, quo ad eius quantitatem, pro vt vires requirunt, ac reliqua quod ad qualitatem spectat, diuersum pro diuerso redundante humore, similem ei, quem instituimus de cholera; donec ipsa se natura componat, & ad integram perueniat sanitatem. At si non integre videatur iudicare, ac se-

gnis naturam euacuando fuerit, motum eius adiuuare oportet (*est critique euacuet*) vt & Alexandro & Aetio visum est: aut id quod deficit supplere nos conuenit, *vt constat in commento eiusdem aphorism. ex Galen. & 9. meth. medendi;* quo ex coniunctis ambobus, quod postulatur, perficiatur. Sed videtur hic Galen. sibi ipsi contrarius esse. *Dubium.* ad Glaucon. vbi præcipit, quod quamuis euacuatio non sit pro multitudinis ratione, tamen ea sola sufficit, quæ a natura fit, nec alia opus est euacuatione. Verum si omnino non sit fidendum, quod ab ea in futurum perfecte & integre iudicari valeant; tunc oportet id supplere quod deficit, vt præcipit Commento dicto. Sin vero confidendum sit, quod natura id præstabit, nihil innouabimus. Sed si non satis præstet officium natura, reliquum expurgabimus leuiter, vt naturam tantum iuueamus. Sed quia in hoc primo agro natura perfecte id fecit, nihil amplius nos tentauimus. Et sic multi morbi iudicantur excretionem ventris. Ex quibus dictis etiam colligimus, quod non semper restringendus est fluxus: imo quandoque iuuandus, si aliquod impedimentum forte adesset, & pigra esset in opere natura. Nam si temere retineas, recurrens materia acris, vel febres, vel erysipelata interiorum, aut aliquod eiusmodi magnum malum efficiet. Aliquando tamen ita profluat alui, vt multo sit incommodo, vt cum corpus colliquat & contabescit, vna vtile & inutile secum ducens: vel cum adeo vehemens est, vt vires deiiciat, sicut in cholera morbo euenit. Dico autem superfluere, cum vires deiiciunt confertim, vt in crisis, symptomatis factis in crudis humoribus; vel sensim, cum corpus colliquant, & contabesciunt. Accidit vero hæc colliquatio in prauis febribus, (*vt exemplis, cum de febribus scripsimus. ostendimus; quemadmodum etiam habetur 10. methodi ad vltimum;*) quæ corrumpunt missam humorum, & ad malam qualitatem perducunt putredine: unde foetentia deiiciuntur, & vna pinguis: quoniam pingue adnatum membris torretur febre & liquatur. Præterea sicut in critico fluxu, si natura non satisfaciat officium, aliquo modo est iuuanda, vt paulo ante diximus: ita quoque si plus iusto euacuet, & vires plane deiiciat, ac diutius duret, eam ipsam refrenabimus, vt in secundo agro fecimus, fluxum reprimendo & paulatim restringendo. Interea tamē in restringendo fluxum criticum superfluum, medicum valde sagacem esse oportet; vti nos fecimus nuper in vetula quadam, quæ ex febre acuta apud calcearium laborabat, post septimum fluxu critico oborto, qui licet ultra tres septimanas perduraret vna cum aphthis, vt pro deplorata haberetur, ad repressionem fluxus valde biliosi amygdalato vrentes, & subinde hordeato; quo hæc ipsa conualuit.

Verum in hoc secundo agro cum vires extreme deiectæ essent, & hæc non sufficerent, paulatim ad constringentia deuenimus: quibus tandem (*vt iam diximus*) curatus fuit.

3.
Fluxus decretorius.

Modus dignoscendi naturam criticam, vel symptomatice per alius profluuium excernantur.

4.

OBSERVATIO VI.

De juvenis viciis symptomatico.

1. **Q**UIDAM cum continuo febricitaret, & simul statim ab initio fluxum ventris haberet, hoc procul dubio symptomaticis ratione fieri intelleximus, cum inde nulla subsequeretur utilitas. Huic vero cum vires constarent, ac etiam ratione febris, & ut fieret diversio ob fluxum, ex vena basilica sanguinem detrahere iussi in brachio dextro, in parva tamen quantitate. Sed hic quispiam obicere posset, id Galeni sententia 4. de rat. victus, aduersari, cum dixerit *alio fluente sanguinem non esse detrahendum*. Id quidem verum est, *alio critice fluente; sed non symptomatice*. Neque obstat locus 1. ad Glau. ubi etiam interdicit venæ sectionem, licet ibi loquatur de febre cum alui profluvio. Si naturæ ratione fiat, & inde iuuetur animal, vel vires deiectæ sint, non est faciendâ. Sed ubi vires constant, & si fiat symptomatice, & in principio febris, venæ sectio adhiberi potest. Atque illud non solum ratione & auctoritate constat, sed & experientia. Nam cum ego annis quadraginta sex curandis ægris vacauerim (*dum hæc recolligeremus ætate sexaginta nouem annorum, & cum hæc prælo committerem 50. annis præin exercui, ætate 73. annorum*) sæpiusq; mihi talia occurrerint præ manibus alui profluvia, quotiescunq; venam secari iussi, viribus constantibus, & ab initio, toties etiam ægris bene successisse conspeximus: prius perpenso, num ætas, vel alia, ac vires deiectæ id non prohiberent: nec unquam quippiam mali superuenit. Quod & Donatus ab Altomari similiter testatur, cum etiam fere annis viginti quinque in curandis ægris vacasset. Vtebamur quoque aliis diuersionibus, utpote *frictionibus, vinculis, alisque extremarum partium reuulsionibus*. Dedimus quoque *syrupum de ribes, de portulaca, de endiuia, & rhab. & myrobalanis, cum aqua plantaginis*. quibus quidem reuulsionibus iam dictis cum alui profluvium nondum cessaret, medicamentis tum cibis adstringentibus vsi sumus, tam intus quam extra adhibitis, ac per sedem iniectis; quorum copiam habes apud Rondeletium, & præcipue apud Guainerium: de quibus quoque latius dicturi sumus cum alias species diarrhœæ in medium proferemus, ac earundem curationes.

SCHOLIA.

3. **S**I quis quærat de profluvio diarrhoico, an sit symptoma expultricis, quoniam plus iusto venter excernit; non licet respondere citra distinctionem: sed quod vel sequitur naturæ opus legaliter operantis in corporis expurgatione, seu morbum iudicet, siue non, sed quod solum cacochymiam excernat; & tunc proprie *symptoma* non est dicendum: si vero comparatur ad aliud profluvium; quod prorsus sit morbi ratione; vel si vtrumque symptoma dici debet; patet, hoc, sicuti de tussi Galenus dixit, debere appellari quodammodo naturale symptoma, 2. de sympt. caus. circa principium. Sat nobis est, quod cum a natura primo & maxime est, remedium non exigit, sed sinendum est. Sin morbi ratione, & eius causarum, proritan-

tium excretricem, tunc non temere sinendus est, nec temere constringendus, tunc enim non est naturæ opus, sed naturæ vehementer & nimium proritata. Ceterum quibus modis fluxus criticus ^{Causa fluxus symptomatici.} distet a symptomatico, scholio præcedente diximus. Causa tamen fluxus symptomatici, præter causam nocentem, dicitur fortitudo expulsiuæ ex vna parte; ex alia habilitas ad expellendum: talis autem habilitas habetur, quando est obedientia ex parte meatuum, & ex parte materiæ. Et sic fit fluxus symptomaticus quasi criticus, cum paulatim ægi curantur tanquam per crisin. Atamen improprie ita quidam practici loquuntur. Imitatur enim aliqua ex parte crisin, cum paulatim materiam euacuet; crisis vero subito. Et sic fluxus symptomaticus fit regularis, his concurrentibus a virtute secernentium iuuatium a nocitium (*ut vocant*) & nocitium expellente. Vnde non semper omnis fluxus symptomaticus malignus existit, per viam causæ, quia materia maligna euacuatur; licet per viam signi malus existat. Nam si materia, quæ euacuari debet euacuetur, & natura toleret, hunc fluxum symptomaticum non restringunt. Non tamen adiuvandus est, vel omnino naturæ relinquendus, ut in critico subinde fieri solet. Et sic ubi alui profluvium ortum fuerit, natura non per se corpus expurgante, sed propter a ^{Si quod excernitur per alui profluvium, fuerit symptomaticis ratione, curatio.} liquod irritamentum, aut quia præ multitudine a valis redundantes non contineantur succi, ita, ut quicquid excernatur, symptomaticis ratione fiat, neque inde vlla proveniat utilitas, imo talis euacuatio prauæ dispositionis sit signum: potissimum si cum febre copulatur, siue simul cum ea inuadens, siue ad eam sequatur. (*circa initia tamen*) siue ipsum alui profluvium febrem præcedat, & deinceps ipsa consequatur; tunc neque totum naturæ permittendum erit, nec ipsam inuare oportet. Quinimo ipsum alui profluvium cohibere necessarium erit, iuxta Hippocrat. decretum *aphorism. 2. lib. 4.* cum dixit, *In medicationibus talia educere corpore, qualia sponte prodeunt, utile. Quæ vero contrario modo prodeunt, cohibere oportet. Neque enim in hoc imitari naturam debemus, cum ex eius euacuatione nulla proveniat corpori utilitas*. Quare, ubi vires aut ætas non prohibeant, in hoc alui profluvio audacter vena secanda erit, ut & ipsum alui profluvium cohibeatur, ac qui confluent ad ventrem redundantes succi, (cum quo non oportet, vergant,) reuelantur, ex eiusdem Hippocratis sententia, 6. de morb. vulg. Si ex toto confluant succi, media vena secanda erit: si ex iocinore, interna dextri cubiti; si ex liene, sinistra; si ex capite, externa cubiti vena incidatur. Verum non tanta sanguinis copia exhaustiunda erit, quantam exigit dispositio, sed minor: & potius si venæ sectione opus sit, irritare debemus, quam simul multam sanguinis copiam educere. Aliis quoq; diuersionibus, de quibus in obseru dictum est, utemur; & tandem veniemus ad constringentia, cohibendo alui profluvium, cum ex eo nullum animali pareretur commodum. Nunc ad alias species diarrhœæ curandæ accedamus; & omnium primo de fluxu chyloso agamus.

OBSERVATIO VII.

De fluxu chyloso, ex obstructione venarum mesaraicarum.

Qui longo tempore faeces mucosas & chylosas deieciat, ita, ut cachexiam metueremus & pallidi coloris esset, & circa ventrem, versus hypochondrium dextrum grauitatem & subinde leuem dolorem sentiebat, me ad sese vocauit. Ad quem ingressus, fluxum chylosum esse deprehendi, ex obstructione viarum hepatis, & praecipue venarum mesaraicarum. Quare ut hunc recte curaremus, sumta indicatione ab oppilatione eiusque causa, quae videbatur materia pituitosa, viscosa & chylosa, ideo nobis utile videbatur utendum incidentibus & abstergentibus, & temperate aperientibus. Quare hoc decoctum praescripsimus: ℞. rad. feniculi, apii, petroselinii macerat in aceto ana ℥j. agrimonie, absinthii communis & Romani, capill. ven. polytrichi, menthae ana m. j. sem. anisi ℥j. ℞. fiat omnium decoct. in aqua communi pro ℔j. col. adde syrup. de duabus rad. mellis ros. colati, oxymell. simplic. ana ℥j. misc. fiat apozema pro quatuor dosibus. Facta digestionem hoc modo, ita paulatim eundem leuiter purgauimus: ℞. agrimonie, absinthii vtriusque, capill. ven. ana m. j. flor. cordialium p. j. vuar. cum arillu ℥j. ℞. semin. anisi ℥j. ℞. myrobal. chebul. ℥j. agericio optimi ℥j. rhab. selecti ℥j. ℞. zinzib. albi, schœnanti ana ℔j. coquantur in aqua pluuiali q. s. & huius decocti prius manibus conficari & colati, accipe ℥vj. col. adde syrup. de byzantiis ℥ij. misc. pro duabus dosibus. Cum ab vna dosi mediocriter purgaretur, die intermisso alteram sumit. Hoc vnice hic obseruandum; quod in hoc fluxu oppilatio debemus cauere a fortibus medicinis, & etiam a magna dosi. Vnde procedendum est; quantum possibile est, cum iis, quae participant stypticitatem aliqualem. Interim a principio non debemus uti iis, quae fluxum constringunt: quia talia sunt causa maioris fluxus, & subinde mortis, ut Auicenna recte quoque admonuit 10. tertii tracta. 2. capite primo. Talem errorem saepe vidimus in empiricis & mulierculis medicis, potissimum qui omnem fluxum statim constringunt. Post apertionem itaque & euacuationem, cum & hic scopus sit roborare virtutem attractiuam venarum mesaraicarum, & praecipue hepatis, ut chylum ad se attrahere posset & seruare, ideo & digestio eius confortanda: huic quidem intentioni satisfaciunt etiam ea, quae aperiunt & nutrimenta ad eadem membra penetrare faciunt. Quamobrem & electuaria, quae ventriculum & hepato roborant, describenda. Nos vero istis commode vti sumus: ℞. specierum diacalamenhi, diarrhod. abb. arom. rosac. ana ℥j. dissolutis in aqua absinthii & mentha q. s. zacch. albiss. ℥ij. fiat confectio in rotulis ponderantibus ℥ij. Interea & frictiones continuas & fortes circa membra totius corporis adhibui, quibus fit attractio nutrimenti ad membra iam dicta. Quibus remediis fluxus cessare coepit. Nam hoc facto, si fluxus non cessat, & moderate procedit, dimittendus naturae. At si adhuc valde superfluat, tunc debemus moderate constringere, cum iis, quae participant stypticitatem, & roborant

membrum. In quo casu tale electuarium commendatur. ℞. passul. cum arillis ℥ij. fistulorum, aulanarum assatarum ana ℥ij. hepatis lupi preparati ℔ij. pistentur simul & cum zaccharo fiat electuarium, sumat mane & sero cochlear dimidium.

SCHOLIA.

RHASES scribens de fluxu ventris, omnium primo tractat de fluxu Chyloso, quem sub diarrhoea, uti & alios omnes fluxus seu lotiuos, oppilatiuos, aquosos, cerebrales, spleneticos, hepaticos continet. At chylosi fluxus magna ex parte a Galeno 2. aphorism. 20. traduntur. Aluus enim plus iusto excernit de portione chyli, quoniam non distribuitur satis in iecur, & ex eo in corpus. Quod vero non distribuatur, non vna causa existit (quamuis in hoc agro causa erat iecoris obstructio & praecipue venarum mesaraicarum: Nam aliquae causae sunt corporeae, aliae vero procatacticae. Sunt autem haec: cibus humidior lubricitatem faciens, & concoctiuam vim impediens, ut de cita aluo diximus. Alia est ciborum multitudo, unde tanta distributione corpus non eget: quare ut satur dimittit eos per intestina, ipsis etiam saturatis. Sic enim est retinentium natura, ut retineant quousque fruuntur; post pellant, ut onerosum. Alia est ciborum mordacitas, qua proritant ad expulsionem plurimum, nec contineri satis sinunt. Sub prauitate etiam intelligimus cum Iacchino esse prauitatem, quae natura insurgit cito ad pellendum. Sed neque attrahantur aliquando a iocinore praui qualitate cibi, unde deiciuntur multi. Sed de his modo non loquimur, quos vno nomine Galen. solet appellare cruditates 8. meth. cap. 5. Nam statim sponte cessare solent, debita victus ratione instituta; & remotis illis causis procatacticis. Sed copia ad procatacticas causas potest referri semper, ut sit ciborum copia vel simpliciter. Sed causae in corpore sunt, quae distributionem impediunt, vel vitiata attractio membrorum, & iocinoris, cuius munus est exsugere ab intestinis quicquid utile est, quousque saturetur (vitiatur autem frigiditate & stupore quodam, quo non sentit indigentiam) quamuis & attractio alia ratione diminui possit, ut quia multo non eget, ideo superabundat plurimum iocinori, cum tamen venter appetens natura sit, & concoquat. Et rursus alia causa (ut in hoc agro) est, quod obstructae sunt viae attractionis, id est, venae mesaraicae, & sima iocinoris. Quae quoniam erat causa morbosa, ideo 2. aphor. 20. dirimiteam, & solum loquitur Galenus de occasionibus, quae sanis eueniunt in eo loco. Alia causa est, quod venter debito tempore non retinet, ut exsugere a iocinore possit. Quod vero non retineat est, vel quia vis eius contentrix imbecilla facta est, unde potest quidem continere usque quo concoquatur, sed non usque quo distribuatur alimentum: quare chylosus fit fluxus; idque ex frigiditate & humiditate maxime. Vel ab acri & molesto aliquo influxu admisto citius expellit, ut biliosa, acria, ut in oris ulceribus tales diarrhoicae deiectiones fiunt. In catariis ex pituita, ut balbis, 6. aphor. 32. & in dentitione puerulis. Et ita eadem causae, quae lie-

Chylosi fluxus tractatio.

teriam producant, etsi minores multo sint, facient etiam diarrhoeam: sed non conuertitur: Nam priuatim hic fluxus fit ab obstructione. Irritant etiam vermes, & hunc fluxum faciunt, vt experientia monstrat. Idque quoque exemplis in febribus ostendimus. Notandum tamen ex Galeno 6. de locis aff. 2. ad finem, quod fluxus cibi, vel in chylosos, vel indebilitatem contentinæ deducitur: & intelligit quando nulla causa proritans & mordens adest: & appellat fluxum in chylosum passionem cœliacam, de qua prius satis diximus. At si ex iecore, aderunt signa debilitatis iecoris & oppilationis, vt etiam Rhases testatur. Si ex iecore, chylosus tendit ad aliqualem ruborem. Si in melaericiis, non ita est alteratus ad rubeum, sed aquosus.

7. Talem curauimus in consule *Alcmariano, mercatore, Cornelio appellato*. Causa etiam fluxus aquosus est causa quandoque hydropis ascitis. Sed differunt in hoc quod materia talis aquosa recipitur in intestinis; eo tamen defluit a iecore imbecillo: & sic fit fluxus in intestinis; & non sic in hydropo. Causa vero fluxus ablutui refertur ad fluxum hepaticum. Plura de his vide apud Neotericos & Gradum. At si debilitas iecoris fuerit ab intemperie frigida, scopus erit calefacere cum adstriptione, & id per aromata, vt aromaticum rosatum, diarrhodon, diamoschum dulce, & epithemata, emplastra; & victus ratione calfaciente, per portiones, cibos, & exercitia; quemadmodum de intemperie frigida hepatis diximus. Si ex stomacho, roborandus est. Sed hic erat obstructio in iecore & melaericiis: & ideo opus fuit de obstructione. Si ex proritatione alterius materiae influentis, & alterantis & corruptentis, membro mandanti prospicere oportet, vel ad catarrhos respicere. Postea si in ventriculo derelictus sit malus habitus expellendi iusto citius a se cibos, etiam ipsi prospiciemus, vt sequente exemplo de fluxu cibali vel alimentali docebimus. In puerulis quoniam non licet causam tollere, quia est naturalis, attendimus, vt quam citissime fiat dentitio, & vt dolor ex ea factus sedetur: & prospicimus symptomati astringentibus, vt oleo myrteo, cotoneorum, & puluere myrrillorum, & aliis. Sed quod ad fluxum hepaticum chylosum attinet, studendum vt minus chyli generetur: & opus erit cibi abstinentia. At si famem tolerare non possit, dentur cibaria multæ quantitatis & pauci nutrimenti, per multam enim quantitatem sopitur appetitus: & per paucam qualitatem, parum de chylo generatur. Si fluxus chylosus fiat ob crassitiem chyli & viscositatem, danda cibaria facilis coctionis, & subtilem chylum generantia, vt sunt carnes auium laudabilium, quibus adiungantur aperitiua, vt ius cicerum, decocta rad. fœniculi, petroselin. apii. Si eueniat ob paruitatem hepatis, dentur cibi boni, subriles & paucarum superfluitatum, ventrem non lubricantes, sæpe & parum vna vice, vt hepar attrahat chylum, & corpus frequenter nutriatur. Si fluxus chylosus veniat ab hepatis apostemate, basilica vena dextri brachii incidatur. Deinde apostema curetur in principio repercutientibus: in

augmento adiectis resolutiuis: postea resoluentibus, vt de apostemate dictum est. Si sit ex oppilatione materiae sanguineæ, fiat venæ sectio. Si a materia crassiore phlegmatica, curetur, vt iam in obf. præcedente dictum est: & si biliosa, vt de diarrhoea biliosa dicturi sumus. Plura, si libet, vide apud Leonellum de fluxu chyloso.

OBSERVATIO VIII.

De fluxu ventris ex alimentis corruptis.

1. PVELLA nobilis octodecim annorum, religiosa, cum cibos corruptibiles in magna copia denorasset, nempe melones pepones, cucurbitas, & lactucam cum oleo & aceto, deinde & lac post cibum alium sumtum, qui facile corrumpitur; in cruditatem ventriculi incidit & in fluxum ventris. Causa cruditatis & ventriculi exhibuimus has pilulas: ℞. pilul. alephang. (quia stomachum frigidum habebat, & frigidis vsa fuerat) mastichinas, ana ℥j. cum aqua absinthii, fiant pilule v. dentur mane. Interea utebamur cibo boni succi, & concoctu facili: & post euacuationem die quarto dedimus ℥ij. diacydon. cum speciebus, multo tempore ante pastum. Stomachum inunximus yng. sequenti: ℞. cerati stomachici Galeni, olei nardini ana ℥ij. inungatur ventriculus ante pastum. Postea ventriculo applicuimus emplastrum de mastice, ad scuti formam: & vinum rubrum loco potus concessimus Gallicum stypticum. Quibus remediis & hæc quoque sanitatem consequuta est.

SCHOLIA.

2. SI fluxus ventris a cruditate ventriculi fiat, eadem habet causas & signa, ac in cruditate ventriculi fieri diximus: quanquam in hoc differunt, quod hic stomachum laxum habeant, & ideo humida & pituitosa deiciunt, si adsit intemperies, humida & frigida; si calida, etiam biliosa, & corrupta. Sed hæc puella, prius cruditate affecta, facile & citâ aluū habens, ex eadē intemperie frigida & humida, postea cum cibos corruptos comedisset, eos quoque deiciebat: & ideo oportebat in hac diarrhoea, ex corrupti cibi causa, pro natura corruptelæ eisdē assumptos cibos purgare, & cū causam frigidā haberent, ea adhibere, quæ ad succū pituitosum valere scribunt auctores, vti satis de vomitu declarauimus: deinde ventriculū roborauimus. Facile enim hæc ex sermonibus ægri cognoscuntur. Et ita quoque si ab acerbis alimentis vel salis contingat diarrhoea. Si biliosa causa fuerint, flauo inficiuntur excrementa colore, quæ nec citra caloris sensum & mordicationem excernuntur: atque tales curandi, vt biliosa diarrhoea. Si alimenta copiosius sint ingesta, viscosioraque fuerint, vnde humores crassi pituitosi & lenti nati sunt, qui corrupti diarrhoeā excitant, contraria dictis prorsus aderunt, quæ per aluum deiciuntur. In causa calida calidos expurgabimus succos, in frigida frigidos. Deinde roborabimus ventriculū. Si ob ventriculi imbecillitatem vel facultatis retentricis intestinorum contigerit, ea adhibenda; (vt paulo ante diximus) quæ ad alui deiectiones ab auctoribus probantur. Sed si a capite vel aliunde eo confluant humores, membra illa prius quoque erunt curanda; vt postea exemplis

emplis viuis etiam declarabimus. At hic quidam, Vt Gatenaria, proprium caput ponunt de fluxu cibali. Primo abscindunt caussam, vt si nimia sit quantitas, paucum cibum sumant; si cibi corrupti, ab iis abstinere iubent: vt si oleaginea & vinctuosa sumserint, tunc vt styptica sumant, iubent. Si corruptela in intestinis hæret, huius mundificationi student per clysteres lenientes, ex lib. i. decoct. communis, cum \mathfrak{z} j. *caussa* & \mathfrak{z} s. *pul. zacchari*. Si in stomacho, dant mannam vel pilulas alephanginas. Tertio remouent malam impressionem factam a corruptione ciborum, ventriculum roborantes, dando *syr. de mentha, absinthio in causa frigida, & aromat. rosa. & diagalangam; & exterius emplastra & vnguenta & fomenta sepius dicta de stomacho frigidiore*. Si sit intemperies calida relicta, post euacuationem humoris calidi, amouent caliditatem cum iis, quæ diximus valere ad intemperiem frigidam ventriculi, addentes etiam calida constringentia, & roborantia. Interea illud quoque aduertendum, si recrementa putrida absque febre fuerint retenta sine dolore, sciendum est quod aliud tunc aliquando constringatur, id fieri corruptis alimentis constat, quod & in praxi quotidiana sæpe obseruauimus in puerperis, quibus venter longo tempore restringitur, nec vti volunt glandibus vel leuioribus medicamentis & clysteribus; & ita stercora tandem corrumpuntur, & fluxum postea lethalem, qui restringi non posset, inferunt: vti euenit uxori Petri Opmeri, cui nomen Sophia erat, apud Delphenses. Quæ postea nec a me, nec ab aliis medicis doctis curari potuit, quantumuis optimis & aptis remediis. Sunt apud nostrates adeo nasutæ quædam mulierculæ, vt puerperis nullo modo sit medicandum, quamuis illæ, non minus quam alii omnes, etiam medici opera indigeant, si ægrotare eas contigerit.

OBSERVATIO IX.

De diarrhœa biliosa.

MOnacha, Anna Martini nomine, apud Alemarianos, habitus biliosi ac tenuis, cui & temperamentum biliosum erat, ætate triginta annorum, ætatis tempore, aeris quidem calida constitutione, victu præcedente bilioso (nam & allis & porro vsa fuerat) anno 1550. mense Iulio diarrhœa biliosa correpta fuit: quæ mihi facile innotuit, cum ad eandem accitus essem. Nam & deiectio crocea & ruffa erat. Et præterea in ea bilis flaua & citrina atque ardens, subinde & spumans vltro emanabat; idque aliquando sine magna ventris torsione. Eius motum, cum natura superflua expelleret, nolimus tum inhibere, sed potius iuuare primo cum iis, quæ bilem detergerent. Ideo hoc decoctum præscripsimus: \mathcal{L} . *decoct. hordei non excorticati* \mathfrak{z} iij. *syr. ex infus. ros.* \mathfrak{z} j. *misc.* Hic notandum quod quotiescunque scribimus *syr. ex infus. ros.* intelligimus ex rosis communibus paratum, non autem ex rosis Prouincialibus, quæ magis laxant. Licet & hic *syr.* leuem habeat laxationem, ex rosis rubeis magis apertis confectus. Mox eadem bile contemperata, domita, ac euicta, ac

præparata ex oxyzaccharo, syrupo ex infus. ros. & succo cichorii, tale purgans medicamentum exhibuimus: \mathcal{L} . *myrobalan. citrinorum* \mathfrak{z} ij. *rhobarb. selecti* \mathfrak{z} j. *spica* \mathfrak{z} s. *infunde per noctem in aqua acetosa, cichorii ana* \mathfrak{z} ij. *s.* *facta leui ebull. mane fortiss. express.* *adde syr. ex infus. ros. de succo cichorii ana* \mathfrak{z} s. *misc.* quibus quinquies vel sexies aluum deposuit. Perpetuo autem tam in hoc, quam in alio quocunque alui profluuiio, vbi purgans medicamentum datur, moderatum sit oportet, ne ex immodica vacuatione vires prosternantur. Pari ratione adstringentia magis, vel minus admiscenda erunt cum purgantibus medicamentis, prout magis vel minus aliud profluuiio laborat, ac vires ipsæ magis vel minus euacuare permittunt, ac plus vel minus ventris partes fuerint imbecillæ. Postea, vt magis constringerem, dedi \mathfrak{z} j. *rhob. parum rosti* (sic enim acrimoniam exuit, parte subtili & acri dissoluta) *puluerisetur: & dabam cum* \mathfrak{z} iij. *aquæ plantaginis*, & fluxus cœpit multo melius habere. Alii dant ad \mathfrak{z} ij. *in substantia*; alii etiam ita torrefactum infundunt; & tunc relinquunt spicam, quæ additur ad intencionem aperiendi: sed hic nequaquam, cum intendimus magis adstrictioni, & membrorum roborationi. Tamen in principio potest adiungi spica, vt fecimus prius. Sed vt in substantia melioris saporis esset, addebam \mathfrak{z} j. *syr. cotoneorum*. Materia his satis euacuata, ad hæc constringentia deuenimus: \mathcal{L} . *conserua ros. antiqua* \mathfrak{z} vj. *pul. ros. rub.* \mathfrak{z} j. *coralli rubri subtilissime pul.* \mathfrak{z} s. *boli armen. veri* \mathfrak{z} ij. *syr. myrrill. rob. de ribes ana* \mathfrak{z} s. *misc.* & detur quatuor vicibus. Modo etiam hos syropos capiebat: \mathcal{L} . *syr. cotoneorum, ex ros. siccis, syr. myrtini ana* \mathfrak{z} s. *aquæ plantag. acetos. centummodii ana* \mathfrak{z} j. *misc.*; vel cum decocto earundem herbarum. Sunt enim hæc inter se varianda; & vicissim ægrotantes his vel similibus vti debent, ne vni natura assueta, eo tanquam cibo vtatur. Sumebat & ante cibum diacydonii sine speciebus \mathfrak{z} ij. Ventrem inunximus oleo cotoneorum, myrrino, & ros. omphacino. Quibus hæc diarrhœa biliosa curata fuit.

S C H O L I A.

Cum bilis plurimum attrahitur a iecore, ac nimis intempestiue ad intestina expellitur; inde supra modum stimulis intestinis profluuium oritur periculosum; vel si negligentius biliosa materia in iecinore derelicta in intestina depellitur: aut pori quoque fellei oppilatio si intercedit, fluxum eundem ventris excitat; præclusis meatibus ad stomachum, intestina, & iecur: vnde coacta materia fellis, præcipiti potentia, cursu per intestinorum anfractus cholericum mouet fluxum. Etenim aliquando bilis flaua, aut citrina ardens spumansq; emanat, sine magna ventris torsione, quod libere per laxas patentessq; vias defluat. Ea sæpe a calidiore iecore aut e cysti fellis profunditur in intestina; nonnunquam, sed rarius, e venis maioribus, atque etiam ex corporis habitu. Hac enim diarrhœa statuit Hippoc. surditatem, aliosq; ex bile morbos solui. Sed & oculorum interdum vitia sanat, ex Hippocrate, ventris biliosus

3.
Causa & signa
diarrhœa bilio-
sa.

fluxus. At interdum in diarrhoea ex flava bile, in ventre punctiones sentiuntur; inflammatio quoque, non sine in sedis partibus acriore morfu: ad est oris siccitas, sitis, & febris interdum. Causa omnium primo amouenda. Si veniat ex calore hepatis, intemperies primo curanda, & ipsa bilis contemperanda, & euacuanda, & hepar roborandum, *ut dictum est prius*: & si adsit febris, venæ sectio in principio etiam imperanda, *ut exemplis plurimis ostendimus in libris nostris de febribus*. Euacuant primo bilem cum *myrobalanis citrinis, & rhab.* *ut dictum est*. Quidam *rhab. puluerem accipiunt, ad ℥j. & inde conficiunt pilulas*. Alii dant in principio *infusum rhab. cum manna, vel syr. ex infus. ros. leuiter purgans*. Et minus sunt solliciti de syrupis digerentibus; nam cum periculum sit in mora, in principio, leuiter tamen, (*ut dictum est*) materiam euacuant: facile enim sui acuitate in dysenteriam mutatur: & ideo neque in principio est retinenda, neque acriter mouenda; sed eiusmodi medicamentis vtendum, quæ post se adstrictionem aliqualem relinquant, *ut iam paulo ante admonuimus*. Et si nec vna nec altera purgatio sufficiat, vbi necessitas est, etiam tertiam adiciemus: nam per eiusmodi medicamenta vita infirmi seruetur. Cuius oppositum euenit, si statim a principio fluxus restringatur. Interim quoque qualiscunque fuerit redundans humor, clysteribus vtendum erit. Ego sequentibus felicissime sæpe vsus sum: *℞. decoctionis hordei non decorticati ac torrefacti ℥j. sacch. rub. ℥j. β. vitellum vnius oui, fiat clyster*. Sal non imponendum, propter eius mordacitatem & acuitatem. Vel fiat ex decocto eiusdem hordei, gallinarum seu pullorum gallinaceorum iure & saccharo rubeo vocato, ac oleo rosaceo parato, præsertim vbi bilis redundarit. Sed & hoc, præcedente corporis euacuatione, feliciter vsus sum: *℞. decoct. hord. torrefacti ℥ viij. succi plantag. ℥ iij. olei ros. omphacini ℥ ij. vitellum vnius oui, sacchari rub. ℥ j. β. misc.* Frigide potius quam tepide aut calide iniiciatur. In fine etiam tali vsus sum (quibus omnibus iam dictis etiam præceptor meus Benedictus Fastentinus utebatur:) *℞. lactis vaccini lapidari vel chalybeati ℥ j. succi plantag. ℥ iij. sacch. rubri ℥ j. β. vitellorum quorum num. ij.* A purgatione vero, vel vbi alui profluuium diutius perseverauerit, vires consumens, ac habitum colliquans, tunc eidem resistendum, per ea, quæ per os sumuntur, & per anum infunduntur, magis restringentia; atque ea, quæ forinsecus imponuntur, ex Aetio, Alexandro & Paulo. At vbi biliosa & pura recrementa fuerint, statim non adstringenda, sed cohibenda, & in magis salubria ea permutanda sunt, *iuxta eosdem auctores*: velut sunt cibi bonum atque paulo crassiorem succum generantes; *ut præsana & eius cremor, Paulo auctore*. Vel ex torrefacto hordeo contuso, extenuato, & aqua pluuiali adiectis mali punici acidi granis, ac acetosa foliis: aut in iure gallinarum, seu pullorum gallinaceorum, eiusdem granis quoque adiectis, hordeum sic paratum decoquatur. Biliosus namque humor cibis lenientibus, magis, vt descendat, quam vt in corpore retineatur, est sollicitandus, inquit Alexander. Alias totum morbum gravior efficit, & non-

nulla alia symptomata, *iuxta eundem*, gignit. Nullum idem remedium magis commendat, *vt & Aetius*, ad tales fluxiones, quam lac bubulum & caprillum, si febris non vrgeat, tepidum recensque mulctum vel ad ignem decoctum, & assidue agitaturn, donec ad tertias sit redactum, vel si per filices fluuiales ignitos, aut candentes ferri laminas in ipso extinctas coquatur, & potetur, spuma cochleari ablata vel penna dum coquitur. Si febris vrgeat, non purum lac dabimus, sed quartam partem aquæ, secundum eundem, lacti admiscebimus, vna coquentes donec dimidium totius absumatur: & tunc illud, *iuxta eosdem auctores*, sine aliquo periculo exhibebimus. Et licet Hippoc. & Galen. *aphorism. 64. lib. 5.* a lacte in feb. acutis & biliosis deiectionibus abstinent, cum in nidorem celerrime conuertatur; intelligunt (*ut etiam Donatus admonet*) quod nulla præcesserit corporis euacuatio, & adhuc multa bilis sit in corpore, & febris acuta valida. At nos probamus post purgationem, febris non valida existente. Sed affusa aqua, *ut iam dictum est*, minus in febribus nocet, minusque in nidorem conuerteretur, vbi diu perdurauit fluxus, & corpus colliquetur, & cum lac minus ad ignem est coctum. Nam &, *Galeno auctore 5. de alimen. facul. & 10. de simpl.* ita paratum non promte in nidorem velut purum conuertitur: estque optimum dysenteriae remedium, & omnium ventris acrium fluxionum, *ut ille inquit*.

OBSERVATIO X.

De muliere pituitosa, fluxu ventris bilioso laborante.

Mulier, si quæ altera, admodum crassa & pituitosa, cui nomen Anna Iuonis, vxor Bartholomæi Simonis, Alcmaria anno 1553. post febrem acutam incidit in diarrhoeam biliosam: atque ipsa quamuis vteretur diuersis remediis constringentibus, suo, vel aliorum ac muliercularum consilio, tamen quanto magis ea sumebat, tanta maiori fluxu tentabatur; vt sæpe fieri assolet, ob medicamenta compressiua etiam styptica, quæ aluum citatiorem reddunt, ad inferiora materiam detruendo. Tandem post multa remedia adhibita, me in consilium adhibuit. Vtile nobis videbatur vti medicamento & purgante & simul constringente. Quare hoc sequens dedimus: *℞. myrobalan. citrinorum (ob bilem) myrob. chebul. (quia eramus in hyeme, & in muliere valde pituitosa, cum pura bilis etiam non abundaret) ana ℥j. β. bulliant in ℥ viij. aqua plantag. deinde decoctum tepidum post ebullitionem manibus confricetur. Eius colatura accipe ℥ iij. addendo rhab. selecti, prius parum rosti & pul. ℥ iij. schœnanthi & β. mellis ros. syr. cotoneorum ana ℥ β. misc.* & vnica vice & in diluculo epoto ter aluum deposuit: & fluxus, magno cum meo honore, restrictus est.

SCHOLIA.

FLUXUS (*ut iam sæpe diximus*) ab initio non restringendus; præsertim vbi acris est. Interea tamen ratio

Curatio.

Euacuatio.

4.

Clysteres.

Vbi diutius perseverauerit alui profluuium.

ratio habenda, num talis fluxus fiat natura stimu-
lata, vel in crisi (*de qua antea dictum est*) vel etiam
ab alimentis ingestis, qui ita ventrem aliquando
perturbant, vt natura ipsam regere non possit. Et
adeo etiam abundat, vt mox vires, aliquando et-
iam in principio, omnino deiciat: quemadmo-
dum nos conspeximus anno 1552. in nobilissima
matrona Nieveldia dicta, vetula octogenaria; ad
quam sum accitus, in castello Colsterio dicto, de-
cumbentem, prope pagum Diui Eligii, non pro-
cul ab Alcmaria situm. Quæ quidem inciderat in
diarrhœam adeo vehementem, vt in vita vehe-
mentiore nunquam viderim, ita vt vna nocte
plus quam dici potest, aluum deiecerit, quasi con-
tinuo. Comederat autem existens in Abbazia Eg-
mondensi crema seu pinguedinem lactis in ma-
gna copia; & superbibit certissimam Godanam satis
copiose; mox vinum rubrum. Vnde inter vehen-
dum domum reuersa stomachus abundantia di-
uersorum alimentorum & potuum fuit grauatus:
& subsequuta est diarrhœa adeo grauis & subita-
nea, cum virium deiectione & syncope, vt simi-
lem in vita non viderim, vt omnes astantes vetu-
lam pro deplorata haberent. Dedi statim *leniti-
uum ex decocto hordei non excorticati, cum pauco zac-
charo, ad abstersionem*: & statim, propter excoria-
tionem, quam metuebam, licet non febricitaret,
continuo dedi lac bouillum, quod ad manū esset,
ad tertias decoctum, in quo lamina ferri canden-
tis inter coquendum sæpius exstinguebantur. Hęc
nocte apud eam manens, exhibui; & si oryzam
mox incoquere vellet, admittebam. Die sequen-
ti continuo capiebat *ex diacydonio sine speciebus*; &
cum nonnihil licitet, hunc syrupum sumsit: *℞.
syr. cotoneorum ℥j. syr. myrtini ℥℥. aqua plantaginis,
ros. an. ℥℥. misc.* atque hoc linimento stomacho
& toto ventre inuncto, intra duos dies miraculi
instar vetula, præter opinionem omnium, qui il-
li aderant, viribus subito recreatis, fuit sanitati re-
stituta. Post lotium medicamentum venimus ad
constringentia. Sed in biliosis, vt iam dicere cœpera-
mus, bile prius domita & ex parte repurgata, ad
restringentia prius accedimus, vt iam scholio præ-
cedente ostensum est: deinde a purgatione, si diu-
tius perseverat biliosa deiectione, progredimur ad
constringentia, & adstringentia, dum vires ex e-
iusmodi biliosis deiectionibus immodicis concidant.
Campus astringentium apud auctores adeo
late patet, vt hic non opus sit ea omnia enucleare.
Valent syrupi constringentes, *de ribes, & rob eiusdem,
ex ros. siccis, myrtinus, cotoneorum, de portulaca, con-
serua ros. diacydonium sine speciebus, pul. sem. plantag.
acetosa, cornu cerui vsti, margarita, & mille alia.* Vide
Rondeletium & Guainerium, & alios practicos. Tro-
chis. de spodio, cum sem. acetosæ, de succino, de
terra lemnia; hæc per os dantur. Similiter & cly-
steres constringentes ex *decocto polygoni, plantag.
ros. balaustiis, hypocyst. hordeo non excort. vstulato, ad-
iectis succis plantag. portulacæ, & simil. & vitellis ouo-
rum.* Vide *Leonellum, apud quem habebis plurima re-
media constringentia, vt & apud Benedictum Veronen-
sem medicum.* Quibus adiungenda topica, olea, vt-

guenta, linimenta & fatus; vnguenta & irrigationes, ex
oleo omphac. rosaceo, myrteo, cotoneorum cum vino ad-
stringente; cerata, vnguenta, qua de vomitu scripsimus,
& ea qua ad lienteriam valere scribunt.

OBSERVATIO XI.

De diarrhœa pituitosa.

MVlier quædam obesa, crassa, pituitosa, in
hyeme asperrima, cibis vtens frigidis & hu-
midis, diarrhœa pituitosa afficiebatur. Sitis nul-
la eam affligebat, nec inflammationem percipie-
bat; lenta crassa deiciebat. Ad hanc itaque in-
gressus, cum humores lenti & crassi continuo re-
iciebantur per aluum, materiam præparatam pi-
us cum oxymell. simplici & melle rosaceo, (ne na-
turæ motum impediremus,) in hunc modum e-
andem iuuare decreuimus. Deditur ℥j. ℞. *syr. ex
infus. ros. pallid. cum agarico dissolutis in ℥ij. decoct.
myrob. chebul. & mediocriter excreuit.* Nuper et-
iam commodè exhibui ℥j. pilull. mastichin. & alteri
℥vj. elect. hierapicræ Gal. cum aqua mentha. Verum
huic nostræ mulieri post exhibitum syr. infus. ros.
pallid. cum agarico (sciendum quod in vnaquaque
℥j. infunditur agaricus cum zin. suo correct. nempe
℥j.) postquam iterum sumisset subinde cochlear
vnum aut alterum syr. menthacei & mell. ros. in-
termittis aliquot diebus & has pilulas dedi: *℞. pil-
lul. mastich. ℥ij. ℞. myrob. chebul. parum torrefact. ℥℥.
cum syr. absinthii; sicut pilula v.* Postea vim retentri-
cem ventriculi & intestinorum roborauimus, su-
mendo quotidie mane ante pastum, per quinque
pluresve dies, ℥ij. diacydonii cum speciebus, vel iij. Et
extrinsecus loca dicta hoc vel simili vnguento in-
unximus: *℞. olei nardini, mastichini, menthacei ana
℥℥. caryophyllor. mentha sicca, cardamomi ana ℥℥. co-
ralli rub. ℥℥. elei maceris ℥j. cera parum, fiat vng.* qui-
bus remediis & hæc bene se habuit. At sacerdoti
in pago prope Alcmariam, paulo macilentiori, &
tempore verno simili diarrhœa laboranti, hæc de-
scripta contulerunt: *℞. absinthii vtriusque, mentha
ana m. j. ros. rub. p. j. myrobal. chebul. ℥℥. agarici fœ-
minin. optimi ℥j. ℞. rhab. parum costi ℥j. cinnamomi
loco zin. ℥℥. ℥j. cyperi, schœnanti ana ℥℥. seminis cumi-
ni macerati in aceto ℥j. ℞. seminis anisi, coriand. præ-
par. ana ℥℥. viuar. cum arill. ℥℥. glycyrr. ras. ℥ij. fiat
decoct. in aqua pluuiæ, pro ℥j. expressioni adde syr. e cor-
ticibus citri, absinthii, myrtini ana ℥j. misc. pro iij. do-
sibus matutinis.* sumebat alternis diebus mane. E-
gregie contulit. Deinde semel sumsit quod sequi-
tur: *℞. confer. ros. antiquæ ℥ij. theriacæ optimæ ℥℥.
Postea ante pastum, ad maiorem restrictionem, de
hac mixtura capiebat ad magnitudinem castanæ:
℞. confer. ros. antiquæ ℥j. diacydonii cum speciebus ℥
vj. specierum diarrhod. abb. ℥j. specierum arom. ros.
℥℥. corticum citri conditi ℥ij. syr. myrtini q. s. fiat
mixtura.* Venter quoque tum stomachus inun-
gebantur vng. superscripto, adiecto pauco oleo
cotoneorum. Pro potu utebantur vino rubro
styptico.

S C H O L I A.

3. **S**uccus hic pituitosus abundans prius concoctus & præparatus euacuandus est. Neque lector hic admirabitur, quod syr. ex infus. ros. pallid. cum agarico, etiamque decocto agarici vñ sumus commode in sacerdote, quod tamen medici quidam in hoc casu angue peius vitant, *auctoritate Mesue mori*. Contra quos Donatus doctissime agit, vtens catapotis ex agarico & rhab. & idem quoque eo vtitur in decocto & in substantia, nec solum pro curatione profluvii alui, verum etiam dysenteriae proprie dictæ, & in Ferdinando de Capua primogenito filio Illustris Ducis Termularum, cum bis catapotia cum rhab. exhibuisset, præter aliorum medicorum votum ex eo perfecte curatus fuit, tum ex alui profluvio, tum ex hepatico affectu ex frigida iocinoris intemperie orto, quibus fere decem mensibus laborauerat. Leonellus quoque in fluxu phlegmatico, pendente ab hepate, vel per essentiam vel communitatem, omnium primo euacuat causam facientem eiusmodi fluxum, nempe pituitosum vel aquosum humorem, cum pilul. de rhab. aggregat. & agarico trochis. ana ʒj. quanquam idem admonet eas valere componendo vj. cum succo ieros, dando tres in hydropo interpolatis diebus: vbi tamen fluxus superfluat, loco aggregatiuarum ponit de hiera. Deinde roborat hepar. quanquam & hæc diarrhœa ex ventriculo & intestinis, ad ea membra pituita conflente vel coaceruata, fieri poterit. Et sicuti ex iecore quoque fit; ita & hepatica biliosa diarrhœa, seu fluxus hepaticus biliosus fieri potest; cuius curationem etiam breuiter ponit Leonellus. Interea (vt recte quoque admonerat Rondeletius cap. 18. de diarrhœa) si excrementa alui biliosa sint & male olentia, tunc considerandum, an adsit febris, vel iecoris inflammatio. Nam odor ille grauis putredinem semper indicat. Putredo autem semper febrem adfert, vt & interna inflammatio. Cum tale apparet recrementum, considerandum, quo tempore coeperit fluere, respiciendumque ad morbi naturam & partem inflammata. Nam multum refert, si in principio aut declinatione talia reddantur, & si in inflammatione hepatis, vel pulmonum; vel si fiat in hydropo, & phthisi, & feb. hectica, vel aliqua specie febrium biliosarum. In illis enim utilis est diarrhœa, si in declinatione, apparentibus signis coctionis, accadat; & in principio etiam, cum magna plenitudo adest. In morbis, qui cum tæbe & atrophia iuncti sunt, mortem significat; Hippocrates scripsit de tabidis aphorif. 14. lib. 5. cuius exempla lib. 4. de febribus posuimus. Quod non solum de phthisi est intelligendum, sed de omni atrophia, vt in feb. hectica, hydropo & aliis multis. Significat enim summam imbecillitatem partium naturalium, & potissimum facultatis retentricis. Nos fere omnes hydropicos diarrhœa mori obseruauimus; quod idem & Rondeletius ait se vidisse. Partem vero inflammata considerare oportet, quia in inflammationibus hepatis, splenis, ventriculi, & omnium par-

tium naturalium, diarrhœa in declinatione est utilissima, si notæ coctionis appareant. Quod si in inflammationibus pulmonum & costarum accadat, inutilis est & periculosa, quia nihil a partibus inflammatis euacuat, & corpus liquefacit, vt antea quoque dictum est. Id quod prudenter monuit Hippocrates aphor. 16. lib. 6. Morbo laterali vel pulmonia correpto, alui profluvium adueniens malum. Sed quod ad deiectiones pituitosas attinet, etiam videndum, nū iecur, intestina vel ventriculus afficiatur. Et tunc euacuata materia eadem membra erunt roboranda. Vbi sufficiens euacuatio facta sit, fluxioque ipsa adhuc perseveret adstringentibus etiam medicamentis eis resistere oportet, quomodocunque adhibitis, per os vel aluum infusis aut extrinsecus impositis. Præ reliquis, quorum copiam apud auctores alios quoque inuenies, valet syr. de absinthio, mentha, myrtinus, & de corticibus citri, diacydon. cum speciebus: 6. de sanit. tuen. ex succo coton. zinzib. pipere albo, aceto & melle conficitur; vtare. Minui autem potest & piper & zinziber, prout venter magis & minus frigida intemperie laborat. Cum prædictis syr. ʒj. aut ʒss. infra scripti pul. exhibe, qui recipit vtriusque mentha sicca ʒij. cinnamomi, maceris, galanga ana ʒj. seminis plantag. cornu cerui vñ, seminis acetosa ana ʒij. fiat pul. In quem etiam vñ valent theriaca recens vel mithrid. aut ʒj. vel ʒij. trochis. de spodio, e terra Lemnia. Mora immatura acerba ad solem exsiccata & trita, ad diuturnas coeliacas affectiones & alias omnes fluidas & dysenteriam, conducunt, ex Actio: mora etiam & rhus culinariis obsoniis mixta, & magis rubi mora immatura: & decoctum ex foliis & corticibus pini, pilulis cupressi, surfare, gallis, ac folio plantag. cum oleo myrtino, aut mastichino per annum infusum. Extrinsecus conferunt irrigationes, ex quarta vini odorati parte, oleo mastichino, myrtino, de absinthio, & vnguenta & emplastra ex mastiche, e galla, ex Galeno 1. de arte cur. ad Glauc. ex palmulæ, vino, farina hordei, croco, aloe ac mastiche: & sacculi ex milio, sale, aut panico, surf. & hordeo torrefacto, ex Alexand. & ex cumino, apii seminibus: nam ii sacculi vrinam quoque cient, fluxionesque ab intestinis diuertunt. Vt & vincula circa brachia & crura, & frictiones ad diuersionem.

OBSERVATIO XII.

De diarrhœa melancholica, vel ex atra bile.

Melancholicus, macilentus, excrementa nigra deieciat, ita vt diarrhœa hæc a succo melancholico fieret. Materiam concoquebam & parabam cum syr. de succo fumarie, borag. & lupul. & e corticibus citri, cum decocto fumarie & melissæ, & oxalidis. Purgabam cum sena, epithymo & myrobalanis, & syr. infus. ros. pallid. cum foliis sena. Hic tamen non conquerebatur de dolore splenis; sed sentiebat aliquando grauitatem in hypocondrio dextro: at non febricitabat. Vñ hic fuerat cibo crasso & melancholico. Et quia videbatur obstructio in hepate, dedi quoque syrupum de eup-

Quib. inutilis

In pituitosa diarrhœa si alui diutius fluat, quid agendum.

Quibus utilis diarrhœa.

de eupatorio, de absinthio, cum decocto agrimonie, melisse, apii, absinthii & borag. & cum fluxus aliquo modo perduraret, utebar adstringentibus, conseruato. absinthii Romani, borag. terra sigillata adiecta: vitando carnes bubulas, & omnem cibum melancholicum. Arque ita tandem melius habere cepit.

SCHOLIA.

Fluxus melancholicus non semper est spleneticus; aliquando vero & ab hepate originem suam trahit: quemadmodum Leonellus proprio capite de fluxu hepatico melancholico annotauit, scribens; quod cura fluxus hepatici melancholici feculenti, seu fecalis, quatuor intentiones curandi exigat: primo remotionem causae facientis fluxum: secundo hepatis roborationem; accidentium deinde correctionem, & vitam institutum. Ideo talis ægrotus sibi cauere debet, tam ab aere frigido quam vehementer calido adurente, & ab omnibus generantibus adustionem & sanguinem adustum; ut sunt carnes salitæ, cibi calidi, amari, acuti, & multum dulces. Utatur pullis gallinaceis carne vitulina, & simili. Caueat sibi a vino potenti; & aquam zacchari bibat, existente materia calida, vel causa calida hepatis sanguinem adurente. Et sic si febres adurentes in causa sint, vel synochos, causos vel continua, aut tertiana, & febris pestilens, febris causa amoueat, & fiat venæ sectio basilicæ dextræ, & humor torridus cum appropriatis educatur: & propter melancholiam adde myrobal. indos; & ob calorem, citrinos. Deinde remoueat caliditas febrilis cum omnibus ingeniis, ut fieri assolet. Et ita quoque si iste fluxus a nimia caliditate hepatis procedat adurente massam sanguineam & conuertente eam in humorem melancholicum, sanguine prius melancholico educto, cum venæ sectione basilicæ, humor etiam euacuetur, & habeatur ratio temperaturæ hepatis calidæ, tam intus quam extra: de quibus satis dictum, dum loqueremur de calida hepatis intemperie. Si frigida fuerit, tunc alio modo agendum. Si veniat ab oppilatione hepatis eiusmodi melancholicus humor, curatur de oppilatione. Si fluxus ille melancholicus veniat a virtutis expellentis & sequestrantis fortitudine, tunc dimittendus naturæ forti. Si tamen longo tempore durauerit, retineatur cum iam dictis, ne virtutem debilitando prosternat ægrum. Interea quoque si atra bilis facile intestina exulceraret, tum iocinoris ardori succurrimus; ac totius corporis feruori succurrimus temperatis remediis intestina refrigerantibus; stypticis confirmamus, ac agglutinantibus iuuamus: & reliqua obseruanda sunt, quæ frigida & sicca esse necesse sit. Sed quia etiam venit alia de causa (ut sequentibus exemplis clarius euadet) ut a liene; tunc quoque a missione sanguinis sinistro cubito, diarrhœæ melancholicæ curationem incipere debemus. Si ex atra bile malum fuerit, quæ ad os stomachi nimium effunditur, tunc ventrem apte subducimus cum epithymo, cuius assiduus vsus efficacissime valet. Valent & myrobalani in omni melancholico fluxu: & si vitium a liene oritur, de membro man-

dante, ac de iecore importune melancholiam generante, & liene, oreque stomachi suspiciente, curationis ratio sumenda est. Si ex crassiore melancholia, feci simili, tunc cathartica eas feces purgantia danda sunt; sed leniora tamen, ob fluxum. Sed hæc clariora euadent subsequenti exemplo.

OBSERVATIO XIII.

De fluxu melancholico, ex splenis obstructione.

Qui ex lienis obstructione diarrhœa aliquot diebus detinebatur, me ad curandum vocauit. Quod autem hoc vitio lienis fieret, ex dolore & grauitate circa lienem cognouimus. Cum igitur hic obstructio in liene esset, omnium primo illa erat tollenda remediis propriis tollentibus obstructionem, de quibus de curatione obstructionis lienis antea dictum est. Et quamuis hic non esset febris, propter obstructionem: tamen, cum vires adhuc validæ essent, venam basilicam sinistri cubiti aperiri iussimus, pauco tamen extracto sanguine, sed crassiore & mediocriter effluente. Deinde utebamur apozemate digerente, incidente, abstergente, & nonnihil aperiente: ℞. rad. apii, feniculi, asparagi, brusci, graminis ana ℥ j. corticum rad. cappar. thamaris. ana ℥ iij. ceterach, capill. ven. polytrichi, scolopend. chamaed. ana m. j. seminis agni casti, sem. plantag. ana ℥ j. ℞. vuar. pass. ℥ ℞. coquantur in aqua communi, pro ℞ j. colatura adde ℥ ij. aceti optimi vini: iterum ebulliat, col. addendo syr. de epithymo, de byzantiis ana ℥ j. ℞. misc. Postea huic decocto addebam epithymum, senæ, & cortices myrobal. indorum, ana ℥ ij. & huius decocti pro purgatione accipiebam ℥ iij. addendo syr. ex pluribus infus. ros. pallid. ℥ j. confectionis hamech ℥ j. ℞. & pro absterfione huius medicamenti exhibui aquam zacchari rubei. Facta hac euacuatione, venimus etiam ad illa, quæ exterius applicantur, quæ roborabant & deobstruebant splenem, ac residuum oppilationis resoluebant: ℞. olei de capparibus, lilior. ana ℥ ℞. pul. rad. cappar. thamarisci ana ℥ j. pul. seminis agni casti ℥ ℞. ammoniaci dissoluti in aceto sambucino ℥ j. ℞. cera modicum; fiat unguentum. Interea cum fluxus nondum cessaret, ad maiorem adstrictionem accessimus, & ℥ ij. huius pulueris, vel eius æmuli, exhibuimus: ℞. sanguinis draconis, thuris, mastichis, mummiæ, terra sigillatæ ana ℥ j. boli armen. veri ℥ iij. lapidis hamatit. carabe ana ℥ j. fiat pul. Hic pul. egregie commendatur a Leonello. Victu utebatur in principio attenuante, qualem descripsimus de oppilatione splenis. Postea in fine, cum fluxus non cessaret, adiunximus quædam constringentia, cum attenuantibus tamen cibis. Quibus tandem optime se habuit.

SCHOLIA.

Spleneticæ fluxiones modo veniunt vitio iocinoris, ut paulo ante diximus, cum atra bile plurimum abundat, modo ipsius lienis imbecillitate, aut præclusis membri meatibus. Interuenit & os stomachi melancholiam recipiens, vel vehemens ex-

pulsiua lienis aut attrahendi infirmitas. Facile distinguuntur. Si ab hepate, grauitas & dolor magis in hypochondrio dextro; si a splene, in hypochondrio sinistro. Nam & hic fluxus propriis notis distinguitur a ceteris, cum materia pauca minusque atra est in fœculenta hepatica, quam in lienari, & minus graue olet, sed grauius dolent. In liene nigrior subinde & minus dolens, cum sit obtusioris sensus. Et si sit oppilatio in splene, ad est grauitas & distensio, & dolor lienem exercet. Si nihil eorum adsit, indicabitur adesse attrahendi potentia imbecillitas. At cum nulla odoris grauitate, maiorem affert spem curandi: & si ex atro colore viridis sit materia, ac deinde crocea, salutem denuntiat. Fluxum autem spleneticum curamus, vt diarrhœam ab humore melancholico, mundificando & euacuando eundem humorem, & prohibendo, ne hepar eundem generet, & trahatur materia ad splenem, si adfuerit debilitas attrahendi, aperiantur viæ mediæ inter hepar & lienem, si ibidem fuerit oppilatio. Et si trahatur materia ad splenem, & tandem fluat ad ventriculum, is roborandus ne recipiat. Si adsit durities lienis, ea ipsa propriis locis curanda est. Sed si sit oppilatio in splene (vt hic erat) fortioribus deoppilationibus opus erit. Habes apud Guainerium (*tract. 1. cap. 13. de cura diarrhœæ tam hepaticæ quam spleneticæ*), syrupum egregie deoppilantem, in simili casu ab oppilatione lienis. Gatena-ria quoque breuiloquus inquit, si fluxus proueniat ob debilitatem virtutis attractiuæ splenis, vel propter oppilationem, curetur, *sicut dictum est cap. de dolore splenis*. Quibus tamen si perseveret, vtuntur alii, vt Leonellus, astringentibus; sed prius causa ablata, & liene curato.

OBSERVATIO XIII.

De alio laborante fluxu spleneticæ, ex lienis oppilatione.

I. Spleneticus istis diebus longo tempore exercebat nigra & aquosa excrementa, cum grauitate & hypochondrii sinistri dolore, qui diu ante & scurbuto malo laborauerat, ex oppilatione splenis: nam & crura variegata habebat plumbei coloris. Cum vires adhuc huic mediocriter adessent, venam commodè incidi iussimus ex saluatella manus sinistræ; pauca tamen in quantitate. Deinde decoctum sequens propinaui: *℞ rad. feniculi, petros. macerat. in aceto ana ℥ j. scolopend. ceterach, capill. ven. polytrichi ana m. j. cochlearia, bekabunga ana m. ℔. flor. cord. melissæ, ros. rub. ana p. j. corticum cappar. ℥ ij. seminis agni casti, sem. plantag. ana ℥ j. foliorum senæ alexand. ℥ ℔. corticum myrobal. indorum ℥ iij. epithymi ℥ j. ℔. coquantur in aqua ferrata pro ℔ j. col. adde syr. de epithymo, sceletyrbici nostri, syr. ex ros. sicci ana ℥ j. misc.* Locum lienis inunximus oleo de capparibus, & fouimus cum decoct. rad. filicum, rad. cappar. thamarisci, ceterach, ruta & seminis agni casti, in aqua ferrata & aceto acerrimo decoctis. Cum dolor in hypochondrio, licet obtusus, mitigaretur; rursus decocto suprascripto vsi sumus. Quibus tertio postea adiecimus, fluxu adhuc perseue-

rante, maiora adstringentia, rosas, mentham, absinthium Romanum, & plantaginem cum radicibus. Et exhibuimus conseruam ros. cum trochis. de capparibus & trochiscis de spodio. Vino prius Rhenano modice utebatur, cum febris abesset. Ceruissiam quoque subinde bibebat, cui bekabunga & cochlearia incocta erant. Postea vero in fine, ad maiorem adstrictionem concessimus vinum rubrum stypticum, cui aqua ferrata in fine curationis admixta esset; in quo & masticis paululum incoctum erat. Quibus remediis tandem fluxus cessauit. Eoque cessante, propter scurbutum præcepi, vt subinde rursus ceruissia vteretur, in qua cochlearia & bekabunga incocta erant: ita vt breui pristinam sanitatem recuperauerit.

S C H O L I A.

Hæc erat diarrhœa melancholica, ex vitio lienis, ex scurbuto prius orto. In quo affectu aliquando venter nimium fluit, vt alias diximus de scurbuto, modo etiam restringitur. Sed grauius malum est, si venter eiusmodi nigra deiciat, quam si aluius durior sit. Scribit Fernelius diarrhœam melancholicam prodire aut e liene, aut e mesenterio, quum oppressa natura vel naturalem melancholiam, vel bilem atram in aluum excutit exturbatque. Hæc autem ceteris multo est insolentior. Atra nonnunquam vsque adeo apparet deiectio, vt cum vel diluta pice vel cassiæ medulla conferri possit, quæ multos melancholiæ similitudine fefellit. At illa certe e sanguine fit; qui quoties aperta, rupta vel exesa præcordiorum vena, in intestina incidit, longo sinuosoque prolapsu ita præassatur ac nigrescit, vt picem plane referat. Discernitur autem quod intincta lintea rubescant, quodque cruenta vel comitetur vel præcesserit vomitio: quod prætori Alcmariano ex rupta vena magna euenit, per superiora & inferiora sanguinem profundenti; Et Guilermo Theologo Delpheni contigit. Vterque in hoc malum ex calidi vini potu inciderat, & ambo cum prius sanguinem, & postea tanquam picem excernerent, periere. Vti etiam anno 1589. filio Godefridi Beaumontii ceruissarii contingebat: adolescenti, cum sæpe palmaria lussisset, & valde incaluisset, vena rupta fuit; & per aliquot tempus sanguinem per lotium excernebat: postea in febrem continuam prolapsus, longo tempore excrementa nigra tanquam picem per aluum deiecit; & nullis remediis iuantibus etiam hic obiit. Ceterum de fluxu sanguinis puri, qui minus periculosus est, postea dicturi sumus. Sed nunc de fluxu colliquante exemplum proferamus; quamuis de eo mentionem quoque fecimus in libris nostris de febribus.

OBSERVATIO XV.

De fluxu colliquante.

QVi febre maligna corripiebatur; fortentia admodum & pingua deiciebat: cui licet in principio vena secta erat, breui tamen admodum contabescebat. Huic cremorem prisanæ exhibuimus, aquam frigidam efflagitabat, sed non poterat ferre: dedimus aquam coctam cum syr. de agrestia, vel eius

his loco cotone. & de portulaca, etiam hordeata & amygdalata, adiecto sem. pap. Aerem temperatum refrigerantem elegimus, cubiculo versus orientem vergente aut occasum; ubi sine animi perturbatione quiescebat, suavesque somnos ducebat. Cibos refrigerantes humectantesque, adstringentibus admixtis, adhibebam: & potiones humectantes ac leuiter refrigerantes astringentesque. Epithemata apta refrigerantia & inunctiones cordi ac hepati, ob continuam febrem malignam & ardentem: & sorbitiones ex amylo & pilana. Postea & febre magis diminuta lac cum candente ferro, aqua pauca admixta, & diutius coctum dabam. Et cum ad fellas continue assurgere vires dementer, agro imperauimus (quod rarius erat) substratis pannis profluvia excipere, atque extra cubiculum deiectionum graueolentiam efferre. Dabam & aquam acetosam, cum pauco syr. de agresta, vel eius amulo, & cotoneorum. Vtebatur & hoc condito: ℞. rob. de ribes ʒj. conserua foliarum acetosae, diacydonii sine speciebus ana ʒss. perlaram subtilissima tritaram ʒss. coralli rubri similiter pul. ʒij. terra sigillata vera ʒj. cum syrup. cotoneor. fiat conditum. Subinde capiebat & terasa acria condita: & succum mali punici vinosi. Pro siti admittebam lac acetosum, demtro butyro, cum foliis acetosae coctum. Quibus remediis hic praeter opinionem conualuit. Quemadmodum & alius senex, de quo egimus *Obseruat. 40. lib. 2. Observationum nostrarum, de feb. colliquante.*

SCHOLIA.

SYntecticus fluxus, id est, colliquatiuus, seu intestinorum colliquatio ad diarrhoeam quoque referri potest, sed difficilem & valde periculosam, & saepius lethalem, in qua quod inferne procedit, quasi adipe vel oleo perfusum cernitur. Hinc autem fit, quod retens concretæ pinguedinis carnis, aut etiam (diti protrahente vicio) solidorum partium substantia liquecat, defluatque in aluum. Familiare hoc quidem profluuii genus pestilentibus febribus & causo colliquanti, & hectica, & phthisi, & atrophiae; nonnunquam & viscerum inflammationibus. Nam accidit hæc colliquatio (ut 10. method. medendi circa finem refert Galenus) in prauis febribus, quæ corrumpunt massam humorum, eosque ad malam qualitatem putredine perducunt: unde fortentia descluntur, & vna pingua: quoniam pingue adnatum membrum torretur febre & liquatur. Contingit autem in caufonide, ac saepe in febre pestilenti, & in hectica ac phthisica morientibus fere semper, ut in matrona honestissima, vxore Arnoldi Cornelli Mylli consulis Dordraceni, de qua egimus lib. 4. *Obseruat. de febrib. scholio obseruat. 4.* Idem accidit Andreae Guilhelmo de Oesthoren; cuius historiam habes eodem lib. 4. *Obseruat. 7.* Eodem modo & extinctus est vir ille insignis & doctissimus Adrianus Leoninus Leidanus, urbis Delphensis pensionarius, qui ex marasmo tali fluxu quoque interiit, uti recensuimus *Obser. 9. eiusdem lib.* Quod autem febres eiusmodi colliquantes pessimæ sint, & malignæ, in quibus substantia corporis multis

modis diffluit, modo subito, modo paulatim, id docuimus ad longum scholio *Obser. 40. lib. 2. de feb. colliquante;* atque ibidem magna ex parte curationem posuimus ex Hippocrate, & ex Aetio, quæ Aetius ex Philagrio medico antiquissimo mutuatus est. Ponnit & Galenus curam colliquationum 10. meth. ad finem; & est remedium ardentis febris, ut scilicet aqua frigida potetur, si nihil prohibet. Quod si ob gracilitatem verearis confertim occurrere, minus, sed frequentius, dabis, vel etiam aquam hordei: & extra locis maxime calentibus epithemata frigorifica applicabis: & resumenda sunt, quæ alias de febre ardente posita sunt emplastra, perfusiones, inunctiones, & quæ de erysipelate aut inflammatione ventriculi diximus. Cetera vero remedia ex propriis inuenies affectibus, & loco iam citato, lib. 2. *Obs. nostrarum scholio Obseru. 40. & apud Aetium lib. 5. cap. 89.* Si hectica & marasmo laborantibus contingit, tunc plerumque lethale est, ut diximus. Etiam his, quibus in causo vel febre ardenti maligna, vel pestilenti contingat, si euadant, tabes facile solet succedere, praesertim si diutius perduret, & humidum radicale consumat: quamuis cum carniformes partes colliquat, minus periculosum sit; cum vero spermatica liquefunt, sæuum augurium faciunt. Huic malo refrigerantibus, bene nutrientibus alimentis occurrimus, & quæ facile digerantur ac penetrent. Quibus & in fluxu colliquante etiam adstringentia adiungenda, clysteribus quoque refrigerantibus & restringentibus infusis: nam fluxus hic incommodus est, colliquans corpus, & contabefaciens, vna vtile & inutile secum rapiens.

OBSERVATIO XVI.

De alui profluuiio, a medicamento violento inducto.

SOlet nonnunquam accidere fluxus post nimiam & violentam medicinam cathartica, quod ut plurimum euenit his, qui ab atrocibus Pseudoempiricis & circumforaneis potionati sunt: cuius exemplum refert Leonellus, quod in Hala Oeni oppido circumforaneus quidam, venenarius potius quam medicamentarius, idiota insulsiſſimus, hæmomantis proceritus, circumferens passim crystallum Leoniformem, ocellatum, sculptilem, quo ille prodigiosa prognosi transactos hominum languores, casusque perpeſſos per magicas (ut arbitror) præstigias noscitare videbatur. Emittebat ille tres pſecades cruoris, ex interſtitio auricularis & annularis digitorum, quas cõcautari lapidis, quæ ad iubam excisa est, irrorabat. Tandemque loca sola petens, dæmonis sui potentia, præmissis exorcismo, ariolabatur. Cuius exitiali fallacia heu quot immatura morte præcepti sunt, & adhuc ubi ille degit, extrema pati coguntur! Is (inquam) cucurbitas agrestes, multas incorrectas, simul in aheno decoquebat; de quo decocto cyathum vnum nonnunciarum accipiens, imposito troci exiguo, & puluisculi Sebræ, lathyridis & veratri candidi, cradorum omnium ʒj. pro infusione rhæb. falso propinabat. Singulum haustum aureo

2. Rhenensi, nonnunquam etiam (*videns vulgi incautissimi insipientiam & cecitatem*) Solato aureo vendicabat. Vnde plurimis dysenteria, & minime paucis mors subsequuta est. Quorum idem auctor curationem instituens, multos curavit clysteribus intercipientibus fluxum, tum aliis medicamentis, *de quibus postea in scholio*. Ita & ego sacerdotem noui quendam, qui in pago Schaga tribus miliaribus distantibus ab vrbe Alcmariana habitabat, qui omnibus rusticis aluum soluebat vno medicamento, quotquot ad illum diuerterent, ex sola colocynthide parato. Sic anno 1547. mulier quædam medicastra Alcmariana, mense Septembri, cuidam viro Antonio nomine, qui laternas conficiebat commoranti in platea Venetia dicta, homini valde pituitoso & imbecilli, potionem purgatoriam exhibuit valde violentam ex *elect. de succo ros. & colocynthide*, quam propinauit, & eodem die, contra omnes medicorum canones, sanguinem valde copiosum ex vena basilica demisit, hominemque in vitæ discrimen posuit, vt pro deplorato haberetur. Nam peracta venæ sectione, potione prius assumpta, post horam a propinato medicamento, subsequutus est fluxus ventris adeo enormis, vehemens & impetuosus, vt postea sanguinolenta quoque deiecerit, & in extremam desperationem deueniret. Ad hunc iam viribus prostratum, ex duobus illis generosis remediis perperam adhibitis, accitus sum, cum iam animam agere videbatur. Illico lotium ex *hordei decocto, pauco saccharo iniecto*, dedi, ad venenosi medicamenti absterfionem: & vt statim, cum rursus post lotium deiecisset ventrem, acciperet sæpiissime ex mixtura sequenti, imperabam: *℞. conserua ros. antiqua ℥vj. diacydonis sine speciebus ℥℔. seminis plantaginis, sanguinaria, sumach. hypocystidis, acacia, cornu cerui vsti ana ℥j. contundantur, & addendo fragmentorum omnium lapidum pretiosorum subtilissime puluerisatorum ℥℔. confice cum rob. de ribes ad modum conditi*. Interea & lac chalybeatum potandum dabam, & amygdalatum. Ventrem & stomachum inunxi oleis sequentibus: *℞. olei myrtini, coton. ana ℥℔. misc.* Quibus remediis roboratus est, & fluxus tandem cessauit, & ex sepulcro quasi reuocatus in vitam, Dei beneuolentia conualuit. Quæ si non iuissent, clysteribus vsus fuisset, de quibus latius in scholio sequenti. Ita quoque cum primo Alcmariam rediissem ex Gallia, empiricus impostor passim in publico vendebat tabulas rotundas ex puluere præcipitato imo præcipitante paratas, saccharo adiecto. Multis indiscriminatim dabat & vetulæ & filiæ; vetulæ subsequutum tum filiæ alui profluuium vehemens & dysenteria, maxillarum tumor, digitorum & vnguium nigrities, tanquam veneno infectis. Filia per me curata, vetula subito mortua: tum alii haud pauci.

S C H O L I A.

4. Contra Empiricos tales aliquando scripsimus, & de iis egimus in libris, qui nuper contra vromantes in lucem prodierunt. Digni sunt certe eiusmodi præstigiatores & medicastra, vt sup-

plicio afficiantur, qui non curandis, sed trucidandis ægrotantibus, quæstus gratia capitalem admittere fraudem non verescunt, nec minus directa abeant (*dicente Leonello*) idiotæ, præter etiam hoc, lucriones, myropolæ denique, & argentangina correpti quicunque medici. Contra, nulla non celebratione prosequamur eos, qui obseruato Hippocratis iureiurando, pretium vltra iustum non intendunt, adeoque puram, castam & sanctam suam vitam & artem præstant, & conseruant, & suo semper iudicio ad languentium vtilitatem vtuntur, nec suæ rei potissimum seruiunt. Verum huic malo his subsidis auxiliabimur, neque miseros istos ægrotos quamuis ab empiricis delusos mori patiemur. Sed abimus igitur, *iuxta eundem Leonellum*, primo dolorem enemate ex oleis & aliis rebus anodynis parato, non tamen alui ducti; hoc vel simili clystere etiam intercipiente (*quamuis ego commodè inieci lac coctum prius cum rad. althææ*) *℞. iuris elixationis vtriusque iacea, rosa canina, tassi barbari lb. j. athanasia vel mycleta ℥℔. misc.* Aliud enema valentius in restringendo: *℞. succi plantag. ros. ana trientem, aqua decoct. ros. mespili, sorbi, corni, rad. tormentilla, facta cum aqua pluuiali lb. ℔. addendo de opiatris supradictis seminiunciam: fiat enema: possunt addi vitella ouorum num. ij. vel iij. sanguinis draconis, sepi vel axungia hircina, tragacanthi, gummi Arab. ad placitum*. Si dolor sit intensus, imponatur clyisma consolidans, & mitigans, tale: *olei ros. lb. ℔. sepi castrati quar. j. mucilag. psyllii tantundem, colliquefiant, & distemperentur simul, adiectis vitellis ouorum*. Vel decoct. hordei parata cum aqua ferratorum lb. j. olei ros. omphac. myrta. ana ℥℔. vitellum vnius oui, sacchar. rub. ℥j. misc. Plura sic & condita & emplastra & pulueres ipse compones: vel iis vtere, si opus est, quibus præceptor meus Benedictus vtitur ad constringendum in diarrhœa, & Leonellus cap. proprio tanquam accessorio de fluxu post purgationem violentam. Habes & adstringentium remedium copiam & campum latissimum apud Alexandrum Benedictum lib. 21. contra omnes fluxus. Conuenit & his Theriaca, præcipue si medicamentum fuerit venenosum. Memini cum in Gallia adhuc praxin exercerem, Anno 1545. in principio Augusti me vocatum in pagum quendam Beaucommun dictum, ad quendam, cui ex medicamento, prius pilulis a pharmacopœo assumtis, aluus soluebatur: & superueniente tonsore clyisma infundente, ex decocto colocynthidis, vt existimabam, ex eo plusquam quadragesies cruenta per aluum deiecit, cum maximis torminibus, canicula exurente, & tempore æstiuo. Quem cum ex sanguinem repperissem, clysterem iniici iussi ex solo lacte vaccino cocto, in quo ferrum ignitum sæpius esset extinctum, cum ouo, frigidum aut vix tepidum. Ventrem quoque inungendo vng. constringente; & curatus fuit, etiam vino rubro styptico mox vtens, ad vires recuperandas. Clyisma postea ex solo lacte chalybeato semel adhuc iniectum fuit. Quibus remediis & hic quoque sanatus est.

omnia

omnia hic frigide actu dedimus; quod in omni fluxu faciendum, apostemate & oppilatione exceptis. Antequam clyster iniiciatur, in hoc casu præstat prius bibere aquam hordei, ut nos quoque fecimus in omnibus dictis, ad absterfionem; vel aquam zacchari; & deinde clysterem iniicere.

OBSERVATIO XVII.

De fluxu ventris, qui neque diuersione, neque constringentibus curari potuit, sed tantum narcoticis seu stupefactiuis.

IN omni curatione alui fluxus, in primis considerandum, num sit constringendus necne? Diximus autem, nec criticum fluxum, nec humoralem, seu qui fit a multitudine humorum, subito esse restringendum. Criticum quibus modis cognoscamus, superius egimus. Quum vero a multitudine humorum fit, facile hoc cognoscimus, si singulis annis bis aut ter soleat fieri, natura se exonerante liquidis & serosis humoribus; & cum notæ illius redundantiæ apparuerint, præcesseritque victus ratio talia gignens. Fluxus quoque diuersorum colorum non est restringendus, virtute constante: quia ex hoc arguitur diuersitas & multitudo humorum. Verum is, qui vires deficit & diutius durauit, ut antea quoque retulimus, constringendus est. Verum sumendo intentionem curandæ fluxu, ut fluxus est, ubi cognouerimus, eundem esse constringendum, ex iis, quæ iam longiore sermone enucleauimus, triplex ponitur intentio curandæ fluxum, secundum probatissimos quosque auctores, per diuersa, per constringentia, per immobilitatem materiæ facientis fluxum, seu prohibentia sensum membri, ut sunt narcotica seu stupefactiua. Diuertitur a loco, a quo fluit, interdum vomitu, teste Hippocrate & Galeno, aph. 15. lib. 5. A longo alui profluuiio habito, spontaneus vomitus superueniens morbum soluit. Attamen nolunt promoueri seu irritari vomitum in principio, neque adhuc cum materia multa est, sed per secessum id potius fieri laudant. Euacuantia tamen per eandem partem magis faciunt ad curam causæ fluxus, & minus ad diuersionem, cum materiam ipsam per proprium locum euacuant: & sic fluxus fluxum curat. Non sunt tamen ex relaxantibus, sed cum his, ut antea admonuimus, quæ stypticam etiam relinquunt. At non euacuata ex parte materia, vel minorata, vomitoria non sunt administranda: ea vero euacuata facilius tolerat vomitum natura, attamen cum lenioribus. Ea quoque, quæ sudorem mouent, diuertunt, sed non nisi magna parte materiæeducta. Hoc modo & balnea diuertunt, & frictiones, lotiones brachiorum, & ligaturæ vehementiores, & ventosæ: sed ventosæ non applicandæ, nisi tota materia euacuata. Interea dum per secessum aut vomitum aut sudorem diuertunt, regimen vitæ ac victum ab eo, qui restringit, aliquantulum immutant. Et sic ubi sudorem prouocant, aerem volunt esse minime frigidum ac siccum, sed moderate calidum & humidum, & victum non constringentem, si vomitum incitent. De his vide Guainerium & Gra-

dum. At astringentia quædam sunt simplicia, calida aut frigida & composita: alia exsiccantia humiditates superfluas, aut meatus & vias constipantia, vel infrigidantia, inspissantia, conglutinantia, de quibus vide Auicennam & eius sequaces, & Guainerium. Ex simplicibus varia componuntur medicamenta constringentia, & pulueres, & morselli, aquæ destillatæ, condituræ, potiones constringentes, clysteres, pilulæ cōstringentes: & quæ exterius admoventur, lotiones, forus, epithemata, encatasmata, vnctiones, emplastra; quorum copiam apud eundem Guainerium tum alios inuenies. Vltimo, si hæc non iuuant, ad narcotica accedimus. Sic vir quidam, qui & aliis loco exempli esse posset, cum fluxu ventris diuturno laboraret, cum maximis ventris torminibus & dolore, cum diuersiuis medicamentis curari non posset, minorata & magna ex parte euacuata materia prius cum myrobal. & rhabarb. hæc vel similia constringentia eidem præscripsimus: *℞. seminis arnoglossæ, boli armeni veri, corall. rub. ana ʒj. fiat pulu. subtilissimus.* Exhibuimus cum succo arnoglossæ. Sed cum non iuuaret, uti neque alia adstringentia diuerso modo parata & exhibita, ad stupefacientia peruenire coacti sumus. Clysterem itaque iniecimus ex lacte cocto, cum duobus vel tribus capitibus papauer. albi. Quod cum nondum iuuaret, dedimus pilulas iij. sub noctem, ex *℞. j. pilul. de cynoglossa*: quibus dolor cessauit, fluxu etiam restricto. Alteri quoque dedi *℞. ij. theriacæ nouæ*; & fluxus restrictus est, & dolor omnis euauuit. Nam recens theriaca ventris fluxus, maxime cholericos sistit. Compescit enim mordacitatem humoris, ac torporem inducit. Sed & theriacæ veteris vires etiamnum probantur, si modo ex abscessu non fuerit. Vires enim iuuat, vetus præsertim, sed cum vehementi febre non datur. Fluxui vero ex phlegmate crasso & melancholico mirifice medetur, ut *Benedictus Veronens.* etiam commendauit, cap. 32. lib. 20. Leonellus tamen theriacam nouam in fluxu cum dolore prætulit.

S C H O L I A.

OMnis curatio profluuii ventris, vel respicit causam ipsam, vel fluxum, ut diximus: sic in fluxu cibali primo causam abscindimus: ut si ex nimia quantitate cibi, paucam damus: si cibus corruptus, eos dimittimus: si oleaginosa & vntuosa æger sumserit, damus styptica. Si sit ex hepatis obstructione, eam tollimus. Et si ex aliorum membrorum vitio fiat, ea prius curamus. Si vitio cutis aut aeris qualitate varia fiat, ut si cutis, quæ antea rara fuerit, pori sint constipati cum humoris copia, unde alius fluit; tum aliquando ventris delectio necessaria, vel sanguinis missio, & meatus aperiendi frictionibus. Aliqui & balnea commendant. Si etiam in fluxu, qui nocturno præsertim frigore contingit, vna cum humoris superabundantia, delectio & hic prius necessaria est, & pori quoque aperiendi frictionibus, & calido conclauis æger continendus, membra pannis calidis fouenda; & calidis cibis potionibusque recreandus est æger. Quod si aeris distemperantia calida fuerit ventris

fluxus, refrigerantibus opus est, tum cibo, tum potu, ac inspissantibus: propterea cum papaveris semine ac coriandro cibaria condienda. In plano conclavi continendus æger, sudoresq; cohibendi, si immodici fuerint. Quod vero ad ea attinet, quæ fluxum respiciunt, quibus modis restringatur fluxus, iam dictum est. Sed quod ad narcotica & stupefactiva attinet, quibus aliquando cogimur uti ad restrictionem; quod hæc aliquando conferant, id, iuxta Avicennam fit, quod materiam incrassent & dormire faciant, & prohibeant necessitatem surgendi. Addit, non danda quam diu ab illis possimus excusari, & non virtute existente debili. Nam quidam supposuit sibi collyrium ex opio, & mortuus est. Non solum per os dare hæc suspectum est, sed ea quoq; supponere. Vnde Paracelsici audaces quidam cum suis opiatis multos celeri cursu ad Plutonium demittunt, sæpe inopinato. Vidit Guainerius amicum quendam suum tenesmo laborantem, nec dormire potentem, cui suppositorium ex opio fuit subiectum; quo dulci sopore obrutus etiam nunc in perpetuum dormit. Consultuit igitur, illa esse observandum in stupefactivis exhibendis, quæ a prædecessoribus accepimus, ne temerarii in tam horrendum errorem incidamus.

Tria erunt consideranda in primis, ne opium vel opiata exhibeamus sola. Novi empiricum sacerdotem, qui ultra 3 j. opii sine correctorio in dolore capitis vel dentium per interiora daret: sed quid pellioni, cui id dederat, commodi attulerit, res ipsa indicavit, cum eundem stolidum & stupidum effecerit. Ideo corrigantur: sic castorium bezaar est ipsius opii; gentiana cicutæ, nigri papau. & ne tam libere ad membra transeant, adii-ciunt myrrham vel olibanum; & quæ spiritus vivificant & roborant, ut crocum. Addunt roborantia cordialia, hepatica, stomachica, ut spicam, doro-nicum, & zedoariam, sintque per sex menses vel plures probe commixta & fermentata. At in recipiente narcotica hæc quoque advertenda, ut virtus in eo constet: secundo, ut suscipientem semper actu calidum, vel ut plurimum inuenias: neque illis danda, qui frigidam & siccam, vel frigidam & humidam intemperiem sortiti sunt. Tertio, nisi materia ex parte sit evacuata; si oppositum feceris, illam incrassabis, & spiritus congelabis, & sensum stupefacies, coctionem debilitabis, & materiam retinebis: quo fit, ut paucis diebus transactis fluxus cum maiore conamine, ac seueris symptomatibus reuertatur; & ita debiliores facti agri, talem impetum non sustinentes subitus (dicente Guainerio) per terram paradysum redeant. Quarto, nec illa exhibenda agri, nisi videris priora exhibita non profuisse, & infirmus torsionibus ac doloribus continuo confluctetur. Tempus commodius adhibendi erit a cœna, quæ & pauca ac facilis digestionis esse debet, & per horas quatuor ad minus distans fuerit: tunc enim somnum inducit, & humorum agitationem, atque motum sistit. Potest & vacuo & ieiuno stomacho mane exhiberi, semper correctum, sed nullatenus supra cibum. Refert Guainerius historiam quandam, de suo socio Patavii no-

bilem quandam feminam perditæ amante, qui cum ex vetula (quæ amasiam suam custodiebat) intellexisset, quod esset pauci somni, dedit amasie suæ aquam opiata, quam vetula daret ad somnum conciliandum, ut sic melius amplexibus amasia uti posset. Sed commiscuit in maiori quantitate, quam vetula erat necessarium, & dedit in cœna: atque ita illa vetula triginta horis & ultra stupida, imo vero semimortua remansit: sed tandem medelis multis excitata, per annum tam mente quam corpore sopita fuit. Caue, ne tuo infirmo idem contingat quod vetulæ; & nunquam exhibeas supra cibum, neque iis postpositis aut non observatis, de quibus nunc abunde dictum est. Magis tamen conueniunt, ubi necessitas urget, & iam dicta admittant, in tenesmo & dysenteria ulcerosa; in causa frigida aurea Alexandrina, in calida, rubea trochiscata, requies. Quædam tam in calida quam frigida indifferenter, ut est theriaca, maxime ubi suspicio est de veneno. Aliqui tamen in calida theriacam cum zaccharo ros. miscent: in frigida eam solam dant. Alii rursus in causa frigida antiquam aliquam præferunt, in causa calida nouam.

OBSERVATIO XVIII.

De fluxu ventris cum tussi valida.

Verpera tussim validam habebat vna cum fluxu ventris. Huic dabam lac amygdalatum, paratum cum aqua farina oryzae bullita, deinde colata: ex qua fiebat amygdalatum: Quandoquidem si cum fluxu, incommoda tussis habetur, commotione sui, fluxus increfcit; & si quæ dulcia assumantur, ventri ac fluxui nocent: propterea acetositas ac stypticitas damnatur. Remedia ob eam causam, ac cibi qualitas ex leuiter frigidis agglutinantibus, querenda est; sicut hordeacea plus, ex hordeo tosto, & ouorum lutea aqua cocta vel indurata. Hæc administramus. Liquidæ tamē sorbitiones, quæ cito in aluum defluunt, damnantur. Ideo sorbitiones ex pulte & oryza non ita liquidas confeci-mus. Sed præcipue iuuabant amygdala dulcia corticibus ablatis ita per se deuorata. Hoc etiam modo puellam pulcherrimam, filiam cognatæ nostræ Mariæ Valckestenæ, a fluxu diuturno cum tussi probe curauimus.

SCHOLIA.

Actores cum de alui profluuium curando agunt, adiciunt etiam ultimo intentionem curandi accidentia, quæ cum fluxu aliquando misceantur. Et ita ponunt peculiaria quædam remedia ad fluxum ventris cum tussicula; ut est myrrhus, ex quo etiam syrupus myrtinus conficitur, quo nos commode utimur, tam ad fluxum, quam ad tussim. Commendant & castaneas, auel-lanasq; nuces tostas: nos amygdala potius elegimus, & gummi Arabicum, & amyllum cum papauere. Et sicut tussis fluxum aliquando sequitur, ita & febris modo præcedit, modo cum fluxu iungitur. Vnde & febris fluxum magis incitat, & eius causa existit, inflammatis humoribus, vel iisdem putrefactis. Et sic diuersa oritur intentio curandi (ut viuis exemplis ostendimus in libris nostris de febr.) etiam

Qua ratione
conferant nar-
cotica in fluxu.

Narcoticis seu
stupefactivis non
utendum, nisi
certis regulis
observatis.

.2

Alui profluuium cum tussi.

Profluuium ventris cum febre.

etiam a fluxu varians: nam in febre humectamus, in fluxu exsiccamus. Si itaq; febris fluxum sequitur, agitato intus spiritu & humoribus, vnde abscessus sæpe veniunt, aut oppilationes, vel humores non reguntur, vnde putrescunt, & putrida sequitur febris, qua fluxus vel augetur, vel humores liquefiunt; tunc fluxus & febris contrariis indigent auxiliis: ille enim siccis, hæc humidis sanatur. Sed in actiuis sæpe variant causæ, vt quando fluxus ex frigida, febris ex calida prouenit materia. Vnde vtrique causæ succurrendum est: sed eius, quæ periculosior, principalius curam agimus, secunda non omnino neglecta. Verum si æquales causæ fuerint, a curatione fluxus initium sumendum est. At si febris permaneret, ex oppilatione aut humore non educto, eam (vt in lib. nostris de febr. constat) sanabimus. At si febris & biliosus pariter fluxus iungantur, frigidiora proculdubio conueniunt. Verum si fluxus ex humore frigido fuerit, minus calida offerantur, quæ alioqui fluxui conuenient. Reliqua in feb. patent, cum quibus fluxus coniungitur, quorum exempla plurima inuenies in lib. nostris de febr. At si cum febre hectica fluat venter, vel cum phthisi, trochisci ex spodio dicti medentur, vel qui ex camphora nomen habent, vel qui hoc modo componuntur, *tragacanthi gummi tostii, spodi, rubricæ armeniacæ, terre lemnis, camphoræ, succi liquiritiæ, pares portiones cum myrti succo aut decocto formantur, ex cydoni mali succo dantur.* At si agito stomachus ardet cum ilibus, ac sitis accenditur, linteo- lus cum aqua rosacea, sandalis ac camphora efficaciter imponitur. In summa, fluxui cum frigore calefacientia cum stypticis iuuant. At alia sunt symptomata, quæ biliosæ diarrhææ potissimum superueniunt, casus virtutis, lyncope, appetitus deiectio, vertigo, ardor, torsio intolerabilis ac dolor. Valent carnes destillatæ, cum *myrtillis, sumach, berberis, anthera, cum aqua & modico vino cationcorum, vti iura restaurantia, quæ ad syncopen valent, vertiginem & deiectionem appetitus, propriis locis petenda.* Ad torsiones & dolores egregie confert cornu cerui vstum, etiam vbi vermes simul cum fluxu hominem affligant. Si ardorem & dolorem bilis mordax inferat, hæc ipsa prius euacuanda. Post euacuationem, illo permanente, faculi extrinsecus applicandi, *ex cumino & aceto, floribus taphi barbari, furs. ros. & similibus, & clysteribus consopientibus dolorem, de quibus satis dictum est.*

OBSERVATIO XIX.

De fluxu ventris ex rheumatismo capitis vel catarrho oris.

Rheumatismus capitis (teste Galeno) varias capitis ægritudines affert, cum cerebrum distemperatum fuerit; vnde plurimæ superfluitates oriuntur, quæ instrumentariis partibus subiectis obesse solent. Congeritur humiditas in cerebro ex alimenti inconcoctione ad ipsum delegati. Cum vero catarrhus per fauces in stomachum & intestina, noctu præsertim defluerit, magnis fluxionibus tentantur, aut quia tunica interior lubrica fit, aut humore diu contento retentrix vis resol-

uitur, aut cibus intus vitatur, aut concoctio impeditur, aut humoris violentia excitatur expul- trix, leuitari aut lienteria hæud dissimilis. Ex iis causis, vt antea retulimus, Hippocrat. balbos, ventris fluxu naturaliter periclitari dixit: quales nos plurimos cognouimus, præsertim stultos & balbos. Sic Cornelium illum Alcmarianum, a pueris Kesium dictum, hoc vitio in perpetuum labo- rare conspeximus: & stultum quendam adole- scentem Delfis, cui semper pituita ex ore fluebat, & venter lubricus erat. Hic fluxus a barbaris ce- rebralis vel catarrhalis vocatur; & causæ eius est materia descendens a cerebro in stomachum prolabens sua grauitate, & continuo fluore talem fluxum gignens. Quo quidem monachus senior, Eghertus nomine, in monasterio regularium prope Alcmariam afficiebatur, a quibus mona- chis tunc Alcmariæ habitans, annuam pensio- nem habebam. Ad hunc itaque accedens, facile istis notis cognoui, Rheumatismum hunc fluxum induxisse: nam in fauces destillans humor, noctu præsertim, illi dormienti respiratione sonantior illabebatur, & audiebatur. Abstinencia quoque magis, quam cibatu excitabatur, cum aluus in li- enteria cibo duntaxat assumpto fluat; qua ratione etiam a lienteria distinguitur. Hic quoque fluxus augebatur magis post longum somnum, nec ita erat continuus, sicut stomachicus, sed magis per interualla & periodos fluebat venter; cum post somnum retineantur multæ materiæ, quæ tem- pore vigiliæ expurgantur, vnde in somno vis ro- borata ipsas magis expellit. Et magis fluit post longum somnum: quia post temperatum som- num vis cerebri digestiua magis roboratur; ita & resolutiua insensibiliter magis recrementa resol- uit, & tunc non multiplicabitur fluxus, & materia minuitur. Ex debilitate cerebri & catarrho præ- cedente hæc facillime innotescunt, cum videantur in somno quasi catarrhum deglutire. Cum autem spumosa & pituitosa in hoc sene essent excremen- ta, facile percepimus, diarrhæam hanc ex defluxu a capite ortam esse, iuxta aphor. 30. lib. 7. sic dicente Hippocrate: *Cerebro affecto spumosa aderunt ex- crementa.* Iam quoque ex cerebri debilitate & de- stillationibus certius iudicium feci, etiam ex ma- teria frigidior, tam ob capitis grauitatem quam frigiditatem, quæ sentiebatur, ac sputi multitudi- nem; ætate senili, & tempore hyemali, ac tempe- ratura ipsa idem attestantibus. Quamobrem in- primis illi has pilulas, vel his similes, pro minora- tino medicamento (vt vocant) dedi: *℞. pilular. de hiera simplicis, agarici trochiscati, corticum myro- bal. chebulorum ana ℥ j. cum syrup. e stæchade, fiant pilule quinque.* Materiam hoc modo vel simili præparauimus deinceps: *℞. corticum thuris, mas- sicis, filiorum & nucum cupressi ana ℥ j. bulliant in lb. j. aquæ chalybeata, ad consumptionem ter- tia partis. Hanc colatura pro vna dosi capiebam ℥ iij. addendo syrup. e stæchade ℥ j. mellis rosac. colati ℥ ss. misce, ter fuit exhibitum.* Deinde rursus ad- huc semel cerebrum purgaui: *℞. pilularum cochiarum, pilular. de hiera composita Nicolai,*

Profluuii ven- tris cum hec- tica vel phthisi coniuncti an- genda.

Alia sympto- mata fluxui su- peruenientia, quomodo corri- genda.

2.

3.

corticum myrob. chebul. ana ℥ j. *cum syrupo e stœchade, fiant pilula quinque. Valent in principio, ubi materia est multa.* Postea adhibui diuersiones pro catarrho diuertendo, ut brachiorum frictiones & ligaturas, & ventosas in humeris. Abstiniui a masticatoriis & gargarismis, ne materia traheretur ad stomachum & intestina. Sed nasipurgiis per nates contenti fuimus ex succo betæ & maioranæ: ac sacculo capiti imposito, ad roborationem cerebri, ex maiorana, stœchade, betonica, foliis cupressi, chamomilla crasso modo contusis, & sacculo rotundo inclusis, & capiti supra coronalem suturam admoto. Dedi etiam conser. saluie, betonica, ros. imperauig, ut grana thuris & mastice subinde deglutiret. Etiam ventriculo imposuimus ceratum ex mastiche vel stomachicum; & ad magnitudinem nucis auellana ex hoc electuario sumebat: ℥. conserua rorismarini ℥ j. confectionis mithridatica ℥ ℔. specier. diamosci dulc. ℥ j. conserua betonica, absinthii Romani ana ℥ ij. spica, corticum thuris ana ℥ j. pulueriscentur hac vltima, & cum syr. e stœchad. fiat electuarium. Utens carnibus assis, turture, columbis, optime deinde habuit.

S C H O L I A.

3. **F**luxus hic catarrhalis ex cerebro descendens, modo sua lenitate modo vero sua acuitate lacerare potest, ut fiat fluxus ventris; idque diuerso modo: nam & ab ore, sicuti per gulam, humiditates fluentes in stomachum, vel ex aphthis seu ulceribus & pustulis in ore, fluxum concitant, ita ex catarrho modo insipido, modo falso alui profluvium contingere potest. Solet autem his fluxus ventris a capite descendens, ad ventriculum longo tempore durare; & qui hoc laborant, sentiunt ob pituitam fluentem ad ventriculum dolorem, cruditatem alimentorum. Si a catarrho falso aut acri, magis rodit. Propterea si huius materia sit frigida, eo modo curari debet, ut catarrhus frigidus: si ex calida materia, ut calidus. Valent tamen generaliter illa, quæ rheumatismos cohibet. Ideo a somno supino cauere oportet; & protinus a cœna non dormiendum, & oportet celsa ceruice dormire: & cerebrum imprimis repurgabimus iis, quæ de destillatione diximus; ac cerebrum roborabimus, non solum rationem habentes membri mandantis, scilicet cerebri, sed & recipientis. Si frequentes habeat paroxysmos, cum licet materia prima sit euacuata, noua regeneratur, quæ defluxionem rursus excitat; frequenter vtendum pilulis mastichinis; & errhinis seu nasipurgiis caput repurgandum: theriaca danda, vel mithridatum, quæ valde exsiccant. Sacculi capiti imponendi & pileoli, & pulueres inspergendi, vnguenta, emplastra, fumigia adhibenda; quorum medicamentorum copiam inuenies apud Rondeletium. Interea pars recipiens non negligenda topicis remediis, descriptis ad ventriculi imbecillitatem; ratione temper habita ad materiam ipsam catarrhalem, num frigida vel calida sit. Si frigida, curetur, ut dictum est Obser. precedent. Si calida subtilis, dentur pilul. assaieret, aurearum & boli armeni ana ℥ j. fiant pilula quinque cum syrupo myrteo. Si materia

mixta, pilul. de hiera, aurear. rhabarb. ana ℥ j. myrob. citriner. ℥ ℔. cum syr. rosa. fiant pilula vij. In materia calida digeratur hoc vel simili modo: ℥. syr. rosa. ℥ j. syrup. myrtini ℥ ℔. aqua plantag. ℥ ij. aqua ros. ℥ j. misce. Medicina eradicatiua fiat ex supradictis minoratiuis, aucta dosi. Deinde materia, ut supra, diuertatur frictionibus, ventosis, ligaturis, balneis circa extrema, & caput purgiis. Deinde cerebrum roborabimus tali sacculo in catarrho calido: ℥. flor. rosar. rub. rad. nenuph. exsicc. myrtill. sumach. ana m. j. crasso modo puluerisatis & contusis supra tegulam calefactis in sacculo lineo calidus super commissuram coronalem apponatur. Vel hic puluis capiti inspergitur: ros. rub. myrtill. santal. rub. corall. rub. sandaracha, stœchad. arab. ana ℥ ℔. fiat puluis subtilis. In ore teneat zaccharum rosaceum, vel diacodium deglutiat: aut bolum armenum misce cum syr. ros. sicc. instar electuarii, & teneat in ore. Stomachum aliqui leui vomitu repurgant; vel forti, iuxta exigentiam materiæ peccantis, & secundum tolerantiam virtutis patientis, & quantitatem materiæ, & dispositionem stomachi. Clysteribus quoque intestina mundificant, non tamen fortibus, ne augmentetur fluxus, sed cum iis, quæ simul intestina roborant, & leuiter materiam detergent, & educunt, de quibus supra dictum est, simul stomachum & intestina roborando cum oleo rosaceo, mastichino & similibus. Si vero propter os exulceratum, vel gingiuis, vel propter aphthas fluat, recurre ad propria capita. Si vero hic fluxus ventris fiat ab aliis partibus, ut quidam volunt, ut a renibus, vel matrice, diuertemus materiam ad matricem, vel ad renes, eorundem attractiuam calefacientibus vigorando, & prohibendo causas impediennes, quo minus materiæ conuertantur ad renes vel vterum. Si a toto fiat (cuius indicia posuimus scholio Obser. i. huius libri) tunc qualiscunque fuerit succus abundans, erit euacuandus. Si a toto corpore propter liquationem fiat, totius ratio habenda est, ac totum corpus roborandum; cuius quoque exempla de hecticis febribus posuimus. Nunc ad alui profluvia veniamus, in quibus sanguis profunditur; rursus factio initio ab iis, qui purum sanguinem excernunt; & ita progrediendo ad reliquas cruentas excretiones.

O B S E R V A T I O XX.

De fluxu puri sanguinis.

Adolescens boni habitus, in otio viuens delicate, cui subinde sanguis e naribus fluebat, hac quidem euacuatione cōsuetu intermissa longo tempore, cibis multis ac bonis, tum potibus vtens, incidit in fluxum puri sanguinis: idq; videns, plurimum sibi meruebat; quanquam nondum decumberet, neque febricitaret. Ad quem accitus, percurrrens omnia signa, cum diarrhœa non perpetuo vnam affectam partem habeat, neque ventriculum, intestina, iecur, lienem, cerebrum; sed aliquando totum corpus afficiatur, quod hic videbatur ex signis præsentibus plenitudinis totius, vita otiosa præcedente, cum & sine dolore sanguinem excerneret, & venas amplas haberet, consulimus, ne fluxum illum astringeremus, sed potius

potius illi venam omnium primo secaremus, cum amplas venas haberet, & vires robustas. Cui sectioni d'fficultet auscultabat: sed tandem bonis rationibus inductus, illam admisit; & vena brachii dextri media secta, sanguine mediocriter effluente. Hoc modo non solum facta est diuersio, sed copia sanguinis extracta, fluxus paulo post eum reliquit. Interea iubebam vt parcius cibis refrigerantibus vteretur, & a vino & multis ac delicatis cibis abstineret. Quibus hic probe curatus fuit.

S C H O L I A.

2 **R**hasas octauo Continentis excretiones cruentas per aluum ad quatuor species reducit. Prima est, in qua sanguis euacuatur paulatim; & hoc accidit in quo incisa est pars membrorum, aut d'ffusum exercitum; & talis purus sanguis existit. Aliquando etiam subito & in maiori copia funditur; & iste fluxus sanguinis est criticus a toto: qui si proportionetur repletioni & virtuti, & bene toleretur, eo quod confert & bene ferunt acri, minime est restringendus. Et si aliquo modo videatur superfluere, restringatur diuertendo (vt Leonellus capite proprio de fluxu sanguineo toto critico refert) cum phlebotomia diuersa vena communis vel hepatica. Si vero sanguis acritate sua etiam peccat, propter admixtionem bilis, & non solum sui multitudine, neque tunc omnino purus sanguis est, euacuatur primo bilis cum euacuantibus aliquid stypticitatis habentibus; deinde stringatur sanguis. Tale tunc minoratiuum idem exhibet: *℞ flor. borag. bug'ossæ, ros. rub. ana m. ss. corticum myrob. citrinor. ana ʒj bulliant in s. q. aqua plantag. ad consumptionem medietatis: & huius col. accipe ʒij. rhab. optimi electi ʒij. misc. fiat potus. Vel ʒj succi plantag. facta residentia ʒj. ss. rhab. electi ʒj. puluerisetur rhab. misc. exhibeatur. Habet hic succus cum rhab. (teste Mesue cap. proprio) proprietatem euacuandi choleram & fluxum sanguinis sistendi a quocunque loco veniat. Facta itaque in tali casu cholera euacuatione, stringunt deinde sanguinem ita biliosum, si superfluat, ipsum incrassando & prohibendo ne nona fiat sanguinis biliosi generatio, cum aqua plantag. ʒij. & pul. trochis. de terra sigillata ʒj. & syr. ex ros. siccis ʒj. emisc. Sed ubi purus sanguis est; non ita restringendus, nisi postea vires deiceret. Secunda est, iuxta eundem Rhasem, similis aqua carminum & lotura. Tertia est, illa, qua habet similitudinem cum fece sanguinis habente splendorem. Atque in his tribus speciebus fluxus sanguinis, præsertim prima & tertia, sanguis abundans subito euacuatur; & ego quoque sæpe in praxi vidi eos subito sanari, licet vulgares desperarent. Minus autem periculosum est, qui fluxum purum sanguinolentum habent, vti aliquando cuidam Regnero Alcmariæ portæ custodi contigit anno 1556. 10. Martii die, hora quinta vesperti, qui tamen dolorem patiebatur absque excoriatione, & purum sanguinem deiciebat, tanquam ex vena rupta prorupisset; cui ex tempore, cum pauper esset, & tormenta ventris sentiret, & tussim validam cum expectoratione humoris crudi experiretur, & circa*

renes calorem haberet, vrina etiam suppressa hoc medicamentum propinaui, quod ex parte lubricaret, doloremque mitigaret, & leuiter urinam prolocaret, materiam diuertendo ad renes: *℞ fol. malua cum toto. viol. ana m. j. rad. petros. feniculi ana ʒj. hyssopi m. ss. glycyrrh. rasa ʒj. ss. prun. damas. num. xv. vuarum passul. ʒj. decoxi in ceruisia communi: qua continuo vtens, præter multorum opinionem a fluxu illo sanguineo statim curatus est, & etiam a mingendi difficultate, miraculi instar. Hyssopum adieci, quia vim extenuandi & calefaciendi haberet, & ideo fluxui sanguinis minus conueniret; tamen cum potum diuturnæ tussi proffit, teste Dioscorid. lib. 3. cap. 26. minus obfuit. Mirabar interim, quod ex tam simplici medicamento sanitati restitutus fuerit. Si fluxus sanguineus purus durasset, venam aperuissem: sed opus non fuit, cruenta illa deiectione nunc sanata. At illa deiectio, quæ fuci nigræ splendenti similis est, cum atræ bilis naturam habeat, est periculosior, vt scholio obser. 14. huius libri diximus, atque aliquos ibidem descriptos mori vidimus. Fuerunt tamen nonnulli a me curati. Sic vxor quoque cuiusdam textoris, pallida facie, Magdalena nomine, q̄ Delphis in platea Rietveldia dicta habitabat, sine febre infra supraque plus quàm triginta sanguinis reiecit vncias, imo prima vice integras matulas: deinde per me curata, post tres annos vel plures eodem modo adeo nigrum sanguinem per aluum reiecit, vt fuliginem repræsentaret; astantes asserabant, plus quam paruum cupam, in qua pauperes serum lactis colligunt reiecis, tam supra quàm infra: solo lotiuo medicamento fuit tunc iterum per me curata. Hæc etiam longo tempore prius habuerat lienem induratum, cum tumore magno totam ventris partem mediam sinistram occupante; qui post sanguinis deiectionem paulo diminuera. Rursus aliquot mensibus interpositis de nouo idem malum passa est, & sanguinem atrum deiecit adeo copiosum, vt in vita similem nunquam viderim: morbum etiam tunc superauit, & optimis remediis per me curata est. Non erat tam adeo mordax hæc atra bilis, sicuti acetum terram abradens, quæ est bilis atra exquisita, de qua meminit Galen. aph. 21. lib. 4. quæ plerumque lethalis existit. Sanguinem vero purum deiecis, vt paulo ante diximus, non adeo malum est; imo sæpe decretorio modo utile fuit. Sic etiam cognata mea Geertrudis Bartholdi anno 1547. Alcmariæ purum sanguinem cum deiceret, & simul menstrua haberet, mulier valde sanguinea, sine intestinorum rasura, cum antea non nihil doloris percepisset, in hypochondrio dextro sanguine peccante, vena basilica brachii dextri incisa, pauca tamen quantitate, egregie profuit. Deinde utebamus iis, quæ sanguinem incrassarent (nam aliquo modo in extractione biliosum videbatur) cum syr. ribes, coto-neorum, & aqua plantaginis; & postea exhibebamus confer. ros. antiquam, cum tria fantalis: aliis probis remediis adhibitis & hæc cõualuit. Quarta species sanguinis est cum ulceratione intesti-norum, de qua postea dicturi sumus. At Neoterici fa-*

ciunt tot & tantas distinctiones fluxuum, inter quos est Gradus, qui tamen referuntur vel ad diarrhoeam, vel ad fluxum hepaticum, quem alii dysenteriam hepaticam appellant, vel ad dysenteriam veram & lienteriam, quibus alii & celiacam affectionem adiungunt, de qua nonnihil quoque diximus, cum de ventriculi malis loqueremur: de quibus breuiter videas interpretem Hollerii, & alios.

OBSERVATIO XXI.

De fluxu hepatico, & dysenteria hepatica, ex debilitate virtutis alteratricis hepatis.

Vir quidam ceruisiarius, qui ceruisiam emtam Delphis, rursus Alemariæ denuo vendendam distribuebat, in platea Dronckenordia a vulgariibus dicta habitans, longa & diuturna dysenteria hepatica, seu fluxu hepatico laborabat: quem empiricus medicus diu male pro vero dysenterico tractauerat, neque eundem curare potuerat, ita ut tandem illum pro deplorato reliquerit, cum tribus mensibus illum frustra curauisset. Ad hunc equidem mense Octobri, anno 1550. accitus fui. Cum animaduertissem, hunc fluxum a facultate alteratrice hepatis infirma fieri, cum deiectiones carniū loturæ similes spectarentur, omnium primo infusum rhab. dedimus, myrob. citrinorū & chebulorum. Postea & hoc decoctum propinauimus: *℞* marrubii, absinthii Romani, flor. rosar. rubear. mentha sicca & rubra ana m. j. sem. sanguinaria, plantag. coriandri prepar. ana ℥ j. myrob. citrinorū ℥ ss. rhab. electi ℥ j. ℞ schœnanth. ℞ ad cichorii, apii, petrosana ℥ ss. calami arom. incisi (aderat enim magna ventriculi imbecillitas, & iecoris temperies non admodum calida) santal. rub. ana ℥ j. coquantur in aqua chalybeata ad ℔ j. addendo syr. myrtini ℥ j. ℞ syr. de mentha, de cichor. cum rhab. ana ℥ ss. misce pro quatuor dosibus. Deinde dedi semel ℥ j. rhab. puluer. in modum pilularum, cum syr. ex ros. siccis. Postmodum imperavi, ut bis in die ex condito sumeret, ad magnitudinem castaneæ: *℞* cons. ros. antiquæ ℥ ij. specier. arom. ros. sine musco ℞ ij. ℞ myrob. citrinor. parum ssatorum, & pulueris. mastice ana ℞ j. cum syr. myrtino, confice ad modum conditi.

Cum fluxus nondum cessaret, & iam ultra quatuor menses eidem adhæssisset, & valde debilitaretur, sequens apozema illi præscriptum est: *℞* marrubii, absinthii Romani, mentha sicca, flor. ros. rub. ana m. j. seminis myr. plantag. ana ℥ j. ℞ cinnamom. electi, santal. rub. calami arom. incisi ana ℥ j. coquantur in vino rubeo styptico, aqua equiseti & melisse ad ℔ ij. adde syr. de mentha, myrtill. cotoneorum ana ℥ j. misc. & sumebat bis in die. Quia vero circa stomachum dolebat, eo tempore ceratum stomachicum apposui, & hepatis regionem inunxi vnguento santalino, & oleo absinthite. Postea cum neque his adhuc fluxus remitteretur, omni mane per tres dies, hunc puluerem dedimus, cum ouo forbili, qui multum iuuabat: *℞* seminis plantagin. nucis muscate, mastice, pulueris cornu cerui vsti ana ℞ ss. cinnamo. select. gran. v. fiat pul. subtilissimus. Sed cū

fluxus in totum non cessaret, myrob. chebul. parum tostos cum rhabar. tosto ad ℞ j. ℞ cum aqua plantag. & syr. ex ros. siccis propinaui: & omni mane capiebat ad magnitudinem castaneæ, ex elect. sequenti: *℞* cons. ros. antiquæ diacydoni sine speciebus ana ℥ ss. nucis muscate, mastice ana ℞ j. trochis. de carabi, de spodio, cum sem. acetose ana ℞ ss. cornu cerui vsti pulueris. pul. flor. ros. rub. corticum granat. balaustrorum ana ℞ ss. coralli rub. gra. iij. serici combusti gran. j. cum syr. myr. mentha ana q. s. fiat electuarium moderate liquidum: ex quibus fluxus cœpit cessare. Sed paulo post denuo cum peridis reuertebatur. Quare dedimus hæc sequentia: *℞* decoct. hordei & ciceris rub. (ut materia ad renes diuerteretur) ℔ j. mellis ros. colati ℥ j. syr. myrtini de cichor. cum rhab. ana ℥ ss. succi ros. depurati ℥ ij. de tribus vicibus. Sed cum postea leuia tormina sentiret, libenter enema inieci: sed nullo modo voluit admittere. Quare omni die sumit cyathū unum ex decocto sequenti: *℞* sem. plantag. sanguinaria, corticum granat. balaustrorum, ros. rub. ana ℞ j. sanguinis draconis ℞ ss. gummi tragacanthi aliquantulum tosti, myrob. citrinor. adustorum, coralli rubei mastice ana ℞ ss. cicerum rub. ℥ ss. contundantur crassiuscule & coquantur in ℔ iij. lactis bubuli, ad consumptionem ℔ j. ℞ exstinguatur post colaturam in eol. de sapinis chalybs ignita; & adde mellis rosacei ℥ ij. & ite um bulliant leui ebullitione; & sumat omni mane. Inunct. hepatis loco cum oleo absinthii, cotoneorum & amygdalarum amararum, sæpissime finito decocto capiebat ex tabulis sequentibus, & fluxu ab imbecillitate hepatis orto, quo per semiannum laborauerat, magno cum nostro honore curatus fuit: *℞* flor. rosar. rub. sem. plantag. parum exsiccati & pulueris. ana ℞ j. trochis. de carabi cum sem. acetose specierum diarod. abd. arom. rosar. ana ℞ ss. dissolutis in aqua decoct. absinth. & mentha. adueto Zaccaro q. s. fiat confectio in tabulis. Dosis ℥ ij. pro vice.

S C H O L I A.

Neoterici hepaticum fluxum modo ad chylolum, modo ad apostema hepatis, modo ad Fluxus hepaticus oppilationem eiusdem, ut aquosos & biliosos, pituitosos vel melancholicos referunt, ut apud Leonellum tum alios videre licet; de quibus antea diximus. Verum proprie loquendo, cum etiam de hepatis affectionibus loqueremur, hepaticos vocamus eos, qui iocinoris imbecillitate laborant, ut ad longum etiam docet Donatus ab Altomari capite proprio, in quibus ipse affectus iocinoris imbecillitas duntaxat est. Namque hos solos proprie iocinorosos seu hepaticos medici nominare consueverunt, quando videlicet citra aliquod manifestum in viscere malum, in propriis actionibus debilitatur, ut & Gal. sentit 5. de loc. aff. & 8. de compos. med. secund. loc. & 3. de caus. symp. quem postea sectati sunt Paulus cap. 46. lib. 3. & Aetius cap. 1. lib. 10. & Alexand. cap. 3. lib. 8. quamuis quidam existiment, eo quod excretionem sint liquide carniū (præsertim cruentarum atq; recenter enetarum) loturæ similes; vel si feci sanguinis similia per alium excrementa deiciantur, ita, ut qui excernitur

excernitur sanguis & nigrior, quam pro natura, & splendens apparuerit, utpote sanguine & nigra bile commixtis; licet iecur quoque affectum coniciendum sit (*ut eodem 5. de loc. affect. liquet*) indicium tamen est ipsius hepatis superflantis sanguinem. Hæc prædicta deiectione cruenta, de qua nunc agimus, a nonnullis etiam dysenteria appellatur, *ut liquet 3. de sympt. causis*, quæ ex iocinoris imbecillitate fit, *ut 4. de articulis*. Quamuis errent, *ut ipse idem inquit 5. de locis affectis*, hunc affectum putantes esse dysenteriam, cum tamen non sit: quamuis Alexander Trallianus ad differentiam veræ dysenteriae, hæc excretionem cruentam appellat *dysenteriam hepaticam*. Sed hic sanguinolentus humor talis consistentiæ excernitur, velut si quis sanguinem cum aqua confudisset, seu velut si quis victimæ recens mactatæ carnes aqua lauisset. Ex quo colore Galenus notat iecur affectum esse, *ut patet 5. de locis affectis*. Quod vero ex eiusdem propriæ facultatis læsionis modo qualitas affectus percipi possit, nulli in dubium venit. Est autem is, symptoma in genere noxæ functionum naturalium, alteratricis scilicet, ac magis speciatim sanguificæ ipsius iocinoris, quæ non ablata est neque deprauata, sed diminuta ac imbecilla. Cuius imbecillitatis causa quævis intemperies esse poterit, ac generari circa contentas in ipso iocinore venas & arterias, iuxta materias in spatiis ipsarum contentas, nec non iuxta propriam ipsius hepatis substantiam, quam Erasistratus *πατίχχουα* Græce appellat, *affusionem* seu *perfusionem*. Latine dixeris, *ut eodem 8. de compos. medic. secundum locos a Galeno scriptum est*: quoniam facultas hæc, quæ sanguifica dicitur, in iocinoris proprio corpore seu propria substantia consistit (*ut 6. de Hippocrat. & Platon. decret. liquet*) Propterea & eadem substantia, seu idem corpus intemperatum reddi oportet, quo affectus hic generationem habeat, non negantes, quod interdum primo, interdum vero secundo ipsum obledi possit, tunicis videlicet vasorum, aut humoribus in eorum cavitatibus contentis siue utrisque, primario affectis.

OBSERVATIO XXII.

De dysenteria hepatica, ex iecoris intemperie calida.

¶ Cum deiectiones carniū recentium loturæ similes conspiciuntur (*teste Alexandro Tralliano lib. 8. cap. 3.*) hic affectus dysenteria hepatica dicitur. Itaque vulgares medici (*inquit*) ubi eiusmodi quippiam conspexerint, nihil solliciti, nec internoscere valentes, unde imbecillitas oritur, statim, quæ ad hepar inscripta sunt medicamenta, adhibent, præsertim quæ robur adlicere & confirmare possunt: extrinsecus quidem cataplasmata, quæ ex *aloe*, *balauftio*, *malicor*, *myrrha* & *œnanthe* constant: Intus autem rheum barbaricum, xylo-maces dictum, theriaca, atque alia quædam antidota. Nonnulli autem ipsorum ventrem extrinsecus, spissamentis, & pastillis curare non dubitant; maxime offendentes. Nam ex eiusmodi magis corrumpunt viscus, magisque infirmum & intemperatum reddunt. Verum non ita con-

uenit, sed prius inquirendum ac inuestigandum est, quæ intemperies causæ sit effectrix. Atque hac diligenter animaduersa, statim victus institui aduersus affectum debet, qui ab internotione suggeritur. Quippe iecur non ex calida solum intemperie, sed etiam ex frigida & humida qualitate, item ex utraque simul infirmum redditur. Subinde vero ob prauam quoque materiam ingrauescens, & propter obstructionem læditur. Interdum etiam inflammatio una cum frigida intemperie miscetur, mixtusque affectus & varius efficitur: *ut euenit cuidam rustico adolescenti Cornelio Gerardo 27. annum plus minus agentis, in pago Diui Martini, tribus miliaribus ab Alcmaria distante, ex dysenteria hepatica laboranti*. Erat autem temperatura sanguineæ, ut antea apparebat ex eius colore viuido, licet facie nunc plurimum immutata. Hic cum fluxu hepatico satis diuturno laborasset, empiricum & circumforaneum ad se vocauit, qui neque affectum intelligens, nec causam mali inuestigans, statim huic dedit sine ratione vehementer constringentia medicamenta; unde febris vehementiori oborta, pessime habuit, subinde fluxu sanguinolento instar loturæ carnis redeunte, simul etiam vermes eiiciebat, ita ut tormina quædam ob vellicationes vermium experiretur. & non ratione ipsius fluxus, qui causam mixtam habebat, nempe calidam magna ex parte, cum humoribus putridis, subinde chylosis, aliquid crassitiei aliquando habentibus, modo rursus parum per biliosis licet cruentis fere semper. Adhuc tandem accitus anno 1551. mense Maio, ita eum tribus mensibus gubernauit, ut Dei nutu sanus euaserit. Primo cum ad eum vocatus essem, hoc decoctum propinaui: *℞. radicis graminis* (propter vermes, quos subinde deiiciebat) *radicis cichorii, dentis leonis* (ob febrem) *ana ℥j. endiuia, cucurbita, agrimonia, absinthii Romani, herba hepatica seu lichenis ana m. j. cornu cerui vsti. ℥ij. myrobal. citrinor. chebul. ana ℥j. ℥. hordei mundati* (ob febrem & detersionem) *p. j. cicerum, rubrorum* (ut materia deduceretur ad renes) *℥j. ℥. coquantur in duabus partibus aquæ absinthii, & una parte aquæ endiuia, pro ℔ j. post colaturam addde syr. de cichor.* Nicolai cum rhab (valet præcipue in alterando materiam venenosam, & maxime in febre quasi pestilenti cum vermibus, corroborando, & materiam per urinam & secessum educendo) *℥j. ℥. syr. ros. ex rossis siccis* (ad maiorem roborationem & refrigerationem hepatis) *℥j. omni mane sumebat cyathum unum, & quotiescunque quaterque, deiiciebat chylosa & sanguinolenta*. Sed ex potione febris minui coepit ea adhuc semel reiterata. Interea pro siti, tum febre, sæpe capiebat cochlear unum ex mixtura sequenti: *℞. syr. de limonibus, acetos. simplicis* (faciunt enim ad vermes, sitim & febrem) *syr. de succo acetosa, cotoneorum & syr. de mentha* (pro fluxu compe scendo) *ana ℥j.* Subinde quoque sumebat ad eandem intentionem & roborationem, *zacccharum rosaceum, perlatum, & diarrhodon, & triasantala, in tabulis vel rotulis confecta*. Hepatis regionem inuixi cum oleis rosaceis, cotoneor.

& myrteo. paucō oleo abſinthii & amygd. amar. adiecto Sed cum apud illum agerem per quatuor plureſue dies & tuſſiculam etiam experiretur, pe-
 ctus in unximus vnguento pectorali. Et quia capi-
 te dolebat cum inſomneitate, tempora & fron-
 tem ſub noctem inungebamus vng. populeo re-
 centi. non veteri: nam vetus potius cal. facit & ſo-
 mnū non inducit: dedimusque lac amygdala-
 rum, ex amygdalis dulcibus, paucis amaris adie-
 ctis: modo ſine amaris paratum adhibuimus, cum
 aqua furfuris cōcinnatum: ſubinde etiam ad ma-
 iorem adſtrictionem chalybe exſtinctum, zaccha-
 ro ad dulcedinem iniecto. Sed & hoc iuleb. ebi-
 bit ad febrem & fluxum: *¶* *Endivia cum toto ci-
 chorea cum toto ana m. j. acetosa, portulaca, caſſia a-
 nap. j. abſinthii Romani, plantag. ana m. j. ligni ſan-
 tal. cirini pul. ʒ j. coquantur in aqua pluma pro lb. j. colat. adde ſyr. acetosi ſimplicis, de mentha ex roſ. ſiccis ana ʒ j. miſce, & febris omnino ſedata eſt; flu-
 xu quoque diminuto.* Interea hoc epithema pro
 hepate deſcriptum eſt: *¶* *End. cichorea ana m. j. caſ-
 ſia abſinthii communis & Romani ana m. ʒ. flor. roſ. rub. p. j. ligni ſantal. rub. ʒ j. ʒ. ſpodii ʒ j. coquan-
 tur in aqua comuni pro lb. j. ʒ. adde aceti optimi ro-
 ſacei ʒ j. & iterum bulliant leuiter, & colentur; & fiat epithema pro hepate, ſtomacho ieiuno per qua-
 tuor plureſue dies.* Locus hepatis bis in die hoc vn-
 guento inungebatur: *¶* *ungenti ſantalini ʒ ʒ. olei coton. abſinth. ana ʒ j. miſce.* Huius ſequentis pul-
 dabatur primo ʒ ʒ. deinde ʒ j. cum uno ſorbili; quo
 fluxus conſtrictus eſt & ſimul vermes eiecit. *¶* *ſeminiſ plantag. ʒ j. ʒ. trochiſ. de ſpodio, cum ſeminiſ acetosa, gummi tragac. torrefacti ʒ j. ſeminiſ portu-
 laca, acetosa ana ʒ j. ſeminiſ end. ʒ j. ʒ. caſſia ʒ ʒ. flor. roſ. rub. ʒ j. miſc. fiat pul. ſubtiliſſimus.* Qui-
 bus remediis ſanitati ſatis reſtitutus, me reliquit,
 ac diſceſſi. Ceterum cum ad tempus vtcunque va-
 leret, a diſceſſu meo, poſtea in tormina ventris in-
 cidit; vtrum ex vermib. vel fluxu ignorabat. Cal-
 ceolarius, qui calceos detritos reſiciebat, domi
 eius tunc forte agens, impoſtor illi promiſit ſani-
 tatem: ſed ſibi deeſſe oleum (*quod nardinum ap-
 pellabat*) quod ex Zelandia adferret, illi perſuaſit;
 deinde aliquot diebus in alio pago latitans, ad æ-
 grum reuerſus, oleum attulit: pro quo impoſtori,
 ruſticus alioqui diues, ſex daleros perſoluit, & ſy-
 cophanta abeunte, oleum ſumſit; ſed adeo male
 habuit, vt ilico ſe animam agere exiſtimaret: &
 mox non ſolum in dolorem ac tormina ventris
 incidit, verum etiam in fluxum cruentum multo
 maligniorem, quam antea, licet per periodos eun-
 dem excruciat, viribus indies decreſcentibus.
 Quamobrem me tandem ruruſ reuocauit miſer
 ruſticus, tandem edoctus, quam inepte eiſmodi
 calceolario fidem habuerit, cum prius empiricū
 ad ſe vocauiffet, & tamen a me iam iam reſtitutus
 fuiſſet. Eum nunc denuo accedens, reperi ho-
 minem plane viribus deſtitutum. Ruruſ ſequent
 decoctum præſcribo, prius abſterſiuo ex decocto
 hordei communis cum zaccharo deſcripto, vt in-
 teſtina abluerentur ab oleo etiam calido, quod a

calceolario acceperat: *¶* *cichorea cum toto, endi-
 uia cum toto, dentiſ leonis cum rad. acetosa ana m. j. agrimonia, abſinthii Romani, mentha rubra beo-
 nica (quia aderat dolor capitis) borag. bugloſſa a-
 na m. ʒ. florū roſ. rub. florū anethi (propter do-
 lorem) anap. j. rad. glycyrr. ſœnicul. ana ʒ ʒ. ſangu-
 naria virid. plantag. centumnodii ana m. ʒ. ſeminiſ
 portul. ʒ j. ʒ. ſeminiſ hyoſcyami albi ʒ j. ſeminiſ pap.
 albi ʒ j. ſeminiſ coriand. præpar. ʒ j. ſeminiſ end. ſœ-
 nicul. ana ʒ ʒ. myrobal. citrinorum, torrefactorum
 ʒ j. hordei torrefacti p. j. vuarum paſſul. cum arill. ʒ.
 ʒ. coquantur in aqua comuni pro lb. j. ʒ. dulcor-
 tur cum zaccharo, & arom. cum ʒ j. ſpec. diarrhod.
 abb. & trochiſ. de ſpodio cum ſemine acetos. ʒ ʒ. tro-
 chiſ. de rhab. & trochiſ. diarrhod. anagr. ʒ j. clarifi-
 cetur & in eo chalybs ignita ſepius exſtinguatur. Su-
 mebat bis in die cyathum paruum. De die in diē
 tormina eo minuebantur, & dolor & febris, quæ
 quidem omnia accidentia inducta erant ab oleo
 aſſumto ipſius præſtigiatoris, qui nunc ablata pe-
 cunia auſugerat, vt hoc genus impoſtorum ſolet.
 Pro capitis dolore & inſomneitate etiā inductis
 ab oleo illius nebulonis, tempora cōtinuo inun-
 ximus bis aut ter in die & ſub noctem oleo papa-
 uerino: quibus ſubſidiis dolor ſedatus eſt; etiam
 ſomno ſuauiore accedente. Libenter & hoc tem-
 pore enema inieciſſem; ſed nullo modo voluit ad-
 mittere. Quare & hoc decoctum ſequent præ-
 ſcripſi: *¶* *rad. ſymphyti ſeu conſolida maioris, rad.
 ſœnicul. ana ʒ ʒ. agrimonia, abſinthii Romani, men-
 tha rub. endivia, cichorea, cum toto, centumnodii,
 ſanguinaria portulaca (quia ruruſ vermes deie-
 cerat & languinem loturæ carnis ſimilem) ana m.
 j. ſchœnanthi ʒ j. calami arom. inc. ʒ j. caput pap.
 albi cum corticibus & ſeminibus ana num. i. j. ſe-
 miniſ hyoſcyami ʒ j. ſeminiſ portulaca, bacour. myr-
 ti ana ʒ j. myrobal. chebul. citr. nor. torrefactorum
 ana ʒ j. hordei paruum, torr. facti p. j. gummi tragac.
 torrefacti ʒ j. ʒ. hepatis lupi præparati & modico
 torrefacti ʒ j. omnia coquantur in aqua chalybeata
 ſecundum ordinem ad lb. j. ʒ. arom. col. cum ʒ j. ſpe-
 cierum, diarrhod. abb. trochiſ. de ſpodio, cum ſemine
 acetosa ʒ ʒ. trochiſ. de terra ſigillata. derhabar. ſpec.
 dialacca anagr. v. ſpecier. trionſant. ʒ ʒ. zacch. dulco-
 retur, ſumebat bis in die; & paulatim ceſſarunt acci-
 dentia, & fluxus ac febris diminuebantur. Et lo-
 cus dolens ac venter hoc epithemate fouebatur,
 ad roborationem & reſtrictionem: *¶* *cupular.
 glandium pſidia, balauſtiorum, ana ʒ j. roſ. rub. p. j.
 myrobal. ſumach ana ʒ j. florū chamomill. melilo-
 ti, anethi ana p. j. ʒ. coquantur in vino rub. ſtyptico,
 & aqua ferrata q. ſ. pro lb. j. ʒ. quo dolor euauit, &
 fluxus ceſſare cœpit; hoc decocto adhuc ſumto:
 ¶* *ſucci plantaginis, equiſeti ana ʒ iij. vini rub. ſty-
 pti ʒ viij. ebulliant ad conſumptionem medietatis,
 pauco adiecto zaccharo roſaceo; & ſumſit dua-
 bus vicibus. Et a fluxu liberatus eſt. Verum quo-
 niam ex crebriore ſeceſſu plurimū in ano tenefmi
 inſtar (nam propter oleū a nebulone ſumtū hic fluxus
 hepaticus aliquid bilis & acrimonia cōtraxerat) do-
 lebat in longanone, ſeuū arietinū miſcuimus cum
 ſemine***

sem pap. alb. suppositorii instar leuiter ano impo-
nentes & cessauit eo dolor, ac pruritus ani a fluxu
bilioso: & hepatico inductus, ob oleum calidum
male per os sumtum. Et vt venter magis confir-
maretur, & ad roborationem, ultimo bis aut ter in
die ex hac mixtura capiebat: *℞ confros. antiq. 3 j.*
diacydonii sine speciebus. 3 j. syr. menthacei. cotoneor. ana
q. s. fiat mixtura mediocriter solida. Vltimo conueni-
enti præscripto (de quo in scholio agemus) & istis
prædiis supradictis, Dei nutu a fluxu diuturno
hepatico, valde periculoso, magno cum nostro
honore perfecte sanitatem recuperauit.

S C H O L I A.

9 **R**Ecte Alexander Trallianus admonuit, vt dy-
senteriam hepaticam non curaremus, ante eius
causæ cognitionem: & ideo cum medicus singula
inter noscere debeat, quomodo ex calida intem-
perie iecorario affectu laborantes internoscere
his indiciis liceat, docet. *Eger enim valde sitit, bi-*
lemq. vomit, saepe vero & aruginosa, & deiectiones e-
iusmodi apparent: linguam habet scabram, corpus sic-
cum & gracilius videtur, tanquam iecore collique-
scente, & in cruentas sanies contabescente: temporis au-
tem spatium etiam ex ipsa substantia tandem particula
longe fœdissima deferri cernuntur. His igitur notis ca-
lida intemperie laborantes animaduertere conuenit.
Ceterum ex temperamento, & prægresso vltu, reli-
quum licet firmiter cognitioni gratia capere, atque
hinc internoscere. Nam temperamento calidi sunt &
tenuis habitus, pilosque densos habent, curis dediti, &
animo iracundi. Qui vero ex frigida iecorioris intem-
perie laborant, neque sitiunt vehementer, neque bilem
vomunt, neque amaritudinem in ore, sed potius aco-
rem sentiunt: Item deiectiones alui neque biliosæ, neq;
fœdi admodum odoris, neque colliuationis aliqua,
sed veluti sanguinem crassioris & nigro similem con-
tinent. Huiusmodi vultus non collabatur, & reli-
quum corpus, temperamentumque ad frigidius magis
inclinare videtur. A hæc præcedens vltus talis, si
perspicuas, deprehenditur: item vita otiosior, balnea co-
piosiora & intempestiua, eaque post cibum. Ex his quæ
aliis consimilibus indiciis frigida intemperiem, ie-
coris notare ac internoscere poteris. Sicca iecoris in-
temperies corpus siccus testatur & tenuis, sitimque
magis conciliat: & deiectiones alui pauca, & crassiores
apparent. A humida iecoris intemperies, neque sitim
efficit, neque siccitatem, sed magis etiam lingua humi-
ditatem. Nam nullasius urget, & virtus totumque
corpus diu non collabatur: postea autem deiectiones
ventris plurimæ apparent. Scire porro licet quod ma-
teriales qualitates, si cum effectricibus misceantur,
hæc indicia demonstrent. Hactenus Alexander
Trallianus. At noster hic ager non ita intem-
perie calida afficiebatur, cum nec corpus siccum
nec gracile haberet, sed boni habitus esset, & vt
ab astantibus intelligere potui, primo quanquam
cruenta aquosa deiceret, non ita sitiebat, neque
febricitabat; sed postquam ille primus empiricus
illi dederat fortia adstringentia, febris cum sitis &
verumium deiectio oborta sunt, ventre post v-

num aut alterum diem restricto, deinde rursus
cruenta illa deiectione iterum subsequente a-
quosa, subinde etiam limosa, ita vt nunc hepar
maiore calore inficeretur. Et quia vermes deicie-
bat, quod rarius contingit in eiusmodi fluxu, si-
gnum fuit magnæ putrefactionis, & pessima ac-
cidentia adhuc magis subsequuta, facta quasi re-
cidiua ex oleo illo calido ac calceolario exhibito.
Ita cum nos primo vocati fuimus, non puris fri-
gidis vsi sumus; quin etiam adieciimus quædam a-
peritiua, cum hepar, & præcipue venæ mesaraicæ
non carerent obstructione: attamen non fortiter
calidis utebamur, sed iis subinde adiectis, quæ
non minus ad febrem quam vermes facerent; &
quia debilitabatur ex longiore fluxu, ita vt colli-
quatio quoque fieret, adieciimus astringentia: &
postea, post acceptum oleum illud calidum, cum
diutius perduraret fluxus, omnino in fine magis
astringentibus coacti fuimus vti; tamen prius
adiectis iis, quæ ad temperiem calidam iecoris fa-
cerent, & leuiter aperirent obstructiones, & si-
mul hepar roborarent. Viribus enim postea defi-
cientibus, & colliuatione totius corporis acce-
dente, constringentibus vtentes a grauissimo
morbo eum liberaueramus. Nam huius affectio-
nis curatio haudquaquam despicienda est, quo-
nia nonnulli propter curantium inscitiam (vt *Prognosticis*
Galenus inquit 4. de articulis) perierunt. Quomo-
do autem causæ fuerint medici vt agri moreren-
tur, ibidem declarauit. In calida item intemperie,
si iocinoris imbecillitas fiat, quamprimum rite
curari debet. Nam temporis spatium colliquatio-
nes ex ea fiunt, primum humorum, deinde etiam
carnis ipsius hepatis; quin imo totum corpus ab-
sumitur, vt ex *Galeno & Pauloliquet*. Nos sæpe
vidimus, quod antequam morerentur, non so-
lum cruenta aquosa deicerent, verum etiam qua-
si substantiam ipsius hepatis. Nec minus si ex fri-
gida intemperie ortum duxerit, parui facienda
erit eius curatio: nam tractu temporis corrupto
in viscere sanguine, febris superuenire solet; quæ
tamen ab imperitis medicis vsque adeo negligi-
tur, vt laborantem interdum nequaquam febrici-
rare putent. Quin imo si vltro ea intemperies
frigida augeatur, permutabitur ad aquam inter-
cutem; quemadmodum idem *Galenus. 5. de locis af-*
fectis scriptum reliquit; quod & nos sæpe obserua-
uimus in quotidiana praxi. Ceterum scopus in
eiusmodi affectionibus communis ac primus est,
iuxta intemperiei contrarietatem, hoc est, vt in-
temperiem ad contrarium deducamus: pecu-
liaris autem unicuique per cuiusque contrarieta-
tem; nam calidam dispositionem semper refrige-
rare oportet, frigidam vero calefacere; similiter
humidam exsiccare, & siccam humectare, *Gale-*
no & Aetio testibus. Ceterum pro eo scopo
perficiendo, indicatio, quæ a parte affecta sumi-
tur, adiicienda est, cum princeps membrum sit
iecur, vniuerso corpori dispendens alimenti ma-
teriam. Quia de re omnibus hepaticis remediis
(pro quacunque intemperie curanda) tum iis, quæ

Curatio in-
temperies
calida.

14

Hepaticis
dysentericis
vua utilis-
sima.

Multi hepa-
ticis ex olere
feridis cu-
rati.

15

16

per os sumuntur, tum quæ foris secus imponun-
tur, aliquid ex astringentibus admiscere oportet,
quo firmitas visceris conseruetur. Id quod scrip-
tum reliquit *Galenus 13. method. quem postea secta-
ri sunt Paulus & Aetius*. Sic nuper ex calida in-
temperie hepatis laboranti hoc fluxu, commode
dedimus statim ab initio decoctum scariolæ, end.
cichorii, lichenis seu hepaticæ: habet enim lichen
seu hepatica abstergentem ac modice refrigeran-
tem facultatem; vtramque vero exsiccantem.
Dedi illud decoctum cum syrupo confecto ex
succo cichorii, seu hortulanæ, quam scariolam
vocant. Commendatur ab ipso Donato, vti &
oxyzaccharum, syr. ex succo aut infus. ros. & morsuli
ex triasantal. ℥ j. vel potius ℥ j. diarrhod. abb. ℥ j.
sem. cichorii ℥ ss. vuarum passarum ℥ iij sem. melo-
norum ℥ iij sacchari dissoluti in aqua ros. cichorii q. s.
formetur morsuli; quorum quilibet sit ponde-
ri ℥ j. exhibeanturque cum pauca aqua, in qua
folia & radices cichorii vel hortulanæ endiuivæ
fuerint decoctæ. Vuam passam non tantum in
medicamentis probamus, sed etiam in bellariis.
Trallianus plurimum probat, præsertim quæ ab
illo vocantur *Larissena*. Nihil enim hepaticis a-
deo opitulatur, ac vuam passam, quæ omnia bona
continet; vt non putrescat, vt corroboret, vt præ-
ter boni medicamenti facultatem, etiam nutrire
possit, & quodcunque prauum vitiosumque in-
uenerit, in benignum conuertat. Commendatur
etiam a Galeno 8. *de compos. medic. secundum lo-
cos*; licet ipsa contemtilis videri possit, ob fa-
miliarem eius usum. Seridem seu intybum vel ci-
chorium recte in decocto administrauimus, cum
hoc adeo usus olere ipse idem Alexander Trallia-
nus; multos nouerit ab hepatica dysenteria eua-
sisse. Neque semel tantum, sed etiam sæpe ipsum
comedere eodem die conuenit, & mane & vespè-
ritum ex decocto, tum ex condimento. Corian-
dum autem ipsi inter coquendum miscere o-
portet. Quod si quædam obstructionis suspicio
in gibba aut caua parte iecoris fuerit, tunc etiam
apium simul incoquere præstat. Nam præter-
quam quod suaue est & gratum, concoquitur et-
iam, & in iecur magis distribuitur. Propterea, vt
idem addit, hic in totum remedia deligenda sunt,
quæ præter quam quod refrigerant, & abster-
gunt, etiam aperire iecoris meatus, & corroborare
præterea ipsum possunt, vt alimentum celeri-
ter per totum corpus distribuatur. Itaque cre-
mor ptisanæ (*eodem teste*) hic est idoneus, ac pa-
nis, cui adiecta sit inter coquendum radix apii,
intybus, cichorium, sonchus, & his adhuc magis
troxymum. Quoniam vero in prædictis oleribus
vis amara, & aperiendi obstructos iocinoris mea-
tus existit, vti his oportet. Nam hæc facultas et-
iam calidas iecoris intemperies admodum iuuat,
& frigidas non offendit. Non enim intensam
habet frigiditatem, sed mitem, & quæ medium
iam attingat, vt quis citra noxam ea, & cum fidu-
cia uti possit. Omnia namque recipit, quorum
maxime usus est iis, qui imbecillum adeo iecur
habent, vt neque contineat alimentum, neque

exacte inalteret, vel etiam in corpus distribuatur.
Ptisanæ itaque cremor idoneus est; & subinde
grana ipsius, & olera, maxime in rybus, & his ad-
huc magis troxyma, etiam per se, & cum gallina,
aut perdice, aut ventriculo anseris dari possunt,
aut cum carne quadam (*suauius gratia*) simul
incoqui. Hæc olera commemorata etiam cruda
ipse offert, vt usus morbi postulat. Et lactucam
cum apii & betæ radice percoctam exhibet, aut
eandem per se, licet commodius sit, vt acetum
inter coquendum recipiat: vel reliqua dicta olera
cum iure gallinarum seu pullorum decocta.
Quamuis multa iura, præsertim pinguia, ob si-
xum vitanda sunt, & quæ habent cuminum aut
oryzam, aut aliud condimentum, impediens co-
ctionem & distributionem. Sed poterunt gustare
& carnes pullorum gallinarum, perdicum, pha-
sianorum, & ex syluestribus attagenas, & carnes
turturum aut turdorum, & auium paruarum, a-
nates fugiendo, & omnia in paludibus degentia,
quæque siccant, & melancholicam carnem obti-
nent. Ex piscibus marinis laxatiles in puro mari
degentes. Vbi non admodum magna est intem-
peries, & biliosa, humorque citra aliquam ob-
structionem magnam aut inflammationem vi-
tiosus, ibi cibos offerre conuenit, qui ægre confi-
ciantur, & validos. Ceterum dare his quoque o-
portet, si tempus permiserit, fructus pomaceos,
peponum dulcium carnem, admodum dulcia
mala, & cotonea bene matura; eaque assa probe,
aut cocta cum gallina. Ne autem mala dum as-
santur, adurantur, sed diutius ad assationem suf-
ficient, durentque, fermentum extrinsecus vn-
dique ipsis obducetur; atque sic ipsa furno de-
mittentur. Malorum punicorum grana, & ante
cibum modicum, & cum pane dare conuenit.
Nam iecur admodum imbecille, & stomachum
collapsum firmare possunt, etiam si æger maxima
fati conficiatur. Tunc quoque vuam dura car-
ne præditam, & citrium molle ipsis porrigere
oportet: Item cerasia, pyra vel mespila confe-
runt, semel aut bis exhibita. Nam continuus
omnium astringentium usus siccare & ventrem
inferiorem obstruere, cohibereque potest, ne
stercus facile efferatur. Sorba & castaneæ tuto
sumuntur: nam boni succi sunt, & non cito a
calidis intemperiebus corrumpuntur. At nuces,
pistacia, & nuces pineas eodem auctore vitare
oportet, vt inimica. Præter iam dicta aer hic
ad frigidum vergere debet, & somnus sit mo-
deratus atque nocturnus, & quies quærenda,
animique perturbationes cauendæ, ira præser-
tim, curæ ac sollicitudines. Pro potu vinum cir-
cumcidatur omnino, nisi alteram ob causam
(*nempe stomachi imbecillitatem*) illud re-
quirant; tunc enim tenue & dilutum aliquod
exhibeatur. Verum pro eo vitatur succo ma-
lorum punicorum, aut aqua hordei, seu aqua,
in qua cichorium fuerit decoctum, aut feris, siue
sonchus; adiectis coriandri seminibus præpara-
tis, Asclepiadis auctoritate. *Galenus 8. de compos.
medic. secundum locos*, nonnulla medicamenta
pro huius

17

18

Medicamē-
ta quæ huic
malo pro-
pria.

19

Topica.

pro huius affectionis curatione approbavit: inter quæ primum est, si succi cichorii cyathum vnum cum aquæ calidæ cyathis tribus propines, mellis Attrici cochleario addito: quod medicamentum Asclepiades Antonii Musæ esse dicebat: aut picridis recentis seu seridis recentis succi cyathum vnum, cum aqua mulsâ. Actius & præter seridis succum etiam intybi & senecionis, seu perdicii suecum aut decoctum laudauit. Quin etiam philonis antidotus semel tantum exhibita omnem calidam intemperiem mirabiliter sanat, etiam Galeno teste loco citato. Nec mirum, si semel tantum exhiberi debeat quoniam (ut idemmet Galenus dicit) nullum hepaticum pharmacum vehementer refrigerans esse debet. Nos autem ægrotanti ex intemperie calida, præter syr. ex succo cichorii & morsulos dictos, epithemata extrinsecus adhibemus. Quale hoc est: *℞ succi cichorii & endiuie hortulanae & lactuca seu solani ana ℥iij. aquæ ros. rub. & cichorii seu endiuie ana ℥j. santal. corall. rub. ana ℥iij. aceti albi ℥ij. misceantur, & fiant epithemata, æstate subfrigida, hyeme vero actu calida.* Et inungatur regio hepatis hoc vel simili vnguento: *℞ olei ros. de absinthio, myrtini & de papau. seu nymphae ana ℥j. santal. omnium & corall. rub. ana ℥j. succi cichorii & lactuca ana ℥ij. aceti parum & cera q. s. fiat vnguentum.* Insuper ex foliis plantag. & cichorii ac malo cotoneo in aqua & oleo rosaceo decoctis, ac contusis, adiecta hordeacea farina & exiguo croco, cum pauco aceto, fiat cataplasma; & vtere. hisq; remediis, si statim adhiberent me in consilium, vel similibus, dysenteriam hepaticam ex calida hepatis intemperie sæpe probe curauimus. Plura vide apud Trallianum.

OBSERVATIO XXIII.

De dysenteria hepatica ex intemperie frigida.

Honestus quidam ciuis ex frigida iocinoris intemperie excretiones nec multas nec assiduas habebat, sed tamen diu perdurantes, minus graueolentes, speciem putrefacti sanguinis referentes, velut limus sanguinis crassi apparens. Cui cum humor pituitosus sanguini permixtus tandem in viscere putresceret seu corrumpetur, atque in ipso iocinore retineretur, aut venis circa ipsum ac f.bris superueniret, syrupum absinthii, ex succo fumarie & de byzantiis ac eupatorio, cum decocto agrimonie, absinthii, marrubii exhibui, ipsumque humorem purgavi cum medicamentis non solum pituitam educantibus, sed & ipsum viscus roborantibus; nempe cum myrobal. chebul. rhabar. exiguo agarico adiecto. Prodest & antidotum calefacientium specierum, ut aromaticum ros. diacinnamomum, diarrhod. abb. & compos. Galeni ex malorum, cotoneorum, succo, in fine 6. lib. de sanitate tuenda descripta, vnice conferens ventriculo imbecillo & iecori inualido. Extrinsecus oleo chamæmelino, nardino, de absinthio hepar inungebam. Dedi quoque & lupini iecoris diligenter triti ℥j. cum succo cichorii, cum obscure febricitaret. Valet enim a proprietate, secundum

Galenum, Aetium & Paulum. Quod ad victum attinet, is ad calidum vergebat, cibique boni & facili nutrimenti, & panis cum vino, iuxta Alexandrum & Paulum, offerendi, & ex olerib. brassica bis terve cocta ex iure gallinarum, pullorum, perdicum, phasianorum, starnarum, turdorum & aliarum paruarum auium; aut carnes earundem gustandæ, & anserum ventriculi, iuxta Alexandrum, serpilli, satureia, hyssopo, sceniculo, oreofelino in iure carniū decoctis. Inter pisces commendant nullum assum, & carnes assas, si alios cibos fastidiunt, vel iura cinnamomo aut garyophyllis condita, & castaneas mediocriter assas, modo non crebro comederet; maxime vero vuas passas; minime pistacia aut amygdalas, cum facile corrumpantur & oleosa sint, & promte in bilem mutantur; & recrementum asperius reddant, ut hinc venter magis crebrisq; irritetur, ut ex eodem Tralliano lib. 8. cap. 4. liquet. Pro potu vinum concedebam tenue & odoriferum, quod & nutrit, concoquit, roborat, & putrefactioni resistit: Quibus remediis hic optime se habuit.

SCHOLIA.

Medicamenta calefacientia hic adhibenda, magis minusve, pro frigiditatis obtinentis magnitudine accommodare oportet, ut idē inquit Trallia. Asclepiades dabat filicis vel anethi succi cyathum vnum, cum aquæ mulsæ cyathis tribus, alii, ut Galenus, antidotum cyphoides. Vide eius descriptionem apud Donatum cap. proprio; & aliam apud Trallianum. Habes & efficacissimum medicamentum, quo vtitur Donatus: habet seminis anisi, sceniculi, apii, plantag. ana gran. iij. costi glycyrrhizæ ana ℥j. cassie lignæ, cinnamomi virisq; ℥ss. vuar. passar. ℥iij. croci, spicæ, calami arom. & schœnanthi ana gran. ij. B. cornu cerui vsti, & amygd. amar. ana ℥j. seminis melonum ℥iij. sacchari dissoluti in aqua ros. q. s. formentur pastilli, quorum vnū vice qualibet assumat, cum exiguo vino albo odorifero. Extrinsecus fiant vnguenta, cerata, epithemata, in hunc vel similem modum: *℞ succi marrubii, absinthii, fumarie, agrimonie ana ℥j. asari, spicæ nardi & celticæ, mastichis chie. cinnamomi, tunci odorati, lignis aloes maceris ana ℥ss. olei ros. nardini, chamæmelini, absinthii ana ℥ss. cera q. s. & aceti parum, fiat vng.* Fotus componunt ex oleo anethino, sampsuch adiecto decocto rad. cappari, filicis, cichorii, absinthii, florum chamomill. fol. plantag. chamæpit. seminis danci, anisi & similibus, cum succis eupator. marrubii, absque oleis, adiecto aceti modico. Post fotum Trallianus cataplasma imponit ex ruta contusa, melanthio, cynosino, & aristolochia longa, vel cum horum puluere, vino, melle & oleo capparino. Ceratum quoque habes apud Donatum. Reliqua vide apud Aetium, Galenum & alios auctores supradictos. Vnum addam, quod mirabile est, iuxta Trallianum, ad eos, quos imbecillitas cum obstructione infestat: Brassicæ decoctum & rhus Syriacum tenuiter leuigatum, mixtumque potui datum.

KK 4

OBSERVATIO XXIII.

De fluxu hepatico bilioso diuturno, cum variis accidentibus & dolore mingendi, quasi abscessu succedente, & fluxu sanguinolento modo quasi puro, modo bilioso, modo nigro.

1 Simon Harekonis, qui cognatam meam Corneliam Regneri Almaria in vxorem duxerat, vir admodum parvæ staturæ, vtcunque biliosus, cum longo tempore fluxu hepatico bilioso cum hepatis obstructione & hypochondrii dextri dolore laborasset, torminibus ventris subinde accidentibus, tum dolore mingendi, anno 1557 sexto Augusti die me vocavit. Hic ante meum ingressum per integrum mensem variis usus fuerat remediis, & tonforum & aliorum. Cum hic graviter decumberet, hoc apozema præscripsimus: *℥ corticum rad. dentis leonis, cichor. (ob bilem & apertionem) rad. petros. fœniculi (vt commodius lotiū redderet, & materia ad renes diuerteretur) ana ℥ ℥ parietaria, tapsi barbat. (ob fluxum & dolorem) chares. folii (vt vrina euocaretur) pentaphylloris ana m. j. ros. rub. mentha rub. & florum chamomille (ob ventris dolorem) ana p. j. seminis lini tost. ℥ j. seminis plantag. ℥ ℥ granorum alba kengi, cum suis vesiculis num. vii. hordei non excorticati m. ℥. myrobal. citrinorum, ℥ ℥. myrob. chebulorum, indorum, rhab. selecti ana ℥ j. fiat omnium decoctio in aqua pluvia, ad ℔ j. colatura adde syr. cotoneorum, acetos. simplicis, syr. ros. myrtill. ana ℥ ℥. misce pro iij. dosibus. Hoc decocto dolor ventris vtcunq; sedatus est, & minus postea tormina habuit, & fluxus vtcunque fuit repressus, qui modo sanguinolentus, modo biliosus, modo cum pauca pituita mixtus videbatur; & fluxus fuit vtcunq; repressus. At post tres dies rursus dolor & difficultas mingendi increbueret: sed istis decoctis præscriptis conualuit; & a dolore ventris & mingendi, simul & fluxu liberatus est; *℥ endivia, cichoris, hepatica seu lichenis, agrimonie, cassia, capill. ven. ana m. ℥. cort. rad. fœniculi (vt melius mingeret & materia diuerteretur ad renes) ℥ ℥ seminis fœniculi, anisi ana ℥ j. ℥. coquantur in aqua communi pro ℥ vii. colatura addendo syr. de cichor. Nicoli, cum rhab. ℥ j. syr. capill. ven. ℥ ℥. misce pro iij. dosibus. deinde ℥ florum ros. rub. foliorum tapsi barbat. ana m. ℥. seminis lini tost. ℥ ℥ myrobal. citrinorum. modice combust. ℥ j. fiat ebullitio cum reliquis decocti ultimo præscripti: deinde manibus fricetur: colatura ℥ iij. ℥. adde syr. cotoneorum, mellis ros. ana ℥ ℥. misce: & coepit vnica vice, omnibus accidentibus cessantibus, & fluxu; adeo vt ipse non amplius redirem. Verum post septimanam, vtrum quia sese æri nimium cito commiserat, nescio, in idē malum incidit, me tunc vna cum vxore in Brabantiam profecto. Accitus alius medicus iunior, qui cum multa remedia tam intus, quam extra adhibuisset, etiam fotum pro hepate, & loco dolente; parum aut nihil profecit; ac statim ægrum prodeplorato habens, amicis dixit tum astantibus, illum moriturum, quanquam morbo inducias dāte, & fluxu perdurante, tumore exterius oborto sub regione hepatis, sed valde exiguo, versus umbilicum paulo inferius tendente. Varia medicus**

adhibet medicamenta, etiam chirurgus accito. Cū cum per duas septimanas ita tractassent, me ex Brabantia reuersum æger denuo vocavit, cum nihil profecissent, ambo bus tunc relictis. Ceterum cum ægrum nunc viribus destitutum inuenissem, & tumorem extra apparentem cum duritie & dolore perferentem, & nunc æger medicamentorū pertasus esset, quibus multis usus fuerat, ac omnia remedia respueret, ægre ad hoc inductus est, vt hæc simplicia in ceruisia communi in duplici vase cocta susciperet: *℥ agrimonie, marrubii, lichenis, florum ros. rubear. (nam adhuc fluxu laborabat) absinthii Romani, plantag. cum rad. ungulae caball. cū rad. ana m. j. rad. fœniculi, petros. macerat in aceto per noctem ana ℥ j. rad. liq. ℥ ℥ coquantur in ceruisia, vt dictum est. Eo bis terve in die utebatur: & dicebat se sentire ex eo decocto aliquod leuamen, tam in dolore, quam fluxu. Interea tumorem inunximus duriores hoc linimento: *℥ vng. dialibæ, de meliloto ana ℥ ℥. mucag. fœnigraci, rad. alibæ, olei cotone. absinthii (ob hepatis firmitudinem) unguenti alabaf. ana ℥ ij. & rursus chirurgus accersito, qui eius erat amicus, huic iussit, vt post inunctionem hoc cataplasma emolliens & moderate resoluens & roborans loco dolenti applicaret: *℥ rad. alibæ mundata ℥ iij. folior. viol. malua florum anethi, chamomille, ob dolorem ana m. j. folior. absinthii communii (ad roborationem hepatis) m. j. rad. lilior. alb. ℥ j. coquantur ad mollitudinem; pistentur; adde farinam hordei, seminis lini, fœnigraci ana ℥ ℥. olei chamamelini, butyri recentis q. s. exiguo adiecto oleo absinthii ad hepatis roborationem; fiat cataplasma. Prius adhibito fotu ex decocto rad. & herbarum ac florum præcedente, deinde admoto in plastro bis in die renouando, usque per duas septimanas cū usus fuisset, tumor ille durus mollior paulatim factus subsidit, & euauit: & per alium tunc excreuit sanguinolenta in maiori copia; prius quasi materiam sanguinolentam vtcunque puram, licet non nihil biliosam; in fine vero nigriorem & limosam absque manifesto pure: postea simul cum excrementis sanguinolenta ista commiscebantur, & sine dolore exhibant. Adhibui lotium medicamentum ex decocto hordei non excorticati, exiguo melle rosato adiecto: & non diu post cessauit fluxus ille sanguinolentus per se, tanquā rupto abscessu, licet meram purulentiam nō spectaremus; interim tumor delituit, mox & dolor & fluxus cessarunt, ac perfecte sanitati deinde restitutus est, & sanus permansit, non sine magna nostra laude.***

SCHOLIA.

1 Luxus hepaticus apud quosdam diuerso modo sumitur; quouis modo is pendet ab hepate, siue res humoralis ab eo demandetur, siue non; ad quem referunt fluxum chylosum, qui modo ab hepate, modo a venis mesaraicis ortum habet, de quo egimus obs. 7. & schol. eiusdē, vel quia si opilatio in mesaraicis venis, vel debilitas virtutis attractiue hepatis: vel sumitur pro quouis fluxu huiusmodi.

Fluxus hepaticus apud medicos diuerso modo capitur.

Fluxus di-
uersus partes
ea que ex-
pelluntur.

humorali ab hepate proueniente, siue fuerit a bile, siue a fece melancholica Sed quādo est sanguineus lotius ex debilitate hepatis, tūc propriissime vocatur hepaticus: sed minus proprie, si ab aliis humoribus, vel vitio hepatis, ut si ab apostemate hepatis, fiat; de quibus etiam mentionem fecimus cum de chyloso fluxu loqueremur. Vide de his, ac eorundem fluxuum curatione, apud Leonellum, & qui ab aliis humorib. ab hepate fiant; & de fluxu hepatico bilioso pituitoso & melancholico. Et ita hic diuersus est ex parte eorum, quæ expelluntur: chylosus, cuius causam ad debilitatem hepatis eiusque oppilationem aut venarum mesaraicarum reduimus; vel aquosus, similis aquosifati hydropicorum in hydropicis; vel lotius, ut lotura carnis, modo magis modo minus rubens: vel est biliosus, citrinus, prassinus vel æruginosus, ex bilis multiplicatione: & est virulentus, tanquā ab hepate calido vel eius concavo resudans: vel saniosus, ab apostemate resudans Alius feculentus, feci sanguinis similis: vel sanguineus a toto vel ab hepate, de quo dictum est. A calido hepate biliosa liquidiora; & si augetur calor, insigniter flaua, crassiora, grauitèr olentia, pruriginosa, nigricantia, affatis humoribus & postremo colliquata hepatis substantia. Hinc sitis (ut dictum est prius) ardor, deiecta appetentia, assidua corporis iactatio, difficilis curatio. In nostro tamen ægro non erat tantus calor, licet etiam bilis admixta esset, & fluxus ob hoc diuturnior. In infirmitate attractricis hepatis est materia chylosa: in infirmitate alteratricis, primum quidem loturæ carniū similia, & sanguini diluto aqua: deinde varia qualitate & consistencia, interim quasi limus sanguinis & grumus. Tenuis, rubens & serosus a venis mesaraicis & ramis venæ portæ, quandoque crassior ab hepate vel liene. Hic vero ab hepate primo paulo purior, postea magis limosus fluxit, tumore subfidente. Tamen non videtur fuisse ibi apostema, cum neque virulentia, neque sanies sequeretur. Nec fuit ab intestinis, ut in dysenteria, quia non exhibat cum torminibus. Fluit tamen aliquando laeso hepate aut rupta vena (cuius exemplum prius attulimus) sanguis niger, velut crassum atramentum, & deinde rubens aliquando excernitur, & moriuntur; quales duos vidit Hollerius. Vterque vix sentiens periculum, animi deliquio paulatim exstinctus est. Vidimus tamen & in peste & in fine quartanæ crassum & nigrum effluxisse, & tamen euasisse ægros. Quibus modis fluxus hepaticus curetur, nunc satis dictum est. Ideo ad lienteriam transeamus.

OBSERVATIO XXV.

De lienteria antiqua, cui scurbutum malum adiunctum erat.

Vir quidam longa lienteria ex ventriculi imbecillitate detinebatur, & simul malo scurbutto dicto laborabat. Ad quem ingressus, primo sequentem potionem exhibui, anno 1558. mense Ianuario, dum his duobus malis misere affligere-

tur: ℞ myrob. citrinorum modice combustorum, chebulindorum ana ℥ j hordei non excorticati parum: tostum ℞ florum ros. rubear. absinthii Romani ana p. j. bulliant in aqua plantaginis unica ebullitione; & huius colatura accipe ℥ iij addendor habar. parum asfati & puluerisati ℥ ℞ syr. cotoneorum, de mentha ana ℥ ℞. misce pro vna dosi. Secundo hoc linimento ventriculum inunxi: ℞ olei absinthii, nardini, cotoneorum, mentha ana ℥ ℞. pul. coralli rub. mentha sicca florum ros. rub. exsiccat. & omnium puluerisatorū ana ℥ iij trochis. gall. moscata. caryophyll. ana gr. x. cera q. s. fiat unguentum. Tertio, ℞ conser. ros. antiquæ ℥ ℞ diacydoni sine speciebus, cortic. citri conditi ana ℥ j spec. aromat. ros. diarrhod. abb. trochis. de spodio, de carabe ana ℥ ℞. coralli rub. trochis. de cappar. (ob scurbutum) interiorum stomachi gallinar. prepar. ana ℥ ℞. cum syr. myrtino & menthaceo fiat mixtura. Quarto etiam statim post purgationem, stypticitatē relinquentem, pro scurbuto imperauimus, ut decoqueret cochleariam & bekabungam in ceruisia chalybeata ad libitum: sed cum fluxus augeretur, & debilis esset æger, decoquebat in vino rubro Gallico pontico. Et egregie profuit. Quinto pro gingiuis vlceratis ex scurbuto: ℞ bekabunga, corticum granat. plantag. salua ana m. j. chinamarum rubi, foliorum peruinca, matricarie ana m. ℞. bulliant in aqua pluuia chalybeata vel ferrata, in ℔ ij. ad medietatem colatura, adde aluminis ℥ iij. mellis ros. colati ℥ j. iterū ebulliant; & vsui reteruetur ad gingiuas abluendas & confricandas. Sexto spongia in aceto infusa, in quo bullierant ruta, rad. cappar. filicis & thamarisci, lien fomentabatur. Septimo, post lotionem gingiuarum hoc puluere confricentur: ℞ aluminis vsti ℥ ℞. salis vsti ℥ ij. gallarum, cornu cerui ana ℥ j. maceris ℥ ij. foliorum salua siccorum num. 4. conterantur in pollinem. His remediis & decocto bekabunga & cochlearia, a scurbuto curatus est, & lientericus fluxus minui cœpit. Sed hoc fotu sequenti vtens pro ventriculo roborando, & cerato deinde appposito, alienteria præter opinionē multorum curatus fuit: ℞ absinthii Romani, mentha, corticū granat. baccarū myrti ana m. ℞. coquantur in aqua ros. aceto ros. & vino rubeo styptico ad ℔ j. ℞. colatura addendo succi cotoneorum ℥ ij. masticeis. thuris, acacia santal. rub. ana ℥ ℞. puluerisati, fiat fotus pro ventriculo omni die ante pastum: ℞ olei mastichini, absinth. cotoneorum ana ℥ j. olei menthacei ℥ ℞. calami aromatici seu odorati, caryophyll. thuris ana ℥ j. aloes ℥ ij. ros. rub. corall. rub. ana ℥ ℞. masticeis, cumini pul. ana ℥ j. hypocyssid. acacie sumach. puluer. cat. ana ℥ j. ℞ galliamuscata ℥ j. cum cera resina, terebinth. q. s. ut artis est paratur ceratum. At alter sine scurbuto lienteria laborans, singulo die ventriculo ieiuno sumens semiunciam sequentis electuarii, nihil superbibendo, curatus fuit: ℞ sacchari ros. ℥ vj. theriacæ optime ℥ vj. cum m. ua cotoneorum completa q. s. misce, fiat con. utum. Eodem modo fuit curatus (teste Amato centur. 2. curatio. 56. de lienteria) Dominicus Margaretus, Nobilis Anconitanus, senio confectus, quum per plures dies semicrudum cibum per secessum emitteret, & multa præsidia tentata illum non iuuissent,

hoc electuarlo ultimo reffectus fuit, & sanitatem obtinuit. Vfus est zaccharo rosato Neapolitano antiquo.

S C H O L I A.

3 DE scurbuto malo hic nihil dicemus, quoniā de eo abunde egimus *lib. 20.* cum de affectibus lienis loqueremur: sed nunc de lienteria verba facturi sumus. Quidam hic sub vno capite de lienteria seu læuitate intestinorum, & cœliaca seu ventrali affectione scribunt, cum eodem medicationis ductu vti liceat, ita ut quæ dicantur de vnius curatione, quasi de alterius sint subintelligenda, cum vtrisque commune sit, ut vim retentiuam ac concoctoriā facultatem tum ventris tum intestinorum omni modo refocillare oporteat: seorsim tamen de his dicemus, quanquam prius loquuti fuimus *lib. 18. de ventriculi affectibus, observ. 50. & 51. de cœliaca affectione.* At nunc etiam de ea quasi per transennam agemus, cum magnam affinitatem inter se habeant, licet in nonnullis rebus discrepent. Cum enim eadem retentrix, seu complectens ventriculi facultas tempus retinendi ac complectendi cibos cum coquēdi tempore haud exæquat, si prorsus eos non complectatur, affectus quidam oritur, qui a Græcis *λεντερία*, a Latinis *ventriculi ac intestinorum læuitas* dicitur. Quod si eadem non vsque ad consummatam cōcoctionem retineat & complectatur, alter excitari solet affectus, qui a Græcis *κοιλιακή*, a Latinis *cœliaca*, seu *ventralis affectio* dicitur. Iniustum namque complectendi tempus (ut *Galenus* inquit *lib. de differ. sympt.*) omnino diminuta concoctio excipit: deinceps vero vel celer ciborum exitus, vel eorum in ventre corruptela. At celeris ciborum exitus inseparabilia symptomata sunt deiectionis humiditas, & digestio in corpus diminuta. Quod ad primam affectionem, nempe lienteriam, *λεντερία* Græcis *laue* significat, seu *continuum*, & nulla ex parte diuulsum, sed sibi vndique collærens, æquabili superficie. Vnde *λεντερία*, quasi *λεϊότης τῶν ἐντέρων*, læuitas intestinorum, *ἐστὶ τὰ χεῖρα διέξοδον τῶν προσφερόμενων σιτίων ἀμεταβλήτων ἐν κεινομένῳ*, cum cibus & potus, qualia sumta sunt, celeriter & ante coctionem vllam aut exiguam, elabuntur e ventriculo & intestinis. Quam ita *Galenus* definit *6. aphor. 1.* esse velocem & sine vlla cibi mutatione excretionem. Sic & *3. aphor. 22. & 4. aph. 12.* hoc est, cum cibi ea qualitate, qua sunt assumpti, deiciuntur, non colore, non odore, non consistentia mutati. Verum, ut quibusdam antiquioribus visum est (ut etiam *Donatus* refert) tale nomen sortita est, quoniam qui prius talem ei indiderunt appellationem, fieri ipsam putabant, propter intrinsecæ superficiei intestinorum læuitatem, ob quam cibos in eis contentos nō amplius retinent, quemadmodum retinebant cum suam seruarent sibi a natura inditam asperitatem. Cuius etiam sententiæ videtur esse *Aetius cap. 51. libro 9.* Quam opinionem *Galenus* tanquam erroneam oppugnat, *aphor. 1. lib. 6.* causamque erroris eorum dicit esse ignorantiam causarum, propter quas excrementa intempestiue excer-

nantur, eo quod ignorent quoque proprium esse vetriculi cibos amplecti, & certo tempore stringendo retinere, & deinde ad inferiora demittere: At postea de causis dicemus. Si breuiorem huius affectionis adferre velimus definitionem, dicemus esse carentiam coctionis. Altera affectio, nempe cœliaca, ab ea, quæ afficitur parte, nomen sumsit, ut refert *Aetius cap. 37. lib. 9.* ut latius *scholio* observat. *50. lib. 18.* de morbis ventriculi diximus. Intestina tum ventriculus & de locis affectis, in ambobus afficiuntur. Suntque symptomata retentricis & concoctricis facultatis læsæ: licet inter se communicent & differant, cum in vna ea diminuta est, ut in cœliaca, in qua cibos non complectitur vsque ad consummatam concoctionem: in altera, nempe lienteria, omnino abolita, retentrice facultate prorsus cibos non complectente, ita, ut secundum *Galenum* *lib. de differ. sympt. & actionis* prorsus sit priuatio. Neque læuitas intestinorum subito euenit, cum cœliaca eam præcedere soleat, ut etiam patet *6. de locis affectis.* Cœliacos quæ sequantur & qualia signa habeant, satis superque diximus *scholio* præcedenti: vnum tamen adhuc addemus exemplum de cœliaca affectione, & deinde ad lienteriam reuertemur.

OBSERVATIO XXVI.

De cœliaca affectione.

Refert *Aetius lib. 9. cap. 37. de cœliaca affectione*, Rex Archigene, quod aliquando cœliaca affectio adfligit, temporibus quibusdam aluo resistente; quibusdam vero ordinate per certas horas fluente; ut euenit *Andrea Guilelmo de Oosthoren*, qui frequenter hoc fluxu cœliaco detinebatur, & parui momenti eam reputabat, quam postea in senectute facile lubricam haberet aluum, & tandem in hecticam deuenit, de quo egimus *lib. 4. observationum nostrarum de febribus hecticis.* Aliquando vero incessanter apparet, quemadmodum contigit anno 1569. *Barthildæ Adrianæ viduæ* merchule probæ, annorum quinquaginta septem, circa finem Iulii mensis, quæ in nostra vicinia habitabat. Huic solitus appetitus nihilominus permanebat: (qui sæpe non solum permanet, teste eodem *Aetio* loco citato, verum; etiam amplius augetur) quare statim me non vocauit. Verum persistente appetitu ob id, acruatimq; ac per vices factis, omnia mala augetur. Quod cum huic mulieri fieret, & assidua egestio humida & liquida, etiam foetida adesset, ita ut in animi deliquum quoque inciderit, quod sæpe fieri solet (ut diximus) me tunc vocauit. Cum autem hoc malum septem pluresve dies durasset, & adhuc recens esset, diligenter causam ipsius mali inquirere cepimus. Cum autem assidue cibi corruptiones & peregrinorum eduliorum egestiones præcessissent; (nam mansiones habens extra urbem, pinguedinem lactis, tum pruna, aliosque cibos corruptibiles iniecerat) & mulier satis crassa obambulando se fatigasset, cum talis ingestio huius causa existat, ea ipsa auferre oportet; verum cum illa

Δυσεντερία
a Latinis
ventriculi
ac intestino-
rum læuitas
dicitur.

Κοιλιακή
a Latinis cœ-
liaca seu vē-
tralis affe-
ctio.

*Λæuitas in-
testinorum*
unde nomen
sumserit se-
cundum
quosdam.

6

Cœliaca
unde nomen
sumserit.

Pars affecta
& affectus.

I

illa præterisset, & labor etiam præcessisset, illam in quiete adseruauimus, & si ferre posset, in mediam imperauimus, & ut omnino modico cibo uteretur. Et cum humores viciosi ex cibis præcedentibus essent generati, illi ipsi erant euacuandi. Cum nauseam haberet subinde, nec tamen vomeret, ut larga potione, iuxta eundem Aetium, uteretur, suasi; nam tales ad recomendum cogendi sunt, cum ex nausea potissimum perciperemus humores in ventriculo collatos esse. Quod cum fecisset, etiam cochleari vno aut altero assumpto ex oxymelite simplici, euomuit; licet humores serofi subinde acres intestinis infarcti roderent & irritarent. Nam aliquibus fluxiones statim viū adstringentium oboriuntur, ventre nimirum ab ipsis laeso, propter imbecillitatem aut molliem sensum; ideo Archigenes utebatur *hierasua* ℥ij. At nos prius ad præparationem dedimus hos syrupos, ex *infus. ros. ex succo cichorii, & cotoneor. myrtino & oxysacch. cum aqua acetosa & plantag.* & tale medicamentum purgans dedi, quod etiam valet aduersus lienteriam, si humores vel succi mordaces superficiem ventriculi aut intestini rodant. Communis enim vtrisque iuxta Aetium, in læuitate intestinorum, quo ad celiacos & dysentericos, est curatio. Propterea dicebat etiam Donatus, ea qua dicemus de vnius curatione, etiam alterius subiungenda erunt. Commune itaque vtrisque; erit (ut idem refert Aetius) quod vim retentiuam ac concoctoriam facultatem tum ventris tum intestinorum omnimodo refocillare oportet. Attamen in lienteria illa, quæ ab acri humore fit (ut postea dicemus in ea dolor sentitur; qui si perseverat, dysenteria fit. At in celiaca, vel etiam in imbecillitate, nullus doloris sensus; & melius eunte morbo, acidi rutus commouentur. Fortasse cum hæc paulo ante nostram ingressum bibisset vinum rubrum stypticum, & viciosi humores essent retenti, acrimoniam quandam conceperunt; quare & illi euacuandi erant. Purgans vero hoc erat: *℥ corticum myrob. citrin. ℥ij. acetosa m.j. rhamarind ℥ij. bulliant in aqua commun. q.s. & huius express. accipe ℥ij. syr. ex infus. ros. solut. ℥ij. B. misc.* & habuit quinque sedes. Sed, quod fere oblitus eram, post vnum aut alterum diem a vomitu, cum amplius non vomeret, antequam purgationem darem, etiam propinavi lotium ex decocto hordei communis, nempe ℥ij. addendo syr. ex infus. ros. communium, rubrarum apertarum, & menthacæ ana ℥ss. misc. Humoribus satis purgatis, tandem deueni ad constrictionem & ventriculi simul roborationem. Per duas horas ante cibum capiebat ℥ij. vel iij. diacydonii sine speciebus; & mane ex hoc condito: *℥ conseru. ros. antiquæ ℥viij. specier. diarrhod. abb. arom. ros. sine musco ana ℥ss. margaritarum puluerisatarum ℥j. manus (hæsti cum perlis ℥ij. pellicul. stomachor. præparat. ℥ss. syr. cotoneorum & menthacæ q.s. fiat conditum.* Ventriculum inunximus oleo myrteo, mastichino, cotton. maceris oleo exiguo adiecto. Et quia fluxus non cessabat, metuius ne in lienteriam incideret, vel aliud graue malum. Nam vbiis morbus protrahatur, vel autumnio incipi-

ens ad hyemem vsque se extendat (ex auctoritate Archigenis, teste Aetio) difficilius omnino curatur. Quamobrem ad maiorem adstrictionem condito superscripto adieci rochis. de carabe, de spodio & cornu cerui vltum, & semen plantag. & cerato stomachico Galeni ventriculo apposui, & victu magis constringente, hæc ipsa a celiaca affectione liberata fuit.

SCHOLIA.

Quamquam hic leuia & humecta excrementa egeruntur, tamen eodem Aetio teste, ex Archigene, aliquando etiam sanguis flauus & tenuis vna cum his, quæ egeruntur, destillat; ob eam causam & vitiatum cibum affectant, decoloresque & vehementer graciles fiunt, corrugata in super eorum vniuersa cute; & venæ sane, quæ in ventrem deferuntur, liuescunt; & ad magnam omnino desperationem res denenit, si morbus diutius dureret ægris ad convenientem dietam pigrescentibus. Si eadem celiaca prorogabitur, necessario, atrophica cōsequetur propter diminutam in corpus alimentorum digestionem: cuius exemplum lib. 18. obseruat. 51. posuimus Alexand. cap. 8. lib. 8. hæc inquit: *Morbus hic curatione initio adhibita facile tollitur, postea vero difficilis.* Scribit autem curari, ut qui ventris profluuium, quod Græci diarrhœam appellant, experti sunt. Cibi eis conueniunt, qui non minus aluum reprimunt, sed qui adstringentes facile concoqui & in totum corpus distribui possint: qualis est panis bene elaboratus, & probe coctus, vinoque adstringenti intinctus: nec non lentici & oryza forbitiones. Pisces autem dura carne præditi exhibeantur. Ex auib. quæ non sunt pingues, præter palustres. Quin & panem cum malis cotoneis & myrtis coctum damus: ite vitella ouorum assa & aceto intincta: adhæc lac scissile propinamus. Pro sunt etiam carnes leporinae aut ferinae, ac alia quæ in fluidis affectibus enumerantur. Primis duobus aut tribus diebus a cibo abstinere oportet: præcordiis fomenta, quæ modice adstringant, corroborentque, ex vino & oleo rosaceo aut myrteo, aut melino aut lentiscino imponere; deinde ex palmulis, polenta, malis cotoneis, aloe, & absinthio. Idem dat quinque; foliis radicis aut rubi decoctum. Habes apud eundem plura remedia & pastillos contra celiacos: tum innumera remedia apud Aetium lib. 9. cap. 37. vbi ad longum docetur ex Archigene, quomodo hæc affectio curetur, & quæ Orbafius tum veteres ad celiacos valere scripserunt. Quem, si libet, videre poteritis. Nunc rursus ad lienteriam reuertamur.

OBSERVATIO XXVII.

De lienteria ex ventriculi imbecillitate, cum materia pituitosa lubricante ventriculum.

Vir quidam supra 40. annos natus, cibum continere non poterat, ilico inconcoctum & liquidum minimeque alteratum per aluum reddebat, ex ventriculo imbecillo, cui materia phleg-

Signa.

Prognostica.

6
Curatio.

matica mixta erat. Non febricitabat, neque ardorem aut sitim sentiebat, sed subinde acetosam eructationem experiebatur: quæ omnia materiam pituitosam declarabant. Huic proposui, ut viscosa omnia, & humida vitaret, & ut parum ac sæpe cibum sumeret, utque unico cibo, eoque exiguo & facili nutrimenti, contentus esset. Ideo cuniculos, gallinasque iuvenes, capones, perdices, phasianosque (quia satis dives erat) concedebam, & auiculas assas & alaudas, cum mentha vel aromate conditas, columbaceos pullos, adiectis nonnullis leuiter constringentibus pro condimento: & præcipue talia, quæ grata sunt, veluti est *anisum*, *cuminum*, *cinnamomum*, *garryophylli*, *galanga*, *calamius arom.* & *brassica b. scotia* ex *Pauli* & *Aetii* sententia, & *vinum calidius generosum*, ac *vetustius modice cum aqua pluvia dilutum*. Quæ quidem victus ratio etiam conuenit iis, qui ex sola intemperie frigida hoc malum tentantur. Verum cum & hic cum frigida intemperie pituitosa adessent excrementa, ea prius concoquenda ac præparanda erant. Deditur igitur hunc vel similem syr. *℞ syr. ex absinthio, oxymelitis simplicis, syr. de mentha ana ℥j. aqua fœniculi, absinthii ana ℥ij. misce pro 2. dosibus.* fuit bis reiteratus. Cum autem neuleam non haberet, (quam si habuisset, dedissem leue vomitorium ex *℥ij. aqua repida, cum ℥j. β. oxymelitis*, idque repida statim a cibo) nec pronus esset ad vomitum, dedi *pilul. mastich. & alexiphag. ana ℥β. componendo pilulas v. cum pilulis magis delectaretur.* Alioqui dedissem hanc potionem: *℞ infus. myrob. chebul. in aqua mentha vel absinthii, ℥iij. prius ebulliendo.* Cuius expressionis accipe *℥iij.* & forti expressioni adde *syr. ex infus. ros. pallid. cum agarico ℥j. pul. hiera simpl. ℔β. fiat potio.* Altero die in diluculo dabam *℥j. theriacæ veteris*: deinde postea ad maiorem constrictionem *syr. menthaceum & absinthii, cum pul. cinnamomi vel calami odorati.* Dabam theriacam cum cyatho uno vini rubri. egregie profuit: quemadmodum & alteri *℥j. micela assumpta cum eodem vino.* Interea ventriculum inunxi sequenti vnguento: *℞ olei mastichini nardin', absinthii ana ℥β. mentha sicca. garryophyll. nucis cupressi, masticis, acacia ana ℥β. maceris ℔β. cera parum; fiat vnguentum.* Etiam hoc appposito cerato: *℞ mastichis ℥β. ladani ℥ij. mentha, garryophyll. nucis cupressi ana ℥β. acacia ℥j. β. calami arom. coralli rubri, galanga, ana ℔j. olei menthacei & cera, & resina q. s. fiat ceratum.* Quibus remediis hic breui restitutus fuit, cum malum non diu durasset.

S C H O L I A.

3 **H**Æc signa in leuitate intestinorum esse solent, ut paulo ante dictum est, etiam teste *Aetio capite 5. lib. 9.* cibi crudi in ea & nihil immutati excernuntur, imo talia deiiciuntur, qualia fuere deuorata, ex *Galenii sententia.* Egri quoque cibum non sentiunt, & malum corporis habitum acquirunt, quod vtrumque malum incorrigibile existit. Succedit enim (*Aetio teste*) assidua ex-

cretio cibi, colore subalbida, inaequalis & aquosissima, citra sanguinis aut bilis complexum, atque intensa est cruditas in lientericis (*Paulo referente*) ut alimenti assumti genus ex iis, quæ egeruntur aperte cognoscatur: atque hæc nota potissimum a celiacis discernitur. At causæ celiacæ affectionis & leuitatis inter se non differunt, nisi maioris ac minoris ratione; ideo quæ traduntur de leuitate intestinorum (*ut referi Donatus*) eadem intelligenda sunt de ventrali affectione, cum vtraque symptomata consequantur ventriculi morbum: & is genere duplex esse potest, nempe intemperies aliqua frigida vel calida; sed frequentius frigida. Aliquando etiam cum humore, qui est aut aeris & mordax, ut bilis; vel frigidus, ut pituita, propter quam imbecilla redditur retentrix facultas, tam ventriculi, quam intestinorum. Vel ulceratio occupans superficiem earundem partium, similis illis, quæ in ore sunt, quas *Græci aphthas* nominant. Verum vnā ab alia sic distingues: In illa lienteria, quæ accidit propter ventriculi atque intestinorum imbecillitatem, absq; vilo doloris sensu sunt deiectiones; in ea vero, quæ ab exulceratione proficiscitur, inest quidam morisionis sensus cum deiectiones fiunt. Hæc autem exulceratio a quorundam humorum mordacitate ac acritudine, totius ventriculi ac intestinorum abrafa superficie, ortum habet; quamuis ipsæ vires non multum patiantur, si hac ratione fiat leuitas intestinorum. Necessarium tamen est, ut perineantibus cibis partes exulceratæ dolorem sentiant, & ideo illos propellant, atque a seipsis citissime emittant. Hoc vero in omnibus partibus facto, velox ciborum exitus consequetur, & nullum fiet initium concoctionis. Oboritur autem frequenter dysenteria magna præcedente, & ex profunda ulceratione cicatrice densa & leui succedente, ex *Aetii mente.* Idem ferme confirmauit *Cellus cap. 16. lib. 4.* cum dixit: *Ex torminibus interdum intestinorum leuitas oritur, quæ continere nihil possunt, & quicquid assumptum est, imperfectum protinus reddunt.* Quæ de re faciliter percipi poterit lienteria, si ex acribus ac mordentibus succis ventriculi ac intestinorum superficiem exulcerantibus originem trahat. Alii vero remotas causas etiam his annumerant, siue sit aer, cibus, somnus longior, siue quæuis alia humida, villos stomachi relaxantia, exceptis aliis causis internis, siue fuerit aliqua intemperatura nuda, aut aliis humoribus modo frigidis, modo calidis mixta. At ea, quæ potentia retentrix sequitur imbecillitatem ex intemperatura, quæ nonnunquam in habitu corporis est, vel habitualis, ut etiam dicebat *Donatus*, vel propter humorem aliquem, qui in ventriculo atque intestinis continetur, nempe frigida, raro calida: ideo vnā temperatura ab alia distinguenda; & ita vnus humor ab alio. Sed recte dicit, non opus esse hic longiores sermones producere, ne eadem sæpe repetamus, cum ea exacte distinxerimus in cap. de nausea & vomitu, & de cruditate ventriculi, cum propria signa ibi descripta sint.

OBSER.

OBSERVATIO XXVIII.

De lienteria diurna, lethali.

1. **R**usticus ditissimus, ex pago vulgo Sylua Alta dicto, in nostra vicinia, cum Alcmariæ praxin exercerem, fere per semi-annum lienteria laborauerat, sed nulla remedia miser ac auarus, nisi muliercularum, admiserat, donec ad desperationem deuenisset: tunc prius me vocauit, non intelligens in curatione lienteriae properandum esse: nam protrahere malum, est frigidam stomachi habitudinem adaugere: quam inueteratam exinde sanari difficillimum est, *vt Galenus demonstrauit*, multo difficilius in sene. Ad eum itaque ingressus, qui annum fere septuagesimum attingebat, reperi eundem, non solum viribus destitutum, sed quasi vero marasmo laborantem, & extreme macilentum; quare prædixi eum iam ex tabe consumptum moriturum, cum & difficultas spirandi adesset, & lateris punctura. Hoc est, quod Hippocrates in Coacis prænotionibus prædixit, quod læuitates intestinorum cum spirandi difficultate & lateris punctura in tabem desinunt: & licet quædam remedia adhiberemus, vt ægro satisfacere-mus, interea tamen astantibus prognosticum fecimus, illum breui moriturum, nam vix potuit vitam ad quatuordecim vel plures dies protrahere, post primum nostrum ingressum. Memini Theodorum Forestum adeo macilentum, vt similem nunquam viderim, cognatum meum apud sororem Iacobam Forestam, vxorē Petri Sasboti, Delphis ex lienteria ad desperationem decumbentem: quem tamen præter omnium astantium opinionem cum multa remedia ante adhibita non iuuarent, sic diuino auxilio in pristinam sanitatem restitui. *Vitellum oui, puluere vnius nucis muscatae in sperso supra tegulam ignitam assatum exhibui: quo fluxus restitit, ac probe curatus recte deinde valuit, quemadmodum & illa ceruisarius, qui in tribus Campanulis Delphis habitabat.*

SCHOLIA.

3. **Q**uod ad signa prognostica attinet, augurium Hippocrates nobis in lienteria aperuit, liberari egrum acetosis obortis eructationibus. Quod Galenus ratione confirmauit, tum etiam narium calorem reuocari, ac retentricem potentiam refici tradit. nam calor in cibum agens inualide, eum in acrem conuertit saporem. Sic dicit Hippocrat. *Aphor. 1. lib. 6. in longis læuitatibus intestinorum, si ructus acidus superueniat, quod prius non erat, signum bonum est.* Indicat enim (*vt Aetius refert, cap. 51. lib. 7.*) ructus acidus iucundi quippiam factum esse, & ventrem ac intestina, non velut inanima, cibum sinere pertransire. Verum non simpliciter dixit Hippocrates, *bonum esse signum acidus ructus in læuitatibus intestinorum*, sed primum quidem, *In longis*, adiecit, deinde addidit, *Vbi prius non fuerit*, pro veritate eiusdem sententiæ: quæ omnia a Galeno diligenter ibidem supra eundem aphorismum exposita sunt: etenim illis læuitatibus intestinorum, quæ neque adhuc incipiunt, neque ex pituita fiunt, non insunt acidi ructus. Quod si aliquando fiant (*vt idem Galenus inquit*) signifi-

significant tantisper cibum in ventriculo retineri, donec principium mutationis accipiat, & naturam suorum operū reminisci. Verum, iuxta eundem Galenum ibidem, lienteria quæ fit humorum acritudine, totius ventriculi, atque intesti-norum abrasa superficie, cessante humorum malignitate, statim sanatur cibis ac potibus, qui vim densandi habent. Quod si longiore tempore perseueret, in alteram passionem transmutatur, quæ dysenteria, hoc est, difficultas intestinorum appellatur. At locus ille Hippocrat. in Coacis prænotionibus, in hoc nostro sene lienterico veritatem habuit, quod læuitates intestinorum cum spirandi difficultate & lateris punctura in tabem trans-eant. Sed etiam ex omni lienteria illa periculosior est quæ a frigidiori oritur habitudine, & si retentrix leui frigore concilietur. Hanc sequitur, quam vlcerosam appellant lienteriam: ea enim difficul-ter sanatur. Confirmatæ quoque lienteriae cura-tio difficilis est, & illa, quæ ex contentiua debilita-te fit & perseuerat, hydropem siccum minatur, & tandem mortem, iuxta Auicennam. Hoc equi-dem euenit Henrico Amio Consuli Delpheni, qui in tympaniten incidit, ex qua mortuus est, multo tempore antea prognostico facto. Et quæ abrasioni villorū stomachi vel intestinorum suc-cedit, curationem non recipit: nam ex cicatricibus villi quasi læues facti sunt, nec retinere pos-sunt. Et quæ post chronicos & acutos morbos venit, lethalis est, cum omnimodam virtutis de-fectionem notet. Et quæ ab humoribus acerbis abrasionem intestinorum producant, seu dysen-teriam efficiunt, & perdurant, periculosæ sunt. Et illa, quæ ex sola intemperie immateriali, si cum virtute debili existat, plerumque malum etiam portendit.

OBSERVATIO XXIX.

De lienteria ex causa calida, & humore acro & bilioso.

1. **Q**uamuis rarius contingat lienteria ex intem-perie calida, & humoribus calidis ac acerbis, vt diximus; si tamē contingat, statim curanda est, propter mordaces humores, ne exulceratio sub-sequatur, quod facile fieri solet. Sic istis diebus quidam continuo biliosa deieciebat, inconcocta, & cum humor ille acris ventriculum, & simul in-testina vellicaret, ventriculi potentiam retentri-cem atterēs, lienteriam inferebat ex calida intem-perie & calidis succis adhuc non exulcerantibus. Curationem a victu institui-mus, cum ea tutissima sit via. Præcepimus igitur, ad eum ingressi, vt aer ad frigidum vergeret, & vt somnus more solito longior esset, nocte potissimum, cum diurnus no-xam inferat, nisi lassationis sensus adesset, aut nox vigiliis consumpta. Mane a somno leuiter deam-bulationi indulgendum, & animi laxamenta ad-hibenda proposuimus, & vt vitaret immodicos animi affectus, & præcipue iram. Celsus addit ex-ercitationes & frictiones his conuenire. Cibum contemperantem ex *chondro, oryza, & balica*, qui-bus astringens aliquando incoquatur, *vt superius ex Tralliano retulimus, vt pyrum, malum cydonium,*

messilum, & reliqua adhibenda, quæ & Aetius, Paulus, Alexander ad coeliacos & lientericos valere scripserunt, quæ & ipse Donatus ex iisdem auctoribus decerpit cap. proprio de lienteria. Quod ad medicamenta attinet, cum ad vomitum æger paratus esset, per vomitum euacuationem ita institui. ℞. aqua tepida. ℥ v. syrup. acetosi simplicis. ℥ j. syrup. viol. ℥ ss. misce, ex quo medicamento leuiter vomuit. Ceterum die vno intermisso, cum non videretur materia satis euacuata, dedi hunc puluerem. ℞. rhabarb. parum torrefacti ℥ ij. ss. myrob. citrinor. ℥ j. fiat pulu. dabam cum ℥ ij. aqua plantag. addendo syrup. ex infus. ros. rubrarum apertarum, cotoneorum. ana ℥ ss. misce. Deinde hæc adstringentia præscripsi. ℞. diacydonii sine speciebus ℥ ij. sumat ℥ ij. vel ij. in principio pastus, & postea sæpius ex hac mixtura. ℞. conserua ros. antiquæ ℥ ij. ss. diacydonij ℥ j. terra lemnia vera ℥ j. coralli rub. ℥ ss. cum syr. pap. & cotoneorum, fiat mixtura. dedi etiam hunc pulu. ℞. cornu cerui vsti, sem. plantag. acetosiana ℥ j. fiat pulu. dabam cum syr. de ribes. & ex ros. siccis. Ventriculum inunxi hoc vnguento. ℞. olei coton. mastich. ros. ana ℥ ss. pul. mastich. acacie, corall. rub. hypocyst. ana ℥ ss. cera parum, fiat vng. & hoc, vel simili cerato appposito. ℞. mastichis ℥ ss. acacia, hypocystid. panis assi in aceto & remolliti, boli armeni. ana ℥ j. ladanij ℥ ij. carabe ℥ ss. galla muscata ℥ j. cum oleo myrt. q.s. fiat ceratum, adiecta cera, & resina pini, vt melius cohæreant. Quibus subsidiis etiam hic curatus fuit, ita vt in dysenteriam non inciderit.

S C H O L I A.

3. Ex causa frigida curatio.

LIENTERIA curanda prout causa indicaue-rit, quæ omnium primo amouenda. Si igitur a causa frigida fuerit, ex nuda intemperie, cibi calidi ac ventriculo grati dandi, vt Obser. 27. huius libri diximus. Et si vna adsit materia pituitosa, ea coquenda, & præparanda, deinde vel vomitu, vel per medicamentum per os exhibitum euacuanda, cum myrobal. chebul. vel hiera picra, vt loco citato dictum est. Deinde calida & leuiter adstringentia, euacuata materia, danda, vt calamum aromaticum, vel thuris aut mastichis granum ad fabæ magnitudinem, cum vini rubri cyatho. Vel confect. mithridaticæ vel micleræ ℥ j. cum vino adstringente vtendum. Vel vnguentis, vel ceratis, quibus nos Obseru. 27. vsi sumus, tum aliis topicis, quibus libri medicorum scatent. Valet & emplastrum ex mastiche, in oleo nardino, & absinth. dissoluta, & emplastrum ex galla. Interea etiam illa quoque addenda, vel præscribenda, quæ vrinam mouent, vt materia ad renes deducatur. Valent & sacculi ex vtriusque menthæ, absinthij, ana p. j. chie mastichis, cinamomi, ligni aloes, corticum citri, ana ℥ ij. garyophyllorum, maceris, galanga, calami arom. ana ℥ j. ros. rub. siccar. m. j. ss. figurentur sacculi scutiformes, qui paucio vino odorato calido inspersi iterentur, vel in vino rubro, cum paucio cydoniorum succo macerari, calidi applicentur, sed & siccus ventriculo alligatur. & cõfert. At in calida intemperie, & ex causa calida, ita in victu procedendum, vt Observatione iam præcedent. dictum est, quibus & cibi conueniunt, qui non ni-

8. ex calida intemperie curatio.

mis adstringunt & reprimunt, sed qui adstringentes facile concoqui, & in totum corpus distribui possunt. Panisque elaboratus detur, ac etiam similago cum astringentibus dictis, in Observatione iam præcedente. In pullorum iure decocta, & intybus & cychorium, & carnes ex gallinis iuuenibus, & columbis, perdicibus, phasianis & montanis passerculis, & leporum & capreolorum carnes assatæ, & omphacio irroratæ, quæ apud Aetium & Alexandrum inuenies. Potus sit, vinum aquosum, tenue, subadstringens, paucum, neque cibum interpellat. Multus potus (Aetio teste) fluxionibus ventris infestissimus est, lac recens mulctum ad medietatem, vel ad tertias decoctum, fluxiones has sistit, & caprillum vel ouillum. Calida intemperies refrigeranda, & ventriculus roborandus. Interea si adsint succi mordaces, in intestinis & ventriculo, purgatione eluendi aut purgandi, vel vomitu euacuandi, & si occasio detur, concoquendi ac præparandi cum syrup. ex infus. ros. succo ros. cichorii, & aliis, vt iam Obser. præcedente exemplo ostendimus, cum manna, vel syrup. ex infus. ros. pallid. vel rhabarb. infuso euacuandi. Deinde excretiones astringendæ cum immaturis moris, acerbis, siccis & tritis, & quinque folij rad. decoct. & rub. ex Aetio & Alexandro, apud quos infinita remedia inuenies similia, & cum trochis. de spodio, de terra lemnia & similibus ad ℥ j. sumtis & ventriculi gallinarum desiccatis triti, iuxta Paulum & Aetium, potui inspersi admodum vriles sunt: nec minus eis commoda sunt, quæ vrinam cient, cum deriuationem moliantur, fluxionemque, sæpe transferant: veluti est apium, fœniculum, anisum, adiantum, cicer, ex prædictorum auctorum decreto, quod & Donatus annotauit, cum syrup. de byzantijs permixto vel myrino, vel decocto aliquo ex præcedentibus, nequaquam negligendo ventriculi, aut intestinorum robur. Eo etiam tempore, quo vrinam cientia tribuuntur, eorum etiam quantitas minor esse debet, licet cauendum sit, ne nimium laqus etiam fiat eorum vsus: & licet vomitus etiam collectos humores euacuet & diuertat, non tamen ciendus, nisi prout sint agrotantes natura ad vomendum: nam si difficulter euomunt, nequaquam hic proritandus erit: interea topica post euacuationem etiam adhibenda, & olea, & cerata, & vnguenta, iam in obseruatione præcedente adhibita. Conficiunt & saccellos in hunc vsu. ex purpureis, ros. siccis, santalis, corallis, balastio, hypocystide, cort. citri, cinnamomi ac chie mastichis pauca quantitate addita. Iidem quoque si in succo cydoniorum & aqua rosa. præmacerentur, & pluribus vicibus ventri applicentur modice calidi, magnopere proderunt: & ex iisdem fots quoque pro ventriculo fieri possunt. Verum si ex intemperie duntaxat calida, exceptis purgationibus & cientibus vrinam, quæ relinquenda sunt, vti & vomitus alterantibus & adstringentibus dictis frigidis vteris. Et sic in intemperie frigida, calidis solummodo alterantibus, constingentibus, & calfacientibus, tam intra quam extra admotis. Ita

Topica.

A causis ex-
ternis.

6.

Ita quoque si a causis externis vel procacitatibus euenit, ut a cibo, ut si oleosa sumserit, ea amouenda. Deinde & mala intemperies inducta corrigatur: atque curandus aeger, ut de coeliaca affectione dictum est. Si ex casu (ut Neoterici volunt, de quibus vide Gradum, & praecipue Guainerium) percussione supra ventriculum ex phlegmone curetur, ut in propriis capitibus dictum est. Ita quoque si per consensum fiat aliorum membrorum, eorum habeatur ratio, ut de vnoquoque fluxu ventris dictum est. Sed nimis late lienteriam extendunt. Et ita in lienteria a retentrice debili, siccos & stypticos cibos dant, prout temperies adsit calida vel frigida, de his vide ad longum Gradum, etiam de causis internis, respiciendo & temperiem, si nuda est, & materiam, si sit adiuncta, siue fuerit pituita aquosa, vel viscida, vel etiam salsa, siue bilis: nam haec semper sunt spectanda, cum alia purgatio debeatur pituitosae materiae viscosae (ut & Rondeletius admonuit) alia bili, alia pituitae salae. Vide Leonellum de curatione lienteriae ex phlegmate viscoso, & Gatenarium, qui etiam curationem ponit, si a paralyti musculorum eueniat, & commendat pilulas ex assa foetida, cum melle confectas, per duas horas ante praeestum. Si veniat ab ulcere ventriculi, curandum ut vlcus, si veniat ab apostemate, proprio cap. curatio petenda. Sed de ulcere nos exemplum nunc adiiciemus.

OBSERVATIO XXX.

De lienteria ex ulcere ventriculi.

1. **C**um lienteria, iuxta Galen. 6. aphor. 1. quem & Paulus sequitur, duas causas habeat, primam ex debilitate contentricis, de qua nunc satis diximus, alteram ab exulceratione, quae in summo corpore ventriculi consistit, ut paulo ante diximus, eo modo, quo in ore eius fieri videmus; addit 3. aphor. 22. & intestinorum. Harum exulcerationum causa, illae eadem, quae & in aliis partibus, occurrit scilicet acris humoris, qui initio mordet & contristat, tempore erodit & exulcerat: quamvis ob hanc causam plus pati intestina possunt, quae 5. de usu part. 10. licet sensu praedita, & prompta inde sint ad noxia pellenda, at fugere tamen nequeunt, quin propter reuolutiones multas figatur aliquando humor noxius, & contingat tenera & passibilia eorum corpora. At ventriculus statim se potest exonerare; patitur tamen ipse aliquando, ut euenit nautae cuidam, qui post vlcus incidit in lienteriam: ad quem acciti sumus non statim post vlcus perruptum, cui alioqui dedissemus ilico aquam mellis ad abstersionem, ut in puella factum fuit, lib. 18. Obser. 33. de ventriculi ulcere, attamen ad deterfionem dedimus, cassiae extractae 3. vj. aquae mulsae 3. iij. Deinde cum videremus subinde materiam viscosam, cuius etiam ratione cibus lubricus statim descendebat in aluum, dedi aquam decoctionis caulium. Quia vero vlcus non potest consolidari, nisi prius sit repurgatum, post aliquot dies dedi 3. vj. vel v. iuris decocti vuarum, cum paucis melle ros. deinde ad consolidantia peruenimus, ut decocta radice symphyti, cum terra Le-

mnia, iis quoque foris adhibitis, quae stomachum roborarent & constringerent. Quibus remediis quamuis hic videretur subinde conualescere, tamen rursus fluxu lienterico redeunte, nec ullis remediis aptis iuuantibus, multis mensibus decumbens tandem obiit. At alterum, ad quem in principio statim eramus acciti, hoc modo curauimus. Post decoctum hordei communis & passul. cum melle rosato, satis absterfo vlcere, quod cognouimus ex excrementis sine sanie exeuntibus, consulimus, ut acciperet trochiscum vnum de terra sigillata, cum lacte vaccino acetoso distemperatum: alii dant & puluerem caudae equinae ad 3. j. Exterius applicari iussimus ceratum ad crepaturam, de pelle arietina & sanguine humano confectum, & optime habuit. Hoc enim modo Guainerius curauit etiam lienteriam ab ulcere factam.

S C H O L I A.

VLCUS in ventriculo si lienteriam inferat, prius curandum est, ut de ulcere ventriculi diximus cap. proprio, per ebibita ob vicinitatem. Nam quae in intestinis est, remedia dysenteriae habere debet, nempe clysmata: nam sedes affecta monstrat modum applicandi. Rhases dicit, hunc affectum egere refrigerantibus & astringentibus: quod est, quia fluxio calore mordet, temperatur frigidis. Quia vero vlcus est, siccari postulat, & quia continue forte causa influit exulcerans; hinc etiam adstringere est opus partes exulceratas, ne fluxionem recipiant. Haec autem ita exhibet in cibis, sicut in medicamentis. Itaque succum vuae acerbae spissatum propinat. Spissatur autem sole, vel igne. Sic succus ribes, vel granatorum duorum cum spodio & ros. rub. drachma & trochiscis de spodio: Alimenta vero condiri vult iisdem, & portiones ex succo rhoes parat. Sed hic ubi indicatio a causa, si adhuc adsit? nec enim purgari corpus eo excremento praecipit. Praeterea, si purulenta deiectio aliquando visitur, tunc non solum frigidis siccisque curari vlcus potest, sed extergentia saniem erunt necessaria. Praeterea indicationem a sensu partis non capit, ut qui aceto, & succo omphacio vtatur, quae valde mordere possunt. Nos igitur ad sacram anchoram & veram methodum confugiemus, ac certissima inde remedia habebimus. Si vero adsit causa, ut fluxio calida a capite vel prauorum humorum copia in toto, vacuabimus, & eundem humorem temperabimus & cibis & potionibus, praeferens, lacte; vacuabimus si opus est cum sero; quod in purulento ulcere magis valet; saniem detergemus, atque istis peractis vlcus curabimus, ut partem ulceratam, & assumtis & admotis. Ebibita igitur sine dolore sint abstergentia & exsiccantia. Si dolor vehemens & inflammatio adsit; etiam soporantium aliquid addemus, ut trochisc. de carabe vel electro. Potionibus utemur ex succo plantag. vel terra lemnia. Extra cerato ex myrtino oleo, pulueribus inspersis adiecta cera. Summatim curabitur vlcus, primo abstersione, secundo consolidatione, ut de phthisi vel ulcere ventriculi, dictum est. Si veniat post diarrhoeam longam vel dysen-

Rhases taxat.
tur.

4.

teriam, raro curantur, & est lethalis plerunque, *ut prius dictum*: tunc cura statim adhibenda cum adstringentibus, & curanda, ut diarrhoea vel dysenteria. Si originem habeat ex ulcere intestinorum, curabitur ut dysenteria. Curatione itaq; lienteria peracta, nunc ad dysenteriam progrediamur:

OBSERVATIO XXXI.

De dysenteria.

1. **I**uuenis Amersfordensis, qui mecum Bononia Romam itinere pedestri proficiscebatur, cum impenite vias comedisset (*quanquam admonueram, ne sine pane id faceret*) in dysenteriam incidit, licet non admodum grauem. Ideo enema iniiciendum statim curavi, in hunc modum paratum, ne tormina maiora subsequerentur. *℞. decoctionis hordei integri ℥. j. ℞. sacch. rubei, mellis ros. colati. ana ℥. j. vitell. ouorum numero duo.* Terget sine acrimonia, nam adstringentia retinuisent, quæ erant excernenda; & cum dolor non esset vehemens, reliqui olea & axungias, quæ vlcus sordidum faciunt; quamuis ea adiecissemus, ut in iuvene subsequenti. Postea ad maiorem adstrictionem sequens vel simile iniectum fuit. *℞. florum ros. rub. p. j. hordei integri, parum torrefacti taphi barbati, plantag. folior. myrti. ana m. j. fiat decoctio in aqua pluuiæ. pro ℥. j. ℞. in qua dissolue pinguedinē hirci. ℥. j. succi plantag. ℥. ij. misce, pro clysteri.* Hic quidem statim victu immutato, relictis viis & aliis curatus fuit. At alius iuuenis Flander annos nouemdecim natus, mihi familiaris, cum Lutetia praxin medicam exercere incepissem (*ex Italia reuersus, Anno 1545. in principio mensis Martij.*) qui ex vino non defecato largius sumto, ac recenti admodum, prius in diarrhoeam vehementiorem incidit, & altero die in dysenteriam veram, cum ventris dolore ac torsione, hoc lauans enema & simul dolorem mitigans iniectum ei fuit. *℞. aquæ hordei communis aliquantulum torrefacti. ℥. j. ℞. (præstat hic maiorem quantitatem clysteris iniicere quam in aliis, quia in intestina tantum recipientia, sic melius detergentur, & restringentibus quoque melius restringuntur.) in qua dissolue sacchar. rub. ℥. j. ℞. olei ros. omphacini ℥. ij. adipis renum capræ. ℥. ij. oui vitellum: fiat clyster lauans & dolorem mitigans.* Ter copiose inde aluum expurgauit, vix exiguo sanguine, sed materia magis biliosa, & ex parte mucosa existente, torminibus quasi inde sedatis magna ex parte. Ideo & sequens inieci enema, quod & dolorem sedaret, & simul constringeret & intestina roboraret: *℞. lactis vaccini, in quo lapides igniti sapius extincti essent. ℥. viij. succi plantag. ℥. iij. olei ros. omphacini. ℥. ij. vitellum v-nius oui, frigide iniiciebatur.* Quo & præceptor meus Benedictus Fauentinus utebatur. Quo quidem secundo clystere tormina cessarunt, & iuuenis hic statim a principio magno cum meo honore conualuit, optima victus ratione præscripta. Et hæc erat prima cura, quam Parrhisii perfecit, dum ibidem praxin feliciter exercere incepissem. Petrus Gualtherus ceruisiarius Delphensis, sexagenarius, prius diarrhoea affectus,

deinde leui dysenteria, his subsequentibus statim quoque curatus fuit. *℞. decoct. hord. commun. ℥. iij. syrup. ex infus. ros. coton. ana ℥. ℞. misce. ℞. rob. de ribes ℥. j. ℞. conf. ros. ℥. j. ℞. rad. consol. maior. mundi. ℥. j. bellid. min. plantag. polyg. ana m. j. hord. communis, flor. ros. rub. & malua arborea ana p. j. de cucum. melon. ana ℥. j. sem. acetos. plantag. ana ℥. ℞. liq. ras. ℥. ij. myrob. oninium ana ℥. j. vuar. pass. cum arill. ℥. ℞. coquantur in aqua communi, & colatura prius manibus confricata & expressa accipe ℥. vj. adde syrup. coton, ℥. j. syrup. ex ros. sic. ex infus. ros. commun. ana ℥. ℞. misce pro ij. dosibus. ℞. olei chamomill. ros. ana ℥. ℞. inungatur venter. ℞. conf. ros. vet. diacyd. sine speciebus. ana ℥. ℞. conf. sol. acetos. ℥. ij. pul. cornu cerui vsti, coralli rub. tenuissime pulu. ana ℥. ℞. rob. de rib. ℥. ℞. misce. Lumbi quoque cum dolerent, inungebantur vng. ros. Et istis statim conualuit, sine clysteribus.*

SCHOLIA.

Dysenteria a læsa particula nomen sumit: Ut ^{4.} *Dysenteria a 2. methodi medendi liquet, cum Græcis* ^{de nomen h. beat.} *2. methodi medendi liquet, cum Græcis* intestina dicantur. Celsus tormina hunc affectum vocauit: alii & intestinorum difficultatem. Quidam nomen generale volunt esse (*nam aliud non significat, quam intestinorum laborem*) non per excellentiam acceptum, ut quidam referunt, nam colica & iliaca sæpius vehementius affligunt. At hic intestina ipsa ob exulcerationem dolore torquentur: ita proprie eam sic appellemus, nempe vlcus esse intestinorum, *secundum Galenum de locis affect.* 6. Licet apud Galenum & Hippocratem dysenteria differentia quatuor reperiuntur, sed tres differentia improprie dictæ, uti etiam ^{Sanguinolent. excretionet. quatuor.} prius ex Auenzoare retulimus. quas priores quoque cruentas dysenterias appellant, vel cruentas excreationes, sine vlcere intestinorum. Vna a copia sanguinis (*ut etiam prius diximus*) toto corpore redundantis, qui e venarum orificiis apertis in intestina effunditur, ut in hemorrhoidibus e venis ani etiam in iis: quibus aliquis artuum est abscessus: vel in iis qui exercitationem dimiserunt, per circuitus repetens, & hac quoque solet mulieribus retentis menstruis accidere, ut quinto de locis affect. constat. Naturalibus enim sanguinis vacationibus suppressis, quæ per vterum ac nares, fieri solebant, aut intermissa exercitatione, aut truncato membro, certis interuallis solet eiusmodi dysenteria contingere, quam cruentam vocant, Græci *αἱμορροϊκή*. Altera, ^{5.} cum ex imbecillitate iecinoris aquosus sanguis deicitur, quam utique lotura carnis similem dicunt: hanc prius appellari diximus, a Tralliano libr. 8. capit. 3. dysenteriam hepaticam, tam ex calida quam frigida causa, cui adiungi potest & illa quam ipse cap. 6. eiusdem libri appellat rheumaticam dysenteriam, ex humoribus per venas ad intestina profluentibus, dum & chylus in sanguinem mutatus ad intestina refunditur, atque ita cum bile mixtus excernitur, nec potest ob huius acrimoniam in ventre retineri; sed ab intestinis foras propellitur. Atque hæc est causa dysenteria rheumatica: cuius hæc sunt nota: Acres varique humores per aluum excernuntur, sitis magna vrget, corpus colliquescit, & cibi fastidium torquet

torquet. Aliquando rosiones intestina & stomachum affligunt. Quod si hic affectus diutius perdurauerit, eodem Alexandro Tralliano teste, ad exulcerationem intestinorum perueniet, quæ proprie dysenteria dicitur. Tertia est, cum melancholici splendentis sanguinis decoctio sit, nam, ut ante diximus, sanguis niger pici liquida similis excernitur. Nam cum hepar sanguinem conficit, eius crassiorem partem lien attrahit, & alimento tenuiori inde sumto, reliquias deiecit deorsum. Vel si hepar multum limosi sanguinis colligat, & lien non expurget, neque attrahat, aut attrahat quidem, sed præ copia aut debilitate non conficiat, aut excrementa sua non expurget, utroque viscere copia oppresso & debili facto, fiunt deiectiones nigrae hemorrhoidibus aut menstrua fluxione, aut hamorrhagia suppressis. Aceruatur hic humor, & per intestina vacuatur. Nam, uti ante dictum est, cum triplex sit materia atra bilis, prima sanguis crassior, ut vinum crassum deposita fece, secunda limus & fex sanguinis crassioris, tertia bilis flaua, de his deiectionibus intelligimus, quæ nigrae sunt, neque grumescunt, nec quicquam acre, corrodens, vel acidum habent, nec effusa in terram feruent, aut fermentant terram, sed sunt veluti sanguis niger, aut limus sanguinis, qui salubriter e corpore sæpe expellitur, & si retineatur diutius, in atram bilem exquisitam transit, & extra vasa nigrescit ac corrumpitur, unde multis, interitus contingit. Ideo Hippocrat. dixit: Sanguinem supra ferri quaecunque sit malum, infra autem bonum, cum niger deiecitur, natura excremento melancholico leuata, unde morbi graues solui possunt & declinari, quamuis distinguendum, ut antea dictum est, num vi symptomata, natura aut arte exeant, & inde fructus subsequatur. De his omnibus diximus. Restat quarta & vltima, quæ proprie dysenteria dicitur, quæ nihil aliud est, quam intestinorum ulceratio, cum & minutim & exiguo tempore modo sanguis verus, modo concretus, non sine pure, imo ulcerum crustula, Græci *κεκαυδης* dicta excernuntur, & membranosa quadam corpora, quæ intestinorum sunt particula, cum & stercus subinde guttis sanguinis sit conspersum. Et hæc dysenteria ab Aetio proprie dicitur exulceratio intestinorum serpendo depascens. Cuius tres etiam gradus sunt, iuxta Galenum 6. de loc. affect. & Aetium. quorum vnus gradus est, cum quadam corpora pingua excernuntur: post hæc, vbi ramenta quadam intestinorum abrasa, eorum superficie interiore, quæ membranosa existit, succedit. Tertia differentia, cum aliquid ex ipsa abraditur substantia intestinorum, quo tempore non adhuc fieri dysenteriam, sed iam factam atque constrictam esse dicimus, ut ipse Galenus inquit. Pars affecta consistit in ipsis intestinis. Sed vtrum crassa vel tenuia, id postea distinguendum. Estque hic affectus semper morbus in soluta continuitate, ut patet apud Galenum 6. de locis affect. & 12. method.

OBSERVATIO XXXII.

De dysenteria, in qua pituita muscosa & purulenta quadam cum sanguine deieciuntur.

PETRVS Saffinius, nauta & pistor Alcmari-
nus, Anno 1556. in autumno in dysenteriam incidit valde malignam, cum ulceratione vehementiore & excoaratione, cum etiam eo tempore publice grassarentur dysenteria: Morbus enim hic frequentissimus est, imo vulgaris sæpe, æstate & autumno maxime affligens, omni ætati eueniens, a quo & multi periclitantur. Hic autem per duos menses modo mucosa, pituitosa & purulenta cum sanguine deieciabat, modo melancholica, non sine magno dolore, ita ut tandem etiam ramenta intestinorum subsequerentur. Multis tunc tentatis remediis tam per mulieres, quam per empiricos, cum semper peius haberet, me tandem vocauit, ut fieri apud nostros plerumque solet. Dedi lotium ex decoct. hordei non excoarcati, cum paucis sacchar. rubeo per os, cum clysterem admittere nollet, quem ad dolorem paraueramus, (qui habebat decoct. hordei parum torrefacti, cum nimis diu durasset, & maiori adstrictione opus esset, quam in principio) lb. j. oleo ros. omphacini, myrtini. ana ʒ j. seui ouill. (cum hircinum deesset) ʒ j. vitellum vnius oui, sacchari rubei. ʒ j. mellis ros. colati ʒ ss. fiat clyster. vix tepide iniiciatur. Sed cum eum non admitteret, post lotium medicamentum per os exhibitum, ita eundem purgaui. ℞. corticum myrobal. chebul. indorum. ana ʒ j. myrobal. citrinorum (nam aderat etiam bilis intestina vellicans) ʒ ij. ss. bulliant in aqua plantag. ʒ viij. colatura huius ascipe ʒ ij. adde rhab. optimi parum tosti, pulu. ʒ j. si fuisset in principio, non adiecissem torrefactum, sed ita ut est in sua substantia: cum enim prauis humores ad partem affectam defluunt, causa primum auferenda est medicamenti cholagogis: nam ii humores magna ex parte acres sunt, ut bilis, non raro pituita falsa, interdum melancholia per adustionem. Qualis sit, excrementorum color & tormina ostendunt, de quibus latius in scholio, cum de causis loquemur. Sed eiusmodi cholagogis, inquam, utendum, quæ constrictionem quandam relinquunt, nec acrimoniam augent, nec multum laxant: ideo rhab. myrobal. conueniunt, minus catholicum, nisi tanta esset humorum copia in principio: at hic principium pertransierat, ideo addebam rhabar. parum torrefacti ʒ j. syrup. cotoneorum, syrup. ex infus. ros. rubear. non prouincialium seu pallid. ana ʒ ss. misce. Quod cum in diluculo sumsisset, habuit inde octo sedes, quamuis materia plurimum deinde fuit adæquata, & minus purulenta aut sanguinolenta, & coepit inde melius habere, cum sedes sine excoaratione procederent. Et ita materia satis repurgata, cum paulatim ad restringentia deuenirem, etiam victu adstringente præscripto, ad lac ad tertias decoctum perueniendo, deinde ad oryzam & mespila, conseruam ros. antiquam, ad trochis. de spodio, tandem dysenteria cessauit, & ab ea optime curatus: ut & alij multi euaserunt, quibus in principio etiam hæc potio profuit. ℞. rhabarb. ʒ j. myrobal. citrinorum ʒ j. cum aqua hordei perfecte cocti ʒ ij. ss. syrup. ex infus. ros. vel capill. ven. ʒ ss. Hoc enim in principio bene purgat & ad-

stringit satis. Soleo etiam in principio quandoque dare fortem expressionem rhabarb. deinde rhabarb. in tota substantia. Si febris adest, aut ardor vehemens, addo pulpam thamarind. vel semina berberis ad obtundendam bilis acrimoniam. Plurimos curavi etiam in principio, clystere parato *ex lacte, decoct. cum radic. althææ & iniecto*: hic detergebat & dolorem mitigabat, & simul faciebat ad tormina, nec non ad ulceris deterfionem & consolidationem. Post deterfionem, sæpe hoc vel simili clystere magis adstringente, si opus esset, commode usus sum. *℞. rad. consolida maioris, bistorta. ana ℥ ij. tappi barbari cum radic. plantag. ana m. ℔. gallarum nucis cupressi. ana ℥ ℔. florum malvæ arborea, flor. ros. rub. ana p. j. fiat decoctio in aqua cysterna vel pluviæ, & in lb. vna vel vna cum dimidia, adde succi plantag. vel sanguinaria. ana ℥ j. i pinguedinis hirci ℥ ij. fiat clyster.* Pulveres clysteribus non adiicio: quia si remanerent supra partem affectam, eam pungerent & stimulerent, ac vix euacuarentur. Id quod vidi in quodam Roterodamensi, qui longa dysenteria laborabat, cui medicus clysterem præscribens, ei magna copia bolum rubrum pulverisatum adiecerat, ita ut totus clyster nil nisi bolus esse videretur: quod vulgares spectantes, cum hic æger viribus consumptis ex dysenteria moreretur, medicum culpabant. Verum, si aliquando pulveribus sit utendum, nunc accipio sanguinem draconis, bolum armenum, aut terram sigillatam, vel similia, & iubeo, ut in succis herbarum vel in decocto infundantur, deinde succi vna colentur, vel decoctum ipsum, & postea hæc ipsa iniiciantur: Ceterum nostro Saffinio, cum probe esset curatus a dysenteria, adhæsit aliqua debilitas stomachi: sed cum vteretur hoc condito bis ad magnitudinem castaneæ, hoc modo parato, melius habebat. *℞. conferva corticum citri conditi, conferva ros. ana ℥ ℔. conferva buglossæ, diacydon. sine speciebus. ana ℥ ij. specierum diarrhod. abb. trionfant. ana ℥ j. specier. arom. ros. ℥ ℔. cum syrup. capill. ven. acetosi simplicis & menthaces: ana q. s. fiat conditum.* Et quia non febricitabat, ob debilitatem concessi vinum rubrum cum aqua seminis coriandri lymphatum, inuncto etiam ventriculo oleo mastichino, cotoneorum, myrteo & absinthii simul mixtis. Quibus præfidiis & stomachi imbecillitas cessavit, & pristinam recuperavit sanitatem.

S C H O L I A.

6. *Causa externa.* Antequam ad signa progrediamur, prius de causis huius morbi agamus: quæ quidem sunt modo externæ, modo internæ. Ab externis initium capit dysenteria, cum originem suam habet a nimio frigore, ardore, venenatorum pharmacorum potu, adamante contrito, lythargyrio, colocynthide male contrita inter portiones ex antimonio: nam ex eo novi quendam, qui plus centies inde secessum habuerit, & plurimos qui in dysenteriam deinde collapsi sunt, ex damnatis cibis, peregrinorumque & acrium ciborum acceptione. Iam etiam ex cruditatibus, & quæ iis simi-

lia existunt: quorum singula absque labore facile percipimus, vel ex astantium relatione. At internæ causæ cuncti humores, acres atque mordaces esse poterunt, siue a toto, siue ab aliqua corporis parte ad intestina confluant, siue in ipsis fuerint geniti. Hi vero sunt aut flava bilis, a qua magna ex parte incipit dysenteria, ut liquet comment. *aphorism. 28. lib. 4.* aut atra, ut ibidem apud Hippocrat. & Galen. loquitur. Vtrique enim acritudo inest. Vnde Hippocr. 7. *aphor. 23.* a deiectione syncera, dysenteria fit. Appellat, inquit Galenus, synceras impermixtas pravas, qualis bilis utraque. Non enim a pallida bile fit vlcus, neque a nigro sanguine cui permixtus sit melancholicæ succus, sed ab his synceris. Cum bile autem comprehendo omnia vitiosa bilis genera, ut porraceam, glastinam, vitellinam. Ab his enim fieri potest, & quidem ita videmus fieri sæpe, ut aliquod horum generum, sæpe & omnia excernantur in eodem morbo. Verum etiam ab ipsa falsa pituita, eodem Galeno teste, comment. *Aphor. 12. 3. lib. & apud eundem 6. aphor. 2.* Hæc autem aliquando ab initio in capite gignitur, ex calore loci talis effecta. 3. *aphor. 12.* aliquando talis efficitur putredine in ventre. Neque aliquid obstat, quin admisceantur illi serosæ, & tenues sanies putridæ, atque ita exulcerent. Facit enim mora ad mali generationem. Hanc vero habet ex modo substantiæ: hæret enim lentore suo, 3. *aphor. 12. vnde & 3. epid. 22.* Tenesmi, inquit, (id quod & de dysenteria intelligere possumus) difficiles sunt a falsa pituita: quoniam multum hæret, neque facile eruitur. Similiter & bilis genera, vel atræ a venis profluunt. Causa vero generans, calor earum partium est: vel natura sumtorum, quæ facile in acres humores mutantur, vel quia calida sunt, vel multa humiditate prædita facile putrescunt. Putredine autem acria euadunt. Sic igitur æstate fiunt maxime, tum ob calorem aeris exurentem, tum ob fructus plurimos humidos, qui comeduntur per oporam. Inde pueri cum minime acres succos gignunt, incidunt in hunc morbum ex putredine, & quoniam illa immoderatus sumunt: per autumnum vero cum acria excrementa circa extimas partes genita, refrigerato ambiente rerinentur, & intus pelluntur ad corporis media. Sequitur vero plerumque tales synceras excretiones, ita ut initio eæ deficiantur: postea pituitosi quidam muccores cum dolore excernantur: demum cruenta deiectio, cum tenuibus ramentis internæ tuniculæ, quæ densa est & tenuis, similis illi, qua tegimur, quam epidermida dicunt. Quod si malum procedat, & purulenta deiectio fit. Et si depascat vlcus, etiam carunculæ quædam inveniuntur, quando vlcus ad crassiores intestini partes deuenit. Fit etiam dysenteria aliquando præcedente diarrhœa, vel tenesmo. Quod veto plerosque tenesmus dysentericus præcedere soleat, apud Aerium & Paulum, atque Alexandrum liquet. Poterit quoque ex inflammatione dysenteria fieri, quam ex eisdem signis facile percipies. Et quisnam humorum prædictorum efficiat, distinguens ex qualitate eorum

rum, quæ excernuntur, simul cum ætate, ac temperamento ægotantis, tempore anni, vita antea-cta, ac reliquis similibus, Quæ omnia melius innoscent exemplis mox subsequen- tibus. Hic Neoterici quidam seipsos excruciant, num ex sanguine possint fieri dysenteria? Respondent, ex puro sanguine non posse fieri, sed ex acuto & bilioso, vel bili permixto, quanquam ex supradictis maxime fieri volunt medici præstantiores, potius ex humoribus synceris iam dictis.

OBSERVATIO XXXIII.

De tribus dysentericis, vno ex intestinis gracilibus laborante, altero ex crassioribus, & tertio ex ambobus.

Signis vti semper oportet, non ad affectum modo discernendum, sed etiam ad affectum locum, & causæ qualitatem. Hæc enim tum ad præcognitionem, tum ad curationem faciunt. At signa causarum, quemadmodum iam diximus, facilia quidem sunt, visu usurpata in exercitatis. Iam quoque ipse affectus facilis est cognitu, primum visu, quoniam excernuntur talia, quæ diximus: & eo ordine de dolore transigendum, quoniam propter ulcerationem, tum bilem synceram & atram ac pituitam saltem dolor excitatur. Sed pars affecta exquirenda diligentius est, quoniam ea non vna est, sed multiplex: nam modo intestina gracilia, modo crassa laborant. Sic nobis oblatis fuerunt tres laborantes dysenteria: quorum primus ex ulceratione gracilium intestinorum difficillima & non sine magno periculo decumbebat: alteri vero crassiora affecta erant: in tertio tam superiora & gracilia, quam inferiora & crassa. Cuius ad primum ingressi essemus, diligentissime hæc signa obseruauimus: nam huic tormina antecesserant, & supra umbilicum maximos cruciatus sentiebat, & humor paulatim sine stercore cum quibusdam ramentis fluebat cum sanguine, & ramenta minora erant, doloresque diuturniores, nec alius protinus post cruciatus soluebat. Quibus signis conieci, intestina gracilia ulcerata esse. Cruor enim (ut hic) mixtus erat cum extremis vniuersis; quod signum erat ex d. de loco affecti. Apud Galenum, superiora intestina & gracilia læsa esse, crustulæ quoque tenues. Nam & tenuibus intestinis exulceratis (testo Aetio) dolores circa umbilicum consistunt, biliosaque & porri colorem habentia, atque omnino variegata stercore commixta, citra tamen ramentorum complexum, cum torminibus & mordacitate, desperationeque ac exsolutione, ut non procul ab animi deliquio æger absit: ac siti infestatur & febricitat. Si ieiunum intestinum exulceratum sit (quod raro accidit) egestiones crudiores apparent, nigriorem sanguinem vehementer implicatum habentes, bilemque abunde flauam; sitis multa, itemque nausea affligunt. Vomunt etiam aliquando ac cibos auersantur: dolor vehemens supra umbilicum considerat, & quandoque febres malignæ oriuntur: fiuntque ita affecti decolores, & ad animi deliqui-

um usque sudant: vires etiam ipsorum cito deficiunt, neque procul ab interitu absunt: rosione etiam infestant, non statim, sed post aliquod tempus æger ad excernendum virgetur, inquit Alexander Trallianus. Cum itaque ex notis cognosceremus intestina superiora & gracilia oblata esse, in primo hoc ægro, curationem instituimus auxiliis illis, quæ per os assumuntur. Hoc est, quod Paulus nos monet: Si signa, inquit, stercore commixta cum torminibus videris, in gracilioribus intestinis exulcerationem dignosces, quæ auxiliis per os assumtis curatur. Idem Galen. cum 5. method. tum 6. de loc. affect. sentit, quod quæ in tenuibus habentur, ab epotis medicamentis magis præsidium recipiunt. Quæ enim vicina ventriculo sunt intestina, si ulcerata sint (ut hic erant) iis per comesta & bibita succurritur. Ideo huic primo ægro dedi primo rhabarb. optimi infusi ℥j. cum ℥ij. decoct. hordei non exorticati, syrup. de ribes ℥ss. misce. Postea imperavi, ut bis aut ter in die existis syrupis caperet cochlear vnum. ℥ syrup. de agresta, si desit cotoneorum, myrtini, & rosæ sicci, de succo portulacæ, ana ℥j. Eodem modo potest etiam parari ex succo plantaginis & polygoni. Deinde ad maiorem restrictionem dedi hunc puluerem: ℥ myrobalan. citrinorum ℥j. rhabarb. parum torrefacti ℥j. dabam cum syrup. cotoneorum. Memini me hunc puluerem anno 1583. mense Augusto viro dysenterico cuidam dedisse cum cyatho vno ceruiciæ communis: & ad miraculum eo solo curatus fuit. Ita & Scoto cuidam nobili hoc sequens commode exhibuimus. ℥ hordei communis parum tosti p. j. rad. consolidæ maioris, rad. tormentill. ana ℥ij. plantag. polygoni, bellidis minoris, acetosæ, ana m. j. sem. lini parum tosti ℥ss. sem. portulacæ ℥j. glycyrrhizæ ras. ℥ij. coquantur in aqua communi pro ℥vj. colat. adde syrup. de portulacæ, cotoneorum, myrtini, ana ℥ss. misce pro duabus dosibus. Interea & noster hic primus æger semper ante cibum sumebat ℥ij. vel ij. diacydonis sine speciebus. Postea exhibuimus micletæ Nicolai ℥ij. trochisc. de spodio ℥ss. Victu constringente vtens, præter opinionem conualescere cepit. At cuidam in insigni Solis commoranti Delphis, eodem modo, sed peius, laboranti varia fuerunt præscripta: ut hic haustus. ℥ flor. rosæ rub. p. j. plantag. bellid. minoris, ana m. j. sem. plantag. end. ana ℥ss. cortic. myrob. empelit. belliric. ana ℥ss. coquantur in aqua communi: & huius colat. accip. rhabarb. pulu. parum tosti ℥j. micletæ Nicolai ℥ss. syrup. coton. ℥ss. misce, atque hoc remedio videbatur quasi curatus. Sed cum victus rationem non bene obseruaret, rursus post aliquot dies fluxus rediit. Capiebat ad libitum ex syrup. de ribes & coton. & semel hunc potum. ℥ syrup. coton. ex infus. ros. ℥ss. aquæ portulacæ, plantaginis, ana ℥j. ℥ss. micletæ Nicolai ℥j. misce. einde. ℥ acetosæ m. ij. plantag. bellid. minoris, ana m. j. sem. 4. frig. maior. sem. portulacæ, acetosæ, ana ℥ss. fiat decoctio in aqua communi pro ℥vj. colat. adde syrup. de ribes ℥ij. syrup. de portulacæ, de succo acetosæ, ana ℥ss. misce, fiat syrup. pro duabus dosibus. At hic diu decubuit & semper peius habuit: multis & variis astringentibus & conditis

15.

16.

descriptis, nihil profecimus; neque vnguentis, neque linimentis ac diuersis aliis remediis. Videbatur huic malum esse in ieiuno intestino: quod plerumque difficulter curatur & lethale maxime existit; *ut in scholio latius*. At secundus æger, qui nobis oblatus fuit, contraria signa habebat; eratque dolor sub umbilico minor, ac minori spatio perseuerans; & a cruciatu statim sellam petebat, & ramenta intestinorum maiora conspiciabantur, neque humor ita aquoluserat, & minoris graueolentia. Cum itaque etiam pingue quid viderem cum excrementis excerni, coniiciebam intestina crassiora affecta esse, *iuxta Galen. 6. de locis affectis*: & quia cruor supernatabat, in humilioribus intestinis ulcerationem consistere animaduerti. Nam, *ut recte ait Aetius*, cum circa intestina crassa ulceratio contingit, stercora, quæ egeruntur multa sunt, & coaceruata cum flatibus aliquando etiam spumosa: pingua quoque cruenta excrementis admixta apparent, inexplibilisque edendi appetitus oboritur. Quæ cum in hoc ægro spectassem, ad ea remedia confugiebam, quæ per sedem infunduntur, quæ & hic magis conferunt. Statim iniicere iussi clysterem ex decoct. hordei communis lb j. adiciendo *zaccchari rubei* ℥ j. ℞. & *duo vit. lla onorum*: postea ex lacte decocto cum rosis, & adiecto succo plantaginis. Quia autem malum hoc non diu durauerat, nec progressum fecerat, istis clysteribus facile curatus fuit. Tertius vero fuit consul Terneremundanus, qui in hospitio prope pharmacopœum dysenteria laborabat; & ulceratio videbatur in medio situ intestinorum posita, *iuxta Trallianum, lib. 8. cap. 7.* Vbi neque deiectiones iis, quæ ab ulcere emanant, admodum permixtæ, neque omnino discretæ apparent, coniiciendum est, in mediis potius intestinis affectum esse. Et tunc requirunt, & quæ superius, & quæ per sedem infunduntur, *Galenos teste lib. 4. methodi medendi*. His subsequentibus præsidii curatus fuit anno 1584. mense Aprili. ℞ decoct. hordei communis non excorticati ℥ iij. syrup. ex infus. ros. syrup. de ribes, ana ℥ ℞. misce. ℞ amygdal. dulc. depil. ℥ ij. cum aqua fursuris, fiat amygdalatum pro lb j. dulcoretur parum cum zacccharo perlato rosaceo, *ut artis est*. ℞ rob. de ribes, conseruæ foliorum acetosæ ℥ ℞. diacydon. sine speciebus ℥ iij. conseru. ros. ℥ ij. syrup. coton. ℥ ℞. fiat mixtura. Prius hoc apozemate assumpto. ℞ foliorum plantag. bellidis minoris, ana m. j. hordei communis, flor. ros. rub. an. p. j. corticum myrobal. citrinorum, empelitic. an. ℥ j. ℞. vuar. cum arillis ℥ j. coquantur in aqua communi pro ℥ ix. colat. adde, decocto prius manibus confricato, syrup. cotoneor. de ribes, an. ℥ j. misce, & fiat apozema pro tribus dosibus. Vesperis sumebat amygdalatum cum aqua oryzæ confectum, pro lb j. adiecto ad meliorem saporem zaccchar. perlato. ℞ diacydonii sine speciebus ℥ j. ℞. capiebat ℥ ij. vel tres antecibum. Deinde sumebat ex hoc condito: ℞ conseru. ros. antiquæ ℥ j. cornu cerui vsti ℥ ij. corall. rub. subtiliss. pulu. ℥ j. sem. plantag. parum exsiccati & puluer. ℥ ij. trochisc. de spodio, cum sem. acet. ℥ j. syr. co-

toneor. q. s. fiat conditum, capiebat bis terue in die, ad magnitudinem castaneæ. Clyster hic quoque iniectus est frigide, vel vix tepide. ℞ decoctionis hordei parum torrefacti ℥ xij. chalybs ignita in eo decocto exstinguatur bis terue, succi plantag. ℥ ij. ℞. olei ros. ℥ j. ℞. olei myrtini ℥ ℞. sacchari rubei ℥ j. vitellum vnius oui misce, & fiat clyster. ℞ amygdal. dulc. depila. ℥ ij. cum aqua oryzæ: fiat amygdal. pro lb j. & zaccchar. perlato parum dulcoretur. Sed & hoc enema iniectum fuit. ℞ lactis bubuli chalybeati ℥ viij. succi plantag. ℥ iij. axungie hirci ℥ j. vitellum vnius oui misce, pro clysteri. Etiam ob dolorem in ano, & ad constringendum, fumigium sequens in anum recipiebat, subitus in sella perforata sedens. ℞ massici, olibani, ana ℥ j. granor. myrti, flor. ros. rubear. an. ℥ ℞. fiat pul. subtilissimus, pro fumigio. Et hoc decocto sequenti vsus est. ℞ rad. consolida maioris ℥ j. sanicula, bugla, plantaginis, bellidis minoris, polygoni seu centumnodii, an. m. j. flor. ros. rub. p. j. hordei non excorticati m. ℞. sem. acetosa, plantag. ana ℥ j. sem. 4. frig. maior. ana ℥ ℞. myrobal. omnium parum tostorum, ana ℥ j. coquantur in aqua communi pro lb j. manibus decoctum fricetur cum tepuerit: colatura addendo syrup. ex infus. ros. commun. cotoneorum, myrtini, ana ℥ j. misce. fiat apozema pro 4. dosibus. Sed postea ægre potuit mingere: at appposito hoc cataplasmate minxit. ℞ parietaria m. iij. cum butyro in sartagine frigrantur, & fiat cataplasma. Pro fluxu dysenterico, hoc vnguento ventrem inungebat. ℞ olei mastichini, myrtini, cydoniorum, ana ℥ iij. florum ros. rub. coralli rub. myrtill. an. ℥ ℞. caryophyl. ℥ j. ceraparam, fiat vnguent. *ut artis est*. Insuper & hic fatus præscriptus. ℞ flor. ros. rub. verbasci, ana m. j. absinthii Romani, mentha sicca, ana m. ℞. sumach, sem. myrtill. corticum granat. balaust. ana ℥ ij. incidenda incidantur, & contundenda contundantur, & coquantur in vino Gallico rub. adstringente pro lb ij. fiat fatus. Hoc quoque amygdalatum sumfit. ℞ amygdal. dulc. depilat. ℥ ij. sem. 4. frig. maior. mundat. sem. papa. albi, ana ℥ j. cum aqua, in qua chalybs ignita bis terue exstincta fuerit, fiat amygdalatum pro ℥ x. addendo zaccch. perlatum, pro sapore. In cibo utebatur sumach seu rhu obsoniorum, ad maiorem adstrictionem. Sed & hic clyster ad maiorem adstrictionem iniectus est. ℞ polygoni, plantag. bursa pastoris, flor. ros. rub. verbasci, an. m. j. rad. consolida maioris ℥ ℞. corticum granat. balaust. ana ℥ ij. hordei communis p. j. sem. lini parum tosti ℥ j. ℞. coquantur in aqua pluuiali chalybeata q. s. huius colatura accipe ℥ viij. succi plantag. ℥ ij. trochiscorum de carabe subtilissime tritorum ℥ j. ℞. olei myrtini, ros. an. ℥ j. misce, fiat clyster. Post aliquot dies accepit has pilulas bis aut ter. ℞ trochisc. de carabe, de terra sigillata, de spodio, cum sem. acet. an. ℥ j. cumini preparati ℥ ℞. fiant pilula xv. dentur quinque pro vice. Ultimo capiebat post aliquot dies omni mane ℥ ij. vel ℥ j. ex hac mixtura. ℞ micleta Nicolai ℥ ℞. pulu. myrobal. citrinorum ℥ j. seminis plantag. parum exsiccati & puluerisati, cornu cerui vsti, an. ℥ ℞. syrup. myrtini ℥ ij. fiat mixtura. Atq; his præsidii dictis, cum ultra menssem decubifuer,

17.

18.

tubuiſſet, & parum ſpei ab æſtantiſus ſuper-eſſet, egregie curatus fuit.

S C H O L I A.

19.

Signa præſagientia dyſentericæ.

Signa vero cum alia ſint præſagientia, alia demonſtrantia, alia differentiam aperientia; rurſus quædam mera prognostica: ſigna autem præſagientia dyſenteriam varia eſſe poſſunt. Nam ſi hyemem aquiloniam videamus, ver australe & pluuiolum, calidam æſtatem, æſtatis fine & autumno, dyſenterias futuras pronuntiabimus, maxime otioſis, intemperatis & quibuſdam naturis peculiariter, vt lenticiniſis. Nam antecedentibus anni partibus pituita cralla & viſcida in inteſtinis colligitur. Quod ſi bilis non pro ratione e cyſti fellis in inteſtinum deſluit, nec eam pituitam pro conſuetudine deterget, multo copioſior pituita in inteſtino, & bilis toto corpore aceruatur, acceditque cruditas. Hæc omnia æſtuo calore putreſcunt: primumque illa pituita acris euadit, inteſtina vellicat; ſit deiciendi appetentia, inanis aliquando, & interdum pauca; vel cum maximo conatu mucoſa, & ſimilia albuminibus onorum egeruntur. Hoc malum tenefinum appellati volunt, non dyſenteriam. Vbi tamen frequens hæc cupiditas egerendi ſit, dyſenteriam futuram poſſemus prædicere; magisque ſi ſigna illa ſuperiora præceſſerint. Iam quoque ſi quis diarrhæam acutam bilioſam habeat, eaque tempori non curetur, dyſenteriam futuram pronuntiabimus. Et ſi videamus multa ad-eſſe tormina in ventre, facile poterimus prædicere futuram dyſenteriam, magis hyeme aquilonia præcedente, vere australi & æſtate calidiore ſubſequenti. Hoc modo anno 1556 populatim per totam Hollandiam graſſabatur dyſenteria. Quod ad ſigna demonſtratiua attinet, vt iam dictum eſt: facile cognoscuntur ex morſu, dolore, humore mordaci inteſtini erodente, abraſione interaneorum, & crure exiguo tempore & minutim excreto. Gradus dyſentericæ iam antea ſcholio obseru. 31. huius libri diximus. Neoterici addunt ex Auicenna per eſſentiam inteſtinorum fieri: atque id deprehendi ex diſpoſitione doloris & puncturæ & ulcerationis. Per conſenſum vero, ab aliis membris humoribus confluentibus ad inteſtina, ac abradentibus ab hepate vel liene, petuntur ex diarrhœa ſupraſcripta. Interea, vt diximus, differt dyſenteria ab hepaticis excretionibus cruentis, in quibus nihil abraſum expellitur: atque interdum duorum, aut trium dierum interuallo ſupprimitur euacuatio: deinde rurſus redit malum, excernuntque excrementa. Id vero per inteſtinorum ulcerationem nequaquam apparet, quoniam in iis neque affatim, neque ex longis temporum interuallis laborantes deicere conſueuerunt, Galeno teſte lib. 6. de loc. affect. Ab hepate. Item ab initio tenuis ſanguinis ſanies deſicitur, deinde aucto malo, craſſus humor fecibus vini haud abſimilis, vt idem Galen. inquit. Ex iis itaque interſtingues hanc dyſenteriam proprie dictam ab iis, quæ ab hepate procedunt. Sciendum tamen, iuxta Aetium, lib. 9. capit. 42. quod aliquando

25.

Demonſtratiua.

Differentia indicantia.

Quibus differt ab hepaticis excretionibus.

21.

oboriatur abſceſſus in inteſtini, ad cuius eruptionem aliquationes puris aquoſi conſequantur: quare ignari ac inexperiti hoc viſo decipiuntur, dyſentericam hanc affectionem eſſe putantes: & ſane, vt verum fatear, ſi poſt eruptionem diuturna ſit exulceratio, & perſeueret, eo modo, quo dyſenteria, curatur: verum in principio neuiquam conſimili curatione ſubducitur. Vnde etiam quosdam agrotos periclitatos eſſe conſtat, male ab indoctis medicis tractatos: qui ſtatim in principio dyſentericas infuſiones adhibuerunt. Pro viribus itaque affectiones hæc inter ſe diſtinguantur. Indicatu enim facilia exſiſtunt: In abſceſſu enim ſemper pulſatilis dolor præcedit, iuxta affectum locum immitens: neque morſus neque decurſus adſunt, quales in dyſentericis præcedere conſueuerunt. Deinde mutatione in ſuppurationem incipiente, rigores inæquales conſequantur, febresque circa vespæram maxime irruentes: poſtea ubi perfectæ humidæ mutatio fuerit facta, omnes moleſtia minores ſiunt, vehementesque dolores remittunt: deinceps eruptionis tempore accedente, rurſus dolores intenduntur: aliquando autem perfectæ ventris adſtrictio adeſt. Poſt eruptionem vero humor, qualem diximus, excernitur, quum nihil tale in dyſentericis oboriatur. Aliter quoque curatur ex ſem. lini & adſtringentibus, vt palma, coroneis ad cataplaſma commixtis, & infuſo ſucco ptifanæ aut halicæ, verentes valde aſtringentia. Adhibentes alibæam & caricæ, cum ſimo columbino, ad eruptionem. Eruptioni obuiam imus infuſ. ptifanæ ſucco, deinde modico mellis adiecto ad repurgationem: & ſi ſordidiora ſint lenticulæ decoctum, malicorium, ad ptifanæ ſuccum mel affundentes. Repurgatis vlcèribus a melle abſtinet, & infuſ. paſtillum de hgli-cacabo adiicit. Hactenus Aetius. Sed rurſus ad dyſenteriam redeamus. Quibus modis cauſæ diſtinguantur, ex obseruat. 32. Scholio ſatis conſtat, reſtat, vt ſigna Prognostica hic addamus. Quantum periculi agro immineat, ex priuatis notis ſic diſtinguemus: Primum ex ſede affecta. Laborantibus enim ſuperioribus inteſtinis, grauiora ſiunt ſymptomata, vt tunc obſervatione præcedente oſtendimus; nempe cibi faſtidium vehemens, nauſea, vigiliæ multæ cum dolore, vnde virium defectus. Et quia difficile curantur eorum vlcera, vt Galen. inquit de vlcèribus 6. meth. Et Hippocrat. Si tenue inteſtinum diſciſſum fuerit, non coaleſcit, idque ob venarum copiam, & quia ſyncera adhuc excrementa ſuſcipiunt. Et ſic, vt paulo ante diximus in obseruat. præcedente, quæ ſit in tenuibus inteſtinis, difficulter ſanatur; maxime vero in ieiunio, ex Aetii decreto. Quæ in inferioribus, facilius curatur; & in inteſtino recto accolo conſiſtens dyſenteria facile curabilis exſiſtit. At ex natura cauſæ ſic diſtingues: Quo deteriori conditione humor fuerit, eo peior morbus. Vnde ab atra bile inſanabilis morbus, ſecundum Hippocratem 4. aphoriſm. 43. Sed ille, qui longo tempore in parte orientali Delphis ex dyſenteria laborauerat, cum atram bilem ſæpius excerneret, tandem obiit, & ſic quæ a præſina & ſynceriores bile fuerit, prauior. Orata tamen dyſenteria a flaua bile ſæpe curari poterit; quem-

22.

Signa Prognostica.

23.

admodum si ab atra bile dysenteria oboritur, infanabilis omnino existit, cum nihil differat a cancro ulcerato. Galeno teste, comment. aphorism. 24. 4. lib. in quo aphor. dysenteriam, si ab atra bile inceperit lethalem esse, decretum reliquit Hippocrat. Idem confirmavit Aetius, hanc Hippoc. & Galeni sententiam dilucidius scribens, cum dixit: *Si igitur ab acris cibis, aut a flava bile dysenteria oboritur, fere in totum ipsam curamus: si vero ab atra bile initium sumat, si quidem ratione iudicationis febrilium morborum atra bilis excernatur, transituque suo intestinum distendat, etiam hanc curare non desperamus.* Si vero sua sponte, nullo præcedente febrili morbo; neque concoctione bona apparente, atra bilis excernatur, immedicabilis dysenteria ex ea oborta existit, nihilque a cancro exulcerato differt, estque omnino lethalis. Namque morbis quibuslibet incipientibus, si atra bilis vel superne, vel inferne exierit, lethale est, inquit Hippocrates aphor. 22. Et si lib. de atra bile Galenus, (*quemadmodum etiam citatur ab Alomatari*) velit semper exacte atræ bilis humorem lethaliter excerni; experientia id comprobans in illa pestilentia prolixiore, æstate orta, in qua, qui puram exactamque atram bilem deiecerunt, omnes perire. Non propterea sibi ipsi (*inquit Alomatari, comment. præcæti aphorism. 22. 4. lib.*) nec Aetio pugnat. Nam ubi exacta fuerit atra bilis, absque signis coctionis semper lethaliter excernitur, ac exitialis casus est: Præcedentibus autem coctionis signis, ubi ea excernatur, neque pura, neque exacta atra bilis erit, sed bonam significabit euacuationem, cum a natura corpus expurgetur, *ut idem Galen. inquit præcæto aphor.* Quin imo a qualibet deiectione syncera, hoc est, impermixta aquosæ humiditati, siue humor, qui eiicitur flava sit bilis, siue atra, dysenteria malum est, *ut inquit aphorism. 23. 7. lib.* Pessimæ quoque sunt, in quibus, quæ excernuntur, porri aspectum habent, suntque nigra plurima, varia, graueolentia, & quando vna cum excrementis sordes pelliculis magnis commixtæ excernuntur. At lienosis superueniens dysenteria, bonum inquit Hippocr. aphorism. 48. 6. lib. quando humores crassi, ac melancholici, qui lieni erant infarcti, transponuntur, ac euacuantur. Neque hæc sententia aduersatur aphor. 24. 4. lib. Nam ibi de atra bile, hic de succo melancholico loquitur, ex quo etiam dysenteria oriri potest. Quod si eadem immoderata, ac diuturnior fiat, malum est, *ut liquet aphor. 43. eiusdem lib. 6.* quemadmodum ante annos aliquot vidimus in viro quadragenario, qui cum diu laborasset hoc modo, postea nos ad se vocavit: sed vitam adhuc diu protrahens, tandem mortuus est. Ideo diligenter quoque cauendum, *ne sanguinem concretum in intestinis coaceruatum, & postea excretum referas ad atram bilem.* Nam & nos plurimos vidimus etiam in dysenteria sanguinolenta cum dolore excreuisse pici similia, & tamen euasisse, ut alias diximus. Vidit quoque Hollerius (*teste eiusdem interprete*) quosdam, qui simile quid crassiori pici, nullo periculo & sine febre, deicerent, & nos idem in quotidiana praxi sæpe specta-

uimus, etiam istis diebus in muliere Delpheni, quæ enasit. Alios quoque cum febre & periculo euasisse constat. Monachus quidam (*ut idem Hollerius inquit*) apud D. Genoueam dysenteria laborans, cum vi morbi frigerent extrema, nigra, liquida, pici similia deieceret, spiraret difficulter, & iam de funere disputaretur, conualuit. Anno 1557. autumnno, tempore bene constituto, pestilentissimæ febres extiterunt, & quæ plurimos sustulerunt. Dysenteria salutare. Nemo enim in multis, quos vidit Hollerius, interiit. Curabantur clysteribus leuibus & rhab. erant enim ab acri fluxione. Sæpe quidem, sed pauca, egerebant. Parum febricitabant; ac rheo dato conquiescebat dolor. Sicque breui liberabantur. Anno subsequenti, autumnno quoque dysenteria multæ, in quibus viridia, cærulea, nigra, biliosa, cruenta deiciebantur, & qualia scribuntur lethalia: tamen omnes prope euaserunt, cura etiam parum sedulo adhibita. Hoc tempore Delphis in Batavia apud nos pestis sæuissimæ, at nullæ vel paucæ admodum dysenteria. At ubi a pituita salsa longiori tempore mordente, atque abradente intestina orta fuerit dysenteria, crudelissima ea existit, *eodem Gal. auctore comment. aphor. 12. lib. 3.* & propterea periculosior, quam si fiat ex bilioso humore: nam biliosus humor transfundo affligit. Hic autem, cum sit lentus, moram trahit, & sua cunctatione amplius exulcerat, suoque lentore & transitu per intestina inheret, ac tardans semper aliquid dedit, *ut idem Galen. inquit,* non autem ita exitialis erit, ut ea, quæ ex atra bile oritur. Sed & ab adiunctis affectibus hoc modo prædicere poterimus. Quibus enim symptoma est prauarum febrium, omnes maxime periclitantur, quoniam febris irritatur dolore, & vigiliis, & motione crebra corporis. Præterea significat causæ prauitatem adesse in venis: itaque signum mali moris febris erit. Sic etiam Aetius: *Graues sunt dysenteria, quæ cum vehementi inflammatione oboriuntur, quæque cum febre ac deperditione appetitus.* Dysentericus quoque (*teste Sorano Ephesio*) si post aurem sinistram papula in modum orobi innata fuerit, cum siti admodum frequenti, vigesimo die morietur. Pereunt etiam alii breui, cum in morbo acuto euenit: alii longiore tempore, cum in tabem transit siccatione, vel in praua vlcera profunda serpentina. Vnde & si carunculae exeant, lethale dixit Hippoc. 4. aphor. 23. Interea sciendum, quod dysenteria, quæ adhuc sit mordaci humore abradente, ac abstergente intestina, ita ut quædam corpora pingua duntaxat excernantur, facile curari poterit, ablata causa ipsam faciente; Natura videlicet ipsam sanante, etiam absque externo auxilio, velut reliquos similes consuevit exiguos affectus sanare, *Galen. auctoritate 1. de loc. affect.* Verum ubi iam facta est, atque confirmata, ita ut veluti caruncula, hoc est, magnæ intestinorum partes excernantur, lethalis est talis dysenteria, *ex eiusdem Galeni & Hipp. sententia, aph. 26. lib. 4.* Nam (*ut inquit Gal. & citatur a Donato*) neq; caro concrecere, neq; cicatrix obduci in tali potest exulceratione. At si in dysenteria non adeo magnæ intestinorum partes

Historia quadam
de dysenteria a-
pud Hollerium.

27.

28.

excer-

29.

extermantur, nec corpora duntaxat pingua, sed veluti ramenta quædam ipsorum intestinorum eorum superficie interiore abrasa, quæ membranosa existit & densa, epidermidi, quæ extimam cutem corporis ambit similis, nec adeo prompte curabitur, ut ea, de qua primo mentionem fecimus: nec adeo ægre, vel lethalis erit, sicutiea, in qua veluti carunculæ deliciuntur, cum media quodammodo existat inter vnam & reliquam. *ut ex Galeni verbis elicitur præcitato aphor. 26. 4. lib. in ipso commento, quod & Donatus animaduertit.* In longis quoque dysenterijs cibi fastidium malum esse signum, inquit Hippocrates *aphor. 3. lib. 6.* & cum febre peius. Alii quoque longo tempore sordida vlcera passi, tandem debilitata vi intestinorum, aut in hydropem, aut in lenteriam transeunt, *6. aph. 43.* In hydropem, consentiente iocinore: ad læuitatem, ex proprio malo communicato etiam ventriculo. Et si non solum, *ut superius dictum est*, ex natura vitiosi humoris, sed etiam ex natura vlceris, quo profundius abraditur substantia carnosa, tanto peius. At ex vitiis hoc modis etiam fit iudicium. Nam pueri valde periclitantur, tum quoniam ocysime dissoluantur ob molliem, tum quia minus obediunt præceptis. Senes vero alia ratione, quod magnitudo causæ in his significatur: siquidem talia excrementa non facile gignant. Alii volunt, quod in pueris vsq; ad 12. annum periculosior sit, quam in senibus in prima senectute, aut in iuuenibus. Hæc ab experientia habentur. Mulieres item quam viri, senes & pueri, quam iuuenes & in status vigore consistentes difficilius curam accipiunt, ut Aetius refert. In dysenteria desipientia vel spasmus, lethale, spiritibus animalibus diminutis. Et ideo si contractiones membrorum, singulus crebri, vomitus, si que mente labuntur ægri, lethifera signa sunt. Si dysenteria hydropi superueniat, lethale. Istis cognitis, curatio magis patebit, etiam ab exemplis, quæ subsequuntur.

OBSE RVATIO XXXIV.
De dysenteria admodum periculosa in prægnante curata.

Domina de Cornes, quæ prægnans Loydius tunc tempore agebat, extreme & longo tempore ex dysenteria laborans, cum multorum remedijs vsa esset, neq; sanitati restitui posset, tandem me vocauit. Quæ cum valde debilis esset, optimo victu, tum optimo genere viuendi, paucis deinde adiectis remedijs per me diuina gratia curata fuit. In primis curauit, ut aerem eligeret ad siccum vergentem, & in actiuis qualitatibus temperatum, & ab aquilone & austro tutum; & ut vitaret pluuosum, nebulosumq; cælum: & quiescem præcepi, cum omnis motus sit vitandus, & quauis agitatio, quæ exulcerat. Somno quoq; ut indulgeret admissi, cum vigilie præcipue obessent, vti & omnes immodici animi affectus. Quod ad cibum attinet, quidam hic ferre in ediam per integrum biduum laudant; & alii, *ut Alexander Trallianus*, circa initia tenui victu ac cibo modico vtendum esse velint, cum dysenteria laborantes; propter intesti-

norum & ventris imbecillitatem, hanc in multum possint concoquere, præsertim cum infirmitas sic vbi vires permiserint quantitate, modica eos exhibent, & primis saltem duobus diebus abstinentiam imperant, *eodem Alexandro auctore*. Nam & tenuissimo victu opus est, decreto Galeni *lib. 1. de artic.* præsertim vbi & iocinoris quoq; adsit imbecillitas, ac plenitudinis affectio. Verum hic ratio adhibenda erat & imprægnationis & vitæ, & quod malum iam progressum erat, & quod non febricitaret, sed vires satis deiectæ essent. Et quamquam carnes, eo quod multum nutrant & tarde concoquantur, dysentericis non valde commoda existunt, *ut Aetio quoq; tum Alexandro visum est*, tamen eis, qui diuturno malo vexantur dandæ sunt. Itaq; ob hanc causam etiam huic nobili matronæ concessimus turdos, perdices, turtures, merulas, gregales pullos columbarum, sturnos, phasianos. Aetius has carnes prius ebullit in posca, myrti bacis cum eis incoctis, deinde assari iubet. Nos vero iniici iussimus sorba sicca, corna, mespila, pyra adstringentia aut mala cotonea, deinde confuta assabantur. Sed cum assis non ita delectaretur, propter vires debiles, præcepi ut elixarentur, eisdem adstringentibus cum eisdem carnibus decoctis: & ob vires deiectas, ex earundem auium carnibus parabam contusa, iura, & consummata, adiecto omphacio aut oxalidis succo, vel vino granatorum aut coroneorum: sic & succum expressum ab iisdem carnibus assatis concedebam: & ut ex fructibus attingeret, sed parce, sorba, corna, mespila, mala cotonea, mala punica, præsertim austera aut acida, idq; cum pane: ita enim mandi debent, eo quod facile (*teste Alexandro*) corrumpantur. Alii & hic castaneas laudant. Panem vero commendauit ex similagine vix fermentatum, bisq; furno inditum, vel panem nauticum, sed album. Si fermentato vti necesse est, aqua pluuiæ maceratum comprimito vtraque manu. Galenus etiam cum pluuiæ aqua confici panem docuit, vel aceto adiecto, in libris quos *Curacionum* inscripsit. Et ideo auctores carnes elixari volunt in aqua pluuiæ, & ex pedestribus, *ut carnes leporum, capriolorum, hædorum prius in posca decoctas*, deinde similiter assatas dari iubent. Quantum ad potum, parcius bibere primum auxilium est. Et quamquam pro potu a principio aquam pluuiam, & Paulus & Aetius commendant, in qua prædicti astringentes fructus fuerint decocti, præsertim rhus obsoniorum, aut oxalis vel plantago. Postea tamen, vbi vires fuerint deiectæ, aut stomachus laborauerit, admittunt vinum adstringens non valde vetustum, aqua pluuiæ dilutum, seu fontana, in qua oxalidis vel plantaginis folia fuerint decocta. Nos concessimus vinum rubrum Gallicum adstringens: sed non forte, dilutum cum aqua chalybis, vel auri. Et subinde etiam ceruisiam, iniecto frusto panis biscocti, etiam chalybe ignita in ea extincta, alioqui facile aluum mouet. Ceterum quod ad medicamenta reliqua attinet, pro abstensione dedi primum id, quod sequitur. *℞ decoct. hordei comminatis ℥ iij. syr. ex infus. ros. rub. ℥ j. misc.*

4. Civiteres non inieci, neque rhab. dedi infusum, sed in substantia; idque semel: sed quia longiore tempore laborauerat, ad roborantia & simul restringentia me conuertere, praesertim in praegnan- te. Et quia non febricitabat, dabam oryzam leui- ter tostam, ac exinde cum lacte caprino coctam, modo cum iure pingui gallinaceo: & pedes verue- cinos, agninos, haedinos, si reperirentur, quae in- ter cibaria, cum etiam glutinosa sint & dolorem mitigabant & humores contemperando fluxui resistebant. Sub noctem capiebat amygdal. mo- do cum aqua furfuris in principio, postea etiam cum aqua oryzae confectum. Fiebant & iura, re- staurantia & gelatina, ex carne caponis, pedibus ouillis, vitulinis, pomis cotoneis, mespilis, vino rubro exiguo, & aqua ros. adiectis, in balneo ma- ris destillata. Interea utebatur conferva antiqua ros. diacydonio sine speciebus condita, & iisdem adiecta ter- ra sigillat. vel trochisc. cum syrup. portulac. cotoneorum. Utebatur etiam lacte caprillo ad tertias decocto, vel alio lacte. Quibus remediis magno cum no- stro honore fuit curata. At illud hic notatu di- gnum, dysenteriam ante partum salubrem esse, ut historia Amati testatur centur. 2. curat. 51. quod e- quidem habet ex 7. lib. Hipp. de morb. popul. dicen- tis, Epicharmi uxori ante partum dysenteria, dolor alui, egestionis subcruenta, mucosa: ubi peperisset, statim sa- na erat: diuersionis forte ratione.

S C H O L I A.

5. C Vratio verae dysenteriae, de qua nunc agimus, variatur ratione vlceris, ratione caussarum, & ratione symptomatum. Sicut enim Galenus insti- tuit curationem 6. Epid. & lib. 6. aphorism. 5. Cura- tio, inquit, est, eluere mordaces succos ab vlcere: & est primus scopus. Secundus, oblinere his quae intestina tu- eantur ab acrimonia excrementorum occursum: ne dum de- fluunt, vlceri occurrant, & morsum cieant. Tertius, est temperare eorum, quae defluunt acrimoniam. Haec vero omnia causam vlceris despiciunt, & sunt ad prouidentiam. Nam ea, quae vlceris sanant, siccan- tia sunt sine morfu. Sed nunquid aliter ad causam respicere oportet? Medici enim iuniores medica- mento purgante vtuntur, ut causam vacuent: at- que inde saepe utilitatem sentiri videmus. Con- tra tamen est decantata ea sententia (ut etiam Iac- chinus doctissimus dicebat.) Non debere ad partem laesam excrementa trahi: quae confirmatur ratio- ne: quoniam si fluxionis contactu fit vlceris, quo ergo magis confluet, eo perpetuo vlceris augebit. Praeterea stultum est vacationem supra vacuati- onem moliri: attamen in colica exerosione visus est Galenus purgare per hieram picram ex aloe. Sed haec non totum corpus respiciebat vacuans: quin potius humores in intestinis infixos acres purgabat. Ad haec non simpliciter respondere o- portet, sed cum distinctione affectus. Si enim ac- cuta febris symptoma est, proritare symptomati- cam excretionem non conuenit, nec etiam sistere, sed his procedere quae Galen. scripsit: eluendo, temperando, oblinendo. Si vero sine febre sit, vel febris minime maligna illi succedat, tunc rur- sus distinguendum est. Nam si multam cacochy-

miam esse coniicis ex signis circa agrum habitis, tunc copiam eorum tollere bonum erit, ut cete- ros succos temperare & coquere possis. Si vero exigua sit portio, sat erit superiore ratione meden- di uti: & sic nos in hac Domina statim post ablu- tionem deuenimus ad cibos contemperantes, & etiam constringentes deinde. Quae vero contra haec adferuntur, sic diluimus. Primum Galeni ca- non verus est in phlegmone, quae ex excrementis augetur, ex quibus est genita, dum adhuc influunt. Sic enim verba sonant. Contra etiam vlceris augetur. Re- spondetur ex Iacchino, non est parratio: hic enim excrementa continue defluunt, neque sistuntur. At in phlegmone colliguntur in tumore, quae attrahuntur. Praeterea possumus vacuando obistere, ne excrementis vlceris ledatur: primum ea admiscendo quae oblinant, & temperent acrimoniam, mox & adstringant partem, & ita vlceri conducant. Itaque inuenerunt infu- sum, videlicet psylli, cotoneorum, tragacantes: & vtuntur rhab. infuso vel torrefacto, vel infu- so cum aqua plantag. & cum modico cassiae pro- pinato, ut refert. Iacch. attamen cassia nimium re- laxat: eadem ratione & myrobalanos apparant. Ideo recte quidam admonent, ubi ad vlcerata intestina adhuc a toto, aut ab aliis corporis parti- bus vitiosus succus confluit, & tunc priusquam vlceri succurratur, fluxionem ipsam auertamus, ac eum succum, qui abundat, euacuemus: & si a- uersio haec non sit vlceris, quatenus vlceris est, cu- ratio, ex Galeni decreto 4. meth. med. quamquam illud quoque excerpserit ex Hippoc. doctrina, il- ludque praesertim seruandum erit, ubi non utilia ab ipsa natura sponte ferantur, seu critice eua- cuentur, sed symptomatice. Sed hic quaestio est apud medicos etiam illustres, de venae sec- tione: de purgatione postea latius. Rondele- tius videtur eam non admittere, cum sic scri- bat cap. 20. de dysenteria. Nonnulli sanguinis missionem imperant: sed sine iudicio & utilitate, & cum magna agrotantium molestia. Vires enim de- iicit, nec bilem, ut plurimum ex folliculo fellis flu- entem, retrahit, nec ad curationem vlceris confert. Hoc autem (inquit idem) intelligendum est de vera dysenteria, non de fluxu sanguinis siue dysente- ria cruenta: quo casu venae sectio commodissima est. Contra Hollerius venam secat, corpore bene carnosum, graui febre, atque inflammatione, sup- pressa aliqua solempni euacuatione, sanguine mul- to cum excrementis abeunte, consentiente aeta- te ac viribus, etiam si Galen. ad Glauc. & lib. de ratione victus in acutis repudiare videatur. Altima- rus quoque, qualiscunque fuerit vitiosus suc- cus, qui ad intestina cum sanguine confluit, ip- sa exulcerans, siue a toto, siue ab aliqua con- fluat parte, modo critica non fiat expulsio, vi- ribus ac aliis consentientibus, venae sectionem in brachio adhibet, praesertim circa primos morbi dies, & si febris adsit ac totius corporis plenitu- do; sanguis mittendus erit, ex Alexandri senten- tia cap. 6. lib. 8. id quod etiam confirmauit capit. 7. eiusdem lib. At paulatim, neque vniuer- sim, ne agri vires imbecilliores hinc reddantur,

etiam

Medicamento- rum ratio.

Vtrum vene- sectio conueni- at in dysen- teria voca-

Vtrum vacua- tio supra vacu- ationem conue- niat.

9. *etiam iuxta Aetium capit. 45. lib. 9.* Si sanguinis impetus vehementer virgeat, & subfit inflammatio maxima, & iis qui plurimo sanguine abundant, neque vires resistent, & quibus consueta sanguinis excretio fuit cohibita: tamen neque multum neque coaceruatim. Secat Aetius humeralem, vel ea non apparente mediam, cum fissura tenui. Et etiam si aliquo tempore durauerit, ob inflammationem reuellit. Alii venas extremæ manus aperiri volunt, quia hinc minus virium cum sanguine effunditur. Potest & basilica aperiri, sed angusto foramine, & paulatim euulsa atque etiam vacuata materia. In suppressis purgationibus inferioribus venas malleoli aperiri iubent. Quod si fit, eo magis temperanda vacuatio est, quod hinc ductus sanguis plus virium, quam e manu exhaurit. Et quia assidua egestione, perpetua vigilia, febre atque inflammatione vires maxime laborant, temperandum euacuandi consilium est. Interea paucus extractus sanguis reuellit, innatumque calorem sensim refrigerans, somnum magis quam animi deliquium inducit. Est quippe optimum remedium somnus dysentericis. Affecto enim iocinore, flauæ bili admixtus sanguis etiam reuulsionis gratia internam venam secandam probat; etiam ad ipsius iocinoris alterationem, & ob insignem dolorem, auctoritate Galeni. Et concludit tandem Altimarus ex Aetio & Alexandro, venam esse secandam in initio, viribus, ætate & reliquis consentientibus, si adsint iam dicta, inflammatio & dolor vehemens. Quod & probat experientia, & viuis aliquot exemplis, vbi duorum magnifici cuiusdam filiorum dysenteria affectorum historiam describit; quorum vni vena secta fuit, & superstes mansit, alteri non secta, & mortuus est. Meminit ibidem & cuiusdam Ascanii Caraccioli, qui dysenteria, tenesmo ac febre laborabat, & vena cubiti interna secta, euasit. Et nos aliquando in principio adhibentes venæ sectionem in simili casu iam dicto, aliquos curauimus. Benedictus Fauentinus præceptor meus, *ut etiam annotauit in sua Empirica*, statim in principio venam secabat. At in hac Domina, quia debilis & prægnans erat, & iam diu hoc malo laborauerat, venam non secuimus: ita neque in Domina Assendelphia, dysenteria laborante, de qua suo loco dicemus. Sed eadem quoque controuersia est apud medicos illustres de purgatione. Verum iam indubitatum est, vbi & morbi magnitudo, & cetera non repugnant. In huius etenim morbi curatione duobus sæpius modis peccatur vulgo: celerius suppressa aluo, & adstringentium usu impacto pure in inuolucris intestinorum. Suppressa intempestiue dysenteria vidit Hollerius insanam factam mulierem, cui in perpetuam vitam ita confecta aluus, ut septimo quoque die tantum excerneret, & inde ore & naribus grauiter oleret. Galenus de venæ sectione contra Erasistratum *se non paucos vidisse scribit, qui dysenteria, varicibus, hemorrhoidibus suppressis in insaniam, apoplexiam, atram bilem, nephritidem, pleuritidem, hydropisim, sanguinis vomitionem & hemoptoicam pas-*

sionem inciderint: nobilis quidam pictor in scabiem factam. Corpore enim pleno materia feruida sursum fertur. Alioqui ita resiccatur intestinum, ut maneat perpetua alui adstrictio. Si sursum & deorsum obseratur, in inuolucris intestinorum aceruat magna puris quantitas, quæ tandem interficit. Id Hollerius cuiusdam corpore dissecto obseruauit. Et sic si quid sanguinis missionem prohibeat, aut posteam adhuc vitiosi succi redundent, ita ut intestinorum vlcera adhuc efficiant, aut augeant, purgationem adhibere non erit alienum, quam iterum veluti sectionem venæ non vniuersam, sed per vicem tentabimus, eodem Alexand. auctore: etenim fieri nequit, ut intestinorum vlcera curentur manente adhuc ea, quæ ipsam efficit, aut auget, causa. Curtius his 3 ℞. cassiæ dabat, & eam commendabat: alii vituperant. Sed & Amatus curat. 44. centur. 2. in dysenteria dedit rhab. infusum ad ʒj. cum 3 ℞. cassiæ cum aqua plantag. At secundum alios medicos illustres, rhabar. & myrobalani satis morbi causam deponunt, nec a nobis repudianda sunt, licet Galenus ea non nouerit: si enim nouisset, proculdubio iis usus fuisset. At thamarindi suspecti in dysenteria. Attamen vstulatum rhabarb. in principio non dandum. De vomitu controuersia quoque est, *num* *eo sit vtendum ob auersionem?* Hic quidam vbi humores promte per vomitum euacuari possunt, id tentant, cum per eum, non solum eorum euacuatio fiat, verum etiam & diuersio. Id quod vbi fluxio valenter irruat, exsequendum esse iussit pro vlcerum curatione Galen. 4. meth. med. dum dixit, *Vtique si in superioribus vlcus consistat, per inferna purgantes: sin autem in inferioribus sit, superiorem ventrem vacuantes.* Profecto, si æger facile vomat, neque ventrem valde imbecillum habeat, neque extreme fastidiat cibum, leuia vomitoria vtilia erunt. At si per vomitum facile, qui redundant succi purgari nequeant, per aluum eos vacuare non erit alienum. Nam etsi per exulceratas partes pertransiunt, extra tamen educenda sunt per conferentia ac communia loca. Neque id per vehementia pharmaca tentandum erit, sed per mitiora, ac familiaria, quæ insuper vlceri nocumentum non inferant; quorum copiam nostris temporibus inuenire haud difficile erit, de quibus paulo ante dictum est. Causam quoque respiciamus, deriuatione ad vrinas. Profunt etenim ea, quæ vrinam mouent (*inquit Celsus*) in aliam partem humorem auertendo, si ea consequuta sunt: si non sunt consequuta, noxam augent. Iis vero vtendum post aliquot dies, vbi tanta copia excrementorum non est: timore enim esset, ne exulcerarent eas vias etiam angustiores. Interim tamen ea temperare oportet victu, scilicet prisana, alica, oryza, & similibus. Volunt & alii deriuationem quoq; ad cutem conuenire, procurando sudores, & densantia cutem euitando, ut frigus externum. Quæ vero sequuntur medicamenta apud auctores, communia sunt; vlceri nempe prospicere ne augeatur; ipsumque sanare iam factum; & tertio symptomatum curam habere. Nam ea in hoc

Purgatio.

12.

Vomitum.

13.

Quæ vrinam mouent, quibus conueniunt.

Vlceri ita symptomatis prospiciendum.

casu habent causæ rationem : si quidem dolor & vigilæ, & continua motio corporis proritant partim fluxum humorum commouendo, partim ad eorum generationem faciunt. Quoniam corpus excalfaciunt magis & siccant. Sed & pariter vires destruunt, & cibi fastidium faciunt. His igitur omnibus statim ab initio prospicere oportet, nunc magis, nunc minus, pro eorum magnitudine, atque ea medicamenta eligere, quæ omnibus his scopis possint satisfacere, per epota, per infusa, & per ea, quæ dolenti parti applicantur. Debentque habere has condiciones, ut siccant, refrigerent : præsertim cum vlcus inflammatum est : ut eluant acres sanies, ut oblinant partem & dolorem sedent, ut lac scissile epotum vel infusum mediocriter coctum, caprinum vel ouillum vel etiam bubulum, initio adhibitum, donec inflammatio cesseret. Exterius valent castratorum omenta infusa in vino austero & rosaceo oleo, & repentia apposita, vel ptisanæ succus infusus, vel oryzæ. Oblinunt & siccant : quibus adicere possemus oleum ros. seuum hircinum recens. Sæpe iteranda ob continuum materiæ influxum. Continua ergo eget ablutione & attemperatione. His adicimus, quæ dolorem sedant, ut rosaceum cum seuo : & oua cum tota substantia, & tepida infundimus. Seuo cum rosaceo soluto æquali portione dissoluto & infuso, idque iuxta Iacchinum ter quaterue in die. Alii pinguium castratorum capita cum hordeo coquunt, mox addito ouo, & oleo ros. & seuo clystma faciunt. His vtendum, donec dolor & inflammatio remittuntur ; postea ad ea, quæ vlcus cruentum sanant, est descendendum : & itidem offerenda sunt potui, & per clysmata infundenda, quæ siccant & densent, sine morsu tamen, ex succo plantag. tepido, polygonati, cum oleo rosaceo, & ex adstringentibus rubo, canirubo, ros. & myrtillis, etiam in potu assumpta. Quod ad symptomata attinet, sedabimus dolorem, & vna vigiliis occurremus narcoticis adiectis, & aliquid philonii vel potius decoctum papa. infundemus. Quod si vlcus sit sordidum, medici veteres aquam salis iniiciebant, & clysmata valde acria : quos nullo modo (ut dicebat Rondeletius) imitari debemus, ut nec eos, qui sandaracam, auripigmentum, calcem viuat & alia eiusmodi iniiciebant, & ut Iacchirus ad-monebat, ægros in discrimen ob dolorem ducebant. De quibus videas alios auctores. At exemplis subsequenter omnia lucidiora apparebunt.

OBSERVATIO XXXV.

De dysenteria, qua sex mensibus agrum infestabat.

Mercator in foro auenarum Delphis habitans temperatura biliosa, satisque exusta, circiter triginta annos natus, post longam peregrinationem multosque perpeffos labores, ex Gallia reuersus, & nunc paulo tranquillior, cum vxorem duxisset, & delicate magis viueret, in fluxum diuturnum ventris incidit, mox in dysenteriam lapsus, per sex integros menses cum misere vitam duxisset, doloribus ac torminibus sub vmbilico

pene extinctus est. Verum cum hic experimenta multorum ac muliercularum, frustra, ac diu multumque tentasset, tandem anno 1562. circa Martii mensis initium nostram opem expostulauit, omni spe destitutus. Qui equidem cum hæc subsequenter remedia eidem per me fuissent præscripta, præter omnium hominum opinionem sanitatem fuit consequutus. Omnium primo iniectum est hoc enema. *℞ decoct. hordei communis parum torrefacti lbj. olei ros. ℥iij. sacch. rub. ℥j. β. vitellum vnius oui, misce.* Materia eo clystere vt-cumque deterfa, dolor quoque nonnihil mitigatus est. Mox altero die sequens enema infusum, recipiens lactis bubuli chalybeati lbj. *sacch. rub. ℥j. β. duo vitella ouorum, misce.* Deinde & tertium. *℞ decoct. hordei communis torrefacti lbj. olei ros. cotoneorum, ana ℥j. β. ouorum vitella, num. ij. sacch. rub. ℥j. β. misce.* His tormina cessarunt, & facta est mutatio excrementorum in meliorem statum : quod equidem pro optimo signo habuimus, iuxta aphorism. 14. lib. 2. In profluuiis alui, mutationes excrementorum iuuant, nisi ad mala mutatio fiat. Iniectis demum eiusmodi clysmis, acres materias eluentibus, & per superiora hæc propinauimus, primo abstersorium hoc medicamentum. *℞ decoct. hordei communis ℥vj. syr. ex infus. ros. commun. ℥iij. misce. conficiebatur ex ros. omphacinis non valde apertis, affusis septies vel pluries atque abiectis, ut ego parare soleo :* In eo enim inest vis doloris sedandi mira, sed & oblinendi. Purgauimus autem hoc modo. *℞ folior. plantag. m. j. flor. ros. rub. ℥j. myrob. citrinor. ℥iij. myrob. chebul. indor. ana ℥j. β. schœnanthi ℥j. bulliant in aqua pluuiali.* Huius colaturæ accipe ℥iij. adde rhabarb. electi ℥ij. *β. syrup. ex infus. ros. & coton. ana ℥β. misce, fiat portio :* quinquies eduxit. Deinde & hoc præscriptum est. *℞ hordei communis p. j. seminis plantag. flor. ros. rub. an. ℥j. bulliant in aqua pluuiali :* & huius colaturæ accipe ℥iij. *syrup. coton. ex infus. ros. ana ℥β. misce.* Postea dedi ℥ij. *β. rhabarb. parum tosti cum decoct. plantag. & flor. ros.* Deinde & ea, quæ magis constringerent. *℞ sem. plantag. exsiccati, & puluerisati, ℥j. trochisc. de carabe, de spodio, cum sem. acetosa, ana ℥β. corni cerui vsti ℥j. β. coralli rub. ℥β. pulueriscentur subtilissime, & diuisantur in tres partes, & detur cum vino rubeo Gallico vna dosis.* Altera cum decoct. sem. plantag. flor. ros. & centum nodii, aqua cum decoct. vini rubei, in quo bullierint rosæ, sem. plantag. & centum nodium. Hæc quoque condita præscripta. *℞ conseru. ros. antiqua ℥vj. diacotonei sine speciebus ℥β. trochisc. de spodio, cum sem. acetosa, ℥iij. syrup. coton. rob. deribes, syrup. myrr. ana ℥β. misce.* Aliud, quo etiam vsus est : *℞ conseru. ros. veteris ℥vj. diacydonii sine speciebus ℥β. trochisc. de spodio, cum sem. acetosa ℥β. syrup. menthacei ℥β. insuper victu conuenienti vtens & adstringente, probe conualuit a dysenteria deplorata.* Vnice & hic prodest vinum decoct. gnaphali tam potum quam loco fomenti adhibitum. Et nihil præstantius, quam ℥j. coaguli leporis pota ex sapa, & stercus canum sola ossa vorantium cum lacte chalybeato, ut sapius expertum est.

SCHO-

S C H O L I A.

4.

Dysenteria cu-
rio ex redun-
ante bile orta.i ex falsa pi-
uita, curatio.i ex atra bile
at, curatio.

5.

IN curatione dysenteriae rationem humoris abundantis habere oportet, sicuti in aliis alui profluuiis, de quibus antea satis dictum est. Tamen ad maiorem explicationem, præter ea, quæ in principio huius libri dicta sunt, si dysenteria sit ex bile, si detur occasio, aliqui etiam syrupi magis sunt elegendi ex multis, ut deribes, ex succo acetosæ, de portulacæ, cichoreæ, intubi, ex infus. ros. ex ros. siccis, end. & aquis eiusdem, plantaginis, acetosæ, permistis. Deinde purgandi cum myrob. citrinis, & rhabarb. infuso, & syrup. ex infus. ros. Postea etiam ad maiorem adstrictionem relinquendo cum rhabarb. parum tosto, ut multis exemplis iam ostendimus. Si vero ex falsa pituita, proderunt syrupi ex succo borag. myrtinus, ex infus. ros. mell. rosa. cum plantag. aut acetosæ aqua, vel absinthii decocto. Deinde pituita ita paululum præparata, purganda, cum decoct. myrobal. chebul. Aliqui his & agari- cum addunt, & dicunt, conferre auctoritate Dioscor. nam & Galen. participem esse ait leuiculæ adstrictionis, cum syrup. infus. ros. myrtino & rhabarb. Si atra bilis ea parata cum syrup. ex succo fumariæ, borag. acetosæ, infus. ros. aut pomorum, eam purgabimus cum foliis senæ, epithymo, myrobal. indic. decoctis in aqua acetosæ, plantag. borag. lupulor. adiecto rhabarb. si opus est. Et si perseverauerit, myrobalanos & rhabarb. torrefacimus, ut maiorem restrictionem habeant. Deinde per superius adstringentia adhibebimus, si intestina superiora læsa sunt: cuius exemplum posuimus obseruat. 33. præcedente, & ibi multa remedia attulimus. Præter ea, quæ ibidem diximus, hic pul. præstantissimus habetur, quo Donatus uti solebat. ℞ sem. ros. oxalydis, plantag. portulacæ, ana ℥j. coralli rub. cornu cerui vsti, ana ℥j. amyli, draganti, ana ℥℥. misce, detur cum zacchar. rosa. vetusto, cum succo cotoneorum vel cornorum zaccharo confectorum, vel succo plantag. portulacæ aut polygoni, vel cum syr. ex iisdem succis paratis. Valent & trochisc. (ut sæpe diximus) de spodio, succino, terra lemnia, & micleta Nicolai ad ℥j. item mora acerba in sole siccata, trita: aut mora rubi aliquo liquore, aut obsoniis inspersa, & althææ rad. aut rubi aut hippuris decoctum ex aqua pluuiali, iuxta Paulum & Aetium, & thuris cortex potatus, & mali punici flores, & cornu ceruinum vstum & portulacæ succus, ac ea ipsa cocta & comesta. Si in inferioribus intestinis fiat dysenteria, infusis utendum, ut obseru. iam citata quoque ostendimus. De quibus scholio sequente nonnihil quoque agemus.

O B S E R V A T I O XXXVI.

De quodam dysenterico mortem incurrente, cum enemata admittere nollit.

1.

CUm Alemariæ contagiosa grassabatur, dysenteria, Bartholdus ille, filius Andreæ Celli, qui nunquam ambulauerat, sed perpetuo claudus paralyticus sellæ infidebat, ætate grandæuus dysenteria correptus in crassis & inferioribus intestinis, cum vlcus serpendo procederet, nec enemata admittere vellet, suæ stultitiæ pœnas dedit: ita ut cum cruciatu maximo, hic miser tandem obierit.

S C H O L I A.

2.

STultum hoc genus hominum apud nos frequens, ne dicam temerarium, qui mallent mortem oppetere, quàm enemata salutaria admittere. Dictum est prius, & exemplis ostensum, auctore Galeno, quod superioribus intestinis læsis, potionibus occurramus; inferioribus vero, clysmis; mediis vero utroque modo succurramus. At horum quoque delectum habere oportet. Nam aliud clyster abluens, vel vulgo lauatiuus ad abstersionem fit, sine tamen aliqua proritacione, differens ab absterfuo, qui datur ad pituitæ abstersionem; fit ex abstergentibus herbis & facultatem proritantibus: hic vero ex abstergentibus citramorsum. Et hoc facimus in dysenteria & tenesmo. Dysenteria siquidem, ut vlcus est, omnino duplici abundat excremento, quod auferendum est antequam utamur adstringentibus, & scaroticis, & eousque his utendum. Lauatiuus est, donec intestina omnino sint abluta. Conficitur autem ex decocto hordei, zacchar. ros. vel melle ros. vitellis ouorum. Additur succus plantaginis, ubi videmus intestina aliqua ex parte abluta, tum ut aliqua fiat adstrictio, tum ut intestina refrigerentur. Additur præterea mel cum succo plantag. semper, donec vlcus sit sufficienter detersum, eo- que sit medicamentum compositum ex adstrictione & abstersione, quo utimur ante clysterem co- strictiuum & consolidatiuum; præceptum illud commune sequentes, ab vno remedio ad aliud dissimile, per medium aliquod esse progredien- dum, ut in inflammatione utimur repellentibus simul & digerentibus post repellentia pura, ante- quam solis digerentibus utamur. Fit vero clyster sic. ℞ decoct. hordei integri ℔j mellis ros. vel zacchar. rubei ℥j. vitellis ouorum num. ij. olei rosacei ℥ij. misce, fiat clyster. In hoc vitelli ouorum abstergendo le- niunt, eoque dolorem sedant, auferunt asperita- tem, & coquant: oleum autem rosa. refrige- rat, dolorem sedat, & leuiter adstringit. Sunt qui loco decoct. hordei accipiant decoctionem capi- tis veruecis, vel intestinorum, ob similitudinem substantiæ, & pinguedinem eorum, & seuum, quod partes lenit exasperatas. Additur & in de- coct. intestinorum hordeum ad deterfionem. Cum volumus transire ad astringentia, addimus ros. & succum plantaginis. ℞ hordei integri p. j. foliorum plantag. m. ℔. ros. rub. ℥j. fiat decoctio in ℔j. colatur. dissolue, mellis ros. & succi plantag. ana ℥j. olei ros. ℥℥. vitellos ouorum, num. ij. misce, fiat clyster, qui præscribendus est post præcedentem clysterem. Con- strictiuus clyster ad ventris constrictionem præ- scribendus est duplex. Alius constrictiuus, in quo solum intendimus fluorem alui constringe- re, ut in diarrhœa, constat herbis; seminibus, & aliis astringentibus. Herbæ in summa sunt omnes, quæ adstringunt, ut bursa pastoris, tapsus, caules diutius cocti, folia sumach, myrtus, berberis, acetosæ, lysimachia. Adduntur sem. plantag. coriandr. fructus sumach, acetosæ, cupule glandium, galla im- matura, glandes, psidia, rosa alba & rubra, hoc modo. ℞ tapsi barbatii cum toto, rad. bursa pastoris,

Clysteres diuer-
si.

Lauatiuus.

3.

Intestini ablu-
ti, quæ adden-
da.Abstergens &
leuiter constrin-
gens.Detergens, le-
niens, dolorem
sedans, asperi-
tatem auferens,
refrigerans.

4.

Clyster parum
detergens, sed
magis constrin-
gens.Constrictiuus
clyster duplex.

Constringenti.

hippuris, acetosa, fol. myrtin. ana m. j. sem acetos. portulacæ, ana ℥ iij. gallar. sorbarum, mespil. ana num. xx. ros. rub. p. j. fiat decoctio in aqua chalybeata, vel pluuiali, in ℥ j. colatura, dissol. seu hirci ℥ j. misce, fiat clyster. Alius constrictius & consolidatius, qui fit ex iisdem herbis, vt ex plantag. polygono, foliis salicis & aliis, quæ vim habent refrigerandi & constringendi sanguinem. Additur in hoc clystere seuum hirci, quoniam coagulatur & concreticitius ob siccitatem, & materiam terream, quam aliud, concretum vero cooperit superficiem vlceris, & prohibet, quo minus acrimonia humorum recrudescat. Vlceri quandoque cicatricem inducit opera aliorum simplicium, quibus eo scopo vtimur, vt gummi Arab. terra sigillat. bol. armen. mastiche, quæ omnia consolidant. Vt: ℥ hippur. plantag. myrtin. sumach, rapsi barbat. cum rad. ana m. j. sem. berb. plantag. portulac. coriand. ana ℥ ij. florum ros. chamemill. ana p. ℥. vel ℥ j. fiat decoct. in ℥ j. colatur. dissol. acacie, hypocyst. ana ℥ iij. sacch. rub. vel mell. ros. ℥ j. vitellos ouorum assatorum numer. ij. seu hircini vel caprarum ℥ iij. fiat clyster. vel fiat sic: ℥ succi plantag. & polyg. ana ℥ vj. olei ros. ℥ ℔. seu hirci ℥ iij. misce. & facta residentia adde pul. bol. armen. sanguin. dracon. vel lapid. hamatit. vel terra sigillata, vel mastiches, ana ℥ j. pulueres isti sunt subtilissime terendi; alioqui multum nocent vlceri pungendo. Quæ viscida sunt, magis conueniunt, quam nimis acida, propter læuorem, quem habent dissoluta, ob quem asperitatem non inducunt partibus, neque dolorem. Possunt & alia addi, quæ vim habent constringendi & consolidandi, vt ladanum, hypocyst. & huiusmodi. Addit etiam Galenus aliquando pinguedinem porci, sed hoc tantum cum dysenteria magis est ab acrimonia humoris, quæ est obtundenda. Raro tamen ea vtimur pinguedine, ob eius immodicam humiditatem. Ad sedationem doloris præstaret, vt oleo rosa. In deplorata dysenteria, postquam optime detersum vlceris est, si supprimi non possit sanguinis fluor, cauda equina, sem. portul. plantag. & aliis adstringentibus modo iniectis. Veteres (vt prius diximus) non imitandi, qui calcem viuam, sandaracam iniiciebant. Quin imo in hoc casu Rondeletius solitus erat inungere ventrem & posteriorem partem oleo cydon. & myrtill. ros. & aliis similibus adstringentibus, cum multo aceto ad penetrationem, refrigerationem, exsiccationem, & repercussionem. Acetum enim insigniter adstringit, proinde fluorem omnem compescit. Optimo autem processu semper idem propinavit poscam, (quæ fit ex aqua & aceto) sanguinem spuentibus. Solent etiam extinguere sapa ignita, aceto; & vapor inde elatus excipitur ano, in sella perforata sedente agro. Hæc quidem vtilia duximus addere ex Rondeletio. Laudatur etiam infessio, qua lacchinus commode vsus est, vim habens auerrendi exiguam materiam & constringendi. Auerit quidem calore actuali trahendo ad cutem: constringit vero qualitate medicamentorum strictiua, quæ per anum penetrat vsque ad vlceris. Compositio eius est talis. ℥ tenera germina quer-

cus, baccas cypressi virides, nuces pineas virides, vel pini folia & corticem. Secretum est maximum ad pueros.

OBSERVATIO XXXVII.

De dysenteria cum variis accidentibus.

D Omina Assendelphia, anno 1575. Traiecti agens, cum aliquot septimanis dysenteria laborasset, & permissu Principis Auraici in Hagam Comitris redisset, vt curari posset, anno 1575. 19. die Februar. me vocari iussit. Quæ subinde & febricitabat, sed leviter, ac aliquando dolorem in latere sinistro, nempe liene, sentiebat. Huic varia medicamenta per me descripta sunt, quibus magno cum nostro honore tandem curata fuit. Inprimis vero per os hoc lauatiuum cepit. ℥ decoct. hordei communis ℥ iij. syr. ex infus. ros. ℥ j. misce. Mox & ex hoc condito sumebat, cum valde debilis esset. ℥ diacyd. sine speciebus ℥ vj. conseru. ros. ℥ ℔. myrob. empelitic. condit. ℥ ij. trochisc. de terra sigillata ℥ j. syr. coton. q. s. fiat conditum. Prius Traiecti fuerat purgata cum ihabarb. & myrob. & quia iam diu durauerat dysenteria; ideo ad constringentia ob virium debilitatem peruenimus, nempe 21. Septem postquam his syrupis vsa esset. ℥ syr. de portul. ℥ ij. syr. menthacei ℥ j. misce, hanc potionem dedimus. ℥ portulac. polygoni, ana m. j. myrob. citrinor. & indorum (ob dolorem in latere sinistro) ana ℥ ℔. ruar. passul. cum arill. ℥ ℔. coquantur in aqua communi: cuius decocti, manibus prius confricati & colati, accipiebamus ℥ iij. rhabarb. puluer. & prius parum testis ℥ ij. syr. ex ros. sic. ℥ ℔. misce. detur vnicavice. Qua potione materia aliquantulum mutata est, postea tamen sanguinolenta redeunte. Quare & hoc conditum capiebat. ℥ conseru. ros. veter. ℥ ℔. diacyd. sine speciebus ℥ ℔. trochisc. de terra sigillat. de spodio, de carabe, ana ℥ j. syrup. de portul. myrt. coton. ana ℥ ℔. manus Christi cum perlis ℥ iij. corticum citri conditi ℥ ij. pul. frag. lapidum pretios. ℥ j. fiat conditum. Pro alteratione & febre 24. Septembr. hæc præscripta sunt. ℥ syrup. granat. de ribes, de portulacæ, de acetos. citri, coroneor. ana ℥ ℔. misce. ℥ sacch. ros. perlatis ℥ j. ℔. deinde hunc pulu. cum vino rubro Gallico sumebat ad maiorem restrictionem, febre satis sedata. ℥ corni cerui vsti, rad. tormentill. ana ℥ j. vnicornu gr. v. perlarum subtilissime tritarum ℥ j. misce, fiat pulu. Sed & hunc pul. 27. Septemb. cum maximo commodo dedimus: ℥ rhabarb. testis & pul. ℥ ij. myrob. citrin. indor. an. ℥ ℔. misce, fiat pulu. eum vino rubr. exhibebatur, simul & hoc decocto vtens. ℥ portulacæ, plantag. bellid. minor. polygoni, ana m. j. sem. plantag. ℥ j. coquantur in ceruisia communi, qua bis aut ter in die utebatur, modo etiam per se sumens sem. plantag. ℥ j. cum vino rubr. cum amplius non febricitaret, & tunc potus erat vinum rubeum, cum aqua cocta chalybeata dilutum. Modo etiam ceruisia, in qua mespila contracta immatura iniecta erant. Ita illo potu delectabatur, vt illo solo se curari affirmaret. Sub noctem capiebat lac amygdal. modo cum aqua furfuris, modo cum aqua farinæ oryzæ paratum. Cibus erat constringens: nempe pyra assata, modo in vino rubro cocta & suffocata.

Alius constrictius & consolidatius.

Alius consolidans & constringens.

Alium.

Inunctio.

Cata. Cotonea affata, lac acetosum cum farina, oua duru scula, etiam ex vitellis liba confecta, cum sem. plantag. ius restaurans, gelatina ex carne caponis, pedibus ouillis, vitulinis, pomis, cotoneis, mespilis, aliquot aureis nummis adiectis, pauco vino, & aqua ros. exigua in balneo maris, pro iure restaurante decocta, conseru. rosat. antiqua subinde adiecta, & diacydonio sine speciebus. Quibus remediis optime tandem curata fuit.

SCHOLIA.

4. *Habet exemplum egregium apud Amati cent. 2. curat. 46. de iuvene biliaris, qui a dysenteria bili-osa gelida potu fuit curatus, & curat. 47. de ultero, coitu a dysenteria liberato.*

Varia habentur experimenta contra dysenteriam. Non desunt vulgares, qui semen sophie admodum commendant: noui aliquos, qui illud semen cum pane butyraceo comedebant. Quidam etiam, Celso auctore, vbi pluribus diebus nihil remedia iuuant, & verus iam vitium est, aqua admodum frigida vtuntur, qua absunta vlcera astringit, & initium secunda valetudinis facit. Sed vbi venter suppressus est, protinus ad calidam potionem reuertendum est, vt idem Celsus refert. Illud tamen memorie semper mandandum, quod communis omnium indicatio partium internarum est, vt ea eligantur, quæ animalis naturæ maxime sint familiaria, siue ea cibi sint, siue medicamenta: fugiantur respuanturque huic contraria, Galeno auctore 4. medend. methodo. Quapropter medicamenta, quæ ex opio, alterco, nigro papauere, aut mandragora componuntur, vitari omnino debent, nisi forte maxime vrgeat necessitas, ex Tralliani sententia. Nam licet somno dolorem leuare videantur, & propterea venter retineri conspiciatur, tamen humores in vnum collecti postea sine intermissione deiciuntur, capiteque grauato, ac viribus labefactis ventrem reddunt deteriorem, & maius cibi fastidium inducunt. Tutius tamen per sedem (necessitate cogente) quam per os adhibentur, vspote 3 ℞. aut 3 ij. philonii Persici, aut catapotiorum de cynoglossa, seu eius medicamenti, quod a Nicolao Requir appellatur, Quam periculosa sint narcotica & stupefactiua, diximus scholio obser. 17. huius libri. Sed videndum, num etiam dysenteria ex medicamento venenoso originem traxerit. Noui zythepfam Delphium, cui antimonium datum erat, plus centum sedes inde habuisse, quibus enormia symptomata subsequerantur; quamuis idem a me curatus fuerit: & alius, de quo dictum est obser. 16. huius libri. At si ex venenatorum pharmacorum potu oborta fuerit dysenteria, iis quæ in venenorum potu conueniunt, præter ea, quæ diximus, erit vtendum, iuxta Aetium. Sunt autem huiusmodi in triplici differentia, vomitoria videlicet, obrundentia atque exstinguentia: in quorum numero etiam acria comprehenduntur, vt ipse inquit. Restat vt nunc aliqua addamus de dysenteria contagiosa.

OBSERVATIO XXXVIIII.

De dysenteria quadam contagiosa & pestilenti.

Pestilentes & contagiosæ fiunt aliquando dysenteria, ex pestilenti constitutione, vt Galeus meminit pluribus in locis, vt aphorism. 21.

lib. 4. & in lib. de attrabile. quidam excernebant nigra quædam, 7. 9. & 11. & quibus deiectio talis non fuit, pustula nigra toto corpore excitabatur. Nullus autem seruatus, ex iis, qui atram bilem exactam deiecerunt. Primis diebus erant ruffæ & colliquationes, vitellinæ, crassæ, acres, foetidæ, spumolæ, vt in alio loco κατατόπυς. Sic anno 1567. cū populares essent dysenteria Delphis, Beatrix Ioannis, vxor Tielmanni tinctoris, in aggere tinctorio habitans, duabus puellis ex dysenteria orbata (quas Cornelius Heydius collega meus præ manibus habuerat.) Ipsa quoque eadem dysenteria contagiosa correpta, & mœrore confecta, cum alias proles tunc temporis non haberet, me ad curationem vocauit. Cui hos syropos, vt frequenter sumeret mandauit. ℞ syrup. de limonibus 3 j. ℞. rob de ribes 3 j. syrup. cydon. 3 ℞. misce. Deinde vt ex hoc lotiuo frequenter caperet cyathum vnum. ℞ decoct. hordei non excorticati ℞ j. syrup. ex infus. ros. 3 iij. misce, fiat iuleb. Cibus autem erat amygdalarum sequens. ℞ amygdal. dulc. depilat. 3 iij. sem. pap. albi 3 j. tusa cum aqua fursuris, fiat amygdalarum: saccharo perlato dulce reddatur. Sub noctem vero ex eo capiebat. Hæc primo die, nempe 5. Decembr. præscripta. Die sequenti, qui erat 6. Decembr. accitus est meus collega Heydius, & cum dysenteria laboraret, vna cum magnis torminibus, rursus hos syropos sumebat. ℞ syrup. ex ros. siccis 3 ij. syrup. cotoneor. de ribes, ana 3 j. ℞. misce. Octauo Decembris, cum febris non multum vrgeret, capiebat ex conserua rosa. vnus anni frequenter. Nono Decembr die hoc præscriptum est. ℞ syrup. de ribes, cydon. ex ros. siccis, ana 3 j. ℞. misce. Vndecimo decembris etiam illud. ℞ myriophylli seu millefolii m. j. hordei communis 3 j. cornu cerui vsti 3 j. fiat decoct. in aqua pluuiali ad ℞ j. colatura addendo syrup. ex ros. siccis 3 ij. fiat iuleb. quo dolor plurimum mitigabatur. Duodecimo Decembris hæc gelatina descripta, qua plurimum delectabatur. ℞ amygdal. dulc. depilat. 3 iij. aqua plantag. ℞ j. fiat amygdalarum: amygdalis contusis adde ichthyocellæ & sacchari perlati q. s. cinnamomi selectissimi 3 j. fiat gelatum, secundum artem. Vix febricitabat. 20. Decembris, cum fluxus nondum cessaret, hic potus a nobis præscriptus est: ℞ rhabarb. parum vstulati 3 ℞. myrobal. citrin. 3 j. pulueris entur subtilissime, & misceantur cum 3 j. syrup. ex infus. ros. commun. & cum 3 iij. aqua hordeacea; fiat potus: quem mane in aurora sumsit, & cepit fluxus cessare. Interea hunc syrup. frequenter sumebat. ℞ syrup. coton. de ribes, ex ros. siccis, ana 3 ij. ℞. misce. Ceterum cum ob crebras affellationes doleret circa finem spine, prope anum, in spondylibus inferioribus dorsi, vsque ad nates descendendo, hoc ceratum appositum est. ℞ sumach, balaust. ros. hypocistid. acacia, an. 3 ℞. gummi tragacanthi 3 vj. sem. plantag. 3 iij. farina volatilis 3 j. fiat pul. vt alcohol, & cum albumine oui fiat ad formam emplastri seu cerati. Quibus remediis hæc mulier a contagiosa dysenteria intra 14. dies curata fuit. At mater eiusdem eodem contagio affecta, materia multo maligniore existente cum febre admodum perniciose &

Curatio seu venenatorum pharmacorum potu dysenteria oborta fuerit.

pestilenti, in Haga Comitum decumbebat: ad quam una cum Ericio & Billichio medicis vocatus sum: sed nulla remedia neque clysteres profuere: ita ut 14. die obierit. At cognata eodem morbo affecta, optimis remediis conualuit.

S I C H O L I A.

5. **H**æc contagiosa dysenteria aliquando integrum exercitum inuadit & prosternit: & adeo graue est hoc malum, ut ex præcedentibus torminibus, erosis villis, etiam viscera post mortem erosa spectentur, ut apud Beniuenum cap. xcvi. videre licet. Multos enim non subito, sed paulatim exstinguit: quemadmodum quondam Harlemi post obsidionem grassata est: etiam Delphis in hyeme, anno 1580. Tunc Margareta Christiana, quæ apud amitam agebat, in domo, cui Mundus pro insigni erat (facta prius sectione vena, statim in principio, in pauca quantitate, ex vena basilica) hunc syrupum sumsit. ℞ syrup. cydon. ℥j. syrup. de portulaca ℥℥. aqua portulacæ, plantag. ana ℥j. ℞. misce. Idem syrup. fuit descriptus Mariæ Petri Sasboti filia, in eadem domo, dysenteria laboranti: & hic sequens. ℞ syrup. de portulaca, myrtini, cotoneor. ana ℥℥. aqua cichor. portulacæ, plantag. ana ℥j. misce. etiam hoc quod sequitur. ℞ florum cord. flor. ros. rubear. ana m. ℞. sem. plantag. endiu. ana ℥℥. cort. myrobal. citrinor. empelitic. chebul. belliric. ana ℥j. vuar. passul. cum arill. ℥℥. liquir. ras. ℥ij. coquantur in aqua communi: & huius colatura, prius manibus confricat. accipe ℥ij. rhabarb. pulueris. ℥j. ℞. micleta Nicolai ℥℥. syrup. ex infus. ros. commun. syr. cotton. ana ℥℥. misce. fiat haustus. Hunc etiam syrupum sumsit. ℞ syrup. cotton. ℥j. syrup. ex infus. ros. commun. ℥℥. aqua portulacæ, plantag. ana ℥j. ℞. misce. Istis remediis statim ab initio conualuere: nec aliis opus fuit medicamentis. Missio sanguinis his in principio profuit; quemadmodum & apud Amatium cen-

Dysenteria contagiosa multos pessumdat.

Quæ valent ad dysenteriam contagiosam.

- tur. 2. curat. 48. in abbate Gracilio dysenteria biliosa cum febre laborante. Vide eundem de dysenteria contagiosa, centur. 3. curat. 90. de vetula, quæ intra mensem obiit; & de tribus filiis una morientibus; & de quarto pro deplorato relicto; ita ut ignem construxerit ex herbis suauiter olentibus, nempe roremarino, stæchade, origano, pulegio, maiorana, lauro, iunipero, cypresso, & similibus, ut Hippocrates fecit in peste: quibus reliquos domesticos præseruauit. Ego commodè in ista pestilenti, & contagiosa dysenteria vtor bezoardicis syrup. acidis, cordialibus, de ribes, de myrtillis, de limonibus, de acetos. citri, syrup. acetos. simpl. vino granatorum. iuleborosato, puluere vnicornu, cornu cerui vsto, & pul. tormentilla, bol. armen. vero, & terra lemnia: & præter clysteres, tum alia conuenientia, in dysenteria prius descripta, auro in decoctis pullorum, perdicum, & similibus. Valent & iuscula alterantia, cum multa acetosa, & nodulo de berberis, & colaticia, hoc insperfo puluere. ℞ limatura auri ℥j. margarit. pulu. ℥ij. manus Christi cum perlis ℥j. misce, conserua de berberis. Hollerius hoc puluere vtitur. ℞ limatura auri ℥j. diamarg. recenter parati ℥℥. nucis muscata ℥℥. margar. smaragd. sapphiri, an. ℥℥. panis sacchari ℥℥. fiat pul. Interea vtitur

pulvere vnicornis, cornu cerui, cum vino tenui, odorifero, diluto aqua, in qua aurum exstinctum est. In aurora dat theriacæ optimæ ℥℥. in vino granat. acetos. citri aut re simili dissoluens, & similiter hoc electuario vtitur. ℞ conseru. ros. ℥j. ℞. conseru. cort. citri condit. cum z acchar. ℥j. cortic. citri ℥j. ℞. margar. elect. ℥j. hyacinthi, smaragd. ana ℥℥. serici crudi ℥j. sem. citri mundat. ℥j. ℞. acetosa ℥℥. boli armen. veri, terra sigillat. ana ℥j. limatura auri ℥j. cornu cerui & vnicorni, rasura eboris, ana gr. iij. sacchar. albiss. ℥ix. folia auri, num. x. fiat conditum ad formam z acchar. rosati, cum aqua ros. moscata. Hæc infra scripta multis Harlemensibus profuere, in dysenteria illa contagiosa post obsidionem, a medico Harlemensi tunc præscripta, quæ a Clutio, pharmacopœo tunc Harlemensi, & cognato nostro accepimus, nunc meo quidem pharmacopœo, in sua arte admodum versato. Quæ descripta fuere, anno 1573. in Decembri. ℞ syrup. de agrestia ℥ij. syrup. ros. ℥j. ℞. syr. cotton. ℥j. ℞. vini cydon. ℥vj. aqua portulacæ ℥℥. aqua plantag. ℥ij. vtatur pro tribus dosibus. ℞ radic. consolida maioris mundat. ℥℥. ℥j. plantag. m. y. cortic. mali granati in par. incis. ℥ij. balaust. gran. mespil. sem. myrtill. ana ℥j. ros. rub. m. ℞. fiat horum decoctio in aqua pluuiat. ℥℥. ℞. ad consumptionem tertie partis, colatura adde z acchar. ros. ℥ij. & fiat potus. vtatur pro sex vicibus. ℞ rad. consolida maioris, exterius mundata ℥℥. corticum malor. granat. balaustior. acacia, hypocyttid. terra sigillata, boli armen. sumach, gummi Arab. corall. rub. sem. myrtill. cornu cerui vsti, lapid. hamatid. ana ℥j. ℞. sem. pap. albi ℥℥. opii gr. iij. omnia secundum artem misceantur, cum diacydon. ℥j. ℞. conseru. ros. ℥j. ℞. vtatur pro sex vicibus. Hæc in Ianuar. descripta sunt pro diuersis, anno 1574. ℞ micleta Nicolai ℥x. conseru. ros. ℥j. vtatur pro y. dosibus. superbibendo singulis vicibus semel quod sequitur. ℞ syrup. myrtill. ℥j. ℞. vini cydon. ℥j. aqua polygoni ℥vj. misce. Dos micleta admodum magna est, cum probati auctores & Donatus iubeant tantum drachmam vnam tribui. Vti & illa dosi alteri per eundem medicum præscripta. ℞ micleta Nicolai, ℥j. syrup. myrtill. aqua polygoni ℥vij. misce simul pro duabus dosibus. Sed & 8. Ianuar. anno 74. alteri mulieri hæc præscripta sunt. ℞ mespil. myrtill. rad. consolida maior, exterius mundata, ana ℥vj. cortic. malor. granat. balaust. ana ℥j. fiat decoctio in ℥℥. ℞. aqua pluuiat. secundum artem, ad consumit. mediet. colatura, adde syrup. myrtill. ℥ij. aromat. cum santal. citrin. rub. ana ℥j. cinnamomi optimi ℥j. & fiat potus. ℞ conseru. ros. ℥j. ℞. diacydon. simpl. ℥j. rad. consol. maior. ℥j. trochisc. ramech. ℥j. ℞. cort. malor. granat. pul. ℥℥. fiat mixtura. Etiam illud pro Domina de Liques, 9. Maii. ℞ vini cotton. ℥ij. syrup. myrtill. ℥j. aqua polygoni ℥ij. misce. 9. Maii: ℞ conserua diacyd. simpl. ℥j. ℞. micleta Nicolai ℥vj. trochisc. ramech ℥iv. cum syr. myrtill. q. s. misce, pro duabus dosibus. 10. Maii: ℞ rad. consol. maioris exter. mund. ℥j. trochisc. de carabe ℥℥. hypocyttid. ℥j. philonii descript. Mesue ℥j. confect. diacyd. simpl. ℥j. cum z acch. fiat bolus, vtatur, statim superioribus haustum aqua polygoni.

11. *polygon.* Hæc omnia sunt constringentia valde, quæ non ita in principio, vt diximus, conueniunt, ante quam materia cum rhab. vt prius ostensum est, sit ex parte diminuta & euacuata. Quibus tamen formulis iam dictis, & similibus, plures a dysenteria valde contagiosa & lethali curauit idem medicus. Dosis tamen micetæ Nicolai nimis magna est. Ideo cum cautione vtendum, cum ʒj. vel paulo plus aliquando satis sit. Interea semper symptomata quoq; & febrem respicere oportet. Memini quidem uxorem Garbraudi mercatoris, cognomento Ruchii dicti, Catharinam Singeliam nomine Alcmarianam Anno 1547. circa finem Februarii. mensis ex dysenteria & vomitu superfluo, & mensuris valde profluentibus, actussi valida deploratè laborasse, post febrem continuam per modum crisis, febre ipsa tandem cessante, sed symptomatis adeo superfluis vires prostermentibus, vt in syncopen prolabenti restrictione opus fuerit; sumto hordei decocto, ad abstersionem, & myrobalanis parum vstulatis, tale apozema describere coacti fuimus. ℞. sem. plantag. agni casti. sanguinaria nostra vulgaris, sem. acetosa. ana ʒj. granor. alkachengi (vt materia ad renes diuerteteretur) num. liij. coquantur in vino rub. styptico, pro pinna vna, ex quo subinde cochlear vnum sorbebat, idque singulis horis sæpius. Deinde pro tussi, quæ causa erat maioris defluxionis, ex linctu sequenti frequenter sumebat. ℞. amyl. dragant. ana ʒj. amygdal. dulc. depilat. & contus. ʒj. B. syrup. iutubini & myrthini, ana ʒj. B. misce. Interea utebatur lacte chalybeato, cum amplius non febricitaret, pro potu & cibo, & ex his tabulis sumebat, omni mane ʒj. Superbibens cyathum decocti. infra scripti. ℞. terra sigillata, trochisc. de carabe, de spodio, cum sem. acetosa. ana ʒj. B. amyl. gummi arab. ana ʒj. B. sem. plantag. acetosa. ana ʒj. puluerizentur subtiliter, & dissoluantur in decoct. aquæ plantag. addendo zaccbar. optimi ʒij. fiat confectio in tabula, capiebat mane ʒj. & vespere ante cœnam, superbibendo cyathum vnum huius potionis. ℞. sem. plantag. acetosa, agni casti. ana ʒj. B. trochisc. de carabe, de spodio, cum sem. acetosa, trochisc. de terra sigillat. an. ʒj. B. crassius contusa coquantur in lb. ij. vini styptici ad lb. j. eodem tempore libenter iniecissem clysterem: sed noluit admittere. At, Deo adiuvante, istis dictis dysenteria cessauit, & vomitus ac mensium profluuium & tussis consopita fuit, licet nos quoque ventrem, ventriculum, lumbos & pectinem hoc infra scripto vnguento inungi iusserimus. ℞. olei myrtini, cotoneorum, menthacei. ana ʒj. B. terra sigillata, spodii, ros. rub. ana ʒj. B. cera q. s. fiat vnguen. Quamuis autem Donatus in dysenteria nec cataplasmata, nec fomenta, nec vnguenta seu cerata ventri magnopere probet, potissimum vbi ea frigida atque adstringentia fuerint, nam quo magis. dicente Galeno, cutem desaueris, tanto magis fluxiones augebunt, i. ad Glauconem: tamen iuxta eundem Donatum, vbi cogamur, vehementi virgente dolore, eisdem vti, perpetuo acetum cum iis miscbimus, quod & Rondeletius quoque iubet, vt au-

tea quoque dictum est, vt medicamentorum facultas altius ad intestina penetrare valeat: poterimus & iis addere vini albi & tenuis modicum. Et ideo, vt magis penetraret vnguentum, & restringeret, adiecimus dum fieret vnctio, aliquid aceti. Volunt etiam auctores, vt hæc medicamenta, nec facultate, nec actu admodum sint frigida: ideo nos adiecimus oleum menthaceum, & non frigide, sed moderate calide partes dictas inungi fecimus magna cum vtilitate, ita vt hæc mulier optimo victu quoque præscripto constringente, magna cum nostra laude curata fuerit. Sed nunc paululum vela contrahamus, quoniam tertium scopulum de fluxu, nempe dysenterico, præternavigauimus: restat igitur quartum genus ac vltimum, nempe tenesmus, eoque absoluto Oceanum illum latum fluxum superemus. Et quamuis differat, si proprie loqui velimus, (vt postea latius dicturi sumus) a dysenteria, potest tamen aliquando ex dysenteria fieri. Nam si diu hoc malum perseverat, vigilias, iliacos & colicos dolores & tabem inducit, & ex dysenteria difficilior est. Interdum quoque tam vehemens affectus est, vt dysenteria similis videatur, cum & hic affectus, vt quidam asserunt, cum dysenteria non sine periculo quandoque contingat, vel, cum febre. Nam & diarrhœa, quæ a cholera & humoribus acutis euenit, sicuti & tenesmus, ab iisdem humoribus acutis ortus, dysenteriam tandem parere solet, quemadmodum & dysenteria e diuerso aliquando tenesimum inducit, vt hoc exemplum sequens ostendet.

OBSERVATIO XXXIX.

De diarrhœa postea in dysenteriam mutata, & postremo in tenesimum.

ANGLVS quidam in ædibus M. Guilhelmi de Dalen lithotomi diarrhœam incurrebat, quæ mox in dysenteriam transibat, deinde in tenesimum molestissimum, ac in frequentem & assiduam assellandi cupiditatem. Ad quem cum ingressus essem, his subsequenter subsidii breui admodum conualuit, 22. Iulii anno 1577. ℞. decoct. hordei. ʒij. myrobal. citrinorum, chebul. parum tostorum puluerisatorum. ana ʒj. B. rhabarb. selecti tosti (nam aliquot diebus antequam illum accederem laborauerat) ʒj. B. syrup. cotonei ex infus. rosa. ʒj. B. misce, fiat potio. ℞. diacyd. simpl. ʒij. ℞. oryze parum tosta. ʒj. B. pulu. & bulliat in lb. B. aqua communis. ℞. amygdal. dulc. depilat. ʒij. & cum aqua dicta fiat amygdalatum, zaccb. albiss. adiecto pro sapore delectabiliore. ℞. conserua rosa. veter. ʒj. diacyd. sine speciebus. ʒj. B. rob. de ribes. ʒj. B. trochisc. de terra sigillata. ʒij. B. syrup. myrtini, cotton. ana q. s. fiat mixtura. ℞. sem. plantag. parum exsiccati ʒij. trochisc. de carabe. ʒj. B. rad. tormen-tillæ, cornu cerui vsti. ana ʒj. diuidantur in duas partes, pro duabus dosibus. detur cum vino Gallico rub. ℞. zaccbar. ros. in morsellis. ʒij. ℞. conserua. ros. ver. ʒj. B. diacyd. sine speciebus. ʒij. trochisc. de spod. cum sem. acetosa, de carabe, ac terra sigillata. ana ʒj. spec. diarrhod. abb. ʒj. B. syrup. myrtini parum, fiat con-

ditum: capiat ad libitum: ℞. olei coton. myrt. ana ℥ ℔. olei maceris ℥ ij. misce, inungatur os ventriculi. & venter: & paretur Martius panis pro ℔b. j. Fluxu satis curato, tenesmo nondum desinente, hoc fumigio miraculi instar tenesmus curatus fuit. ℞. mastice ℥ j. thuris ℔ j. sem. myrtillorum ℥ j. ℔. flor. ros. rub. exsiccat. ℔ ij. fiat pul. pro fumigio. Fumum post secessum sub sella, carbonibus ignitis iniecto puluere, in anum recipiebat, & a tenesmo molestissimo liberatus est, ut & quidam eisdem remediis utētes ab eodem malo curati sunt.

S C H O L I A.

3. **D**E diarrhœa & dysenteria satis dictū est, nunc de tenesmo dicturi, qui ex eodem (quo iam dicta dysenteria) genere est, & qui a Græcis τενεσμός, a Latinis quibusdam tenesmus, a Plinio vero (ut etiam Donatus annotavit) tenasmus appellatur. Licet etiam apud Græcos τενεσμός cum ei scribatur, ut patet 1. & 3. de morb. vulgar. & aliis in locis, tam apud Hippocratem, quam Galenum: apud Celsum etiam cum litera n, tum apud alios scriptum reperitur. Latini proprio vocabulo carentes, modo tenasimum, modo tenesimum vocant.

Tenesmus unde nomen sumserit.

Quid sit.

Nomen vero sum sit ab ipso symptomate, ut apud Galenum constat 2. meth. meden. & commento aphor. 27. lib. 6. quoniam in eo tensio quædam circa intestinum rectum fit, ob quam, cum cacare vehementer appetant egri, continuo exsurgunt, ut idem sit, quod desidendi quædam cupiditas assidua, aut inanis quædam egerendi voluntas, seu, ut inquit Paulus, cap. 41. lib. 3. continua & implicabilis desidendi quædam cupiditas, qua nihil præter modica cruenta vel mucosa egeritur: id quod etiam Aetius confirmavit cap. 44. lib. 9. Dicitur autem ἀπὸ τοῦ τενεσμοῦ, quod est conari: quia morbus hic continuos conatus & cupiditates desidendi facit.

4. Vnde & Mesue appellavit, *mendosum appetitum egerendi*. Arabes hunc affectum in tenesimum verum & non verum distinguunt, eumque largius sumendo, qui sine dolore fit, alium vero, qui dolorem habet atque excoriationem. At nos de vero tenesmo nunc agimus, de quo supradicti Græci auctores agunt. Qui quidem affectus symptomata infert dysentericæ similia, nempe cruenta & mucosa excernens, nixus tamē multo vehementiores habet, ut lib. 3. de causis sympt. liquet. Conveniunt cum dysenteria proprie dicta, in dispositione, causa & symptomate, nisi quod ea fiunt vehementiora, præsertim nixus, ex Galeni sententia: differunt autem loco, seu parte affecta. Nam dysenteria proprie dicta indifferenter in cunctis intestinis (ut iam diximus) excitari potest, præterquā

Quibus cum dysenteria conveniat & differat.

Quæ pars affecta.

in intestino recto, ut apud Galenum liquet, lib. 3. de caus. sympt. & 6. de loc. affect. & multis aliis in locis. Alexander quoque lib. 8. cap. 9. dixit, *tenesimum recti intestini affectum esse*. Indicāt etiam ipsum affectum esse vehemens tensio, ac dolor, cum positu, ac prompta deiciendi cupiditas, paucis admodum sequentibus excrementis, & quod per totum morbi spatium iis, quæ a supernis descendunt, haudquaquam misceri viderur. Affectus hic velut dysenteria, morbus est in soluta continuitate, quo-

Quis affectus præter naturam sit.

niam prædicti intestini recti exulceratio est, ut patet apud Galenum locis iam citatis, tum ex signis hunc affectum consequentibus, ut observatione sequenti magis patebit.

OBSERVATIO XL.

De tenesmo, ex ventris fluxu bilioso retento, oborto.

FLuxum ventris admodum acrem & biliosum, cum empirica mulier subito astrinxisset, bilis acris & mordax in intestino recto retenta, crebrius expultricem quidem facultatem stimulabat, & natura conabatur expellere id, quod molestabat, unde oborta est tandem exulceratio intestini recti, in viro quodam: ad quem postremo nos acciti, istis signis cognovimus eum tenesmo vero laborare. Hunc enim affectum comitabatur implacabilis desidendi cupiditas & conatus vna cum flatibus, & descēdebant per alium mucosa, cum graui distensionis sensu, nec non aquosa, etiam partim mucosa & biliosa, interdum etiam leuiter subcruenta: iisque interpositis nonnunquam ex cibo, quoque recte coacta, sanguine aliquando decedente bilioso ac mucoso, cum ingenti dolore in ventre inferiore, maxime ubi ad secessū deveniret. Cum vero intellexissemus, quod prius diarrhœa biliosa laborasset, acresq; humores contracti essent, & videremus cruenta etiam flaua esse excrementa, non solum coniecimus tenesimum esse, ex signis prædictis, verum etiam a biliosis humoribus retentis hunc affectum esse ortum, quare statim hoc enema ut iniiceretur curauimus. ℞. rad. althæe mund. ℥ j. foliorum viol. malvæ, plantag. ana m. j. hordei commu. p. j. fiat decoct. in lacte caprillo, vel bubulo, si caprillum non habeatur pro ℔b. j. colatura adde zacch. rubei, ℥ j. ℔. olei ros. omphacini, ℥ ij. vitellorum ouorum, num. ij. fiat clyster. Postea & hunc vel similem iniicere iussi. ℞. hordei communis, plantaginis. ana m. j. coquantur in iure veruecæ, vel pullorum gallinaceorum. pro ℔b. j. colat. adde zacchari rub. olei ros. omphacini. ana ℥ j. ℔. vitell. ouorum. num. ij. fiat clyster. Per superiora dedi prius decocti hordei communis, ℥ ij. syrup. ex infus. ros. ℥ j. misce. deinde infus. rhab. postea etiam pul. vstulatum. Adhibui quoque fots & infusiones, ex decocto rad. althæe vna cum foliis viol. malvæ, ros. hordei communis: etiam fots ex iisdem, adiecto oleo ros. myrto & amygdal. dulc. & cum dolor vrgeret, anum inunximus oleo ros. butyro recenti, adipe gallinaceo, anserino simul solutis cum modica cera. Deinde perueni paulatim ad adstringentia, & quæ simul humorem contemperarent, componendo clysterem talem vel huius æmulum ex decocto rubi, canirubi, myrti, foliis plantag. ros. cytinis, hordeo communi, hypocistid. balaustis pro ℔b. j. addendo olei ros. omphacini ℥ ij. & zaccha. rub. ℥ j. ℔. vitellos duos ouorum, cum adhuc dolor permaneret. Sed eo postea absente, olea & vitella ouorum reliquimus. Vel ℔b. ℔. tantum decoct. iniiciebatur primo abluens tantum intestinum, quia fere strictius, cum & vltima pars tantum sit abluenda, postea magis roborans & constringens. Item ex latera

latere veteri fumo denigrato, aceto feruenti fumum excipiebat. quod a quibusdā maxime commendatur, modo etiam linteo conuolutus admovebatur. Quibus subsidiis hic, vt & plures alii, conualuit.

S C H O L I A.

3. **A**ffectus hic cum eiusdem sit generis cum dysenteria (vt diximus) haudquaquam circa eiusdem causas ab ea discrepat, *teste Galen. comment. aphorism. 27. lib. 7.* modo ipsa circa intestinum rectum exulcerationem pariant: nam citra eam tenesmus dici non poterit: quamuis alii, vt Arabes, circa eam fieri volunt: sed tunc vero tenesmus non est. Sic vlcera, tum omnia, quæ prouocant intestini expultricem, huius causæ existunt, siue succedat dysenteria, vel præcedat partim exulcerans, partim inflammans, vel ex acri bile, vel pituita. Nam magna ex parte in pituitosis nascitur. Acetatur enim pituita recto intestino crassa & viscida: putrescit tempore & acrimoniâ contrahit, irritat intestinum: hinc deiectioni libido: sed quia contumacius inhæret, non nisi magno conatu excerni potest. Hoc tenesmi genus dysenteriam fere præcedit. A dysenteria, ab acri humore. Hic vero præcedente diarrhœa biliosa, bile intempestine restricta. Et sic etiam fit sine dysenteria a bile acri mordaci. Et post dysenteriam, cum relinquuntur vlcera, in quibus acris sanies intestinum vellicat, ex quo fit tenesmus. Post pharmaca, si quid intestino hæsit, vt male infracta colocynth. agario. vel glande immissa, quod nobili cuidam euenit, qui a me curatus fuit. A vehementioribus pharmanis nascitur etiam: vt Episcopo Nicolao de Nouillerra Harlemensi, qui a pilulis nimis fortibus demoratus in eundem affectum incidit, cum hæc scriberem. Aliquando etiam iecur plus iusto calefactum acriorem materiâ perpetuo generat, quæ ad partem affectam defluit. Vlcerebus quoque in ea parte sponte natis idem malum accidit. Nam & abscessus in recto intestino & inflammatio hunc desidendi appetitum inuolunt. Alii addunt & hæmorrhoides interiores, vermes, humores acres, aut stercus induratum & coactum. Causa etiam externa præcedente sæpe hic morbus euenit, vt si æger in solio frigido aut lapide sederit, ære, vento frigidior. At mendosus potius fit sine materia. Verum hic cumulus est causarum & magna confusio apud Auicennistas & Auicennam, qui remotas causas cum proximis ponunt, & accidentales in numerum referunt. Sunt ergo causæ huius morbi omnia illa, quæ dolorem faciunt, unde ad expellendum prouocant. Sunt & quæ continuū solant extendendo, vt tumores, flatus, erodendo vel puniendo, vt vlcera. Hæc autem genita sunt vel ex hæmorrhoidibus ulceratis, vel ex acris influentibus aliunde, vt in dysenteria, vel sunt maxime biliosa, salsa, pituitosa. Quod ad signa attinet, demonstratiua iam diximus, scilicet, quod adsit multa egerendi libido, quanquam nihil vel tantum exigua muccosa, cruenta, varia, flaua, vitidia ex-

cernunt, & symptomata quæ tenesmo superueniunt fere eadem sunt cum dysenteria: vigilia nimirum atque dolores. Priuatim & vrinæ stillicidium, vt aphorismus 58. lib. 5. ex consensu vesicæ, quæ illi adiacet, musculo debilitato continente vesicam, vel ex repleta comprimens intestinum rectum, & dolorem faciens. Ideo natura properat continuo repellere: hinc aliquando stillicidium vrinæ, aliquando exitus intestini recti, vel procidentia: & hoc fit, quoniam muscoli, qui sursum retrahere debent, continuo dolore & labore retrahendi defatigati, & veluti resolutis fibræ sunt, vt attrahere nequeant, tum quia multus est conatus partis in expellendo, ob perceptam molestiam: minimus itaque erit in trahendo. Reliqua signa diximus in obseruat. præcedere. quod excrementa in principio sint pituitosa, pingua: progressu temporis etiam ramati specie deiciuntur. 6. de locis affect. Sunt, eodem Galeno teste, aliqui, qui a forti excernendi conatu, præcedente dolore vehemente, lapides callosos deiecerunt, iis, qui in vesica nascuntur, haud absimiles: id quod neque ipse vidit, neque alium qui viderit vnquam audiuit. Quomodo autem diuersæ causæ dignoscantur, facile dignoscetur, ex qualitate eorum, quæ excernuntur: num acria, biliosa, salsa, vel pituitosa sint excrementa, simul cum ætate, temperamento agrotantis, & tempore anni, & vita antea acta, ac reliquis similibus, vt de profluuiis alui & dysenteria diximus, num etiam ex relatu ægri, & doloris proprietate & artificiosa coniectura? In vlcere excernitur sanies, aut sanguis, dolor acutus adest: nam vlcere signa nota sunt, si præcesserit dysenteria, præsertim cum vitiosa deiciuntur, vel muccosa, acria, ac si a deiectione vehementem etiamnum morsum ea parte sentiunt, eiusque partis ramenta cum cruenta sanie, flaua bile permixta, vel salso phlegmate alioque adusto humore excernuntur. Materia vero, quæ ab vlcere profluit, virulenta est; & circa anum dolor pungens. Si valde sordidum est, sæpe sine dolore exit, cum diuturnum, & quasi fistula sit. Si ab hæmorrhoidibus, vel ob rhagadias, præcesserunt, vel adsunt. Euenit enim aliquando tumentibus venis sedis, & illis inflammatis: quæ ex relatu ægri facile habentur. In vlcere itaque sanies aut sanguis, vel acris humor relictus post dysenteriam excernuntur, & si nihil perspicis, aut perspicere potest, profundum esse suspicamur, & fit aliquando cacoethe. Vidimus verminum globulos assidue reijci, ab subinde renasci. Ex apostemate ipso, sedes ipsa inflammatur, & pondus cum sauo dolore percipitur, qui maxime ægri torquet, dum aridum excrementum enixius demittitur: tum & febris non cessat, & quod fluit, virulentum cernitur. quibusdam & sequitur febris hectica, vel atrophia paulatim. Si propter stercorum multitudinem eueniat, grauis distensionis sensus circa ventrem aderit, eruntque alui excrementa præter naturam detenta. Hæc autem multitudo non in cæco intestino coaceruatur, vt quibusdam visum est, cum

Signa causarum.

6.

Ab vlcere.

Cacoethe.

Ab Apostemate.

7.

Signa demonstratiua.

in hominibus intestinum adeo exiguum sit, ut nullum fere habeat usum, neque intra ipsum feces excipi possunt, (ut refert Donatus) velut in nostris anatomicis saepius inspeximus: verum in eodem metaderit intestino recto, vel cum primum colo alligatum est, vel in alia eius parte. Sic stercus induratum coniicimus, si diu aeger nihil reddiderit aut non nisi excrementa dura, sicca sine mucositate. Extrinsecus comprimitur, & pungitur, vel a magno & inaequali vesicae calculo, quia vesica recto intestino incumbit, vel inflammatione parastatarum. Hic adest penis distensio, auctor viinae. Illis calculi signa adicienda, urina reventa, turbulenta, sanguinolenta & similia. In gravidis minatur abortum, ut scripsit Hippocrates. Vterus enim inter vesicam & rectum intestinum situs est, foetusque conceptio amplior, & vesicam (unde assidue merendi cupiditas) & intestinum premit. Quo fit

8. ut etiam in laboribus partus, & alio quoque tempore tenesmi cuiusdam imago illis eueniat: & si hoc morbo vehementius corripiantur, in vehementi illo conatu necesse est laborare vterum, foetusque quoque deprimi assiduo decessu, & vires laedi. Unde abortus. Interdum tam vehemens affectus est, ut dysenteriae similis videatur. Haec quoque ad signa prognostica pertinent, scilicet, mulierem tenesmo laborantem facile abortiri, causa superius nota, etiam ex Galeno 2. de morb. vulg. Quod autem tenesmus neque acutis, neque longis morbis annumerari debeat, hinc fit, quod & facile tollatur, neque unquam per se ingulet, teste Celso. Attamen grauis est, & non sine periculo, si cum dysenteria contingat, vel cum febre. Diu quoque perseverans, non solum vigilias inducit, sed quandoque tabem, ut diximus. Et ille, qui a bile aut humoribus acutis euenit, facile in dysenteriam transit: & a ventositate modo in colicum, modo in iliacum & capitis dolorem, inquietudinem & crudelissimam mortem, ut ferunt quidam, quamvis illa ad tenesum non verum pertineant. Sic & singultum in tenesmo perseverantem lethalem esse volunt. Unde & Bertrutius admonerat cap. proprio, medicum in curatione tenesmi, sollicitum esse debere, cum facile transeat in corrosionem intestini recti, ac ani dysenteriam periculosam, virium deiectionem ob dolorem, & febrem hecticam. Eadem fere habet Guainerius.

OBSERVATIO XLI.

De tenesmo ex frigore contracto, & de alio ex pituita viscida, quae exercebatur.

- I. Monachus ex Diui Francisci ordine, annos septuaginta natus, mense Nouembri, Anno 1549. Alcmariæ rupturam habebat, & postea dysuriam vehementiorem incurrebat, de qua dysuria cum conquereretur, nec aluum probe redderet glande immissa ex pul. specul. hiera picra, melle & sale, aluum deposuit. Et tunc primum mihi confitebatur se tenesmo laborare, quem contraxerat ex aere frigido, in quo se ambulasse referebat. Frigus enim ac aer frigidus saepe hunc affectum inducunt, quemadmodum narrat Guaine-

rius de quodam suo familiari amico, qui cum montem Sinisi in festu natalibus transiret, pene totus congelatus exstitit & tenesum incurrebat. Cum igitur ex aegri nostri relatu intellexissemus, ex solo frigore tenesum obortum, libenter hos clysteres iniiecissemus. ℞. iuris pulli vel caponis, lb. j. Guainerius accepit lb. j. lb. sed praestat in minori copia, ob tenesum iniicere: sufficiunt aliquando ℥ viij. (ut superius diximus) cassia pulu. sacchari ana ℥ j. benedicta laxat. ℥ ij. (Guainerius accipiebat ℥ lb. sed ℥ ij. hic satis erant in sene) olei anethini ℥ ij. salis trui parum, fiat clyster. vel hic sequens. ℞. chamomill. parietar. foliorum caulium. rub. ana m. lb. sem. anisi, fœniculi. ana ℥ lb. fiat decoct. pro lb. j. adde iam supradicta, fecibus emissis, sequenti etiam commode utimur ex oleo rutaceo, solo & anethino ad ℥ vj. fiat clyster, & diu retineatur, ut cale fiat. Ex iisdem oleis vel spicæ aut castorei oleo adiecto saepe inungantur anus, renes, pecten & anchæ. At noster aget fecibus per glandem emissis noluit clysteres admittere, quare oleo chamæmelino & zizamino bombacem intinctam glandis instar in anum intrudere mandauimus: quo remedio dolor sedabatur. Laudant hic infessionem ex decocto flor. chamomill. parietariae, ruta, absinthii sicci, origani, pulegii, anisi, fœniculi, sem. fœnugrac. lini & similia. Sed eiusmodi fortum cum sporigia, quia monachus rupturam habebat, contenti fuimus, etiam floribus chamomill. meliloti & parietaria cum malua, & sem. lini, fœnugraci farina instar cataplasmati pectini admouimus: & ut decoctum sumeret iussimus. ℞. malua cum toto parietaria, viol. mercurial. bugloss. borag. ana m. j. agrimonia, capill. ven. ana m. lb. rad. fœniculi, apii, petros. liq. ras. ana ℥ j. sem. anisi. ℥ ij. sem. althæa ℥ j. sem. 4. frigid. maior. ana ℥ j. cicerum rub. ℥ ij. gr. alkachengi. num. ij. prun. damasc. num. xij. fiat decoctio in aqua communi. pro lb. j. lb. col. adde mellis ros. colati ℥ iij. sacchari parum. quibus remediis cessarunt dicta symptomata, & a tenesmo & dysuria miraculi instar monachus liberatus est. Videbatur hic tenesmus nondum ad exulcerationem intestini recti peruenisse. At alteri, ad quem etiam vocati fuimus, tenesmus ortum habuit ex pituita viscida, quæ etiam excoriationem inducebat: cui hæc infrascripta subsidia commode administrauimus. Primo, iniicimus hunc clysterem. ℞. hordei cum corticibus. p. j. malua, beta, mercurialis, parietaria, caulium rub. ana m. j. centauria minoris m. lb. coquantur in aqua communi. pro lb. j. adde cassia pro clysteribus. ℥ j. benedicta, hiera picra. ana ℥ j. lb. mellis ros. colati. ℥ j. olei chamamel. anethini (quia aderat dolor) ana ℥ j. vitell. ouor. num. ij. salis valde exiguum iniiciatur, & aeger eleuatis cruribus non iaceat, neque diu retineatur, quia pituita hunc efficiens tenesmum in recto intestino iuxta anum existit. Educta materia pituitosa, cum etiam ulcerationem quasi adesse coniceremus, cum tandem mucosa cum cruentis reiceret, ad deterfionem iniiecimus clysterem ex sero lactis, cum saccha. & melle & vitellis ouorum, vel huic similem. Interea fortum

Signa prognostica.

tum parauimus in hunc vel similem modum. ℞. summitatem anethi, tapfi barbati, florum chamomill. meliloti. ana m. j. baccarum myrti. flor. ros. ana p. j. sem. fœnugrac. lini. ana ℥ iij. fiat fœtus: & sacculus ex fursure in vino astringenti decocto admouetur ano, & fiat fumigium ex thure, myrrha, galla moscata & rosis. Prius etiam in ano suscepto fumo per sedem, ex decocto florum tapfi barbati. Quibus subsidiis optime tandem se habuit.

S C H O L I A.

4. Quid ad curationem attinet, ratio victus talis hic esse debet, qualem diximus conferre in dysenteria: & (Celfo auctore ac Alexandro) boni succi cibi & concoctu faciles & leuiter astringentes adhibendi. Quod ad reliquam curationem pertinet, curatur omnis tenesmus auferendo causam: quæ si adhuc fiat vel augeatur, hæc ipsa auferri debet, vel venæ sectione, si corpus plethoricum fuerit, seu ab inflammatione tenesmus originem ducat. Si vero vitiosi succi sunt, leuiter purgandi, siue bilis fuerit flaua, vel atra, aut pituita, crassa vel salsa, eodem modo, quem de dysenteria diximus. Ideo si inflammatio adfuerit, facta venæ sectione, & adhuc eadem perseverante, pituitæ succus cum paucis rosac. cum eo decocto infundi debet, Aetio teste, vel paratum ex hordeo non decorticato & torrefacto, ac plantaginis foliis, cuius ℥ viij. iniiciantur cum ℥ iij. olei ros. & duobus aut recentibus, vel lac recens multum, caprillum potissimum cum oleo rosa. Lumbis quoque circa os sacrum, sedi, ac pubi, & perineo (quod quidam interfœmineum appellant) fœtus ac illinitiones adhiberi debent, oleo myrteo, rosaceo, eoque omphacino, paucio vino albo adiecto. Si dolor intendatur, ex fœnugrac. mal. ros. rub. althææ. sem. lini decocto. Vel in eorum iure infusionses fiant, & fomenta sedi admota, iuxta eundem Aetium. Procedente vero tempore, reiectis rosis, ex reliquis adhibitis chamæmeli floribus ac meliloto fomentum paratur, & oleo rosa. seu myrtino, chamæmelinum, ac anethinum permiscere oportet, & temporis processu eisdem solis uti. Si a bile, vel a quouis humore acri, curetur, ut Obseruat. 40. precedente diximus: caueas admouere astringentia. Iniice decocti hordi ℥ viij. vel x. vitellos ouorum. num. 5. Si ardor sit vehemens, sequens. ℞. decoct. hordei ℥ vj. succi plantag. depurati. ℥ iij. mucag. psyllii, aqua ros. extracta ℥ ij. olei ros. ℥ ij. ℞. mitigat dolorem. Extrinsecus hæc admouentur. ℞. mal. althææ, viol. flor. & foliorum, verbasci. ana m. j. sem. lini lb. ℞. coquantur in aqua, & fiat infusio vmbilico tenus, vel anus calide spongia foueatur, aut sedeat in cathedra perforata, supposito eo decocto feruenti fumum per anum recipiat. Quæcunque in tenesmo administrantur, calida esse oportet, quatinus sit a materia calida, deinde sequenti vnguen. inungatur. ℞. olei rosa. ℥ ij. olei nymphae, mucag. psyllii, aqua rosac. extracta. ℥ ℞. permixtis vngantur inguina, pecten, interfœmineum, anus, partes illi vicinæ. Bilis autem, si vniuerso corpore abundare videatur, concoquatur,

deinde euacuetur in hunc modum. ℞. syrup. de acetos. citri, de succo acetosa, de ribes ana ℥ j. ℞. aqua nymphae, intybi, acetos. ana ℥ iij. fiat iuleb. depuratum, & santalis citrin. ℥ ij. aromat. per triduum vtatur, purgetur cum ℥ ij. vel ℥ j. ℞. infus. rhabarb. adiect. syrup. viol. ℥ ℞. cum ℥ iij. aqua acetosa. Si bilis vsta, adde myrob. citrin. & cum rhab. infundantur in aqua cichor. vel end. adiecto syrup. viol. Si pituita salsa. ℞. cepulas & empeliticæ. Alii post fœtus lenientes ex althæa, ros. viol. & similibus, vel fœtum in aqua calida solum, ut Celsus facit, vel sessionem adiciunt, quæ astringunt & simul contemperent ex decoct. myrti, rubi, ros. cytini, hord. balustii; & iniiciunt oleo ros. omphac. & zacch. rub. & vitell. ouorum adiectis, vbi dolor est: alioqui, ut etiam diximus, eo absente relinquunt oleum & vitellos. Si vero pituita sit, quæ ægrum infestet, ac tenesmum incitet, curetur; ut iam Obser. 41. precedente diximus, vel si adhuc exigua quantitas fuerit in recto intestino eiusdem impasta, detergentibus eiusmodi clysterib. vtare primo ac leuiter adstringentibus; deinde adstringentia magis ac exsiccantia medicamenta adhibeas, quæ etiam in calidum vergant, ut ℞. hord. communis, cicer. rub. ana p. j. furfuris p. ℞. corticum pini, foliorum lauri & florum chamæmeli ana m. ℞. pilular. cupressi, num. 4. fiat decoctum in aqua pluuiali, aut iure pullorum gallinaceorum: e quo excipe lib. i. vel paulo minus; & adde olei anethini, chamæmel. ℥ ij. Si dolor vrgat, duo vitell. ouorum, mellis ros. ℥ ij. misceantur; & fiat clyster. Pariter circa pectinem, sedem, & semen calida fomenta, ac etiam olea adhibere oportet. Fiant autem fœtus, infusionses ex flor. chamomill. melil. fœnugr. anetho, cort. pini, lauri, ac cupressi foliis, malicorii, myrti baccæ, parato decocto ex tribus partib. aqua pluuialis & vna vini adstringentis. Illinitio autem ex oleo anethino aut chamæmel. liliaceo, irino aut rutaceo. In hunc etiam vsum conferunt sacculi ex fursur. in vino adstringenti decocto parati, si sedi admoueantur. Per propriam quoque experientiam ab Aetio commendatur later, perquam vetustus & a fumo denigratus, vna cum contentis in eo paleis, si tundatur, deinde feruente aceto subactus linteoloque alligatus subdatur sedi. Id vero statim ab excretionem ad-moueri debet; & maxime si dolor infestet: demum prædicto hordei, ac cicerum decocto malicorium, lentes, myrti baccæ ac gallæ adici debent; corticem pini, cupressi, pilulas non prætermittendo: idque infundi debet per sedem, mellis rosac. ℥ ij. adiectis. At si tenesmus frigus præcesserit, eisdem calidis, discutientibusque foribus, infusionsibus, sacculis ac vnguentis vti licebit & similibus; prout vsus expostulabit. De quibus vide Guainerium, qui copiosas posuit formulas.

O B S E R V A T I O XLII.

De tenesmo ex stercore indurato oborto.

R Vsticus quidam ab obstructione ex stercore indurato tenesmum grauissimum incurrebat, quod ex graui distensionis sensu etiam circa imum ventris percepimus, & quod sterces valde difficulter exi-

Si de pituita
curatio.

7.

bat: quem statim clysteribus emollientibus & fortibus, ac inunctionibus in hunc modum paratis curare tentauimus, cum optimo successu. *℞. rad. althææ cum foliis. m. j. maluæ, mercurial. viol. branchæ vrsinæ. ana m. j. ficus pingues. num. xij. sem. lini, fœnugraci. ana ℥ j. B. decoquantur in s. q. aqua: & huius colatura accipe ℥ j. adde cassiæ recens extract. ℥ j. B. mellis viol. ℥ ij. olei communis ℥ ij. olei amygdal. dulc. ℥ j. fiat enema.* quod bis fuit iniectum, stercore iam educto. Nihil autem quod acre est his enematis admisceri debet; acris enim feces magis exsiccant, quæ mitioribus & lenientibus tantum enematis educere oportet. Oportet enim in hoc casu præcipue cauere, ne alia præter clysterem lenitiuum adhibeamus. Neque purgantia medicamenta ante stercoreis educationem sunt propinanda, cum inde ægrotanti maximum exitium immineret, attractis nimirum aliunde ex vniuerso corpore ad priorem stercoreis copiam excrementis: & ideo nunquam per os dabimus solutiuum, nisi feces prius nouerimus molliores redditas esse; quod indocto medico & imperito aliquando contigit, cuius historiam narrat Guainerius: videns medicus, quod clysteres nihil operarentur, dedit ℥ j. cassiæ. cum ℥ j. B. elect. indi. & B. j. diag. cum communi decoct. soluta. sed pessime. Nam medicina illa acuta a venis ad intestina humores traxit, qui ob oppilantes feces per ea egredi non potentes, ad stomachum rapti sunt, & vomitu violenter educti, & pauperculum infirmum sæpius ad syncopen deduxerunt, frigido sudore superueniente, & tandem in miseram mortem. Ceterum per enemata fecibus eductis, hunc totum præscripsit. *℞. maluæ, althææ. ana m. j. B. sem. lini. ℥ j. B. decoquantur. in eoque decocto spongia immersa & expressa foueatur ventris pars anterior & posterior. Deinde ℞. olei amygdal. dulc. butyri recentis. ana ℥ j. B. vnguen. dialthææ. ℥ ij. inungatur ventris pars posterior & anterior, circa renes & anum post fotum.* Quibus remediis recte curatus fuit.

S C H O L I A.

3. Si ex stercoreis multitudine, vel stercore indurato fiat calculo.

SI ex stercoreis multitudine vel induratione tenesmus excitetur, tentandum primo est lenibus clysteribus, aut etiam aliquando acrioribus eandem molliri: & vbi suffecerit, ad lenientia medicamenta purgantia transeundum erit, veluti est manna, cassia, fistula, saccharum, viol. syrup. ex pluribus infus. ros. rubearum aut persicarum: & si opus fuerit, aliquid diacatholici addendum. Nam & Paulus medicamentum quod emolliat per os assumptum hoc in casu laudat: sed præstat prius (ut diximus) clystere emolliente feces duras educere. Recte dixit Rondeletius, quod omnis tenesmus curatur auferendo causam: quare si ex stercore indurato fiat, impossibile est ut curetur, nisi stercore emolito & educto. Ita quoque sit ex alia causa fiat, nempe propter calculum, impossibile est curari, non ablato calculo, ut proprio loco dicitur. Interea cerata ex oleo anethino, chamamelino, bdellio, & cera vri emollientia conficienda, & clysteres ex rad. althææ, sem. plantag. & lini, & oleo chamamelino in-

Ex calculo

iciendi. At si lapis magnus est in vesica, non poterit curari malum, nisi eo ablato. Si a recrementis retentis & induratis fiat, remollienda est pars & relaxanda. Quare iniectio olei communis cum paucio vino vtilissima erit, vel decoctum pingue cum paucio sale & oleo, vel decocto maluarum, viol. branchæ vrsinæ, mercurial. sem. lini, fœnugrac. Quod si non reiciatur istis clysteribus, addenda erunt aliqua, magis relaxantia, ut cassia, benedicta, hiera. Idem erit faciendum in multa pituita viscida retenta circa anum. Si ab inflammatione glandularum aut sedis, adhibenda sunt remedia istis affectibus. Quod si sequatur recti intestini relaxatio & procidentia, curetur ut proprio loco dicemus: & si cetera vitia sedis in causa sunt, ut hemorrhoides, fistula, rhagades, condylomata singula, habent propriam curationem: de quibus dicemus libro sequenti. Medicamentum vero acre si fuerit huius affectus causa, detergendum illud est medicamentis præscriptis ad humoris acrimoniam, deinde aliqua pingua iniicienda, ut butyrum dissolutum in iure pulli, vel axungia porci, vel oleum amygdal. Hæc enim pingua acrimoniam frangunt. Fotus quoque prodest ex oleo calido, cum spongia, & glandes ex refrigerantibus stypticis subditæ. Sed si affectio sit in recto intestino, ut bilis post dysenteriam, clystere detergente curabitur. Iniicienda vero paucæ quantitas clysteris, quia extrema pars recti intestini tantum (ut diximus) abluenda, sed frequenter iniiciendi sunt. Post usum iniectionum fouendæ sunt partes sedis eadem decoctione, vel si nimis stimulentur, addere etiam oportet aliqua sensum & acrimoniam humoris temperantia. Clysteres detergentes erunt, quales diximus cap. de dysenteria. Valent etiam facti ex sero lactis (ut supra diximus) cum saccharo, vel cum melle & vitellis ouorum. Quod si sit cum multo dolore, ole. rosa. vel axungia porci miscentur. Quod si perteneret dolor, optimum erit sedere in decoctione intestinorum pingui. In hac decoctione sint maluæ radix aut dialthææ. Quod si ardor sentiat, & caliditas præter naturam in ea parte, addenda erunt aliqua frigida citra adstrictionem, ut folia viol. cucurb. vel cucumerum, vel melonum, vel lactuæ, vel solani. Si pars fuerit deterfa, & dolor sedetur, constringentibus leuiter pars erit corroboranda. Quod si vigilia vna cum dolore persuerante consequantur, neque prædictis cedat affectio, sedi aliquod soporiferum collyrium subditur, ut inquit Aetius. Aliqui, hic componunt suppositoria stupefactiua, ex thure, mastiche, croco, storace, liquir. adiecto paucio opio, ut videre licet apud Guainerium. Sed is admonet, ut cum filo semper coxæ alligetur: quia opium ad intra attractum æternum soporem inducere possit. ipse opii ad summum ℥ j. imponit. vidit ex ℥ ij. opii thuris Licii gummi arab. ana ℥ j. suppositoria confecta. Sed ægrum postea ex tali impositione vnius suppositorii nunquam deinde ardorem atq; dolorem sensisse scribit, & dulcem soporem subsequutum, ut miser ille æger vsque ad diem iudicii, etiam

4. A recrementis retentis & induratis.

A multa pituita viscida.

A relaxatione & aliis vitiis sedis.

Ex medicamentis acris.

5. Ex bile aut pituita salsa.

Anodyna quando competant.

6.

Nota mirabilem casum.

etiam nunc dormiat. Ex eo enim quatuor suppositoria confici poterant: quia quantitatem dactylorum nuclei excedere non debent. Nimia igitur erat quantitas opii, præterquam quod etiam nimis crassum esset. Idem narrat mirabilem casum præceptoris sui, qui suppositorium ex opio confectum cuidam tenesmo laboranti imponi iusserat: ex quo per quatuor continuas horas quieuit, ita ut eodem tempore idem suppositorium filo appenso euauerit: unde ad duos dies æger tam horribilem saporem in ore percipiebat, ut assumere cibum non posset: unde eius præceptor vomitum eidem prouocauit; & tunc æger suppositorium illud filo appenso euomuit.

7 *Certe, inquit, nisi mihi vir tantus narrasset hoc ipsum, vix fidem dedissem.* Ideo monet, ut in talibus suppositoriis nequaquam audaces simus, sed circumspecti, eadem coxæ alligando cum filo, ne sursum repât. Sed redeuntibus unde

A frigore.

digressi sumus, si a frigore externo factus sit morbus, curetur, ut observat. 41. diximus, vel sedeat æger in aqua calida, vel in oleo dulci; vel optimum erit fouere vino. Quod si morbus non expurgetur, addemus quædam calefacientia, ut flores anthos, stœ. had. herbas calefacientes, ut *pulegium* & *trimumque, orig. hyssopum, melissam saluam, &c.* Vel inungantur partes perinei, quæ sunt circa sedem,

A ventositate.

aliquo oleo calido, ut *anethino, rutaceo*. Si a ventositate, eodem modo curetur, ut de frigore; etiam clysteribus & sacculis ac fotibus adiectis seminibus ventositatem carminantibus, ut aniso, ammi,

A vermium motione & morfu circa anum.

8

cari, cumino, & similibus. Si sit ex vermium motione & morfu circa anum, inicienda medicamenta valde amara frequenter, vel decoctum absinthii, marrubii, persicariæ, centaurii minoris; & in colatura dissoluenda myrrha aut fel bouis. Olea etiam addi possunt, vel amygd. amar. vel absinthii vel parum olei de iunipero vel petrolei, vel olei de spica: satis est adiecisse 3j. cum aliis, propter insignem vim eorum. Aut benedicta, vel hiera picra aliaq; laxantia, post hæc amara commodissime iniiciantur. Vel dari possunt pilulæ ex aloe, myrrha,

Ablata causa, vel si ea non adsit, vel admodum exigua sit, quid agendum.

agar. & habarb. & aliis amaris. Cum vero tenesmi causa fuerit abscissa, aut idem non amplius a causa dependeat, aut eadem exigua sit, cum discutiētib; tum modice adstringentibus, laboras sedes moueri debet, cum ex eisdem agro quoque opem feramus. Actuario auctore, totisque viribus, clysteribus, topicis medicamentis ipsum curare nitendum erit, eisdemq; adhuc diuersis, prout diuersæ fuerint causæ, quæ ipsum effecerunt. Reliqua vide apud Aetium lib. 9. cap. 43. de tenesmi cura.

OBSERVATIO XLIII.

De tenesmo ex colico dolore prius oborto; tandem cum ulcere intestini recti.

Vincentius Neoburchius, iuuenis agens annum 29. frequenter nephritico dolori ac colico obnoxius, (a quibus quidem affectibus saepe per me curatus fuerat) incidit anno 1557. mense Octobri in grauissimum tenesmum, & continuam cupiditatem egerendi, materiam muccosam subinde & cruentam deiciens, non sine torminibus

& ventositate. Hoc vitium, ut mihi retulit dum illum accederem, contraxerat ex colico dolore prius: qui dolor cum ventositatibus mixtus ventrem inferiorem occupasset, & vna ad inguina & coxas tenderet, adeo grauis, ut se in lectum portatilem, circa focum luculentum composuerit; ita solus in cubiculo occluso manens, clunibus denuatis ante ignem, calorem in lecto iacens excipiebat. Ex quo quidem calore ignis, cum aliquantulum refocillaretur, ac dolor vi caloris mitigaretur, somno suauissimo obrepente, sic clunibus denuatis permanentibus diu dormiuit, foco ardente iam paulatim consumto & extincto. Tandem cum euigilaret, podex ei fuit admodum refrigeratus, grauissimo tenesmo succedente. Cumque primis diebus nulla adhiberet remedia, malum indies augmentum est. Tandem eius auunculus, medicus existens, potius empiricus superueniens, putabat nephriticam passionem consuetam tum colicum dolorem esse. At grauissimo dolore cum torqueretur, ut a malo liberari posset me similiter vocauit. Fecibus inspectis, ilico tenesmum esse iudicabam, quem & cupiditas desidendi indicabat; quare libenter clysterem iniecissem; at medicus id dissuadebat, qui potius tabulas ventositatem carminantes, ut præscriberetur proponebat, tum alia multa decocta: cui satis resistebam. Sed æger potius auunculo auscultans, enemata non admittebat. Ceterum hæc ipsa tum decocta præscripta sunt. Verum cum iis parum iuuaminis sentiret, & indies malum augeretur, & secessus muccosos frequētes, & postea etiam subcruētos haberet, & modo rursus stercora retinerentur, dolore urgente tandem concessit, ut hic sequens clyster iniiceretur: *℞. folior. malua, viol. mercurialis, beta, parietaria, hordei non excort. ana m. j. flor. chamomilla m. ℞. semin. lini, fœnug. ana 3j. bulliant in aqua sufficienti: & huius decocti, ℞. ℥. j. addendo cassia mund. 3j. benedicta laxat. (ob phlegma viscosum) 3ij. mellis ros. sacch. rub. pro absterf. ana 3j. olei oliuar. 3ij. olei ros. (ob dolorem & puncturam) 3j. duo vitella ouor. salis 3j. misce.* Quo clysteri deposuit primo feces duras, postea materiam muccosam, cum magna alleuatione. Octauo die Octobr. fuit iniectum, & rursus idem enema: & quia materia purulenta (deinde etiam ulcerationem & corrosionem indicans) deiciebatur, aliud enema ex solo lacte paratum iniectum fuit, cum, *ij. vitellis ouorum, & 3ij. ℞. mellis ros. colati ad absterfionem materię etiam muccosę causantis tenesmum: & ad materiam eandem contemperandam & hic fœtus præscriptus est. ℞. tapsi barbari m. j. viol. malua flor. chamomill. flor. ros. rub. ana m. j. sem. lini 3ij. coquantur pro ℥. ij. in lacte bubulo, pro fotu.* & ventrem inunximus ob dolorem, cum etiam conquereretur de ventositate, oleo chamæmelino & anethino. Et cum per totam noctem dormire non posset, ad magnitudinem castanę sumens ex hac mixtura, dolor egregie sedatus est, & per totam noctem deinde quieuit, quod antea facere non poterat: *℞. sem. apii 3ij. sem. pap. albi, hyoscyami ana 3j. sem. anethi, ameos. fœniculi ana 3j. ℞. trochis. alkakengi (nā etiam*

4 *stranguria laborabat*) \mathfrak{z} j. contundantur subtilissime, & cum syr. viol. ros. ana q. s. fiat confectio conditi in star. Similia fere præscribit Bertrutius sub vno ca. de ani pruritu & tenesmo. Sed iubet netalia continuentur, ob hyoscyamum & pap. Ideo post quatuor dies iterum dedi parum; & dolor mitigabatur, succedente etiam somno. Ter ad summum dedi, non amplius; & miro modo iis iuuabatur. Postea cum tenesmus nondum cessaret, ægro sæpe redente mucosa & cruenta, clysterem sequentē denovo iniecimus: \mathfrak{L} . folior. malua. mercurial. beta. viol. parietaria hordei communis ana m. j. flor. chamomil. anethi (ob dolorē) ana p. j. sem. lini, fœnugraci ana \mathfrak{z} iij. sem. coton \mathfrak{z} j. fiat omnium decoct. in aqua pluuiæ. q. s. pro \mathfrak{t} b. j. ad. endo cassia mundata \mathfrak{z} j. β . mell. rosa. sacch. rub. ana \mathfrak{z} j. duo vitella ouorum; olei oliuar. \mathfrak{z} ij. olei rosa. \mathfrak{z} j. misce pro clystere. Mox post operationem & deterfionem sufficientem, sequens clyster iniectus est: \mathfrak{L} . \mathfrak{t} b. j. lactis bouilli, in quo lapilli marini rotundi albi (qui circa littora maris inueniuntur) sæpius igniti & extincti fuerint, succi plantag. \mathfrak{z} ij. duo vitella ouorum in lacte semel ebullita adiiciantur; & fiat clyster. tepide iniiciebatur. Dolor deinde cessauit & tenesmus, neq; amplius rediit dolor; & ab aliis quasi pro desperato habitus, a tenesmo difficilimo curatus fuit.

S C H O L I A.

5 *Similem fere casum narrat Amatus cent. 3. curat.*
44. cui tale fomentum descriptum fuit: \mathfrak{L} . rad. altheæ, malua. chamomill. semin. lini fœnugraci, rosa. rub. ana p. ij. m. \mathfrak{t} b. xx. aqua fiat decoct. cui adde olei ros. chamomill. ana \mathfrak{z} iij. fiat infusus. Eo decocto tepente, vt non solum anus, sed inguina quoq; madescant; & eius vice filtro aut spongia prædicto decocto imbuta & porum expressa quandoq; utebatur. & clysteres abstergentes hoc modo iniecti: \mathfrak{L} . decoct. hordei integ. \mathfrak{z} xv. sacch. rub. \mathfrak{z} ij. β . olei ros. \mathfrak{z} ij. vitellos duos. misce, in quo & mel rola. colatitium imponere optimum sane est, cum ex iis sit, quæ vlcera maxime abstergant. Deinde clysteres exsiccentes constringentes, non minus in curatione dysenteriae valentes, descripti: \mathfrak{L} . sumach. plantagenis, balaustiorum ana p. j. in libris duabus aqua fiat decoctio & in lib. j. huius decoctionis adde semi hircini \mathfrak{z} j. β . butyri recentis, salis expertis \mathfrak{z} j. thuris \mathfrak{z} ij. ouum integrum unum, olei myrtill. \mathfrak{z} ij. misce, fiat clyster: quem pro posse retineat. Grande quoq; immissa, dolore sæuiente, ex seuo hircino parata, cum massa pilul. de cynoglossa, adiecto vno vel altero opii grano. etiam deueniendo ad clysteres ex lacte vaccino confectos, & oleo rosaceo omphacino cum prædictarum pilul. de cynoglossa \mathfrak{z} β . adiectis quoq; granis duob. opii; a quibus gummi tragacanthi & Arab. uti & seuum hircinum & butyrum recens minime eliminabantur: quibus & vnguento ex plumbo foris ad anum applicito, intra octo dies sanus fuit factus, optimo semper assuescens victui, & acria fugiendo. Vbi igitur ab vlcere acciderit tenesmus, ob id pus acre & retentum fieri solet. Quare clysteres ad puris deterfionem in principio iniiciendi erunt, aucta mellis quantitate, aut sacchari. Vel additis vngu-

6 Si ab ulcere fiat tenesmus ratio.

entis deterfuis, quæ vlcus detergendo hoc symptoma auferunt. In principio, quia vlcus magna ex parte solet esse sordidum, vnguen. Ægyptiacū cum multo melle iniiciendum est, & vnguentum apostolorum, vt iubet Rondeletius, eodem modo præparatum. Sensim minuere oportet eorum acrimoniam, quæ iniiciuntur, quia omnia vlcera post deterfionem magis dolorem sentiunt. Vlcus postea curatur ea ratione, qua postea docebimus. Sed ad tenesmum & vlceris curationem multum confert talem facere iniectionem: \mathfrak{L} . hordei torref. p. ij. folior. myrti, olea agrimonie ana m. j. florum centaurei minoris p. j. rosa. siccar. p. β . absinthii tertiam partem, seu m. j. fiat decoctio in hydromelite, & frequenter iniiciatur, donec vlcus deterfum fuerit, augendo vel minuendo mel pro deterfione facta. Quod si in hac iniectione vnguentum pomphol. fideliter dispensatum dissoluatur, vlcus etiam curabit. Idem facit emplastrum diapalma, dissolutū in multo oleo, ita vt iniici possit. Idem præstat vnguentum diuinum, additis \mathfrak{z} j. chalcit. Si autem vlcus fuerit in ipso capite intestini recti vel longanoni & commodè lauari queat: \mathfrak{L} . aqua lactis \mathfrak{z} vj. mellis ros. \mathfrak{z} ij. misce & locus tepide lauetur; vel loco aquæ pone vinum; & si maiori abstersione egeat, lixiuio facto ex sarmentorum cinere utere. Intus laua cum \mathfrak{z} viij. aquæ hordei & mell. rosa. \mathfrak{z} ij. Quod si ita profundum fuerit, vt extra palpari nequeat; \mathfrak{L} . aqua hordei, vel mellis aut lactis aut lixiui sarmentorum \mathfrak{z} x. mell. rosac. \mathfrak{z} iij. misce; & fiat clyster, tepide iniiciatur: quo emisso, quæ consolidant iniiciantur, vt de dysenteria dictum est: & inungantur vlcera exterius: \mathfrak{L} . olei rosac. \mathfrak{z} j. β . mucillagin. gummi arab. \mathfrak{z} β . ceruse, plumbi \mathfrak{z} ij. cera parum; fiat vnguent. molle. Verum vbi ardor intensus fuerit, adde opii \mathfrak{z} β . & tunc mirabiliter prodest. Vel facias sic: \mathfrak{L} . olei rosac. \mathfrak{z} ij. mucag. tragacanthi & gummi arab. ana \mathfrak{z} β . aloes \mathfrak{z} ij. thuris, mastice ana \mathfrak{z} ij. cera parum, & fiat vnguentum. Si dolor & ardor adfuerint: \mathfrak{L} . mucillag. gummi arab. tragacanth. ana \mathfrak{z} β . ducantur in mortario, & cum tali vnguent. locum perunge. Guainerius in hoc casu expertus est solam mucillagin. psyllii. At si inflammatio vel apostema calidum tenesmum inferat, in principio: \mathfrak{L} . succi plantagin. \mathfrak{z} iij. olei rosac. \mathfrak{z} ij. album. oue recentis unum, agatur simul; & per syringam mitte. & extra olso rosac. perunge: & spongia aceto infusa appone. In augmento caules vitello oui & oleo rosac. emplastr. vel \mathfrak{L} . olei rosac. \mathfrak{z} j. butyri sine sale, adipis gallinae ana \mathfrak{z} β . cera q. s. fiat vnguentum molle. inunge. Si ad maturationem tendat: \mathfrak{L} . olei liliorum, chamomille ana \mathfrak{z} j. mucillag. fœnugr. lini ana \mathfrak{z} β . cum cera fiat vnguentum. & hic fofus administretur: \mathfrak{L} . bis malua cum rad. m. iij. fœnugrac. \mathfrak{t} b. j. fiat decoct. q. s. & cum spongia locus fomentetur: deinde inungatur. Vel hoc cataplasma imponatur: \mathfrak{L} . malua. bis mal. cum rad. fol. viol. flor. chamomill. ana m. j. coquantur, pistentur cum axungia, inpinguantur & fiat emplastr. Si rumpatur, deinde vlcus curetur, vt dictum est. Si si frigidum, vero sit apostema frigidū, in principio inungatur oleo ros. in augmento fofus supradicti adhibeatur, & cm-

7

8

Si inflammatio aut apostema calidum, tenesmum inferat, curatione.

quomodo curetur.

& emplastra; adiiciendo semen lini: & rupto apostemate curetur, vt de vlcere dictum est. Et sic totum tractatum de profluuiis alui, vt diarrhoea, leuenteria, dysenteria, & tenesmo, absoluiimus: Ideo hunc librum finientes, ad reliqua sedis vitia progrediamur.

FINIS LIBRI XXII.

LIBER VIGESIMVS-
TERTIVS,
DE SEDIS ET ANI VITIIS
& affectibus.

OBSERVATIO I.

De exitu & procidentia ani, per modum consultationis; pro filiolo Augustini Teylingii Alemariani, sororis mei.



As vs, quem sororius in scriptis lingua vulgari pro filiolo suo ad nos dedit, ad procidentiam ani seu exitum eiusdem refertur. Ceterum cum musculus ani (Graeci σφιγγερ, ἡ ἀπὸ τοῦ σφίγγω, id est, constringendo vocant) resoluitur, anus procidit, atque extremitatis longanonis exitus, seu intestini recti fit. Cum varia huius causae sint, & pro varietate earundem diuersa quoque fiat curatio, quas causas sororius in literis suis non recensuit, cum earundem cognitio tum ex praegressis causis, tum signis praesentibus habeatur, difficilius ob hoc forte in commune consulam, nisi ex medico praesenti magis faciam instructus. Ideo haec, quae scribemus (cum parum medice in literis quaedam tantum obiter narrentur) diligentius a medico praesenti erunt notanda, vt curatio methodo certa absoluat, vtque certi fiamus earum rerum in hoc aegro, quae ad medicum verum & rationalem pertineant: vtque omnium primo inquirat, quae sit sedes affecta: deinde quis sit affectus praeter naturam, postremo, vt ex vtriusque probe curatione perficiat. Licet igitur hic sedes affecta etiam visu satis innotescat, tamen in eadem parte morborum affectus plurimi oriri possunt. Si enim excrementa nobis inuitis egrediatur, resolutio est sphincteris. Si vero extra anum prolabatur intestinum rectum, neque sursum retrahi possit, nisi manu protrudatur, necesse est causam esse in musculis aut nervis sursum reuellentibus, vel membranis alligantibus. Quamobrem videndum in primis, qualis hic sit affectus praeter naturam, cum is triplex existat, morbus, causa, symptoma. Ne igitur hic diu haereamus, affectus est praeter naturam, pertinens ad morbum in situ, quia anus exit, & pars affecta a suo loco naturali dimouetur. Sed cum hoc vario modo fieri possit, vt diximus, causa omnium primo indaganda. Excidit autem anus vel infirmis musculis obliquis, qui sedem sursum reuellunt, ex laxitate membranarum, quibus ossi sacro & lumbis colligatur; ex nervi etiam resolutione, qui ab extrema spina ad sedem porrigitur. Fit itaque ani exitus a mala intemperie humida, laxante musculos ani; vel fit laxatis illis nervosis corporibus, vel

imbecillioribus redditis; vel intumescendo, vel inflammato intestino recto. Si resoluatur nervi, causae ex cap. de paralyti perquirendae erunt, & topica remedia ossi sacro imponenda. Imbecilliores autem redduntur aliquando ob nimiam molliem & humiditatem, vt in pueris a quacunque causa externa; quam & ego coniicio in hoc filiolo Augustini Teylingii esse: vel ob aliquam aliam intemperiem aut humorem madefacientem: quamquam & ob magnam aliquam intensiorem in reddendis excrementis durioribus, aut acrioribus, vt in dysenteria, tenesmo fieri contingit, vt sic morbus ex morbo nascatur. Inflatur autem a quolibet tumore, sed praecipue inflammatione, quam sequitur dolor, febris perpetua, irritatio ad excretionem, vrinæ stillicidium, vt antiquissimus Hippocrat. prodidit: non ex pituita tantum, sed ex sanguine, vel biliosis quoque tum acris humoribus. Verum, vt breuiter rem comprehendamus, eam ad quinque causas reducere possimus. Primo ad humidam pituitam mollescentem longanoni, vel rectum intestinum, aut musculum, qui sphincter a nobis dictus est. Secundo, ad inflammationem seu abscessum, vel apostemam in interioribus longanonis, seu recti intestini. Tertio ex casu, percussione violenta facta supra spondylos dorsii, subsequente resolutione. Quarto, ad paralytin lacertorum seu musculorum sphincteris. Quinto, ad fistulam infiltratam in ano. Vt autem has causas distinguamus, etiam signa hic adhibenda erunt. Si ex humectante qualicumque phlegmate fiat, in ano aderit dolor grauis, saepeque molestus; & magis stimulan, si pituita acris: salsaque fuerit; mordicans intestina aut anum, cum tenesmo, egestionibus albis, viscosis, mucilaginosi, etiam mordicantibus, si biliosa materia ad anum confluat: redit tamen anus, si ex relaxante pituita fiat, & ad interiora manibus facile impetit. Si ob paralytin, signa eadem aderunt, quae de paralyti memorantur: egreditur tum stercus cum ventositate inuoluntarie. Si ex inflammatione vel apostemate, non ingreditur anus, etiam si impellatur. Adest tumor, calor, dolor acutus, & saepe etiam febris perpetua adhærens. Si fiat ex spasmio vel tensione, prohibetur facis exitus, & plerumque sublequitur colica: ex mollificatione autem & paralyti, vt dictum est faeces inuoluntarie vltro exeunt. Si ex casu, percussione, id ex aegri sermone quam facillime dignoscere poterimus. Si ex ulceratione aut fistula fiat, eaq; diuturna praecessit, cum continua stillatione pessimae humiditatis & saniosae, cum induratione labiorum eiusdem. His adiungimus & signa prognostica. Si cum fluxu ventris fiat, vel tenesmo forti, malum: quoniam multiplicat causam, & topicorum remediorum effectum remouatur. Si ob paralytin, casum, percussione, fistulam, non curatur nisi cum blanditiis: & tales longo tempore sustentari possunt. Cum quibus si & pedes resoluantur, idque subito, magis malum est, laesionemque ad nervos progressam significans: quare nullo modo curari poterit: quemadmodum nec paralytis, quae a casu vel percussione fortis originem duxerit. Difficilius quoque in senibus

quam in iuuenibus curatur, licet fortio- rem causam in iuuenibus habeat. Frequenter pueris ex humiditate, tum frigiditate quoque externa euenit. Et hac de causa minime dubito, hunc puerulum sanari posse, modo non ab aliis causis supradictis malum ortū fuerit. In mollificatione quoque, febre superueniente nonnunquam tollitur ægritudo. Sed si remedia secundum methodum & rationem adhibita non cōtulerint, ac corpus indies extenuari cōeperit, tum discolorari, malū lethale erit; nam vertebrarum dorsū ac neruorum paralyfin significat extremam. Nunc ad curationem veniamus; quæ non omnibus eadem est: frustra enim adhiberentur remedia ano, si spinæ vitio resolutus sit neruus: tum enim topica remedia applicanda forent extremitati spinæ, vbi coxa est, redeundumque ad genus curationis paralyfis. Itaque & primum considerandum, nunquid inflammatio adsit, quod ex tumore, rubore, calore & duritie, vt dictum est, intelligemus. Atque hæc erit curanda, vt ceteræ inflammationes, indicatione sumta a parte ipsa, & affectu. Si ex pituita humectante, illa digerenda tum purganda erit, demum topica adhibebimus. Sic quoque, si opus est, materiam inflammationis resolu- entibus medicamentis & laxantibus digeremus, partim etiam iis admixtis, quæ repercutiant & corroborent. Sed quia in puerulo, si adsit inflammatio (*postposita sectione vena, quæ in adultis conuenit, aliisque euacuationibus omissis*) si alius durior, ea irritanda cum decoct. maluar., exiguo adiecto diapruno simplici, vel cassia extracta; idq; quia puer est, si medico præsentī idoneum esse videbitur. Mox reducatur in sedem suam anus. Si adsit inflammatio aliqua, vel rubedo, neque intromitti possit, leuiter foveatur cum decoct. maluar. viol. bis malua, flor. chamom. meliloti, anethi. ros. fol. plantag. ana m. j. coctis in lacte. Hoc enim inflammationem compe- scit, repercutit, materiam fluxam resoluit & do- lorem mitigat. Deinde anus inungatur oleo ro- sac. chamomill. vitell. ouorum simul mixtis. Et ita regatur, donec tumor subsideat: tunc impellatur anus ad interiora. Deinde fiat lauacrum ex astrin- gentibus, puluere aliquo constrictorio insperso. Verum si ex pituita humectante, vt plerumque in pueris accidit, atq; sit infirmitas musculorum ob- liquorum, & corpus crassis viscidis humoribus abundet, vel puer sit pituitosus, (*quia iam, vt puto, septimum annum ingreditur*) detur decoctum ali- quod lene pituitam digerens; cui & postea addi possunt folia senæ in parua quantitate, tum my- robal. chebuli, emblici (*quæ etiam post ventris leni- tionem & stomachum & intestina roborant, & ad strictionem post se relinquunt*) deinde, si quæ sordes ano inhæreat, detergenda prius hydromelite, vri- na propria, decoct. beæ vel marina aqua. Tum stypticis & resoluentibus fomentetur anus; & leuiter manibus imposita, constringentibus de- inderetineatur. Nam tempus remediorum con- stringentium erit, vbi iam ægri deiecerint, & ab- luta sedes reposita fuerit. Vbi autem præ tumore intromitti non posset, fiat, vt superius dictum est,

vel sedeat puerulus in aqua calida butyro mista, donec detumescat; vel foveatur, vt dictum est. Vbi vero repositus fuerit, iubeto eum sedere in decocto ex adstringentibus, vt gallarum, nucum, cupressi, rosa. plantag. & similia. & si adsit aliquis calor vel rubedo in ano, prius lauetur aqua plan- tagin. & rosac. & demum fomentetur adstringen- tibus, & pul. adstringens adhibeatur ex mastiche, thure, balast. glandibus, nucis cupressi. Quo modo ego multos curavi, sæpe etiam sola inunctione ex adstringentibus, puluerata aloë, eaque insper- sa. Fetus quoque sæpe repetitus ex vino austero, in quo acacia, hypocystis, myrtus, malicorium, rosa, sco- ria ferri, inacta fuere, profuit; & alia similia ad- stringentia, mitiora quidem mollioribus; durio- ribus vero corporibus fortiora adhibendo. A fo- tu vnctiones, insersiones puluerum, insersiones & balnea vsurpanda erunt. Quorū copiam apud Aetium cap. 14. lib. 6. ad procidentiam ani inuenies, & apud Neotericos, præcipue Guainerium, & quæ Benedictus Alexander Veronensis de procidua sede, de causis & curatione, cap. 26. lib. 21. scripserit. & A- mæcen. lib. 1. fen. 3. doct. 1. cap. 3. de infantibus curandis: quæ omnia apud Sebastianum Astrucum de morb. puerorum, morbo 41. copiose reperies. At si fuerit cum tenesmo, vel alio fluxu, diarrhoea, lienteria, dysenteria, curetur, vt in propriis locis habetur. Si enim fluxum ventris diuturnum sequatur, vt plerunq; fieri solet, conferunt vniuersaliter con- stringentia ad membrorum corroborationem & materiæ exsiccationem, remediorumq; fixationem in loco, quæ prohibentur ob continuum fluxum. Quamobrem si ob tenesmum sit, locus aqua hor- dei & melle repurgandus, & intestina detergen- da, mox manibus molliter imponenda; deinde sacculi & fetus calidi, vel frigidi styptici, iuxta morbi materiā adhibeantur, decocta in aqua fer- rata, vino rub. styptico, fumigia ex thure, santal. semin. nasturt. assato, in causa frig. in calida bolo arm. gummi arab. & similibus. Et si adsit ventosi- tas, ob quam anus ingredi non possit, adhibean- tur sacculi carminantes. Si simul adfuerint apo- stemata, vlcera, rhagades, hæmorrhoides, ex pro- priis locis curatio instituenda. Si ob fistulam fiat, talem curationem chirurgo relinquemus. Quare in hac re prolixior esse nolo, cū præsens medicus aliquis doctus ea, quæ diximus, moderari possit. Sed vt quædam particularia adderem, & sororio meo satisfacerem, hæc præscripsi. Scripsit Forestus Delphis, 15. Martii anno 1566.

S C H O L I A.

Absolutis diuersis alui profluuiis, & tenes- mo, ad vitia sedis peruenimus, incipientes ab ani procidentia, cum ab iisdem, & potissimum a tenesmo fieri soleat: vnde quidam statim post tenesmum de hoc vitio agunt. Quamobrem hoc libro de ani sedisq; symptomatis & affectibus per- tractabimus. Cuius affectus variæ ac diuersi sunt, anum occupantes, vt phlegmone, abscessus, rhaga- des, condylomata, hæmorrhoides, fistula, fissura, ul- cera depascentia & phagocæna sedis, thymi, syco- sis, verruca, & reliqua eminentia ani: de quibus omnibus

21 omnibus in hoc libro pertractaturi, cum ex quibusdam præcedentibus etiam ani procidentia fiat, commune cum vulua vitium existens, nam & sedē prociduam vocant. Multas hæc causas habet, ut iam diximus, vel ex alui interiore abscessu, vel nimia humiditate, vel aliis iam præcedentibus malis; unde etiam eius curatio variatur, ut nunc satis in obser. seu cōsultatione diximus. Si digitis præ tumore intromitti non possit, tumor relaxandus, sedendo in aqua & butyro: deinde imponendum id, quod protolutū est. Et si purum, digito intromittatur; si impurū, prius abluatur a muccolo humore. Actius muria aut marina aqua procidentem anum fouere cōsuevit: & sæpissime nullo alio medicamento indiguit. Quod si diuturnum malum sit, inuisione vititur, ex Leonida, lib. 14. cap. 7. Sed hæc clariora euadent exemplis sequentibus.

OBSERVATIO II.

De ani procidentia ex tenesmo præcedente.

2 Tenesmo laboranti tandem rectum intestinum relaxatum procidit, ut cum manu molliori introduci non posset: huic spōgia anum foueri iussimus, cum decocto malua, adiecto butyro: & ubi detumuerat, cum pars stercore inquinata esset, vino rubeo abluere mādaui: deinde ut mollior manib. imponeretur, lenim & leniter comprimendo. Vbi vero intestinum repositum esset, fouere iussimus decocto adstringente & roborante, ex gallis cort. granat. ros. plantag. balaustris in aqua chalybeata decoctis: & podicem inunximus oleo myrino, puluere superinperso, ex myrill. & ros. cornu cerui usto, & gallis. Quibus curatus fuit Eodem quoque modo nobilem matronam curauimus ex diarrhoea longa in sedem prociduam prolapsam; fouendo sedem cum decocto in vino rubro adstringenti, ex gallis, balaustris, rhubobson. baccis myrti & foliis plantag. & flor. ros. & supero deinde pul. ex ros. myrti baccis, thur. & mastich. At filio M. Ioannis Neuburchii Pensionarii Amstelrodamensis, cum anū ex mollificatione (ut sæpe pueris contingere solet) extra propendentem haberet, abluto stercore cū aqua plantaginis & vino rubeo styptico, ut anum leniter reducerent curauimus: & insperso puluere myrill. sumach. balaustr. ros. cupul. glandum, puer probe curatus fuit.

SCHOLIA.

2 Si a nimio conatu vel tenesmo fiat ani exitus, humoris quoque ratio habenda, & causa ipsius: nam in causa calida prius expurgata materia per enemata, ut iam libro præcedente diximus, talis infusus vel lotio fieri potest, ex decocto in aqua fabrorum, florum & fol. ros. rub. balaustr. plantag. folior. myrti, cupul. gland. & similium: quibus tepide fiat fatus: & oleo ros. tepid. inungatur anus, & intromittatur prius; deinde ex decocto earundem herbarū in aqua ferrata vel chalybeata: pul. hic sequēs inspergatur: ℞ cornu cerui usti, baccarū myrti, gallarum, sumach. ana ℥j. & fiat pul. A causa frigida inungantur axungia vulpis felis, cū oleo costino; & euacuentur enemate, si opus est; & topica adhibeantur, fatus ex ros. foliis querc. nucum cyress. in vino rub. decoctis, insperso puluere sequenti: ℞ cornu cerui

usti, pinea combusta, thuris, mastich. antimonii an. ℥j. fiat pul. & podice introducto circulus inungatur oleo mastichino & myrti. superinperso puluere iam dicto, vel bedeguaris. Vide Amati historiam, cent. 1. curat. 93. de ani procidentia, cum diuersis symptomatib. Infantulo quoque cum anus procideret, & videretur adesse inflammatio, podicem lauare iussimus aqua plantag. & inunximus cum oleo ros. & acacia; & introducta ano puluerem ex aloë inspergi mādaui. Hoc modo & multos curauimus.

OBSERVATIO III.

De hamorrhoidibus subito & sponte apertis.

Recte dixit Hollerius, quod hamorrhoides vniuersum corpus euacuat: idque aliquando eacochymia; aliquando puro sanguine, quandoque sola quantitate peccat. It autem per venas, quæ a vena cava explantata, vtero, pudendis & sedi implantantur. Hoc enim verisimilius est, quam per venam a liene repurgari. Ramus enim venæ, quæ a medio liene descendit, definit in omentum. Sed de iis postea in scholio latius. Hæc vacuatio cum in genere quidem præter naturam sit, & subinde periculosa; ideo non facienda eius consuetudo. Quibusdam tamen naturis fit naturali consuetudine, & incolumis valetudinis causa est. Tale est, quod scribit Hippocrates: Atra bile vexatis, & renum passionibus, hamorrhoides superuenientes, bonum. Præterea quod a quartana, melancholia, angina, pleuritide, & aliis eiusmodi grauioribus morbis, hominem vindicant. 6. Epid. Salutaris quoque hæc vacuatio epilepticis, & iis, quibus tubercula & maligna vlcera oriri solent. Sic meus pater Iordanus Forestus ex antiquissima Forestorum familia oriundus & nobilitate clarus, præfectus rerum capitalium apud Bergenses, sub ditione Brederodiana prope Alcmariam, qui similiter curam habebat aggerum conficiendorum & reficiendorum. Hic cum Harlemi degeret, apud Nobilem quendam suum cognatum Sparwonwium, incidit in secessum sanguinolentum: quem cum spectasset, perterritus subito domum contendit, atque me vocauit. Excrementis inspectis animaduerti ex venis hamorrhoidalibus sanguinem effluxisse, qui separatus ab excrementis purus cernebatur. Dixi ex eo nihil periculi adesse, imo salutare hoc malum esse; neque omnino esse restringendum pronūtiaui. Agebat autem tunc annum quinquagesimum, vir quidem robustus, & ab ineunte ætate sanus, ut vix in vita ægrotauerit, nisi semel tantum, cum dolorem sentiens in ano abscessum metueret; sed sola cassia deuorata, ex Æmilii medici doctissimi cōsilio, cum nos adhuc ageremus in Italia, a dolore subleuatus fuit. At nūc ex hamorrhoidibus longam eidem sanitatem promissimus, Deo auxiliante, hac euacuatione salutari existente & a multis morbis liberante. Semel enim adhuc, cum ageret annum 58. incidit in quartanam, a qua statim liberatus nostra industria; cuius curationē posuimus in libris nostris de febrib. Hamorrhoidibus subinde fluentibus, non tamē copiose, pancratice deinde vixit, donec senex moreretur.

3

S C H O L I A.

Nomen hæ-
morrhoidum
diverso mo-
do ab aucto-
ribus sumitur.

Quod ad nomen hæmorrhoidum attinet, sæpe æquivoce sumitur: modo pro quinq; illis venis descendentibus a vena chilis, terminantibus ad orificium ani, quæ dicuntur communiter hæmorrhoides. Secundo modo, sed strictius, nō pro illis venis tantum, sed pro inflatione contingente in capitibus dictarum venarum terminatarum in ano; quæ videntur apostemata, quamvis nō sint, & facile ab ani apostematibus distinguuntur. Sic Fernelius etiam in conspicuam & externam, quæ ex ano quoque surgit, prominentem distinxit. Ea ex atro melancholico sanguine, & caua in extremū venæ profusa, nondū tamen illic præ loci duritie exsiliens cumulat, idque impletur, & in specie ficus distenditur. Sed hæc distat a condylomate, quod & breui tēpore fiat, & affligat graui dolore, quodque nondum in callosam duritiē concreascit. Atque ea cæca, appellatur hæmorrhoidis, quā nihil sanguinis effundit. Sed nomen proprie magis sumitur, quando tales venæ proprie sanguinem fundunt, & hæmorrhoidis magis sit aperta. Hinc magna inter auctores, præcipue qui Avicennam sequuntur, confusio, cū alius tres differentias faciat alius quatuor; dū alias similes verrucis esse volūt, duras, acutas, latas, rotundas & cineritii coloris & purpurei, & granis vix & mori similes, confundentes ipsas cum affectibus nonnullis, quos Græci, ut Aetius, in sede quoque fieri scribūt, ut sunt *rhagades, condylomata, thymus, sycofis formica, verruca, clavi, & reliqua ani eminentia*, de quibus suo loco dicturi sumus. Alii distinguunt in *cæcas & fluentes*. Rursus cæcas esse volūt, a quibus nunquā aliquid fluat, vel in quibus retinetur fluxus earū consuetus. Fluentes vero appellant, e quibus sanguis profluit. Rursus distinguunt in *profundas, occultas & externas*. Differentiæ enim adeo multiplices resurgunt, ut apud *Rondeletium* videre licet, modo a situ, modo a colore, asperitate, vel a symptomate ipso. A situ, modo internæ, modo externæ & apparentes dicuntur. Internæ ex venis intestinorum vel mesaraicis, iisque frequentius, qui cachexia laborant, & difficulter, excernunt, & mulieribus difficulter parientibus & alio frequenter utentibus. Conuenit melancholicis affectibus, tumoribus splenis, hepatis, mesenterii. Externæ a venis distributis circa sedem & in affectibus renum profunt. Sanguinis vero reiecti colore & consistentia differunt. Nam qui ab internis fluit, splendidus est & tenuis; qui ab externis, colorem habet magis saturum. Sanguis enim dilutus permixtus multæ substantiæ serosæ, magis tenuis & splendidus est, qualis aliquando redditur in fluxu hepatis. Nam sanguis venarum mesaraicarum, rudem tantum formam habet: qui vero ex ramis venæ cæcæ defluit, magis concoctus & elaboratus; unde & color magis saturatus. Differunt tertio: alie enim leues sunt, vixque similes & leuitate & colore; alie rugosæ, quas practici a moris morales vocant, alias viales ab vix. Sed Neoterici has ad cæcas referunt, ponuntque quatuor differentias; ut Alexander Veronensis facit, lib. 21. c. 7. verruciales, quas refert ad condylomata, v-

4
Hæmorrhoides cæcæ.
Fluentes.
Differentia.

Internæ.

Externæ.

uales, morales, & piscium albicantibus, vesicis similes. A symptomate, aliæ sunt ab inflammatione, aliæ sine ea. Aliæ sanguinem fundentes (quas proprie hæmorrhoides appellamus, nomen generis seruantes) vel cæcæ, doloremque vehementissimum inferentes. Alii rursus penes materiam distinguunt. Sic verruciales a sanguine melancholico fieri volunt; morales ex sanguine; viales ex materia mixta, sanguine nempe melancholico, & melancholia. Vesicales, sed rarius, ex pituita. Rursus ex termino temporis, modo diuturnæ, modo redeuntes, vel per crisin factæ (ut exemplis dum de febribus ageremus ostendimus) modo plures, modo vnæ: modo naturales & iuuantes, modo superflue & lædentes. Et ita iuxta Celsum, non morbum hunc esse volunt, sed quandoque purgationem naturalem. Quamvis tamen per anum sanguis effluat multis modis, nempe per intestinorum fluxum, per hæmorrhoidas, id etiam per *cūxæ* siue ficum & thymum vel mariscam fieri potest. In quibus multi sæpe falluntur, qui sine distinctione, statim fluxu aliquo in ano aut tumore apparente, hæmorrhoidas esse putant, cum plurimum hi omnes affectus inter se differant & natura & curatione. Thymus enim a veteribus describitur tuberculum carnosum, quasi verruca eminens ad cutem, tenue, subprælatius, subrubrum, in summo perasperum, oblongum, florem thymi referens, unde nomen habet. Facile finditur & cruëtur: modo vnus, modo plures nascuntur in pedibus, talis, palmis, mediis femoribus, glande, præputio, facie, & sæpe in ano: etiā in pudendo muliebri, ut in nosocomio spectauimus in puella, quæ ex lue Gallica valde magnum habebat, qui a chirurgo per caustica ablatus, cum maxima putredine. Alii sunt sine dolore carnosissimi, asperi, candidi, aut subrubri alii cum dolore punctorio, duriores, asperiores, maiores, feculenti, liquidi; nec facile curantur nisi tota parte excisa, cui innascuntur. Sycofis idem significat, nisi quod maior est quantitate & magnitudine, ut scribit Aetius. Latini & hunc morbum *ficum* appellant, siue *mariscam*. Vnde Martialis:

Celsus.

Thymus dif-
fert ab hæ-
morrhoidibus.

6

Sycofis.

Marisca.

Caduntur tumida medico ridente marisca.

Falluntur ergo, qui mariscas cum hæmorrhoidibus confundunt. Illæ enim generantur ex præpostera Venere, immodica equitatione, vel attritione quolibet in ea parte facta: Hæmorrhoides vero (nomine pro affectu sumpto, siquidem partem affectam quādoque significat) nihil aliud est quā profluuium sanguinis per venas ani, aut in illis tumor ab influente sanguine. Interim hæmorrhoides ad symptomata referuntur, nempe ad immodicam sanguinis profusionē, & eius minime consuetam suppressionem. Sola quippe naturalis vacuatio ea censetur, quæ quæ grauatur infensumque est, velut onus inutile deponit, citra corporis infirmitatem, citraque virium laetudinem. Sic interiores hæmorrhoides, quum corporis venæ aut multo aut acriter turgent sanguine, nullo rere sensu tumoris dolorive superuacuum sanguinem eructant; ut in meo patre carissimo eueniebat; nam sine dolore sanguis effluebat, idque solum in egerendi conatu, atque isecorū conspectu tenebatur.

Hæmorrhoides.

elebatur feci minime permittus. Profusionis causa continēs est in sanguine, qui multus, tenuis aut violenter erumpit: vel in venis, quæ aut apertæ, aut erosæ, aut ruptæ sunt. Suppressio autem contrariis ex causa fit. Aliquando hæmorrhoides sumuntur a quibusdam pro fluxu materiæ virulentæ vel saniosæ ex dictis venis, quæ assimilantur fluxui materiæ ex vlcereb. ani, non a dictis venis. Et hoc modo sumit etiam Auic. 17. *terti cap. 2. in principio*, cum dixit: *Scias quod multoties existimat aliquis quod habeat hæmorrhoides, & non habet, nisi vlcera in recto, & in iis, quæ sunt circa ipsum*. At fere omnes communiter loquendo de hæmorrhoidibus, intelligunt eminentias illas venarum extumescientium, scilicet hæmorrhoides cæcas vel apertas ac fluentes. At exempla subsequētia hæc omnia latius declarabunt.

OBSERVATIO IIII.

De quibusdam, qui commoda, ab hæmorrhoidibus fluentibus, perceperunt.

Vbi sanguis, qui effluit per hæmorrhoides, redundat, vel vitiosus est, magna commoda subsequi solent, quæ ab ipso Hippocrate numerantur: nam incipientem melancholiam prohibent, factam vero sanant, quod fere is humor crassior & nigrior per has venas vacuetur, licet & alias quoque varicibus, lieni indurato, & arthritidi hæc euacuatio utilis est. Sic dominus Cornelius Zuuius Hollandiæ Præses, cum articuli dolore affligeretur, apparentibus consuetis hæmorrhoidibus, usq; fluentibus, statim prædixi eum ab omni dolore articuli liberatum iri: neque me fefellit hæc sententia, cum nephritidi remedio quoque sint. Nam & 6. *Epid. comment. 3.* tales neque pleuritide, neque peripneumonia, neque phagedæna, neque furunculis, neque terminthis, neque lepra fortasse, neque aphthis corripuntur. Verum non solū his profunt, teste Hippocrate, sed & vteri, vesicæ & pudendi affectibus. Nam & viduis quibusdam loco mensium commode fluxisse hæmorrhoides, compertum est. In gravidis quoque, vt annotauit Hollerius, vtiliter fluxere in duabus mulieribus nobilissimis, iam quatuor menses in vtero habentibus: in quibus partus tempestiuus consequutus est, & saluberrime adoleuit. Erat autem frequens & multus fluxus, sanguis fere dilutus; qui vbi subsistebat, grauius habebant. Agre excluso leuabantur. Quibusdam etiam familiis cōsuetæ sunt. Cuiusdam nobili in ædibus Amb. Paræi chirurgi decubenti, qui Hollerium ad consilium adhibuit, cum in grauissimo dolore renum emingeret pus, sanguinem & crassam pituitam, natura remedium ostendente, quia tumebat hæmorrhoidis, & aliis remediis non cedebat dolor, eo statim tempore iussitaperiri hæmorrhoidem; vnde incredibili celeritate dolor conquieuit.

SCHOLIA.

Quoniam mortalium corpora culpata sunt, teste *Alexandro Benedicto Veronensi, lib. 12. cap. 8. de causis hæmorrhoidum*) talem excrementitii humoris viam salutarem inuenit natura, cum acuti mordacesq; in corpore exundauerint humores,

quibus orificia venarum patefiunt, vt sanguis melancholicus aut atra bilis (*vt tradit Hippocrates*) suo graui pondere eos meatus resoluit. Sed & excrementorum ariditas angustos quoq; transitus anilacerat, & mulieribus difficulter parientibus, & flatulentis cachexia laborantibus vel calculo, aut vlcera in intestinis habentibus, quandoque euenit, & qui cum magnis (*vt dictum est*) conatibus prius recrementa reddunt: fluuntque per diaurosin, dianastomosin aut diapedesin. Ex his aliæ corporeæ & internæ: quædam vero externæ & primitiue. Ex corporeis denuo quædam antecedentes, & iuxta alios coniunctæ quædam existunt. Ex antecedentibus, rursus aliæ complexionales (*vt vocant*) vel compositionales: aliæ humorales. Sic temperatura calida & humida in toto vel hepate multiplicans sanguinem, vel calida & sicca inflammans & adurens. proferens melancholiam; vel mala ipsius splenis dispositio: ex complexionalibus latitudo meatuum situsq; venarum deorsum vergentium, humoribus eo facilius depulsis ac fluxis. Antecedentes sunt, humores prædicti. Primitiue sunt variæ, vt in æstate torrida a nimio calore, aut in hyeme nimio frigore, austris vel aquilonibus, perseverantibus, longis equitationibus, aut quotidianis sellis. Et quæcunq; irritant hoc vitium, vt glandes sale exasperante nitroue inieciæ, suppositoria crassa. Sic Iacobo Heutero apertæ hæmorrhoides, sed suo cōmodo cardialgia laboranti, ex qua euasit, vt alias diximus; clysteres quoq; acuti & aloë nō præparata aperiunt ora venarū; vt & frictiones longæ & asperæ, vel super marmore duræ infessiones. Accedunt metus, formidines, animi perturbationes, diuturnæ vigilæ, ac immensi labores corporis. Accenditur, & sanguis longa fame, siti. In cibis ostendunt salsa, acuta, & quæcunq; rarefaciunt & aperiunt. Cum igitur venæ latæ & calidæ intēperies hunc morbum promoueat, multis hoc malum quibusdā hereditarium est, ob similem compositionem & temperaturā. Quidam tamen (*vt nunc exemplis docuimus*) ex iis venis sanguinē fundunt sæpe, veluti naturali quodam onere sese exonerante natura: idque etiam in ore vuluæ veluti foeminarum menstruo vectigali incidere cōsuevit. Hæc de causis. *De signis quædam addemus, hoc rursus interposito exemplo.*

OBSERVATIO V.

De puerpera doloribus hæmorrhoidibus obnoxia.

Nobilis matrona Berentrechia, mulier admodum proba & prolifica, in Haga Comitatus habitans, in puerperio doloribus hæmorrhoidū fere semper valde affici solebat. Quæ cum multis frustra remediis tentatis, a dolore minime liberari posset, tandē consultum fuit vt suberem lignum, (*nostrum culck appellant*) combureret, & cinerem eiusdem cum vitello oui & oleo rosaceo linamenti instar simul commisceret. Quo remedio, vt nobis retulit, dolores hæmorrhoidum miraculo quodam semper sedabat. Ego autē in hæmorrhoidibus, in quibus fere cruciat dolor, commode sæpe oleo ouorum solo vsus sum; aliquando vitellum oui commode cō rosaceo aut violaceo oleo subegi, atq; iis

tantum utebar. Vbi autem insignis adesset ardor, albumen oui quandoq; apte cōmiscui; modo etiam *micam panis albisimi ex supradictis oleis sub-* *etam emplastri modo*, cū maxima utilitate apposui; etiam subinde sedē inungendo *oleo violaceo, muc-* *ilagine seminis psyllij. pauca portione cera adiecta.*

S C H O L I A.

- 2 **H**ÆMORRHOIDES quandoq; cum impati-
bili dolore turgent: vicinitatis quoque par-
tium vesicæ, (*qua & urina sæpe supprimitur*) colis,
testium, inguinum, & pubis cum osse sacro com-
municatione. Parturientibus, vt dictum est, sæpe
hoc malum oboritur: quod forte etiam huic ma-
tronz euenit ex difficili partu; vel quia erat obesa,
huic malo semper magis in puerperio obnoxia.
Ceterū oportet prius signa inuestigare: quorū a-
lia sunt præfagientia, alia vero demonstrantia ge-
neris, tum etiā specierum; quædā vero mera præ-
gnostica. Præfagientia magna ex parte cognoscū-
tur ex malo hereditario, nū parentes eo vitio ob-
noxij fuerint, ex dispositione naturali mēbrorū,
vt caliditate, siccitate hepatis & latis venis circa a-
num, vt diximus; ex victu crassiore melācholico,
ex plenitudine præcedente & victu aperiente, ex
grauedine dorsi, pruritu ani & dolore præcedēte.
At quæ crisin præcedunt, dum venæ istæ aperiu-
tur, de iis satis superque diximus *in libris nostris De*
febris. Signa demonstratiua generis satis sunt
manifesta, si extra appareant; & multo magis si
fluant: Internæ latentes quidem oculis cerni non
possunt, nisi descendente ano aut immisso specu-
lo; qua quidē in re antiquis placuit, vt sedes euer-
teretur. Inusitatum nec ita tutum remedium no-
stris temporibus. Neque magis tutum mihi vide-
tur illud Rhasis consilium, qui in libro Diuisionū
iubet apponere ventosam supra anum, vt sic cō-
templari possent. Ceterū si sint interius, satis de-
clarantur ex læsione stercoris exeuntis, & ex ali-
quali pōdere & pruritu illarum partium. Sanguis
quoque profluens id manifestabit. Differt autem
a sanguine dysenterico, quia nec mixtus est cum
fecibus, neque cum dolore & torminibus deiici-
tur. Differt quoq; a tenesmo, quia non fit exitus
illius cum expressione vehementi & conatu, sic-
uti in tenesmo fieri solet. Effluit distillando: & cū
tergunt anum papyro vel panno lineo, sanguine
commaculatur; neque dolor adest, vt in dysente-
ria, cum & sanis sæpe appareat. Color quoque fa-
ciei habentis hæmorrhoides, teste Auicenna, ad
viridem colorem declinat. Id quod in multis ali-
quando animaduertentes, solo hoc signo indu-
cti, eos hæmorrhoidibus laborare pronuntiaui-
mus, magno cum artis honore. Fluit quoque per
istas venas (*vt diximus*) sanguis per *diaurosin, dia-*
nastomofin aut diapedesin. Hi vero modi sic depre-
hendūtur. Si sanguis sit aquosus & paucus, per re-
sultationem fit: si per anastomofin, paulo crassior
est, & in maiori quātitate, & in forti compressio-
ne guttatim defluit, & non nisi cū redduntur ex-
cremēta alui: si obarrofionem venæ, præcessit vl-
cus circa sedem, sanguis fluit crassior, & in maiori
quantitate, & etiam sine compressione. Sed dili-

Signa præ-
fagientia.

Signa de-
monstratiua
generis &
specierum.

genter æger interrogandus est, nunquid alias hoc
malo laborauerit. Solent enim hæmorrhoides in
quibusdam apparere per interualla, in aliquibus
quarto quoq; anno, in aliis singulis annis, vel ci-
tius; vt in his, qui multo sanguine abundant. Et
ideo vbicunque consilium est vel commouendi
vel restringēdi hæmorrhoides (*de qua re postea suo*
loco) peculiaris natura ægri primum expendenda
est, exquirendumque ab eo, an ex cōsuetudine &
statis interuallis soleat eo modo repurgari. Sūt e-
nim quib. periodice fluunt: vt fit senibus, mulie-
ribus, viduis, & quib. aliter supprimuntur menses.
Sanguis interim diuertit a venis vteri ad sedis ve-
nas, & ita per periodos sese repurgant. Nō temere
hic, vt suo loco postea dicemus, restringendus est
sanguis. At habentibus hæmorrhoidas cæcas do-
lor vehemens subsequitur, cum cæcæ inflatæ sint
humoribus quoque incensis ac spiritibus cōcal-
factis. In cæcis autē grauissimus dolor adest, quia
partes illæ acutiore sensu sunt. Sphincteris enim
neruosa quædam substantia est, quæ neque vsio-
nem, neq; sectionem facile ferre potest sine con-
uulsione: deinde habet e vicino osse sacro ductos
neruos; & extremæ partes sunt, quales acerrimum
habent sensum, neque sine periculo offendūtur.
Indicio est e pollice pedis subita mors apud Hip. i.
Epid. & læsis extremis digitis dolor grauissimus &
oculis, & pudendis & sedi. Rectitudo quoq; & te-
nuitas neruorū plurimū facit ad doloris sensum.
Quæ omnia indicant, non sine causa, pleniorib.
vasis & distensa membrana sedis, quæ orificis ve-
narum prætenditur, a plenitudine aut inflamma-
tione acutissimum dolorem excitari, qui sæpe ad
se totam curationem traducit. Sunt itaq; vel sine
inflātione, vel cum inflātione. Inflāmatio-
nis signa sunt dolor, rubor, tensio, renixus, febris,
si vlcerentur, etiam pus reiicitur. Sed & hoc scitu-
dignum, quod neoterici adiciunt, quod nō tan-
tum fluat sanguis, sed aliquando etiā aqua citrina
vel aquositas quædam lotiua, in iis, quas vesicales
appellarūt. Et si sint ex humoribus frigidis, senti-
tur conturbatio, dolor & grauitas in ventre, pon-
dus circa crura, & ani circulū. Ex calidis punctu-
ra circa anum, calor & ardor: præter grauitatem,
pondus, dolorem circa anum, anchas & dorsum,
ægri tandem debilitantur: aliquādo appetitus de-
ficit, sitiunt; lædūtur a frigore, & iuuantur a calo-
re; colorque iis accedit citrinus, ad viridem decli-
nans, modo fuscus: quæ signa plerumque conco-
mitantur eos, qui hæmorrhoidibus afficiuntur:
accedit discoloratio faciei & grauitas coxarum, si
superfluant. Quod ad prognostica attinet, cæcæ
omnium deterrimæ. At apparentes minus malæ
sunt, quā latentes aut profundæ, remediis aptius
ad loca venientibus. Fluentibus quoque dolores
remissiores, materia etiam purgata, quæ in cæcis
retinetur. In mulieribus, menstruis fluentibus cu-
rantur hæmorrhoides; & e conuerso: ac fluentes
hæmorrhoides, passionibus renum medentur, 6.
aph. 11. & 21. insanientibus commodæ, & phrene-
ticis & melancholicis. Difficiliter tamē curantur,
ob multas causas, teste Galeno, cum pars sensilis
facile

Cæca hæ-
morrhoides
cur valde
doleant.

Prognostica.

facile irritetur ab acribus mordacibus pharmacis, & mordacib. recrementis aut duris per eam partem transeuntibus: est etiam semita superfluitatū, frigida pars, in decliuiori loco posita, per quam viam transeunt feces; neque medicamenta ibidē morantur; & materia tanquam per sentinam ad anum recipitur, diminuendo quietem, vt Auic. ac Rhases afferunt. Curationis periculum etiam cōstat ex aphorismo 12. lib. 6. a diuturnis hæmorrhoidibus sanato, si vna non seruetur, periculum est aquam intercutem vel tabem aduenire. Nam itinere intercluso, vt refert Galenus in commento, vna & duritiem in hepate facit, & simul multitudine grauians, ac crassitudine, calorem in ipso natium exstinguit, cum tale quid accidat, quale in flammis exterioribus, in quibus multa ligna superingesta strangulant ignem atq; exstinguunt. Si enim a natuo calore generatur sanguis, manifestum quod ipso exstincto non generabitur amplius. Aqua vero intercutem fit, quum sanguinis generatio frustratur. Si vero aliquando posset hepatis propellere multitudinem ad venas pulmonis, his vase aliquo rupto tabidi fiunt. Non frustra igitur consuluit vnam saltem seruari hæmorrhoidem, vt per hanc enacuetur feculēta & vitiosa materia hepatis, præsertim in quibus longo tempore solita est per tales venas excerni. Potest quoq; ex omnimoda restrictione fieri mania, dolor capitis, hydrops, aliq; morbi melancholici, & cancer, lepra & scabies. Nam tales, quibus aperiuntur eiusmodi venæ, neq; pleuritidem, teste Galeno, neq; pulmoniam, neq; corrosionem aut scabiem patiuntur. Et sicut Hippocr. hæmorrhoides antiquas per se vel per artem restringere malum dixit, ita & vltra modum fluere, malum quoq; idem pronuntiant: quoniam marasimum vel hæcticam, vel hydropem prælagit.

OBSERVATIO VI.

De dolore hæmorrhoidarum; per modum consultationis.

VIR Nobilis, cum insignem aliquando dolorem pateretur hæmorrhoidarum, consultandi causa me accessit, vt eidem remedia quædam transcriberem, quo ab hoc dolore leuari posset. Cui hæc infra scripta per modum consultationis dedi. Sciendum, vir generose, quod dolor hæmorrhoidarum plerumque contingat ex sanguine melancholico multiplicato, ad venas hæmorrhoidales transfluxo, & ibidem coaceruato, qui nisi extra exspiret, cæcas & surdas aliquando infert hæmorrhoides, a quibus nihil sanguinis profluit: & sic propter tensionem factam, sanguine exire non potente, infertur interitus hæmorrhoidarum dolor. Solet etiam aliquando sanguinis excretionem præcedere dolor: quamuis etiam circa dolorem hæmorrhoides aliquando profluant, & etiam subinde doleant, etiam nullo sanguine succedente. Qui dolor tam magnus aliquando esse potest, vt per sympathiam vesica laborante, vrina succedat stillicidium. Sic viro cuiusdam (de quo refert Dodonaus, medicus quondam noster familiaris) cæca ac interna hæmorrhoides mole-

ste erant. Medicus enemata adhibuerat, quibus saltem & hieram admiscuerat: Hinc dolor & inflammatio adeo intensa, vt non minus, quam hæmorrhoidum labor, vrina quoque molestum esset stillicidium: & cui prius remedium adhibendum foret, in deliberationem caderet. Huic autem mox olei violacei uncia in anum injecta bene fecit, dolor primū hæmorrhoidum, deinde & vesicæ leuato, eodem vero postea aliquoties imposito, omnis dolor conquieuit. Quo oleo, si tu etiam vti velis eum dolore tentaris, non erit inutile. Vel hic clyster iniiciatur, quo præceptor meus Benedictus Fauentinus Bononiensis professor commode utebatur: ℞ olei violacei ℥. ii. j. decoct. folior. caulium ℥. vii. vitellum vnius oui, zacher. rub. ℥. j. ℞ salis communis ℞. ij. vel fiat sine sale. Si circulus ani ita fuerit obseratus, vt clyster minus imponi possit, detur ℥. j. vel ℥. ℞. cassiæ recenter extracta. Dolor adhuc perseverante, cum nunc simus in Maio, basilicam dextri brachii tundere facias, moderate sanguine extracto. Quod si deinde dolor adhuc urgeat, & medico tuo præsentia apium videatur, saphena etiam tundatur. Hoc enim modo præceptor meus in simili casu procedebat: neque iis iuuantibus, cum cæca hæmorrhoides dolorem inferrent adhuc, die vno atque altero interposito eas aperiebat, cum panno aspero fricando, vel cum foliis ficuum. Alii id cum phlebotomo faciunt: verum cum facile dirumpant venas plusquam sit oportunum, hinc fit vt ulcera in hæmorrhoidibus figantur. Ideo securius est eas aperire sanguisugis bene purgatis, extremitatibus hæmorrhoidum apposis duabus vel tribus, prout expediet. Sed id non faciendum, nisi præcedentibus aliis vena sectionibus: & cum sanguisugis non extrahantur nisi quatuor uncia ad summum; nam debiliores exsistentes ex priore sanguinis detractioe, maiorem copiam non ferunt. Si neque istis dolor adhuc sedaretur, materia concocta cum syrup. viol. aquis borag. fumariæ, lupul. & similibus, purgetur cum syrup. ex infus. ros. pallid. cum foliis sene, vel cum elect. lenitino, vel diaseña, adiecto diacatholico. Vel in hunc modum. ℞. syrup. ex infus. ros. pallid. cum foliis sene ℥. j. elect. lenitini, diacatholici ana ℥. ij. confect. hamech ℥. j. ℞. cum decoct. communis ℥. iij. fiat potus, mane exhibeatur. Corpore repurgato, bis terne in die hæmorrhoides sequenti unguento, egregie dolorem sedante, inungantur, quo & præceptor meus vti solebat in mulieribus prægnantibus, quæ propter retentionem menstruum fere sæpe per molestantur: ℞. olei viol. loti cum aqua viol. butyri recentis ana ℥. j. vitellum vnius oui, olei de semin. lini ℥. j. cera q. s. fiat unguent. molle. Vell lana succida sequens ano apponatur: ℞. olei sem. lini, de chrysomelis ana ℥. iij. porcellionum, verumum terrest. ana ℥. j. misce, bulliant ad perfectam coctionem animatum: deinde colentur cum forti expressione, & vsui seruentur, & intus cum lana succida madesacta ponantur ad locum hæmorrhoidum. Vel hoc emplastrum apponatur: Medulla parisi ℞. j. lactis oui vel vaccini, vel capri ℞. ij. bulliant ad consumptionem duarum tertiarum lactis. Deinde adae pinguedin. renum caprarum ℥. ij. puluer. vermium terrest. ℥. j. misceatur, & calidæ ano apponatur. Sed & hoc balneo commode vitur: ℞. folior. malua cum

rad. rad. althææ, bismalæ, violariæ flor. tapfi barbari, chamomil. meliloti fœnugr. semin. lini ana m. j. b. bulliant in s. q. aquæ dulcis, ad consumm. m. dietatis. Fiat infusus in hoc calido balneo per horam unam. Interea & illud cognitu necessarium, quod in hæmorrhoidibus cæcis plerisque alius obstructa est. Ideo si id tibi contingat, hoc vel simili clystere utendum, non solum ad alui lenitionem quin imo & ad certam doloris ablationem: ℞. olei olivar. decoct. rad. althææ ana ℥ v. butyri recens ℥ iij. succi folior. porrorum ℥ j. b. z acchar. ℥ ij. vitellum unus oui, salis communis ℥ ij. At si ulcerata sint hæmorrhoides, a sale plane abstinendum. Hæc sunt, vir generose, quæ casui tuo utilia esse censeo.

S C H O L I A.

Hæmorrhoides adstrictæ curatio.

6

Q V O D ad curationem attinet hæmorrhoidū, varia est intentio, prout affectus euariat: modo enim fluxus est, modo adstricta passio: & cum fluit, nunc permittitur, si per periodos id faciat, nunc supprimitur, si vires lædat; inde enim concoctio vitiatur, & hydrops sequitur. At hic de passione adstricta agitur, quæ fit cum replentur fluxione vasa, quæ ad annum terminantur; idque bifariam: vel enim replentur cum dolore facto ab extensione vasorum, (vasa enim sensu prædita sunt, ut diximus: vel cū dolore & tensione adest inflammatio, quæ non venas solum maiores, sed & minores, & musculorum anispatia occupat sensilia, & fit phlegmone. Contingit & differentia (ut prius diximus) ex natura humoris: aliquando enim sanguis acutus est & calidus; aliquando frigidior. Est & alia differentia, de qua etiam antea dictum est, ratione loci. Nam vel cæcæ dicuntur hæmorrhoides, vbi tumor extra non apparet, vel sunt extra eminentes. Rursus distinguimus, quoniam vel sponte naturæ fluxio est excitata, ob copiam crassi sanguinis, vel ex aliquo accidente, ut equitatione. Primus casus, si sint cum dolore mediocri, nec magno tumore, loco non inflammato, tunc scopus est euacuare præter naturam distentum: cum itaq; fluxus cessauit omnino, tunc ex eo loco ipso; cum magna ex parte, tunc e vicino. In primo igitur casu vacuatio tentanda per resoluētia, si multa materia non sit, neque magna durities, vnde conicimus contumaciam humoris: sed si hoc timeamus, melius erit venas aperire cum medicamentis aptis, vel ut alii volunt chirurgiæ; quæ tamen non adeo, ut etiam in obseru. præc. diximus, probatur. At quæ resoluunt, nota sunt: siccant enim sine morbo, ut radix & flos tapfi barbari, & mucilagi fœnugraci & althææ. Emplastra & unguenta his similia, ut ex cape albo & butyro simul decoctis; & est Rhasis multum expertū. Quod si molliores sunt, etiam magis siccante utemur, ut alumine illis adiecto. At quæ aperiunt, de his etiam paulo post dicemus. Secundus casus est, vbi dolor & tumor magnus & inflammatio. In quo casu, si de magno fluxu suspicio est, auersione utemur; quæ fit per contraria, ut secando superiores venas; mox deriuatione ex infernis. Aliquando hæc secunda sola sat erit. Mox dolor sedandus emplastro ex cape albo; vel cerato Galeni albo, vel unguē-

to popul. cum opio, vel ex hyoscyamo. Post hæc dolore sedato, si tumescant adhuc, cura eadē erit, quæ in primo casu. Sic in ægotante quodam cum dolor intensus esset, nec remediis sedare posset, solo fotu tapfi barbari in aqua cocti cum semine hyoscyami sæpius experto omnis dolor euauit. Interea sciendum tripliciter corpora lædi ab hæmorrhoidibus, scilicet cæcis non consuetis fluere; & cæcis fluere consuetis, sed iam natura fluentibus; & etiā ex superfluentibus. Cæcæ autem requirunt mitigationem doloris, ut detumescant & resoluantur. Præter diuersionem conueniunt infusus, emplastra, olea; de quibus videas Rōndeletium, & alios. Quæcunque relaxant partem distentam his conferunt. Interea, quod ad doloris sedationem attinet, diligentissime etiam inspicere oportet, nū pars sit cum aliqua inflammatione: tunc enim refrigeranda & relaxanda est. Nam constringentia & vere repellentia in dolore vehementissimo non sunt apponenda, nisi fluxus immoderatus iūctus esset, & qui raro iūgitur, nisi per arrosionem fluāt hæmorrhoides. In dolore cū caliditate magna vitimur, vng. ros. vel viol. vel succo hyoscyami in paucā quantitate, vel oleo mandragoræ admixto in vehementissimo dolore. Cogimur aliquando ob vehementiā doloris opium diluere in oleo viol. vel cham. vel viol. li. lior. & amygd. dul. aut mucilagi fœnig. & supra partē apponere cum paucō croco. Pro arcano a quibusdam hoc habetur: suber combustus puluerisatus cum oleo sem. lini vel oui vitello: alii limacis vtuntur, cum testa decoct. in oleo viol. Vide plura experimenta apud Nicolaum & Gradum, ac alios Neotericos. Alii, quod ad exsiccationem attinet, vtuntur antimonio cum succo tapfi barbari. Ceterum si post vsum horum remediorum dolorosa permaneant vel tumida, quod vix contingit, tunc tutius erit procedere cum iis, quæ sanguinem contentum in iis educant: Quæ intentio principaliter versatur circa hæmorrhoidas cæcas fluere consuetas: quæ si non aperiantur & tumida maneat, morbi supradicti, ut hydrops & apostemata in hepate expectanda, sanguine retento. Ig tur venis superiorib. sectis & in curuatura poplitis vel saphenæ, & deinde potius sanguifugis quam phlebotomo. At prius emolliendæ balneis, unctionibus, emplastris emollientibus. Et ita molliores redditæ aperiendæ frictione aspera, ut diximus, foliis ficuum, unguento molli subactō ex succo cepæ rubræ, vel eadem cepa acetō macerata confusa & imposita cum oleo irino, ruta- ceo, cum pinguedine lardi erasa, vel pulpa colocynthidis in oleo immersa, & alligatur ano: quinque horarum spatio, ut aiunt, aperit; cum stercore columbino cum molli ping. lardi mixto, cum foliis parietariæ appositis; fotuq; ex cyclamine, bryonia, iride, & similib. cum felle porci, balanis acribus. Verum si nimium fluant, & vires omnino deiciantur, tunc restringendæ iisdem remediis, quib. menstrua superflua & vires deicientia restringuntur. Nam fluxus immodicus hæmorrhoidarum statim supprimendus, quia toto genere præter naturam est & rationem causæ habet: refrigerat iecur & totū corporis habitum, & vires deiecit. Hoc enim morb ge-

nus

7
Trib. modū
laduntur co
pora ab hæ
morrhoidib

Intertio quæ
versatur cir
ca hæmorr
hoidas cæ
cas fluere
consuetas.

9
Si nimium
fluant & v
res deician
tur, curatio

s. de is, hamor- des euer, aperi- sistant, ant, li. 4.
IO
II
hamor- das in- as flu- s.
 nus (teste Aetio) plurimorum saepe malorum ori-
 go est. Nam & deformitatem, & vitam miseram,
 interdum & mortem affert. Deformitatem, quo-
 niam nimia inanitione vniuersum corpus deco-
 loratur: vitam miseram, quoniam perpetuæ im-
 becillitati occurrendum est: mortē, quia frequen-
 ter iocinore ob excedentem euacuationem refri-
 gerato, aqua intercus superuenit. Vult igitur is, vt
 plane delectantur post rectam viuendi rationem &
 sanguinis detractionē. Deinde vitur medicamē-
 tis, vel etiam chirurgia, vt apud ipsum ad longum
 videre poteritis. Interim supprimuntur diuersio-
 nibus. Diuertuntur autem euacuādo sanguinem
 extra corpus, vel trahendo ad partem remotam. Si
 multus non fluxerit sanguis, corpusq; multo san-
 guine abundet, vires valeant & etas nō dissuadeat
 vena brachii aperienda erit, parua apertione, ne
 multus sanguis afflicto fluat, & vt magis tenuis &
 serofus fluat. Si vero æger debilis sit, aut propter
 multitudinem sanguinis de fluxi imbecillior red-
 ditus, fiat *ligatura dolorosa in extremitate digito-
 rum*. Apponantur cucurbitulae supra iecur & lie-
 nem, vel sub alis, & sanguis extra trahatur. Post di-
 uersiones alii per interiora exhibēt ea, quæ sangui-
 nem incrassant & restringunt, vt est *syr. de portula-
 ca, & alia, & j. trochis. de carabe, cum vinorub. sty-
 paco*. Exterius sunt vng. restringentia ex succis plā-
 burse pastoris, *tapsi barbi, sang. draco. boli, & similibus,*
vel cum cerussa, lithargyr. Etiam ex constringenti-
 bus balnea & infusio parant, in quibus ægri in si-
 deant. Vide de his auctores Leonellum & Ron-
 delletum, & alios. Hoc sequens valde restingit. *℞.*
ossium myrob. indorum combustorum ℥. ss. scorie ferri
preparata ℥. ij. lapid. hamatit. ℥. j. ss. gyphi ℥. ij. teran-
tur vltima contritione, cum succo plantaginis, & cum
eo liniatur et cūlus ani intus & extra. Alii vtuntur
fumigio ex bdellio. ℥. j. quoque pilul. de bdellio summa
per os, potenter reuinet fluxum hæmorrhoidum.
 Puluis bufonis combusti vel ranæ terrestris posi-
 tus supra hæmorrhoides, dicitur eas stringere a
 proprietate. Si hæmorrhoides sint internæ ac pro-
 fundæ, quæ fluunt, fiat licynium intinctum in cō-
 positione sequenti, & intromittatur. *℞. thuris,*
sanguinis draconis, boli armen. pilul. leporis ana ℥. j. ci-
neris testarum oui, foliorum oliuæ ana ℥. ss. tela aran.
℥. j. omnia incorporentur cum seuo castrati, & succo
tapsi barbat, & supponatur licynium quater in die.
 Atque his curabitur, si Deus, voluerit.

OBSERVATIO VII.

*De hæmorrhoidibus cæcis, ad condylomata ac-
 cedentibus.*

I
 Ioannes Heuterus, vir præclarus, a quartana li-
 beratus incidit in hæmorrhoides cæcas, proxi-
 me ad condylomata accedentes, cum grauissimis
 doloribus, vt integris noctibus vigilaret, ex crasso
 humore melancholico. Eo primum purgato cum
decoct. senæ adiectis. sy. de epithymo, de fumar. & simi-
libus, deinde ad resoluendam materiam coniun-
 ctam & dolorem sedandum, vsi sumus *fo. ex de-*
coct. fol. maluæ, althææ, cum rad. folior. viol. flor. melilo-
is, tapsi barbat, sem. fœnug. althææ, lini in lacte decoctis.

A fotu inungebatur oleo lini, *viol. ros. butyr. recen-*
te, deinde & oleo onorum. etiā lana succida apposita,
 immersa sequenti mixturæ: *℞. olei lini ℥. j. ss. olei*
viol. ℥. j. porcellionum seu oniscorum recentium, ver-
minum terrest. ana ℥. j. cocta parum, per pannum fiat
expressio, & vsui referuetur. Quibus cum dolor nō
 mitigaretur ex toto, licet subinde minus doleret,
 hoc enema molliens, leniens, sedans dolorem in-
 iectum fuit, cum aluum non bene deponeret: *℞.*
folior. maluæ, viol. tapsi barbat, caul. rub. betæ, althææ
mercurial. seminis fœnugr. lini ana ℥. ss. coquantur in
sq. aquæ, huius colat. accipe ℥. x. addendo olei olinar.
amygd. dul. viol. ana ℥. j. ss. butyri recentis ℥. i. ss. cas-
sia ℥. vj. zacch. rub. ℥. j. vitellum vnius oui, salis triti
℥. j. fiat clyster. Eo ter aluum deposuit cum maxi-
 ma alleuiatione. Ab iniecto clystere, paulo post
 hæmorrhoides interiora apertæ sunt, sed paucum
 admodum sanguinis fluxit cum fecibus vix effa-
 tu dignum. Ideo post tres dies cum feces denuo
 duriores euaderent, ac dolor ingens reuenteretur,
 hunc bolum deuorauit: *℞. cassia recens ex cannis*
tracta ℥. vj. confect. hamech ℥. ij. zacchar. candi a-
perso fiat bolus. eoque deuorato quatuor secessus
 prius fecales, postea & mucosos ac melancholicos
 habuit. Tunc in ano inspeimus excrescentiam
 quandam vnā atque alteram exterius apparen-
 tem, valde exigua tamen, condylomatū in-
 star, ex quibus sanguis non profluebat; neque ab
 eo tempore, nisi post clysterem, valde exiguus
 existens, visus est. Cum vero ingenti dolo-
 re denuo afficeretur, ad dolorem sedandum & e-
 molliendum, *emplastrum* apposuimus *ex foliis mal.*
viol. & tapsi barbi cum farina hordei & butyro recen-
ti paratum. Dolor licet prima fronte tunc videba-
 tur mitior, paulo post tamen redibat multo vehe-
 mentior, licet diceret se melius habere cum sede-
 ret, quam cum decumberet. Nam ex continua
 sessione anus comprimebatur, & melius ferebat,
 optabat vt aperirentur. Adhibita denuo decocta
 maluæ cum spongia instar fotus, & oleo terebin-
 thinæ inuncto, cum multis hoc modo aliquando
 apertæ sint, etiam adhibitis cepis contusis, nihil
 inde auxilii reperit. Puluis quoque *onorum rai-
 vum in littore maris inuentorum* inspersus fuit. Hoc
 enim modo plurimi a condylomatibus & hæmor-
 rhoidibus cæcis curati dicebantur. Aliis multis
 experimentis adhibitis, etiam vsus est radicibus
 chelidonie minoris cont. sis & applicatis, quæ
 proprietate dicuntur valere ad condylomata &
 verrucalæ hæmorrhoides: quare etiam hæc herba
 a vulgaribus dicitur *speen cruyde*, ab eius insigni ef-
 ficacia ad hoc malum. Sed his nihilo magis iuuan-
 tibus, vna etiam vocauit M Lambertum chirur-
 gum seniore, qui aliquando nos comio Del-
 phensi præfuerat. Cum autem ab vna parte ani vi-
 derentur apertæ, licet sanguis non efflueret, sed
 tantum madidæ essent, habentes paruum foramen
 capitis sphincteris instar vel aciculæ; ideo vtrius-
 que consilio hoc digestium appositum est: *℞. te-*
rebinthina lota in aqua rosa ℥. j. ss. vitellum vnius oui
cum oleo rosaceo mixtum. fiat digestium. Deinde
 super imponebatur ad mollificationem & maio-

rem attractionem, emplastrum diachylonis. In parte vero sinistra ani erat condyloma maius, & in eo dolor intensior, cui ad exsiccationē pecia lineae infusa in aqua plantaginis bullita, cum modico alumine vsto expressa & duplicata calide apponebatur. Deinde lintenum conduplicatum compressionis instar, ne ex ponderelabia ani comprimerentur, vnde dolor augebatur, impositū fuit. Atque hoc modo chirurgus procedebat aliquo tempore. Verum non diu post, cum ex appositione aquæ prædictæ fieret quasi corrosio, reliquit aquam, & eius loco apposuit vnguentū de cerussa; etiam postea relinquendo digestiū & diachylon. Tamen aliquot diebus intermissis, relicta aqua, cum duo foramina, licet exigua, semper mandentia apparerent, iterum apposuit tantum diachylum. In fine vero sola aqua ros. & plantaginis lauabat; & paulatim post multos labores, quos passus erat, fuit curatus. Citius autem curari non poterat, cum corpus plethoricū & cacochymicum haberet; & ideo dū chirurgus topicis vteretur medicamentis, sæpe eūdem purgauimus, etiam præcedente venæ sectione. Et ita tandem ab omnibus doloribus liberatus, probe curatus permansit.

S C H O L I A.

- 6 C Vm hic eiusmodi doloribus torqueretur, innumera etiam vetulæ (*ut fieri solet*) referebant experimēta, vt fumigio vteretur ex mastiche, quæ candelæ cereæ paschali infigitur, quam supponeret carbonibus ignitis sub cathedra perforata, & fumum vndiq; clausus in anum exciperet, superstitionis hoc equidem remedium, cum sola mastix aliquando iuuerit, licet candelæ cereæ paschali a sacerdotibus non fuerit infixæ. Alii cynoglossa contusa, anoq; emplastri modo apposita, ab ingenti dolore liberatos esse referunt. Amatus hoc topico remedio vsus est, *cur. 6. cent. 3.* ad dolores hæmorrhoidum, cum cetera remedia non iuuant.

Ad cristas sen excrescentias ani. *na infunde, & ad cineres calidos admoue, & calidum applica, & sepe in noua:* est enim mirum. Idem ad excrescentias circa anum (*quas cristas vulgus appellat*) curandas, cum plures plura machinati sint (*variis quoq; tentatis præsidiis*) nullum securius nec melius huc vsq; inuenit remedium, quam eas forcipibus incidere: incisis enim paucis, postea derelicta vestigia curantur. Plures enim carneæ excrescentiæ nō solum mulieribus, sed & puerulis apud Romam agentibus (*ut etiam nos pro dolor, Roma aliquando & Bononiæ praxin cum præceptoribus obseruantes, in nosocomiis conspeximus*) enascuntur: quas nonnulli ex practiciis scribentibus auctoribus cristatas hæmorrhoides appellare solent. Nefandus morbus is est, quum ex naturæ ordinem peruertentibus reb. eueniat, pulluletue. Ego vix dignos eiusmodi scelere diuina obnoxios cinædos existimo, vt curentur, quamuis medici benignitate quadam huius artis beneficio hos curent. At apud Amatū *curat 87. cent. 2.* vt scholia ibidem habent, contendebāt nonnulli medici morbum hunc aqua ex rebus apprime constringenti-

bus, vt alumine, & tartaro, ac sublimato confecta eradicari: veluti alii argētariū aqua forti. Sed mea (inquit Amatus) sententia curandi via a nobis tradita, ceteris securior est, quum paruum dolorem, & symptomata fere nulla secum trahat, vt experientia longa comprobatum habemus. Rhagades, ad earum radices, similes iis, quæ in labiis ob boreæ flatum asperiores accidunt, sæpe conspiciuntur: At rhagades vngueto de plumbo, & aliis apprime exsiccantibus extirpantur. Sed de iis postea. Ita & de condylomate obseruatione sequenti agemus.

O B S E R V A T I O VIII.

De condylomatibus.

Q V i condylomata patiebatur, ex quibus interdum humiditas aquosa tenuis emanabat; huic iussi, vt folia viridia rutæ cataplasmatibus instar loco affecto apponeret. Egregie enim illud ad condylomata & hæmorrhoides facit. Si neque illa iuuant, imperavi vt puluis subtilissimus conficeretur ex ferrugine ferri, qui cum succo rapsi barbatī mixtus cum bombace applicetur: omnia enim, quæ condylomatis conducunt (*teste Aetio*) de quibus latius in scholio, adstringentia esse oportet.

S C H O L I A.

C O ndylomata, iuxta Neotericos quosdā, sunt hæmorrhoides siccæ, & tuberositates ani, sparsæ sine pede, a quibus nihil manat sanguinis, sed interdum quædam humiditas aquosa. Celsus vero condylomata tubercula appellat, quæ vbi induruerint vulsella apprehensa iuxta radices excindit, vt constat apud eundem *lib. 7. cap. 30. de ani viitiis & condylomatum curatione*. Sic etiam Paulus Ægineta, *lib. 6. cap. 80. de condylomatis & rimis ac tuberculis*: *Ani condyloma loco solum ab eo, quod muliebres locellos infestat, differt, occallescent & ipsa sedis tuberculum, aut inflammatione, aut rima, quæ dicitur rhagades præcedente*. Primum itaque tuberculum appellatur; occallescent autem, condyloma: quare conuenit, quemadmodum illa, specillo apprehensa excindere, & medicamentis crustam ducentibus curare. At Fernelius durum ait condyloma esse tuberculum in ani margine ortum, aut verrucæ, aut grani vix, aut ficus effigie. Attamen verrucæ & ficus, secundum alios, vt postea dicturi sumus, differunt a condylomate. Hoc ipsum tuberculum, iuxta eundem Fernelium, fit ex melancholico nigroq; sanguine illic sensim extuberante & excrescente; tædio tamen potius, quam dolore molestum. Attamen secundum alios, vt Aetium, fit quandoq; etiam cum inflammatione & dolore: cum ita dicat: *Accidit in sede condyloma, quando replicatis ani corpusculis ruga quedam præternaturam insurgit & intumescit. Cum enim anus sinuosus sit, rugas annexas habet. Ergo intumescente ruga condyloma generatur, quod interdum molle & sine inflammatione est, interdum inflammatum, durum & dolorificum*. Rhagades autem (*de quibus tamen postea*) quandoq; in musculo claudente, quæ sphincterem vocant, quandoq; in circulo fiunt, eueniuntq; vel ob acrium humorum defluxum, vel ob inflammationem extensionemq; condylomatum,

Hæmorrhoides cristatæ.

Lib 14. c. 3. de rhagades & condylomatis sedis.

Rhagades

lomatum, quibus partes adiacentes franguntur. De duobus his vitiis vno capite agit, sic scribens: *Hæc omnia in principio quidem medicamentis curantur, producta vero medicatione, induratoque & ad calli formam perueniente affectu, ad manuum opus confugere oportet, condylomate quidem volsella extenso, & a basi exciso; rhagadam autem callosis labiis exculpis, ut nouum vlcus mite & purum persistens, medicationem commodam reddat: quod quidem post chirurgiam, primo suppurare oportet, deinde mundificare, postea ad cicatricem perducere. Præsidia, quæ in principio adhibentur, huiusmodi sunt: Lucii medicamentum ad sedis inflammationes & rhagadas, quod etiam ad testium inflammationes conferi; cerussa $\frac{3}{4}$ v. spuma argenti $\frac{3}{4}$ j. s. scoria ferri lota, aluminis, thuris ana $\frac{3}{4}$ ij. e vino albo antiquo terito, deinde cerato rosaceo aut myrtino admisce, & vtere. Facit & ad virilium vlcera, præsertim in coronæ glandis & præputio exsistentia, quæ linamentis mundificari nequeunt, & medicamento ad depascencias confecto exacerbantur. Aliud ad condyloma: Myri torrefactum cum terebinthina liquida ad emplastri consistentiam excipito, somentum prius ex aqua adhibito, tanquam admirandum apponito. Aliud ad rhagadas sedis & condylomata inflammata: Cadmia mollis ter exusta & lota, spuma argenti lota, cera ana $\frac{3}{4}$ ij. ouorum assatorum vitellos duos, defruti cyathum vnum, rosacei tantundem, commisce & vtere. Vide ad ambo hæc vitia plurima alia remedia apud eundem descripta.*

OBSERVATIO IX.

De thymis & sycofi ex lue Gallica.

1. **M**ulier rustica, ex pago Scermerio, prope Alcmariam, quæ in ædib. M. Theodorici Garbrandi chirurgi Alcmariani Gallica lue laborans a nobis curabatur, thymos ac ficus quoque in ano & pudendo habebat. Quæ post vniuersalia remedia, corpore repurgato, & decocto ligni guaiaci cum diu vsa esset, cum decoctum falsæ parillæ tunc nondum in vsu esset, puluerem præcipitatum chirurgus miscebat cum aqua plantaginis & solatri, & cum pluma intincta oblinebat thymos, donec deterfi satis deciderent, deinde cicatricem superinducebat cum vnguento de minio. At in muliere illa, quæ in nosocomio Delphesi ex morbo Gallico decumbebat, chirurgus Theodoricus, qui tunc curationi præerat, sycofin valde magnam instar vix pensilis oleo arsenico oblinebat. At tamen forte quidem hoc est remedium, licet Ægineta lib. 3. cap. 59. callosa tubercula calce & auripigmento cum aceto acri trito recte etiam in sole perungi iubet, etiam si sine lue Gallica exsistant.

S C H O L I A.

2. **D**e lue Gallica, si Deo visum est, alias loquimur. Ceterum quod ad has excrescentias attinet, quæ etiam fiunt sine lue Gallica, Aerius loquitur vno capite, scilicet lib. 14. cap. 4. de thymis, sycofi, verrucis, clauis, reliquisque eminentiis ani & vniuersi corporis. Differunt tamen hæc eminentiæ, secundum eundem Aetium. Et quod ad thymi nomen attinet, a corymborum montanæ herbæ similitudine transumptum est. Qui enim in corpo-

re thymi enascuntur, turgidæ quædam excrescentiæ sunt, asperæ, subrubræ, oblongæ, præter naturam auctæ, in excisione longe plus emittentes sanguinis, quam magnitudini suæ ascribatur. Frequens est hic morbus circa sedem, pudenda & femora: inuadit quandoque tamen & faciem. Thymorum quidam pusilli sunt, & a medicis eminentiæ vocantur, quidam magni, ac proprie thymi appellantur, quidam maiores, quos sycofes vocant. Magnas præterea eminentias in facie apparentes, a magnitudine nomen transferentes, sycofes vocant Græci; a Latinis *ficus* appellantur. Quod in facie fiant aliquando, nos semel cum aliis medicis doctissimis tum chirurgis vidimus, in vxore cuiusdam ceruisiarii Delphenis. Sycofis enim huic mulieri probæ ac piæ circa tempora in facie, in parte sinistra satis magna oculum fere pertingebat, ita ut manu nec curari nec irritari posset. Sumserat autem originem ex thymo fere maligno digitis confricato, qui thymus equidem ferus incurabilis existit, ut mox dicemus: adeo ut & hic in sycofin malignam carcinomatis instar permutatus, vltq; ad annum 1590. longo tempore perseverans nullo modo curari potuerit; ita ut dudum facto prognostico, diu miseram trahens vitam mulier, palliatione tantum vtens, miserabiliter obierit. At Neoterici quidam (ut Valescus, qui sub vno capite tractat de fici in ano, de condylomatibus & attricibus) scribunt, *ficum esse, quandam excrescentiam generatam circa anum, eiusque circulum vel pudendum, cuius forma est stricta in pede, & lata superius, & exterius est rubens. Condylomata dicunt esse eminentias aliquantulum longas, & in cuspide magis acutæ. Attrices nominant quasdam tuberositates paruas circa anum, quæ aliquando recedunt & per tempus reuertuntur. Est harum trium passionum ficus deterrima, cum eius materia sit multa, & causa malignior, cum frequenter vlceretur. Volunt ut simili fere modo curentur. Hinc Valescus: Materia prius antecedens & coniuncta purgetur quibusdam pilulis ad hoc aptis, quas describit lib. 5. cap. 37. de fico & condylomate. Adhibet etiam emplastrum ex cinere, rad. cannarum & clauellatarum $\frac{3}{4}$ j. millefolii, parietar. chamomill. ana $\frac{3}{4}$ ij. alum. vsti $\frac{3}{4}$ ij. incorporetur cum vino rubro applicetur. Vel ex solo millefolio & parietaria, cum sale pistis. Si neque his modis curentur, incidunt, ligant, vel cauterio actuali vel potenciali consumunt, aut rosario auferunt. At eorundem Thymorum alii rursus, iuxta Aetium, mites, alii feri: mites exiguæ carnes sunt, inæquales, eminentiis sensum latentibus, scabræ, colore candidæ, aut subrubræ, dolore carentes: feri cutem duriores, scabriores, amplioresque sunt, feculenti, colore liuidi, dolorem punctiōemque inferentes, manuum præcipue attactu, & medicamento- rum applicatione. Ac reliqui quidem curatu faciles sunt: feri vero insanabiles: qui tamen etiam interdum curantur, non excisi a radice, quemadmodum cetera solent, sed amputatione totius membri, in quo fuerint. Acrochordon autem, id est, verruca, turgida quædam eminentia est, ita*

Differētia thymorum.

Sycofes.

3.

Ficus.

Condylomatia Attrices

4.

Thymi qui mites, qui feri.

Verruca.

appellata, quod apici incisæ chordæ maxime affi-
muletur. Eodem modo formica tumens & callo-
sa eminentia est, colore nigricans, basi lata, & cu-
te sessilis, in excisione dolores afferens, moriun-
culis formicæ animalis similimos, a quo etiam no-
men accepit. Reddit & hæc dum abscinditur
longe maiorem sanguinis quantitatem, quam suæ
paruitati congruat. Clavus autem callosa eminen-
tia est, capiti clavi similis, frequens circa calcanea
& manuum extremitates. Thymos igitur tam mi-
res, quam maleficos primo quidem, iuxta eun-
dem Aetium, medicamentis curare tentabimus,
ac mitibus ea, quæ contrahendi facultatem ha-
bent. Maleficis vero quæ ad cancrofa vlcera, præ-
sertim mammillarum & vteri describuntur, ap-
plicabimus. Si neque his cedant, thymos ani vol-
fella exserentes a basi amputabimus, & aridum
medicamentum sistendo sanguini idoneum ap-
ponemus, quale est flauum apud eundem: & o-
mnino vsque ad sanitatem adeptam exsiccantia
medicamenta adhibebimus. Vinctuosæ enim ma-
teriæ vsus recidivam ægritudinem facit. Sed ad
thymos, qui partes magis expositas occupaue-
runt, veniamus: post amputationem si plures ma-
gnique fuerint, tum sistendi sanguinis, tum reci-
diuæ prohibendæ gratia, cauterium tentabimus;
quo peracto curationem, reliquis vsionib. com-
munem, cum his, inquam, prius, quæ crustas ab-
scindant, deinde cum his, quæ repurgent; postre-
mo cum exsiccantibus procedendo. Ceterum
medicamenta quæ absumere exsiccareq; thymos
possunt, ea sunt quæ communi ratione etiam ad
verruca & formicas conueniunt; quale est hoc,
faciens ad sedis, pudendorum & reliquarum par-
tium corporis thymos: ℞. aluminis scissilis, atra-
menti sutorii torrefacti, glutinis tauri ana ℥ j. squa-
ma aris ℥ ij. terito quateri possunt, & cum tauri glu-
tine prius in aceto diluto simul confice & illine. Aliud
ad thymos & ad dura condylomata inflammatio-
ne carentia, & ad lycoses: ℞. squama aris ℥ j.
sandaracha ℥ ij. auripigmenti ℥ x. aluminis scissilis
℥ iij. terito seorsum, deinde cum rosaceo ad glutinis
consistentiam conficito, & copiose illinito ad alligato-
que, ac bis singulis diebus curato. Idem aceto dilu-
tum aliis membris conuenit. Plura remedia a ve-
teribus vsurpata apud eundem loco citato inue-
nies. Aliud ex Paulo: Hedricum optimum ad a-
ni inflammationes, & eiusdem excrecentias: ℞.
cerussa, spuma argenti, suffiminis ammoniaci, bdellii
ana ℥ vj. terebinthina ℥ j. ceræ semuncia arida suc-
co solani vel portulacæ conteruntur. Quæ liquan-
tur, ubi illis adiuncta fuerint excipito: & solutis
rosaceo, vritor. Vel hic pastillus: cerussa quadrans,
pompholygis vncia, argenti spuma sextans, masti-
ches scrupula sex: alterci succo excipiantur. Si ca-
reant inflammatione, cupressi galbulorum combu-
storum cinis loco dolenti, vino prius absterfo, inspar-
gitur; vel cucurbitula arida corticis combusti, vel pal-
mularum ossium, cinis similiter, vel testarum ouo-
rum & foeniculi cinis, vel succi mali punici foliorum,
aqualis modus, vino albo deterfa pars diebus septem
eluitur. Ad lycoses valent folia betæ, cum axungia

porcina trita & apposita. Neoterici ficus curant, ca-
pill. ven. capis, aristoloch. rotund. simul pistis & super-
positis. Vel stercus gallina, sapa Gallicus & summitates
tapsi barbatissimus, contrusa & applicata curant. Ferunt
fessionem in decoctione aronis & tapsei barbati
curare ficus apparentes circa anum.

OBSERVATIO X.

De rhagadibus ani, per modum consultationis.

Rhagades, id est, fisturæ, ani vlcuscula oblon-
ga sunt, quibus sphincteris rimæ proscindun-
tur, iis similes quæ inferius labrum & manus pe-
desque dilacerant. His finitima sunt & læuia quæ-
cunque vlcera sedis. Dolor acerrimus est, cum
ardore, citra phlegmones indicia; vlcerisque ex-
tremum expressa ano plerumque oculis pater.
Fiunt autem vel duriores asperitate fecum, vel
humoris acris salis siccantisque morfu. Nam rha-
gades nihil aliud sunt, quam vlcera vteri & sedis,
diducta in fissuras. Quo malo sacerdos quidam
admodum putido & molesto afficiebatur, in villa
quadam prope Alcmariam; qui ad me desectens,
consilium petebat, quibus modis hoc vitio libera-
ri posset. Lenitione ventris cum cassia ℥ vj. & con-
fect. hamech ℥ ij. instar boli peracta, altero die venam
mediam in brachio secari iussi, cum in vere esse-
mus; præcepique vt quotidie sumeret decoctum
fumariæ & acetosæ in sero lactis. Eundem purga-
ui cum infuso rhab. & senæ; adiecta exigua por-
tione confectionis hamech. mox iussi vt rhagades
madentes lauaret sequenti lotione: ℞. florum ros.
rub. tapsei barbati ana p. j. psidior. balaust. ana ℥ ij. co-
quantur in aqua plantag. & ros. pro lb. ij. in qua dissol-
ue collyrii albi ℥ ij. vng. albi camphorati. de cerusa ana
℥ j. syrup. ex ros. siccis, mellis ros. colati ana ℥ ss. misce
in mortario & vtere pro lotione. Vel lauatur cum
decoct. foliorum oliuæ (quæ folia cum apud nos non
sint, eius loco accipiantur folia salicis) & ros. &
aluminis. Deinde inungatur vnguento albo campho-
rato. Vel litharg. & cerusa & plumb. m. vsum du-
cantur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, & a-
qua ros. & oleo ros. adiecta exigua camphora, donec to-
tum nigrum & fuscum euadat. Pannus eo vnguen-
to linitus apponatur. Desiccat egregie, & infrigi-
dat. Egregie idem conducit in vlceribus tibiariū,
post totius corporis & vlceris mundificationem.
Vel cum vlcerationes sint aquosæ & vitulentæ,
fiat hoc vnguentum mundificans, exsiccans &
incareans: ℞. psid. balaust. myrrha, cerusa lota,
plumbi vsti, marcasitæ aurea & argent. aloes succotr. lo-
ta, sem. ros. thuris, mastice, cineris, ostracorum adustor.
ana ℥ ij. folior. oliuæ, aluminis vsti, aluminis de plu-
ma, virid. aris, litharg. ana ℥ j. ss. olei ros. q. s. ceræ
nouæ ℥ j. fiat vnguentum, & omni die nempe natu-
rali) bis aut ter pannus lineus inunctus eo apponatur, &
lauetur prius cum decocto gallar. aluminis vsti, & folior.
oliuæ & ros.

SCHOLIA.

Rhagades (vt prius dictum est ex Aetio) quan-
doque fiunt in musculo claudente anum, quem sphincterem vocant; quandoque in i. so-
circulo ani. Et non solum hæc vlcera fiunt in se-
de, verum etiam in vtero, deducta in fissuras. Sed
alia

4. alia humida & saniosa, alia callosa, nonnulla cancro-
 sa & feruida. Fiunt vel duriorum asperitate fe-
 cum, vel humoris acris siccantisque morfu, vel ob
 acrium humorum defluxum, vel ob inflammationem
 extensionemque condylomatis (etiam iuxta
 Aetium, ut paulo ante meminimus) quibus partes
 adiacentes franguntur. Fiunt etiam ex maligno
 humore ex lue Gallica: sed de iis suo loco. Quic-
 quid partes illas scindit ac findit, ut apostemata
 calida, fluxus hæmorrhoidum, vel quilibet acutus
 etiam dysentericus, stercora dura, aut extrinsecum
 quid scindens, rumpens, vel glandes acutæ, ene-
 mata acria iniecta vel emplastra calida admota, &
 alia his similia. Impurissima quoque cinædorum
 turba hoc vitio infestatur. Signa per se manife-
 sta sunt, ex rimis & ingenti pruritu & ardore, & te-
 tro odore, ac humore virulento. Si a causis ex-
 ternis, ex iis, quæ præcesserunt & sermone ægri
 noscuntur. Et si ab hæmorrhoidibus, illæ præcel-
 serunt, & contingit aliquando & sæpe ab exsic-
 cantibus apposis, vel propter violentiam aper-
 tionem hæmorrhoidum cæcarum cum ferro, vel
 ab omnibus duris dilatantibus, etiam stercore du-
 ro: quæ omnia facillime ab ægris intelliges. Si hu-
 mores acuti eo confluerunt, id ex intemperie eo-
 rundem & colore ac dolore percipietur. Et vtrum
 sint saniosa, callosa, cancrosa, visu apparet; & fer-
 uida quoque sentiuntur. Ab iis aliquando nihil
 emanat, & a siccitate fiunt. Quandoque effluit ab
 iisdem res viridis, nigra vel liquida, vel citrina, fœ-
 tens, cum dolore & ardore & tumore aliquali. Et
 est quandoque cum febre, cum apostemate; eo
 quod fiat ex materia adusta cinerosa, vel a phleg-
 mate falso exulcerante. Hæc ex humorum domi-
 nio & colore discernenda sunt. Hoc malum mi-
 nime contemnendum, & cito huic succurrendum;
 nam facile si negligatur, in vlcus corrodens vel in
 fistulam conuertitur, eoque peius, si cum tenes-
 mo, ut sæpius fieri solet, affligat; cui quoque oc-
 currendum erit: & præcauendum ob dolores ne
 in febrem hæcticam incidant, si malum cum do-
 lore protrahatur. Pro causa rhagades inferente,
 curatio etiam variatur. Si ex dysenteria vel flu-
 xu hæmorrhoidum, vel quouis alio acuto, hæc
 vitia prius curentur; & interea huius quoque ma-
 li ratio habeatur. Si ex facibus duris, illæ emol-
 liendæ cum clysteribus emollientibus. Si veniant
 ex frigore tantum, sicut fissuræ fiunt in labiis, vel
 ex calore sine materia, pro habitudinis qualitate
 frigida aut calida eliges: & sic vbi malum inuete-
 ratum ex frigore, facies inunctionem ex medulla
 cruris vaccini, vituli, oleo amygdal. dulc. adiecta cera.
 Ex calore, cum cerussa, oui candido, oleo violaceo,
 camphoraque exiguo, addita cadmia farina & alba ce-
 ra. Si ex nimia siccitate, fiat hoc modo: ℞. me-
 dullæ cerui, vituli, & quæ in maxilla porci inuenitur,
 axungie gallina, anatis, butyri recentis, olei sisamini,
 amygdal. dulc. pap. ana ℥ ij. litharg. cadmia lota, dra-
 gar. ana ℥ j. cera q. s. fiat vng. Si ex vitio humoris
 fiat, is digeratur, purgerur primo, & fiat venæ se-
 ctio, si opus est: deinde ad topica deueniendum;
 respectum semper habendo ad humorem, num i

calidus sit, acutus, salsus, adustus vel melancholi-
 cus, ut de hæmorrhoidibus quoque dictum est. Interim
 & hoc aduertendum, num rhagades ani sint cum
 febre, inflammatione, aut apostemate: tunc etiam
 conuenit venæ sectio basilicæ in brachio vel ma-
 nu. Et ita si sint inflatæ & apostemosæ, curantur
 sicuti apostemata ani, ut postea dicemus. Topica
 etiam variantur iuxta rationem causæ. Sic saniosa
 primum abluimus, sero lactis, mulsa. Deinde con-
 solidamus tetrapharmaco in rosaceo dissoluto,
 medicamentis lithargyro, chalcitide & metallis.
 Callosa, mollientibus curamus, æsypo, radice lilii,
 irride illyrica, terebinthina exceptis. Alioqui vitellum
 cui assum cum lacte muliebri subactum impones. Vbi
 feruet, & canceri ad sit suspicio. ℞. cerusæ lota ℥ ij.
 tutia preparata & puluerisata ℥ ss. Vel ℞. succi por-
 tulacæ, lactucæ, plantag. psylli ana ℥ ij. vel vnius ho-
 rum; agitentur in plumbeo mortario, pistillo plumbeo ad
 crassitudinem: vel ut in vng. melius coeat, adde olei ros.
 vel ouorum & cera modicum: vel ceratum rosa.
 Galeni cum succo solatri, vel vng. de plumbo: quibus
 tutia lota & infriata misceri debet. His adiungere
 poteris ea, quæ Aetius lib. 14. cap. 2. valere scripsit
 ad inflammationes sedis & ani; siue rhagades, siue
 condylomata, siue vlcus in causa fuerit. Quale
 illud est dactylicum ad rhagades, condylomata,
 dolores confestim sedans, valens ad vlcera pha-
 gedænica malefica, & cicatrici rebellia: quæ e-
 nim exstant contrahit, & concaua replet: & facit
 ad tibiæ vitia. Quod ita habet: masticha, cerussa,
 spuma argenti, succi hyoscyami ana ℥ j. olei myrtini
 aut lentiscini q. s. feruetur in plumbea pyxide. Qua-
 le etiam hoc emplastrum diapompholygos est
 ad inflammationes sedis, rhagadas & vlcera:
 spuma argenti, cerussa ana ℥ j. pompholyg. croci, a-
 dipis anseris ana ℥ ij. ouorum assatorum vitellos q. vi-
 ni antiqui & olei ros. q. s. Ad siccas valet fumigatio
 cum maluis, bis malua, viol. & brancha vrsina. Ad hu-
 midas valet superscriptum in Observatione; etiam
 ad virulentas.

OBSERVATIO XI. De insigni pruritu ani admodum molesto.

Q Vidam cum incidisset in enormem ani pru-
 ritum, existimabat hæmorrhoides esse: cum-
 que malum ad tres septimanas perduraret, multis
 tentatis remediis etiam post purgationem ex cas-
 sia, & alia præsidia variasque inunctiones & lotio-
 nes nihil iuuaminis sentiret, tandem lotionem v-
 tens atque totum ex aqua plantaginis, in qua modi-
 cum aluminis incoctum esset, a pruritu & omni il-
 la molestia liberatus fuit.

SCHOLIA.

PRuritus ani nihil aliud est quam ani assidua mor-
 dicatio. Et ab iisdem fere causis, a quibus tenes-
 mus fit, nempe pituita salsa, viscosa, mordaci, labiis
 sphincteris adherenti, & eadem stimulant. Vnde
 quidam, ut Bertrutius, sub vno capite & de tenes-
 mo agunt. Attamen non ex hac solum causa fit
 ani pruritus; verum aliquando vna ex his qua-
 tuor, aut ob sorditiem sudoris, vel fecis ibidem
 derelictæ, & non repurgatæ, aut ob vermes in ano

Signa.

aut intestino recto, quos ascarides vocamus, vel ob vlcera in ano, aut humores pungentes acutos ad anum confluentes. Si sit pruritus cum tenesmo, adsunt signa tenesmi, desidendi implacabilis cupiditas ex falsa pituita anum stimulare. Si a vermibus, signa vermium aderunt. Si ab humore acuto, salso, signa huius humoris prædominantis id indicabunt. Si ab vlcere, sanies defluens ostendet. Curatio iuxta diuersas causas instituenda. Si cum tenesmo, ea quæ de tenesmo diximus, peragenda. Si a vermibus, quæ de ascaridibus diximus instituenda; primo remouendo causam antecedentem, digerendo, euacuando, deinde vermes expellendo cum clysterib. acutis in exigua quantitate vel glandibus, aut bombace madefacta in terebinthina vel pice liquida, quibus vermes inuisantur & exeunt. Si ex ani sorditie, lauetur cum aqua tepida, & continuo cum pannis lineis puris & foliis taphi barbatii repurgetur. Si humor falsus & acutus, vel adustus, digeratur & purgetur: deinde ad topica procedatur; prius materia euaporetur imbibita ex balneis paratis malua, viol. ros. salice, vel spongia leui immersa foueatur; fiantque suppositoria sedantia dolorem, si opus est, de quibus dictum est, de tenesmo. Lotio ex succo ebulo- rum egregie prodest. Si fiat propter vlcera, desiccantur cum vng. de plumbo, albo camphorato, & lithargyrio nutrito: & teneantur perpetuo munda cum pannis albissimis, post lotionem cum decoct. agrimonie, & foliorum oliuæ, adiecto alumine adusto & de pluma. Quiescant a laboribus, ne cundo aut laborando medicamenta decidant, & minus effectum sortiantur. Ad pruritus cum vlceratione hoc præstans est: *℞ tragacanthi, sulphuris citrini, lithargyri ana ℥j. terantur, & cum aceto, adiecto pauco oleo ros. fiat linimentum.* Si adieceris exiguum opii, tollet quoque dolorem.

OBSERVATIO XII.

De ani intertrigine.

1. **Q**uibus ex equitatione ani intertrigines contingunt, argentinam herbam seu argëtarium dictam contusam commode appone. Ex huius herbæ succo si nates liniantur frequenter, mirabiliter iuuat. Alii sebacea candela ad ignem leuiter calefacta intertrigines inungunt. vt equites facere consueuerunt.

S C H O L I A.

Ad intertrigines & vredines.

Ad femorum alarumq. vredines.

2. **A**etius lib. 14. cap. 11. intertrigines & vredines, quæ in peregrinationibus inter femora eueniunt, chalcitide cum aqua subacta illinit, vel plumbagine cum aceto & vino; vel spumam argenti priuatim, vel cum myrto aridam tritamque inspergit. Vel alumine vsto vtitur, cum testis ostreorum subacto: vel hoc efficacissimo: *℞ plumbagine ℥viij. gallinarum ℥iij. aluminis ℥j. myrrha ℥ij. quod aridum applicat, vel cum oleo myrtino illinit; locum vino prius abluens, & medicamentum deinde inspergens.* Aliud, faciens ad femorum alarumque vredines, quæ in carnosissimis hominibus ob sudores contigerint: *Syrici, fuci infectorum, testarum olibani antiqui ana ℥ij. terito & locum prius ablutum inspergito.* Valet & hic pului-

sculus ad intertrigines vlceratas: *mali arboris corticem vrito, & cinerem feruenti aqua exstinguit; in aqua pannum madefacito, & applica.*

Ad intertrigines & vlceratas.

OBSERVATIO XIII.

De insigni ani dolore, eiusque inflammatione & abscessu.

Vir quidam cum equo grauiter incedente longo tempore duriter equitasset, oborto in ano insigni dolore, in febrem quoque incidit. Ad quem accitus, cum de acerbo in ano dolore, eoque valde lancinante, concoqueretur, & simul narraret, equitationem duriores præcessisse, ani inflammationem adesse suspicabar. Ano itaque inspecto, tumorem in eo deprehendi, qui premendo exacuebatur; & foras etiam rubedo & inflammatio prominebat, & aluum non nisi cum summo cruciatu & difficultate deponebat; & comite febre, non solum dolorem illum acerbum, verum & pulsationem quandam sentiebat; postremo & siti quoque & astuatione obrepere. Statim igitur inflammationem adesse conspicientes, & quod aluus durior esset, non ausi fuimus medicamentum, ne cassiam quidem, per os dare, ne materia deorsum deturbaretur: quare enema emolliens tantum & refrigerans, hoc vel simili modo paratum ex iure pulli, cui incocta essent malua, viol. lactuca, parietaria, mercurialis, hordeum mundatum, rad. althea, cum castia & oleo viol. & vitello oui iniici mandauimus. Fecibusque duris eductis, venam basilicam in brachio dextro aperiri iussimus, cum magna adesset repletio, ac in vere essemus, in homine satis plethorico ad vncias octo sanguinem fluere fecimus, & mox medullam panis cum vitello oui & in aqua ros. & solatri bullitam, & postea expressam, adiecto oleo violaceo, lacte muliebri, & ros. ano applicuimus. Cum calor adhuc vrgeret, inunximus cum vnguento ros. & emplastrum confecimus ex foliis malua, viol. solatri, lenticula aqua, coctis in aqua ad mollitudinem & aqua desiccationem, pistentur deinde, adiciendo olei viol. ros. vitellorum ouorum & albuminum ana q. s. fiat cataplasma. Et quia abundabat sanguine, neque febris illum relinquebat, secta quoque fuit vena in talo ad materiæ coniunctæ diminutionem. Feruore non desinente, portulacam herbis superscriptis adiecimus coctam in lacte, adiecto vnguento populeo. At dolore postea magis adhuc crescente, cum ad abscessum tendere videretur, deuenimus ad magis lenientia & maturatiua: primo ad forum sequentem, ex malua rad. althea, semine lini, fenugraci, meliloti deuenimus: & ex iisdem reliquiis, adiecto oleo amygdal. dulc. butyro recenti fiebat cataplasma. Ceterum cum hic abscessus in partem magis exteriorem declinaret, quod bonum erat signum, multoque minus periculosum, quam ad interiorem (de qua re latius in scholio) tandem ruptus est abscessus, & pus effluebat. Quare statim locum affectum continuo deterfimus cum decocto hordei communis & melle rosaceo. Cum satis deterfimus videretur, hoc vnguento incarnante & consolidante, & cicatricem inducen-

3. inducente vt inungeretur, mandauit: ℞. vng. albi camphorati ℥j. turia, lithargyrii ana ℥j. sarcocolla, thuris, balaustiorum ana ℥ss. ducatur in mortario plumbeo, donec fuscum fiat: inungatur vel super pannum lineum inductum apponatur. Ad idem quoque valet vnguentum de plumbo, quo sæpius vtor, non solum ad vlcera, sed ad rhgades, vt paulo antea diximus. Quod ita describitur apud Montagananam: ℞. plumbi vsti ℥ij. lithargyrii ℥j. cerusæ lotæ, aceti ana ℥ss. olei ros. ℥ij. mellis ros. ℥j. vitellorum ouorum num. iij. myrrha ℥ss. cera q.s. fiat vnguentum. Valet in omnibus excoriationibus, inflammationibus, & vlceribus fraudulentis, corrosiuis, ambulantis, & antiquis gangrænis crurum & arum partium. Vtitur & Montagnana pro ano gangrænato hoc vnguento, quod ita fit: ℞. vng. de cerusa lb. j. plumbi vsti ℥ss. thuris, myrrha ana ℥ij. lithargyrii despumati ℥j. s. incorporentur in mortario vltima contritione. Valet gangrænosis vlceribus, ostracosis, erysipelatis & dependentibus ab humoribus acutis, corrodentibus, corrumpentibus, venenosis.

S C H O L I A.

4. **A** Num occupant & phlegmone & abscessus. Phlegmone seu inflammatio fit copia sanguinis e magnis venis per hæmorrhoides in partes inanes, quæ circa podicem sunt incidente. Hæc quum ex aliis causis, tum maxime ex multa duraque equitatione, proficiscitur; & vt alii ferunt, ab hæmorrhoidibus restrictis, inflatis, cæcis, duris, vel iisdem amputatis cum causticis corrodentibus, vel cauteriis, vel a medicamentis. Quandoque etiam sanguis, qui per istas partes fluere consuevit, redundat & coaceruatur; fitque apostema, inflammatio, nisi per alia loca expurgetur; vt ex repletione aut defluxu humorum ad anum; aliisque causis externis, percussione, dura sessione, podicis refrigeratione. Et ita fit apostema modo calidum, modo frigidum, vel inflammatio aut erysipelata fiunt, alique tumores ex humoribus valde calidis & acutis. Quodque anus dolorem patiatur, id etiam multis modis fieri potest, ex hæmorrhoidibus, apostemate, erysipelate, aliisque tuberculis iam dictis & tumoribus. Qui dolor non curatur nisi prius eiusdem ablata causa, vt iam ex precedentibus satis constat. Abscessus quoque aliquando e phlegmone relinquitur, qui in recti intestini cauum sæpius, quam in cutem (vt refert Fernellius doctissimus) erumpit: quandoquidem parte molliore exedens pus sibi promptius viam parat. Rupto abscessu vlcus manet purulentum ac foetidum, quale & nonnunquam existit ex neglecto tenasmo. Id autem in fistulam breui degenerat, vt postea docebimus: vix enim parte humida & excrementis peruia coalescit, sordiumque copiosum, diutissime manet, etiam dolore sedato. Signa inflammationis & apostematis eadem sunt cum aliis partibus: adest dolor acerbus, qui premendo acuitur: alius non nisi difficulter redditur, & aliquando multos dies sistitur, febre accedente. Si fiat ab hæmorrhoidibus, res ipsa indicabit: ita & causæ externæ ab ægris facile in-

telliguntur. At fiunt sæpe sine his calida apostemata, ad sunt dolores, calor, pulsatio, febris, æstus ac sitis, sed maiora omnia in erysipelate ab acris & calido humore: mitiora vero a sanguine. Si frigidum sit apostema, vel a pituita aut melancholia, supradicta erunt remissiora. Quod ad signa prognostica attinet, hæc ægritudines sedis, tum præcedentes, vt ex Galeno citatur ab Aetio, cap. i. lib. 14. multis de causis sanatu difficiles sunt. Primo enim ea pars sensu vegetissima est; iamque sæpius ostendimus huiuscemodi membra ab acrioribus medicinis facillime irritari. Deinde excrementa alimenti, præterquam quod ipsa priuatim erodant (præcipue vbi bili acrique interdum tabe permixta fuerint) liberam etiam applicandarum medicinarum potestatem medicis interdiciunt, quum quibusdam temporibus minime congruis sæpe æger ad egerendum prouocetur. Adde quod caliditas & humiditas loci refrigerantibus & exsiccantibus indigens, non parum facit ad reddenda vlcera, quæ inflammationem sæpe subsequuntur, curationi rebellia; quoniam mordicationem, quam res adstringentes inferunt, locus sensu vegetissimus tolerare non potest. Inflammationes quoque ob locum putredini aptum difficilius curantur, cum facile ad abscessum perueniant: diligenter igitur sunt curandæ, antequam eo perueniant. Vt si calidum sit apostema vel phlegmone, tribus primis diebus basilica brachii partis magis dolentis incidatur, vt crassior vel calidior sanguis diuertatur; permanente adhuc plenitudine, ex talo: & ventosæ ad spatulas ponendæ, frictionesque in principio & ligaturæ dolorosæ in membris superioribus ad auertendum materiam admouendæ. Et si venter constipetur, lubricantibus clysteribus alui tantum lenienda. Estque statim in calido apostemate post venæ sectionem aliquod re-percutiens applicandum cum anodynis: in augmento re-percussiuæ, vt in aliis inflammationibus minuenda, & augenda paulatim resoluentia, dissoluentia, & maturantia. In statu sola maturatiua apponenda. In principio valent folia solatri & maluæ & violariæ, cum lentibus excorticatis pistis & coctis, adiecto oleo viol. ros. vitellis ouorum. Refrigereturque si magna est inflammatio, cum aqua solatri, portul. & rosarum. Ad erysipelata & inflammationes, solani folia tenera & portulacæ, mica panis in aqua ros. tincta, ouorum tostorum lutea pari pondere rosacei q. s. apponantur. Si dolor virgeat, adde etiam hyoscyami folia. In augmento: ℞. medulla panis ex frumento, vel farina volatilis molendini, cum oleo amygdal. dulc. misce. In statu fiant balnea ex malua, & aliis; adiecto meliloto, bisinalua & flor. chamomill. inde etiam fiant emplastra, adiecta farina lini. Si tendat ad maturationem, vtere rad. althææ & aliis magis maturantibus. Post maturationem statim aperiatur. Si sit frigidum apostema, post vniuersalia præcedentia remedia, clysteres, venæ sectionem, fiant emplastra ex rad. althææ, seminis lini, fenugrac. cum oleo chamamelino & butyro recenti, & quod ex capis albis & tapso barbato fit; & ponatur æger sæpe in

Prognostica signa.

6.

Curatio.

Si calidum sit apostema.

Ad erysipelata & inflammationes.

7.

Si apostema frigidum.

aqua tepida decoct. malua, bismalua, viol. florum chamomill. meliloti, anethi, rosa p. a. Id enim apostema aliquo modo repercutit, materias fluxas resoluit & dolorem mitigat. Fiantque encatismata ex decoct. malua, bismalua, seminis lini, fenugraec. chamomill. meliloti. Habes exemplum

8. *Causa.* lib. 19. observat. nostra 37. de calceario ab apostemate frigido ani curato, & hydropo laborante. Sed hic cautio adhibenda, si ad maturationem tendat, statim iuvanda & aperienda; imo ante plenam maturationem: nam si protinus non aperitur, ut dictum est, sanies retenta inferiora loca occupat, quae etiam membra inferiora, imo & intestina ipsa, perforat & corrumpit, ut vidimus, & in fistulam (ut paulo ante diximus) abit. Sic postquam apostema circa anum frigidum maturum esset, scalpello statim aperiri iussimus, ut in Christophoro chirurgo, familiari nostro Delfis apud Pontem Auenarium habitante, viro admodum sene, quod prope anum erat, & non in circulo, & deinde per chirurgos debite curabatur. Ideo post rupturam sanies statim detergenda, mundificanda, & consolidanda. Et si ulcera remaneant, curanda, ut de rhagadibus diximus. Indigent autem vehementer resiccantibus, ut est carta combusta, anethum vstum aridum, cucurbita concremata. Siccis recentibusque etiam aloe praesens est remedium, si arida in pulverem redacta inspergatur. Leuissimum vero & efficax est pompholyx. Ad humidiora ulcera, piceae cortex per se, lapis haematites: si alte descenderint, manna miscebitur: si pascendo serpant lenticula cum malicorio: si cum inflammatione sint, conferunt ea, quae diximus ex cerussa, pompholyge, cadmia, thure, cum succo serres, & cum cerato ros. componi. Sed & vlcus fungo quoque simile in eadem sede nasci solet, ut Celsus tradit: id si hyems est, egelida aqua; si aliud tempus, frigida fouendum est: deinde squama æris inspergenda, superque ceratum ex myrteo factum, cui paululum squamæ, fuliginis, calcis sit adiectum. Si hac ratione non tollitur, vel medicamentis vehementioribus, ferro adurendum est. Verum quæ ad rhagades paulo ante valere scripsimus, ea ipsa commode adhibentur ad ani ulcera. Aetius libro decimoquarto, capite octavo. Cum inflammationem præcedentem nonnunquam abscessus sequatur circa sedem, si is contigerit ob multam locorum humiditatem caliditatemque, copiosa putredo superuenit: ideo chirurgicam curationem instituit, ne locus fistulis fiat obnoxius, quamvis hoc tempore exoleuit, ut & inustio procidentis sedis, quam ex Leonida decerpit cap. 7. eiusdem libri, cap. 9. agit de depascentibus & phagedænicis ulceribus in interiori ani musculo, quem sphincterem vocant, contingentibus. Sed ibi nec vstio, neque incisio conuenit, ob conuulsionem & voluntarium defluxum, quæ subsequi solent; quamvis longa depascentia per se sphincterem absumant tandem, & inuoluntarium defluxum inferant: ideo medicinis ad depascentias descriptis vtitur, locumque fouet, myrti, malicorii, rubi aut similibus decocto: ac primo quidem partibus

9. *De ulcere fungo simul in ano.*

10.

ulceris, a natura recedentibus, Faustino aut aliquo huiusmodi medicamento crustam inducit, postea quod e cartis conficitur, aut Isidem pessulis illinit, & reliqua deinceps solita peragit. Sed quæ ad chirurgiam pertinent, ea in propriis locis lectores inuenient. Vtinam a nostris chirurgis, ubi ita necessitas cogit, dextre perageretur!

OBSERVATIO XIV.

De ulcere sinuoso & ani fistula.

Petrus Vidius, aduocatus Pithueriensis, vir senex, & amicus noster, cum Pithueris in Gallia praxin exercerem, annis septem fistula ani laborauerat, quæ si occlusa & restricta esset, nihilque puris effunderet, peius habebat. At anno 1546. mensis Februarii initio, cum subito fistula restringeretur, fluxum ventris & hæmorrhoidum adeo enormem passus est, ut in syncopen incideret, ac pro mortuo ab astantibus habitus fuerit, etiam leui tussicula accedente. Ad eum ingressus sum: & adhibitis per nos diuersionibus, per frictions, ligaturas membrorum superiorum, ad se rediit, a syncope releuatus. Tamen ob virium deiectionem, ut bis terve in die ex hoc condito sequenti sumeret mandauimus, ad castaneæ magnitudinem, superbibendo vinum stypticum chalybe ignita extinctum: *℞ conser. ros. veter. ʒ j. B. conser. bugloss. diacyd. sine speciebus ana ʒ B. spec. diarrod. abb. margarit. perforat. & non perforat. corall. rub. diamarg. frig. spec. diatrag. frig. ana ʒ j. B. cum syrup. coton. fiat conditum;* cuius usu paulatim hæmorrhoidum fluxus restitit. Doloꝛe tamen circa femora utraq; oborto, hoc linimento cessante: *℞ olei chamomill. ʒ ij. vini albi clari optimi & antiqui ʒ vj. bulliant vnica ebullitione,* quo fortiter fricentur femora: & mox dolor euauit. Et denuo fistula humorem solitum euomebat, & saniem; & statim melius habuit. Neque vtile nobis visum fuit in sene hic chirurgia vti; sed solo vtens, ut antea fecerat, ad detergendam saniem, vnguento apostolorum, quod ulcera contumacia, itemque fistulas detergendo expurgat, fungosam & mortuam carnem absumit & nouam restituit, ab hoc malo liberatus fuit.

S C H O L I A.

EX abscessu sedis, apostemate rupto, si statim pus non repurgetur, & ilico curatio succedat, fistula subinde oritur, ut diximus, etiam ex ulcere purulento & sordido, vel ex tenasmo neglecto, breui fistula aliquando fit, vel ex hæmorrhoidibus male curatis, vel ulceratis, aut ex aliis ulceribus per defluxionem malignis, cancris, depascentibus. Ad hæc iuuant aliquando causæ procatactice, ut vulnus in ano, aut in partibus ei vicinis, ab ictu, casu, ulcere male curato, & repurgato succedente, aut ex medicamentis corrodentibus perperam apposis, vel ex causis antecedentibus peracrium humorum confluxum. Fistula facile innotescit orificii strictura & largitate interioris clauicatis, & exitu saniei aquosæ. Aliquando clauditur; & tunc nihil exit, sed inflantur partes vicinae, dolent; ac iterum aperitur, & tunc rursus fundit & euomit saniem. Causæ externæ dignoscuntur ex iis, quæ præcesserunt, & ægri sermonibus, nunquid

3. *Causa fistulae.*

Signa.

4. *tefel hifo.* Nunquid hæmorrhoides, apostemata, vlcera male curata, præcesserint. Si ex confluxu acrium humorum, ex prædominio eiusdem, ardore & dolore habetur. Vtrum sit profunda & penetret, radius immixtus indicabit, & si intestinum perforauerit, feces, & sanies per fistulam exeunt. Hoc Valescus vidit in quodam iuvene, cui post ulcerationem ac corrosionem hæmorrhoidis vniuersa, male curata per longiores, accidit fistula; & illa rursus etiam male curata, sua virulentia corripuit intestinum penetrando, ut sterco per fistulam exiret: at ille eundem recte prædixerat moriturum, cum eum ex longa ægitudine debilitatum videret. Quam prædictionem euentus postea comprobauit. Signum quod fistula penetret ad vesicam, est exitus vrinæ per foramen exterius. Sed & id visum est interdum (*inquit Fernicius*) in vesicam penetrare: ac tum miti-
5. *Augustinus.* turo crepitus e pudendo perinde atque e podice, deinde puris atque etiam fecis nonnihil mixtum vrinæ prorumperebat. Signum quoque, quod in aliquo musculorum est, quod sterco non potest contineri perfecte. Et si est in musculo seu lacerato, inuoluntarie exit quotiescunque ad illam partem venit. At fistula penetrans intestinum aut vesicam, incurabilis est; sed non penetrans curari potest, & non est tanti laboris: & penetrans est deterius, & ut plurimum mortalis, & ut alii vult, non facile curatur; ideo melius est & honorabilius eam dimittere: imo consilium maxime ipsius Auicennæ erat de penetrante fistula, quod si non fuerit no uimentum eius multum, ob plurimum fluxus & sanies, vel si non adferat magnum tedium cum suo fœtore, quod inquam non malum erit eam sic dimittere. Diu tamen teneatur munda cum aptis lotionibus ac fortibus seu fomentis; & huius causam aliquiesse volunt eo, quod superfuitates corporis per illa loca expellantur, & vicem supplet hæmorrhoidum fluentium: quæ quidem expulsiō est causa longioris vitæ. Vnde etiam Valescus inquit: *vidi aliquos eiusmodi fistulam habentes, quam non multum curabant, & parui faciebant (idque ex consilio peritorum) per multum tempus viuentes: non tamen erant penetrantes.* Hoc modo & huc aduocato, ut idem faceret consului; & longo tempore ad senium vsq; superuixit. Aliquos tamen (*ut hoc sequens exemplum ostendit*) ad hecticam deduxit.

OBSERVATIO XV.

De fistula ani, quam hectica subsequuta fuit.

1. Christianus Musicus insignis Delphenis, fistulam adeo sinuosam & in ano intus latentem habuit, ut speculo immisso animaduerti non posset. Hæc plus aliquando in magna copia enomebat; subinde & initio deiectionis exibat, & super sterco effusum cernebatur, multo secus exiens, quam e mesenterii aut superiorum partium vlcere. Verum pure per tres annos ita exeunte & excreto, ad hecticam tandem devenit, & paulatim tabefactus obiit.

S C H O L I A.

2. *Bartholinus.* Quid ad fistulam ani attinet, quicquid dicant auctores, quod ea sit dimittenda, ob causas

iam dictas; bonum tamen est, ut fistula ani, ut *Valescus probe admonerat*, omni die cum decoctione agrimonie & foliorum oliuæ & aluminis vsti, cum syringa quatuor aut quinque vicibus immittatur; deinde leuiter cum pannis lineis exsicceetur. Et si foramen sit nimis angustum, aperiatur cum medulla sambuci, aut gentianæ; vel cum radice bryoniae ad modum tentæ, ut loquuntur chirurgi. Et si eadem melle madefeceris superaspergendo pul. alum. vsti, melius erit, & citius aperiatur. Et si vis amouere callositatem, super dictas tentas aut filamenta melle madefacta, asperge puluerem viridis inulæ vel asphodelorum: sed non multum penetret interius, ob metum corrosionis intestini vel vesicæ, vel musculorum claudentium & aperiendum circulum ani. Et semper lauentur cum dicta lotionem, in qua reperitur sæpe iuuamentum magnum: vel repurgetur cum collyrio apud eundem descripto lib. 2. cap. 4. de fistula lacrymali: cuius hæc est descriptio: *℞ aloes, thuris ana ℥j. sarcocoll. balaust. sang. draconis, antimoni, aluminis ana ℥j. ℞. sicc. aris quartam partem vnius drachmæ.* de isto collyrio distemperato cum vino vel decoct. gallarum, iuxta *Auuen.* quod melius est, guttæ tres vel plures in fistulam distillantur, & vratur: ut & vnguento viridi ibidem descripto, & aliis lauatoriis in eodem loco dictis. Et mundificet iisdem, vel cum melle & vino & virid. aris, donec consumatur caro mortua, quæ apparet in fistula, & occulteretur caro sanguinea: sed illa rursus apparente fit dolor, qui mitigandus erit cum butyro & oleo ros. vel cum albumine oui & butyro. Vulnus probe repurgatum curetur tunc incarnatiuis. Vide & de his *Mattheum de Gradi.* Si istis non curetur, tunc chirurgia curanda erit, cauteriis actualibus: tamen cum cautione, cauterisando superficiem fistulata. Id tamen fieri non debet, si fistula intestino aut vesicæ propinqua existat. Alii vtuntur incisione. De his vide *Valescum & Gradum.* Vel potius ea, quæ *Paulus Aegineta* tradit ad longum lib. 6. cap. 78. de anifistulis, & *Aetius* lib. 14. cap. 10. de fistulis ani ex *Leonida.* Interea tamen non nisi a chirurgo peritissimo talia sunt peragenda. Memini enim non solum in his fistulis, quemadmodum & in fistula lacrymali; adhibitum fuisse ex consilio medici haud indocti cauterium, in nobili iuuenicula, quæ multo peius deinde habuit. Sed & illa operatio, quæ vniuersas callosas partes in fistulis ani in toto ambitu abscindit (*ut ex Leonida docetur*) non sine metu & periculo agitur; præsertim ab iis, qui in hac arena triti non sunt. Ideo *Aetius* ex *Leonida* monet nos, si qui sint, qui ob molliem vel formidinem reiecto ferro medicamentis tantum curari malunt, ut eos exsiccantibus, & his quæ sanandarum fistularum facultatem pollicentur, in principio curemus. Quibus nihil proficientibus, ad ea, quæ callosas partes erodendi absumentique viribus pollent, accedamus, quæ fistularia collyria appellantur; quorum confectio-
nes in communi de fistulis loco in eodem libro apud *Aetium* paulo inferius reperies. Medicamenta autem, quæ fistulas exsiccare pollicentur, sunt

& quod ex spuma argenti, oleoque & aceto præparatur, & quod fuluum Galeni sine cera appellatur. Vide de his sub finem *cap. 10. loco citato*, quæ ad fistulas ex Leonida descripta sunt. Hæc de sedis anique vitiis atque affectibus sat est dixisse: nunc ad renum morbos, hoc libro absoluto, progrediamur.

FINIS LIBRI XXIII.

LIBER VIGESIMVS
QVARTVS.DE RENVM AFFECTIBVS
ac morbis.

OBSERVATIO I.

De Nephritide seu dolore renis sinistri.

- i. **M**ulier Delphia quinquagenaria, in Delphine habitans, anno 1593. mense Septembr. cum e regione renis sinistri adeo dolore torqueretur, ut frigidum sudorem emitteret, pulsumque vermicularem haberet, & in animi deliquium incurreret ex cruciatu intolerabili, ita ut astantes illam morituram putarent; tandem adhibitis frictionibus digitorum ad se rediit, ac statim cyatho vno ex nostro consilio ceruissæ epoto, in qua flor. chamom. incocti essent & expressi, statim miraculi instar ructibus emissis, omnis dolor euauit. Mane tamen altero die *zj. elect. len. pul. hier. pic. gr. ij.* (nam a dulcibus adhorrebat) *dissolu. in zj. decoct. com.* propinauimus. Cumque ex ea potione ter alium satis bene deposuisset, optime deinde habuit.

S C H O L I A.

2. **D**E renum constitutione, situ, positu, forma & figura, ac eorum officio, satis superq; diximus in præfatione, & in libris nostris *de incerto vrinarum iudicio*. Qui quidem renes variis ac acutis morbis periclitantur; de quibus nunc dicere instituimus. Tripliciter enim patiuntur, intemperie, continui solutione, & morbo officiali. Estque dolor accidens horum morborum. Afficiuntur autem simplici intemperie, vel composita, aut materiali. Ex remotioribus causis salacitas Venusq; importuna plurimum afficit & supinus accubitus. Calidos enim renes prompta indicat libido, mordax vrina & rubicunda; & in diurnitate huius affectus membra macie conficiuntur; humidum enim naturale in iis dissoluitur, & attrahitur: vitium augent plumæ culcitæ & molles, quales nunc ex cygno facere docuerunt corrupti hodierni mores; & circa spinam calidiora indumenta, unde de facili inflammationibus tentari ea membra videntur, nam & calidos humores contrahunt. Calidiores præterea renes siticulosos homines efficiunt, trahunt enim a iecore, id vero a stomacho: ii neq; frigida frequenti haustru refrigerari possunt, quando quidem ad ea remotiora membra non facile remedia penetrant, aut contraria infestant. De quorundam prodigioso vini potu Galenus scribit, *Quod ii, ex earum partium continuo feruore, integras vini amphoras breui horarū spatio plures haurire ad ostentationem visi sunt; & pro potus por-*

tionem supra modum vrinantes, velocissimo renum officio, subito & continuante motu de humoribus discrimen agunt. Tricongius Mediolanensis (ut Plinius scribit) tres congios, unde cognomen illi fuit, epotauit vno impetu, spectante miraculi gratia Tiberio principe, (ut de ebriitate alias diximus.) Ferunt & L. Pisonem, urbis Romæ curatorem biduo duabusque noctibus perpotationem continuasse apud ipsum principem. Namque eodem auctore & hæc necessitas vitium comitatur, ut bibendi consuetudo augeat auiditatem. Scitumque est Scytharum Legati, quanto plus biberint, tanto magis sitire Parthos. In hoc affectu motiones obsunt & equo vehi, sed molli cymba non nocet: inflammat calidum cubile, thalamus indumenta que corporis calida: obest fames sitisque, & quicquid vrinam ciet calidæ naturæ, & quæ Venerem excitant. Pisces iuuant, & in gelu cocta animalium extrema. Exoleribus lactuca, seris, cucurbita, cucumis, portulaca; acetosa. Valent frigida potiones, & seminum frig. maior. emulsiones, unguentum rosaceum, & similia. Si adest humor calidus, sanguineæ habitudinis notæ id ostendent, vrina purpurea, crassa, puluerulenta, renum & lumborum grauis dolor, & omnium membrorum fere immodicus calor, venæ turgidæ, ac præsertim quæ supra talum sunt; conuenit venæ sectio. Si vero biliosa fuerit materia, vrina tenuis & flaua cernitur, interdum crassior. Si lutea bilis in causa fuerit, in qua & quædam capillamenta conspiciamus, vel in imo vitro; addunt & in iis renibus inflammationes sentiri. Quæ ad inflammationes renum conferunt, huc transferenda. Si frigidi renes sunt, alba vrina & aquosa redditur, pallor faciem occupat, sine Veneris desiderio viuunt, & in ima renum parte frigiditas sentitur, quam calida iuuamenta tollunt. Cum pituita vero dominio, decolor vrina, sed turbulenta ac crassa cernitur, in qua capillamenta alba subsidunt, tum frigidi renes ac graues sentiuntur. At ex atra bile tenuis vrina emittitur, vel liuida, spumans, interdum glauca & crassa, pro humoris qualitate, cum quadam circa lumbos grauitate: vtrique crura stupent, si ambo renes afficiuntur; aut solum alterum crus, ab ea parte, qua dolor incumbit. In eo vitio calidus ac temperatus aer, corporis motus iuuat, tum & in molli pluma somnum ducere conuenit, vel supinos cubare: & antedicta vestimenta conueniunt, quæ prioribus causis inimica sunt, nam & edulia aromate condita prosunt, quale est, *cinnamomum, & galanga, perdicæ & phasiani, pullique columbacei, turtures, & anicula, alauda dicta, peculiariter dantur.* Ex hortensibus *apium, anethum, daucum, pastinaca, petroselinum, maiorana, mentha, sauiæ, brassica cymæ coctæ, & expressæ cum salis exiguo, pineæ, pistacia, amygdala amara.* Obest crapula & Venus. Calida oleo infundantur, & extrinsecus illiniantur. Si materia adest, ea prius digerenda, mox purganda, in diuersum trahenda; postremo quæ vrinam ciunt, damus. Et sic intemperaturæ dolorem inferunt. At calidam referunt diabeten, ad siccam renū macilentiam & consumptionē syntexin;

Ex calida causa, curatio.

4.

Frigida habitudine renum nota.

Calida renum distemperatio.

Ad frigida causa vrina que valent.

Prodigiosa potatores.

Intemperaturæ quomodo dolorem inferunt.

syntexin: corporis macies succedit, vrina multa, pinguis. Humectantia iuuant. At humiditas raro est sine frigidityte, quæ maxime ad imbecillitatem spectat, renibus nimium laxatis. Imbecillitatem pariunt percussio in spina, longæ & diuturnæ equitationes, nec non lassitudines, & nimia Venus: & impotentia, ut in senibus & macie confectis, & renum expultrices potentie ablatae. Nam & vrina loturæ carnis similis, imbecillitatem indicat renum, sicuti de iocore dictum est. Vrinæ profluvia laxos & infirmos reddunt renes. Vrina modica extenuatos & constrictos renes ostendit. Meatum vero amplitudinem faciei pallor, ac corporis macies præ se fert; membra enim vrinæ fluore consumuntur, & vrina multa cruenta cum crassis humoribus effluit: quandoquidem renes nullum contrahunt alimentum; tunc nec ullus adest dolor. Sed & aliud vitium, auctore *Oribasio*, intercedit: nam renum substantia, siue caro, quæ alioqui solidior est, mollior fieri solet. Ad malam compositionem pertinent, vel quia a prima sui creatione possunt esse vel nimis parui, vel nimis magni. Huc etiam spectat meatum obstructio vel laxitas: Item oppilationes: sub quibus & arenulæ, calculus, lapides, materia viscosa, crassi solutis inclusi. Rursus dolent ob continuam dissolutionem, per vulnus, venarum apertionem, corruptionem, vlcus. Vel patiuntur morbum compositum, ut apostema. Dolent itaque renes, ut interdum exitialiter hominem torqueant, malæ habitudinis causa, aut ictu, vel lapsu, vel vulnere, aut incluso spiritu, aut innato calculo, vel harenis aggeratis, aut abscessu. Addit Galenus ex superfluentibus quandoque fieri humoribus, oppilando; siue calidis & frigidis. De quibus omnibus in hoc libro dicemus. At dolor hic nephriticus, qualis fuerit in hac muliere, prius indagandum est. Appellamus autem hunc dolorem nephriticum communi vocabulo, (*quamuis nonnulli proprie nephriticum ad inflammationem renum pertinere velint*) indifferenter omnem passionem renum, & quemuis renum cruciatum & dolorem. Sic enim & Leonellus illum aphorismum interpretatur: *Quicumque nephritici sunt, non sanantur, post 40. annos*; intelligendo per nephritidem omnem passionem renum indifferenter: Nam & aphorism. 79. lib. 4. *Quibus in vrinis arena subsistunt, illis vesica laborat.* Non solum vesica laborat, inquit Galenus, sed & renes. Ibi & nephriticam dolorem ad calculum etiam renum refert Galen. & 6. aphorism. lib. 6. dicente Hippocrate: *Renum & vesicæ vitia in senibus difficulter sanantur.* Idem Galenus intelligit, siue vlcus, siue inflammatio, vel alia passio in renibus fuerit, difficulter curantur. Ceterum dolor hic, nempe in hac muliere, qui renem sinistram procul dubio infestabat, erat ex incluso spiritu vel flatu renis sinistri. Potest enim eiusmodi spiritus flatuosus renes extendere, & insignem dolorem adferre: quod cognoui ex dictis Alexandri Benedicti Veronensis, medici insignis ac doctissimi. Qui ita scribit lib. 22. cap. 6. de curatione nephritico-

rum: *Si calculi signa non sunt, nec colici nota, nullaque, præterea in renibus grauitas adfuerit, nihilominus grauissimi in renibus dolores torquent, tum in incluso spiritu distenduntur; nam subito oriuntur: præsertim si calidis fomentis dolor remittitur: nam & interdum locum mutat. Leuat alui deiectio, vel ventris flatus emissus.* At nostra mulier flores chamomillæ in ceruisia coctos & expressos cum ebibisset, rustibus per superius, & flatibus ventris emissis, ilico conualuit. Benedictus vinum tenue laudat, cymini exiguo vel anethi, vel rutæ seminis adiecto. Veteres medici (*ut idem refert*) ius brassicæ in potu dabant, vel semen apii, vel anisi decoctum. At quibus alii dolores curantur, ex diuersis causis oborti exempla infra scripta clarius ostendent.

OBSERVATIO II.

De renum caliditate.

Iuuenis salax, Veneri deditus, raræ constitutionis, caliditate renum afficiebatur; ita ut tandem macie conficeretur. Cum simplici intemperie laboraret, sine affluxu humorum, solis alternantibus infrigidantibusque, contenti fuimus: eaque adhibuimus, quæ in scholio præcedenti diximus conferre ad dolores renum ex causa calida, & intemperatura calida: imperantes quoque, ut *pannus lineus inunctus vnguent. ros. continuo lumbis apponeretur*: inunctionis enim motio calorem aliquem inducit. Cibus erat lactuca, portul. cocta, adiecto modico agrestæ, & vesperi hordeatum cum emuls. sem. pap. albi, & seminum quatuor frig. maior. mundatorum. Vtebatur etiam lacte ouillo, & lacte ebutyrato, & conserua florum nenupharis. Et sic tandem a calore & dolore renum liberatus est.

S C H O L I A.

Quomodo simplices intemperaturæ absque fluxione humorum curentur, Scholio præcedente dictum est. Si vero sint cum affluxu humorum signa habentur ex humore prædominante, & ex iis, quæ antea retulimus. In materia calida conferunt venæ sectio; primo ex basilica vena; secundo ex saphena exteriori: clysteres refrigerantes, humectantes ob loci vicinitatem; vel ex solo lacte ouillo, cum pinguedine renum caprarum, & oleo rosaceo, & digeratur materia cum syr. sequenti, vel simili: *℞ lactuca, portulaca, hepatica herba, lentis aqua, bursæ pastoris, bellid. minoris ana m. j. florum nenupharis p. j. semin. quatuor frigid. minor. & maiorum ana ℥ ij. spodi, santal. rub. & alb. ana ℥ j. ℞. ex decocto fiat syr. adiecto zacheraro q. s.* Purgetur deinde materia calida cum thamarind. cassia fistula, elect. de succo ros. Exterius inungatur cum vnguento populeo, adiecto succo arnoglossæ, virgæ pastoris, prius cocto ad succi consumptionem, adiecto & oleo rosaceo & cera: & fiat vnguentum, vel extendatur pars in panno lineo, & applicetur. Quidam & hic laminam plumbeam laudant lumbis appositam. Si ex frigido humore; pituitoso, viscido, si non adsit fluxus vrinæ aut sanguinis, digeratur cum oxymelite simplici aut diuretico; purgetur cum diatrisbith, & agarico, & myrob. chebulis. Inungantur renes oleis calidis,

chamaemelino, anethino & similibus. Ventosæ quoque in natibus cum sacificatione positæ, plurimum inuant in ægitudinibus renum & lumborum. Victus contrarius, nempe calidus præscribatur, ut de simplici intemperie paulo ante diximus.

OBSERVATIO III.

De renum debilitate, ac lumborum dolore ac colliquatione, pedumq; inflatione.

Nicolaus sacerdos, Corfius dictus, anno 1555. sub finem hyemis, ineunte vere, annos quadraginta natos, insignis Musicus, & vir admodum facetus, imbecillitatem & colliquationem renum longo tempore patiebatur, vrina pingui apparente, cui & renes ac lumbi dolebant. Empiricus quidam hunc male tractabat, neque habita ratione ad caliditatem & renum imbecillitatem ac siccitatem, calidis aperientibus medicamentis utebatur. Ad quem ingressus, inueni eundem valde debilem, & viribus deiectis adeo consumptum, ut ad marasum quasi tendere videretur, pedibus tamen inflatis, membris vero superioribus valde macilentis: pingue enim quod ambiebat renes colliquecebat ex habitudine plurimum calidioris, qua membra consumebantur, & membra extrema, nempe pedes, ad frigiditatem perducebantur. Id euenire tradunt venere consumptis, aut post longam diuturnamque diabeticam dispositionem. At hic sacerdos concubinam habebat, unde malum magis auctum existimabam, tum ex calidioribus & diureticis medicamentis, perperam ab empirico propinatis. Vrina huic multa alba, sed pinguis, oleaginea erat. In lumbis, ilibus, & imbecillitas & dolor erat, caputque nonnihil & oculorum acies afficiebantur. Huic tandem & Venus demonebatur, & totius corporis macies accedebat, exceptis pedibus Talia enim adesse solent, quibus arescunt renes; ita ut tæbe quadam ex siccitate conficiantur, & syntexin pati dicantur, cum supra modum extenuentur, & eorum pingue colliquetur. Hæc cum animaduertirem, ut a potionibus illis calidis exsiccantibus & urinam ducentibus, quibus ex præscripto empirici tunc utebatur, abstineret, mandavi. Omnia exsiccantia, quæ hic damnantur, salsa acuta, acetosa & austera interdixi, & vinum vetus. Iram quoque & mærorem, omnemque exercitationem, quæ pestifera est; uti & equitatio in primis, sius, & fames, & Venus. & quæuis deiectio. Omnia cum somno concessi, & lectum molli pluma; ne tamen supinus dormiret. Quod ad cibum attinet, omnia humectantia admitti, quæque hecicis & tæbe confectis alias scriptissimus conuenire, & quæcumq; corpora replent, ut gallinæ pinguis, capi quoq; & agnina caropinguis, hedura, vitulina, gallinacea, & iocinora, oua recentia, (non hypenemia, id est, subuentanea. & citra coitum edita, Plinio dicuntur zephyria oua lib. 10. capit. 60.) testisque gallinacei, si haberi possunt, iusculum pingui, adipe gallinaceo, aut vitulino pingui reddita, aut anserino adipe recente. Etiam hac pulve commode utebatur (qua vtor & in consumptis) ex medulla bouum parata, cum vino & zaccaro paucis pane albo

confriato iniecto. Præterea iussi, ut omnimane lac ouellum, adiecto zaccaro albo potaret. V. spiritus lac amygdal. confectum cum semine papau. albi & semina 4. frig. maior. Quod ad medicamenta attinet, conserua viol. & zaccar. viol. & diapapauere & similibus vsi sumus, & decocto ex lactuca, portulac. vio ar. floribus cordial. & floribus nymphaeæ albae, & hord. mundat. & passulis in sero lactis decoctis. Et cum alius resisteret, nolimus eundem purgare, sed sola ʒj. cassia recens extracta cum zaccar. boli instar. latus fuit; post horam sumendo panatam ceruistiam, cum pane albo intrito & butyro exiguo. Id enim semper obseruandum, quod sumta cassia fistulari vel alia quacunque medicina, modo ex illis sit, quæ leniendo purgant, post horam panata assumenda erit: Nam aliter si magnum interceperit spatium, vice nutrimenti natura eam rapit & amplexatur, unde parum aut nihil aluum subducit. Hanc regulam docte admodum medici periti in praxin traxerunt ex Galeno lib. 2. de facultat. alimentorum cap. 31. ubi de prunis agit. Ibidem enim inquit, Pruna ventrem subducunt, modo non ilico supra earum assumptionem prandium sequatur, sed paululum potius interponatur tempus horæ, ut diximus, ad ipsum prandium. Hanc vero vniuersalem esse regulam ait, & methodum lenientium assumendorum, eodem capite vltimis verbis, nec minus lib. 5. de tuenda valetudine, ubi aluum lubricantia parum ante cibum offert. Non opus est tamen (ut obiter hoc adnotemus) ius aliquod lauans, aut hordei aquam præbere, prout fit in aliis deiectionibus alui, cum fortibus & scamoneatis medicamentis. Ex mucag. egummi arabic. tragac. seminis coton. & psyllii, & sem. althææ, lini, cum oleo rosaceo, cucurbitino & viol. adiecto butyro recenti, & adipe gallinaceo, cum modica cera alba conficiebatur linimentum & vnguentum molle: etiam subinde apposto infrigidante Galen. Iis cum vteretur, paulatim euauit pinguedo in lotio, & colliquatio cessare cœpit, ac continuando victum resumituum sanus factus est. At pedes inflari cum læderentur puris resoluentibus, inuncti cum tribus partibus vnguenti populei & vna parte vnguenti alabastrini, tandem partibus æqualibus & in fine solo vnguento alabastrino, detumuerunt. Et postremo, cum adhuc commode incedere non posset pro maiore roboratione & resolutione residui humoris ad pedes defluxi, hunc fotum præscripsimus: ℞ flor. ros. rub. florum chamom. meliloti fursuris minime pinguis, uia arthetica, salvia ana m. j. salis communis m. ij. coquantur in aqua communi q. s. pro fotu. Atque his debite administratis, cum diæta conuenienti, ex Dei gratia, sanus euasit.

SCHOLIA.

Pingue, teste Aristotele, plenius renes ambit, sed ex habitudine calidioris facile colliquatur, & renes arescunt. Tunc ea, quæ renes inde defectos recreant, & pinguiora faciunt, studiosius administramus; quale est lac ouillum, quo defecta corpora facile implentur: idem præstant asininum vel camelinum, nam renes firmant efficacius, & imbecillitati subueniunt. Nam ilico huic

male

in malo succurrendum; alioqui perducit corpus ad tabem, febrem hecticam, & demum ad mortem. Methodus curandi est, ut non solum renes impinguentur, sed totum corpus, cibis multis & nutritivis, ut sunt iura carniū inspissata cum vitellis ouorum, pultesque ex amylo, lacte recenti caprarum, penidiis, amygdalis dulcibus. Valentque auellanae, pineae, non rancidae, phytici recentes, vinumque rubrum dulce: lac ex mamillis calide haustum cum saccharo mixtum. Quibus adde ea, quae diximus in *observatione precedente*. Abstinendum a coitu, venae sectione, purgatione, & medicamentis urinam prouocantibus & diureticis; a vehementer exsiccantibus, sinapi, aceto. Sed potius iis utendum, quae sperma augent, nempe diafatyrio; de quibus cap. *de diminutione coitus* dicemus. Nam vis huius curationis in tribus rebus consistit: in extinctione caloris assantis, ex cap. *de phthisi, tabe, & de feb. hectica*. Secunda in alteratione siccitatis marasmati, ut *ita loquar*, ex cap. *de mala intemperie siccæ ventriculi, & de diabete, de qua postea*. Tertia in multiplicatione spermatis renes confortantis, de qua agemus capite *de diminutione coitus*. Quod vero attinet ad ea, quae ad imbecillos renes faciunt, ratio habenda, ex qua causa fiat, calida vel frigida, intemperies illa curanda cum contrariis, ut paulo ante diximus: ita & humores contemperandi, & purgandi, si ad renes confluant & ipsos debilitent, ac auerrendi, ut exemplis subsequenter latius ac clarius patebit. Memini tamen filiam Dominae de Marquet, quatuordecim annorum, lotium longo tempore minxisse admodum pingue, tanquam ius carniū supernataffet: erat tamen crudum, tenue, album; non ita dolebat in renibus, quamuis alba & macilenta esset, & quasi atrophiam laborabat: fuit hæc tamen commode per me curata, cum longo tempore pluma pinguedinem quasi concretam ex lotio moueremus. Et quia debilis ventriculus erat, rotulis ex aromat. rosar. dactylod. abb. & speciebus latificantis Galeni (nam videbatur etiam melancholica subiectis) & speciebus diamarg. frig. utens, aliisque aptis remediis, etiam ad atrophiam & maciem conferentibus, hæc ipsa probe restituta est, & crassior facta bene deinde se habuit.

OBSERVATIO IV.

De Diabete.

Diabetes rara est affectio, quam Galenus semel tantum aut bis vidit. Rondeletius ter in filia & patre, atque morbum quasi hereditarium existimabat, vel potius quod essent eiusdem temperamenti, scilicet biliosi. At ab Hollerio visus est, anno 1558. in fine Augusti in vico vetere Templi, Consuli du Val, in febre continua, non ita ardente ad sensum, lingua scabra, arida, nigra. Quotidie sex pintas (quas vocant Luteria) urinae mingebat; non ita siticulosus; constabat mente. Sub septimum diem obiit. Consuli Quelain nephritico, in febre profluvium urinae motum, in quo serosa urina, ad duas quartas emingebatur, ex quo euasit. Eodem morbo paulo ante eius pater obie-

rat. Alter ab eodem profluvio obiit, in vico sancti Ioannis Bellouacensis. Quibusdam diutius urina suppressa, sequitur urinae profluvium, aut morbus aliquis acutus per crisin malignitatem suam in renes deponit, ut ait Aræteus. Sic socrus mea, vetula, Iusta nomine, quæ viro suo Augustino Teylingio quæstori Domini de Egmont, peperit viginti proles, uti epitaphium post mortem eiusdem habebat: *Septem bis gnatos, sex est enixa puellas*. Qui omnes nunc mortui sunt, vna vxore mea Eua Teylingia superstita, quæ erat decima octava proles, quæ adhuc mihi socia in hunc usque annum 1595. 70. annos nata. Ceterum mater huius (de qua nunc agimus) quandoque apoplexia correpta, soluta in paralyfin, & ab ea apoplexia liberata, post multos annos demum febrem acutam incurrit, annum septuagesimum tertium agens, eamque satis ardentem in vetula: post 7. diem tribus noctibus valde sitibunda, urinam serosam adeo copiosam per tres continuas noctes atque dies profudit, ut multos congios impleret: a quo tamen malo euasit, quamuis post mensem admodum vetula postea obierit. Vidimus & nos mulierem vetulam Alcmariæ ad Fossam nouam, diuturno hoc malo circa renes consistente, (diabete dicto) laborantem, neque primis diebus medicum consuluisse. Omnia autem quæ bibebat, protinus per urinam demittebat, vix a natura concocta vel immutata, ex renum proculdubio caliditate: nam valde biliosa erat, & admodum macilenta, perpetuo urinam tenuem aquosam reddens: aderat & sitis continua, renumque caliditas, cum doloribus & punctationibus. Cum malum longo tempore protractum esset, priusquam ad eandem accitus essem, ut viscera iam vri viderentur, lumbis quoque intumescantibus & coxis, & tandem mordens caliditas in visceribus augeretur; superior venter corrugabatur, & venæ in ipso eleuabantur, vniuersusque habitus gracilis fiebat, & rabes totius corporis grauis accedebat: quare iam diabetem, quamuis raram affectionem, veram tamen adesse percepi: sed in vetula nunc diuturnam, amicis incurabilem esse pronuntiaui. Interea quæ ad hunc affectum conducere videbantur, cum amici instarent, ne eam pro deplorata relinqueremus, illa adhibuimus, quæ ad hunc affectum conducere videbantur, occurrentes quantum possibile erat totius corporis intemperiei, deinde etiam renum. Paulus & Alexander aduersus immodicum renum calorem pugnandum esse volunt, refrigerando quidem partem & confirmando; contemperando autem totum corpus, & humectando, quoniam id necessario siccum, ob largam urinarum excretionem deprehenditur. At Aetius etiam acrimoniam humorum huius causam designat; quam & deleri vult, sanguinemque, ac cum eo permixtum humorem reddit serosum, & renum temperiem corrigit. Ideo aerem elegimus ad frigidum & humidum vergentem, & somnum solito longiorem præcepimus, & quietem inunximus, nam quoduis exercitium & immodicus motus, & animi affectus

4. immoderati vitandi. Tota enim vitæ ratio omnino frigida, etiam affectu esse oportet. Alimentis crassis vitendum, emplasticis, minime calidis, incidentibus vel aperientibus: cibique, iuxta Alexandrum & Paulum, sint crassi, bonique succi, mordacitate carentes, & qui acrimoniam obtundere possunt, ac frigidi, ex sententia Aetii. In quantitate etiam necessario crassiores, ut perdurare possint, & copiosiores, ex Alexandro. Deditur igitur ptisanam, aliamque sorbitionem ex allica, pedes veruecinos, vitulinos, suillosque & bubulos, hædinosque pedes, tum rostra, caseumque recentem citra salem, & lac per silices aut ferrum ignitum scissum, seroso humore adempto, & amyllum in iure carnis coctum, ova sorbilia: & ex oleis intybum, seridem, portulacam, & lactucam. Inter pisces, saxatiles. Et inter fructus, pyra, poma, mala punica, & castaneas, iuxta Alexandrum. Vitanda salsa omnia & acria, & anisum & cuminum, & quæcunque urinas prouocant. Vinum rubrum frigida dilutum, aquam hordei ex tosto hordeo confectam, & succum malorum punicorum frigida permiscebimus loco potus. Quod ad medicamenta attinet, a venæ sectione abstinuimus; quæ licet conveniat in cubito a principio, ex Aetii & Pauli mente, tamen ab ea abstinuimus in valde vetula & iam exsangui. Syrupos ex portulaca, de ribes, ex oxalide, myrtinum, rosaceum, & nymphææ, exhibuimus, qui bilem contemperarent. Et quamvis alii, si vitiosi humores sint in renum corpore imbibiti, exhibent leuiter urinam cientia, tamen ubi inueteratum est malum, neque iis, neque venæ sectione utuntur. Concocta materia, per syruos dictos, si alius resistebat, sola cassia eam semel leuiter purgavi. Et denuo ad syr. de agresta vel de succo acetosæ, cum decocto plantag. portulacæ, florum nymphææ & symphytiac similes deueni, etiam ad condita; hunc in modum: ℞ carnis cotoneorum, conseru. consolidæ maioris, ros. veteris ana ʒ ss. muccag. gummi trag. sem. cotton. extract. cum aqua ros. ana ʒ ss. boli armeni, terra sigillat. ana ʒ j. amyli. ʒ iij. cum syr. myrt. & pap. fiat conditum. Capiat bis in die, & semel in nocte. Lumbos inunximus hoc vel simili linimento: ℞ olei ros. omphacini, cotton. nymphææ ana ʒ ss. succi plantaginis ʒ j. santal. omnium ʒ j. ss. cera & aceti parum; fiat vnguentum. Lumbi quoque interdum vnguento popul. inungebantur. Ceterum cum nulla remedia hanc vetulam iuuarent, tandem consumpta, ut prognosticon etiam feceramus, hæc obiit, cum tales plerumque ut hectici succumbant.
5. *Cur diuersi modi de affectio hac nuncupetur.*
6. Aliqui agunt de diabete in vesicæ malis: sed quia diabetes proprium est vitium renum; nos hic de ea agimus. Græcis vero dicitur διαβήτης quandoque διαβήτης, interim δὲ οὐκ εἰς ἀμύδα quandoque vero διαβήτης εἰς ὕδα appellatur, Galeno teste 6. de loc. aff. 1. de crisib. & lib. de diff. sympt. Latini vero diabetem, vel aquam intercutem, seu hydropem in vas urinale; interim vero diarrhœam in urina vocant: Benedict. Vero diarrhœam nephriticam. Ita hæc affectio prout diuersimode consi-

derabatur, diuersa quoque nomina sortiebatur. A verbo διαβαίνω, quod Latine traicio, pertransco, seu traduco sonat, ob celerem urinae transitum. Διαβήτης a verbo διαβήτης quod idem est, quod sitis, ob inexplabilem & ingentem sitim, quæ hunc affectum consequitur. Alii magnam urinae copiam inspicientes, aquam inter cutem ad matellam, seu urinae profluuium nominarunt. At nomen non curantes, sed curationis viam, ut inueniamus ex loco affecto & dispositione, id præcipuum est. Estque diabetes, iuxta Aetium cap. 1. lib. 11. nihil aliud, quam affectio diuturna circa renes constitens, multum potum inducens; una cum hoc, quod quicquid bibitur simul, ut acceptum est, per urinas reiecitur. Et iuxta Paulum cap. 45. lib. 3. potionis transmissio est protinus, qualis fuerit assumpta. Et iuxta Galenum exitus velox urinae, & quod potatum est, sua qualitate non mutatum, habetque similitudinem cum affectu ventriculi intestinorum leuitate, ut ad longum apud Galenum videre licet 1. de crisibus, & 6. de locis affectis. Quomodo generetur hæc affectio, vide ad longum apud eundem; & quod tres diuersæ renum facultates lædantur, attractrix primo & deprauata, & retentrix adeo imbecilla, ut ablata dici possit, & alteratrix ablatio. Dubia quædam circa hanc affectionem oboriuntur: quorum solutionem vide apud Donatum. Renes hic quoque sunt affecti ex caliditate; iuxta Alexandrum & Paulum, & subinde ex vitiosis humoribus in renibus imbibitis, iuxta Aetium. Comitatur hunc affectum sitis pertinax sine satietate. Viscera vri videntur, anxii sunt, & lotium citissime exit, qualitate non mutatum, ut diximus, suntque animo dubii, igne ardere se putant, intumescunt lumbi, testes & coxæ graciles fiunt, tabesque totius corporis accedit; & plerisque in fine mors subsequitur: nam & hæc affectio paulatim cum inceperit increscit, ut eius principium & incrementum vix percipiatur; sed dum ad statum peruenierit: adeo ut videatur subito aduenire, Galeno teste 6. de locis affectis. Propterea quod renum desiderium non animale, veluti ventriculi est, sed naturale. Quod vero pessimum sit vitium urinae profluuium, quoniam duplex est, ex Galeno constat lib. 1. de crisibus. Et enim quanto plures instrumentorum cuiusque generis actiones & vires impeditæ fuerint, aut ex toto perierint, tanto deterior est morbus, ut ipse refert. Neoterici addunt in senibus & decrepitis vix aut nunquam curari. Si perduret, ex mente Auicennæ, deducit corpus ad liquefactionem, tabem, & hecticam. Iuniores quidem euadunt, modo in principio occurratur. At in febre ardente raro curationem recipit. Curatur ut iam in observatione præcedente diximus. Vnice cauendum, ut corpus non moueatur, neque dormiens renibus incumbat, ne nimis incalescant. Si ex calida renum tantum intemperie fiat, succus sanguinariæ ex rubro præbetur, iuxta Paulum & Aetium, & dilutum pyrorum, & cremor symphyti. In principio si non durauit malum, vena secanda: humores acres salsi si imbibiti sunt, prius parandi &

S C H O L I A.

7. *Diabetes quid sit.*

8. *Curatio.*

randi & contemperandi cum syr. dictis; demum euacuandi cum cassia, thamarindis, myrob. citrinis & chebulis, & materia diuertenda, etiam per exsudationem, iuxta veteres & Aretæum, in dolio facta euaporatione, capite extra dolium prominente, modo vires ferant. Donatus eos ad balneum seu puteolos mittit. Nam ex eo non solum materia ipsa ad exsudationem diuertitur, verum renes ipsi corroborantur. Ab ipso autem balneo, & ante ipsum, medicamentis refrigerantibus & topicis, quæ & a Paulo & Aetio recensentur, renes inungit, de quibus etiam in Obseruatione diximus. A balneo ℥j. vel ℥j. β. zacchari rosacei exhibet, cum ℥β. aquæ hordei torrefact. & oxalidis. Qua curationis via huc vsque reliquis rite adhibitis, diuersis in temporibus duos perfecte curauit, Iohannem Franciscum Carassam, & Vincendum Marcellum, ut apud eundem videre licet capite proprio. Topica sunt diuersa olea, succi herbarum refrigerantes, vnguent. linimenta, emplastra, ut farina oxyrrhodino subacta, emplastri modo renibus apposita, & cerata ex ros. & lactace succo, & quacunque roborando refrigerant & adstringunt renes, & vñctiones refrigerantes renes, quas ad ardores vrina sine vlcere conuenire dicemus. Hæc & similia ad diaberen conferunt. De multitudine vrinae, eiusque incontinentia dicemus libro sequente, de vesicæ morbis ac vitiis.

OBSERVATIO V.

De renum imbecillitate non separantium sanguinem ab aquositate; cum aliis quibusdam symptomatis.

Catharina Iacobi, vxor Florentii Teylingii, fratris vxoris meæ, e regione domus ciuicæ Alcmariæ habitans, anno 1557. mense Aprili, cum dolore lumborum ac renum afficeretur, ob debilitatem eorundem, virtute colatoria oblata, vasisque renum laxatis, vrinam lixiui instar modo nigram, modo serosam cum sanguine permixtam & perturbatam subinde meiebat, caliditate venarum emulgentium seroso sanguine ad renes profluente, & ob renum laxitatem perturbato lotio sic permanente, dum redderetur. Huic renes non tantum imbecilles erant, sed vna & ventriculi imbecillitas aderat, & simul hepatis caliditas, vti ex precedentibus signis, quæ tunc aderant, ad eam acciti cognoscere potuimus. Sed ab hoc malo diutius cum detineretur, infrascriptis remediis nostra industria Deo adiuuante euasit: ℞ rad. cichorii, dentis leonis cum toto, exceptis floribus, rad. feniculi ana ℥β. end. parietar. fumarie, capill. ven. ana m. j. florum rosar. rubr. (ad roborationem renum) plantag. (ad laxitatem constringendam & refrigerandum renes, tum hepar simul) absinthii Romani (ad ventriculi corroboracionem) ana m. β. semin. quatuor frigid. maior. sem. portul. ana ℥β. fiat decoctio in aqua cichorii ad ℥βj. β. col. adde syr. de cichor. cum rhabarb. iuiubini ana ℥j. syrup. de portulaca, capill. ven. ana ℥β. clarificetur, & arom. cum ℥j. specierum diarrhod. abb. & fiat ad modum clareti, bis in die ex hoc decocto sumebat. Deinde ℞ cass. recens extracta ℥j. rhab. optime puluerisat. trochisc.

alkachengi sine opio ana ℥β. cum ℥ij. aqua decocta pariet. fiat portio; detur hora sexta mane, quinquies aluum deposuit, dolore in lumbis sedato, & vrina puriore exeunte. Renum regione quoque inuncta, cum infrigidante cerato Galeni, pauco adiecto oleo ros. decoctione priore iterum reiterata, adiectis alcakengi cum suis vesiculis, & iuiubis recentibus, cum sem. pap. alb. & his tabulis subsequentibus sumtis: ℞ pul. trochisc. alkachengi sine opio, specier. diarrhod. abb. ana ℥j. β. trochisc. de rhabarb. (nam aderat quadam obstructio in hepate, quod grauitas hypochondrii indicabat) specier. diatrag. frig. (ob caliditatem renum) ana ℥β. dissolutis in aqua fumarie, lupulor. adiecto zaccharo optimo q. s. fiat confectio in tabulis secundum artem: capiebat ℥ij. vel iij. mane hora sexta, & hora quarta pomeridiana. Vt autem omnibus symptomatibus succurrerem (cuius rationem in Scholio latius explicabimus) sequens adhuc apozema descripsimus: ℞ corticum rad. feniculi, cichor. glycyrrh. ana ℥β. capill. Ven. parietar. hepatica (ob caliditatem hepatis) flor. ros. rub. sanguinar. agrimonie, absinthii Romani, pentaphyl. plantag. ana m. β. gr. alkachengi num. iiii. iuiubar. sebesten ana num. vii. semin. quatuor frigid. maior. ana ℥j. semin. quatuor frigid. min. coriand. preparat. feniculi, cumini in aceto prepar. sem. pap. alb. ana ℥β. fiat omnium decoct. in aqua cichor. fumar. vngula caball. ana ℥βj. β. infus. maneant per noctem: mane fiat expressio; addendo syrup. capill. ven. iuiubini ana ℥j. zacchari candidi. albiss. pro sapore q. s. fiat apozema. Sumat bis in die. Mane quoque ad renum caliditatem, roborationem, constrictionem utebatur zaccharo rosaceo: & inungebatur infrigidante Galeni, & cerata seu vnguento ros. Et has lozengas capiebat: ℞ trochisc. alkach. sine opio ℥β. specier. diarrhod. abb. diatrag. frig. specierum arom. ros. (ob stomachi imbecillitatem) ana ℥j. dissolutis in aqua alkachengi, adiecto zacchar. optim. q. s. fiat confectio in tabulis per lozengas, ponderantes ℥ij. qua omni mane sumebantur. Et ob dolorem in renibus inungebat subinde renes cum oleo ros. & exiguo vng. alabast. & infrigid. simul mixtis. Quibus remediis fuit curata a dolore; & lotium rediit ad aureum colorem, & deinde optime valuit.

SCHOLIA.

Debilitantur renes ex omni causa prohibente vel diminvente ipsorum operationem; quæ est, aquosam partem siue serosam a massa sanguinis nuper in hepate geniti (vt alias ad longum demonstraui in libris nostris De incerto vinarum iudicio) segregare, qua non indiget Segregatio pars in aquosa. nutrimentum. Quæ quidem segregatio breuiter tribus modis perficitur; attractione sanguinis aquosi a vena chili, per venas emulgentes; diuisione sanguinis attracti in partem aquosam nutritiuam substantiæ renum, & partem subtilem superfluentem, per panniculum colatorium porolum in concauitate renum contentum: per cuius poros augustissimos transire potest aqua subtilis, crassa permanente: vel fit expulsio partis aquosæ subtilis ad vesicam extra corpus per vretes. Quod autem multæ sint causæ, impediētes

operationem renum vel corrumpentes, præter dictas scholio *Observationis 1. huius libri*, ob intemperiem malam, malamque compositionem & continui solutionem, hinc patet, quod etiam renes laxiores fiunt, ac debilitantur, ut vrina exeat instar loturæ carnis, ut in iecore fieri solet: nam & in hac muliere subinde nigralixiui instar prodibat: non tamen ab ictero neque a crisi (ut subinde fieri solet, uti de ictero diximus) neque veniebat a calculo, de quo nunquam conquesta erat; licet ab eo quoque teste Fernelio fieri potest, ut vrina nigra profluat. Et quanquam ob amplitudinem vel largitatem venarum, per quas fit attractio superfluitatis aquolæ cum sanguine mixtæ a vena concava ad ipsos renes, fieri potuit. *iuxta Galen. 6. de locis affectis cap. 2.* mingunt subtilem sanguinem æruginosum, similem egestionem hepaticæ, qualis est lotura carnis recentis; est tamen ista, quæ procedit a renibus, magis sanguinolenta, ut venit ista vrina sanguinea post digestionem factam in hepate, cum sanguis spargitur ad venas. Quia si vrina ægri consideretur immediate post cibum, reperitur aquosa. Vnde & hæc vrina sanguinolenta potest euenire, etiam propter defectionem renum, procedentem ab aliqua egritudine ipsorum; & tunc sentitur dolor in renibus. Hæc autem ægra non erat omnino sine dolore, & vrina erat subnigra & subrubra, non tamen plane sanguinolenta, neque immediate a cibo clara spectabatur. Si ex sola largitudine viarum ad renes attracta fuisset aquositas, tunc plane sine dolore exiisset. Contingit autem aliquando, ut vrina cum sanguine & aliis humoribus emittatur, per viam mundificationis ab hepate; & tunc sit residentia in fundo vrinæ. Si venæ autem non sunt infirmæ, & æger sentit iuuamentum magnum ac tranquillitatem, habens & periodos suas instar fluxus hæmorrhoidum, illa non subito est restringenda: vel si etiam veniat quasi per crisin. Sed de his omnibus agemus postea, de cruenta vrina. Nam illa, quæ fit propter debilitatem renum, vel propter nimiam venarum amplitudinem, si diutius durat, totum corpus extenuat; ut etiam illa vrina quouis modo superfluens, ut in diabete præcedente diximus. Et licet viæ a gibbo hepatis ad renes procedentes nimium laxentur dilatenturque, tunc oportet uti stypticis, ne sanguis ultra modum ad ipsas attrahatur; & ubi adest immoderata prædictorum meatuum largitas, a diureticis & aperitiuis omnibus erit abstinendum; quæ regulæ etiam in omni fluxu vrinæ immoderato locum habet. Interea tamen si alia symptomata, ut oppilatio hepatis, id prohibeant, vel alia symptomata adsint, non est utendum puris stypticis & constringentibus. Ideo propter laxitatem renum solis constringentibus uti non fuimus ausi: sed ut sanguis ille limosus niger, licet etiam subinde aquosus, sed turbidus, (instar coloris, qui in lixiuio apparet) leuia etiam aperientia, sed non calida, cum constringentibus & dolorem sedantibus, & acrimoniam contemperantibus, ut sunt semina quatuor frigidior. tam maiora quam minora, & papau. & reliqua, quæ ad calidi-

tatem hepatis faciebant, commode administrauimus. Interea tamen ob laxitatem renum etiam vinum rubrum dedimus, cum aqua virgæ pastoris, & oxygalam pro hepatis & renum caliditate. A vinis albis aperientibus abstinuimus, & lactis vsum non interdiximus, cum efficaciter renes (ut dictum est prius) firmet, & meatus laxos restringat. Quibus remediis probe sanitati restituta fuit.

OBSERVATIO VI.

De vrina cruenta.

MVlier nomine Siberta, ab omnibus Amica dicta, quinquaginta annos nata, biliola, macilenta, præter carcinoma, quod mamillam occupauerat, chirurgus quidam, qui illam tractabat, alioqui iactabundus, portionem quandam exhibuit: cui vtrum cantharides immixtæ fuerint ignoro; ab eo tamen tempore, circa renes oborto dolore, sanguinem mingebat, pro quo accidente chirurgus multa, sed frustra, remedia adhibuit. Ad hanc accitus, anno 1546. cum aliquot diebus sanguinem minxisset, nunc vero in fundo matulæ crassam residentiam facientem, lac exhibui, num forte cantharides sumxisset, quod a chirurgo intelligere non potui: sed frustra. At cum ex signis multis præsentibus animaduertentem, eandem calidi esse hepatis, ac renum calidorum, coniciebam mixtum sanguinis euenire partim ex iecoris imbecillitate: nam & dolor in hypochondrio dextro longo tempore præcesserat, ut ipsa affirmabat, partim ex venis apertis & dilatatis: & quia renes calidiores erant, etiam fortes in attrahendo: nam copiosam vrinam sanguinolentam reddebat, absque tamen dolore & ardore. Ideo ex calore hepatis ac imbecillitate renum calidorum, ex apertione venarum in renibus causam esse coniectabam: quanquam omnino negare non possem, aliquam quoque corrosionem in principio fuisse factam, a portione illius chirurgi prius assumpta, qualiscunque ea fuerit; nam & dolor tunc præcipue circa loca renum subsequebatur: nunc autem non ita dolebat. Quare cum hic sanguis esset calidior iusto, & subinde subtilis, modo rursus residentiam faciens (ut in imbecillitate renum fieri solet) similis loturæ carnis, plurimum hæc extenuabatur, & vires indies deiciebantur; idque magis, non solum ex illo fluxu sanguinolento perdurante, sed etiam ob perpetuum dolorem ac corrosionem canceri, quo mamilla iam dudum affecta erat. Venam igitur non secumimus, quæ antea secta fuerat, ob vires extreme debiles. Sed ex hoc apozemate bis in die ex nostro præscripto sumebat: *℞ portulacæ, borag. bugloss. ana m. j. acetosæ, consolida minoris, vel bellidis dicta ana m. ℞. semin. frigid. maiorum & minorum ana ℞ j. plantag. m. j. fiat decoctio in aqua communi pro ℞ j. ℞. in qua dissolue succi glycyrrhizæ, gummi tragacant. ana ℞ j. ℞. syrup. violar. ex rosis siccis, iuiubini & mellis rosacei colati ana, ℞ j. aromatizetur cum ℞ j. specierum diatrag. frigid. trochisci, alkachengi sine opio ℞ j. misce.* Cum autem tunc prius ex Gallia Alcmariam seu in

seu in patriam venissem, vocauit Æmiliū quondam præceptorem meum, qui alias, cum Louanio decessissem, & Alcmariæ per semiannum hæsissem, antequam Italiam accederem, mihi prælegebat aliquot opuscula Arnoldi de Villa noua. Eius aduentus erat mihi gratus in casu satis periculoso. Vna hoc decoctum præscriptum est: *℞ cymarum rubi, arnoglossæ ana m. j. end. flor. borag. bugloss. florum rosar. rub. non completa maturationis ana p. j. rad. asparagi, brusci, fœniculi (nam in fundo crassior materia feculenta nigra sanguinea subsidebat, ita vt aliquali detersione indigeret) ana ℥ ss. semin. quatuor frigid. maior. ana ℥ ij. coquantur in aqua cichor. plantag. pro ℥ j. dulcoretur cum zaccchar. perlato.* At tussicula oborta pectore aliquando denudato, cum chirurgus vlcus crancrosum reficeret, pro ea depellenda hunc linctum præscripsimus: *℞ diatr. frig. in tabulis ℥ ss. amygdal. dulcium depilat. contusar. zaccchar. penid. zaccchar. candi ana ℥ ij. syrup. violar. liquid. capill. ven. ana ℥ j. misce.* At cum forte fortuna extra cubiculum seorsum de affectu loqueremur, & alta voce lingua Germanica Æmilius diceret, eam ab hoc malo non euasuram. De cancro, inquam ego recte, sed de sanguinis renum profluvio adhuc posse euadere, modo ea remedia apta persequatur. Sed cum ægra hoc audisset, utpote morosa & biliosa, cum eam rursus accederemus, senioremedicum & præceptorem statim reliquit; & vt ego illam solus curarem, admisit. Admonueram prius, vt Latine loqueremur, iuxta præceptum Hippoc. in libello de Præceptis, ne ipsa audiret, nos de suo morbo differentes. Post discessum tamen Æmilii excepit eandem paulo post dolor magnus in renibus, vt sacra inunctione munita, tanquam vltima sacerdotum anchora, hinc emigratura existimaretur. Sed bis hac potione sumpta, dolor euauit paulatim: *℞ end. scabiosa, buglossatum toto, cichor. cum toto ana m. j. rad. fœniculi ℥ j. semin. omnium frig. tam maiorum quam minorum, sem. anisi ana ℥ j. (cum iam vrina ita sanguinolenta non proflueret, addidi rad. fœniculi & semen anisi) coquantur in aqua communi ad ℥ j. ss. colentur & arom. cum ℥ j. specierum diarrhod. abb. addendo syrup. de cichor. cum rhabarb. capill. ven. ana ℥ j. misce.* Huius decocti mane sumebat ℥ iij. addendo ob dolorem ℥ j. philonij Romani: & altero quoque mane tantum. Et sedabatur dolor. Deinde dolore vtcumque ablato, solo decocto iam dicto bis in die utebatur. Lumbis quoque inunctis primo ob dolorem, vnguento alabast. & infrig. Galen. simul mixtis, postea vnguento ros. solo; & in fine solo vnguento infrig. Galeni; & finito vltimo decocto, etiam sequenti vtendo, vrina de die in diem clarior euadebat; paulatim & mictu sanguinis cessante: *℞ end. cichor. bugloss. cum toto ana m. j. acetosa, plantag. cymar. rubi ana m. ss. glycyrr. ras. rad. fœniculi ana ℥ j. sem. frigid. maior. & minorum p. j. sem. anisi ℥ j. coquantur in aqua cichor. & aqua pluuiæ ad ℥ j. ss. colatura, adde syr. de end. ℥ iij. syrup. acetosi simplicis ℥ ss. misce.* Sanguinem deinde non minxit. Sed post octo dies, mictu sanguinis reuertente, me iterum vocauit.

Et quia valde macilenta erat, & vires deiectæ essent, conuenienti iterum victus ratione præscripta, infrigidante scilicet, corroborante, restaurante, & adstringente, hoc, quod sequitur, iterum præscriptum est: *℞ flor. cord. m. j. acetosa, plantag. sanguinaria vulgaris, succum rubrum sanguinis instar emittentis, cymarum rubi ana m. j. cassuthæ, end. cichoræ cum toto ana p. j. (quia adhuc crassus sanguis feculentus fundum petebat) rad. liq. asparagi, sem. omnium frig. maior. & minorum ana ℥ ss. coquantur in aqua communi simplici pro ℥ j. ss. col. adde syr. de succo acetosæ, syr. de end. ana ℥ ij. syrup. ex ros. siccis ℥ ss. misce.* Denuo regio renum inuncta est, & super pannum lineum ceratum infrigid. Galeni positum, lumbis imponebatur; & rursus cessauit mictus sanguinis: qui ne iterum rediret, cum remedium eam pertæderet, vt in ceruisia communi decoqueret hæc viridia, imperaui: quibus bis tertie in die utebatur: *℞ cymarum rubi, plantag. cum seminibus, sanguinaria, portulacæ ana m. j.* Quibus sanguinis renum profluvium cessauit, nec amplius rediit. Cum iam foras prodiret, mirabatur Æmilius, cum de huius curatione dubitasset. Vixit deinde sana aliquot annis; quanquam tandem satis vetula ex carcinomate obierit. Ex illo sanguinis renum profluvio adeo extenuata fuerat, vt eam tabe quis laborare dixisset. Laudandus Deus, qui artem curandi aperuit, cuius nutu omnes languores curantur. At iuuenis quidam viginti quatuor annorum, hoc anno 1587. dum hæc rescriberem, filius Godefridi Petri Beaumontii, ex hoc malo obiit, cum ei pila ludenti vena rupta esset in renibus: & longo tempore nihil remedii adhibens, tandem cum in febrem ardentem & tabem incidisset, neque satis tempori me vocassent, cum diu multoque tempore decubuisset, etiam aphthis & peripneumonia accedente, remediis aptis nullo modo inuantibus, diuersis symptomatis misere afflictus obiit.

S C H O L I A.

Hanc affectionem Græci *αἱμορραγία νεφρῶν*, Latini sanguinis renum profluvium nuncupant.

Et cum percircuitum, vt hæmorrhoides, renes sanguinis profluvio laborent, sic etiam appellant, vt patet ex Paulo cap. 45. lib. 3. & Aetio cap. 2. & 3. lib. 12. vt etiam si propter rupturam, erosionem venarum in renibus, vel quouis modo contingat, sanguinis profluvium nominare licebit: imo etiam si tenuis sanies sanguinis mingitur. 6. de locis affectis & 3. de causis symp. Renes afficiuntur quocumque modo ab iis effluent. Suntque hic quatuor symptomata, in genere excretorum immodice toto genere præter naturam; licet diuersas renum dispositiones sequantur: nam modo tenuis & aquosus est, vt in iecoris imbecillitate, vt antea ostendimus, ob renum imbecillitatem, retentrice facultate & alteratrice oblaesis, ex intemperie, aut oris vasorum apertis per transcolationem, diapedesin, tunica rarefacta vasorum, & sanguine tenuato, vel ex gracilium vasorum adaptione, vt liquet 5. meth. med. Si propter amplitudinem vasorum fiat, vrinam ad renes

Pars affecta.

Affectus præter naturam quid sit.

8. *Si tenuis san-
guis mittatur
caussa & signa.* excolantium, erit iam dicti symptomatis causa morbus in via, eaque dilatata: id quidem percipies non solum cum tenuis sanies sanguinis meitur, sed cum quiddam etiam ex sanguine venae laxatum emittunt, & alia itidem crassa; adeo, ut postquam ea, quae micta sunt, constiterint, subsidentia quaedam in vase reperiantur, & superne quaedam concreta, marinum maxime pulmonem similitudine referentia. Concocto ac distributo cibo in venas, nihil aut omnino parum dolent aegri; electoque lotio leuati melius habent, *ut Aetio visum est.* Sed ubi fiat exiguum vasorum a-pertione, tale serosi sanguinis profluvium sub anastomosi continetur. Vbi vero propter debilitatem ipsorum renum praedictum sanguinis serum meitur, improprie sanguinis, proprie vero feri profluvium dicitur, *ut etiam annotavit Donatus.*

*Causse, si per
circuitum san-
guis mingatur
& signa.*

Namque sanguinolentum serum est, quod excernitur, *ex Galeni sententia 3. de causis symptom.* Quo loco propter iam dictam causam, sanguinis diapedefin, tanquam quartum genus excretionis omnino excipit; quemadmodum etiam de cruenta spuitione prius adnotatum est. Sanguis vero per circuitum excretus, non minus symptoma est, in genere excretorum immodice, sed & ad earundem vasorum referationem consequitur: nec circa initia aderit noxa alicuius facultatis dictorum renum, sed ab excretrice facultate, *(quemadmodum per hamorrhoidas fieri contingit)* sanguis excernitur.

9. Quapropter circa initia, citra vllum dolorem expellitur: leuantur aegri propter eius excretionem; & fortiores fiunt. Vbi vero diuturnior fuerit affectio, absque laesione retentricis eorum facultatis fieri non poterit. Dignosces autem affectionem hanc, quoniam excreti sanguinis ipsi aegri transitum iuxta renum locum saepe percipiunt. Item quoniam urinae admixtus sanguis reperitur, praecessit victus ratio multum sanguinem generans, aut consueti alicuius exercitii omissio, seu cuiusdam membri mutilatio, aut quæpiam alia naturalis cruenta excretio præter naturam retenta est. Similiter si propter rupturam in renibus profluvium fiat, symptoma erit, ut reliqua, solutionem continui consequens. Eritque is affatim purus, & multus excretus, ac repente, ut superius dictum est, servabitque naturalem sanguinis colorem; nempe purus & rubicundus erit. Cuius causa, & ipsius sanguinis copia erit, aut propter ea, quod graue onus leuarit quispiam, seu valde saltarit, aut ex alto ceciderit, aut aliud quippiam tale violentum pertulerit, ut liquet ex commentar. *aphorism. 78. 4. lib. & Aetio loco praecitato.* Idem quoque symptoma erit, si per erosionem vasorum renum sanguinis excernatur: insequitur dictorum vasorum continui solutionem, & exulcerationem. Is tamen sanguis sensim, & paulatim excernetur: dolor renes excruciat; aderuntque alia erosionis siue exulcerationis indicia. Causam habebit acres succos ex supernis defluentes, *ut latius de ulcere renum postea suo loco patebit.* Sed ex quibus causis fiant, satis exemplis subsequentibus constabit.

*Si propter ru-
pturam.*

Si per erosionem.

OBSERVATIO VII
De mictu sanguinis ex cantharidibus sum-
tis, orto.

Vrinam cruentam ex alto delapsis statim emitti vidimus; idque saepius: etiam ex nimia Venere in adolescente Germano nobili: in mulieribus etiam mensibus suppressis, & in viris hamorrhoidibus fluere consuetis & retentis: trunca etiam manu vel pede, aut quoquo modo pleno corpore, & abscessu ulcereque cruentam urinam emictam fuisse scimus. Sed mulier, tum iuuenis quidam, quibus in potu cantharides exhibitæ erant, sanguinem minxerunt. Iuuenis vero penem extentum habebat, & irritatus ad Venerem supra modum coibat. Hæc enim dicta a cantharidibus assumtis consequi solent: quod etiam ex relatione aegri ac assistentium facile dignoscitur: nam cantharidum dira portione exulceratis interaneis & vesica, sanguis demittitur: & si subito non succurratur, ad læua ulcera perducit. Primo igitur veneno succurrendum esse putauimus, tanquam causa qua nisi ablata, effectus curari non potest. Copiose igitur lac dedimus: probat autem chalybeatum Rondeletius, qui & oleum rosaceum cum albumine oui intus assumendum tradit. Inieci-mus & clysteres refrigerantes. Aetius recens lac ouillum mulsum cum oui iniicit. Post clysteres ad remedia fluxui sanguinis oportuna recte deuenimus: illa tamen elegimus, quæ venenis similiter resistebant; ut est terra sigillata, bolus armen. corall. trag. Et alia ad sanguinis sputum & reiectionem, tum vomitum sanguinis, prius enumerata; ut est succus bursæ pastoris, polygami, sanguinaria, & rasura seu pulvis ossis sapiæ.

SCHOLIA.

QVI cantharides acceperunt in corpus, teste Aetio lib. 13. cap. 49. statim vires eorum in nares diffunduntur, odore picis: picis enim aut cedriæ qualitas linguæ inferri videtur, qualia alexipharmaca ad hoc virus conferant, vide apud eundem, quæ ex Nicandro scripsit. Hoc autem tempore venit mihi in mentem historia illa Iohannis Langii, primo libro Epistolarum, *Historia Langii, de adolescente, qui pul-
nerem cantharidum in in-
sculo sumpserat.* epist. 47. quam narrat de quodam adolescente ex Gallia, diuitis & stemmate nobili, gallo quouis gal-
linaceo salatiore, qui Bononia puellam, non adeo longe ab ade Dñi Dominici habitantem, deperi-
bat, quæ cum illi noctem condixisset, illius amore inescatus, consilio sui commilitonis, ne in Veneris conflictu succumberet, ad coitus illecebram cantharidum puluerem in insculo quodam absorpsit. Postea cum ad primam noctis faciem pruritus circa pudenda sentiret, letus ac ratus esse libidinis ex pharmaco tentiginem, amicam adiit. In concubia vero nocte, quum punctiōibus vellicaretur, & in ore cedri picis saporem perciperet, nec mente sibi probe constaret, ac anima defectu & vertigine pene concideret, tristis auxilii & consilii inops, domum rediit. Vbi cum cruento urina stillicidio ac ardore continuo distorqueretur, Deum hominumque, & præcipue Ludouici de Leonibus præceptoris Langii, opem implorauit: qui cum egredi ob quorundam Bononia factionum insidias

infidias non auderet, Langium ad eum curandum mittit, iussitque, ut dato ad sorbendum oleo vomitum prolliceret, & ventrem clystere ex mercuriali, maluarum radic. althææ decocto, in quo cassia, addito liliorum ac violarum oleo, dissoluta esset, elueret. Et ut singulis horis plenum lactis caprini aut bubuli cyathum patiens ebiberet. Quibus curatus fuit. Sed reuertentes ad sanguinis mictum, cum varias causas habeat, ut diximus, signa ipsa diligenter sunt perscrutanda, antequam curatio adhibeatur. Quibusdam enim naturis eodem modo sanguis per vias vrinales excernitur, quo aliis per nares, venas sedis, aut vomitum. Hoc ipsum licet aliquando iuuet, ubi plenitudo adest; cum tamen præter naturam sit, præstat anteuertere secta vena e brachio dextro, inclinante vere; tunc enim eiusmodi excretiones excitari solent. Aliis etiam cruenta est vrina, similisque diluto sanguini, ex laxitate, ut diximus, atque amplitudine venarum, quæ a caua renibus inseruntur. Renum quoque infirmitas hoc idem efficit, & iecoris vitium. Venæ quoque, propter humorum multitudinem distumpuntur, aperiuntur, casu, saltu, ictu, aut vehementiore motu. Si rupta vena, confestim effluit sanguis: qui vero subito prorumpit, collisam venam significat; aperta, paulatim. Laxioribus venis emulgentibus, infirma vi renum contentrice aut discretrice, statim a cibo serum sanguinis purum post coctionem cum spongioso sedimento excernitur. In laxitate crassior. In imbecillitate tinctura est a sero. Quæ enim carnis loturæ similis; veluti sanguinolenta cernitur, aut vitio renum, aut iecoris contingit, quoniam non bene concoquunt, nec discriminis rationem habent, demissa cum sanguine vrina. Ex vitium quoque imbecillitate, ubi vis continendi prostrata est, membra diminuuntur. Orificia hiantia venarum aperta, non conferunt, sed paulatim, non crassum sanguinem, sed tenuem, & quasi percolatum reddunt. Purus enim sanguis cum dimittitur sine dolore, corporis plenitudinem indicat; ex iecore præsertim: nam ex renibus non sine dolore lumborum profluit: ex vulnere copiosior erumpit; ex apertis poris, ut iam diximus, sensim manat, ceteris dilutior; qui si ignitior est ac flagrans, pudentum in exitu mordet. In infirmitate vasorum seminalium, aliquando etiam excernitur sanguis, non cum vrina, sed in coitu, aliter quam vesica ulcerata. His enim cum vrina sanguis emingitur, quibusdam corpusculis immixtus. Nec in vesica solum, ut postea de vesica dicemus, sed etiam in cole exulceratio esse potest. Sed ulceris sanies & dolor indicia sunt. Et ita sanguinis nomine, ut etiam Hollerius recte annotauit, non intelligimus sanguinem purum, exquisitum, syncerum mingi, sed aliquando serum, aliquando suo sero mixtum, aliquando cum pure. Ab ulcere id sit aut læsione vasis alicuius. Sed ulcera intelliguntur tum ex dolore, tum ex pure & corpusculis simul prodeuntibus, ut squamulis e

vesica. Pus ergo cum sanguine exit per vrinam, renibus, vteribus mediis, & vesica ulceratis. Nam si in pene exulceratio sit, sine vrinis & pus exit, & sanguis. Exeunt quoque e renibus sanguinis grumi in febribus affati. Nonnunquam carunculæ, veræ renum partes, licet in aphorif. Galenus id se vidisse neget. Sexto tamen de locis affectis, & initio primi, videtur agnoscere, ubi iam ulceris acrimonia erosit particulas renum, quomodo & in pulmonariis tabidis contingit particulas pulmonis exspui, (ut sæpe vidimus in praxi) & in dysenteria, partes intestini. In Aduocato, nomine Perrot, vidit Hollerius minimas carunculas, ut non abre σφαιρία μικρά dici deberent, quas sæpe emingebat; neque reuera erat grumus. Has carunculas præcedit dolor pulsantis, qui ad lumbos & nothas costas extenditur; & signa ulcerati renis. In concreto sanguine, & orobis vrinis, non præcedit. In utroque, hepate incolumi possunt vrinæ naturaliter cetera habere. Si in aliis partibus fuerit exulceratio, ex dolore quoque, & simul exeuntibus corpusculis dignoscendū, hoc tanquam generali axioma notato in his omnibus affectibus. A renibus dolorem & sensum quemlibet a lumbis ad nothas costas extendi: ab vteribus perilia oblique descendere: a vesica, in pectine: a vesicæ collo, in perineo. Potest quoque & sanguis solus exire, vel cum vrina, de quo præcipue hic agitur. Atque huius causæ, si nullum sit vlcus, variæ esse possunt, ut paulo ante diximus. Est quidam salutaris, & quandoque iudiciali die adiudicatur, quo corpus leuatur onere, & ita potest mictus sanguinis esse criticus, & interuallis quibusdam motus, qualis fuit in moniali muliere, cuius meminit Musa, quæ singulis mensibus, suppressis menstruis, multum sanguinis emingebat. Archembault Aduocatus (ut refert Hollerius) per aluum, vomitum, vrinam ex interuallis sanguinem reddebat, ætate virili. Quibusdam inclinante vere multus emingitur. Id ab Archigene scriptum est, quibusdam per circuitus, ut in hæmorrhoidibus, sanguinem multum collectum renibus emingi, vnde subleuantur; id accidere iuuenibus, qui maiori licentia Veneri indulgent. Tamen is sanguis, qui per circuitus redire solet (ut refert Benedictus Veronensis) solus interdum symptomaticus est, & non sine periculo apparet. Milesius quidam apud Aurelianum s. xiv. sanguinem emictum affirmabat esse ex infirmitate seminalium vasorum. Ab Aureliano reprehenditur. Sed cum experientia doceat, e renibus per vasa spermatica defluere, & ab his, & a renibus exire certum est. Vidimus qui a coitu multum sanguinem effunderent, quique non facile reprimeretur, laxatis nimium vasis, & imbecillioribus redditis profuso omni semine. Animaduertendum igitur, num grauitas renum, & calor præcesserint, an immodicus coitus, an solita sit excretio. Quod si repente, & nulla causa antecedente profluat, e renibus & vteribus excidit. Neque enim a venis vesicæ id accidere potest, duab. de causis: vna, quia non ita multum san-

guinem, ut renum, excipiunt. Altera, quia renum venulae nuda sunt, inuestes & expositae ruptioni: quod contra fit in venis ad vesicam perreptantibus. Ex vesica si profluat sanguis, est exiguus; & in vrina cruor subsedit, dolorque in pube sentitur. Nam ex iecoris etiam rupta vena, sine dolore exit, plurimoque humore vrinae permixtus cruor. Ex vesica, non nisi modice effluit, & in imo vase residet sanguis exiguus. Vtrum sanguis, uti in omni haemorrhagia, fluat apertione orificii venarum, erosione, ruptione, iam satis Scholio praecedente dictum est. His omnibus distinctis, & Prognosticis signis animaduersis, de quibus statim agemus, curatio ineunda erit. Hoc prius exemplo interposito.

OBSERVATIO VIII.

De sene octogenario, ex ruptura vena sanguinem mingente, & in phrenitidem lethalem incidente.

1. Hippocrates diuinissimus dixit *aphorif. 51. lib. 2.* repente euacuare, aut corpus de repente mouere periculosum. Quamuis id iunioribus minus periculosum forte portendit, senioribus vero id periculosissimum est, ut experientia quotidiana vidimus in senioribus ac debilioribus, potissimum renum malis laborantibus: uti euenit Aduocato cuidam in Haga Comitum, Petro, cognomento Rotro dicto, eo quod Roterodamo oriundus erat. Cum 84. attigisset annum, alioqui vir robustus, sed nephriticus, calculo laborans, & in principio mensis Iunii, anno 1566. pedestri itinere ex Haga Comitum Delphos accessisset, non sine lassitudine iterum Hagam reuersus, vena in renibus subito eidem rupta fuit, cum ingenti lumborum dolore; qui paulo negligentior medicum statim ad se non vocat, sed vno arque altero die, vel pluribus intermissis prius, lotium ad me transmissum est, cumque sanguinolentum spectarem, venam perruptam esse iudicabam, cum in lumbis circa renes, uti referebatur, aeger cruciaretur summo dolore. Verum neque tunc me vocarunt, quamquam in sene morbum grauissimum iudicarem. Tandem dolore magis augescente ad aegrum accitus, repperi, senem non solum sanguinem mingere, sed & simul ex febre acutissima & ardente decumbere, etiamque delirare & per nares sanguinem stillatim fundere; quod equidem in febre ardente cum phrenitide (*ut de febribus diximus*) lethale est signum. Ideo praedixi hominem moriturum; eoque magis, quod Hippocrates etiam pronuntiauerit febres acutas senibus minus fieri: quod si fiant, plerumque lethales esse, *iuxta aphorism. 14. lib. 1.* cuius rationem Galen. in commento explicat, cum frigidum eorum sit corpus, quod non facile tali febre ardente corripitur. Maximam igitur causam adesse oportet, si ea corripantur; vnde minus euadunt. Quare, vix de remediis cogitantes, ventrem tamen leniendo leuibus medicamentis & refrigerantibus, cum a tempore decubitus alium non deposuisset, hordeato quo-

que exhibito, nihil profecimus, in tam vehementi malo, & homine sene: qui non diu post, secundum nostram praedictionem, e vita decessit.

S C H O L I A.

Recte dixit Auicenna, *Omnis mictus sanguinis purus & multus, malus est; cum significet subitam vena magna rupturam.* Hic in sene etiam febre accedente cum delirio, mortem intulit. Semper quoque malum est, in quorum vrina sanguis longo tempore apparet, eo quod causam confirmatam arguat. Quod mictus sanguinis etiam periculosus sit in variolis aut morbillis, id ostendimus *Scholio obseruat. 45. lib. 6. ex Garcia-Lopio.* Scripsit ad me aliquando Henricus Bra, Documanae reipubl. medicus, cum anno 1576. Romae viueret, & ad praxin sequeretur celeberrimos, tunc in arte medica Alexandrum Petronium & Hieronymum Cardanum, & variola & morbilli passim tam inter adultos, quam pueros grassarentur: Videre (inquit) contigit puellulos aliquot, qui biduum fere ante eruptionem sanguinem mingebant; sicut & alios, quibus sanguis copiose per nares prorumpebat; qui fere omnes vitam cum morte commutarunt: an quia natura sanguinis istius sarcinam superare non potuit? Forte euasissent, si vena secta mature fuisset. Sed eo reuertamur vnde digressi sumus. Neque illi, qui propter renum imbecillitatem, aut eorundem vasorum reserationem, tenue sanguinis serum mingunt, negligenter tractandi sunt, sed magna diligentia circa initia eos curare oportet. Nam temporis progressu extenuantur & emaciantur omnes; & magis adhuc ii, qui plus sanguinis mictu excernunt, *Aetio auctore.* Neque etiam despiciendi sunt, qui per circuitus sanguinem e renibus excernunt. Nam licet in principio, propterea, quod citra vllum aliquem dolorem excernitur, nihil in totum mali formident aegri, ubi tamen diuturnior fuerit affectio, & aliquando cohibeatur, quod pro more excerni consuevit, grauitatem inducit, aliorumque pessimorum morborum causa existit, sanguine nimirum ad alias particulas dilabente: qua ratione articulares affectiones in aliquibus accidunt, aut vertigines, aut deliria, & insaniae, aut oculorum caecitates; ut plurimum vero in malum corporis habitum, & hydropem delabendi aptitudo inde oritur, *eodem Aetio teste.* Si vero ob venam ruptam sanguis profluat, quam celerrime etiam praesidia adhibere oportet. Nam verendum est, ne ob nimiam sanguinis copiam, corpus totum inaniatur, ac infrigidetur, & propterea in lipothymiam, syncope, & demum in mortem incidant. Aut propter concretum sanguinem, & in grumum versum, si in vesica detineatur, timor est, ne vrina supprimatur, consequaturque etiam animi defectio, & color pallidus, ac reliqua praua symptomata, quae ad grumos vocatos sequi solent, *ut liquet apud Galenum 6. de locis affectis.* At sine dolore, & paucus, per interualla, idque critice, non est malus, de quo sit timendum. Sed ubi perseuerat forte succedet febris & mictus puris. Et qui longo tempore ap-

3.

Prognostica

4.

5. paret in vrina, pessimus est, quia vlcera fraudulenta arguit. Sed per periodos fluens, cum alleuati-
one agrotantis, nullatenus restringi debet, nisi ad-
eo superfluat, vt virtutem diiciat; alioqui in cor-
pore otio dedito, vel crapulis, vel post mensium
& hæmorrhoidarum restrictionem, in corpore
consueto, inutilis non est. Præseruat a multis ma-
lis, a venarum ruptura, synocha febre, lepra & si-
milibus. At exuberans & antiquus, qui neque per
se, neque per artem curatur aut restringitur, hy-
dropem, marcorem tandem & mortem inducit.
Mictum sanguinis diurnum subsequi solet mi-
ctus saniei, & per consequens vlcus in renibus &
vesica, cum ardore & dolore: quare ei in principio
occurratur; quoniam vlcus difficilius consolida-
tur, quam vlcus; *iuxta illum aphorism.* In sanguinis
sputo, saniei sputum malum. Alii & hos se-
quentes aphorismos signis Prognosticis appli-
cant. 75. lib. 4. *Si quis sanguinem aut pus minxerit,*
renum aut vesicae ulcerationem significat. & aphor. 77.
lib. 4. *Si sanguinem sponte mingant, iis a renibus ve-*
na rupta significatur. & lib. 4. aph. 80. *si sanguinem*
mingant aut grumos, & stillicidium vrina habeant, &
dolor in imam incidat ventrem, interfemineum & i-
mmum ventrem pestinemque, circa vesicam male se
habere significatur. Hic aphorismus potius ad ve-
sicam pertinet. At is, qui per erosionem sangui-
nis meltur, quam celerrime circa initia curari de-
bet. Nam temporis processu difficilioris cura-
tionis existet, vt de ulceratione renum postea di-
cetur.

OBSERVATIO IX.

De mictu sanguinis ex plenitudine per in-
ternalla eueniente.

1. Vt solitus habere hæmorrhoides, iisque per se
restric-
tis, dum vteretur victu largiore & vi-
no, atque in otio vueret, incidit in mictum san-
guinis per intervalla, qui sanguis ex plenitudine
coaceruatus, & hæmorrhoidibus restric-
tis per cir-
cuitus fluens, vt aliquando euenire solet, *iuxta*
Aetium lib. 11. cap. 3. ex mente Archigeni, iuxta eun-
dem, nolimus subito illum sanguinem restrin-
gere: sed assumpto bolo cassiæ, cum alius restric-
ta esset; altero die, fecibus & excrementis prius
per cassiam excretis, venam basilicam aperiri ius-
simus, sanguine extracto ad uncias octo, cum sa-
tis robustus esset. Idem Leonellus *cap. proprio de*
cara mictu sanguinis puri solius, a sanguinis multi-
tudine, iubet fieri. Deinde ex decocto fumarie,
lupul. acetos. portulacæ sumebat, & postea adie-
ctis myrobalanis, & rhab. eundem leuiter purga-
ui. Et quia solitus erat habere hæmorrhoides, sa-
phena incisa, vt sanguis inde flueret, hæmorrhoi-
des apertæ sunt, sanguinis profluuium e renibus ces-
sante. Recte dixit & Bertrutius capit. proprio,
quod in tali casu insistendum sit euacuationi & vena
sectioni potius, & prouocationi menstruum, vel hæ-
morrhoidum, si antea fluxerint & nunc restricta
sint, diuertendo sanguinem ad loca consueta. Et ita
noster æger liberatus est: vti & aliaquædam mu-
lier, cui menses deficiebant, & per intervalla san-

guinem mingeat, demisso sanguine ex talo, mox
& ab hoc malo curata fuit. Interea ne hoc malum
rediret, inunximus renes confortantibus medi-
camentis, & alterantibus. Quam intentionem cu-
randi idem Leonellus post sanguinis detractionem
commendat. Et ita lumbos inunximus vng.
rosato, adiecto etiam pauco vnguento comitissæ.
Is vero hoc sequenti vtitur: *olei myrtini, rosana 3*
vj. balauft. corticum granat. sumach, boli armen. ana 3
j. adiecta pauca cera. Valet & in iis, quibus non fue-
rint antea menses restricti, aut hæmorrhoides.
Post venæ sectionem, si ex plenitudine fiat, & non
restringatur præcedentibus diuersionibus, tunc
adhibenda est secunda intentio, qua renes robo-
rantur, vt est inunctio supradicta.

S C H O L I A.

3. Cognitis causis, per sua signa, demum ad cu-
rationem perueniendū: Singulis enim causis
sua debetur curatio. Si enim per circuitus
quosdam, aut propter venæ rupturam in renibus
factam sanguis excernatur, conandum est statim
in principio, vt cohibeatur. Itaque venæ sectio
commoda est iis, quibus ob venam ruptam pro-
manat, statim in principio: iis in vero, qui per cir-
cuitum sanguinem excernunt, paulo ante circuitū
adhibita, *Aetio teste,* nisi etiam sanguinis impetus
vrgeat, ac cogat, vt cohibeatur. Namq; tunc etiam
in ipso circuitu vena secanda erit. Ceterum san-
guinis detractionem partiri melius erit, vt paula-
tim eius reuulsio, & diuersio fiat; eodem Aetio
auctore. Et ita curatio mictionis sanguineæ ex
abundantia, duabus intentionibus perficitur: pri-
mo, diuersione per venæ sectionem basilicæ, eua-
cuando materiam antecedentem; deinde con-
iunctam, si opus est, ex talo, vbi menses vel hæ-
morrhoides restrictæ sint: secundo roborantibus
renes. Sic oportet auertere & vacuare plenitudi-
nem, & renum venas densare, etiam in iis, qui
bus per circuitum redit, ne copiam excremento-
rum recipiant. Vbi vero iudicialiter a natura pro-
pellitur, remedia necessaria non iudicamus, nisi
virium defectum cognouerimus. Cuius habemus
exemplum apud Amatum *centur. 2. curat. 93. de*
iuuene florido, robusto, criticam sanguinis mictio-
nem habente, qui cum sanguinea febre affligeretur,
& pluries illi sanguis esset extractus, sexto
die sanguinem cum vrina minxit, & sanitati resti-
tutus fuit. Admirabantur autem assistentes om-
nes, contendebantque nonnulli medici alii, qui
illius quoque curam habebant, hanc tam subitam
sanguinis suppressionem. At cum Amatus crisi-
sin per eam viam a natura factam coniceret, &
ægri vires inde non labefactari perciperet, rem in-
totum securam, & agrotantem liberum & a mor-
bo immunem esse prædixit. Solet autem crisis hu-
iusmodi in febribus aliquando, licet raro, contin-
gere. Et sic variæ causæ variam postulant curatio-
nem. At exemplis adhuc infrascriptis curandi
methodus clarior euadet.

Curatio si per
circuitum aut
propter venæ
rupturam san-
guis mingatur.

4. Quibus fluxu-
ibus remedia
constringentia
non adhibenda.

OBSERVATIO X.

De mictu sanguinis scroso.

PP 4

1. **I**uuenis cum sanguinem serosum & tenuem meieret, consultandi causa ad me accessit. Cum nullam febris in eo notam animaduernerem, & certis signis colligerem nullum in iocinore calorem subesse, sed renes debiliores factos, venarumque ora rariora sanguinem tenuem dimittere; statim iis usus sum quæ renes roborarent, venasque adstringerent, adhibita victus proba ratione, & simul lacte caprino utens: postea etiam ouillo, cum nihil melius eo existimet Auicenna confirmandis renibus valere. Dabam ieiuno $\frac{3}{4}$ vj. quibus admiscebam boli armeni $\frac{3}{4}$ j. Ac si mictus sanguinis tenuis desisset, corpusque quod prius macilentum erat, nutriti, viresque reparari contigit. Atque ita iuuenis sanitati tandem restitutus est.

S C H O L I A.

2. **D**ictum est prius, huiusmodi sanguinis profusionem accidere propter oscula venarum rariora facta, vel ipsum sanguinem attenuatum; *διαπύκνυν* quasi transcolationem vocant. His autem quibus vrina truenta orta, propter renum debilitatem, aut amplitudinem osculorum vasorum, vrinas ad renes excolantium, vel raritatem, sanguis transcoletur, conueniunt, ex *Pauli auctoritate*, medicamenta, quæ ad sanguinis sputum inscribuntur. Conuenit & hic in principio quies, cibi astringentes, & vinum nigrum in potu, potissimum ubi vires imbecilles fuerint. Ab iis vero, quæ vrinam ciunt, & a coitu, omnino abstinendum, *vt inquit Aetius*. Maxime vero confert polygoni succus, etiam sanguinariæ, & rad. symphyti decoctum. Adhæc tragacanthum in vino nigro maceratum, polygoni & plantaginis succum cum posca commendauit. Ex quibus etiam succis, *iuxta Donatum*, cum saccharo syr. parari poterunt, pauco aceto addito; ac exhiberi, vel in eorum vicem syr. myrt. ex ros vel etiam de portulaca, aut alius præberi potest, addendo eisdem $\frac{3}{4}$ j. rad. symphyti, cornu cerui vsti, aut lapid. hamatitæ, seu boli armeni preparati, pauco aceto addito, vel trochis. de spod. de terra lemnia & succino. Nec minus conferent, si cum ipsa posca exhibeantur. Extrinsecus autem renibus & lumbis imponi poterunt ea, quæ ad sputum sanguinis descripta sunt, quæque vnâ adstringunt & resiccant, ac etiam robur addunt, *vt inquit Aetius*. Cuius farinae sunt rubi folia, myrti, ac quercus myrti baccæ, malicorium, & balauustum & perdicii folia, cum posca, aut vino adstringenti imposita; ex quib. cataplasmata conficies, adiecto oleo ros & posca. Vng. ros. inungantur lumbi, & adiectis santal. pul. bol. arm. acacia hypocyst. & similibus; fiantque cerata lumbis apponenda. Nam ubi tenuitas sanguinis in causa fuit, frigida glutinantia profunt. Quibus vero vrina sanguinea ex immodica Venere, eam portionem assumant, quæ habet plantag. ac eius seminis portul. myrti cauliculos teneros, & vitis palmites ana m. j. succi glycyrr. ac rad. ipsius, anisi, fœniculi in aceto macerati atque tosti ana $\frac{3}{4}$ ij. sem. pap. lactuc. ana $\frac{3}{4}$ ij. tusa in aqua hemina macerentur, deinde ad tertias decoquantur: adde sacchari pond. & syrupum conficito. Ex eo vnciam sumito ma-

ne: cum puluere, obulis binis, rubrica armeniaca, succini, rubrica lemnia aquo pondere trita dantur in potione antedicta. Spongia aceto calido infusa circumponitur verendis & ilibus: aliaque frigida, vt portulaca cum bolo armeno, & succis herbar. refriger. & astringentium, emplastri modo imponuntur.

OBSERVATIO XI.

De mictu sanguinis ob venam ruptam in renibus.

Rusticus qui supra lumbos ceciderat, sanguinem primo satis purum mingeat, postea etiam multum ac crassum. Cumque doletet circa regionem renum, proculdubio venæ in renibus perruptæ erant. Ad hunc accitus, iussi vt statim sanguis ex vena basilica e regione loci dolentis (nam in dextro rene magis dolebat) ad auersionem detraheretur; sed non ita copiose, vt in viro præcedente, qui ex plenitudine sanguinem mingeat, de quo diximus obser. 9. Deinde hoc linimentum ad repellendum & constringendum præscripsi, vt eo locus dolens inungeretur: $\frac{1}{2}$ oleo ros. omphacini, myrtini ana $\frac{3}{4}$ j. boli armeni, sang. draconis, tragacanthi, gummi arab. ana $\frac{3}{4}$ B. puluer. sentur omnia subtiliter, & cum oleis prædictis, misce instar linimenti; vel cera adiecta fiat ceratum. Usus sum & in alio post venæ sectionem, qui ex percussione sanguinem mingeat ex vena rupta, hoc vel simili epithemate: $\frac{1}{2}$ albuminum duorum vel trium ouorum: bene ac diligenter inuicem conquassentur, & sequentes pulueres iisdem addantur, scilicet tragac. gummi arab. sarcocolle, cerusa lota, thuris ana $\frac{3}{4}$ j. adde aqua plantag. $\frac{3}{4}$ ij. vel iij. olei ros. & aceti ros. ana $\frac{3}{4}$ j. conquassentur omnia & cum petiis lineis infusis in tali liquore, locus percussus epithemetur.

S C H O L I A.

Quidam, inquit Aetius ex Archigene lib. ii. cap. 3. sanguinem e renibus excernunt, propter venæ rupturam in renibus factam: quemadmodum contingit his qui graue onus leuarunt, aut valde saltarunt; (vt hisce diebus nobili cuidam contigit per fossam saltanti;) aut ex alto ceciderunt, vt nostro rustico, aut aliud quippiam tale violentum (vt de causis antea diximus) pertulerunt. Post venæ sectionem in principio conueniunt ea, quæ de hæmoptoicis scripsimus. Retinent, inquit Rondeletius, sanguinem bolus armenus, carabe, cum albumine oui fortiter agitata, & deuorata: & supra partem hæc constringentia apposita: $\frac{1}{2}$ boli armeni, vel terra sig. B. sang. dracon. cort. mali granati, balaust. ana $\frac{3}{4}$ j. a. luminis $\frac{3}{4}$ j. ros. rub. seminis myrti ana $\frac{3}{4}$ j. B. puluer. sentur subtilissime, & excipiantur albumine oui & aceto. Applicentur supra partem. Quod si concretus sanguis remanserit in vesica, tunc dissoluentia sanguinem danda erunt, aliquo tempore post, & non nisi vrgeat, retinendo vrinam, aut aliud quid efficiendo. Verendum enim est ne rursus aperiantur venæ & sanguis prouocetur, nisi dentur illa, quæ vtrumque præstent, vt carabe, quæ sanguinem dissoluit coagulatum, & fluentem retinet. In his quoque, (vt idem refert Aetius) qui ob venam ruptam

Quæ ad rupturam venarum in renibus conferant.

Cautio.

ruptam sanguinem mingunt, si exulceratio in locis relinquatur, ipsam post sanguinis suppressionem curabimus per ea, quæ in loco de exulceratione dicuntur. Sic memini quendam a viro crasso insultante, derepente & copiose sanguinem minxisse, qui tamen crassior erat, quam in vena aperta; qui & a me curatus fuit. At puer quidam, qui in ludo (ut refert interpret Hollerius) Britone insultante sanguinem minxit primum, deinde pus annis sequentibus. Ideo in iis curatio diligens adhibenda est, ne vlcus subsequatur. At senior ille Ioannes Sasbotus, septuagenarius, subinde sanguinem mingens sine dolore, per me curatus fuit, cum videretur provenire ex dilatatione colatorii; sæpius sumendo lac amygdalatum; etiam ouillum pauco iniecto bolo armeno, & conferva ros. subinde vtens: roborando renes cum aliquo limimento ex supradictis, simul constringente & roborante.

OBSERVATIO XII.

De mictu sanguinolento ex vena renum corrosis.

Mulier biliosa, ex infima plebe, Anno 1569. cum lotio sanguinolento consultandi causa me accessit: atque is amictus sanguinis cum diu durasset, ac illa in cibis allio ac porris sæpius via esset, sanguis que sensim & paulatim excerneretur, & dolor excrucietur renes, non sine erosione & exulceratione quasi, in muliere biliosa hanc sanguinis mictionem ab acuitate sanguinis acuti, corrodentis venas renum, euenire iudicavi. Propterea, cum adhuc viribus constaret, imperavi, ut fieret phlebotomia diuersiva, ex vena hepatica, in brachio dextro; sanguine tamen moderate extracto, & non ita copiose, ut ex iis, qui in plethora afficiuntur. Deinde iussi ut fieret mundificatio sanguinis ab humore acuto, nempe bilioso corroden- te, hanc portionem describendo: *℞ end. cichor. portul. plantag. famaria ana m. j. florum nymphææ, ros. viol. ana p. j. sem. portulacæ, end. acetos. & 4. sem. frig. maior. ana ʒ j. hordei mundati p. j. iunibar. recen. num. v. glycyrrh. rasa ʒ vj. coquantur in aqua communi pro lb. j. colatura adde syr. pap. nymphææ, viol. ana ʒ j. ex ros. siccis ʒ ʒ. misce. capiat bis in die.* Postea accepi eiusdem decoct. absque syr. ʒ iij. b. infundendo rhab. selecti ʒ j. B. myrob. citrinor. ʒ ij. facta prius leni bull. stentq. infusa per noctem. Mane hunc fortiss. express. adde syr. viol. ʒ ʒ. misce. Materia biliosa & acuta sic expurgata, ad remittendum feruorem, & acuitatem sanguinis, iuleb sequens sumxit: *℞ syrupi viol. nymphææ, myrtini, pap. ana ʒ j. aquarum end. portulacæ, plantag. ana ʒ iij. misce. fiat iuleb pro quatuor dosibus.* Deinde capiat omni mane ante cibum per horam, ad quantitatem castaneæ magnæ ex electuario, sanguinem incrassante, & acuitatem eiusdem remittente: *℞. zacch. ros. antiqui, diacotonei sine speciebus ana ʒ j. diamarg. frig. ʒ ij. syr. ex ros. siccis q. s. fiat electuarium.* Pro cibo utebatur hordeato, amygdalato, & lacte ouillo, etiam subinde halica & oryza.

S C H O L I A.

SI veniat ex acuitate sanguinis vel humorum, humores contemperandi, & leuiter euacuandi

cum iis, quæ stypticitatem relinquant, quidam ex rhab. pilulas conficiunt cum succo plantaginis: & ea conferunt, quæ ad ardorem vrinæ præscribentur: & si vna cum mictu sanguinis ardor sentitur in renibus, *℞ aqua plantag. portulacæ ana ʒ ij. philonii ʒ j.* Si vna adsit vlcus, vel ob vlcerationem mingat quis sanguinem, vlcus detergendum & consolidandum deinde: nam vbi cruenta vrina abscessu vlcereque demittitur, vel calculo scabro exeunte, horum ratio habenda quoque, ut etiam illa ipsa simul curentur. At purulenta quoq; vrina simul cum sanguine aliquando exit, vel peripneumonia, vel plenitudine, vel abscessu rupto iecoris, ut apud Galenum de locis affect. lib. 6. videre licet: vel renum & vesicæ vlceribus contingit, de quibus suo loco, ut & de vlceribus renum & vesicæ dicemus.

OBSERVATIO XIII.

De mictu sanguinolento diuturno, per modum consultationis.

ANni sunt quatuordecim, quod hic iuuenis, filius Ioannis de Bodegem, Delphenfis, mictu sanguinolento laborauerit, quem in principio Cornelius Heydius eius auunculus, collega & confrater noster, piæ memoriæ, medicus alioqui doctissimus, curauit. Et quantum ex iuvene etiam docto intelligere potui, medicus iudicabat hoc malum ex vena rupta in renibus originem cepisse: qui licet aliquando ex priore curatione melius habere videretur, tamen nunquam perfecte ab hoc malo curatus fuit. Præterea ab hinc anno etiam in Hispanis degens, frustra medicorum excellentium opem, ut nobis narrauit, expertus est. Dolet hic circa lumbos; ideo a renib. mictionem sanguinolentam fieri certum est. Et quanquam ruptura venarum in renibus in principio quasi ex parte curata videretur, at nunc cum multis annis perseueraret, etiam renum imbecillitatem accessisse arbitror, venasque rariores vel magis apertas sanguinem sæpius profundere, cum & malum singulis diebus exacerbetur, non sine acrimonia & sanguinis caliditate, cum aliquando simul sentiat ardorem in emittendo lotio; ita ut ex falsedine serositatis, vel caliditate eiusdem fere guttatim, aut in minori copia vrina vna cum sanguine permixta effluat; adeo ut sæpius cogatur mingere, virtute retentiua partim longitudine mali debilitata, partim acrimonia falsedinis vel caliditatis irritata, ideoque minus lotium retere valeat: quamuis tamen (ut refert) vltro non effluit, interim tamen sæpe cogitur mingere: & quum sanguinem mingit, etiam in minori quantitate, semper ardorem vrinæ habet. Insuper vbi plus æquo sese exerceat, ilico sanguinem in maiori copia profundit: etiam cum vinum Hispanicum biberit, idem facit. Signum est, quod non solum venæ facile referantur, verum etiam rariores & debiliores factæ sunt. Hanc tamen fluxionem sanguinolentam non existimo ab hepate euenire, neque a toto corpore, quemadmodum fieri solet critica expulsionem per interualla; sed quod potius fiat a renibus, cum dolor

fit circa lumbos. Ad hanc fluxionem iuuat etiam
 falfedo quædam (*cum lotium reddatur cum ardo-*
re) modo venas renum aperiens sua caliditate,
 modo sua falfedine leuiter erodens; non tamen
 exulcerans: nam purulenta cum sanguine non min-
 git. Quoniam etiam ardor in emittendo lotio sen-
 titur, recte materiam acrem adesse puto, & serosi-
 tati sanguinis admixtum esse plurimum pituitæ
 falfæ, & etiam materiæ biliosæ: nam facile effluit, si
 calidis vtatur, vel vehementiori motu aut exerci-
 tio, vel vino Hispanico. Hæc, inquam, omnia re-
 nes lædunt, serositatem sanguinis inflammant; &
 ob hæc venæ in renibus plus æquo referantur, &
 3. sanguis liberius profunditur. Præterea cum hic
 iuuenis sit, si forte aliquando (*vt iuuenibus salacio-*
ribus saepe euenit) nimium Veneri indulgeat, hic ar-
 dor magis incenditur, vti solet fieri quandoque in
 glandulis vteris nimia Venere cōsumtis. Quam-
 obrem harum omnium caussarum ratio, tum par-
 tis affectus, in curando præcipue habenda erit. Pi-
 tuita falsa & materia biliosa contemperanda, &
 prius euacuanda; acrimonia obtundenda, renes
 imbecilliores roborandi erunt, venæque nimis ra-
 ræ factæ referatæ aut apertæ constringendæ & san-
 guis reprimendus & astringendus in fine, & simi-
 liter caussa, quæ morbum non tantum facit, sed et-
 iam auget, tollenda erit. Et quod ad prognostica
 attrinet, malum hoc licet sit diuturnum, eoq; diffi-
 cilius curatu, curatio tamen erit tentanda. & con-
 tinuanda in iuvene adhuc robusto, qui doctus est,
 eoque facilius etiam curationem non solum ad-
 mittet, sed imperata a nobis non difficulter perse-
 queretur. Qui equidem si vitam bene instituerit, &
 optimam victus rationem probe obseruauerit (*de*
quibus primum agemus) plurimum ad sanitatem
 recuperandam valebunt. Igitur iis præhabitis, quæ
 ad genus viuendi pertinent, postea de medica-
 mentis tractabimus. Aer igitur continens eliga-
 4. tur, ad frigidum, & parum ad siccum vergens: a
 calido vero & humido abstineat: flatusque austri-
 ni valde sunt vitandi, radii quoq; solares, tum fo-
 cus luculentus: nihil peius quam dorso ad ignem
 sedere, vel stare. Ideo dorsum minime sit sufful-
 tum pellibus, aut zona valida constrictum, maxi-
 me circa lumbos. Hæc enim omnia renes calfa-
 ciunt, venas rarefaciunt, aperiunt & sanguinem
 profundunt. Camisia recens, eaque lota & recte
 exsiccata sæpius mutanda. Somno moderato v-
 tendum, præsertim nocturno: diurnus fugien-
 dus; supra latera dormiendum; non in dorso cu-
 bandum, aut lecto molliori, plumis multis & ca-
 lidis referto. Conclauē in quo dormiat vel verse-
 tur, sit potius infernum quam supernum, & lapi-
 dibus potius stratum, quam ligneis tabulis confe-
 ctum. Omne exercitium fugiat: Venerem quoq;
 animi affectus immodicos; equitationes, cursus,
 saltus & tripudia. Excrementa quoq; alui, si possi-
 bile est, quotidie deponantur, arte vel natura. Ci-
 bi autem eligendi sunt, qui emplasticam habent
 vim, & qui refrigerant, & mediocriter obturant,
 ac leuem adstringendi vim habent. Neque calidi
 quippiam offerre oportet. Sed omnia sint potius

temperata ad frigidum declinantia, etiam actu, &
 sint tales cibi qui superfluam humectationem nō
 inferant. In summa, cibi sint refrigerantes, pa-
 rum siccantes & adstringentes. Viscosa & gluti-
 nosa hic quoque laudantur, vt lac, pedes vitulo-
 rum, suum, hœdorum, & gluten piscium. Conue-
 niunt carnes gallinarum, columborum, cunicu-
 lorum, capreolorum, perdicum, phasianorum, a-
 uicularum montanarum, pisces saxatiles, muscu-
 li, cancri quoque fluuiales. Interea parua cibi sit
 quantitas: tamen ab inedia abstinendum, pro-
 pter ardorem vrinæ. Sed cibi pauci, mediocriter
 frigidi, & potus, & natura constringentes adhi-
 beantur; velut ptisana, & eius cremor, alica, fru-
 mentacium amyllum, similago valenter decocta,
 aut oryza, & oxygala. Quæ omnia meliora sunt
 (*quod & de aniculis montanis, aliisque iam supradic-
 tis etiam intelligendum*) si aliquod adstringens
 cum eis fuerit decoctum, aut eorum succus adie-
 ctus sit. Verbi gratia, cotoneum malum pyrum-
 ve, aut pomum aliud austerum, malique punici
 grana, berberis aut sumach. Aut si non libeat talia
 cum sorbitionibus decoquere; incoquantur ea
 cunctis aliis eorum cibis; qui insuper in aqua plu-
 uia decoquantur; in qua etiam micæ panis imbutæ
 pro cibo conueniunt. Ex oleribus assumere po-
 teris lactucam decoctam. Interim ipsam in po-
 scam aquosam intringens. Similiter intybum &
 6. portulacam, vel arnoglossum. Portulaca quouis
 modo comesta, etiam cruda cum aceto huc con-
 fert; vel melius prius parum decocta in aqua plu-
 uia; deinde aqua amara aceto adiecto. Auibus iam
 dictis, tum starnis adiacere poteris gallorum testi-
 culos, potissimum assatos, & alas anserum, non ta-
 men veterum: conducunt & ventriculi, pedes vi-
 tuli castrati, tum hœdorum; aceto inter coquen-
 dum adiecto. Valent & hic lac caprillum & aci-
 dum. Ex fugacibus fructibus, qui modice ad-
 stringunt. Vt mala cocta, vel tosta, pyra, sorbæ,
 mespila, cotonea. Et si fueris admodum siticulo-
 sus, conferent cerasa, præcipue quæ a vulgarib. *mo-*
rella dicta, vna pensilis, vitis pampini, portulaca seu
arnoglossi folia. Vinum quoque rubrum aqua di-
 lutum minime nocebit, si eo moderate vtaris. Ab-
 stineas ab Hispanico aliisque vinis calidis ac diu-
 reticis: vt & ab omni aromate, pipere, sinapi, allio,
 porro, raphano, aliisque calidis speciebus; & a cer-
 uisia crassa feculenta aut nimium recenti, sed sit cer-
 uisia tenuis depurata ad saporem vini accedens, nec
 nimium recens, nec adeo antiqua vt acorem habeat.
 Nunc ad remedia progrediamur. In primis ad di-
 7. uersionem in exigua quantitate fiat venæ sectio
 ex vena interna brachii dextri, vel media, quæ ma-
 gis apparet. Deinde vt acrimonia obtundatur, vta-
 ris decocto rad. consolid. maior. polygoni, portulacæ,
 acetosæ, bursa pastoris, bellidii minoris, adiecto syrup. de
 portulacæ, & myrtino, ac oxyzacch. vel fiat hoc iu-
 leb. ℞ aquar. portulacæ, plantaginis, bursa pastoris
 ana ℥ iij. syr. de portul. myrtini, oxyzacch. simplicis ana
 ℥ j. misce, fiat iuleb pro tribus dosibus. Deinde simul
 ad purgationem ac leuem alterationem, ℞ rad.
 symphyti ℥ ℔. rad. & fol. plantag. m. j. myrob. citri-
 nor.

Hor. 3. ij. liquir. ras. 3. ij. coquantur in aqua pluua, & in 3. iij. infunde per noctem, facta leui ebullitione, rhab. selecti 3. j. B. mane fortiss. express. accipe 3. ij. adde syr. ex infus. ros. pallid. 3. B. misce, fiat portio breuis, detur mane. Postea, 2. succi portulacæ, plantaginis ana 3. j. syr. viol. myrtini ana 3. B. boli armeni veri 3. j. misce fiat haustus. Poterit & hoc apozema deinde parari: 2. rad. consol. maioris, rad. nymphaeæ cum floribus albis ana 3. B. rad. plantag. cum foliis m. j. polygoni, portulacæ, bursa pastoris, arnegloss. ana m. B. florum ros. rub. nenuph. albi ana p. j. seminis acerof. 3. j. glycyrr. ras. 3. iij. coquantur in aqua pluua, pro 1b. j. colatura adde syr. de portul. myrtin. coton. ana 3. j. misce, fiat apozema pro quatuor dosibus matutinis. Si magis sit constringendum & roborandum, 2. trochis. de succino vel carabe 3. j. detur cum 3. ij. vini rubri Gallici. Exterius cerati forma sequens applicetur lumbis: 2. vnguenti ros. 3. ij. boli armeni veri, malicorib. ana 3. j. trochisc. de carabe 3. B. pulueriscentur, & adde vnguentum ros. adiecto exiguo oleo ros. & cotoneorum, & cera alba q. s. ad consistentiam cerati; & sindone rubra coopertum lumbis applicetur.

9. Si neque illa inuerint, fiat fofus seu epithema sequens, cum spongiis immerfis, & expressis, vt fieri solet, pro lumbis: 2. florum ros. rub. exsiccat. m. j. granorum sumach, myrtill. hypocystid. ana 3. B. cupular. gland. 3. ij. santal. rub. citrin. ana 3. j. B. malicorib. 3. ij. coquantur in vino austero ad tertia partis consumptionem, pro 1b. j. B. & fiat epithema, quo lumbi forinsecas cum spongia madefacta & expressa irrigentur, idque pluries iterando: mox inunctis rursum lumbis cum vng. ros. & in frigidante Galeni, applicentur ceratum supraddictum; & si velis adiuuere exiguum vnguenti comitiss. magis conferet vrina cruenta. Hæc sunt, quæ egregie conferre existimo ad tuam sanitatem recuperandam. Ex nostro Museo, 25. Iulii, anno 1581. Petrus Forestus hæc consuluit.

S C H O L I A.

10. Sæpius sanguis mictum solo lacte ouillo, nempe sumendo 3. iij. lactis & 3. j. boli armeni veri, curari. Hoc idem expertum a Gatenaria, qui tamen præcipit, ne post eius assumptionem aliquis dormiat, neque se exerceat. Si longo tempore duret sanguinis mictus, constringentibus vtendum tam intus, quam extra, vt in nobili muliere, quæ ultra duos annos laborauit mictu sanguinis, quæ a me curata fuit, longo tempore admoto lumbis cerato Comitissæ; vti & Theodorus Duystius, eodem malo admodum diuturno affectus, curatus per me fuit, & alii non pauci, ex decocto quoque herbarum astringentium, & aliis prius præscriptis, & ratione adhibitis. Ceterum iuxta causas varias, vt diximus, curatio perficitur. Verum nunc de doloribus renum, qui ab obstructione eorundem fiunt, agamus: & antequam ad exempla curationum procedamus: sciendum est, quod renes aliquando exitialiter doleant, ob varias causas, vt in principio huius libri diximus: sed ex oppilatione vitium adeo graue est, vt periodicos dolores inferat, qui sæpius repetunt: vt & si ab obstructione re-

num fiant, vt exemplo sequenti clarius demonstrabitur.

O B S E R V A T I O X I V.

De dolore nephritico, ex renum obstructione.

VIdua chirurgi cuiusdam Alcmariani, Nicolai dicti, annos quadraginta nata, Anno 1551. mense Iulio, cum decumberet ex intensissimo nephritico dolore, quem alias sæpius passa fuerat, modo ex materia muccosa, modo ex arenulatum vel calculi obstructione in renibus, ad eum dolorem diuersis cum vsa esset remediis, etiam empiricorum ac muliercularum valde calidis & diureticis, ex quibus dolor adeo immenso excreuit, vt amici ac astantes de eiusdem vita desperarent, atque extrema inunctione a presbyteris adhibita, me tandem vocarunt; cui statim, vt hoc enema iniiceretur mandauit: 2. foliorum maluæ, parietariæ, betæ, mercurialis, florum meliloti, chamomillæ ana m. j. rad. althææ mundata 3. j. B. florum seu summitatum anethi p. j. seminis maluæ, lini ana 3. ij. seminis foeniculi, anisi ana 3. j. coquantur in aqua communi pro 1b. j. cuius colatura adde cassia mund. pro clyst. 3. j. B. diacatholici, elect. hiera picra simplicis ana 3. j. B. olei chamamelini, amygd. dulc. anethini ana 3. j. salis communis 3. j. B. luteum vnius ouis fiat enema, quo excreuit omnium primo materiam fuscam. plumbeam, cæruleam, viscosam ad modum argilæ plumbeæ luti instar tenacis, in magna copia, vt similem egestionem nunquam viderim, astantibus etiam admirantibus. Eaque materia per clysterem reddita, cum prius mingere non posset, statim minxit vrinam crassam mucosam turbidam, & postea etiam vna cum vrina quatuor lapillos ad magnitudinem fabæ reddidit: adeo vt etiam ilico dolor ille vehementissimus miraculi instar statim ab iniecto clystere sedatus sit. Interim cum materia illa iam dicta, tum etiam lapilli, ex renibus depulsa forent, imperauimus vt bis in die ex decocto diuretico vteretur: 2. corticum radicum apii, petros. feniculi ana 3. B. glycyrrh. ras. 3. j. folior. petros. virid. cherefolii ana m. j. sem. petros. Macedonici 3. j. B. sem. cherefolii 3. j. coquantur in aqua communi & vino Rhenensi ad 1b. j. B. dulcoretur saccharo. Eodem tamen die, cum clyster iniectus esset, antequam decoctum præcedens biberet, iusseram ad maiorem lenitionem, vt ipsa vteretur decocto hordei, ficuum recentium & folior. maluæ in sero lactis. Deinde decocto iam paulo ante dicto vtebatur; & simul loco dolenti sequens cataplasma apposuius: 2. flor. meliloti, chamomill. ana m. j. rad. althææ mund. 3. ij. coquantur ad molliitudinem; & aqua effusa adde iisdem pistis butyri recentis q. s. ad cataplasmati formam. Quibus remediis adeo sana facta est, vt dolor amplius non redierit.

S C H O L I A.

REnum obstructio licet fiat aliquando ab humore crasso & viscoso, raro tamen (rest. Fernelio) & vix vnquam compertum est, vt a solo humore vel crasso vel lento ren totus obturetur: a calculo autem & arenulis sæpissime, a quibus etiam solis vrina supprimitur, vt postea

exemplis patebit. At quocunque modo sit obstructio in renibus, dolor lumbos exercet, vrina quibusdam supprimitur: sed apertis meatibus, ea nigra, multa, quandoque arenosa variisque humoribus mixtis emittitur, interdum etiam vrina cyanea, ut vidimus, quæ aliquando caloris vehementiam, aut defectum ostendit: quandoquidem sanguis intra renes, neque vnitur neque similis fit; vel interdum vnitur, unde cyaneus ille color exit.

Cyaneæ
vrina.

4. Accedit & renum siccitas quædam, qua sanguinem in sese non immutant, unde vix ea membra aluntur & sanguinem ipsum in substantiam albam male vertunt, unde adustio redditur, & cyaneo quoque colore efficitur vrina. Ea siccitas ex ventris & musculorum tensione deprehenditur, & vniuersa corporis habitudo macie conficitur, ut in multis & nos conspeximus, qui talem vrinam reddebant. In summa, vrina arenosa, cyanea, spissior, turbulenta, sedimine veluti granuloso, renum imbecillitatem ostendit, & imminentem calculum: ruffa vero malum protrahi, limosa cum variis humoribus augeri dolorem indies significat. At huius viduæ vrina erat crassa, turbulenta, limosa, ex materia etiam pituitosa obstructionem in renibus esse demonstrans. Fit etiam aliquando obstructio a pituita in modum pilorum conuersa, ex caliditate renum, aut alio modo, eiusmodi pili generantur; quemadmodum & Galenus meminit 4. aph. 76. de quodam qui pilos mingeat, & corpora longa incredibilis longitudinis. Hic toto anno comederat orobum, fabam, caseum tenerum, tum aridum & vetustum; qui ab exenuantibus & incidentibus medicinis fuit curatus, atque alio victu humectante adhibito. Appellat autem Galenus in commento eiusdem aphorismi hoc vitium capillitium. Ita ut 6. lib. de locis affectis, cap. 3. inquit: Ea vero quæ pilis similia sunt, Hippocrates quoque cum vrinis excerni vidit; quemadmodum & in aphorismis. scripsit, ac ipsi etiam vidimus aliquando, quæ semipedis longitudinem aquarent; interdum etiam iis longiores, nonnunquam valde exigua; ut mirarer quomodo in renum spatio talia possent consistere: proinde probabilius mihi videbatur in venis huiusmodi res procreari. Quemadmodum in quodam Arabia loco (ut aiunt) in tibiis hominum dracunculi vocati nascuntur, neruosa natura, colore longitudineque lumbricis similes. Igitur quum multos audierim, qui sese vidisse eos dicerent, ipse vero nunquam viderim, idcirco neque de ortu, neque essentia ipsorum quicquam exacte conicere possum: At ubi pilos mendo excretos vidi, tum ex colore, tum ex mole credidi dicentibus eos ex crassa lentaque materia, quam calor calefecit exsiccauitque, in venis consistere; quanquam longitudinis ipsorum causam non intelligo, Verum quum primum eos vidissem, curationem a medicamentis, quæ vrinas ciere possent, tentavi; quam postea experientia comprobauit. Omnes vero quotquot huiusmodi affectu laborare consueuerant, neque ante ipsum, neque rursus post ipsum nephritico aliquo accidente fuerunt molestati; sed medicamentis quæ vrinam ciere possunt, plene fuerunt curati. Hæc Galenus, lib. 6. de locis affectis, cap. 3. Nos quoque & in opere

Pilos mingeri
quomodo a Ga-
leno curatus
fuerit.

Capillitium
quid.

practico tales vrinas sæpe conspeximus. At Fernelius ipse doctissimus vult, quod mictio flilis aut capillamentis conspersa fiat, vel a lenta pituita, quæ in vreteribus; vel a seminis excremento, quod in vasis spermaticis longitudinem hanc adipiscatur. At ex humoribus crassis viscosis, oppilantibus in renibus dolores haud exigui fiunt, ut observatio præcedens manifeste demonstrauit: quemadmodum & sequens clarius ostender.

OBSERVATIO XV.

De renum dolore ex obstructione a materia frigida.

Re nes quandoque obstruuntur ex materia frigida; idque etiam frequentius ex iis, qui victu frigido perpetuo vtuntur; maxime vero piscibus: quod multoties fieri conspexi in Carthusianis pisciuoris apud Delphenses, eorum medicus tunc existens, quibus & dolor nephriticus ex obstructione sæpe per periodos reuertebatur. Qui cum a piscibus abstinere non possent, consului ut squamosis tantum vterentur & saxatilibus, vel saltem iis, qui in aquis mundissimis degerent, longe a lacubus, & stagnis & viribus, qui per cloacas nutrimentum recipiunt, & potius assis quam elixis, cinnamomo aut alio aromate conditis. Imperaui quoque ut versarentur in aere subtili, sereno, modo possent: ventosum vitarent aut impense calidum vel frigidum, licet magna ex parte sub tecto viuant & in cellulis vitam consumant, & vix in aerem apertum prodeunt, nisi cum animi laxamenta habeant, tunc enim extra claustra prodire possunt: ubi talia contingerent, aerem iam dictum eligerent. Panem fermentatum concedebam, sæpe exiguo adiecto, tum modico anisi semine, vel cumini insperso, antequam in furno apto coqueretur. Azymum & panem sili-gineum & quacunque ex crustis artocrearum constarent, ut fugerent iusi, ut & missila, sorba, castaneas, & placentas, & quæ ex caseo conficiuntur. Et quanquam abstinentia, qua isti vtuntur, vrilis quidem videatur, ne talis obstructio contingat, vel calculus gignatur, victustamen ille quo vtuntur, obstructionem sua viscositate & frigiditate facile producit: quare nihil præstantius esse poterat, quam uti ouis sorbilibus & mollibus & olusculis ex chara folio, petros. beta, spinachia, asparago, & hysopo, saluia, maiorana, melissa, caulium iure ac piscorum: sed a leguminibus omnibus in substantia abstinentum suasinus. Vinum Rhenanum odoriferum concessimus; a musto & crassa ceruisia abstinentes, & ut rarius oryza cum lacte (ut soliti sunt facere) vterentur præcepi. Quod ad medicamenta attinebat, cum aliter sit procedendum tempore paroxysmi, dum eiusmodi dolorem patiuntur, ita ut quibusdam vrina retineatur, aliter tempore interpolationis. Ideo cum minus afficiantur extra paroxysmum, iubebam ut in autumno & in vere, si proclues essent ad vomitum, eo vterentur, post cibum prius comestis beta ac piscibus salsis, raphani decocto, cum ficibus. Et extra paroxysmum iubebam, ut materiam pituitosam viscidam & cras-

1.

2.

3. & crassam, quam ex continuo piscium esu coaceruabant, digererent cum oxymelle simplici, composito, diuretico, & scyllino, aliisque conuenientibus: & deinde purgarentur cum diaphœnico & electo. inde ad elect. diuretica, vt lithontripi ducis, & similia deueniebant, & etiam ad illa, quæ ad renum calculos postea describemus valere. Renibus quoque inunctis cum oleo anethino, chamæmelino, etiam scorpionis, sed non tempore magni doloris. Tunc enim omnium primo clystere anodyno iniecto etiam fots anodynus conueniebant, in hunc vel similem modum descripti. *℞. folior. malua, viol. mercurialis, beta, parietaria, florum chamomill. meliloti, summitatum anethi. ana m. j. sem. anisi, malua, lini, fœniculi. ana ℥ j. ℞. coquantur in aqua communi. pro ℥b. j. adde olei amygd. dulc. anethini, chamæmelini. ana ℥ j. mellis ℥ ℞. benedicta laxat. ℥ j. salis ℥ j. ℞. misce, fiat clyster.* Veletiam postea, cum oleo chamæmelino anethino, adiecto decoct. flor. chamomill. meliloti, flor. ros. rub. ad roborat. sem. lini, fœnugraci, fiant fots cum spongia. Hoc modo a dolore quosdam ex his iam dictis curauimus: facilius autem alios, quibus victum commodum ad libitum, eiusmodi legibus non adstrictis, præscribere potuimus.

SCHOLIA.

4. *fructio qui tollatur.*
SI ex humoribus oppilantibus vitium fuerit, ii extrahendi, distrahendique sunt, si fluere non desinunt: iuuat, si opus est sanguinis missio, vomitus ac deiectio: profunt & modice aperientia, deum diureticis opus est, quæ materiam ex toto per vrinas derurbent: ea tamen ante deiectiones diuersionesque omnino damnantur: importune enim materiam ad vrinæ meatus locumque doloris secum contrahunt, initio præsertim morbi: ob id necesse est perpurgatum reddi corpus. Sed & nephriticis omnibus aluum infusionibus mollire aut leniter ducere in primis prodest. At ex humore frigido viscoso sæpe oppilantur renes, vnde facile in calculum incidunt. quo modo tales curentur breuiter etiam diximus Scholio Obser. 2. huius libri. Aliquando fit etiam obstructio ab humoribus calidis, licet rarius, cuius exemplū ponit Gordonus de iuvene quodam, qui experiebatur dolorem in parte posteriori in spina dorsi, quod & arenulæ in vrina rubræ ostendebant, cuius oppilatio patebat ex paroxysmo & vrinæ retentione, & ex eo, quod cum curaretur, inde subsequabatur multitudo lotii. Eueniebant hæc maxime in fine lunationis. Similiter debilitatem adesse animaduertebat ex mala intemperie, & dolore, qui per decem annos eidem adhæserat, atque nunc intemperies confirmata erat, & virtus debilitata ratione sui instrumenti, ita vt renes minus purgarentur, vnde intermittebat malum, sed rursus coaceruata materia dolor redibat. Nam & æger biliosus erat, cum hepate calido, & oculis croceis, tempore paroxysmi admodum calidus manebat, & in renib. calorem sentiebat. Quod autem morbus esset materialis, etiam & illud patebat, quia soluebatur paroxysmus cum euacuatione multæ materiæ, & sentiebat iuuamen ex iis, quæ & secessum & vrinam

proritabāt. Huic recte proscripsit, post feces communes eductas, venæ sectionem basilicæ, postea etiam saphenæ, extra paroxysmum. Digerebat materiam cum syr. quodam apud eundem descripto, *part. 6. cap. 8. de passionibus renum & eorum dolore, qui ita paratur. ℞. end. scariol. lactuca. ana ℥ ij. succi cucurbita. ℥b. ℞. flor. nenuphar. viol. borag. ana ℥ ij. prun. xxx. aceti albi ℥ ij. panis zacchar. ℥b. j. fiat syr.* deinde purgabat materiam digestam cum elect. de succo ros. Mitioribus tamen præstat vti, ne materia ducatur ad renes. Locum inungebat vng. parato ex succi vmbilici veneris, oleo ros. & cera alba. Ceterum reliqua vide de curatione ex causa calida & materia calida: & ex frigida vel pituita, Schol. 2. Obseruat. huius libri. quibus adiungere potest ea, quæ Benedictus Veronensis annotauit cap. 15. lib. 22. de humoribus renes oppilantibus, & dolorem inferentibus.

OBSERVATIO XVI.

De dolore renum, cum mictione multarum arenularum.

DOlebat in renib. adolescens, & ægre aliquando lotium reddebat cum multis arenulis, ita vt maximus metus de calculo foret. Vt illum curaremus: prima intentio curandi ad hunc scopum pertinebat, vt omnibus modis prohiberemus generationem calculi, cum eiusmodi arenulæ, vt in Scholio latins ostendimus, facile in calculum coeant, & vt simul dolorem mitigaremus, & materiam renes obstruentem & lotium impediens euacuaremus. Præcepimus igitur in primis, vt aerem crassum, turbidum & pluuiosum vitaret, qui tales humores facile incrassat: & similiter vt abstineret a vino nigro crasso turbido, dulci, ab aqua stagnāli, & aqua valde frigida: vinoque subtili subinde vteretur, non tamen potenti, sed albo nempe Rhenano, aquæ virtutis sua, substantia & colore assimulante: nam tale vinum repurgat vias vrinæ, & Galen. eo vritur *in meth. medendi*, in febribus ad vrinæ prouocationem, Pane quoque vt vteretur mandauimus, non omnino a fursure mundato, bene fermentato & aliquāliter saliro: at azymum præcipue vitaret. Sed vt carnibus vteretur paucarum superfluitarum, optimi succi & facilis concoctiones, vt sunt carnes lepusculi, pullorum, perdicum, phasianorum columbarum, turturum, & similibus. Imperauimus etiam, vt ab animalibus aquaticis omnino abstineret: itemque a lacte, caseo, & omnibus rebus tum fructibus frigidis & humidis, & vt temperato exercitio vteretur, & somno septem horarum, capite eleuato; & omnibus modis procuraret, vt arte vel naturā quotidie aluum deponeret. Diligenter etiam hæc obseruando. In primis quod non comederet nisi appetitu & desiderio ad ipsum cibum sumendum instigante, neque in eadem mensa diuersa caperet fercula, neque repletet se multo cibo aut potu, sed recederet a mensa cum reliquiis famis. abstinendo quoque a coitu vehementiore & animæ accidentibus. Imperaui, vt bis in mense caperet cassiam recentem, ex cannis tractam, ad vnciam vnam. Materiam digerebam hoc vel simili syr. *℞. syr. de dua-*

3. *bus rad. ex infus. ros. ana ℥ j. mellis ros. colati, syrup. acetos. simplicis. ana ℥ ℔. aqua decoct. charesfolii. fœniculi. capill. ven. ana ℥ ij. fiat iuleb. pro ij. dosibus.* Purgavi eundem hoc modo. *℥ diacatholici. elect. lenitivi, diaphœnici. ana ℥ ij. aqua decoct. rad. fœniculi, petros. ℥ ij. mellis ros. colati. ℥ ℔. misce.* Ad dolores mitigandos clysteres lenientes inieciimus, & fœtum in lumbis ex anodynis administrauimus. Postea etiam iis adhibitis, quæ ad calculos faciunt, *de quibus in sequentibus, latius dicemus.* Attamen primo omnium ventrem clystere molliendum censuimus. Renes enim oppressi stercore, grauius dolent, liberati, leuius: & ex eo minori negotio arenulæ fabulum & crassior materia, quæ facile in calculum concreveret, excluduntur. Alio sic quoque lenita, vñctionibus & fomentis balneisque lenientibus atque laxantibus commode vñ sumus.

S C H O L I A.

4. *Appropos.* **A**renulæ autem (*vt Fernelius quoque testatur*) non interiore cauo, sed in propria renum substantia proueniunt, a qua duræ sunt ac rubræ & renis substantiam coloremque retinent. Illius fluentis vrinæ impetu feruntur in cauum, prolabanturque in vesicam per vteras, & vrinam reddunt arenosam. Si curatio negligitur, tempore crassescunt illæ, vel mutuo adhæsu inter se colligatæ calculum coagmentant atque componunt. Attamen nos vidimus renum sinum calculis exiguis repletum fuisse, post cadaueris sectionem: quasi parui lapilli non solum in sinu & concavitate renum, sed in ipsa substantia infarcti erant, vt nos spectauimus in Domino de Abbenbroek. At in renibus cur tinguntur fere rubro colore, vt rubrum intelligas & flauum & rufum iustaratione, quod & in Arenis videre licet. Hoc autem fit ideo quod a sanguine, calore loci, & partis colore, tingi solent. Suntque minus duri, asperi & magis friabiles, quam in vesica. Ergo magis ex arenulis coalescunt. Cur igitur multi arenas mingunt, neque calculosi sunt? Causa est in promptu, inquit Hollerius: *Non enim coguntur, nisi viscido aliquo & crudo humore tanquam glutine, opus est tempore.* Vbi igitur obstructio est a crassis & viscidis humoribus, & acrior vrina ac magis feculenta, angustiores meatus, calore superueniente a quacunque parte, (*vt hepate, corde, renibus,*) quid diu impactum fuit in meatu: induratur, & lapidescit, figuramque accipit a sinu in quo est. Neque impedimento est, quod nonnulli respondent ex calculo arenulas fieri, non contra. Cur enim qui generantur in vesica, in arenulas raro dissoluuntur. Neque etiam ob id necesse est in calculo renum semper arenas excerni cum vrina. Nam in multis dissectis probatum contrarium, qui calculosi sunt inuenti, cum neque arenas meierent, neque laborarent vrinæ difficultate, in fœso calculo in substantia renum. Archigenes & Philagrius arenas reddi voluit, cum iam calculus e rene in vesicam descendit. Vrinæ quoque aliquando arenosæ ex vesica: aliquando contra. Ita ab arenulis & a materia terrea atque adusta, (*sed multo frequentius ex crudo succo, ac vis-*

cido, quo etiam coguntur arenule) calculos oriri consentaneum est, aliquando arenulas ex renibus in vesicam labi, sed ex ipsius vrinæ fece resoluta humore posse fieri, a calore stomachi ipsius, vt ait Hippocrates: quales in matulæ fundo apparerent. Sic multi arenulas aliquando vel fabulum mingunt, neque renes calculo afficiuntur, neque vllum dolorem in renibus patiuntur. Sed quouis modo sit obstructio in renibus, de quibus nunc loquimur, siue ab humore viscido, siue ab arenulis vel calculo, dolor circa renes ægrum infestat.

OBSERVATIO XVII.

De nephritico dolore renis sinistri, ex arenulis in eo impactis.

Angela Hugonis, mulier ita dicta, viginti sex annos nata, ceruicarii illius vxor, pro cuius cupis a Græcum Delphis pro insigni erat, duobus mensibus elapsis cum grauidam se existimaret, in insignem dolorem lumborum & præcipue circa renem sinistram incidit. Medicus ad eam prius accitus metuebat abortum: adhibet tamen glandem hoc modo descriptam. *℥ pulu. specier. hieræ picræ. ℥ ij. trochis. albandal. ℥ ℔. mellis. q. s. salis parum, nihil eduxit.* Mox iubet vt obstetrix præsto adesset, si subito abortus superueniret. Exhibet hanc potionem, cum alius omnino resisteret. *℥ aqua melissæ ℥ v. in qua infunde folior. senæ ℥ ij. rhabarb. elect. ℥ j. schœnanthi. ℥ ℔. flor. chamomill. p. j. liquir. ras. ℥ ij. fortissim. express. adde syrup. ros. comm. ℥ j. misce, fiat potus.* Sed eodem medico peregre profecto, nec redeunte, obstetrix accersita abortum futurum expectabat. Tandem dolor cum ingenti cruciatu renem sinistram magis occupabat, & e directo ad coxendicem declinabat, neque poterat in latus decumbere sanum. Duobus postea elapsis diebus, cum præ nimio dolore animi fere deliquium incurreret, medico non reuertente, ipse accitus fui. Putabant autem partus conamina esse. At ego dolorem nephriticum iudicabam, ex arenulis reni sinistro impactis, non tamen in vterere, alioqui dolor adhuc multo grauior & vehementior fuisset. Omnia autem euomebat, etiam potionem illam, quam prior medicus dederat. Ter balanum immitto: sed aluum non deposuit. enema, cum grauida esset, neque admittebat. Iubeo tamen locum dolentem, vt inungeret linimento sequenti. *℥ muccaginis seminis althææ, maluæ, extractæ cum aqua maluæ. ana ℥ ℔. ping. vituli, gal-linæ. ana ℥ ij. olei ros. viol. chamomill. anethi. ana ℥ ℔. vnguen. ros. ℥ ij. misce, pro linimento.* Similiter præscripto hoc potu, quem cochleari paulatim deglutiuit. *℥ manna, granata selecta ℥ x. dissoluantur cum modica aqua maluæ, & fortiter express. adde syrup. ex infus. ros. rub. commun. ℥ j. ℔. syrup. acetos. citri. ℥ ℔. misce.* Retinuit. Sed post duas horas semel vomuit, nocte tamen deinde subsequente egregie aluum deposuit, omni quoque sedato dolore, nec abortum passa est: deinde lotium reddidit prius turbulentum. Mox vna cum lotio arenulas rubras non tamen calculum reiecit, & perfecte curata fuit. Dolor itaque ille non erat parturientis, sed ex obstructione

5. **Q**uione humorum crassorum in renibus contentorum, simul cum arenulis rubris; quæ ex calore renum indurate procul dubio a renib. per vteretres tandem in vesicam deturbatæ per lorium expellebantur. Non tamen semper eiusmodi arenulæ rubræ, vel etiam calculi rubri, in renibus nascuntur, *vt etiam Fernelius testatur*. Et propterea iis non semper credendum, qui calculos albos in vesica duntaxat rubros in renibus nasci affirmant: nam purulenti renes albos quoq; proferunt. Tamen magna ex parte, vt alii omnes volunt, calculi pleriq; rubri sunt, qui in renibus nascuntur, quamuis arenulæ, vt antea diximus, subinde absque calculo exeunt, vt in hac muliere, quæ post humorem crassum & viscidum arenulas tantum sine calculo per lorium emisit: quæ causæ fuerunt huius doloris & obstructionis.

S C H O L I A.

4. **N**ephriticus dolor, *teste Fernelio*, acerbissimus est renum cruciatus, aut certe vteretis, cuius est eximius sensus. Is in renis situ fixus, alterutro latere stabilis est, nisi quod interdum vel ad coxendicem, vel ad testem, qui e directo iacet, vteretis tractu protenditur. Non vt colicus dolor in ventrem medium aut in omnem illius regionem murmure quodam euagatur, neque semper citata & expurgata aluo dilcussisque flatibus mitescit: sed immanitate & ferocia peritonæum conuellit: hinc viscera & ventriculus subuertuntur, ac primum quidem pituitosa, deinde biliosa vomitione reiciunt. Urina quum malum incipit pauca, tenuis, & aquosa est, interdum vero supprimitur: Postea copiosa, crassa & arenosa exit, eaq; ardoris quodam sensu ad crebrius meiendum compellit. Decubitus in ægram partem dolorem demulcet, in aduersam exasperat. Creber admodum est ac multis frequens hic dolor, colicus vero rarus. Tanti cruciatus neque inflammatio, neque sanguinis grumus, neq; crassus humor solus causa statui potest, quod mollis ac fluidus facile obsequatur, quodq; obseruamus crassiorem mucum, imo & concretum pus, nullo sensu e renibus facile prolabi. Erat hic tamen dolor satis vehemens in hac muliere, licet ab arenulis crassa viscosa materia ren obstructus dolore, nempe sinister, fatigabatur. Sed vnus calculus causa fit doloris, vbi dolor acerbissimus adest, qui (*vt idem refert Fernelius*) crassiusculus, inæquabilis ac scaber, dum per angustum vteretrem deuoluitur, hunc magna vi dilatans atque dilacerans per quam immaniter excruciat. Iis qui iam pridem nephriticis doloribus erant assueti vsque adeo dilatatum vteretrem, aliquando comperimus, vt in eum maior digitus immitti posset. Per hunc mediocres calculi, sine molestia excidebant, qui olim non nisi summo cruciatu procidissent. Qui vero aut nondum, aut certe raro, & leuiter nephritico dolore tentati sunt, minimo calculo distorquentur, & si sunt arenulæ, cum minori molestia per medicamenta lenientia cum vrina exeunt, vt huic mulieri contigit, quæ etiam vrinam postea turbulentam reddebat sine calculo. Hunc autem dolorem a colico

discernere in primis arduum est, quia nihil excedere manifesto deprehenditur. Sedato atque restincto dolore, etiam atque etiam cōsiderandum, dolorisne causa in vesicam exturbata sit, an in renis cauum remeauerit? Si exturbata est, cauendum, ne illic subsistat, & assiduo materiæ appulsu in vesicæ calculum coagmentetur. Iam vero eiecto cum vrina calculo, æstimandum solidusne sit, an ex arenularum adhæsu compactus. Ex iis namque medendi ratio constituitur. Inter ea arenulæ sic mutuo adhæsu inter se colligatæ, calculum, *auctore Fernelio*, coagmentant atque componunt, vt etiam antea diximus ex eodem. *Nephritis autem.* Hic deinde renis substantia (*vt idem refert*,) exturbatur in cauum, cumq; euellitur, renis partem cui adhærescebat, sine doloris sensu diuellens, & quasi dilacerans, saniem prolicit, quæ pariter cum vrina profunditur, eamq; crassam, turbidam subnigramque reddit. Id enim sæpe & nos obseruauimus in quibusdam, qui talem vrinam mingeabant, calculo renem laborantes. Calculus autem exceptus renis capacitatem, si exiguus est, non multo post tempore in caput vteretis se infert, ex quo magna vi summoque dolore nephritico in vesicam procidit. Si crassiusculus est, aut salebrosus & asper, in via diutius hæret, & magno cruciatu vteretrem dilacerat. Sed & nonnunquam in renis capacitatem subsistit ac permæret, quum præ crassitie non satis lata illi est vteretis via. In illam contrusus & exagitatus, acerbum sæpe dolorem mouet, quum præsertim profilit, atque se infert in vteretis caput: at is mitescit calculo remeante in renis cauum. Hic (*nisi tempore procidit*) assiduo arenularum appulsu coagmentatur in verum renis calculum, cuius nec vna semper est magnitudo, nec vna forma nec color vnus. Confirmatus fere renis cauum implet, consuetasque arenulas exire prohibet: ac proinde renum calculus veteres dolores nephriticos obtegit & dissimulat. Perfectum in rene hunc esse docet affectæ partis grauitas, ob quam vix spina dorsii inflectitur: cuius tamen dolor, non vt is, quem destillatio peperit, externarum partium pressu admodum manifestus est. Nullo tumore foris conspicuo obtusioris cuiusdam doloris sensus inest, præsertim quum aluo suppressa ren ipse vel flatu vel fece premitur, aut quum decubitus est in aduersum latus, aut quum vehementior est exercitatio. Nephriticus dolor ex interuallis citra calculi excretionem redit: per laborem & duram equitationem vrina profluit cruenta, tum quippe calculus suo pondere & attritu renem contundit, ac plerunque sine sensu dilacerat, exulceratque, e quo sanguis cum vrina profunditur. Cruris quod e directo affecti renis est, torpor quibusdam inest molestus. Calculi materia est crassus & viscosus humor, in renem pariter cum sanguine eiusq; sero excurrent, qui alias ex cruditate, alias ex torrido terrenoque sanguine processit. Efficientem causam omnes quidem profitentur immoderatum esse renum calorem, qui humores perurens, siccans & obdurans, cogit in lapidem. At certe alia statuenda causa efficacior

Signa perfecti calculi.

Calculi materia.

Causa efficiens calculi.

longeque crebrior, insita renum arenosa calculo-
saq; constitutio. Hanc quisquis a parentibus con-
traxit, vix vlla ratione calculi tormenta effugiet,
quandoquidem hoc vitium omnium est maxime
hereditarium, vt non paucis pariter cum renibus
calculus procreetur. Adiuuantium porro causarū
præcipua est otium, somnusq; diuturnus, de cubi-
tu supino, *Hactenus Fernelius*. Sed exemplis subse-
quentibus omnia lucidiora euadent.

OBSERVATIO XVIII.

*De dolore nephritico ex renum obstructione ac
calculi metu.*

Magister Petrus Zegerus, apud Haghenſes
Canonicus, Frater Domini Wassenhouii,
Consilarii & equitis auitati (*de quo etiam egimus in
lib. nostro de febribus*) dolorem nephriticum circa
lumbos patiebatur, lotium sabulum non contine-
bat, sed resolutiones pituitosæ in eodem spectabā-
tur. Vnde obstructionem in renibus esse percepi,
quæ cum facile in ardorem vrinæ permutari pos-
set, si huius materiæ fieret putrefactio aut corrosio,
vias vrinales vlcerando, vel si retineretur materiæ
limosæ pituitosæ, ex leui calfactione renum (*cum
dolor nephriticus adesset*) calculum in renibus infer-
rent. Quare eidem dixi præcautione opus esse,
cum is quoque calculum metueret, non sine caus-
sa, materia limosa apta existente, vt in lapidem fa-
cile concreſceret. Præseruatio enim præclarior i-
psa curatione existit: multo enim præstat morbum
prorsus non admittere, quam admissum expelle-
re: quemadmodum gubernatori nauis longe præ-
stabilius est ante tempestatem exortam portum
ingredi, quam fluctuatum periclitatumq; e mari
euidere. Cum enim parentes eius calculo obnoxii
fuerint, vt fertur, ideo maxime cauendum illi est:
nam & hoc vitium inter hereditarios morbos nu-
meratur, propterea si quis in eo metu securus non
fuerit, aut eo vitio natura tentatus fuerit, ne illa
valetudine corripiatur integer obseruare debet:
atque hæc vitanda sunt calculum timentibus, ne
curru primum, neque equo concutiantur aut pi-
la parua, athleticaque exercitatione sese multum
fatigent. Etenim his & iis, qui calculo laborant
vel eum metuunt, quemadmodum desidria valde
noxia est, ita rursus neque iis magnæ exercitatio-
nes conueniunt, veluti equitationes, aut armis aut
lucta, aut pancratio certare, aut humum fodere,
aut id genus aliud facere, *Galeno teste & de morb.
vulgar.* At cum Dominus Canonicus iam ætate
grandior, vitam potius quietā & otiosam agat, non
opus est de his eundem admonere, satis erit loco
exercitii, vehementioris, leui deambulatione vti.
Nam ex vulgo magis offenduntur qui fabili arte
aut fornacia, vti & pistorum, vtuntur. Omnibus ta-
men obest thermarum vsus, multaque vestimen-
ta, ac mollis culcitra. Vnde & Alexander Trallia-
nus admonuit, *ne culcitra indormiant ex anserum
plumis, cum renes valde calfaciant, non minus, vt arbi-
tror, ex cygnorum plumis.* Cinctus item latus at-
que arcte pressus nocet, quo Dalmatæ vtuntur.
Cauendum quoque ne frigore pedes corripian-
tur: nocent quoque super lapidem longæ sessio-

nes. Iuuat igitur cœli temperamentum, letielque
deambulationes. Fatigationem vero, ac pluri-
mum otium, somnumque meridianum, damna-
mus, sicuti & nimiam Venerem. Sed cum Cano-
nicus sis, & cœlibem vitam agas, vix de ea memi-
nisse oportuit. Sic alius soluta assidue proderit,
modo ne instet aliud quippiam. Cum namque
probe excernet, vrinæ profluent libere. Ab im-
modicis animi affectibus cauebis. In victu vero,
cruditas ac crapula vitanda erit, & quæcunq; suc-
cum generant crassum aut lentum, quale e simi-
lagine confectus panis, vel si male fermentatus
fuerit, vel inepte coctus. Damnantur oua, *Præser-
tim dura, ac fricta, caseus, pultes, ex tritico cibaria,
vel farre, legumina fere omnia, lens, oryza: inter ob-
sonia bubula caro, hircina, ouilla & suilla, gelu cuius-
cunque generis, anates palustres, anseres, interanea.*
Præterea a mensa esse debent, renes, corda, & ie-
cora, præter gallinacea. Omnibus pisces vitandi
sunt, *grandiusculi præsertim, acetaria omnia, quales
cunicula sunt, raia, squatina & murena, anguilla, pa-
stinaca,* quæ selach appellauit Aristoteles primus:
nos cartilaginea vocare possumus. Et mollia quo-
que damnantur, *sicuti vitica, loligo, sepia ac poly-
pus.* Et omnia cancerorum genera, sicuti quos ca-
rabos vocamus, locustas, & astacos, in concha-
rum genere ostreas, conchylia, pinas, & echinos,
& quæcunque sanguine carent. Immaturi præ-
terea fructus, acerbi, ac asperi vitandi sunt. Sili-
qua, sorba, melpila, pyra immatura ac cytonia ma-
la, persica. Valent tamen vix passæ, amygdalæ a-
maræ, & cerasorum nuclei. Acria quoque non
laudantur, præter porrum & armoraciam, sicuti
inter olera quæ vehementer calfaciunt; inflami-
mant enim renes: Veluti inter aromata piper v-
trumq;, ac macropiper cum zingibere. Inimica
traditur esse tuberum ac fungorum natura, & car-
nes salitæ fumoque induratæ, piscesque saliti, &
qui in piscinis stagnisque limosis victum quæri-
rant, & pastæ ac laganæ. Vina præterea multa-
rum virium austera damnantur, Rhetica, Creti-
ca, Falerna, nigra præsertim, atra, ac dulcia, qua-
lia ex Dalmaciæ insulis vehuntur, & Martionea,
Patauina dulcia & atra, & Hispanica. Musta o-
mnia inutilia sunt. Rhenana mediocriter sum-
ta conueniunt, nempe subtile & aquosum cras-
sum, rubrum ac mustem nullo modo. Cerui-
sia sit clara, non admodum recens; at crassa, tur-
bida, vitanda. Sunt & aquarum vitia. Inueniri
fontes audiuius, quorum haustu calculi proge-
nerantur: palustris damnatur & ex liquata niue.
Aquæ cisterninæ salutares sunt: saluginosæ insa-
lubres. Cibi vero conueniunt hi: *phasianus, per-
dix, & attagena, præcipui saporis, primas tenet par-
tes, & turdi, alaudæ, merula, sicedula, luscinia, & his
similia, pulli quoque gallinæi columbæque: & est
præcipuæ gloriæ avis, omnium, præter regulum
(inquit Paulus) minima, quo vno maior habe-
tur, colore haud dissimili, medio inter cinereum
& viridem, acuti rostri, in muris & parietibus
degit, Troglodytes vocatur, peculiari auxilio ce-
lebratur, ad hunc vsum facile alternatur. Nam &
recens*

recens deuoratus calculos eiicit, gignique prohibet, tostus item cum pennis viuis aut cinis per se siue cum exiguo pipere ex melle potus idem præstare dicitur. Quotidiano vsu utilis est vitulina caro, hædina, veruecina, capreoli, leporis tenelli; herinacea peculiarem ad id vitium medelam facit. Hæc de victus ratione & vitæ instituto satis. Quod ad medicamenta attinet, ne ex materia illa pituitosa, quæ per vrinam exit, in calculum cōcresecat, ventrem subinde lenies; vbi alius nō satis respondeat, sumra vncia vna cassiæ in bolo, adiecto saccharo. Si dolor renes lancinet, clyster leniens iniiciatur omnium primo: eo enim dolor leuari solet; vbi etiam dolor vrget, vomitus ciendus erit a cibo: sæpius tamen sponte euenit, vbi lapis adest, quamuis ex vomitu non tollitur: ex vomitu tamen situm lapidis dolorosum minus fieri contingit: nam dolor non solum mitior redditur, sed & lapis mouetur a loco: in quo impactus dolorem facit. Quia vero hic tantum metus est de lapide seu calculo, cum materiam pituitosam conspexerim in tuo lotio, ideo eam ipsam prepararem cum melle ros oxymell. simplici, & purgare primo cum syt. ex ros pallid. cum agarico; & singulis mensibus acciperem has pilulas: ℞. pilul. cochiar. de agarico ana ℥ j. pilul. aurear. ℥ ℥. cum aqua betonica; fiant pilule v. Vti poteris aliquando terebinthina. Ea enim egregie ad cautionem calculi facit, potius quam ad exclusionem; qua & multis modis vti posses.

6. Vncia vna terebinthinæ inuretur in lamina ferrea candente, vt possit infriari. Accipies ℥ ij. eius pulueris, cum aqua vel decocto malua, parietaria vel cherefolu. Hoc etiam faciet ad ardorem vrinæ. & si ardor adest, detur cassia in bolo ℥ j. adiect. ℥ j. trochis. alkachengi, sine opio. Sed & hoc medicamentum etiam excludendo calculo satis esse poterit, vbi prius lenieris & relaxaueris: ℞. terebinthinæ ℥ ℥. lithontribon ℥ ij. misce, fiat bolus. Sed & hoc exhiberi potest tempore paroxysmi: ℞. terebinthinæ lota in aqua halicacabi ℥ ij. pul. tragac. & glyc. ana ℥ j. ℥. incorporentur in ℥ ℥. cassia, cum saccharo; fiat bolus. Existimarem hæc omnia supradicta vtilia fore, cū etiā pituitosus sis: abluta enim pituita, & sæpius his supradictis absterfa & potissimum terebinthina, spero quod dominatio tua minus calculo detinebitur. Hæc proculdubio ad hanc obstructionem & calculi metum hoc tempore sufficient.

SCHOLIA.

7. Multis in partibus corporis humani calculi generari possunt; quemadmodum & nos diximus Sch. lio Obser. 26. lib. 14. Nam & ex lingua erupisse vidimus. Id similiter vidit Iacobus Forliensis, medicus insignis & præceptor Guainerii, in quodam Nicolao de Summa Rippa. Auenzoar similiter refert lapidem generatum sub lingua, cap. de nocumentis renum, in principio. Idem & Beniuenius testatur in pharmacopœo Mariotto; & in tunica hepatis reperrum fuisse lapidem in matrona nobili. Et nos quoque in nobili muliere ex intestinis per anum excretum spectauimus. Ex pectore quoque, tum in tunica fellis, etiam post mortem vidimus: & Langius e faucibus erupisse

scribit, vt loco iam citato recensuimus. Hollerius obseruauit concretos in capite & vtero mulieris, cui dissecandæ in Scholis publice præfuit. Gradus supra Rhaf. capit. decimoquarto, de lapide renum & vesica scribit, aliquem sibi familiarem & fide dignum vidisse lapidem concretum circa carunculas mammillares ad quantitatem pinæ maioris durissimum, & per nares expulsam. Multi quoque in folliculo fellis (vt & nos vidimus) leues, nigri, flauī, innatantes aquæ, qui quandoque excluduntur deorsum. In nobilissima muliere 53. repertos secto folliculo, vidit Interpres Hollerii in Aruernia. Nos quoque Delphis in domo Orphanorum, vt loco citato meminimus eos vidimus. Puero cuiusdam sudoris in mesenterio inuenti: Duabus mulieribus in pulmonibus; vt & nos in alio spectauimus: multis in articulis, iecore, liene, ventriculo. Adhærent sæpe vesicæ, cranio & vtero. Galenus meminit calculi in vtero. Musa mulierem refert ex ano quinque lapides reddidisse: quod vero simile est; nam pituita sæpe lentissima intestino hæret, quæ potest concrecere, dum saris non detergitur. Galenus s. de locis affectis, meminit cuiusdam, qui e thorace velut grandines expuebat. Alberto Saunarolæ mortuo decem calculi inuenti in vesica, magnitudine oui columbæ, & figura, singuli pendentes plus quam ℥. v. omnes simul ℥ vj. vt scripsit Musa. Guainerius refert de rustico quodam, cui aluo admodum dura existente (vt in quindecim diebus aluum non deponeret) plures lapides in intestinis procreatos ad magnitudinem nucis etiam excretos vidit. Gradus quoque annotat Papix se vidisse mulierem ex colico dolore laborantem excreuisse octo vel decem lapides crassos ad nucis quantitatem, ac ab eo malo euasisse. Qui equidem sua crassitie, duritie, & ponderositate in terram proiecti sonum edebant. Ideo hic affectus multis partibus communis videtur, non vni soli ac eandem causam habet, cum arenulis & aliis calculis ex materia viscosa retenta & per calorem cōcreta, vt postea suo loco plenius dicetur. Attamen eo potissimum laborant renes, laborant vrteres, laborat vesica: aliquando & in colem descendit. Sed locus generationis est maxime, vbi excrementa, quæ ea arte feruntur, detinentur magis: & sunt renes primum, mox vesica. Atque in vesica quidem, quoniam non paruo tempore vrinæ in ea retinetur, & facit subsidientiam eo loco, qualem & videmus in matulis facere. At in renib. non retinetur, nisi modico tempore: sed propter loci angustiam, tale excrementum non facile truditur: Pituita putris & pus crassum aliquando representant calculi signa, vt in Praside quodam multa mucosa, viscida longo tempore quotidie expurgante. Id & nos sæpe vidimus in Prætorē Haghano Dammio dicto, & in Melchiorē quodā Delphenfi & aliis innumeris. At nunc de calculo seu lapide tantum dicemus, qui in renibus procreatur atque ibidem hæret, vel in vrteribus impactus, aut in vesica permanens, ægros subinde dolore conficit: & omnium primo de renum calculo seu lithiasi, tractabimus.

OBSERVATIO XIX.

De renum calculo.

1. **V**estalis virgo, cui Sophia Henrici nomen erat, utcumque vetula, sexagesimum plus minus ætatis annum agens, Alcmariæ grauem dolorem circa lumbos patiebatur, ita ut aculei infixi sensum præberet, nullo foris apparente tumore. Hanc vero calculosam esse cognouimus, & calculum in renibus impactum esse: nam & crassas urinas prius minxerat, & arenosas sabulosasque: & frustula sabuli contriti sæpe micta in lotio visa fuerant, a quo mictu prius plurimo sabuloso leuabatur, & plerumque antea leuiore aliqua doloris accessione tenebatur. At nunc dolore circa renis situm valde affligebatur, & urina primo præter morem tenuior reddebatur, postea etiam supprimebatur, aderatque vomitus grauis, & nausea illam vrgebat. At hic dolor post cibum minuebatur, qui colicis augeri solebat. Hærebat autem dolor circa dorsum fixus: contra in colico dolore circa ventrem & abdomen, nec fixus stabilisque manet. Sed etiam crus hic eidem reni respondens (nam magis in dextro rene dolor erat) stupebat subinde. Paucam & aquosam urinam reddebat: quæ tandem supprimebatur, atque illa simul narrabat se aliquando præter sabulum subinde & sanguinem minxisse, quod ex calculo asperiore subinde e rene auulsum & emotum fuisse coniciebam. Cum hæc diligenter animaduertissem, eandem calculo renum laborare certo iudicabam. Quæ cum agnoscerem, curationem a doloris mitigatione auspiciatus sum, simul vitando inter initia solutiua fortia, atque diuretica, quibus multi ad orcum vel cælum transmissi ac subito rapti sunt, ut multis exemplis docetur apud Guainerium insignem practicum, licet minus cultum, aut (ut quidam appellare eum consueverunt) barbarum. Nam ea omnia humores agitant, qui agitati denuo ad renes decumbunt, doloremque augent. Diuretica vero ventriculi humores & intestinorum ad renes dirigunt, unde & dolor adeo exercebatur, ut in deliquia animi subinde, & in mortem inopinam misere ruant. Cum itaque aluum non redderet, enema emolliens, leniens, primo ut iniiceretur mandavi, quale hoc est. *℞. radicis althææ. ʒj. foliorum maluæ cum rad. viol. brassicæ. ana m. j. florum chamomill. meliloti. ana p. j. ficuum pinguium & iuiubar. recent. ana num. vj. fursuris in nodulo ligati. m. ℞. coquantur in aqua communi. pro ʒx. vel xy. adde cassia recens extracta vel mundata pro clysteribus ʒj. butyri recentis. ʒij. olei communis vel amygdal. dulc. ʒij. salis parum, vitellum vnius oui, fiat clyster.* Eiusmodi clysteres quantitate solito minores esse debent, ad ʒx. non excedentes xij. decoct. ne renes comprimant & dolorem augeant. Verum cum illa clysteres admittere nollet, balano statim ad feces emittendas vsi sumus: nam & glandem admisit, qua aluum deposuit. Fecibus enim eductis, renes prius stercore oppressi grauius dolentes, nunc ab iis liberati fuerunt. Quare ad fatus deuenimus,

dolorem mitigantes. Et quum aluo euacuata, in corpore robusto, vena poplitis secta, e regione cruris stupentis, ubi adsit plenitudo, utilis sit; tamen in vetula satis debili, potius cacochymia quàm plethora laborante, purgationem præstitisset adhibere. Sed solutiua hic non conueniebant, ob dolorem; verum potius enemata, quibus ad dolorem & flatum etiam discutiendos sæpissime in his vsus sum, qui calculo laborabant: habent enim tales plerumque flatum quoque in intestinis, qui renes comprimunt, & subinde stercora duriora, quæ prius & emollientibus educenda veniunt, in hunc vel similem modum. *℞. radic. althææ. ʒj. ℞. maluæ cum rad. viol. parietaria, summitat. anethi, flor. meliloti. ana m. j. flor. chamomill. p. j. furs. ligati in nodulo p. j. sem. maluæ, althææ, lini, fenugræc. feniculi, carui, dauci, ana ʒj. ℞. coquantur in aqua communi, & huius col. accipe ʒx. adde olei anethini, chamamel. ana ʒj. ℞. diacathol. ʒj. benedicta laxat. ʒij. vel iij. vitellum vnius oui, salis parum, fiat enema, aliquando etiam ob dolorem, olei anethini, chamomill. ana ʒij. iniectis solum profuit. At nostra religiosa, ut diximus, clysteres, (quamuis ad hoc malum destinatos & vtilissimos,) noluit admittere: ideo ex glande cum aluum deposuisset, hoc fotu emolliente, dolorem mitigante, & vnguento vsi sumus. *℞. althææ cum rad. maluæ, viol. ana m. j. parietaria, summitatum anethi. ana m. ℞. florum chamomilla, meliloti ana p. j. sem. lini, fenugr. maluæ. ana. ʒ℞. fiat decoctio pro fotu cum spongia pro ℞. ij. Mox inungebatur hoc vnguento. *℞. butyri recentis, pingued. gallina, anatis, anseris, olei amygdal. dul. an. ʒ℞. mucilaginis, sem. althææ, maluæ extract. cum aqua maluæ, olei lilior. ana ʒij. olei chamamel. anethini. ana ʒij. misce.* Quibus remediis dolor fuit sedatus. Quare tunc exhibuimus diacatholici, cassia recens extracta. ana ʒ℞. (cum amplius non vomeret nec nauseam haberet) cum ʒij. decoct. vuar. pass. ficuum, glycyrr. iuiubar. rec. viol. capill. ven. quibus cum aluum moderate deponeret, viis vrinalibus apertis, multas arenulas minxit: & deinde exhibitum hoc puluere, etiam parua fragmenta lapillorum reiecit subrubra, alioqui si arenulæ non descendissent, priusquam puluerem dedissem, cucurbitulas supra renes & paulatim inferius affixissem, ut sic fragmenta lapillorum e renibus emota per vretes ad vesicam descendere. Verum mitigato prius dolore, & ventriculo, & aliis viis repurgatis, ea quæ calculum protruderent & expellerent, dedi in hunc modum. *℞. lithontribi ʒij. seminis pap. (quia renes calidos habebat, licet vetula) seminis melonum. ana ʒ℞. fiat pul. quem modo capiebat cum decocto cicero, modo cum vino Rhenano.* Deinde iussi, ut & his pilulis per intervalla aliquando vteretur, modo vj. modo ix. sed non quando dolore afficeretur vel grauitatem circa lumbos sentiret. Prius capiebat ʒj. cassia in bolo, cum ʒ℞. pul. trochis. alkachengi sine opio, zacch. candi assers. Deinde pilulas subsequentes vel his similes, cum nulum dolorem sentiret, quas paratas semper domi habebat. *℞. seminis milii solis, petros. macedonici & communis, seminis saxifrag. seminis charesolii. ana ʒ℞.***

§ B. sanguinis hirci preparati ʒj. succi liqu. ʒij tro-
chisc. alkachengi sine opio ʒ B. terebinthina lota in a-
qua fœniculi, apri, deinde parum tosta ʒ ij. fiant pi-
lula admodum exigua ex ʒj. quibus multa fragmen-
ta lapillorum & arenularum expellebat, uti mihi
postea confessa est. Descripta sunt hæc a me Alema-
riæ, dum ibi praxin exercerem, anno 1552. mense
Septembri.

S C H O L I A.

3. **N**on raro renes ipsi siue secundum eorum ca-
uitatem siue substantiam, affectum nephri-
tim siue lithiasim incurrunt, quamquam, ut
alias diximus, nephritim quoque nominare con-
sueuerunt omnem affectum renum, siue similis
sit, siue instrumentalis, siue communis. Caput ta-
men Galenus eum pro lithiasi (*lib. de renum affect.*
dignotione accurat. Galeno ascripto.) Latine calculi
siue lapidis morbum appellamus, quo & vesica
laborare solet, præter renes & etiam Colon, *aucto-
re Galeno l. de loc. affect.* Affectus vero hic nihil ali-
ud est, quam corpusculum quoddam durum, to-
to genere præter naturam, instar lapidis, seu to-
phi, in substantia seu finibus ipsorum renum ge-
nitum. Renes hic affecti sunt, ut ex dolore cum
positu percipitur, qui iugiter in renum loco fixus
ac stabilis infestat; in dextra parte, si dexter; in si-
nistra, si sinister fuerit affectus, cum stupore femo-
ris regione affecti renis, ex retracto teste: Paulo au-
tore, ob conlensum vasorum dorso incumbenti-
um, causæ scilicet venæ, ac magnæ arteriæ, quibus
a mediis tum crura, tum testes renibus consen-
tunt, ut in dissectionib. videre licet: ex Galeno 6. de
morb. vulg. & loco citato. Est hic morbus in nume-
ro proprie in excessu, toto genere præter naturam,
Galeno auctore, *lib. de diff. morborum*, qui ex qualita-
te doloris primo percipi potest: sentiunt enim in
renibus dolorem aculei infixi, ex Paulo, & iuxta
Hippocratem, in renibus grauem, cum cibo imple-
ti sunt, ut 6. de morb. vulg. & inter initia etiam aucto-
re Galen. 6. de morb. vulgaribus, vomitus pituitosi fi-
unt, per peritonæum ipsis copulato ventriculo, si
crassi naturaque pituitosiores existant laboran-
tes. Malo quoque perseverante æruginosis vo-
mitus superuenit, ob dolores ac vigilias corrupto
sanguine (*ut Galen. inquit*) idque maxime cum v-
na febricitauerint & inedia macerati fuerint. A
quibus vomitibus leuiores ægri euadunt, cum ci-
bis euacuati sunt; & ab accessionibus quidē libe-
rantur, sed non ab affectu, eodem Galeno teste, are-
nulæque rubræ subsident, & cruentum meiunt,
ex Hippoc. calculis proximas partes vulnerantibus,
etiam prius dilutas purasque vrinas reddentibus,
postea & crassa subsidentia & arenosa, test. Galen.
6. de loc. affect. lapide cum vrina exeunte a dolore
liberantur, & simul locus affectus manifestabitur.
Accedit ægris loci dolor, inquit Aetius, tumore
nusquam foris apparente, nisi inflammatio per la-
pillos producat, spina ægre flecti potest, & to-
tum corpus ad motum pigrum est; crura torpent,
& maxime crus reni affecto propinquum. Vrinæ
circa obturationis principium paucæ, aquosæ
minguntur, postea vero perfecte earum suppressio

contingit: alius nihil excremit, verum promittu-
dines multas ad egerendum facit. Excremitur et-
iam aliquando sanguis propter violentiam calcul-
lorum, præsertim asperorum. Ceterum ubi lapis
e renibus fuerit emotus, & ad vesicam delatus, v-
rinæ multæ prodeunt arenosam subsidentiam ha-
bentes, & alius similiter large egerit. Sensus au-
tem æger percipit, veluti calculo a renibus ad vesi-
cam transeunte, Hac Aetius.

O B S E R V A T I O XX.

De quadam matrona calculo renum & morbo ar-
ticulari laborante.

Refert Guainerius, calculosam passionem domi-
nam arthritidem seu morbum articulare diligere,
& tantam simul cum ea habere affinitatem, ut
vna sine altera aliquem rarissime inuadat. Quibus
malis Guilhelmina de Oostboren frequentissime
laborabat, mulier ditissima & valde delicate vi-
uens. Vtebamur autem terebinthina lepillime,
superforbendo cochlear vnum syrup. infus. ros.
commun. cum calidos renes haberet. Nam pro
renibus expurgandis in hoc casu terebinthinam
vtilissimam semper inuenimus. Venit enim tunc
mihi in mentem Monachus ille, de quo agit A-
matius centur. 1. cur. 63. qui cum articulari morbo, si-
mul & nephritide, corripitur, & nullo remedium
genere ex multis tentatis bene valeret, tandem monitu
Amati assiduo terebinthina esu intra sex menses liber a
dictis morbis euasit. Erat autem terebinthina nunc ma-
gnitudine, quam singulis diebus ieiunus saccharo admi-
xtam deglutiebat. Terebinthina antiquitus pro alio
subducenda tantum utebantur: Neoterici vero eam pro
renibus expurgandis, ac aliis variis intentionibus im-
plendis, in vsum traxerunt, ut Amatus in commentariis
suis in Diosc. abunde demonstrauit. Neque discrimen vl-
lum inter vulgarem terebinthinam, modo bona & pura
sit, facit, & eam, quæ a terebintho arbore desumitur, &
dissimulatur habetur, quam utrique communes vel pares
habeant possessionis.

S C H O L I A.

De arthritide suo loco dicemus: sed nunc de
calculi sermonem prosequamur: & quam-
quam de calculi materia nonnihil diximus
Schol. Obs. 17. attamen de materia ipsa ac causâ ef-
ficiente & generationis modo in vesica & renibus
non eadem omnium sententia. Alii autem mul-
tam materiam crassam ac terream primum cogi
in vnum in vesica, existimant, cuius pars intima
concrescit, tandemque si non efficiatur, calore &
frigore, parte tenui consumta, in lapillum coale-
scit. Hinc voluitur ab vrina, & semper sibi quip-
piam adiungit, atque sic augetur. Causam autem
efficientem esse tum calorem tum frigus, vnde in
senibus & pueris generantur, non in iuuenibus.
Paulus materialem causam (*cap. 45. lib. 3.*) dicit,
esse crassam terreumque humorem. & Galen. modo re-
nacem, modo crassam, modo vtramque materiam. &
ex sola pituita crassa & viscida cinerei caloris præ-
cipue existunt. Si pituita lenta crassa mixta sit
cum paucio sanguine, sicuti in priore vrinarum
subsidentia, similis colori tophorum & cinerei:

De calculi ma-
teria, causâ ef-
ficiente & ge-
nerationis moda
in vesica & re-
nibus, non ead-
em omnium
sententia.

Causa materi-
ales.

ita & hic subsidentiae color pro succi maiori copia euadet nonnunquam veluti ex pallido alboque mixtus, aut ex rubro & albo, aut ex flauo & albo, nonnunquam vero & rufus erit; pariter quoque & arenulae, quae in vrinis subsident: ipso siquidem sanguinis colore ad colorum differentias faciente, qui neque hominibus exquisitè ruber semper est, sed interdum quidem ad atrius, interdum ad flauius & rufius vergit, eodem Galen. teste, quo fit, ut ipsi etiam lapides, quemadmodum & antea diximus, inter se colore reperiantur differentes; similiter & arenulae in vrinis subsidentes, ob diuersam materiam, ex quibus fiunt: Nigri enim & subalbidi & pallidi reperiuntur, ut inquit Aetius, quandoque etiam rufi reuera, id quod saepius accidit: Et propterea Hippocrat. arenulas rufas in vrinis subsidere asseruit, tamquam eo saepius contingente. Quamquam per rufum colorem, potuit omnes iam dictos intelligere, praeter cinereum, ut testatur Galen. & citatur a Donato. Non ab re itaque Aetius materialem causam generationis calculorum assiduas esse cruditates inquit, unde materiae incoctae ac crudae multitudo congregatur. Et Alexander Trallianus simul cum Galeno humores crassos ac lentos esse fateatur, cap. 4. lib. 9. Sed quod quidam causam efficientem esse velint, modo calorem, modo frigus, unde & in senibus & pueris calculi magis, quam in iuuenibus, generantur, id alii non ita admittunt, atque causam effectricem esse volunt, praecipue igneam in renibus caliditatem, ut inquit Alexander & Aetius. A frigore autem, ut & Donatus annotauit, ipsi generari non valent: numquam enim fieri potest, ut viuo corpori tantum frigus accidat, quo concrefcere valeat in homine lapis, quemadmodum fieri in externis videmus, ut liquet apud Galen. de renum affect. dignot. accurat. quamquam, non semper ex eodem calore, sed quandoque vehementi, interim autem non ita vehementi procreentur, prout eorum materia magis apta est, ut induretur. Ob quam etiam caliditatis diuersitatem lapides quoque colore differunt. Et sic, secundum quosdam, causa efficiens est ignea vel forsitan tepida, ut in aquis thermarum tepidis euenit, licet in diuturna actione, quamuis agens sit debile, tamen longo tempore perficit operationem suam. Sic alii ex Hippocr. materiam faciunt, vrinam adustam a feruore & ardore. Quorum enim alius ardens & feruida fuerit, in his etiam necesse esse vesicam idem perpeti; quum enim magis, quam pro natura fuerit calefacta, stomachus eius inflammatur, vbi vero haec perpetitur, vrinam non dimittit, sed in ipsa concoquit & adurit: & quod quidem tenuissimum in ipsa est excernitur, quod purissimum, transit & emittitur. Indicio esse, quod vrina splendidissima excernitur instar feri. Brassauolus tertium modum adfert, ex eodem Hippocr. Fieri enim ex arenis, sedimento velut glutine copulante. Hoc quibusdam non placet, quia natura, ut statim arenam senserit, protinus eiicit. Et cum renum calculus nudus sit, adeo vesicam vexat, ut diu

non possit retineri; quare nec augeri. Contra nonnulli nullum in vesica lapidem generari aiunt, quin in renibus principium & rudimentum habeat, de quo postea. Ex his iam utcumque patet generatio lapidis & arenularum: quamuis materia arenularum est crassa, non multum viscosa: lapidis vero vel calculi est viscosa, crassa & secundum plurimum pituitosa, ut neoterici quidam sentiunt. Et ita fere secundum omnes materialis causa calculorum est humor crassior. Efficiens, ignea caliditas. Sicut etiam in externis (inquit Trallianus) videmus. Nam ex igne & tali materia idonea singuli vasa conficiunt, ita ut ne ab aqua quidem dissolui possint. Quae cum ita habeant, studendum est, ne materia in renibus crassior generetur, neque ipsi ignei & intemperati fiant. Nisi enim horum aliquid exstiterit, nunquam calculus constitui poterit. Interea tamen, ut recte meo iudicio nonnulli addunt, oportet, ut eiusmodi materiae retineantur longo tempore in dictis membris, alioquin non fiet calculi generatio. Eaque retentio non erit minima causa generationis lapidis; imo quae simul sit consideranda. Neoterici quidam (de quibus etiam consulas Gradum) hanc causam retentionis modo referunt ad materiales, modo ad accidentales, ab intemperie, compositione, vel vtriusque: ut Rhases, qui eam refert ad debilitatem virtutis expulsiuae renum aut vesicae, ad intemperiem, modo simplicem, modo compositam, calidam nimis, attrahentem humores ad renes, frigidam nimis meatus constringentem, ad compositionem quoque, meatuum dispositionem, stricturam, aut amplitudinem, oppilationem. Guainerius triplicem causam retentionis colligit, materiae viscositatem, viarum oppilationem seu stricturam, & expulsiuae debilitatem. Alii causas antecedentes esse volunt, humores crassos viscosos in toto corpore, vel in renibus aut vesica, malam temperiem frigidam constringentem, calidam excedentem. Huc pertinent & internae causae: nempe humores viscosi, aut quouis alius in renibus: & quadam ex his rursus immedata sunt, ut materia crassa, viscosa, pituitosa, sanies, melancholia vel sanguis crassus, alius humoribus commixtus. Remota, cruditates, crapula. Ita & externa, aer calidus, siccus, resoluens, crassus, nebulosus, statio in sole, balnea calida, frigus constringens, balnea aluminosa exsiccantia, decubitus supra culcitam mollem, vestes pellibus suffulta dorso constricta, & dorso ad ignem sedere, quoduis exercitium vehemens, & equitatio dura, violenta, repletio maxime post cibum, cibi omnes crassi, viscosi, otium, omnes fructus frigidi, styptici, & fere innumeri alii. Haec de causis. Reliqua quae ad modum generationis adhuc spectant, in quo non omnes consentiunt, sequenti scholio latius pertractabimus, hoc prius interposito exemplo.

OBSERVATIO XXI.

De calculo in renibus confirmato, cum intolerabili lumborum dolore, ac vrinae difficultate.

Quidam calculum confirmatum in renibus habebat, cum intolerabili dolore lumborum, & difficulter mingebat. In hoc curando intentio nostra fuit lapidem fixum, quantum possibile erat, e suo

Effectrix causa calculi.

5. Differentia inter materiam arenam & lapidem.

Causa retentionis materialis lapidis.

6. Causae antecedentes.

Interna immedata, remota.

Externa.

ē suo loco mouere, viasque emollire & aperire, ac dolorem mitigare: ideo omnium primo emolliens enema confert, dilatans & dolorem mitigans ac aluum leniens. Oportet enim curationem aspiciari a doloris mitigatione: nam inter initia nullo modo solutiua fortia aut diuretica conueniunt, vt antea dictum est. *℞ rad. althæe mundata ʒj. folior. althæe, malua, viol. parietaria, ana m. j. flor. melilori, chamomill. ana p. j. semini lini, fenugraci, ana ʒj. ʒ. caricar. ping. num. vj. sebesten. num. v. sem. quat. frigid. maior. ana ʒj. ʒ. fursuris in linteis ligati p. j. coquantur in aqua communi pro ʒx. adde cassia recens extracte ʒj. zaccb. rubei ʒj. ʒ. butyri recentis ʒij. olei communis & amygdal. dulc. ana ʒj. salis parum, fiat enema.* Quo clystere duriora excrementa deposuit. Et quia erat robustus, & dolor magnus, vena ex molleolo, vt incideretur eodem die post clysteris operationem, iussi, & hunc fotum ex anodynis veris, quæ calorem temperatum habent, præscripsi. *℞ rad. althæe cum foliis, foliorum maluar. ana p. j. ʒ. sem. lini & fenugraci ana ʒj. decoquantur in aqua communi, vel melius in hydreleo q. s. & in illo decocto spong. a madesacta & expressa regionem renum fouebat.* Mox sequenti vnguento locus dolens inungatur. *℞ butyr. recentis, olei amygdal. dulc. axungia gallina, anseris, ana ʒj. ʒ. olei chamomill. anethini, ana ʒij. cera exigua. misce. dolor parum mitigabatur.* At cum rursus aluum non deponeret, die sequenti hic clyster iniectus est. *℞ althæe cum rad. malua cum rad. sol. beta, mercurial. pariet. summitatum anethi, melilori, ana m. j. flor. chamomill. p. j. caric. ping. num. vij. fursur. in linteis colligati p. j. sem. anisi, carui, feniculi, lini, fenugraci, ana ʒj. ʒ. coquantur in aqua communi q. s. & huius soluturæ accipe ʒx. vel ʒij. adde olei communis, chamamel. anethini, ana ʒj. cassia mandat. diacathol. ana ʒj. ʒ. benedicta laxat. ʒij. diaphefici ʒj. butyri recent. adipis anseris, ana ʒj. ʒ. misce. quinquies excreuit egregie cum alleviatione.* Rursus fotum adhibuimus & vnguentum: & licet dolor nonnihil esset sedatus, tamen lapis adhuc fixus renibus inhærebat: quare cucurbitulas siccas sine scarificatione supra renes affigere iussi, deinde aliam paulo inferius; & rursus aliam atque aliam deinceps, parius interuallis oblique, vsque ad inguina, vt sic calculus in vesicam descenderet. Conducunt enim non parum cucurbitulæ eiusmodi absque incisione adhibita: quæ sæpe lapidem celiter adeo transferunt, vt subitam eius malileuationem comparare possint, lapide nimirum in locum ampliorem translato supra a renibus initium facientes ad inguina per obliquam earundem partium (quas ilia appellant) positionem procedentes: quo loco frequenter dolores incidunt, propter situm meatuum, qui vretetes appellantur, sed prius fotu illo relaxante & emolliente post clysterem tantisper utebamur, quantisper eis lapis in rene hærebat, & non utebamur cucurbitulis, cum dolor vehementius instaret, sed ipso aliquantulum lenito. Nam iis dum vehementius dolores infestant, iuxta Aetium, non vtendum nisi iisdem parum lenitis, & inflammatione

non impediēte. Et ita cum fotu continuo dolor mitigaretur, tandem etiam adhibitis cucurbitulis, sentiebat calculos aliquos per vretetes in vesicam descendisse, & cessabat difficultas mingen- di. Mitigato dolore, quod fieri debet prius, quam lapidem expellentia & comminuentia exhibeamus, ventriculum expurgauimus, & vias, quæ sunt ad renes, ne humores alii vna cum medicamentis lapidem comminuentibus sumtis ad renes descendant. Purgaui autem hoc modo. *℞ vuar. passul. ab arill. repurg. ʒj. ʒ. caricarum pinguium, nam. v. glycyrr. ʒj. ʒ. capill. ven. veri & recentis p. j. quat. sem. frig. maior. ana ʒj. iuiubar. num. v. fiat decoct. in aqua communi: & huius accipe ʒij. cassia recens extract. ʒj. ʒ. syrup. viol. ʒj. ʒ. misce. fiat potio. sumat in aurora.* Prandebat æger sumta portione hora solita. Id faciendum etiam si non operetur. At æger ex ea portione aluum egregie deposuit, cum magna alleviatione: alioqui si ante cenam non operata fuisset, iniecissem (vt aliquando feci, cum maxima vtilitate) enema sequens. *℞ iuris pulli ʒx. cassia ʒj. melis ros. colati ʒj. ʒ. olei communis vel amygdal. dulc. ʒij. salis parum, fiat clyster, qui ante cenam infundatur.* Mitigato igitur dolore, ventriculo & viis expurgatis, ad ea descendebamus, quæ calculum comminuunt & expellunt: quale est decoctum rad. o- nonidis, lappa, petros. graminis, & cicerum rub. chare- folii, ac seminis milii solis, petros. & similia: quibus & paruos calculos rubros vna cum lotio redde- bat, & a dolore liberatus est, & libere potuit min- gere. Memini anno 1556. Maynardum illum, qui Alcmariæ in insigni petasonis habitabat, calculo renum misere laborantem (quem empiricus sacerdos perperam cum diureticis primo curabat) me postea curasse, cum ad illum accitus essem, primo emollientibus & relaxan- tibus supradictis adhibitis; demum dolore sedato hoc apozema cum pilulas exhibuisse, quibus arenulas cum lotio demisit, adeo vt egregie etiam simul a difficul- tate mendi, cum mingere non posset, tum cal- culo curatus fuerit. *℞ rad. glycyrrhiza, feniculi, a- pii, asparagi, brusci, cichorii, ana ʒj. ʒ. foliorum pariet- aria, feniculi viridis, charefolii, saxifrag. scolopend. ce- terach. capill. veneris, ana m. j. sem. feniculi, anisi, cu- mini, ana ʒj. sem. leuistici ʒj. ʒ. fiat decoctio, in duabus partibus aquæ communis, & vna parte vini Rhenani o- ptimi, pro ʒij. ʒ. colatura addendo syr. de quinque rad. ʒij. misce, sumat bis in die ʒij. vel v. prius trib. his pi- lulis deuoratis. ℞ terebinthina sapius lota cum aqua fe- niculi, & parum tosta ʒij. trochisc. alkachengi sine opio (nam aliquando & dysuriam patiebatur ex reni- bus læsis, & quasi vlceratis a calculis asperis) ʒij. pulueris liquir. ʒj. ʒ. fiant pilule parue, ciceris instar.* Atque his remediis ilico gratia diuina fuit cura- tus, & lotium deinde optime mittebat cum are- nulis.

S C H O L I A.

Qua parte renum calculi genarentur, magna inter auctores est controuersia: alii enim duntaxat in renum cavitatibus concreescere pu- tant: alii cum Hippocrate & Galeno a. de natur,

Qua parte re-
num calculus
generetur.

human. tum 6. de morb. vulg. ac lib. de renum affecto-
rum dignotione ac curatione, absque controuersia re-
cte tenent eos, non solum in renum sinibus posse
concrefcere, verum etiam in eorum carnibus
procreari, vt & aliquando conspeximus in cada-
ueribus post mortem incisis. Et quod quocun-
que (vt etiam sentit Donatus) loco generationem
habeant, in rene adsit grauis dolor, siue per gra-
uem acerbis significetur, siue tamquam alicuius
grauis loco incumbentis sensum inferentem intel-
ligamus, diuersis tamen temporibus. Nam si in
renum cauis fuerint orti, in solo per vrinarios me-
atus transitu grauissime dolent laborantes. Si ve-
ro in ipsa renum carne fuerint creati, non solum
inter exeundum, verum etiam creationis tempore
dolorem inferunt. Pariter & quando in renum
sinus peruadunt. Modus autem generationis
(inquit Donatus) talis existit. Nam cum renes
quicquid serosi, tenuisque cum sanguine in valis
permixtum est, ad se ipsos attrahant (superius de-
monstrauimus) meatibus id in renum ventriculos
percolantibus latius patefactis, aliquid etiam ex
crassioribus succis, simul illabitur. Quando igitur
istud calfactum in renis cauo, ad tophi consi-
stentiam redactum fuerit, si renum vis expulso-
ria omne id vna cum lotio extruserit, arenosæ in ipso
subsidentia fiunt. Quod si renis cauo pertinacius
inhærescat, aliquid aliud eiusdem materiae ex ve-
na caua suscipiens, sibi que apponens, plus auge-
tur: semper enim quod recens influit, priori cir-
cumdatur: atque ita insigni magnitudine tophus
grandescit, exulto arefactoque crasso & vilcido
humore, atque ad tophi corpulentiam redacto.
Cum vero in renum carnibus generantur, pro-
portione tophis in articulorum morbo genitis
correspondent, vt liquet ex Galen. Hippoc. auctorita-
te 2. de natur. human. & 6. de morb. vulgar. Nam
si idem sanguis, qui in renes deriuatur, crassior ac
pituitosior se ipso existens, seu etiam ad atram bi-
lem vergens per venas & arterias in renum sub-
stantiam feratur, quantitate vel qualitate, aut con-
sistentia excedens, astringitur, detentusque con-
cipit caliditatem præter naturam, quæ amplius e-
um densat, agglutinat, & assat, assatumque ipsum
in terram & lapidem commutat, quemadmodum
si in cavitatem delatus esset: vtroque enim modo
lapides fieri posse in renibus clarum est, cum suc-
cus tenax, & crassus tempore aliquo assatur in iis,
itaque exsiccat, vt eodem libro de renum affectuum
dignot. & cur. scriptum est. Sed quod ad genera-
tionem calculi vesicæ attinet, maior apud medi-
cos excellentiores controuersia est: cum enim hu-
ius causam plerique omnes tradant crassum quo-
que esse & crudum succum, qui per venas cum v-
rina in vesicæ capacitatem influat, in qua tam-
quam fex subsidens, loci calore exarefactus sensim
lapidescat: tamen Fernelius nullum lapidem in
vesica generari existimat, & in omnibus calculis
medium quasi nucleum reperiri; verum rudi-
mentum a renibus exturbatum. Philotimus con-
tra, sæpius in vesica propter capacitatem caleulos

generari scribit. Sed contra respondet Fernelius,
inquiens: At vero quid limum istum (nisi forte admo-
dum angusta aut obstructa sit vesica ceruix) tam diu
possit illic remorari, non video, cum & sanguinis gru-
mus, & pus, & mucosa lentæque pituita, aliæque
multa crassiora facile illinc profluant cum vrina. His
argumentis adductus aliam cepi causam (inquit)
inuestigare, ac tandem comperi omnem calculum in vesti-
ca conclusum, rudimentum quoddam e renibus traxisse,
e quibus per nephriticum dolorem excidens, si grandu-
sculus est, in vesica aliquamdiu hæret, ac plerumque per-
sistit, illicque allatarum sordium adhasu coagmenta-
tur, dum verus confirmatusque lapis fiat. Ita qui-
dem neminem hætenus offendi in vesica calculum habe-
re, qui nephriticis doloribus diuexatus ante non fuisset.
Et quoscumque exemptos vesicæ calculos obtinui (obtinui
autem experiendi gratia permultos) in eorum medio
quasi nucleum reperi, verum rudimentum e renibus ex-
turbatum, diuersi quam reliquum integumentum ac
inuolucrum & coloris & substantia. Hæc ille, o-
stendens capacitatem vesicæ iustum argumen-
tum non esse: & experientia contrarium docet,
contra communem & veterum medicorum opi-
nionem. Quam Rondeletius his verbis quo-
que oppugnat: Decipitur vero (scilicet Fernel.)
in hoc, quod putet, quod aliquando sit, & aliquibus,
semper & omnibus fieri, scilicet lapidem vesica accepisse
initium a renibus, cum post nephriticum dolorem non
reiecit, sed retinetur in vesica, in qua obducitur muco
quodam, quo pars internæ vesicæ munita est, & a crudo
succo, qui cum vrina illuc peruenit. Verum id in omni-
bus non contingere, experientia docet. Pueri in vesti-
ca sæpe calculum habent, qui nunquam nephritim passi
sunt, nisi in utero sint passi. Nam cum lapide natos
multos vidi, qui a parentibus hereditario iure accepe-
runt. Ratione id posse fieri ostendo. Si lapis renum
coagmentationem accepit in vesica, vt cogitur fate-
ri, generari potest. Nam & iisdem causis genera-
tur & accrescit. Augescit ab eadem materia, ex
qua fit, scilicet a crudis, lentis, limosis succis, & a ca-
lore partu, tamquam ab efficiente causa. At talia re-
crementa retinentur ad coagmentationem: Ergo &
ad generationem; non in omnibus, sed in his, qui cru-
dis, lentis, & viscosis humoribus abundant, & qui-
bus meatus strictiores sunt, & qui diutius vrinam re-
tinet, ob quam retentionem crassa in fundum descen-
dunt, & subsident, quo tempore partes illæ in lapi-
dem concrefcunt. In vesica succus crudus citius con-
crefcit, quam in renibus, ob minorem calorem. Mi-
nus enim calet vesica ipsis renibus. Sanguis enim cru-
dis succis mixtus coalescit, & liquidiores succos reddit
minus aptos, vt in lapidem vertantur. Erit calculus in
vesica & in renibus, vt grando in pulmonibus, & lapis
in collo, vt refert Paulus lib. 3. Lapides hi inter se
differunt. Nam qui in renibus fiunt, ex arenulis
simul coniunctis generantur, & figuram sumunt a re-
num sinu. Si enim in primo sinu retineantur, habent
veluti aculeos: qui vero per vretes redduntur, figu-
ram in vretere accipere videntur, quia oblongi sunt, &
nucleis pinearum similes magna ex parte, si non fran-
gantur. Lapides vesicæ calculi fluuiarilibus similes
figura

Controuersia
medicorum de
modo generati-
onis calculi in
vesica.

Fernelii opinio.

8.

Rondelet. con-
tra Fernelium.

9.

Differentia la-
pidum.

6.
Modus genera-
tionis calculi in
renibus.

7.
Modus genera-
tionis calculi in
vesica.

figura sunt, scilicet rotundi fere, vel figura lentis, non ex arenulis, sed ex materia lenta, qua velut laminas depurum facit, leues magna ex parte, qui in vesica initium sumunt. Verum qui e renibus rudimentum acceperunt, in medio veluti nucleum habent, ex multis arenulis compactum. Quod si continuo e renibus arena descendat, asper efficitur ob arenam muco permixtam alligatamque. Lapides pulmonum, quia a pituita resicata sunt, grando dicuntur, quia grandini assimulantur in duritie & substantia. Lapis e colo intestino reiectus vesicae calculus similis est. At qui ab abscessu redduntur, ossibus similes esse solent, colore fusco. Tales ab abscessu hepatis, matris doctissimi curasdam Nemausensis redditos vidimus, & abscessu intestinorum mulieris Montisbani, qua mulier post varios dolores tabida erat, hacque menstrua nunquam passa fuerat, & tamen peperit duodecies. Liberorum multi adhuc superstites sunt. Hactenus Rondeletius. Memini ego in puella 22, annorum filia Petri Opmeri, tabida, ossicula & frusta lapillorum, & nescio quæ & varia ex longo fluxu laborante excreta; quæ tamen nullis remediis iuuantibus tandem consumpta obiit. Ceterum de vesicae calculo hæc per transfennam dicta sufficiant, nam de eo serio tractabimus libro sequenti. At nunc de calculo renis, quæ adhuc vtilia esse videbuntur, in medium profertamus.

OBSERVATIO XXII.

De calculo in renibus periodos dolorem inferente, qui dolor admodum insignis vnico clysteri euauit.

Nihil æque (vt longa experientia experti sumus) in calculosis, quibus dolor in renibus per interualla recurrebat, alio existente duriore vel obstructa, confert, quam statim clysterem iniicere: imo hoc adeo aliquando iuuare comperimus, vt aliis medicamentis non opus sit, quem admodum anno 1562. euenit reuerendissimæ & nobilissimæ Dominæ Abbatis de Loelduynen admodum vetulæ, amicæ Domini de Egmont, matronæ mehercule admodum probæ & religiosæ. Hæc cum frequenter dolore nephritico admodum vehementi ex calculo renum afficeretur, ita vt anno 1562. mense februario eundem dolorem grauissimum incurreret, ac ex medici astantis præscripto infusum rhabarb. & folior. senæ accepisset, ab illa assumptione pessime habuit, & dolore supra modum aucto me vocauit. Statim proposui, vt enema anodynnon & emolliens, cum ex infuso ventrem non deiecisset, & inde grauius haberet, iniiceretur. Primo renitens tandem admisit: eoque iniecto omnis dolor eo tempore miraculi instar euauit. Talis erat clyster. ℞ radit. malua cum foliis m. ij. radic. althææ ʒ j. ℞. mercuriali parietaria, beta, caulium rub. ana m. j. florum chamomill. meliloti, summitatum anethi, ana p. j. sem. lini, fenugraci, ana ʒ ij. semin. anisi, feniculi, ana ʒ j. fiat decoct. in aqua communi, pro ʒ xij. adde cassiæ recens tractæ, diacatholici, ana ʒ ℞. benedicta laxat. ʒ ij. vitellum vnius oui, olei amygdal. dulc. chamomelin. anethini, ana ʒ j. salis communis ʒ j. ℞. mi-

scæ. Eodem modo ante hanc generosam dominam, anno 1558. mense Maio simili dolore correpta fuit matrona proba, vidua Adriani Stalpar-di in Hagha Comitit. Medicus eius Domesticus existimans dolorem colicum esse, exhibet decoctum senæ, tum alia; quo quidem medicamento secessum habuit, sed dolore multo quam prius vehementius infestante. Altero die cum lotium ad me misisset valde sabulosum, suspicionem mihi rebuit de calculo in renibus: atque eodem die ad illam vocatus, altero medico Leydam profecto, cum dolor in lumbis fixus maneret, subinde ad ilia procedens, & sabulum in lotio conspexissem, potius nephriticum dolorem ex calculo renum existimaui, quam colicum, ex dictis Galeni 6. de loc. affect. cap. 3. sic dicentis: Quum enim a medicamenti potione sabulosa quædam subsidere conspicerem, nephriticum affectum esse cognoui, atque deinde reliqua medicamenta ad calculum facientia adhibendo curationem perfeci. Ceterum quod hoc vitio laboraret, minus dubitare cœpi, cum eodem dolore circa lumbos alias laborasset, & eo sopito, cum grauis non adeo esset, sabulum ipsa in matula conspexerat. Quare enema iniiciendum dixi, & ad vtrumque etiam malum valere, etiamsi colicus dolor esset, (vt prior medicus huic persuaferat) & dolorem colicum non minus quam nephriticum, quem ego causam esse dicebam, statim tollere posse. Ea igitur annuente & admittente, ob insignem dolorem, tale statim, vt iniiceretur, iubeo. ℞ parietaria, mercurial. viol. malua, summitatum anethi, florum chamomill. meliloti, ana m. ℞. sem. malua, fenugraci, ammi, feniculi, carui, anisi (nam videbatur adesse ventositas in muliere vtcumque obesa & crassa) ana ʒ j. ℞. fiat decoctio in aqua communi pro ʒ xij. colatura adde cassiæ pro clysteribus ʒ vj. benedicta laxatiua, electuar. hierapicra, ana ʒ ij. (quia valde pituitosa erat) olei chamomill. anethini, ana ʒ j. olei amygdal. dulc. olei scorpionis, ana ʒ ℞. vitellum vnius oui, salis communis ʒ j. ℞. fiat clyster, quo bis egregie aluum deposuit, & ab omni dolore liberata est, antequam prior medicus accedebat: qui adhuc sustinebat morbum colicum fuisse, quamquam postea multa sabulosa minxit, & consultum fuit, vt in posterum abstineret ab iis, quæ calculum renum procreare possent, atque eo victu vteretur, tum viuendi modo, de quibus supra obseruat. 18. dictum est.

SCHOLIA.

Quibus vero indiciis renum dolor a coli dolore secernatur, a Galeno lib. 6. de locis affectis ad longum docetur, & nos, cum de coli dolore ageremus, fusius conscripsimus. Breuiter ex colicis in dextris cum plurimum ilibus vexari, & ad stomachum pertinere & iecur & lienem, & aluum prorsus supprimi, vt ne flatum quidem per inferna transmittat, & si reddere aluum cogimus, quod ventosum est, bubulo simile, vel vitreum emittitur phlegma, vrinaque alba cernitur. Et licet Paulus Aegineta dicat, etiam nephriticis & iliicis communes notas videri, initio ven-

5. trem sisti, summos cruciatus sentiri, cibi tadium siue concoctionis, & peculiaris colicis eadem esse, verum diuturniora inueniri. At renum caussis, acutus hæret dolor, praxilli adaucti vicem referens, ac eiusdem partis, vbi infixus dolor est, testem dolore, ac coxendicem torpescere, tum reliqua adsumt, de quibus Scholio obseru. 17. & 19. huius libri. Et signa calculi renum demonstratiua ex iis locis statim dictis manifesta sunt, ex dolore in rene dextro vel sinistro extendente, grauante, subinde acuto & perforante, vt æger seipsum erigere vix possit, mictu frequentiore ob caliditatem & arenulis stimulantibus torpore cru-
 6. ris eiusdem partis cum rene affecto per consensum. Sed vbi mouetur ex renibus ad vteretres, dolor increfcit, & subinde cruenta mingunt, sentiuntque aperte ægri mutatum doloris situm: imo & descendere eos sentiunt, donec ad inguina dolor fiat, qua parte vteretres committuntur vesicæ, quando etiam multa spes est liberatum iri hominem, vt ego in multis expertus sum, qui lapides minxerunt, qui & cruorem mingebant, calculis vteretres dum transirent vias vrinales illas, quasi vlcerantibus. Demum cum subito cessat dolor, in vesicæ capacitate exsiliet lapis, & paulo post mingetur: qua parte rursus subinde dolorem excitat, & cruorem, sed non semper: nam calculi asperiores & paulo crassiores, aut maiores id præstant, minores minus & leues. Et cum is ex carne renum exturbatur, cruenta protinusemittitur vrina: qui si grandiusculus est, lethalis est, &, vt alii volunt, hydro-
 7. pen infert. Sed illa ad signa prognostica etiam pertinent. Sicuti & vrina atra ac turbulenta copiosemissa, exturbatum e renibus calculum & salutem pariter denuntiat. Et inter signa prognostica etiam illa, quæ lapidem futurum præfagiunt, non sunt leui pede percurrenda, cum præcautio non minus locum habeat, quam ipsa curatio. Signa igitur lapidem renum vel vesicæ præfagientia, causæ procatarticæ indicant, vt si quis piscibus vescatur perpetuo, vt Carthusiani facile in calculum incidunt, eoque magis quod pellibus vestiti, zona lumbos arcte stringunt, quæ renes inflammant; & ex materia piscium, quibus semper vtuntur, vitaque otiosa, nam nullo exercitio vtuntur, pituita viscida lenta coaceruatur, vnde tales, vt sæpe vidimus (vt & antea dictum est) calculis obnoxii sunt. Causæ corporeæ sunt, præcedentes cruditates, cibi repletiones, crudi humores, si coaceruentur, etiam ex cibis, nempe caseo recenti & veteri, pastillis, lactis vsu, pani similagineo, conchis, ostreis, fungis, & similibus, quæ inquam omnia fomitem præstant ad calculos gignendos. Huc etiam spectat corporis dispositio: crassi enim & pingues eo citius corripuntur, & quorum parentes calculosi fuerunt. Ita non solum viros & pueros, sed & fœminas corripit, impari tamendiscrimine. Virginibus ac fœminis rarius in vesica generatur: pueris frequentior. Viri quibus corpora pinguiuscula sunt, renum calculis facile periclitantur. Quod vero in adultis ac in declinante

Signa calculi renum demonstratiua.

Signa generationis lapidis futuri & lapides præfagientia.

potius ætate magis quam pueris renum hic affectus contingat, idem Gal. testatur 6. de morb. vulgarib. quemadmodum vesicæ calculis pueri frequentius laborant, quam ætate prouecti, vt fatetur Aetius. Idque non nisi ob diuersitatem caloris, qui in adultis crassos succos cogit atque inspissat, in pueris vero fundit, atque dissoluit, quemadmodum fusius sequenti libro de lapide vesicæ declarabimus. In pueris gignitur in vesica, ob edacitatem. Quod mulieres rarius afficiantur, fit propter menstrua, & laxitatem molliemque viarum. Sed contingit etiam laborare virgines tum fœminas: quemadmodum & virgo illa, quæ acum crinale deorauerat (de qua meminit Alexander Benedictus Veronensis in suis Anatomicis) oui magnitudine gallinacei lapidem in vesica, humoris mucidi circa acum sensim accretione ad vltimam fere tabem redacta, patefacta ceruice, magno impetu, lapidis ingens pondus in sellam demisit. Ceterum in adolescentia ac iuuentute. In quacunque igitur ætate, vt Galen. auctor est, mollior aluius, ac vesica temperati caloris ampliorisque meatus, iis lotium non difficulter it, nec quid turbidi in vesica remanet; quo fit, vt nulla fiat lapidis generatio cum meatus inueniat apertos. Ob eam rationem raro fœminis ac virginibus quoque ex breuitate, accer-
 8. uicis vesicæ amplitudine, id malum oritur. At viris corpulentis pinguiusculis calculi renum facilius contingunt, vt diximus: contra extenuatis & consumptis lapis vesicæ minatur exitum: si nulla præsertim in vrina resideant arenosa, & sæpe tortuosior reddatur, calculosi raro fiunt. In Septentrionali quoque regione infantia hoc malo plurimum infestatur. Et qui lacte, caseo & vinis crassis vtuntur, vt Ferraria; & aquis limosis, vt Lutetia, facile calculo corripuntur. Sumitur etiam futuri calculi præfagium ex parte vrinæ. Si vrina multa, crassa, turbulenta sit, & diu ita exeat sine crisi, & ita perseueret, & quis bono vtatur regimine viuendi, lapidem futurum prædicere licet. Vrina in primis crassa ita persistens, deinde conuersa ad tenuitatem, calculi suspicionem facit. Nam materia crassa, quæ solebat expelli, retinetur & incrassatur in calculum: & si dolor accedat in renibus, ibi calculum expecta: si vero in pectine, in vesica. Si emittitur vrina arenosa: sed aliquando naturaliter tales spectantur in biliosis, etiam a pueritia, vt Ioannes Matthæus de Gradi de se ipso scribit. Apparent etiam aliquando in declinatione febrium, & post febres diuturnas: sed tales quæ facile digitis compressæ dissoluuntur: duriores vero & difficulter dissolubiles lapidem præfagiunt. Refertur mirabilis historia de milite generoso, calculoso, nephritico in renibus, a Grado, qui quoties noctu somniabat se barbaria concoctu difficilia comedere & quod erant duriora & crassiora, vt cibi ex pasta confecti, eo die sequenti detinebatur: si de cibis boni nutrimenti somniabat, nullo modo afficiebatur. Sed cum semel somniasset se pisces magnos lacunales deuorasse, imo stagnum comedisse, habuit die sequenti crudelissimos dolores, præter rationem. Sed hæc ad abditas causas pertinent. At mere Prognostica hæc signa sunt, vt & quædam prædi-

Exemplum Virginis, quæ acum deorauerat.

Calculi præfagium ex parte vrinæ.

9.

prædicta. Quod ii, qui habent ventres molles & liquidos, raro calculis vesicæ, aut renum tentantur. Vnde & trauli raro capiuntur calculis, & qui vomitu vtuntur spontaneo, vel arte parato, bis aut ter in mense, magna ex parte a calculi generatione præseruantur, materia, vt in prædictis ad opposita conuersa. Bonum, si crassæ vrinæ prius, deinde tenues, rursus crassæ, & in fundo resideant arenæ, lapidem in via resolutionis esse declarant. Cum senibus fiant in renibus, pueris vero in vesicæ, si contrarium contingat, curatio difficilior erit. Puer quoque respectu aliarum ætatum difficilior a calculo præseruatur: ita senes difficulter sanantur, iuxta Hippocrat. *Vitia renum & vesicæ in senibus difficulter curantur.* Hi quoque facile reciduiam patiuntur. Qui calculum frequenter incurrunt, facile in excoriationem vesicæ incidunt. Calculosi dolores, si nullis medicamentis sedantur, miseram mortem & calamitosam minantur: vbi extremitates frigidae fuerint, & sudor frigidus faciem occupauerit, tunc presbyteris, (teste Guainerio) relinquendi: pulsu formicante, iam mors in proximo est. Si malum quoque hæreditarium, peius. Habet autem hoc malum sæpe suum interuallum, vt postea exemplis docebitur, ita vt quibusdam de mense in mensem redeat, ac de anno in annum, vt etiam Auicenna annotauit. In lapide magno & duro in vesicæ, curatio non est expectanda; & qui in renibus est, vel vesicæ, vna cum vlcere, impossibile est, vt curetur: nam quæ lapidem minuunt & frangunt, vlceri contraria sunt. In calculosis quoque arenosa substantia emicta, nigra, deterior est: deinde liquida peior quam citrina vel ruffa, aut rubra, cum a durior materia decidatur, a qua & durior lapis. Et arena, quæ difficilior frangitur aut rumpitur, deterior, cum a durior & magis resistente resolutioni materia coaceruata sit. Senes quoque etiam in vesicæ, si calculum habeant, raro curantur propter impotentiam expulsionis, coaceruationem superfluitatum, & malam digestionem. Et qui in renibus aut vteribus urinam plane prohibeant, & fortem dolorem inducant, neque per artem exeant, mortem inferunt. Senes autem intelligimus post 40. annos. Et quibus calculus in renibus aut vesicæ, & simul adiunt vlcera, raro perfecte curantur: antiqua scilicet & inueterata, & in corpore senili nunquam. Quibuscunque in vrinis arenosa substantia sedimina, his vesicæ aut renes lithiasin patiuntur, aphorism. 79. lib. 4. Vult Valescus exiguum calculum ciceris instar citius impedire vrinæ exitum quam magnum, eo quod citius in virga meatum descendat & ibi hæreat. Tamen in renibus, quanto fuerit maior tanto peior, quia per vias angustas transire non potest. In calida nephritide, acutus dolor, vrina rubens, mordax vel cruenta interdum emittitur, in qua arena subsidet rubra, febri ac siti cruciatur æger; nam & ii, vt plurimum salaciores sunt. Contra a frigida causa laborant seniores; & in renum partibus non adeo acutus, sed grauis duntaxat, hæret dolor, iisque vrina lactea, vel tenuis, alba, in qua vrina residet cinerea resolutio. Cæterum febris non semper ad-

est: sed in confirmato, quem natura nititur expellere, tunc in motu illo soluitur continuum, & ad eam solutionem sequitur aliquando febris, dolor & æstus, ex impetuoso motu sanguinis & humorum, & spirituum ad locum vbi dolor existit. In renibus (de quibus nunc potissimum agimus) consistunt lapides, aut parui aut maiores, & aliquando quidem pauciores, aliquando plures, magnitudine, & forma, colore, & asperitate & multitudine inter se differentes. Ex eorum autem numero rotundi & lænes facile excernuntur, non item, qui alia quacunque forma præditi sunt, maxime tamen, oblongi & asperi difficulter excernuntur, Actio teste. Affectus hic inter initia magna cum diligentia curari debet: namque vbi perseverauerit ac magnopere increuerit, ob dolores ac vigilias, sanguis corrumpitur, & æruginosus vomitus superuenit, (Galeno auctore) vel magnum imminet periculum, ne vires a vigiliis, & constanti dolore deiciantur, vt inquit Alexander Trallianus. Ad curationem igitur calculi in renibus existentis statim properandum erit. Ideo & alia exempla supradictis adiungemus.

OBSERVATIO XXIII.

De calculo renum, cum ingenti dolore & vrinæ retentione.

Dominus de Fama, Chiliarcha, anno 1585. tertio die Decembris, cum per periodos antea ex calculo obstructio in renibus laborasset, eoque subinde collapsa per vteres in vesicam, lotium omnino retinebatur: nunc in idem malum incidebat, cum intensissimo dolore circa renes: lotium omnino quoque retentum fuit, & adeo vehemens in nocte malum increbuit, vt me ex lecto vocaret. Cum igitur in accessione mali esset, & dolor illum adeo vrgeret, vomitu obrepente, non tamen iuuante, & vir admodum crassus & pituitosus esset, huic malo sæpius obnoxius, omnium primo accessioni succurrendum esse proposui: & postea, in tempore remissionis, reliquam curationem ad calculos diminuendos & expellendos esse persequendam. Oportet enim omni diligentia huic tam immitti malo & dolori atrocissimo celeriter succurrere. Nam ægrum sæpe tam acriter sine intermissione obruit, vt ex hac vita multis lacrymis & lamentationibus celerrime cogatur ire. Quare clystere omnium primo ventrem emollire studuimus, cum alium nequaquam depone- ret: idque statim faciendum esse ægroto consuluimus, ne meatus vrinæ magis obturarentur, cum stercora dura tum ventositates, quibus intestina repleta videbantur, dolorem renum ex calculo magis augebant. Et licet hic alius clysteriis inanienda sit (vt Alexander Trallianus etiam admonebat) non tamen admodum acribus, sed potius quæ copiosius oleum recipiant, possintque laxare, & comminuere citra acrimoniam. Tale est althææ decoctum, fenugraci, ficum siccarum, furfurum, chamamelis, & oleum chamamelinum. In calidioribus admodum etiam ptisanæ cremores cum rosaceo, chamamelo, &

luteis ouorum compositi. Mitigant enim & bonam loci temperiem inferunt, & morbi causam minuentes, eos, qui continue calculosi sunt, ne affectu corripiantur, prohibent. Verum cum sæpissime (ut dictum quoque est prius) etiam tempore paroxysmi ventositates in intestinis abundant, dilatantes & comprimentes renes, cuius causa dolor multum intenditur, uti in hoc viro eueniebat, & alius durior esset, tale enema feces emolliens, & educens, dolorem sedans & simul aliquo modo ventositates expellens, præscripsi. *℞ radic. althæe mundatæ ʒj. foliorum malua, mercurial. parietaria, florum chamomill. meliloti, summitatum anethi, ana m. j. furfuris in nodulo ligati p. j. sem. lini ʒij. sem. anisi ʒj. ℞. fiat decoctio in aqua communi pro t̄b j. colatura adde diacatholici, electuarii lenitiui, benedictæ laxat. ana ʒj. ℞. olei chamamelini, anethini, amygdal. dulc. ana ʒj. salis communis ʒj. salis gemmæ ʒj. misce, statim iniiciatur.* Tere o aluum deposuit, & dolor non nihil mitigabatur, & paucum lotii emisit: & ut magis irritaretur ad lotium reddendum, quod retinebatur, apponi iussi pectini cataplasma post operationem clysteris, ex parietaria in patella cum butyro prius fricta. Mane, cum satis robustus esset, & dolor non mitigaretur satis & venæ sectioni assuetus esset, & venas satis latas & amplas haberet, venam in cubito ex mente Aetii secari iussi. De qua venæ sectione latius in Scholio. Fotum quoque hunc adhibuimus: dolore enim perseverante non oportet a remediis quiescere, neque hora prætereunda est (ut Guainerius recte admonerat) quin apud ægrum aliquid faciamus: fecibus prius cum clystere eductis, ad fatus, sacculos, vñctiones, emplastra, in sessiones deueniendum est, cum recte enim dixerit Alexander Trallianus: *Calculo affecti in accessionibus quidem medicamentis curari debent, quæ laxare, lenire, & præterea comminueræ, postea & calculum educere possunt.* Ipse utitur balneo, & dicit omnium optimum esse, ut quod non solum mitiget, sed etiam curare possit: & inungit in balneo copioso oleo chamamelini. At quum in hyeme essemus, a balneo abstinentes, fotu contenti fuimus sequenti, & etiam sacculis. *℞ radic. althæe mundatæ ʒij. foliorum malua, parietaria, cheresfolii, florum chamomill. meliloti, ana m. iij. sem. lini ʒj. sem. malua, petroselin. ana ʒij. ℞. fiat decoctio in aqua communi, incisus primis & incidendis, & concussis concutientis, pro t̄b iij. pro fotu.* Reliquia deinde pistentur, & fiant duo sacculi quadrati: qui post fotum calide alternatim lumbis, inguinibus & pectini applicentur: quibus dolor multum mitigabatur, & lotium fluere cœpit. Præscripsi tunc, ut ex hoc decocto sumeret ad libitum. *℞ radic. ononidis, fœniculi, petroselin. glycyrrh. rasæ, ana ʒj. sem. althæe, malua, ana ʒj. ℞. cicerum rub. ʒj. ℞. sem. quat. frig. maior. ana ʒj. ficuum pinguium num. v. sebest. num. iij. hordei mundati ʒj. granor. alkachengi numer. vij. fiat decoct. in aqua communi pro t̄b j. ℞. addendo syrup. de limonibus, de quinque rad. ana ʒj. fiat apozema. calculos reddebat, sed exiguos. Dedit etiam per os id, quod sequitur: *℞ syrup. ex infus.**

ros. pallid. cum foliis senæ & rhabarb. ana ʒj. aqua malua ʒij. ℞. electuar. lenitiui ʒj. ℞. misce, & bis terue excreuit. Verum postea rursus redibat dolor, & alius retinebatur: quare ut iterum clyster iniiceretur mandavi, capiendo decocti pro clystere ultimo descripti t̄b j. addendo diacatholici ʒj. diaphœnici, benedictæ laxat. ana ʒij. olei amygdal. dulc. anethini, chamamel. ana ʒj. vitellum vnius oui, salis communis ʒj. ℞. misce, pro clysteri; & habuit quatuor vel quinque secessus. Et rursus sacculis appositis dolor mitigabatur omnino. Deinde ut calculos melius expelleret, & ipsi magis comminuerentur, dedi cochlear vnum atque alterum nostræ destillationis contra calculum, quæ fit ex rad. ononid. & raphani sylvestris (nostri vulgares Meerrettich nominant) cum vino Rhenano in balneo Maris destillata. *daham ʒij. ℞. pro vice, cum ʒj. ℞. oculi cancerorum puluerisati.* Do aliquando etiam sine oculis cancerorum, uti aliquando etiam multis consului post supradicta lenientia & emollientia, & præcipue Domino Villerio equitum magistro, cui & consultationem in scriptis dedi. Et ut adhuc viæ laxiores fierent, imperavi quoque ut renes, & oblique ad inguina descendendo pectinem inungeret, hoc vnguento. *℞ olei lilior. alb. amygdal. amar. ana ʒj. ℞. pinguedinis gallinae, caponis, ana ʒij. vnguent. dialthæe ʒij. misce.* Postea ut renes magis purgarentur & viæ vrinales, exhibui quoque hunc bolum: *℞ cassia recens extracta ʒj. sem. anisi, pulueris. ʒj. zaccaro candi asperso fiat bolus.* Et si dolor aliquando rediret, iubebam, ut flores chamomillæ decoqueret in ceruisia, & ex ea cyathum sumeret. Deinde vno atque altero die intermisso sumit & hunc puluerem. *℞ pul. specier. iustini ʒij. oculi cancerorum ʒj. fiat pul. detur cum cyatho vno decoct. infra scripta. etiam illud quod sequitur. ℞ pul. specier. iustini, lithontrib. ana ʒj. ℞. oculi cancerorum ʒj. Sed & apozema, quod sequitur aliquando sumebat absque pulvere, ℞ radic. althæe mundat. ononidis seu arrestæ bouis, petroselin. fœniculi, lappa, apii, ana ʒj. ℞. florum roris-mar. chamomill. ana p. j. agrimon. parietaria, cheresfolii, capill. vener. polytrichi, ana m. j. seminis anisi, fœniculi, carui, ameos, dauci, (nam valde ventositatibus homo crassus & obesus erat obnoxius quoque) ana ʒj. ℞. sem. petroselin. ʒj. sem. malua ʒj. iuiubar. sebesten, ana num. v. gran. alkachengi num. vj. fiat decoct. in aqua communi & vino Rhenano, ana p. a. ad t̄b j. coletur; clarificetur, prius cum zaccaro albisimi. condulcorato ad saporem delectabiliorem, cum ʒij. cinnamomi electi: fiat claretum.* Multos calculos ad magnitudinem parui pisi & cicerum modo citrinos, modo subrufos expellebat. Quia vero ventositatibus valde erat obnoxius, pro iis depellendis capiebat subinde ʒij. huius confectionis in tabul. *℞ specier. diacymini ʒj. dissol. in aqua flor. chamom. q. s. additendo zaccb. albis. ʒj. ℞. fiat confectio in tabulis.* Interea etiam renes in fine & inguina inungebat, vbicumque leuem aliquando dolorem sentiret, linimento infra scripto. *℞ olei liliorum ʒj. olei scorpionis, cheirini, pingued. gallinae, caponis, ana ʒij. misce. quibus re-*

mediis

mediis multis lapillis expulsis, eo tempore conu-
luit. Consului tamen, vt post expullos nunc la-
pillis, ne alii renascerentur, cum corpus obesum
haberet, victu exquisitè extenuante vteretur.
Nam scopus (*teste Alexandro Tralliano*) est, ne cras-
sior aut frigidior materia, quæ ad calculi genera-
tionem idonea est, congregetur. Ideo contra flu-
dendum est, vt bonam temperiem conciliemus, &
extenuantibus citra magnum calorem vramur.
Imperimus igitur, vt caueret cibos substantiæ
duræ, & qui ægre manducatione atteruntur, item
eos, qui multam substantiam habent, plurimum-
que nutriunt, & qui aceruatim digeruntur, ante-
quam perfecte coquantur, & qui grauis sunt qua-
litatis, siue difficulter commutantur, ac superna-
rant, & ægre per aluum subeunt, & inflant; item
eos, qui meatus obstruunt, aut alias diutius in
corporibus insident, *ex Aetii sententia*. Si autem
cibus boni succi & moderatus, vt *Paulus ait*: rarus-
que leguminum omnis generis, frumentaceo-
rumque vsus. A caseo, lacte, & quæ ab ipsis præ-
parantur, præcepi vt caueret. Nam omne lac eis
incommodum existit, præter asininum, propterea
quod ceteris omnibus est tenuius asininum: ideo
confert, *ex eiusdem Galeni & Aetii sententia*. Præ o-
mnibus satietatem vt euitaret, consului, vinoque
tenui urinam cienti, non valde veteri, vt quoque
vteretur: nam dulcia calculosis sunt noxia, & ru-
bra ac nigra: & summatim omnia, quæ crassi sunt
succi, ac nimis calida seu acria nocent. Confert
hic & a cœna, vt sæpe vomant. Quia tamen cras-
suses, & difficulter vomis, non incitandus vomit-
us, nisi ad illum pronus fueris. Laudant quidam
aquam tepidam ante omnem cibum bibere, ni-
hilque renes adeo recrementis vacuos tempera-
tosque reddere scribunt, vt non amplius calculos
procreare possint: nam temporis spatium igneus i-
psorum calor a tepore aquæ exstinguitur. Quare
probe faciunt, qui bibunt etiam in medio pastus
aquam, aut vinum refrigeratum, aut rosaceum,
aut violatum, *vt idem Alexander inquit*. Paulus ve-
ro a balneo, ante vinum, aquam temperatam po-
tandam ieiuno exhibet, tamquam omnium præ-
sentissimum remedium ad calculos arcendos. Sed
quia Dominus ex parte pituitosus est, ægre aquam
ferret stomachus. Curabis interea, vt intempera-
tis locis degas, (*quod tamen difficile erit militiam se-
quenti*) in quibus anni tempora & horæ nimio fer-
uore non infestent: frigora tamen magis quam
æstus cauenda. Assumes etiam otiosas deambula-
tiones & exercitia moderata. Etenim segnities &
ocium calculosis nocent. Ventrem semper, vt la-
xum habeas stude, idque sponte vel natura, ali-
quando cum cassia recenter extracta, si opus est.
Somno vtaris moderato, sed non in culcitra. Inter
leuia remedia quibus ad calculi diminutionem v-
ti posses, per interualla conuenit oxymelli vti, cum
quodam simpliciore urinam ciente, veluti adian-
tho, apio, graminisque decocto. Alexander ap-
probat palustris asparagi decoctum, eryngii &
herbæ quinquefolii & plantag. tum radicem, tum
vero folia & semen, accicerum ius. Si aliquando

languis abundare videbitur, maxime vere, curio-
se inspicienda erit temporis oportunitas, vt ve-
nam seces, cum consilio medici tui astantis. Id e-
nim Paulus & Aetius suadent, vbi sanguis abunda-
re videatur. Interea quum etiam pituitosus & sa-
tis crassus existas, & facile humorum copia asser-
uetur subinde ex commestationibus, eo quod mi-
litiæ sequaris, & non semper optimo victu vti
possis, non erit incommodum, prout videbitur
medico astanti pro ratione reduntantis succi pur-
gatione vti. Per interualla ea bibes, quæ urinam
ciere possunt tam simplicia, quam composita. *Vt
sunt decocta acori, rad. valeriana, graminis, nardi, ca-
lami arom. asari, dauci, petros. hyperici & roris. deco-
ctum*. Ex his singula eisque similia tum per se, tum
inuicem permixta præberi possunt: nam urinam
manifeste mouent, *teste Aetio*. Et in cibis vti quo-
que poteris pastinaca valde cocta, fœniculo, car-
duo, pulegio, calamintha. Ab eodem quoque na-
turalium aquarum vsus (*verum non sæpe*) tanquam
conuenientissimus commendatur. Similiter si per
plures dies rad. eryngii, vel dictamni decoctum bi-
bas, vel ononidis; quæ a me valde probatur. Vel
satis erit semel in hebdomada accipere $\frac{3}{4}$ ij. destilla-
tionis nostræ superius descriptæ contra calculum.

S C H O L I A.

Pro curatione calculi renum auctores in pri-
mis vitæ institutum, tum victus rationem pro-
bam præscribunt, qualem nos descripsimus *obser-
uat. precedente*. Similiter eligendo aerem purum
ac temperatum, somnumque paulo longiorem
consuetudo & quietem vitando, mediocria exerci-
tia admittendo, pro ætatis habitus roborisque æ-
grotantis ratione: violenta fugienda, & immodi-
ci animi affectus declinandi, cibique moderati &
bonæ concoctionis præcipiendi, vitando crudi-
tates morbum hunc asperantes & etiam generan-
tes: & reliquis iam dictis vtendo; caseum, omnia
acria, dulcia, crassa, tanacia & pingua relin-
quendo. Sed potius pristinam, vel eius cremorem, vel
gallarum seu pullorum, sternerum, phasianor-
um ius exhibendo, aut panem in eodem iure ma-
ceratum aut confusum carniū dictarum, vbi vires
requirant. Vinum tenue album non vetus, reli-
qua tanquam calculosis inepta vitanda. Sirque a-
qua lymphatum purissima, & purgata atque de-
cocta. Vbi renum hic affectus subito inuadat, &
qui laborat cibo nuper relictus sit, cibique adhuc
sint incocti, aut semicocti, ante omnem aliam cu-
rationem pro doloris mitigatione (*nisi quicquam
impedimento sit*) vomitum prouocare expedit.
Nam leuiore quidem a vomitibus euadunt, *vt an-
tea diximus*, sed Hippoc. & Gal. testibus, licet ac-
cessio mitigetur, sæpe tamen eo malum non tolli-
tur, quamuis leuetur. Interea tamen si æger nau-
seet, & ad vomitum sit procliuis, tunc vtile erit e-
undem leuiter incitare cum aqua communi & a-
ceto, aut oxymelle simplici, & aqua raphani, *vt
Guainerius suadet*. A vomitu tamen, vt paulo ante di-
ximus, ab affectu non liberantur, cum cibis vacui
sunt, vt Galenus asserit: (*qua idē ratione ex eiusdē Ga-
leni sententia, & alimēti recrementis, quæ in intestinis colli-*

11.
Clyster.

guntur, sub cibi nomine comprehenduntur) confestim euacuari debent per idoneos clysteres, modo nihil obstat: idque omnibus calculosis commune est, etiam si dolores paulatim irruant, & non repente incidant: qui ex fursurum decocto, caricarum, scœnugraci ac aristolochiæ, parari debent, ut inquit Aetius. Sint autem lenientes inprimis; qualis ille est, qui recipit viol. althææ, fursur. borag. ana m. j. ficuum, num. vj. sebesten, num. vij. ex his fiat decoctio, de qua accipe ℥ x. vel xij. & in ea dissolue cassiæ ℥ j. B. butyri recentis ℥ ij. olei communis ℥ ij. B. salis tritiparum. Talis vel similis statim est præscribendus, cum ad ægrum deuenieris, si feces retentæ sint. Alii iubent & feces educi per glandes. Neque hic statim (ut quidam imperiti medici faciunt) ubi ad ægros acciterimus hac passione laborantes, diaphœnicum aut electuarium indum propinabimus, aut simile quid cum vino maluatico, aut alia fortia diuretica quauis diei hora: nam qui id faciunt, non solum exhibendo talia pharmaca peccant, sed multo deterius cum vino maluatico præbent, cum potius dolores sedentur clysteribus lenientibus: nam ita fecibus eductis, maxima pars doloris sedatur: imo si calor & acumen post exitum stercoreis adfuerint, & post intestinorum mundificationem aqua hordei cum oleo violar. & oleo ros. & muccagine seminis lini & psyllii, ut quidam iubent, etiam iniiciatur. At si clysteri supradicto ab Aetio descripto etiam decenter euacuentur, tunc finire oportet: si vero non, etiam bis aut ter infundere. Quibus adicere possemus olei communis ℥ iij. mellis ros. ℥ ij. ac salis communis parum: vel ex maluarum, althææ, mercurialis ac betæ foliis, carycis ac fursur. decoctum paratur, pauco sale addito. cui adicias olei communis, anethini vel chamæmelini ℥ iij. mellis ros. ℥ ij. B. pulpa cassiæ nouiter extracta ℥ j. Et si ex his aliud non sufficienter excreuerit, ℥ B. diacatholici aut hieræpicæ, vel ℥ iij. confect. de dactylis seu elect. indi adicias, nec minus & ℥ j. butyri recentis, aut adipis anserini. Ceterum ubi venter sufficienter inanitus fuerit, quædam infundere oportet, ex Aetii præcepto, quæ corpusculorum circa lapidem sitorum inflammationes lenire, & laxare possunt: id ipsum vero oleum anethinum facere poterit, adipe galinaceo recenti in eo liquato, seu anserino, aut etiam butyro, quæ si non adsint, etiam scœnugracum & althææ rad. oleo decocto infundemus. Refert Guainerius, cum etiam tempore paroxysmi adsint aliquando ventositates in intestinis cum fecibus retentis, quæ comprimendo renes dolorem magis augent, tunc post lenientem clysterem, hunc vel similem iniiciendum: adice decocto maluæ, betæ mercur. chamom. etiam aliquid sem. anisi, scœniculi in ℥ viij. decoct. d. dissoluen-do benedict. ℥ j. cassiæ ℥ vj. duos ouorum vitellos, & ℥ iij. olei chamæmel. cum exiguo salis. Idem in hoc calu ℥ vj. olei chamæmel. absque re alia commode iniicere iussit. Interea ubi lapis in renibus adeo fuerit obturatus, ut vehementissimos attulerit dolores, si quid aliud non prohibeat, vena cubiti propinquæ manus in corpore ex repletione affecto secanda est, ex Aetii testimonio. Namque eis, qui

Vena sectio.

13.

sanguinis multitudinem congregant hæc venæ sectio commoda existit, ut ipse Hippoc. inquit. Verum lib. 6. de morb. vulgar. cum opus fuerit, iuuenibus præsertim poplitis venam incidere iubet, ubi sanguis multus aut crassus in venis abundet, ut Galenus inquit. Nam (ut ipse asserit) membra supra iecur cubiti venæ sectionem postulant, infra vero, crurum, in poplitibus videlicet, aut omnino saltem iuxta malleolos. Libro autem de renum affectorum dignor. aut curat. hæc oppositæ sententiæ conciliantur. Scriptum namque ibidem est, quod ubi valida fuerit virtus, venam, quæ in poplite est, aperimus, vel quæ ad malleolos: sin imbecillis, venam, quæ est in cubito. Nam si virtute debili infra euacuamus, retentrix facultas, quæ est imbecillis, non retinebit, sed vniuersa in præceps rapietur, & partem assiduo de fluxu impetet, succis videlicet in locum imbecillem perpetuo procumbentibus: sed cum perpetuo venæ sectio in Hippoc. & Galen. doctrina virium robur exigat, non video eisdem, (quod & Donatus etiam sentit) imbecillis existentibus cur vena secanda sit, etiam ea, quæ in cubito existit. Propterea cum eodem Galeno lib. de curat. per venæ sectionem, sic de ea sentirem, ac iam dictos auctores conciliarem: ait namque ambiguum esse, an renes partibus superioribus, an inferioribus ascribi debeant: & propterea eis affectis neque perpetuo in cubito secta vena, neque etiam in poplite, aut malleolis iuantur, sed ubi recens fuerit phlegmone, copiaque sanguinis affuerit, vena cubiti secanda est: quibus vero affectio inest, quam proprie nephritim nominant, in iis eam, quæ in poplite est secare expedit, aut certe, quæ in malleolis sunt. Reuulsionis itaque gratia, ubi copia sanguinis affuerit, & timor adsit, ne ex ingenti dolore phlegmone excitetur, Aetius venam cubiti propinquæ manus secari iussit, ut ex eius verbis patere poterit. Sic nos etiam in cubito sanguine non multo extracto, nisi mediocriter abundante, in homine 50. annorum, id fecimus: Hippocr. vero euacuationis gratia cum reuulsionem, seu deriuationem, ubi sanguis multus aut crassus in venis abundet, cum eundem sursum reuellere promptum non sit: sed magis expeditum per inferiores partes euacuare, seu per conuenientiore regionem, qua maxime natura vergit (ut sui moris est) poplitis venam secare præcepit, e directo videlicet affecti renis, cum rectitudinem perpetuo seruandam esse iusserit. Verum quæcumque vena incidatur, multo minus euacuandum est, quam ipsa repletionis copia expostulat: neque enim (ut inquit Aetius) futurum speramus, ut omnino cito e renibus excidat lapis, præsertim si magnus existat. Quare seruare oportet sanguinem in eam, quæ cum tempore futura est in corpore expensam. A venæ sectione, ubi etiam vitioso humore ægri abundant, purgans medicamentum, quod abundanti humori conueniens sit, præbendum est: neque omittendum, hoc est, nisi aliud quippiam id fieri prohibeat: notissimum namque est (ut inquit Gal. 6. de morb. vulg.) quod si utroq; auxilio homo indigeat,

Diuersa sententia.

Conciliantur.

Propria opinio.

14.

Purgans medicamentum.

indigeat, a venæ sectione incipiendum est, quoniam si per sanguinis missionem corpus prius vacuatum fuerit, purgans medicamentum non exhibitum venas & arterias, & inanes corporis regiones inuenit non oppleras: quo fit, ut absque ulla impedimento in totum corpus permeet ad attrahendum succos: facillimeque fit eorum euacuatio per vasorum spatia & fusionem, renuitatemque succorum. Nam si vasa sanguine repleta sint, & purgans medicamentum dederis, non poterit propter plenitudinem in corpus differri; unde fit, ut substat, & nihil efficiat, aut si quicquam facit, male faciat, ut liquet lib. de renum affect. dignor. ac cures. Pariter ubi sanguinis multitudo non affuerit, sed vitiosi duntaxat humores redundarint, eisdem purgatio apta est, citra venæ sectionem, pro ratione redundantis succi. Sed hic quidam purgationem primo exhibent, & post purgationem adhibent fomenta, iniectiones & vnguenta: alii non, nisi fortis lenientes præcesserint post clysteres: ut Guainerius facit, insequendo vestigia Auicenna, qui in principio abstinet a purgationibus: exhibitum enim pharvacum, per os a superioribus versus renes trahendo materiam, valde augmentat. Ideo in lenitione naturæ est alleuatio plurima, magis quam doloris sedatio: hinc solutiva per clysteres lenientes fieri volunt, cum administrationem per os ægri non tolerant. Et ideo volunt, ut calculoso in principio clysteres acuti vel carminantes imponantur: cuius exemplum ponit de quodam medico imperito Guainerius, qui eiusmodi enemata carminantia præscripserat, per quæ statim in principio adhibita nullæ feceseductæ fuerunt: & cum nullas fomentationes adhibuisset, sed solum cum oleo scorpionis locum dolentem inunxisset: quæ ratione valde auctus est dolor. Cui succurrere idem cupiens, sanguinem hirci cum vino maluatico in bona satis quantitate exhibuit: & sic dolor intolerabilis adeo ægri torfit, & impatientem reddidit, ut nullis modis sese Deo commendare potuerit, & cum magna desperatione sic expirauerit. Et ideo admonet medicos, ut sibi ab inmodico caueant, cum non solum de morte corporis, sed quod deterius est, de morte animæ Deo rationem reddituri sint. Ideo etiam diuretica vitanda sunt, neque ea in cibo (ut vulgus medicorum facit) dabimus, cum secum cibum vna ad renes indigestum deducant: & ideo non nisi stomacho prius repurgato, etiam diuretica danda sunt; & ubi tempus est, de quo postea, ea adhibemus per duas aut tres horas ante cibum. Præstat igitur his dictis prius uti, nempe clysteribus emollientibus, etiam fotu; quamquam, ut Donatus iubet, si præcesserint clysteres & venæ sectio, mel roridum seu cassiam fistulam exhiberi posse putant alii, si bilis redundat: si pituita, dat cassiam vel diacatholicon cum electu. seu confect. de dactylis. Verum fecibus quouis modo eductis per clysteres, mitigato vel saltem quiescente dolore, exhiberi poterunt cassia recens tracta ʒx. cum decoct. capill. vener. flor. borag. bugloss. viol. sebesten, hordei mundat. sem. 4. frig. maior. glycyrrh. & possular. adiecta ʒj. syr. viol. idque in aurora calide.

Quæ potio siue operetur sine non, sumat æger prandium hora consueta. Si ante cœnam ex ea ventrem non deponat, iniiciatur clyster ex iure pulli gallinacei vel caponis ʒx. mellis ros. ʒj. B. cassia ʒj. olei commun. vel amygdal. dulc. ʒij. B. salutarium, fiat clyster. Cassia itaque per se vel clysteris auxilio si operationem fecerit, tuto & securius ad lapidem comminuentia accedemus. Interea etiam post clysteres lenientes, possemus & sacculis & fotu & vntionibus uti, vel etiam post leuia lenientia per os exhibita, clysteribus mollioribus, vel etiam venæ sectione præcedenti. De sacculis, mollientibus, aliisque topicis, Scholio sequenti latius dicemus.

OBSERVATIO XXIV.
De nobili muliere ex renum calculo laborante.

Domina de Marquer, sorore eiusdem Domini, de quo præcedenti Obseruatione egimus, similiter calculo renum frequenter laborabat, non sine magno dolore, antequam calculi per vtereres in vesicam descenderent; quos magno numero, sed valde exiguo, subinde reddebat, his subscriptis remediis, quando ad eam in accessione huius mali accitus essem anno 1588.19. Iulii die hoc enema sequens, cum magno dolore afficeretur, inieci. ʒ rad. altheæ mundatæ ʒj. B. mercurialis, betæ, florum chamomill. meliloti, ana m. j. rad. branca vsina ʒj. sem. lini fenugraci, anisi, feniculi, ana ʒij. (ventositatibus etiam erat obnoxia, cum magis ex calculi dolore mulier pituitosa & satis crassa afficeretur) fiat decoctio in aqua communi, circiter lbj. adde cassia mundatæ pro clysteribus ʒj. benedictæ laxat. hiera picra, ana ʒij. olei amygdal. dulc. chamamelini, anethini, ana ʒj. vitellum vnius oui, salu communis ʒj. B. misce, fiat clyster. Cum ter quaterue aluum deposuisset, cum magna alleuatione, hunc fotum præscripsi: ʒ rad. altheæ ʒij. parietar. bismalua, florum chamomill. meliloti, summitatum anethi, ana m. j. sem. lini, fenugraci, malua, sem. anisi, feniculi, ana ʒij. coquantur in aqua communi pro lbj. B. fiat fotus, ut artis est, cum duabus spongiis alternatim. Quibus remediis dolor cessauit: & cum ex clystere plusquam quatuor secessus habuisset, non opus fuit alia purgatione. Ex decocto deinde cicerum, ononid. feniculi & asparagi, cum chærefolio & parietaria, malua & ficubus, multos calculos reiecit cum lotio, & deinde optime valuit. Verum anno 1589. mense Maio iterum in eundem dolorem incidit, quamuis paulo minorem quam præcedentem. Cum autem aluum non deponeret, libenter rursus clysterem iniecissem, sed illa prius id cum glande tentandum esse dicebat: atque illud satis esse putabat. Quare hoc supposito-rio præscripto, aluum commode deposuit ʒ pul. specier. hiera picra ʒij. trochisc. alhandal. ʒj. salis parum, mellis q. s. fiat suppos. deinde adhibito hoc fotu, & sumendo hoc decoctum ad libitum, multos calculos cum doloris alleuatione exiguos, modo rufos, modo citrinos minxit. ʒ rad. altheæ ʒij. flor. chamomilla, meliloti, ana p. j. folior. malua m. j. parietaria, chærefolii, ana m. j. sem. lini ʒj. B. sem. malua ʒj. B.

3. fiat decoctio in aqua communi pro ℥ ij. pro fomento cum duabus spongiis alternatim (vt fieri solet) in decocto calide immerfis & expressis ac apposis. *℞ rad. althæe mund. ʒ j. liquir. rase ʒ ss. malua, viol. parietar. charifolia ana m. j. cicerum rub. ʒ j. sem. malua, althæe ana ʒ j. granerum alkakengi seu haitacabi cum suis vesiculorum vij. hordei mundat. p. j. coquantur in aqua communi pro ℥ j. capiebat hanc colaturam ter quaterue in die : & cum reiceret lapides rufos, primo vt nuclea ceraforum vel cicerum instar, dolore satis mitigato, hanc leuem quoque purgationem cepit. *℞ syrup. ex infus. ros. pallidarum seu provincialium, cum foliis senæ ʒ j. b. elect. lenitiui ʒ j. diaphænici ʒ j. aqua betonica ʒ ij. b. fiat haustus breuis, ex quo quinquies egregie aluum deposuit. Postea vtens etiam aqua nostra ononidis destillata, recte deinde valuit. Iussit tamen vt eodem viuendi genere tum victu vteretur, quibus & frater eiusdem (de quo egimus Obseru. 23. præcedente circa finem) vsus est, tam ad præcautionem, quam curationem valde commodis.**

S C H O L I A.

4. **T**Oto autem corpore purgato per clysteres lenientes, vel per venæ sectionem, quæ laxare meatus ac renum corpora mollire valent medicamenta adhibenda sunt, vel (vt alii volunt) etiam post leues purgationes præcedentes, ex manna, cassia, diacatholico vel similibus : vel etiam ante, vt nos fecimus, quod & alii practici egregii iubent, vt Guainerius : ita & quidam nostri temporis, vt Rondeletius, qui bolo quidem cassiæ vtitur post clysteres, forus & inunctiones : sic etiam interpres Hollierii in ordine primo ponit clysterem leuem, deinde fomentum & vnguentum, venæ sectionem, deinde & bolum, sic cassia molliuntur viæ, vel sola, vel cum rhabarb. cessante dolore & vomitu. Postremo adhibent ea, quæ comminuunt lapidem. Fomenta igitur conficimus ex decocto folior. maluarum, foliorum ac radicum althææ, florum chamæmeli, fœnugræci, seminis lini, & rad. graminis in hydrelæo. & cum spongiis sæpe supra affectum renem adhibemus. Vel hoc vti possemus. *℞ malua, bis malua cum toto, ana m. j. b. parietaria capill. Ven. anethi, meliloti, caulium, ana m. j. florum chamæmel. p. j. semin. fœnugræci, lini, ana ʒ ij. ex his vel similibus decoctio fiat, pro fomento pro renibus cum spongiis. vel iis vtere quibus nos vsi sumus. Deinde statim a foru renes dolentes inungantur cum oleo chamæmelino, anethino, adiectis pinguedinibus anatis, vel anseris, aut gallinæ, vel butyri recentis. Si ad vnguenti formam redigere velis, adde ceræ parum. Vel ex butyro recenti, axungia gall. oleo viol. & amygdal. dulc. liliorum, adiecta cera. Ex eisdem rebus, quibus fomenta fiunt, etiam iniectiones parari poterunt. At omnium (vt inquit Alexander) optimum est balneum, vt quod non solum mitiget, sed curare possit, id vero ex dulci aqua fiat, aut ex hydrelæo : vel iisdem decoctis adde oleum chamæmelinum vel solam aquam calidam, cum oleo communi, cum filtro & spongiareni dolenti adhibeas : & post forus vel etiam iniectiones, inungas cum oleo sîz amino, & a-*

dipe anatis, vel oleo ex fœnugræci. althæa, vel cum oleo anethino, vel vnguentis sup. adiectis. Aliqui postea aliquid olei scorpionis addunt. Post fomenta vero, iniectiones ac balnea adhuc cataplasmata conueniunt, vt illud quod recipit farina tritici & sem. lini, fœnugræci ana m. j. olei anethi. rad. althææ, contusa ʒ iij. misce, cum oleo chamom. & amygdal. dulc. alii addunt resinæ tereb. ʒ ij. & mellis ʒ ij. misce. Vel quod ex lupinorum farina fit, hordeacea, sem. lini in aqua & oleo decoctis. Vel : *℞ mucilla. sem. lini, fœnugræci ana ʒ vj. anxung. gallina, ʒ iij. farine hordei q. s. ad inspissandum, fiat emplastrum. Vel : ℞ medulla panis remollita in vino & expressa ℥ j. pistetur, & cum oleo chamæmel. q. s. ad impinguandum, fiat cataplasma. ac circa lumbos & ventrem imponatur. Neque tamen erit absurdum pectini ac vesicæ eadem vnguenta ac cataplasmata adhibere : & ne quam primum frigescant, calefactorio extra ea contegere oportet : id quod commodè fieri potest per saccellos ex milio, fursure ac floribus chamæm. paratos, ac in latere paucio vino insperso calfactos. Aliqui hæc cataplasmata stupis vel succida lana, lumbis & aliis locis imponunt : præstat autem extendere supra pannum lineum, vel quem vulgus fustaneum vocat, & ita apponere. Hoc quidem magna cum experientia apposuit, ex medulla panis in aqua decoct. ficuum remollita & fortiter expressa ℥ j. duobus vitellis ouorum, admixto oleo chamæmel. q. s. ad formam cataplasmati. Quod si fiant iniectiones, encatasmata, in tina ab umbilico vsque ad inferiora æger in balneo actualiter calido permaneat : & si eo delectetur, pro libito in eo moram trahat æger : sed debilis citius exeat. Tinam egrediens, linteis calidis leuiter exsiccetur, & locus dolens aliquo vnguento ex superscriptis inungatur, vel emplastrum aliquod admoueatur. Ex iisdem, quibus fomenta fiunt tinæ decoctio paratur, nisi magna adesset inflammatio, tum aliqua frigida, vt folia viol. cucurbitæ, flores nenupharis, & similia adiiciuntur : & ex tina egrediens oleo violaceo inungatur. Eodem modo parantur & sacculi, quibus & loco fomentorum vtiuntur, ex fursure triticea, flor. chamomill. rad. althææ, meliloti, anethi, cum oleo chamomille decoctis. Sed amouendi cum infrigidari cœperint, & calidi sæpius imponendi. Et demum ex oleo chamomille calido vel aliquo supradicto locus dolens inungendus. De cucurbitulis antea dictum est : sed ea non adhibenda dum dolor vehementius infestat ; verum lenito dolore, & inflammatione non impediende. Quo etiam tempore supradictis iam adhibitis, & dolore mitigato, tempestiuum erit exhibere ea, quæ vrinam ciunt, ac lapidem frangunt. Etenim transmoto lapide, & ex lede agitato dolores quiescunt, vt ipsemet testatur Aetius. Qualia illa sint, Scholio subsequente dicemus.*

O B S E R V A T I O XXV.

De calculo renum, cum omnimoda lotii retentione.

DOminus generosus de Asperen de Carnes, quum calculo renum laboraret, cum dolore nephritico, & omnimoda lotii retentione, anno 1577. 13. die Ian. ad illum accitus hoc sequens enema sta-

ma statim iniicitur beo. *℞. rad. althae. ʒ j. folior. malua. parietaria. mercurialis. florum chamomilla, meliloti, foliorum viol. semmitatum anethi, ana m. j. sem. lini, anisi. fenniculi, malua. ana ʒ j. ℞. coquantur in aqua commun. pro ʒ xij. col. adde vel forti expressioni cassiae mundatae pro clysteribus ʒ j. benedicta laxat. ʒ iij. olei chamamelini, anethini, amygd. dulc. an. ʒ j. salis communis ʒ j. vitellum vnius oui, misce, fiat clyster.* ab eo clystere iniecto dolor sedabatur, ex hoc decocto fumens. fragmenta multa calculorum minxit, & lotium libere fluxit. *℞. folior. malua, viol. charesfolii. ana m. j. hordei mundati p. j. sem. quatuor frig. maior. an. ʒ j. sem. par. albi* (propter dolorem & aliqualem calorem, nam macilentus & biliosus erat) *ʒ j. ℞. sem. anisi. fenniculi, carui. ana ʒ j. sebsten. recent. an. num. viij. granor. alkakengi. num. v. cicerum rub. ʒ j. ficum pinguum. num. iij. coquantur in aqua comuni pro ʒ j. colatura add. syrup. uuiubini ʒ ij. misce, & fiat apozima, & ab omni dolore liberatus bene habuit.* Attamen cum renes calidos haberet, & tenuis constitutionis esset, & biliosus, ad renum corroborationem & calorem, quem saepe percipiebat in lumbis, imperauit, ut vnguento rosaceo eos inungeret. & probe curatus fuit. Quemadmodum etiam antea eius vxor Domina de Carnes praegrans in octauo mense, quae adeo calculo (quo & sepe chnoxia erat) fuit affecta, ut mingere non posset, at sequentibus remediis, cum vrina omnimodo esset restructa, duos lapillos ad pisi magnitudinem a renibus delapsos in vtereres & ibidem haerentes, ac impactos permanentes, tandem vna cum lotio reddidit: ad quam ipse octauo die Augusti anno 1576. vocatus fueram. Haec erant remedia. *℞. parietaria viridis. m. iij. chares. ii. foliorum malua. meliloti. ana m. j. cymini parum, pulu. m. ℞. fiat sacculus quadratus & intersutus, vino asperso pectini apponatur: & cum non iuuaret, etiam in vino decoctum & expressum calide apponebatur etiam cataplasma, ex parietaria. m. iij. cum butyro recenti fricta prius in patella appositum fuit: & hac col. utebatur ad libitum. ℞. sem. malua, althae. ana ʒ iij. cicerum rub. ʒ iij. caruarum pinguium. num. v. hordei mundati ʒ ij. sem. a frig. maior. ana ʒ ij. sebsten. num. ix. liquir. rasa ʒ vj. coquantur in aqua comuni. in ʒ iij. ad medietatem.* His non tantum lotium reddidit, sed & calculos praedictos, neque fecini obfuit, quin & nono mense postea absoluto feliciter peperit. Vxor quoque Magistri Petri Streeilingii, qui pueros eo tempore & Gallicam linguam Delphis docebat, quum lotium perites quatuorve dies reddere non posset, & Guilielmus de Dalen lithotomus multa & varia adhibuisset remedia, etiam instrumento suo vsus esset ad lapidem eximendum, cum haec omnia frustra tentata essent, me vocarunt anno 1576. 6. die Septembris, quae cum hac sequentia adhibuisset, miraculi instar, lotium reddidit, & curata fuit. *℞. parietaria viridu. m. iij. cum butyro fricta pectini cataplasma-ru instar calide imponatur. ℞. charesfolii, malua, parietaria. ana m. j. sem. althae, malua ana ʒ j. ℞. cicerum rub. ʒ ij. sem. a frigid. maior. ana ʒ j. hordei mundati p. j. sebsten recentium. num. ix. caric. num. v. liq.*

raf. ʒ ℞. coquantur in ʒ iij. aqua ad consumptionem medietatis. Colaturam libenter bibens continuo, post ingentes perpeffos dolores per lithotomum, his remediis fuit curata, atque libere lotium min-
gere potuit. Pro curatione loco priami imaginem Petri Nannii quondam Professoris Louanienfis, Alcmatiani, praceptoris mei, quam hoc tempore belli forte maritus emerat, mihi dedit: quam cum antea libenter emissem, ut pecuniam pro ea quam expenderat in emendo rursus reddidisset, mihi negauerat. Sed rursus secunda vice multo peius affecta, imaginem depictam prius dedit, cum 10. Septembris die grauius in idem malum incidisset vxor, adeo graue ut Guilielmus de Dalen catheterem per vinarum meatum frustra imposuerit, sperans hoc modo lotium prole-ctari posse, cum quatuor continuis diebus iterum nihil lotii effluxisset. Verum non erat lapis in vesica, sed in vterere sinistro. Adeo intolerabilior-quebatur dolore, propter retentam vrinam, ut miserabili voce tanquam desperata, clamore intolerabili nostram opem expeteret. Rursus adhibeo haec subsequencia remedia, denuo ad illam accitus: quibus non solum lotium, sed & lapillos multos vna cum lotio minxit: *℞. parietaria viridu. m. iij. cum butyro recenti, & oleo anethino, & exiguo scorpionis adiecto, cataplasma fiat: sed clystere sequenti prius immisso, pectini apponebatur. ℞. rad. althae mundata ʒ j. parietaria, malua, mercurialis, betae, florum chamomill. meliloti. ana m. j. folior. viol. m. ℞. coquantur in aqua comuni pro ʒ j. nempe ʒ xij. addendo cassiae pro clysteribus ʒ j. benedicta laxat. ʒ j. olei chamamel. anethini, amygdal. dulc. ana ʒ j. salis communis ʒ j. vitellum vnius oui, misce, fiat clyster.* & statim iniiciebatur, & locus dolens ac pecten inungebatur linimento sequenti. *℞. olei amygd. dulc. in vtri recentis, olei lini, axungiae galinae ana ʒ j. misce, & pectini apponebatur cataplasma supra scriptum: & continuo hibeat ex decocto sequenti iterum. ℞. sem. malua, althae ana ʒ iij. cicerum rub. ʒ iij. caruarum pinguium. num. ix. sebsten. num. viij. sem. quat. frig. maior. ana ʒ ij. hordei mundati ʒ ij. glycyrr. rasa ʒ vj. fiat decoctio in aqua pluvialis. ʒ iij. ad ʒ ij. colatura ad libitum utebatur.* Rursus minxit, & lapillos multo plures quam antea, (cum prius non ita grauius laboraret, ut nunc, & citius tunc curata esset) eiecit, & perfectam valetudinem denuo consequuta est, & tunc mihi imaginem depictam dono libens dedit. Vxor quoque Iohannis Heuteri, nobilis matrona, Barbara Zuzia, filia Domini Cornelii Zozii, Praesidis Hollandiae cum Traiecti ageret, neque mingere posset, medici astantes oculos cancerorum pulueritatos dederunt: & hoc modo vrinam prouocabant. Nos saepe lenientibus iam dictis praemissis, nostram distillationem ononidis commode exhibuimus, etiam subinde cum puluere oculi cancerorum, & sine illo.

S C H O L I A.

Cominuentia lapidem, & vrinam cientia exhibemus praecedentibus clysteribus. aliisque lenientibus iam dictis dolore iam mitigato, vel la-

Quo tempore
urinae cientia
ac ea quae lapi-
dem comminuit,
exhibenda sint.

pide transmoto & ex sese agitato, ut diximus, cum dolores iam quiescent, ut & Aetius recte dicebat. Quae vero calculosis tunc auxiliantur unica facultate indigent, quae secat & abstergere cum manifesta caliditate potest, teste Galen. 10. de compos. medic. secund. loc. Talia autem sunt omnia fere amara; ut ipsa inquit. A valde tamen calidis, ac diureticis omnino abstinendum est, praesertim a longo eorum usu. Nam effluvia calidiorum causam adaugent, dum tenes intemperatos igneosque per caliditatem reddunt, ut promte alios calculos generare possint, licet factos comminuant, Alex. teste.

7. Admodum itaque calida acriusque medicamenta studiose vitari debent. Vnde calculosis, quae valde calefaciant dari nullo modo conuenit, ut liquet 6. de sanitate tuenda. Quod si necessitas te cogit, semel aut bis eis utare, & demum desistere ab eis debes, ex eiusdem Alexandri testimonio. Ego soleo in decoctis extenuantibus & urinae cientibus addere aliqua, quae etiam vias simul lubricant, ut in exemplis supradictis satis liquet, addendo radicem althaeae, vel eius semen, vel maluam, & semen eius, violas quoque subinde & ficus, quae praeter id quod faciunt bonam aluum, iuxta Dioscorid. etiam vesicae & renibus utiles sunt. Et iuxta Galenum ficus commeabiles sunt, & facile in totum corpus perueniunt, penetrantque: nam & abstergerendi vi polleant haud obscura: cuius gratia commanfae calculosis renibus arenularum viro propellant. His adiungimus extenuantia & incidentia, citra magnum calorem, quibus ad lapides comminuendos & urinae ciendam propterea utendum est, sed quae tepidam (ut ita dixerim) facultatem habeant.

8. Haec enim paulatim citra noxam lapidem comminuunt, nec eum duriores reddunt. Sed haesitaret forte aliquis, ut etiam Donatus ait, si curatio quaelibet per suum contrarium efficitur, quomodo lapidem possint comminuere, quae tepidam facultatem habent, cum a calore fuerit genitus? Cui respondebimus, quod cum calculus ab intemperie, & valido calore sit factus, ob id merito exhibemus, quae tepidam facultatem obtinent, ut quae contraria his sint, a quibus lapis est effectus, siquidem tepida seu minus calida sunt valde calidis contraria, ut liquet lib. de ren. affect. dign. Haec itaque medicamenta, quae minimum caloris possident, collolas seu tophaceas consistentias incidere sunt idonea, Galen. auctore 5. de simpl. medic. facult. veluti sunt radices regionum asparagorum, & rubi, & betonica, & polium, ac acetum scyllinum, & vitrum combustum, & quae eius generis sunt, eodem teste. Praeter haec autem a Paulo graminis radix, adianthum, althaeae semen, spongiarum calculi, cicer nigrum seu eius ius, phu, meon, asaron, carpesion & laxifraga commendantur. Sion vero & scolymi radix, atque erysimon esu & potu profunt, ut idem Paulus testatur. Alexander vero, cardui decoctum cum apio, seu etiam decoctum rad. quinquefolii cum oxymelite, tanquam valde efficax commendat, & radices graminis, plantag. folia, & semen, & virici semen, & amygdala, & peucedani radicem, radiculamque & paliuri semen & tribuli decoctum, cy-

peri & rumicis domestici radicem, & vermes terrenos coctos: quorum singula partim decocta, partim tenuissime trita praebeto bibenda, ut ipse refert. Vbi vero haec non suffecerint, ad valentiora medicamenta transire oportet quae (ut Aetius fateatur) communia etiam sunt & calculosae vesicae remedia, inter quae sunt praecipua lapis Iudaicus, cicadae siccae sine pennis ac pedibus contusae: ac hircinus sanguis inarefactus, qui praesistentes lapides soluit, atque ita per lotium excerni eos facit, ut etiam alii amplius non gignantur. Praeterea dolorem sedat, Aetio auctore. Aliqui lapidis Iudaici dosim, ut lapidis lyncis esse volunt, & cum aliquo diuretico. Quomodo autem sanguis hirci parari debeat, vide Aetium cap. 12. lib. 11. Colligitur autem hircinus sanguis hoc modo: Quum una maturefcere ceperit ollam nouam accipito, & infusa in ipsam aqua, donec terreum deposuerit olla coquito: & accepto e grege hirci aetate maturo, plus minus quatuor annorum eum mactato, eiusque sanguinem medium olla excipito, ita ut eum qui primum effluxit, itemque postremum penitus relinquant: medium autem inspissari sinis; & in olla suum per acutam arundinem in multa frustra diffuso: indeque reticulo denso, aut linteolo raro, aut cribro archiore contextum sub dio exponito, ut insolatur & roscidus fiat, cauendo ne imbre commadeat: Porro ubi exsiccatus fuerit, eum diligenter terito, & in pyxide asservato, & remittente mulo cochlearium plenum cum passo critico exhibeto. Cognominatur autem hoc pharmacum Thyeir: Huius & nos, inquit Philagrius, in breui tempore non aspernandum periculum fecimus. Aliquando odoris commendandi gratia parum phylli aut amomi, aut similibus admisimus. Ego, inquit, hoc pharmacum cum troglodite passiculo permixtum, cuidam penitus nihil loti essienti post magnos colores exhibui, & permagnum lapidem attritum ab eo expuli. Alii huius dosim esse scribunt, ut Guainerius, a 3 j. ad 3 j. cum vino dulci cocto, aut aqua apii montani. Accedunt ad haec alia, quae a tota substantia conducere videntur: inter quae passerulus quidam inter sepes & murum victum quae ritans, troglodites appellatus ab Aetio & Paulo conscribitur, cuius descriptio ab eodem Paulo cap. 45. lib. 3. & Aetio cap. 11. lib. 11. Hic sale conditus, & in cibo crudus acceptus morbum perfecte sanat, in posterumque generari prohibet. Conditur autem ac diuersis modis praeparatur, quemadmodum ab eisdem auctoribus in praecitatis locis scriptum est. Aetius etiam hoc ex Marciano medico Aphro efficacissimum scribit: Leporis pellem in ollam conice, & in furnum dimitte: atque ubi ussa fuerit, ut probe contereri possit, acceptam tere & ex ipsa cochlearium unum cum vino, ieiunio in solis calida aqua insensu praebe. Si vero velis experimentum pharmaci ipsius accipere, ex eo in vinum conice, & in vinum item lapidem ex flumine acceptum iniice, & contextum per paucas horas sine, & in grumos lapis dissoluetur. Alii leporem totum in ollam nouam reponunt optime clausam, quam in furno tam diu permittunt, ut inde pulu. fieri possit, cuius a 3 j. ad ij. cum aliquo diuretico praebent. Alii leporem iugulantes, in sua

9. Valentiora.

De sanguine hircino.

10.

Thyeir pharmacum.

Qua a tota substantia conducant.

12. sua pelle sanguinem reponunt, & eam cum illo sanguine in furno tantum desiccari permittunt, quod inde puluis fieri possit, Non desunt, qui abiecta carne ossa solum cum sanguine & pelle desiccant. Quo puluere medicus Sarracenus apud Guaineriū dicitur mirabilia præstitisse. Prægnantem leporem iugulabat, deinde lepusculos e ventre extractos, & euisceratos sanguine matris implebat, & in furno, eo modo, quo supradictum est, desiccari permittebat, & puluere inde parato utebatur. Aquam leporis Auicenna commendabat, quæ in duplici vase destillari potest. Referunt quidam officulum quoddam esse in iunctura poplitis posteriorum pedū leporis, ad fabæ mediocris magnitudinem, cuius puluis, si cū vino optimo propinetur, calculum frangit: expertum a Marchione Montisferato calculoso. Id quod veteres de sanguine hircino dixerunt, idem nonnulli de cerui ac vulpis sanguine referunt, vt hirci etiam præparato, & sanguinem vulpis (fertur) si pecten eo inungatur, calculū vesicæ frangere. Testæ ouorum a quib. extracti sunt pulli, super laminam ferream exsiccata, & in puluerem redacta, ad ℥ ss. puluis in debili, in forti ad ℥ ij. in mediocri ad ℥ j. exhibitus cum diuretico aliquo, calculum minuit, & cinis vermium terrestrium ad ℥ j. Habemus & alia remedia innumera: pulueres, aliasque compositiones apud veteres Galen. & Actium, & apud Neotericos, præcipue apud Guainerium (licet is barbare scripserit) de calculosa passione commentariolum: in quo multa habet remedia, quæ lapidem comminuunt. Sed & hic pul. Donati ab Altomari mirifice commendatur ad lapidem comminuendum. Recipit sem. althææ, viol. albar. ana gr. v. lito spermatis, & radicis glycyrr. ana ℥ ss. lapidis Iudaici & spongie. ana gr. ij. pul. ossium dactylorum, cerasorum & mespilor. ana ℥ j. sem. melonum. ℥ iiij. fiat pul. cuius ℥ j. pro qualibet vice. cum ℥ ij. vini albi aquosi aut oxymelitis, aut ℥ ij. decocti asplenii, in aqua parati, ac exiguo aceti addito tribuatur. Interim vero corporib. præsertim natura frigidiorib. seminis apii, asparagorum, cinamomi ac saxifragiæ cuiuslibet grana septē adicere poteris. Verum vbi dolor adeo infestet, & vigiliæ supra modum ægrum conficiant, vt magnum vitæ periculū immineat, viribus præsertim consentientib. cum his, quæ torporem inducunt, succurrendum erit, ex Pauli Aetii sententia, præbeaturque Philonis medicamenti, aut theriacæ nouellæ ℥ j. cum ℥ ij. vini albi aquosi. Ab aliis valde stupefacientibus & opio abstinendum. Noui quendam Paracelsicum, qui ex calculo renum cuidam, qui adeo afficiebatur, vt ob dolorem nullo modo dormire posset, opium propinauit, & nunquam deinde a somno experrectus euigilauit, sed ita dormienstandem exspirauit. Ideo præstat adhuc leuioribus diureticis uti. Ego vero in calculosis magna cum utilitate sæpe vsus sum (vt in Carthusianis hoc malo obnoxii) decocto rad. lappæ & ononidis. Sed & sola radice lappæ in ceruisia decocta Ioan. Adriani, frater prætoris Rheniburgensis hoc modo calculosus sibi ipsi lorium prouocabat, alius vero radice vrticæ & lappæ maioris in ceruisia communi

etiam decocta. Radice quoque saxifragiæ condita utiliter utimur. Quidam terna allii capita decocta mane assumebat, eodem die rupto calculo, protinus vrina profluebat, & dolore leuabatur. Hirundinum caro & erinacei syluestris, vt quidam tradunt, ad hoc vitium salutaris perhibetur. Sed & satiui raphani decocti mane poti ad ternos cyathos calculos comminuunt & eiiciunt. Manardus in aureo petasone, de quo prius facta est mentio, ex mulierculæ cuiusdam consilio cinerem fabarum cum vino Pictauiensi instar lixiui colabat, cuius tria cochlearia aut duo ad summum, fimo columbino pauco immixto potabat, cum ex calculo mingere non posset: idque in diluculo cum sumisset in continenti minxit, & vna lapidum fragmenta cum vrina exhibant. Referebat adeo vehemens esse medicamentum, vt per totum corpus sudor efflueret: tamen arcanum infallibile est, & ex eo semper mingebar. Est autem stercus columbini adeo calidum. teste Galen. libr. 3. cap. 3. de temper. vt in Myfia domus ex fimo columbino putrefacto incensa sit & tota combusta. Eo non solum veteres ad comminuendum lapidem vsi sunt, sed & neoterici, vt Guainerius asserit, qui commendat puluerem stercoris palumborum rubeorum, qui prius tamen nutriendi semine lini aut pane, in quo semen fœniculi coctum sit, deinde hoc stercus per diem & noctem in aceto infusum & iterum exsiccatum & in puluerem redactum cum cinnamomo exhibitum ad ℥ j. egregie confert. Vel ℥ huius fimi columbini sic parati ℥ j. origani. ℥ ss. sacch. ℥ ij. fiat pul. & sic vna dosis, quocunque modo datur, mirabiliter operatur. Gerardus Theodorus Melissius, septuagenarius, cum calculo & difficultate mingendi & ardore intolerabili afficeretur Delphis, & fluxu ventris, consultum est a muliere, vt apium viride cum lacte bubulo decoqueret, & aquæ addito pauco, sale, eo remedio frustra calculorum reiecit, & dolor sedatus est, atque ardor vrinæ & fluxus: rationem tamen huius medicamenti ignorabat, vt vulgares omnes, qui aliquando experimentum habent, cuius rationem explicari non possunt. Apium enim aperiebat oppilationes renum, vrinam prouocabat, & calculum comminuebat, lac vero mitigabat vrinæ ardorem, aqua vero facit ad penetrationem, ne lac etiam concrederet, sal quoque corripiebat lac, ne acresceret, & lac etiam ad fluxum faciebat. Cum autem id sæpius ad calculum in se ipso expertum cognosceret, consului, si apium viride non adesset, vt eius loco semen caperet. Memini quoque empiricum lapillos albos repertos in littore maris ignitos, in vino Rhenano, modo in Pictauiensi exstinxisse, & eo vino commode vsu fuisse ad lapides comminuendos & expellendos. Valet etiam aqua destillata lappæ, in pueris, & aliquos noui ea a dolore liberatos esse, & melius minxisse. Villerius nobilis & magister equitum, Houtini frater, cum calculo laboraret, dolor in rene ac vretere illum lancinabat. Post iniectum enema sumsit oleum amygdal. dulc. cui succus limonis immixtus erat, & pettini opponebat sacculum ex cumino: quibus

præfidiis calculus expellebatur. Idem anno 1583. 29. die Nouembris, cum Delphis apud Principem Auracum ageret, ex nostro consilio idem oleum sumsit cum succo limonis: verum cum etiam exiguum nostræ distillationis (*de qua superius dictum est*) prægustasset, miraculi instar calculos vna cum lotio reddebat.

OBSERVATIO XXVI.

De Calculo renis in vterere impacto, cum crudelissimo dolore, & vrina omnimoda suppressione, cui & antea ex sanguine coagulato etiam vrina suppressa fuerat, cum sæuissimis symptomatibus.

1. **H**enricus Henrici, mercator egregius, qui Delphis in ædibus habitabat, quæ Bethleemum pro insigni habebant, a me anno 1558. cum sub finem Martii in tertianam quasi intermittentem notham incidisset optimis remediis adhibitis probe curatus fuit. Verum quum febris illum reliquisset, post plures dies iterum rediit: & tunc ex monachi empirici consilio, (*qui in monasterio Sion dicto medicinam faciebat*) in ipsa accessione sumsit decoctum herbæ cardui benedicti: ex quo rigore statim cessante, is post semihoram redibat: & rursus eodem assumpto decocto cessabat: & sic tertia vice decocto denuo propinato, æger in somnum deinde incidit: mane autem sanguinem minxit, vtrum ex decocto ora venarum aperiente, an ex fragmentis, (*nam calculosus erat*) nescio. Attamen cum bis minxisset cruenta, subsequuta est omnimoda vrinæ suppressio ex sanguine coagulato & in grumos coacto. Nam non diu post hæc sæuissima symptomata subsequebantur: refrigeratio membrorum extremorum & narium cum intolerabili dolore lumborum, deinde & circa pectinem, pulsus erat exiguus, & viribus collapsis, astantes mortem præ foribus esse putabant, cum membra frigida ita permanerent: & cum animam agere videretur, me tunc rursus vocarunt. Nam hoc tempore de sua salute desperans, hinc emigraturus testamentum suum in scriptis reliquerat, & tandem cruciatu intolerabili afflictus opem petebat, cum & vrina tum faeces omnino detinerentur. Ad eum igitur ingressus, hunc casum cum explicasset, & signa quæ sanguinem concretum comitari solent animaduertissent, 27. die Aprilis denuo ad illum accitus, ad aluum depouendam suppositorium sequens immittere iubeo. *℞. pulueris hieræ picræ ʒ j. pul. colocynth. diacridii. ana gr. iij. salis exiguum, cum melle, q. s. fiat suppositorium.* Sed ex eo aluum non deposuit, nisi sterco ra dura quædam, neque lotium reddidit. Cum omnia intenderentur, pectini apposui parietariæ. *m. iij. fricta in patella, addendo olei scorpionis. ʒ j. butyri recentis. ʒ β.* & rursus glande indita aluum non soluebat, clysterem iniecissem, sed noluit admittere, at hoc medicamento propinato sub noctem calide (*habet autem oxymelitis simplicis ʒ j. β. aqua malua, artemisia & florum chamomill. ana ʒ j.*) primo vrinam crudam cum sanguine permixtam minxit, postea multas arenulas rubras, & dolor qui lumbos exagitabat, sedaba-

tur. Quantum valeat oxymel ad sanguinis grumos, & artemisiæ decoctum, vel aqua eius destillata, in Scholio latius dicturi sumus. At nocte sequenti dolor rursus duplo maior in lumbis reuersus est, ac vrina denuo retenta fuit, neq; adhuc alia glande immissa aluus irritari potuit. Vnde hora quarta in diluculo cum me excitassent, ac dolorem lateris, (*quo tunc valde laborabat, circa vterem, in quo ego calculi fragmenta inharere suspicabar, tri-na permanente suppressa,*) eo nunc admittente, clysterem iniicere iubeo, & simul forum præscribo ad dolorem mitigandum, cum se erigere non posset. *℞. rad. althææ ʒ j. folior. malua, viol. meliloti. ana m. j. seminis malua fœnug. lini. ana. ʒ iij. β. coquantur in aqua communi pro fotu cum spongia pro loco dolente, quo tamen non iuuabatur: sed dolorem circa renes & lumbos magis augebat, vrina etiam manente suppressa, quare in libra vna decocti superscripti pro fomento, dissoluebam cassia mundata ʒ j. elect. hieræ picræ ʒ iij. diacatholici, benedictæ laxat. ana ʒ j. olei amygdal. dulc. anethini. ana ʒ j. olei chamomell. scorpionis. ana ʒ β. vitellum vnius oui, salis ʒ j. β. fiat clyster. quem postquam duas horas retinisset, materiam tantum clysteris reiecit. Post meridiem cum redirem, neque adhuc mingere posset, iterum oxymel simpl. cum aqua malua, flor. chamomilla & artemis. propinaui: sed cum maximam partem euomet, neque retineret, apozema sequens exhibeo. *℞. artemisia, ag. imonia, parietaria, malua, hordei mundati, charesfolii, betonica. ana. m. β. cumini ʒ j. cicerum rub. ʒ j. coquantur in aqua malua petros. fœnic. viol. aqua raphani. q. s. cuius colatura accipe ʒ iij. adde oxymel. l. simplicis ʒ j. misce, quum autem liquorem tantum clysteris reiecisset, denuo glande immissa ter aluum excreuit: deinde & nocte adhuc semel, & potionem iam dictam vnica vice sumens, sanguinem concretum & iam dissolutum minxit, & simul deinde cum lotio reiectis fragmentis lapillo-rum, paulatim cessauit omnis dolor. Imperaui-mus tamen, vt hordeum non excorticatum maluam cum toto, & parietariam, & charesfolium, pruna dama-scena decoqueret in sero lactis, ad detorsionem, quo lubens utebatur, & lotium deinde ad libitum reddere potuit, omni dolore cessante, neq; eo, neq; febre redeunte, fuitq; admodum breui miraculi instar ab hoc malo curatus. At post duos dies tamen incurrebat leuem dolorem in scapulis, ex frigore contractum, vt opinabar; nam humeris denudatis sese iectando ob præcedentes dolores intolerabiles, etsi ignorans, decubuerat: quare sacculum ex floribus siccis chamomillæ furfure & sale parare iubeo, eo-que calide loco dolenti admoto, is dolor admodum breui euauit, & egregie ad tempus curatus permansit. Sed cum hic propria natura & quasi hæreditario male calculosus esset (*vt eius frater Iacobus Persinius dictus, mercator Amwerpianus, si quis alius, ditissimus, qui etiam nostra industria præcautione vtens ad senectutem peruenit*) admonui vt etiam præcautione contra calculum vteretur, eo quod & antea calculos ad pisi magnitudinem aliquando reiecisset, e renibus deinde in vteres delapsos, & postea in vesicam: & propterea eidem etiam scripsi lin-gua**

8. gna vulgari, cum Latinam non calleret, quib. modis praeuerti posset. Verum hic postea sui ipsius sanitatem negligens, diuersis utens ferculis, & vinis crassis ac calidissimis, in otio viuēs & liberalius multo utens, tandem anno 1560. 9. die mensis Ian. Harlemum cum profecturus esset ad secundas nuptias sororis suae, vna cum amicis, & cum Hagam Comitum primo peruenisset, apud Domin. Quintinum consiliarium regium, sororium suum incidit in idem malum & omnimodam vrinæ suppressionem, vt deinde sex integris diebus ac noctibus ne guttum quidem vrinæ emitteret, cum intolerabili dolore circa renem sinistram, calculo in vterem illapso, ac ibidem hærete, vt postea certis signisprehendimus: illo quoque vociferante, in eodem loco vlceresse. Ad hunc, cum in Haga Comitum apud sororium esset, nec Harlemum proficisci posset, omnium primo aecitus est Hæricus Vergerius, medicus doctissimus, 10. Ian. die, qui sequens enema vt illico infunderetur iubet. *℞. malae cum toto m. j. folior. caulium rub. m. j. matricaria. m. j. flor. chamomill. m. j. sem. malua, althæa an. ʒ j. β. fenugr. lini an. ʒ j. β. fursurū in panno lineo ligati m. j. β. bulliant in s. q. aqua, ad consummationem medietatis: deinde facta colatura eiusdem. ℞. ʒ xij. olei chamamel. lilior. an. ʒ j. β. olei anethini ʒ j. zarch. rubei ʒ j. vitellum vnum oui gallinae, elect. diacassia ʒ j. fiat clyster. addito medico sale, parum educti.* Deinde adhuc semel eodem iniecto, vter seu alius leuor videbatur, permanente tamen dolore in parte sinistra iam dicta, lotio non emanante. Vitum tenuem prescripsit, & in potu cōcessit ceruisiam Gondanam antiquam, vinum Rhenanum subtile, etiam cum ceruisia prædicta mixtum, cum æger eo sapore delectaretur, nec anglicanam inhibuit, cum & domi eadem esset. Vndecimo vero die Ian. hanc portionem propinauit. *℞. elect. lenitissimi, electuarii de dactylis. an. ʒ ij. sang. hirci preparati ʒ j. specier. Iussini & lithontribon an. ʒ ss. anthera ʒ j. syr. capill. ven. ʒ j. dissoluantur in aqua betonica, verbenæ, fendentia q. fiat portio.* Nihil eduxit, & dolor auctus est, & ibi immensum accreuit. Duodecimo igitur Ian. die hanc portione iterum propinat. *℞. pul. nuculeorum missilorum exacte cribratorum ʒ j. β. specier. lithontrib. & Iussini an. ʒ j. misc. cum syr. de duab. rad. capill. ven. aqua crethami marini q. s. fiat potiuncula.* nihil lotii reddidit, imo dolor magis aggrauatus est: & cum ex priore putgatione cum diureticis aluū non deposuisset, post exhibitū puluerem, hoc enim denuo iniici iubet. *℞. fol. malae m. j. mercurial. caulium. rub. an. m. j. sem. lini, fenugr. an. ʒ j. β. fursurū in nodulo ligati m. j. folior. beta. m. j. fiat decoct. in aqua commun. ad medietatem, colatura accipe ʒ xij. diacassia ʒ j. benedictæ solutivæ ʒ j. β. zarch. rub. ʒ j. β. salis communis ʒ ij. salis gemma ʒ j. fiat clyster.* eo aluū quidem deposuit, sed vrinam nondum reddere potuit. Quare dolore aucto, 13. die Ian. ad curationem simul vocatus fui. Eo tempore & glæde iterum irritabatur aluus, & vna decoctum sequens prescripsimus, & erat sine febre. *℞. verbenæ, ceterach capill. ven. betonica an. m. millefol. scabiosa an. m. j. cicerum rub. ʒ ij. glycyrr. ras. ʒ vj. bulliant in aqua purissima, pintis trib. ad consumptionem medietatis, deinde dulcoretur cum syr. de duab.*

rad. & oxymell. simpl. an. ʒ ij. fiat decoctum, vtatur sepius. Proposui eodem tempore, vt ex emollientibus anodynis fatus tum inunctiones fierent, vt sic decocto præparatorio lapis cōmodius excuteretur. Voluit tamen fomenta Henricus quædam diuretica adhibere: & ita hic sequens fatus prescriptus est. *℞. folior. malua, parietaria, verbenæ, senecionis, flor. chamomill. an. m. j. fursurū frumenti m. j. capit. alliorum. num. iij.* (quæ tamen ob odorem libenter reliquifsem, Henrico contra nitente, qui me multo senior erat) *sem. lini. malua an. ʒ ij. iuniperi, bacca. laur. an. ʒ j. bulliant in vino Rhenensi, & aqua chamom. an. q. s. fiat fomentum cum duabus spongiis alternatim, circa renem sinistram, vterem & inguina, & pectinem.* Nihil tamen eo quicquam promouimus, dolor quoque ex allio illi molestus erat: quare ne fieret maior attractio aut inflammatio, ab eo desistendū esse suadebam, & vt chirurgus doctus accerseretur, qui cathetere immisso (cum etiam in pectine valde doleret) forte lapillo aliquo in collum vesicæ illapso, illum inde remoueret, & sic vrinam prolectare posset. Ceterum Henricus medicus contra suadebat, vt decocto supra scripto, cum etiā fotui, insisteremus. Ego vero cum cogerer Delphos recurrere ob alios meos ægros, admonui tātum clysterem emollientem esse iniiciendū, & fomento ex emollientibus & anodynis & vnctionibus eo tempore tantum esse vtendum, insequendo vestigia medicorum illustrium, & præcipue Guainerii, qui inter reliquos practicos haud infimus est, & ita discessi. Interim sub noctem eodē die post meum discessum, duplo magis dolor auctus est, ita, vt Vergerius medicus hora noctis 11. electo vocatus fuerit, qui allio contuso præputio circumligato tanquam arcano quopiam vrinam prolectari posse, promittebat, vel saltē sperabat, sed cum spe sua frustraretur, æger tanto calore adurente afficiebatur, vt digressio medico alliū abiecerit impatiens. Cum vero & in vterem dolor irreperet, iubet medicus sequens enema denuo infundi. *℞. diacassia, electuarii de dactylis. an. ʒ vj. specier. elect. de bacca lauri* (nam æger circa ventrem & lumbos se ventositate torqueri clamabat) *ʒ j. β. salis commun. ʒ ij. salis gemma. ʒ j. sacch. rub. ʒ j. β. vitell. oui gallinae, oleorum ruta ʒ ij. olei aneth. chamamel. an. ʒ j. cum decocto pro clystere vltimo prescripto fiat enema.* atq; in aurora diei sequentis iniectum fuit, quo pituitam vitream mucosam & excrementa quædam excreuit, cum alleuatione quædam, dolore tamen nondum cessante, neq; adhuc vnam guttulam vrinæ emittere potuit. Decimoquarto die Ian. circa meridiem, vt promiseram, rediens, reperi ægrum valde debilem ex dolore præcedente & vigiliis: nam totam noctem præcedentem insomnem egerat ob dolorem. Aderat & tūc leuis dolor capitis, maxime in parte posteriori, vt ipsemet referebat, absque tamen manifesta febre. Sed medicus tunc præsens non aderat, cum & is Delphos accessisset, rursus admonuimus de docto chirurgo, & de cathetere immittendo, num & hoc modo vrina prolectari posset. Hæc cum dixissem, æger medicum Delphos accessisse aiebat, & cathetere secum allaturum, quo

Franco Bartholomæus prætor eodem malo, nempe calculo obnoxius uti solebat. Recte quidem, inquiebam ego, sed eo instrumento, non tam dextre, ut Lithotomus facere consuevit, uti scies. Is igitur vocatur, ut una cum medico veniret. Sed eo tempore Lithotomo Sciedamum vrbe profecto, medicus cum cathetere solus venit, & chirurgus in Haga Comitum existens, cum dextre cathetere uti non sciret, e Schiedamo vrbe accititur Guilelmus de Dalen lithotomus, de quo diximus, qui ad multam noctem ad ægrum peruenit. Cathetere per collam in vesicam immisso, ut artis est, voluendo ac reuoluendo, tum sugendo, nihil urinae subsequutum fuit, & præter binas guttas sanguinis absque urina nihil aliud effluxit, digitoque in anum immisso (ut fieri assolet) nullum lapidem in meatu urinario aut vesicæ collo aut in ipsa vesica esse pronūciavit, qui obstructo ostio lotii effluuium impediret, ita ut ipse chirurgus in suo opere expertus ægrum pro deplorato haberet, quod immisso cathetere, urina non prolectaretur: rarius inquit, hoc sibi evenisse, quin paulo post mors ipsius agrotantis subsequeretur, quemadmodum & ante mensē illi contrigisse nobis narrabat in Petro illo Pampio dicto, Delphensi, homine supra modum crasso, quem & Cornelius Ericus meus collega præ manibus habebat, vir egregie doctus, ita cum cathetere immisso non subsequeretur lotium, non diu post spasmo oborto, ex intolerabili dolore, ob urinae omnimodam retentionē misere mortuus est: quod & huic agro nostro euenturum existimabat. Eo iam dimisso cum æger de vita sua inciperet desperare, sequenti nocte ab eo rogatus, apud eum permansi, & communi consilio cum medico præsentē hanc præscripsimus syringationem. ℞. aqua agrimonie ℥ viij. herba verbenæ. m. ℥ s. malua ℥ j. bulliat. diab. aut trib. ebullitionib. colentur, & adde mellis ros. ℥ j. syr. capill. ven. ℥ s. misce. & moderate calide per meatum urinarium usque ad vesicā per chirurgum sæpissime iniiciebatur. Sed nihil effecimus: ac per totam noctem æger in somnis manens, præ dolore circa sinistram renem & locum vtereris sinistri, se disrumpi clamabat, tanquam urina maximo pondere ibidem inhærens, huius doloris causa fuisset. Henricus eo tempore, multo me senior, & expertus medicus, stupore commotus, nunquam se similem casum vidisse narrat, neque apud auctorem probatum legisse, ita retentam urinam in rene fuisse, quod ne ipse quidem Gal. scripserit, mirabaturque quod hic quamvis vesica ab urina libera, nullo tumore aut in pectine circa vesicam apparente, vel dolor grauante aut extendente, tanta copia urinae in renibus aut vterere permanere potuerit, adeo ut disrumpi latus sinistrum exclamaret æger, & in parte sinistra in vterere, versus ilia in parte anteriori se dolore atrocissimo confodi vociferaretur. Decimo igitur 5. die Ianuarii chirurgus ablegato, cum eius ope non liberaretur, re ipsa diligenter perpenſa, cum iam malum ad desperationem quasi deuenisse videretur, proposuimus, ut adhuc clysterem emollientem infunderemus, deinde & lenitium per os eodem die propinaremus, & cataplasma loco affecto emol-

liens, dolorem sedans & vtereres, simul apponere-
 mus. Quare hæc præscripsimus. ℞. diacassia ℥ j. benedict. laxat. ℥ s. salis commu. ℥ iij. sacch. rub. ℥ j. s. rub. oui gallina, olei lilior. ℥ iij. olei chamæ. ℥ j. cum decocto supra scripto fiat clyster. vix retinuit, & parum aut nihil effatu dignum deiecit. Quare & hoc statim per os propinauimus. ℞. cassia recens tracta ℥ vj. elect. de dactylis ℥ j. s. resina, terebinth. Veneta ℥ ij. s. aqua crethami marini & verbenæ an. q. s. syr. Ven. ℥ j. misce, sed totum sumere non potuit, ob nauseam qua tentabatur, licet fere totum ebiberit, parum aut nihil restaret, & ideo ne totum euomeret, integram portionē pharmacopœus non dedit, exigua tamen quantitate remanente. Cataplasma vero quod eodem tempore appositum fuit, tale erat. ℞. folior. malua cum toto m. ij. rad. althææ. ℥ j. s. sem. malua, althææ. an. ℥ ij. s. fenugr. ℥ j. sem. lini ℥ s. bulliant quoad mollescant, ut deinde contundi exacte possint: iisque contusis adde pinguedinis gallinae, butyri recentis an. ℥ j. olei zazamini, olei amygd. dulc. viol. an. ℥ j. farina hordei. m. j. s. fiat cataplasma, quod calide loco dolenti imponatur. Eodem die 15. Ian. istis præscriptis Delphos iterum remeavi, ad ægros meos inuisendos, reuersus vero post meridiem hora 4. inueni illum ex prædictis remediis nondum subleuatum, sed in peiori statu existentem, imo valde debilem cum maiore dolore & extensione circa locum affectum, neque adhuc guttulam urinae reddidisse, clysterem non retinuerat, neque medicamento per os sumto adhuc alius soluta erat. Ego vero, ne æger spem omnino abiiceret illum bene sperare iussi, inquit medicamentum leue esse ex cassia, cuius operatio tardius expectanda esset, & quod potio circa noctem prius operaretur: & ideo ob virium debilitatem ius pulli cum vino modico immixto, una cum oui vitello adiuncto dedimus, & post horam a iusculo assumto cepit medicamentum operari, paucis deiectis excrementis duris. Dixi præterea se peius habuisse ex cataplasmate: sed hoc factum existimauimus, eo quod vxor (ut referebatur) non satis calidum imposuerat, quare iterum appositum est, ut & calor consequeretur, desuper apponebantur panni calfacti. Et cum non subsequeretur maior operatio, noctem futuram grauem metuimus: & superueniente Henrico medico, etiam de salute ægri haud exiguus metus erat, & cum vix aliquid consilii superesset, eo magis ancipites eramus. Venit tunc mihi in mentem similis fere casus, de quo in Scholio latius. Quare re ipsa inter nos ultro citroque animaduersa, sub noctem, ut hoc decoctum pharmacopœus pararet, mandauimus. ℞. sem. malua, althææ. an. ℥ iij. cicerum rub. ℥ iij. sem. quat. maior. frig. an. ℥ ij. hordei mundat. ℥ ij. caricar. pinguium. num. ix. sebesten. recent. num. vj. glycyrr. rasa. ℥ vj. fiat decoct. in pintis quatuor vel quinque; aquæ communis ad consumptionem medietatis. Deinde facta colatura ea sæpius utebatur, etiam cum sitim haberet. Hoc decoctum erat lubricans, simul & emolliens, & urinam prouocans, quod quum biberet per totam noctem, absque alio potu, & apud eundem quum permanerem, tandem post mediā noctem, quum insigni dolore & cruciatu afficeretur, & animam quasi agere videretur, alius copiose soluta est, ita ut quatuor

14.

15.

quatuor secessus habuerit: & tanto impetu effluxit vrina, & adeo copiose, vt quatuor integras matulas impleuisset, si reservata fuisset: erupit enim lotium vna cū secessu, & lapillus nuclei pruni instar paulo oblongior, quales in vretre coaceruari solent: nam qui per vretres redduntur, figuram in vretre accipere videntur, quia oblongi sunt & nucleis pinearum similes magna ex parte, si non franguntur: tales & hic aliquando, vt postea etiam referemus, cum lotio reddebant. At nunc omnium primū cum secessu haberet, per virgam modicū sanguinis erupit. Deinde lapillus ille nuclei pruni instar, deinde & lapilli parui pisorum modo cum dolore exiebant, mox vrina foetida in magna copia subsequēbatur, & cum ardore haud exiguo. Neq; hoc admiratu dignum: nam per sex integros dies & noctes, lotium retentum fuerat, vnde & corruptionem & foetorem ac faldedinem contraxerat. Affirmabat enim aeger vrinam adeo foetere, vt in lecto perdere non posset ob foetorem eiūdem, dum exiret. Paulo post cum ita lotium turbulentum & foetidum emisisset, clarius mingebatur: & continuando potum illum dictum, dolor omnis euauit. Decimo sexto tamē die Ianuarii reliquias lenitū propinamus, & iussimus, vt potum illū vltimo præsriptum cōtinuaret: & habuit illo die quatuor vel quinq; secessus, ita vt ceperit multo melius habere. Imo 17. die Ianuar. denuo ad eundem reuersus, reperi eum in meliori statu, dolore paulatim mitigato, & vrina nunc ad placidum emanante. Interea præcepimus, vt decoctum illud vltimum adhuc continuaret. 18. Ianuarii die eundem accedens, inueni quasi curatum, quanquam non nihil de fluxu ventris cōquereretur. Victum tunc immutauimus, & liberaliorem concessimus ac solidiorem, & potum illum medicum inhibuimus, ne renes debiliores redderentur. Attamē admonebamus si vrina non satis efflueret, vt moderate eodem potu vteretur. Et sic Dei gratia, eius qui curat omnes languores, præter opinionem multorum optime curatus est.

S C H O L I A.

17 Cū hic eger primo sanguinem minxisset, & postea plane restrictus esset, ex sanguine vero condensato & in grumos concreto mieri non potuit. Et licet nonnunquam vena in renibus aut vretre non solum ex casu, vulnere, aut remediis diureticis rumpi posset, verum etiam ex fragmentis calculorum acutis, cū hic postea etiam calculus vrinam retentam deinde habuerit; in primo tamen casu, quocunq; modo prius sanguis vel ex decocto *cardui benedicti* a monacho propinato, vel forte ex calculis venas perrumpentib. euenerit, semper sanguine in vesica permahente, is sanguis in grumos conuersus videbatur, quod & si signa præsentia indicabant, cum ego ad ægrum primo accitus essem; nam animo linquebat, palleſcebat, pulsusq; exiguum, obscurum & densum habebat, in cerore agebatur, refrigerabatur extrema, & viribus destituebatur. Et quia grumus ille in meatum vrinarium inciderat, is quoque vrinae excretionem suppressit, vnde fieri potuit, vt tunc

quoq; lapillus meatum obstruxerit. Quocunq; modo id factum fuerit, graue malum erat. Ceterū quibus sanguis in vesica in grumos cogitur, pri-
18 mum tentandum est, vt medicamentis conuenientibus dissoluatur, ac diffundatur. In potu itaq; præbenda est artemisia, elichysum, absinthium, abrotanum, ramenta vitis, raphani semen, leporis aut hœdi coagulum, vnumquodq; cum oxymelite. Imo ipsum oxymeli per se exhibitum mirifice prodest: grumos enim dissoluit, vt subinde paulatim vna cum vrina prodeant. Ita & hic iuabat potio *oxymelitis, cum aqua malua & artemisia*: recte dedi etiam decoctum artemisiae, admiscendo quædam diuretica, cum de calculo suspicionem etiam haberem: vnde prius sanguinē dissolutum minxit, deinde etiam fragmenta calculorum ex renibus prodeuntium, qui erant ruffi, citrini: aliqui habebant aculeos. Qui enim ex renib.
19 De calculo renum & qui in vretre retinetur. fiunt (vt antea dictum est) ex arenulis simul coniunctis generantur, & figurā sumunt a renum sinu. Si vero in primo sinu retineantur, habent veluti aculeos, quos etiam nos conspeximus non solum in domino de Abbenbroeck, post cadaueris sectionem, sed in aliis multis adhuc viuentibus, & subinde in hoc eodem ægro: qui etiam suis aculeis venas renum vel vretrem perrumpunt, vt sanguinem mingant. Quod & huic primo euenisse potuit. Ideo illud decoctum artemisiae quoque cū diureticis quibusdam sanguinem illum concretū postea & lapillos eduxit. Verum de sanguine in vesica in grumos concreto, libro sequenti, cum de vesicae malis loquemur, latius dicturi sumus. Nunc vero de calculo renum & in vretre impacto agimus, qui manifestius in hoc secundo casu, in hoc mercatore etiam postea apparuit: adeo vt calculo renum, deinde etiam in vretre sinistro, laborauerit. A renibus enim (vt in libris nostris de incerto *vrinarum* iudicio contra vroscofos ostendimus) descendunt venæ illæ ex sanguine, quas Galenus poros siue meatus vrinarios seu vretres vocauit, prælongos, robustiores, qui ad vesicam feruntur, quibus aliquando impacti lapides (vt antea quoq; diximus) cruciatus intolerabiles producant. Hanc autem id in rene sinistro eueniebat, & in vretre sinistro, in quo calculi impacti vrinae meatum ad sex dies impediabant. Qui equidem si impactus est, quomodo educendus sit emollientibus, dilatatis meatibus, antea quoque dictum est: & quid in illo dolore, qui atrocissimus est, sit agendum scilicet in ipso paroxysmo, antea quoque docuimus, cum calculus non sit confringendus statim, sed emollientibus transponendus: quod vel hoc vnico exemplo ostendi potest. Ideo in hoc secundo casu in principio diureticis quibusdam per priorem medicum descriptis nullo modo dolor cessauit: imo magis exasperabatur calculo plus impacto: sed cum decocto illo ex caricis, cum aliis emollientibus, & quibusdam diureticis nō admodum fortibus, præcedentibus clysteribus vsi essemus, egregie profuit ad curationem absoluendam: quibus effectum est, vt æger hoc modo ab orci faucibus quasi liberatus fuerit. Cognouimus insuper

hoc exemplo lapidē in vretere sinistro impactum fuisse, ex dolore loci affecti, qui adeo vehemens & fixus in loco, non vagabundus, ut in colicis doloribus fieri assolet, hærebat, adeo truculentus, ut æger neq; in lecto manere posset, neq; in sede permanere: modo enim ad ignē se recipiebat, denuo ad sedem, iterum ab ea ad lectum, unde etiā multas ventositates incurrebat, quæ & dolorem augebant, ut minus quietus esset. Verum quod vrina in totum fuerit suppressa, id ex lapide vreteri sinistro inhærente & occludente contingebat, & renibus quoque lapillis oppletis, sese in eo loco disrumpi clamabat. Hæc ita quidem esse, nec in vesica malum latere apparebat: nam in ea neque tumor erat circa pectinem, neque calculum in pene aut in collo vesicæ hære; cum catheter impactus vsque in vesicam libere transiret, lotio tamen non subsequente, cum & chirurgus digito immisso per anum, quo modo experientiam faciunt, num calculus adsit in vesica, in ea nullū lapidem sentiret. Retinebatur igitur lotium ex calculo retento in vretere sinistro. Sed hic Henricus, medicus certe doctissimus nobiscum admirabatur, quod vrina non fluere in vesicam per renem dextrum, cum in ea parte nulla obstructio adesse videretur: neque enim dolor dextrum renē aut vreterem dextrum occupabat. Nunquid forte ob imbecillitatem suam officium minus præstaret; vel potius, ut ego sentiebam, per sympathiam id fieret, quo minus vrina per renem dextrum & vreterē deflueret, sinistro oppleto. Deinde mirabamur ubi tanta copia vrinæ in renibus, vel sursum elata contineretur, cum ad vesicam non perveniret? Vnde & experientia constabat illud minime verum esse, quod scribit Fernelius de Ischuria, sic inquit: *Una igitur suppressa vrina causa est obstructio vel obstructio. Hæcque vel amborum vreterum capita, vel vesica cervicem opplet. Utrum autem eorum in causa sit, certis notis peruestigandum. Si alterius duntaxat vreteris via obstructa est, haud quaquam supprimitur vrina; per alterum enim perlabitur. At quum vterque obstruitur aut coarctatur, suppressio fit, hinc conspicua, quod laborans renis utriusque dolore fuit opportunus, lumborum summa gravitas est, ac interdum vehemens utrimque dolor excruciat, nulla aut minima meie di cupiditas urget, in pube nec dolor nec tumor ne premendo quidem percipitur: vesica inanis est, & vacua, ut nec immisso cathetere vrina quicquam emanet.* Hic tamen contrarium vidimus, semper dolore in vretere sinistro manente, ubi cum in dextro rene neque dolor neque obstructio esset, tamen mingere non potuit: ita ut hæc opinio Fernelii hoc solo exemplo minus vera sit. Vel enim dicendum in dextro rene nullam obstructionem adfuisse, vel ex torpore per consensum officium nō præstitisse, vel forte ob condolentiam. Verum ubi copiosa illa vrina substitit videndum: nam in renibus tanta copia manere non potuit: oportet igitur, ut regurgitaverit ad hepar & venas superiores. Illud quoque videtur sentire Ioan. Tien-
gus, medicus magni nominis, quondam apud Amstelrodamentes. Qui fere similem refert hi-

storiā, quam inter eius scripta reperit. Quam hic ad maiorem fidem referre libet. *Mulier quædam cum retentionem urina ex oppilatione renum patere-
tur, tota aquositas ad hepar & ad venas superiores regurgitabat, unde maximam angustiam cordis incurrebat & anhelans. Ad vesicam vero nulla aquositas profluebat. Hinc inprimis hunc clysterum misce-
runt: ℞. caulium parietarie florum chamomilla, betæ, artemisia ana m. j. anisi, cumini, fenugreci, acci, semini lini, api ana ℥ ij. fiat decoctio; cuius ℞. ℥ j. addendo olei communis ℥ j. mellis ros. colati, cassia extracta ana ℥ j. salis communis ℥ ij. fiat clyster, mox & in die bis ex iulebo sequenti sum sit: ℞. syrup. acetosi simplicis ℥ j. mellis rosa. colati ℥ j. aqua. bugloss. lupul. foeniculi ana ℥ j. misce pro duabus vicibus. Lumbi hoc fomento fovebantur: ℞. mairicaria, pariet. artemisia, meliloti ana m. j. sem. api, cumini anisi, ruia ana ℥ ij. fenugrec. ℥ j. fiat decoctio in aqua communis q. s. Interdum etiam fovebantur cum filis crudis decoctis in cineribus. Postea exhibui, inquit solutivum tale: ℞. agrimonia filipendula ana p. j. zinzib. semin. genista semin. petrosel. Macedon. ana ℥ j. agarici electi ℥ j. cyclaminis ℥ j. fiat decoctio in aqua lupul. & exprimatur: cui addantur oxymel. simpl. medulla cassia ana ℥ ij. Istis continuatis per quatuor vel quinque dies, vrina non fuit provocata: sed sæpe reiteratis clysteribus, & iulebis, ut superius dictus est, assumtis, etiam tale iuleb. exhibitum fuit: ℞. agrimonia, filipendula parietaria pentaphyllonis ana m. j. cyclaminis, semin. maior frig. ana ℥ j. rubia tinctor. ℥ j. sem. petrosel. Macedonici, semin. genista, granor. iuniperi ana ℥ j. fiat decoctio in aqua lupul. artemisia; & colatur. ℞. syr. de duab. rad. syr. de end. de byzantio ana ℥ j. decocti. supra scripta ℥ j. misce pro duabus vicibus. post binam huius exhibitionem cepit vrina profluere, licet primo in parva quantitate. Sed isto continuato, & fomentationibus, semper vrina abundantius provocabatur: adeo ut etiam menstrua aperirentur. Et quia putabat se pregnantem, in quarto vel quinto mēse, diu situm iuleb. istud, & præscripta tale: ℞. pentaphyl. plantaginis, hypericonis, hyssopi ana m. j. agrimonia, parietaria ana p. j. semin. & frig. maior. granor. iuniperi, sem. cardui benedicti ana ℥ j. rad. torment. llo ℥ j. fiat decoctio in aquis portul. lupul. api. ℞. syrup. de end. de byzantio de eupatorio ana ℥ j. decocti. supra scripta ℥ j. misce, pro duabus vicibus. Iste utebatur per tres vel quatuor dies, & copiose provocabatur vrina, & menstrua subsistebant, & omnia accedētia præstabant. Cui postea feci elect. ex speciebus regina & diamarg. cum sacchar. decoct. aqua end. & sum sit bis in die loco iulebi, & Dei nutu prospere evasit. Hæc illa. Verum si fuerit gravida, ut exultimabatur, mirum quod eiusmodi diureticis menstrua aperientibus non fuerit passa abortum. Fuit hic gravis casus, quamvis præcedens in mercatore multo gravior fuerit.*

OBSERVATIO XXVII.

De calculo in vretere lotium omnino retinente.

Idem ille mercator Henricus Perfinus, eodem modo, quo paulo ante diximus, in omnimoda

Historia
urina
ta in opp
tione ven
in qua ag
sitas ad
par &
nas sup
res reg
tabat.

23

24

dam vrinæ suppressionem incidit, ex calculo in v-
retere sinistro rursus impacto, anno 1560. 15. Iulii
die, & in idem malum relapsus est, neq; potuit vl-
lo modo lotium reddere per tres dies ac noctes.
Cum autem isto dolore intolerabili torqueretur,
& sine medici consilio accepisset decoctum senæ,
ex eo licet haberet secessum, materia tamen ad re-
nes etiam deducta fuit, & ad vretes, & in sinistra
parte magis impacta quam euacuata, cum potius
curatio incipienda fuerit ab ipsa mitigatione; &
ideo post meridiem prius ad eum accitus sum, cū
in propriis ædib. nunc Delphis decumberet, cum
ex decocto senæ assumpto secessum haberet, vrina
tamē ob calculum in vterere infarctum retenta,
fomentum emolliens & anodynum ob insignem
dolorē rursus in loco prædicto præscripsi. *℞. rad.*
althææ ʒj foliorum maluæ, viol. parietaria, florum
chamomill. meliloti ana m. j. sem. maluæ, fœnugr. ana
ʒij. ʒ. fiat decoct. in aqua communi, pro ʒ. duabus,
pro fomento loci dolentis cum spongia. A fotu inun-
gebat locum affectum linimento subsequenti: *℞.*
olei amygd. dulc. viol. pingued. gallinæ, butyri recen-
tis, olei chamomill. ana ʒ. ʒ. misce. Sed iis nihil pro-
fecimus. Quare & hoc decoctum præscribo: *℞.*
foliorum ribes nigra m. j. sem. maluæ, althææ ana ʒij.
cicerum rub. ʒij. sem. quat. frig. maior. ana ʒij. hor-
dei mund. ʒij. caricar. ping. nu. ex. sebesten nuno. vij.
glycyrrh. rasa ʒ. ʒ. fiat decoct. in aquæ communis
pintis quatuor, ad consumptionē medietatis. Hoc
decocto seu colatura utebatur ad libitum, quo et-
iam alia vice, vt dictum est prius, commode vsus
est; nunc tantum adiectis ribes foliis. Verum hoc
tempore nihil effecit. Quamobrem cum aluum
prius mouissem cum foliis senæ, & secessum ha-
buisset, & nunc rursus aluum nō deponeret, ter-
tio die enema emolliens, sedans dolorem, & vias
vrinarias, nempe vretes, & renē ipsam sinistru
dilatans, vt lapis inde moueretur & expelleretur,
iniici iubeo, in hanc modum præscriptum: *℞.*
rad. althææ ʒ. ʒ. foliorum maluæ, viol. parietar. mer-
curialis, florum chamomill. meliloti ana m. j. sem.
maluæ fœnugr. ana ʒj. ʒ. fiat decoctio in aqua com-
muni q. cuius colatura accipe ʒ. j. addendo diacas-
sia pro clysteribus ʒ. ʒ. ʒ. acch. rub. ʒ. ʒ. olei amygd. dulc.
libior. chamomill. butyri recentis ana ʒ. ʒ. salis commu-
nis ʒ. ʒ. salis gemmæ ʒ. j. misce pro clysteri. Retinuit
autem per tres horas. Sed iterum adhibito fotu,
deinde inunctione ventris, punctiones cœpit ha-
bere Imperaui igitur, vt sellæ insideret, cū vascu-
lum subiectum esset aqua calida chamomillæ re-
pletum, ac sic tentaret, num ventris saburræ de-
ponere posset; & tandem aluus cœpit fluere, & co-
piosas habuit purgationes, & mox lotium reddi-
dit, & rursus lapillum vnum atq; alterum ad pisi
magnitudinem reiecit, mox dolore mitigato, his
quidem remediis denuo per me solum curatus e-
uasit ab omnimoda vrinæ retentione, vt sine mo-
lestia copiose vrina emanaret, postquam per tres
dies ac noctes retenta fuerat.

S C H O L I A.

4 *Quomodo*
inlenosifia R Ecte dixit doctissimus ille medicus Monta-
nus in consultatione sua 93. manifestum esse,

renes & vesicā, vbi semel aut bis afficiuntur, vt plu-
rimum imbecilliores reddi, & præparari ad nocu-
mēta facile suscipienda. Quod inde apparet, quod
qui semel aut bis calculum, vel retentionem; aut
difficultatē vrinæ perpeffi sunt, vix possunt omni
conatu præcauere, quin toto vitæ curriculo non
subiciantur iisdē; quare & iis renes sunt corrobo-
randi, vt ibidē docet ad longum, & disputat, num
diuretica cōueniant in præseruatione affectus re-
nū & vesicæ, contra illos empiricos, qui iisdē sine
animaduersione vtuntur. Quamobrem cum hic
mercator facile recidiuam pati posset, vt diligen-
ter victus rationem obseruaret, eidem in scriptis
dedi. Verum cum idem paulo post in victu deli-
quisset, idem malum facile recurrebat: sed adhi-
bito eodem clystere emolliente prius descripto
obseru. præcedente, deinde adhibito fotu ac lini-
mentis iisdem, hanc purgationem lenem exhibui:
℞. cassiæ recens ex cannis tractæ ʒ. ʒ. elect. de dactylis,
tereb. clare prius rosta & parum pulu. ana ʒ. j. aqua be-
tonica, maluæ, raphani ana ʒ. ʒ. ʒ. aqua agrimonie ʒ. j.
syrup. capill. ven. iunibini ana ʒ. ʒ. misce. detur unica
vice. habuit iterum quinque sedes, & ad libitum
minxit: epoto etiam interim decocto ex ficubus,
cicere, & aliis antea descripto.

OBSERVATIO XXVIII.

De eodem mercatore rursus in suppressionem vri-
na incidente.

Idem hic mercator, eodem anno 1560. decimo
sexto die Octobris, cum mustum bibisset & ca-
staneas comedisset, quibus delectabatur, licet ea
a me prohibita essent, eodem malo correptus est;
neq; rursus lotium reddere potuit. Primo iterum
adhibito clystere emolliente, mox lotium reddi-
dit: & cum libere vrinam mingeret, dedimus pur-
gationem illam lenem supra dictam. Sed denuo
vreter sinister obstructus est ex calculo, & vrina
omnimodo denuo retenta. Ego timebam ex pur-
gatione quantūuis leui ad renis locum deturbatū
esse, licet tamen arte curationem instituerā, prius
inieccto clystere emolliente; vnde & lotium ema-
narat. Et lotio emanante lenem illam purgationē
exhibueram, qua etiam multa muccosa, vt etiam
cum clystere, excreuerat, non obstante quod ite-
rum lotium fuerit retentum. Quare vsus sum fo-
mento vltimo in præcedentibus descripto, ex rad.
althææ & reliquis, mox & decocto illo ex ficubus.
Quibus remediis non solum lotium reddidit; sed
& fragmenta multa lapillorum reiecit cum lotio,
prius vno eiecto ad pisi magnitudinem; & rursus
egregie curatus fuit.

S C H O L I A

Miser hic æger quinquies hoc anno huius in-
tolerabilis doloris malum haudquaquam
contemnendum passus est, & recidiuam incurre-
bat ex calculo in sinistro rene in hærente ac reten-
to. Verum ab hoc dolore, tum alii quoque simili
casu laborantes in hunc modum semper curati
fuere, primo inieccto clystere emolliente; deinde
fomentis & linimentis emollientibus, dolorem
sedantibus & renem ac vreterem relaxantibus;
postea decocto illo ex ficubus, cum cicere, & aliis;

3 ultimo purgatione ex cassia adhibita. Quod quidem non solum medicis nunc praxin exercentibus, sed etiam iunioribus omnib. medicis tum medicinarum tyronibus, memoriam commendandum est. Nam talis curationis processus, in paroxysmo accessionis, seu tempore doloris, non modo utilis est in calculo renum vterem obstruente, ita ut lotium retineatur; verum etiam in quavis renu obstructione, siue ex materia viscosa, siue ex calculo, valde necessaria est. iij. q; precedentibus quicquid in vteribus seu renibus impactum fuerit, siue calculus, siue alius humor crassus, postea diureticis multo melius propelletur, alioqui diuretica in principio adhibita maxime oberunt, ut sequens exemplum ostendet in eodem mercatore.

OBSERVATIO XXIX.

De eodem mercatore denuo incidente in urina suppressionem ex calculo vterem sinistram obstruente; unde mors subsequuta.

1 Infortunatus mercator idem & miserrimus, cum hoc malo ita obnoxius esset, denuo anno. 1561. 23. die Martii in urina suppressionem adeo gravem incidit ex calculo rursus obstruente vterem sinistram. Antwerpia eo tempore agebat, apud uxoris matrem: ut inde mors tandem subsequuta sit: cuius historiam hic libet adicere, ob communem utilitatem nostrae professionis. Quum nullis modis tunc quoque lotium reddere posset, medici Antwerpiani alioqui excellentissimi ad illum vocati sunt. Et omnium primo accitus est ad eum Cornelius Spirinchius dictus medicus senior: deinde Arnoldus iunior medicus. Postremo vero & B. kanus doctissimus, si quis alter, & insignis medicus. Varia vero ac multa medicamenta eaque extrema remedia tentarunt: sed frustra. Demum oborta in corpore magna inflammatione & febre satis vehementi, magisq; sub noctem affligente, vires eius plane prostratae fuere. In principio autem utebatur tenuissima dieta, quanquam (ut nobis relatum fuit) postea cibum efflagitaret medicis denegantibus, postea vero concedentibus iusculum pulli cum succo limonum. Medicamenta, quae praescripta fuere, suo ordine recensebimus, facto initio ab iis, quae Cornelius Spirinchius senior medicus primo praescripserit. Et erat enema sequens: ℞ rad. althaeae ℥j. betonicae cheresfolii ana m. j. coquantur in aqua pluviiali q. s. ad ℥b. j. tum colatis adde sacchari rub. ℥ij. olei amygd. dulc. ℥ij. diacassiae ℥j. ℞. fiat enema. Secundo: ℞ olei amygd. dulc. pingued. gallinae ana ℥j. misce. inungat locum dolentem & renes crebro. Tertio: ℞ rad. filicis calamiarum saxifragiae ana ℥b. ciccerum rub. m. ℞ gentiana ℥b. sem. anisi ℥j. ligustici angelicae dauci ana ℥j. passul. mundat. xij. coquantur in aqua pluviiali q. s. ad ℥b. j. ℞. in colatura adde vini Rhemensis ℥iij. sacchar. & cinnamomi q. s. fiat potus odoratus & clarificatus. Quarto: ℞ cheresfolii fufuris tritici. florum chamomill. ana m. ij. seminis anisi ℥ij. incidantur herba parum, & pistentur semina, rad. althaeae ℥ij. compone in sacculos manus longitudine & latitudine, cancellatos, ut consuetudo est. Quinto: ℞. ex eisdem herbis, radi-

cibus & seminibus; coquatur certa portio in cacabo in aqua pluviiali debita quantitate, ut eodem decocto sacculi coquantur, expressi salide loco dolenti admoveantur. Sexto: ℞ sem. anisi, ligustici ana ℥b. glycyrr. ℥b. rad. foeniculi saxifrag. ana ℥j. coquantur in aqua pluviiali, & vini Rhemensis ℥b. j. ad consumm. medietatis, colat. adde sacchari & mellis ana q. s. cinnamomi parvi; & fiat potus. Septimo: ℞ succi foliorum porri & cheresfolii ana ℥ij. clarificetur, acur statim b. benann. Octavo: ℞ olei scorpionis ℥j. ℞. vngatur totus penis in xia inferiore partem. Nono: ℞ fufur. tritici. char. fol. florum chamomill. ana m. j. ℞. coquantur in aqua pluviiali q. s. ad ℥b. j. in colatura adde olei amygd. dulc. & amar. z. sacchari ana ℥j. ℞. hierapicra Gal. ℥j. ℞. fiat enema statim. Decimo: ℞ pulv. corticum quorum combustorum ℥j. cum vino albo fiat haustus. Haec sunt, quae Spelingius ille excellentissimus medicus solus praescripserat. Sed cum iis nihil proficeret, accitus est Arnoldus iunior medicus; & una subsequenter praescripserunt, scilicet: Undecimo: ℞ bened. et laxativa ℥b. oxymellis composui ℥b. aqua foeniculi ℥ij. fiat haustus. Duodecimo: ℞ corticum ou. assati ℥j. vini Rhemensis ℥ij. misce, bibat statim. Decimotertio mandarunt, ut balneari & foveri in aqua calida totum penem. Sed ex his omnibus nihil lotii subsequutum est. Et ita tandem vocatus est insignis ille medicus Bekanus, vir mehercle doctissimus. Et tunc communi consilio postremo deueniunt ad extrema remedia & diuretica, nempe ad cantharides. Et sic cum lotium adhuc non redderet aeger. Decimoquarto communi consilio haec praescribere: ℞ seminis dauci Cretensis ℥j. corticum quorum combustorum ℥j. aqua raphani ℥ij. & ℞ cantharid. nu. j. Decimoquinto: ℞ fufur. m. tritici. cheresfolii. florum chamomilla ana m. j. rad. althaeae ℥j. malua m. j. ℞. fiat omnium decoct. in aqua pluviiali ad ℥xv. olei amygd. dulc. ℥j. hierapicra ℥j. diacassiae ℥b. misce pro enemate. Decimosex. o: ℞ dauci Cretensis ℥j. corticum quorum combustorum ℥j. cantharid. nu. j. tenuissime omnib. pulverisatis sumat cum vino Rhemensi. Verum ab hoc pharmaco assumpto postea lingua nigra reddita est (ut postea aeger nobis retulit) ideo id non amplius dedere. Nam suborta erat inflammatio & febris subsequens batur satis acuta, ea ipsa paulatim magis augecente, neq; aegro per lotium quicquam excernente. Antea quoq; adhibitus erat catheter, etiam cerea candela per meatum penis vsq; in vesicam immissa: sed frustra. Postea eundem nudum in balneo posuere ultra umbilicum vsq; Pro quo parando, decimoseptimo haec describere: ℞ malua, althaeae ana m. ij. chamomill. m. ij. fufur. tritici par. ana m. ij. ℞. rad. rabie cinctorum ℥j. in j. misce. & haec omnia simul cocta in balneo vel in na posita fuere; in qua tina nudus sedebat ad horam cum dimidia, ex qua sessione (ut mihi postea referebat) plus aequo sudavit, & deinde debilitatus est, & nihil iuuamini ex eo sensit, neque aliud commodi consequutus est. Decimooctavo praescripserunt ceratum: ℞ rad. althaeae, malua ana ℥j. ℞ sem. lini, fenug. ana ℥b. sem. foenic. ℥j. succi cheresfolii

foiu 3. iij. aceti vini a'bi lb. j. & coque ad consistentiam mucilaginis, & ex mucilagibus cum candida cera sufficienti & pinguedine gallina olei amygdal. dulc. & modico terebinthina fiat ceratum circa renes. Decimonono: ℞. olei seminis raparum 3. x. iniiciatur per clysterem. Vigesimo: ℞. cinerum stipitum fabarum corticum fabarum, sarmentorum vitis, filicis ana lb. & aqua pluvialis lb. iij. calefiat aqua, coletur per sacculum ter quaterue: colatura adde succi limonum depurati 3. iij. cinamomi 3. ij. clarificentur simul per sacculum. Præter hæc omnia eidem quoque dederunt puluerem vitri combusti & præparati. At istis omnibus remediis, alioqui a tribus doctissimis medicis præscriptis, cum nihil promouerent, & æger ad extremum periculum redactus foret, perpetuo exclamabat, locero suo tum amicis ac vxore præsentibus. Si medici mei domestici ope uti possem, facile is lotium prouocaret suis consuetis remediis, cum quinquies me ab hoc malo liberauerit. Amici illius misericordia commoti, die lunæ post festum palmarum ad me Delphos usque literas miserunt, quæ continebant, ut vna cum fratre ac nuntio, qui literas perferebat, ægrum inuiserem, ac Antwerpiam venirem. Discessi eodem die, quo literæ allatæ erant, nempe Martii die ultimo, & vna cum fratre, ac nuntio, primo Aprilis die, Antwerpiam appulimus, & hora 2. pomeridiana ægrum accessimus. Tunc conuocatis medicis, casus mihi narratur, & quæ circa eundem acta forent, explicant. Quæ etiam ab ipso pharmacopœo in scriptis mihi tradita fuere, nepe omnia illa, quæ nunc recensuimus, quibus hætenus vsi fuerant & nunc nonus esset dies, quod ne tantillum quidem lotii æger excreuerat. Et simul suam opinionem de affectu & parte affecta mihi dixerunt medici præsentis, qui existimabant potius viscosam & crassam materiam in rene ac vtretere esse impactam, quam calculum, qui lotium inhiheret. Nec opinabantur calculum ex vtretere dilapsum in vesicam meatum vrinarum obstruentem, cum frustra cathetere & cerea candela vsi fuissent, uti & nos aliquando sine utilitate in eodem ægro feceramus. Recte quidem, (respondebam ego) idem sentio calculum neque esse in vesica, neque ex renibus in vesicam delatum, neque calculum adesse obstruentem os colli vesicae, quo minus vrina essluat; neque in meatum penis impactum, quod & catheter & candela cerea frustra immissa indicant. lotio non subsequente. Interea, saluo meliore iudicio, sustinebam, neque materiam crassam viscosam in rene aut vtretere esse impactam, neque in vesica, cum ea ipsa vacua esset: verum quod calculus e rene motus in vtretere sinistro hærens, lotium non permetteret transire in vesicam ipsam. Ideo pronuntiabam calculum in vtreterem sinistrum esse impactum, quod & scdes affecta, & dolor circa vtreterem sinistrum indicabant, eoque magis, quod hominem iam quinquies eodem malo correptum præ manibus habuissem, quem & sanitati restitui, primo vtens clysteri vno atque altero emolliente, statim etiam adhibendo fomenta, ac linimenta mollientia, dolorem se-

dantia, ac renem & vtreterem relaxantia, deinde decocto quodam appropriato simul emolliente, detergente, & vrinam leuiter prouocante, ita vt semper calculum reiecerit, modo ad pisi magnitudinem, modo non plane rotundum, sed paulo oblongiorem nuclei pruni instar, quasi ex rene sinistro lapsus foret, in vtretere hærens diutius, talē formam cōquisierit; modo etiam fragmenta calculorum similiter sublequuta sunt, etiam figuræ instar pinearum, quales in renib. oriri solent, modo subruffi, modo citrini; & post illos calculos emissos statim subsequutum quoq; fuisse lotium, vt semper hoc modo, nō solum ab illo insigni dolore, sed lapillis expulsis, & vrina demū libere ex-eunte, nunc quinquies a me laude diuina sanitati restitutus sit. Et ideo licet a vobis excellentissimis doctoribus recte quidem in principio & subinde ēt enemata, & alia emollientia p̄scripta sunt: tamen cum valde forte fortia illa, & diuretica ad lotium quidem educendum a vobis p̄scripta, hætenus non iuuerint, nullo modo iis insistendū esse puto, calculo adhuc in vtretere sinistro permanēte, cum dolores vehementes nullo modo remittant, & febris magis incendatur, qua & nunc laborat, virib. etiam plane deiectis, tam ob febrem, quam dolores & vigilias præcedentes, omnib. modis operam darem, eodem decocto, quo semper prospere post clysteres, fomenta & linimenta vsus sum, etiam nunc uti. Et licet sanguinis missio etiam hic conueniret, quam Actius monuit in principio peragendam; sed nunc, licet ob febrem & inflammationem conueniret, tamē in homine extreme debilitato vix conferre putarem. Vtreter quoq; ventosa ad lapidem transponendum; sed quia iis vsi estis, ab ea nūc abstinere: neq; in cibo aliqua diuretica exhibere, quæ neq; illi modo in principio, neque nunc sola, cum adhuc calculus ex suo loco non sit dimotus, exhibenda sunt. Propterea ego meam decoctionem ex ficibus, malua, alchæa, cicere & aliis paratam, darem, modo vobis, illustres medici, id videatur commodum. Quam rationē meam doctores excellētissimi intellexissent, vnanimi consensu in meam sententiam transierunt, tam de affecta parte quam affectu ipso, & de vili curatione, vt eandem decoctionē, qua solitus fueram in eo uti, propinarē. Quod equid. m. lecretū & arcanum, vt vocant, ne nunc quidem reticere volo ob communem agrotantium vtilitatem, ne illud audiam, quod seruus ille nequam audiuit a domino suo, quod talentum sibi a domino commissum sine scenore sub terra cōdidisset: ideo neque hoc arcanum posteritati iniquior (vt multi prob dolor solent facere) apud me seruare volui. Estque hoc decoctum sequens: ℞. sem. malua, alibæ ana 3. iij. cicere rub. 3. iij. sem. 4. frig. maior. ana 3. ij. hordei mundati 3. ij. caricarum pinguium num. ix. sebesten numer. vii. glycyrrh. rasa 3. fiat decoctio in lb. 4. aqua pluvialis ad consumptionem medietatis, colatura vsui reseruetur: qua continuo vtens, calculum semper excreuit, vt in præcedentibus observationibus ostensum est. Atque hæc decoctio a me descripta & ab excellentissimis medicis approbata, quod febr-

11 nō obesset, primo Aprilis die a me præscripta est: & statim ea vtēs, venter (ut ager ipse fatebatur) qui instar tympani durus erat, emollitus est, & subsequutus est secessus quam plurimus, cum ea cōtinuo vteretur; & dolor aliquomodo mitigabatur, quamuis neque vllō die minxerit: interea tamen nocte sequente paulo melius habuit, & plus dormiuit, quam omnibus noctib. præcedentibus. Sed febre eum non relinquēte, & virib. omnino prostratis ob dolores præcedētes & vigilias, consultū fuit ægrum paulo largius nutrire, cum medicorū præsentium consensu: & sic factum fuit. Videbatur quoque vtile & Cornelio Spiringio & Arnoldo Becano, tunc non præsentē, vt cum vesica sequenti decocto repleta tale fomentū fieret, quod eorundem medicorum consensu ita a me descriptum est secundo die meæ vocationis; *℞. rad. althææ ʒj. ʒ. foliorum malua, viol. ana m. j. parietariae m. ʒ. florum meliloti p. j. sem. althææ, malua ana ʒiij. ficuum ping. num. vi. coquantur ad mollitudinem, & pistentur ac confricentur, cum toto; liquori decoctionis huius etiam addas olei Zizamini, olei amygd. dulc. liliorum ana ʒj. omnia ponantur in vesica, duplici filo ligata, & ita calide in vesica conclusa loco dolenti sæpius ne admoueat. Post meridiem, cum nondum redderet lotium, consultum fuit, vt aliquo modo magis aperitiua adhiberemus: & quia tunc Arnoldus medicus solus aderat, Cornelio Spiringio non redeunte, hæc decoctio descripta est: *℞. corticum rad. apii, feniculi, asparag. brusci, graminis ana ʒ. ʒ. parietariae, chærefoli, spergularib. nigra, seu summitatum eius, ana m. j. rad. resta bonis seu ononidis ʒj. semin. malua, althææ ana ʒiij. glycyrrhi. rasa ʒj. caric. ping. nume. iij. sebesten nume. viij. dauci cretici ʒiij. semin. 4. frigid. maior. ana ʒj. fiat decoct. artis ratione in aqua pluuiali ad lb. ij. & utebatur mane & vespere tantum loco syr.* Die sequenti, qui erat xi. dies, a quo tempore non minxerat, communi consensu & Cornelii Spiringii & Arnoldi, qui tunc aderant, meo decocto ex ficibus, quod pro arcano habebam, continuo utebatur, etiam fomento cum vesica. Et tandem tertio die Aprilis, qui erat vndecimus ab initio sui morbi, non minxerat, parum mingere cœpit, omnib. admirantibus: & cum continuaret decoctum illud nostrum, tandē cum magno impetu lotium erupit, & libere mingere potuit. Cum vero medici præsentēs admirabundī dicerent, non emittit lapillos æger, vt prædixeras; ideo & obstructio est ex materia viscosa: ego contra respondi, non dubito quin lapillus adhuc subsequetur vel calculus: vt etiam euenit, (& idem quoque alias cum eodem decocto vteretur eueniat. vt superius relatum est.) Nam altero die, qui erat 12. dies ab initio sui morbi, lapillum rufum ad magnitudinem pisi abruptum cum lotio demisit in matellam, medicis tū præsentibus ac amicis idem spectantibus: ac lotium deinde minori negotio, imo copiose fluere cœpit. Et quanquam hæc contingerent, vt æger se nunc sanatum putaret, tamen vires ad extremum deiectæ, licet paulo mitius febricitare videretur, erant mihi valde suspectæ, cum etiam ab illa*

febre post mictionem non liberaretur. Medici autem cum lapillum proiectum spectarent, hoc nostrum prognosticum ac curationē palam laudabant: & quia videbant vrinā libere exire, ægrū tanquam iam sanatum omnino relinquebant, etiam amicis ciuib.que Antwerpianis me ita extollentibus, vt medicum Batauū dicerent hunc ægrotum quasi sepulcro destinatum ad lucem reuocasse: & illa fama apud alios mercatores dispersa, causa fuit quod ad multos vocatus fuerim cōsultandi causa, qui renum aut vesicæ affectibus detinerentur. Attamen minus ea laude afficiebar, quanquam nostris optimis remediis vtens, Deo adiuvante, lotium redderet, quia nondum febre illam superauerat, quā valde periculosam metuebam: multoq; fortunatior medicus fuisset; si ab ea liber euassisset, in quam ipse ante nostrum accessum infelix inciderat eger. Et licet æger 13. die subsequenti, eo quod nunc lotium redderet, valde gaudebat, & speraret melius de sua salute, atq; palam profiteretur multo melius se habere, imo & præ lætitia se ipsum erigeret in lecto, quod antea minime poterat: tamen omnino periculum non euaserat. Cum nunc libere lotium redderet, vt a decocto nostro abstineret iussi; & vt febris quoque malignæ rationem haberemus consului. Nam licet ad libitum nunc mingeret sine vllō obstaculo, tamē 14. die, qui erat dies Sabbati ante festum Paschæ, peius habuit, & magis febricitauit: & illo die excepit illum fluxus sanguinis narium, luna promota ad signū oppositum radice ægritudinis: post quem sanguinis fluxū pessime habuit: vnde etiam prædixi quibusdam amicis astantibus, quod æque bene moreretur, licet iā optime mingeret, febre nondum cessante, & virib. plane collapsis: ideo medicos reuocari iussi, qui hominem iam quasi pro restituto habentes reliquerant. Ceterum Spiringius eo tempore ægrum non accessit: nam is euocatus erat ad dominum de Bergen: solus Arnoldus comparuit, eamque febre non ita malignā iudicabat; atq; siccitatem oris, quam æger etiam tunc sentiebat, nihil eff. faciendam, quam putabat contractam & nigram euassisse, ex liberaliore vsu limonum, quibus medicorum cōsilio diutius vsus fuerat, non obstante quod ego iudicarem, ex malignitate febris id fieri, cū & totam noctem male tulisset, & nunc post crisin imperfectam ex fluxu sanguinis narium male haberet, cum & lotium libere effluens nihil homini virib. destituto prodesset. Interea tamen communi consilio inter nos, gargarismo utebatur ex hordei mundati decocto, pro oris siccitate; & nodulis ex semicotoneorum in ore detentis & per linguam cōuolutis, quib. ego frequenter in aphthis & lingua aspera nigra uti solebam. Capiebat simul duo cochlearia argentea syrup. viol. sub noctem, & etiam illo die hordeato pro alteratione & viribus refocillandis in hunc modū parato utebatur: *℞. amygd. dulc. repurgat. v. ʒ. sem. 4. frigi. maior. mund. ana ʒiij. aqua horaci lb. j. fiat hordeatum seu emulsorium, adiecto zaccchar. albi, vt artis est.* Pro fiti quoque utebatur cerasis conditis. Decimo-
quinto

quinto die ab initio morbi, qui erat dies Paschæ, mane quātumvis melius habere visus est, & vrina per se copiosius flueret, quam antea, tamen sub noctem pessime habuit, & admodum inquiete totam noctem peregit. Decimoseptimo die delirio quasi accedente omnia in peius vergebant. Cumque iterum vocatus esset Arnoldus medicus, sed profectus esset Mechliniam ad uxorem, quā nouiter duxerat, eo nō veniente denuo Becanus accitus est: & inter nos factō prognostico, quod moreretur, eodem die post meridiem, nempe decimoseptimo die, computando ab initio morbi, obiit.

S C H O L I A.

17 **M**Eo quidem infortunio, dum lotium nostra ope (*Deo adiuuante, sine quo nihil fit*) reddidisset, vir hic egregius & nostri amicissimus tamen obiit, viribus ob febrem etiam consumptis, cum toties hoc malo, tum calculo excarnificatus, locis ipsis quoque affectis debilioribus redditus, morbum hunc atrocissimum superare nō potuerit. Aliqui ex amicis satis sinistre iudicabāt ob febrem inductā a medicamentis fortioribus agrū mortem incurrisse; licet medici illi in artis operibus peritissimi recte vli fuerint clysteribus emollientibus, tum fotibus in principio. Non deerant & vulgares, qui vitrum combustum exhibitū incusarent: eo tamen & Galenus noster, tum alii veteres medici vli sunt ad comminuendum calculum. Interea hic admonēdi sunt tyrones ex Guainerio, sit eo sit vtendū, vt hoc agrotō non manifestent, cum ex eo canes interficiantur: sed his (*scilicet canibus*) non tritum datur, sed integrum cum pinguedine aliqua mixtum; & cum tunc eorum guttur transire nequeat, eos interficit, & nō venenositate. At hominib. datur prius præparatum; teritur enim subtilissime, & in cochleari ferreo supra ignitos carbones vritur; & vbi rubeum fuerit, in aquam fabarum proiicitur. Tunc enim calcinatum facile deprehendes; non calcinatū rursus ad ignē reponas, sicut primo, totiesq; iterādo donec ad atomorum similitudinem teri possit, cuius cū mellis aqua aut alio diuretico a ʒ ss. ad ʒ j. exhibetur. At hic æger vndecim diebus non minxerat.

18 *Cardinalis quidam sepius decem dies nō mingens vitam produxit.* Refert Ioannes de Tornamira in suo Clarificatione cap. de diffic. mingendi, quendam Cardinalem Fabrensem Romæ septendecim diebus vitam produxisse absque vrinae emissionē, & vrinam per superiora vomitu reiecisse. Habui ego ipse præ manibus Martinum Henricum, sic dictum, Delfis habitantem in insigni rosæ, qui quindecim diebus lotium non emisit, & postea lotium emittens, cū febre etiam afficeretur, tandem & mortuus est, vti & hic mercator. Idem Ioannes de Tornamira scribit Gregorium Papam Vndecimum similem casum incurrisse ex oppilatione humoralis: ʒsti, inquit, incurrerunt hunc casum: dolebant in anchis, & non febricitabant nisi in fine, appropinquante morte. Et refert se casum vidisse in quodam nobili concusso fortissime in anchis ab inimicis suis, qui vixit febricitando sine aliqua vrinae emissionē vsque ad 14. diem. Fuit tamen factus totus citrinus, colore herbarum semiuiridum: & mortuus est 14. die. De ter-

mino vero septimæ diei, quod si quis nō mingat, vt quidam putant viuere aliquem non posse, id falsum est: nam & Iacchinus testatur quosdam ad 17. diē pertinisse, & adhuc mansisse incolumes: nam, vt mihi a fide dignis relatum fuit, pater Petri Nanni Alcmariani, professoris Louaniensis, duodecim diebus non minxit, & sanus factus est. At Martinus in Rosa, de quo paulo ante dictum est, cum quindecim diebus minxisset, postea mingens ac febricitans, per quatuor pluresq; dies adhuc mingens obiit. Sed hic tyrones admonendū sunt, vt in principio, vbi calculus hæret in vteribus, plane abstineant a diureticis. Quare illud exemplum illos cautos reddet, cuius meminit Guainerius, quod medico imperito euenit, qui diureticis vtens in principio sine emollientibus, agrotanti suo mortem miseram & inopinatam intulit. Ceterum multæ sunt causæ retentionis vrinæ, de qua latius libro sequēti dicemus, cum de ilchuria seu vrinæ suppressione & vesicæ malis dicturi sumus. Nunc rursus ad renum vitia redeamus, quoniam de calculo renum plusquam satis egimus.

O B S E R V A T I O XXX.

De renum inflammatione.

HAud secus quam ceteras corporis partes ex copia influentis sanguinis, & renes ipsos inflammatione tentari contingit; præsertim vbi in carnosam eorum partem confluat, quamuis nonnulli raro in renibus accendi volunt, quod firma eorum & prædura caro ægre fluxionem admittat. Fit tamen interdum renibus ictu casuque cōtusis, accersitaq; fluxione per venas emulgentes: ita enim vulnere, attritu, assidua equitatione, corruptela & affluxu humorum, potis pharmacis fieri potest, cuius cognitio non nisi peritis sæpissime patet. Ita meo tempore cū adhuc Alcmariæ praxin exercerem, Bartholomæus Simonis, mercator Alcmarianus, qui in platea vulgo Houtil dicta, prope templum Diui Spiritus, vel sacellum in domo angulari habitabat, anno 1555. 20. Nouembris die correptus est dolore acerbissimo iuxta extremas dorsi vertebrae, paulum supra spurias costas: qui dolor breui tempore ita auctus est, vt hominem iamiam moriturum, qui aderant putarent. Aduocant empiricum sacrificulum, qui neque morbi causa inuestigata, nec morbo cognito statim dorsum locumque dolentem inungit oleo laurino & spicato, seu spicæ dicto; & per os exhibet theriacam & mithridatum simul mixta: & ita discedens imperat, vt summo diluculo vena hepatica in manu dextra pertunderetur. Sed ex his adeo dolor excreuit, vt æger me tēpore matutino coactus fuerit vocare. Cum autem vix agrum salutassem, reperi monachum Franciscanum ibidem adesse, etiam medicinam (*si dñs placet*) profitentem. Hic venerandus pater agrū ilchiade laborare contendebat. Sed ex signis præsentibus diligentissime morbum examinando, certo deprehendi inflammationem in rene dextro hæere, quam & febris satis acuta, tum alia signa, quæ aderant, confirmabant. Dolor enim in lumbis ingens hunc agrū affligebat, ad iecur sursum, deinde deorsum, vsq; ad

velicam, pudendum lumbosq; tendens, nonnunquam ad coxendicem & femora: unde & monachus ille coniecit ab ischiadem esse: verum con-
 3 sequebatur stupor propinqui cruris, neque recte sese erigere poterat ob dolorem: frangebantq; extrema, & magis suræ ac pedes. Dum autem pulsum ipsi⁹, digitis ad notis ac manu iniecta explorarem, atq; hæc inter tangendum ægrotanti narrarem, num hæc iam dicta sentiret, putabat ægrotus omnia hæc me ex pulsu conicere, & admirabatur de his omnibus meam interrogationem. Et licet eo tempore nondum aderat mingeudi difficultas, tamen eam paulo post affuturam prædicebam: nam & post meridiem eodem die hæc ipsam quoq; experiebatur, ita ut cum difficultate similiter mingeret. De qua quidem interrogatione & prædictione valde admirabundus mihi soli fidem dedit, utpote iam perfecte eius morbi cognitionem habenti, & empirico ablegato simul monachum illum sciolum ac nasutum relinquebat. Ceterum cum hic æger plurimum torqueretur dolore, etiam nausea accedente & stomachi morfu, quæ ob medicamentum calidum (*nempe theriacum*) assumptum, huic malo contrarium evenisse exstimabam, cum mordaces humores hoc modo irritati magis ad partes inflammatas fluant, non minus ob malum prædictum per se, quod solet plerumque morsum stomachi vomitumq; biliosum inducere. Præterea cum prius ex dolore usque ad animi deliquium angeretur & exsudaret, venterq; ei sifteretur (*quod huic morbo peculiare est*) & continuo exacerbationes fierent, nonnunquam per intervalla, vxor tum amici metu perculsi, secundum medicum, quamvis magna ex parte etiam empiricum potius quam vere rationale, & vera methodo curandi non ita instructum, ut professio medici requiratur, dum ego adessem, me inscio vocarunt, ac superuenit, dum ita de eius morbo disquirerem. Sed iam me certior factus, qualis affectus esset, eadem de morbo sentiebat, sed aliis negotiis forte obstrictus isthinc discessit, & curatio mihi soli deman data fuit. Quare ilico eodem mane, cum enema æger non admitteret, nec aluum deponeret, glande hac immissa pro fecum educatione aluum deiecit: *℞ pul. hiera picra ℥ ij diag. gr. iij. mellis ℥ j. salis parum sit glans vel suppositorium.* Non diu post eodem die sanguinem detrahare iubeo ex vena saphenea (*cum saphena minus appareret*) in exigua quantitate, in dextro pede, cum in dextro rene dolor magis agrum afficeret: & profuit; quamvis melius fuisset ex saphena, modo recte apparuisset. At de venæ sectione postea latius in Scholio subsequenti. Sanguine itaque detracto, multo melius habuit. Mox locum dolentem loco olei laurini & spicati, (*quibus perperam satrificulus usus fuerat*) solo oleo rosæ. adiecto pauculo unguento infrigidante Galeni, aceto admixto ad leuem percussione, prius leuiter inunximus, postea & ceratū instar adiecta cerolum illis imposuimus, & abstinuimus a mouentibus urinam, quibus perperam prior empiricus usus fuerat, & ab iis, quæ purgant, à quibus in initio inflammationis abstinendum est. Interea ad hu-

morem temperandum dedi decoctum hordei mundati, folior. viol. malua, portulaca, florum nenupharis, sem. quatuor frig. maior. cum syrup. viol. nymphae, pap. propter vigilias & dolorem urgentem. Postea etiam hunc fotum adhibui ad dolorem mitigandum: *℞ foliorum viol. malua, portulaca, florum rosa. rub. nenuphar. florum chamameli, meliloti, summitatum aneibi, parietar. exsicc. ana p. j. rad. althea ℥ j fiat fomentum loci affecti cum spongia, adiecto exiguo aceto, quo dolor nonnihil sedabatur.* Et cum dolor postea rursus magis vrgeret, hoc sequenti fomento vsum sumus: interea valde debilis erat ex dolore & febre. Pro siti & inflammatione & ardore urinae, modo sumens hordeatum & emulsorium ex semin. q. frig. maioribus mundat. & semin. pap. capiebat lubinde ex his tabulis: *℞ specterū diatrag. frig. trochis. alkakengi sine opio* (nam ardorem urinae & quasi ulcerationem patiebatur) *ana ℥ ss. dissolutis in aqua alkakengi, adiecto saccha. albiss. ad ℥ j. ss. fiat confectio in tabulis.* Rursus quoque glande iniecta ad aluum soluendam, a fotu etiam cataplasmate vsum sumus: *℞ florum chamomilla, meliloti, florum rosa. rub. foliorum malua ana m. j. coquantur in aqua comuni ad mollitudinem pro fomento.* Reliquia contendantur; & adde farina hordei ℥ j. farina fabar. ℥ ss. farina seminis lini & fenugraci ana parū; olei rosæ. & chamomill. q. s. fiat cataplasma pauculo cotoneorum adiecto, sed chamamelino dupla proportionem ad oleum rosæ. & cotoneorum, & apponatur, & per continuam fomentationem, & huius emplastri seu cataplasmati applicationem dolor sedatus est; & mane reddidit urinam muccosam, purulentam, & quasi languinolentam, & per se incidit quoq; in fluxum ventris; sed non enorme, cum maxima doloris sedatione, ita ut inflammatio in suppurationem mutata videretur, febre etiam cessante, ut purulenta quoq; mingeret. Ideo statim pro abstersione sequens medicamentum propinaui: *℞ decoct. hordei non excorticati ℥ iij. syr. de cicchor. Nicol. cum rhab ℥ j misce.* eaque potione vnica vice assumpta cessauit mictio purulenta, & fluxus alui muccosus & quasi sanguinolentus, ut tenesmus videretur incurrere. Sed hoc potu tantum ebibito perfecte magna cum nostra laude Dei optimi nutu intra septē dies curatus fuit. Viæ huic erat cremor hordei in principio, & aqua hordei loco potus.

SCHOLIA.

7 **Q**ualis autem affectus sit præter naturam inflammatio renum, nempe morbus in compositione, & secundario morbus in intemperie, eaq; calida, & in continui solutione, vel etiā frigida ex parte causæ & materiæ, prout apostema iuxta illos, qui Arabes sequuntur, frigidū vel calidū fuerit. At nunc, vestigia Græcorum insequentes, ob plurimas quidem causas, *Aetio testel. b. 11. cap. 16.* renes inflammantur: nam & humores corrupti (*ut ex Ruffo accepit*) & plagæ & attritiones, & Causæ. pharmacorum potiones, inflammationes generant, & equitationes continuæ & vehementes: Inflammatio enim, *Alexandron. victore lib. 9. cap. 5.* in vniuersum ex copia materiæ in particulas præfer-

Inflam-
 tio renum
 qualis sit af-
 fectus præter
 naturam.

Causæ.

signa.
8

Prognostica.

presertim carnosas influentis generatur, ut omnibus in confesso est: ac conuenit hoc scienter perpendere, num id, quod influxerit, sola copia, an qualitate tantum, aut utroque simul offendant: copia quidem, ut cum ipse sanguis probus est, & ob nihil aliud quam solam abundantiam, obstructionem excitat, particulam distendit, & in sublime attollit: qualitate autem sola, aut cum exiguus existit, biliosus & nimis acer, aut crassus viscosusque, aut terrestris & melancholicus. Nam hæc cognoscere ad curationem valde utile est. Quod renes afficiantur, ex dolore in lumbis cognoscitur, & signis iam in obseruatione dictis: cum dexter ren afficitur, dolor pullatilis superius ad nonas costas & hepar tendit, inferius ad vesicam & femur, petinem, pudendum; stuporque adest cruris respondentis. Si sinister ren, circa easdem regiones dolor aderit parte sinistra, & sinistri cruris consequitur stupor. Quod si ambo afficiantur, circa ambas partes percipietur dolor & amborum crurum stupor consequetur. Et, iuxta Aetium, neque recta erigi possunt agrotantes, neque pedibus ingredi, & siue sternutatio siue aliqua alia concussio irruat, vehementi dolore lancinantur: frigent extrema, suræ ac pedes: adest urinae emittendæ difficultas, minguntque assidue & laboriose: in principio quidem tenuia, & aquosa, in quibus nihil subsidet: In inflammatione vero in peius proficiente, rubicundiora, deinde etiam crassa & mucosa: adsuntque febres vehementes. Quod si adhuc amplius inflammatio augescat, hæc omnia fiunt vehementiora: acceditque his nausea, morsus stomachi & vomitus bilis, & quidam usque ad animi deliquium anguntur, & excludant: sistitur ipsis venter adeo, & inflatur, & assidue ructus emittunt. Sequitur fastidium vehemens & quibusdam continuæ fiunt exacerbationes, quibusdam vero per intervalla. At Paulus & Galen. contra Aetium dicunt non pulsatilem dolorem adesse, sed dolorem cum gravitate, ut 2. de loc. aff. Sed hoc dicunt, quatenus inflammatio est in carno sa parte renum: Aetius vero quatenus est inflammatio vehemens in aliis partibus, nempe tunica, quæ renes obtegat, ut etiam latius videre licet 2. de loc. aff. in magnis inflam. notatu dignis, de quib. loquitur Aetius. At Paulus de mitiore, & ideo de f. bricula meminit cum exigua & circa initia fuerit inflammatio. At in eisdem inflammationibus si urinae prodeant muliæ, & crassæ, in iis bonum est quod subsidet, quoniam ipsæ maxime iudicant, ac secerunt morbum, propterea quod inflammationis concoctionem indicant bonum portendunt: quemadmodum si urinae aquosæ puræ, ac perlucetæ prodeant, agere morbum secerne indicabunt, eodem Aetio teste. Conferunt etiam renū passionibus hæmorrhoides superuenientes, utpote, quæ velut fecem sanguinis vacuare sunt natæ, ex Hippocrat. & Galeni sententiâ, aphor. 1. 6 lib. Breuiter, quod ad curationem, eodem victu hic utendum, ut in inflammatione iocinoris præcepimus: sed ex Aetii præcepto, a primo die a cibo abstinendum; non tamen in multos dies inediam extendere oportet, cum urinae per inediam aciores reddantur, &

vehementissimos morsus infligant. Sorbitiones lenientes morsus, in principio conferunt, tenuisque, ut prisanæ succus, & aquæ calidæ potus, aut potius aquæ hordei, vel in qua aqua semina coriand præpar. incocta sint. Vitet aquam mulsam in principio, & ea, quæ urinam ciunt. Sanguis, omnibus succis & aque abundantibus, & sanguine exsuperante, ex Paulo Aetio, Alexandro deerrahendus. Aetius cubiti venam secatur: Gal. 12. meth. circa poplitem aut malleolum. Sed illos sic conciliabimus: ubi recens inflammatio est, & copia sanguinis adest, reuulsione gratia ex cubito vena secanda: si non recens, ex poplite vel malleolis; rectitudine semper seruata. Sed in nostro agro, ubi copia sanguinis non erat, atque debilis erat, nec statim ab initio acciti eramus, ex schiatica id fecimus, cū chirurgus in malleolo interiori vel saphena non recte inuenire posset venam: quamuis melius esset ex saphena, tamen altera incisa ob causam dictam iuuabat: Si in principio vocemur, ubi copia sanguinis urget, primo ex cubito; secundo ex poplitis vena vel malleolo sanguinem mittemus: nā & repetitam sanguinis detractionem comendauit Aetius. Sed in pedibus venæ apertæ, cum vires facile deliciant, ut auctor est Aulicæna & eius si quæces, in minori quantitate sanguis extrahendus, quam ex superioribus venis. Possunt & ante venæ sectionem clysteres adhiberi, in minori tamē quantitate, ne intestina repleta renes comprimant, ex maluæ decocto, sem. lini scænu. cum oleo & melle, aut prisanæ succo, cum oleo & melle, ut Aetius iubet: & ubi stercora prodierint, oleum anethinum, cum butyro, quibusdam adipibus in his eliquatis anserino videlicet, aut gallina iniiciatur, aut ex malibeta. viol. foliis hordeo decoctis in aqua ad lb. j. addendo olei viol. 3. j. pulpa cassiæ fist. la 3. j. butyr. recentis adipis anseris ana 3. lb. misce, fiat clyster. & si alius durior, adde diacathol. 3. lb. misce. Talis clyster debet esse emolliens & refrigerans, ex mercur. beta. pariet & similibus. Reicienda ficus nisi cum detergere oportet, vel abscessum rumpere. Nam nimis detergentia initio malum exasperant. Et hic clyster conuenit. ʒ. rad. bismalua. lilior. ana 3. j. malua, viol. ana m. ij. passul. prun. ana x. quat. semin. frigid. maior. ana 3. ij. florum viol. p. j. fiat decoct. m. 3. vij. vel x. dissol. mellis viol. sacchar. rub. butyr. recentis ana 3. j. olei chamamel. 3. j. misce. fiat clyster. iniici potest ante vel post venæ sectionem. Talis optimus est ad omnium internarum partium inflammationem, & potissimum, quæ circa sedem sit. Aliqui huic vitio renum glandem commodiorem esse volunt clystere, licet & ille iniici posset in parua quantitate, ut nunc diximus. Ceterum si vitiosus humor, presertim acris & biliosus, cum sanguine abundauerit, a venæ sectione purgationem quoque adhibere oportet; sed non antequam humorem contemperaueris, ac solutum facilem paraneris; aut si crassus fuerit, ipsum extenuaueris, ex Alexand. decreto cum neque in principio, ut dictum est, conueniant. Neque etiam illa adhibenda, quæ vehementer purgant: sed potius tamarindis, cassia, manna, saccharo viol. syrup. ex in-

10
Vicus ratio

Vena sectio.

11
Clyster.

Quidā glandem in hoc malo commodiorem clystere esse volunt.
Purgatio.

12

Topica.

13

14

Vrinam ci-
entia quo
tempore ex
hibenda sunt.

fuf. rofa. viol. & interm diacarth: vtendum, vt qui-
dam fuadent. Aliis vero, vt *Rondeletio*, etiam caffia
ipfa fufpecta eſt, cum aliquid caloris habere dica-
tur. Et ideo ſi aliud adſtringatur, potius clyſtere
& glande irritari malit; non autem decocto laxa-
te, aut medicamento, qualecunque ſit, cui locus
erit in declinatione. A medicamento enim du-
plex eſt incommodum, tum quod calida ſint, tū
quod humores attrahant ad partem aff. ctā. Quod
ad Topica attinet, inter initia feruente ac huc in-
flammatione, refrigerantia ad mouere conuenit,
potiſſimum vbi bilioſus fuerit ſanguis, qui in flā-
mationem excitauit, reneſque ardorem igneum
ſentiant; veluti eſt oleum roſae. omphacinum ſeu
melinum, cum pauco aceto, & ſucco polygoni,
aut portulacae: vel iſtis adiice lutea ouorum; & ce-
ratum fiat ſupra renes, ex Pauli ſententia. Ale-
xander etiam commendat ex roſaceo, pauco ace-
to, ſucco polygoni, aut portulacae & cera, cera-
tum. In incremento inflammationis aliquid di-
gerens, diſcutiens, veluti eſt *chamamelinum*, & e-
ius oleum, cum ſoenugrac ſemin. lini, melilot. albae,
adeps gallinaceus recens admixendus: & ad cataplaſ-
mata deſcendendum ex ſa. ſoenug. a. lini, hordea-
cea fabacea, rad. & foliis aithae, in iure chamameli
decoctis, oleo chamamel. vel anethino addito. Acco-
dem tempore fotibus vtendum ex decoct. chama-
meli, & dictorum pauco adiecto aceto, & flore iunci
odorati addito per ſpong. as. Et balneis calfact. tuto
vtetur, eiſdem quoque in incremento ac ſum-
mo vigore, ſi materia craſſi. fuerit. Id tamen mi-
nime prateriundum, ex Alexand. & Pauli aucto-
ritate, quod admodum calida vitanda ſunt, ne ma-
teria quae in parte inflammata continetur in pus
conuertatur. Item, quae impendio refrigerant,
non minus vitare oportet, iuxta eoſdem, ne quā
primum renes inflammati indurentur, potiſſimū
cum ipſi ſi ſuapte natura facile ſcirrhis deprehen-
dantur, tum propter eorum ſubſtantiae qualita-
tem, tum etiam propter excrementorum natu-
ram, quae per ipſos dilabantur, vt liquet 13. melib.
meden. At vbi perfecte concocta fuerint inflā-
mationes, & quieuerint dolores, tunc etiam per
vrinam cientia purgandum. Quapropter tribu-
enda ſunt, acorum phu, petroſel. gramen, caſſia,
chamapi. ys & polium ex Aetii decreto. Horum
vnum quocq; (vt ipſe inquit) ex aqua coquendum
eſt, & cum vino & melle bibendum: cibisq; tribuenda,
ſoeniculum, apium, daucus, paſtinaca probe percocta,
crithma, ſcandix & gingidium. Verum ſi inflam-
matio ad puris ſuppurationem vertatur, quam
celerrime adiuuare oportet tum ſuppurationem,
tum puris eruptionem, ex eiſdem Aetii doctri-
na. Sed quibus id fiat, poſtea dicturi ſumus. Nam
& ea, quae in principio huius mali ordine ſint per-
agenda, multo clariuſ elucſcent etiam exemplis
infra ſequentibus.

OBSERVATIO XXXI.

De calidorenum apoſtemate ſeu i. flam-
matione.I M Vlier quaedam ex infima plebe, annum tri-
geſimum ſextum agens, apud Delphenſes,

rarae conſtitutionis, vt apparebat, ſatis bilioſa, in i-
gneum apoſtema renum calidum incidit, ex ſan-
guine admodum bilioſo: nam prater pondus in
rene dextro etiam morſum quendam in eodem
rene ſentiebat: inflammationem quoque vehe-
mentiore & ſitum excedentem habebat, atque
febrem ſatis ardentem, idque in aſtate, adeo vt
de paraphrenſi metus eſſet; cui & anhelitus dif-
ficultas, cibique ſaſtidium accedebat. Ad hanc
primum quarto die accitus fui, cum extreme la-
boraret: nam & in ima ſpina dolor erat, ad ingui-
na deſcendens, & punſiones quaedam in dextro
latere circa regionem renis dextri ſentiebat, cum
vrinae aliquali ſuppreſſione, & mingendi difficul-
tate, Aſtantes putabant pleuritidem eſſe: alii vero
morbum vterinum. Debilis haec erat, & valde ca-
lida. At certis notis deprehendens apoſtema ca-
lidum eſſe in rene dextro omnibus modis vt haec
quieſceret, neque ſe iactaret, imperaui. Et cum
alium non deponeret, glande immiſſa ſaculen-
tam materiam excreuit: mox ex malleolo inte-
riori vel ſaphena dextri pedis, ſanguinem depromere
iuſſi, non tamen copioſe, cum iam morbus
incrementum ſuſcepiffet: alioqui in principio ac-
citus id potius ex vena interna cubiti vel baſilica
fieri mandaſſem e regione loci affecti. Epithe-
ma mox, cum ingens calor in renibus adſeſſet, ſta-
tim a ſanguinis miſſione ad moui, ex aqua viol. ro-
ſae plantagin. & ſolatri. cui oleum viol. & roſae. as
nymphae admixtum erat, pauco etiam aceto adie-
cto. Mox quoq; loco affecto inuncto ex unguen-
to roſae. pauco ſucco ſolani & portulacae adiuncto; &
cataplaſmate impoſito ex foliis maluae viol. ſolatri co-
ctis ad mollitudinem; adiecto exiguo pulu. roſar. &
ſantal. cum oleo roſae. & farina hordei, ex his iun-
tilibus fiebat cataplaſma: quibus dolor aliquo mo-
do ſedabatur. Verum cum eſſemus in quarto, a-
poſtemate magis tendente ad augmentum, ſta-
tim altero die adiecimus ſupradictis anodyna qua-
dam & reſoluentia, vt ſorum chamamel. meliloti,
aneth. farinam ſeminis lini. Arque ex iſdem re-
bus, adiunctis foliis maluae viol. & ſorum roſae. nym-
phae, ſemine pyſylli, praſcripſimus ſorum, anodynis
dictis admixtis. Interea ſtatim eodem die pro ſiti
& ſibi hoc decocto utebatur: ℞. decoct. hordei
mundan. prun. damaſc. ſicc. ſem. quat. frig. maior. ſo-
rum viol. nenuph. roſae acetosa, portulaca ſcilicet lb. j.
ad dendo ſyrup. viol. oxyzacch. ſimpl. ſyrup. nymphae
ana ℥ j. miſce fiat iuleb. Secundo die, etiam poſt
ſorum anodynum ſupraſcriptum, cum modera-
te refrigerantibus admixtis etiam renes inunxi-
mus unguenti popul. oleo roſae. & chamomill ſimul mi-
xtis; & dedi loco cibi hordeat. m., cum emulſ. ſemin.
quat. frig. maior. mund. & pap. a. bi. Ita vt in quin-
to die dolore plurimum mitigato melius habere
coeperit, ac in ſexto die manna ℥ j. exhibuerim, cum
decoct. lactuca, viol. ſorum borag. & prunor. ſyr. viol.
℥ j. adiecta, quo medicamento cum alium bene
depoſuiſſet, menſes aperti ſunt. Deinde reſolutio-
ne apoſtematis per ſe facta, ſeptimo die, menſibus
probe fluentibus, paulatim deinde ad ſanitatem
deducta eſt.

SCHO.

S C H O L I A

Non desunt, qui sub vno capite de renum ac vesicæ apostematibus scribunt, vt Rhases eiusque interpretes: alii quoque de his ac vreterum inflammationibus & apostematibus vna tractant, vt Valescus, Beitutus & Gordonius. Alii rursus seorsim de renum apostemate solum agunt, quāquā modo in rene dextro, modo in sinistro, modo in ambobus vel etiā vretete contingere possit inflammatio; vel in sinu aut ambitu aut membrana succingente, vel in carne ipsius renis. Vnde ex parte loci variæ quoque differentia resultant, vt apud eosdem auctores constat. tum ab ipsa causa & materia sumta: alia enim calida, alia frigida, quædam rursus ventosa, modo sanguinea, modo melancholica, pituitosa, aut biliola ab ipsis appellata, & ex parte quantitatis, magna & magnum locum occupantia, eoque modo deteriora, alia parua, benigna, maligna, quæ etiam ad materiam ex qua fiunt pertinent. Vel ex parte termini, quod collectionem faciunt, maturentur, rumpantur, insensibiliter resoluantur, quorum terminatio melior. At in duritiem conuersa, peiora existunt. Materia etiam horum facile in lapidem conuertitur (teste Auicenna) ob caliditatem renum & duritiem eorundem. Si rumpatur & permutetur materia ad vesicam per vretetes, melior est eius terminatio. Si ad intestina, per reditū ad hepar, per venas emulgentes & venam concauam ad hepar, & postea per mesaraicas ad intestina defluat materia, non ita bona est: tamen in illo mercatore, de quo egimus, obseruat. 30. contulit, cum per secessum semel materiam saniosam excreuerit, quæ pauca existens facile fuit deterfa cum decoct. hordei communis, & syrup. de cichor. Nicol. cum rhabarb. & ita euaserit, simul pure per lotium excreto: quod si ad inane spatium ventris transfluat, facit hydropem incurrunt. Alia distinctio sumitur; quod sint breuis aut longioris temporis, modo in principio, augmento statu, aut declinatione; etiā ratione corporis, in corpore iuuenili, senili, robusto, vel debili, vel per viam defluxionis, aut paulatinæ cōgestionis; idque rarius, vel ex causis primitiuis externis, vt sunt casus, percussio supra renes, ventosæ attrahentes, emplastra calida, corpore repleto renibus admota, vel pellicea vestis ac strictura, vel dorso ad ignem cōuerso sedere, aut duriter equitare, saltare, currere, aut longo tempore stare, vel post cibum fortiter se exercere, violenter balistam intendere, onera graui subleuare, portare præter vires, coitu nimio uti. Quæ omnia ex symptomibus ægri dignoscuntur. Internæ antecedentes corporeæ, repletio totius, vel partium superiorum cum renibus colligatarum, materiæ congestio & confluxus calidæ, frigidæ, sanguinis, & aliorum humorum omnium. Quidam etiam ex ventositate fieri volunt apostemata ventosa, ex cibis aliisque rebus flatulentis. Lapis quoque in vesica, calculus in renibus, & vrinæ retentio subinde causæ inflammationum & apostematum existunt. Frequentius tamen materiæ supradictæ renum apostemata producunt, quam vesicæ. Et præ-

cipue magna ex parte in renibus fiunt ex sanguine, vt quidam censent; alii vero etiam ex pituita. At ex sanguine frequentius: cuius exemplū nunc ponamus.

OBSERVATIO XXXII.

De apostemate renum sanguineo.

Rusticus robustus, sanguine abundans, cui facies admodum rubicunda erat, anno 1561 Iunio mense, cum opere messorio valde incaluisset, lumbis admodum defatigatis, incidit in apostema renis dextri: nam & febris huic aderat, non tamen ita acuta vt in præcedente, cum ex sanguine in homine sanguineo & multi sanguinis febris quasi vaporosior esset, vt ita dicam: vrina quoque magis rubebat, & crassior erat, & dolor satis vehemens, grauis tamen magis quam pungens. Cum vero potui etiam crassiori hic deditus esset, & frequenti crapula antea vsus, corpore repleto etiam messorem agens, sanguineo apostemate renis dextri correptus est. Ad quæ accitus, statim post iniectam glandem fecibus eductis, ipso sanguine exsuperante, cum & venæ manifestæ ac repletæ apparerent, venam cubiti dextri internam secari iussi ad reuulsionem, cum malum recens esset, sanguine ad uncias sex pluresve extracto, & vitam frugalem eidem præcepimus. & vt sero lactis, si vellet, quo consuetus erat, vteretur; modo etiam aqua hordei cum prunis, & sem. quat. frig. simul incoctis, sed & pro cibo sub vesperam hordeatum dedimus. Decocta quoque exhibuimus ex viol. scariola, portulaca, lactuca, floribus rosar. & nymphae. hord. mund. passulis & semin. 4 frig. maior. adiectis prunis xij & 3 j. thamarind. & semin. berberis pap. 3 j. & colatura addendo syrup. viol. nymphae. papau. an 3 j. Sed etiam fotum præscripsimus primo ex decoct. malua, viol. florum rosa, nymphae, cymarum rubi. Cataplasmate quoque imposito ex hordei vrina, cum malua decocta, & ros. oleo rosar. succo plantag. & aceti modico adiecto. Verum cum nec iis dolor mitigaretur, licet calor aliquo modo minueretur, ex malleolis venam pertundere fecimus, tam ad euacuationem, quam ad deriuationem, sanguine rursus ad uncias quatuor vel quinque extracto & statim fomentum (cum in quarto die essemus) sequens adhibuimus, ex foliis malua, rad. althæe, florum ros. viol. nymphae, melilori, chamomill. semin. malua, coton. psyllii & althæe paratum adhibuimus cum spongia, vt per se solet: & dolor multum mitigari cepit, & febris multo mitior illum affligebat. Tunc 3 j. diacathol. cum aqua malua & lactuca ana 3 j. 8 syr. ex infusione rosa. commun. 3 8. propinavi, & inclinante malo ac morbo, decoctum capill. Ven. polytrichi, cum semin. quat. frig. maior. hord. mund. & syrupo violaceo exhibuimus. Et farinam fenugraci, cum rad. althæe, & floribus chamomill. prius decoctis ad mollitudinem, mox contusis, adiecta hordei farina, & immixto pauco unguento rosar. & oleo chamæmeisno & anethino, pro cataplasmate lumbis imposuimus. Quibus remediis, sine suppuratione, quæ tamen sæpe in apostemate sanguineo fieri solet, breui admodum hic rusticus sanus factus est.

Varia distinctioes & differentia apostematum renum.

Causæ primitiue externæ.

Internæ antecedentes corporeæ.

S C H O L I A.

³ *Signa præ-
sagientia re-
num aposte-
mata.* **D**E signis ex parte diximus scholio observa. 30
Sed quod ad præsentia attinet, illi facile
hæc apostemata vti & vesicæ, incurrant, quibus
calculi crassiores in renibus aut vesica facile gene-
rantur, & quorum parentes eo velut hereditario
malo obnoxii sunt, quique cibaria crassa: mucila-
ginosa & diuretica simul sumunt, & quibus renes
frequenter dolent, & calidiores sunt, causis fre-
quenter præcedentibus, quæ labores renib. infe-
runt, ipsosque extenuant & debilitant. Demon-
stratiua diximus: nam & his febris continua, mo-
do etiam secundum aliquos erratica succedit, dorsi
grauitas ac dolor; tum alia ante dicta. At specialia
sunt hæc: si in rene dextro dolor in eodem loco
est, ascendit ad hepar; si in sinistro, inferius decum-
bit dolor, & in eodem loco melius quiescunt. Si in
utroque rene, dolor in utroque latere, & perpetuo
coguntur supini in lumbis iacere. Si in substantia
renum, dolor est remissior: in membranarum vhe-
mentior, ita ut non possit ager se erigere neque e-
rectus stare, aut ambulare, neque rursus, neque ster-
nuere, ob læsionem nervorum, quibus membra-
næ seu panniculi integuntur & suspenduntur: in
his enim malum multo vehementius est, unde sæ-
pe fitis, dolor capitis, vigilia, rubedo oculorum, anhe-
lus difficultas. Et si in venis emulgentibus & par-
tibus superioribus, sunt hæc graviora, & in vrete-
re dolor supra modum acutus est, tendens a reni-
bus versus vesicam. At calidi vel frigidi ex acci-
dentibus: in calido vehementior febris, subsequen-
te aliquando mentis alienatione: in sanguineo, fe-
bris vaporosior: in bilioso acutior, vomitio bilio-
sa, vrina citrinæ in sanguineo magis rubra & cras-
sior & dolor vehementior: at fortissimus pungens
& magis acutus a bile. In frigido omnia remissio-
ra, & febris mitior, ægrotudo longior, vrina alba,
dolor paucior, gravitas in loco multa. At phlegma-
ticum apostema & melancholicum distinguuntur,
licet communicant in gravitate, tensione & vrine
paucitate & ratione inflammationis. Sed in phle-
gmatico adest mollities in facie, oculis & dorso: In
melancholico maior durities, & siccitas, & stupor
circa anchas & crura, propter oppilationem via-
rum spirituum a siccitate ad dicta membra, quæ
extenuantur & arefiunt: etiam ex parte vrinæ; in
melancholico subtiles, in pituitoso crassiores. Di-
stinguuntur quoque ex causis prægressis. Tamen ex
parte cibi quam potus calidi, humidi, frigidi, vel
sicci natural! quoque habitudine, nempe sangui-
nea, biliosa, melancholica, pituitosa. Signa vero
indurationis nota sunt, ex remotione febris, per-
manente gravitate: sed de his latius de duritie re-
nis & scirrhusi apostemate. Signa vero tempo-
rum, terminationis apostematæ, etiam nota sunt
ex sapius dictis, de pleuritide & apostemate hepa-
tis. Vbi dolor intenditur circa renes, extensio, gra-
uitas cum febre; bi principium: vbi augentur &
vrina aliquantulum turgitur, tunc est augmentum: v-
bi vero magis vigent, status adest: dum vero incli-
nant, declinatio. Si autem ad suppurationem re-
num inflammationes vertantur, cuncta prædicta

symptomata (de quibus etiam scholio observatio 30. *vergat in
diximus*) ac accessiones extendentur, & febres cum *inflammatio
signa.*
horrore irruent, atque id maxime circa vespertinam
eruntque inordinatæ, & dolores cum horrore in-
terpellato, ac vario infestare videntur, ut liquet ex
Gal. 6. de loc. aff. Nam dum pus gignitur, dolores
ac febres magis eueniunt, ut inquit Hippocr. aphor
47. 2. li. Tumor item circa ilia quodammodo ap-
parebit, & vehementis caloris sensus ægrotos cir-
ca renes affligit, minguntque ruffa & pura, (ut ca-
pit. 18. lib. 11. inquit Aetius) Quod si in sanam partem
inclinat ager ex affectu, gravitatem magnam, magis
se sentire dicat, quam ante quam inflammatio in abs-
cessum peruenisset. Alexandro teste c. 5. lib. 9. Nam
circa renem dolentem, veluti suspensi cuiusdam
ponderis sensum percipiet, ut ait Gal. 6. de loc. aff.
Perfecta autem suppuratione, & febrium & do-
lorum accessiones minores contingunt, & graui-
tatis sensus magis circa affectum renem infesta-
bit, ac tempore rupturæ magis exacerbantur: ad
quam etiam cum ipsis vrinis puris excretio conse-
quitur, & nonnulla alia, de quibus de exulceratio-
ne renum dicturi sumus. Et si sanies erit alba, le-
nis, neque foetida, cum vrina exiens, adeo bonum
etiam teste Auicenna, ut melius non possit inue-
niri: Sed hoc ad signa prognostica pertinet; vti &
hæc auguria. Ex igneo apostemate cum acuta fe-
bri, si delirium sequatur, nec diaphragmatis com-
munionem contingat, certa mors prælagenda est.
Si vero cum humoris digestionem vrina alba fuerit,
cum sedimento purulento, collectiones salutariter
disrumpi denuntiantur; si tamem mucosa per-
seuerans fuerit, malum præstat augurium, nam ma-
teria ad eas partes confluere creditur. Rubens ita-
que vrina, in qua quod residet digestum sit, nec du-
ritiem, nec suppurationem minatur, sed utile re-
solutionem denuntiat. At cum indigestio perse-
uerat, vrina clara ac tenui fluente, aut pus, aut du-
ritiem abscessus minatur. Salutare signum est cum
febris finitur, ac reliqua diminuuntur accidentia,
si quæ vrina multa sit; ac quod sub fidelis concoctum
sit. Quod si globosum purulentum cum graui
fuerit odore, damnatur. Ita & quæcunque tenuis
fuerit demissa, perseuerante febre, nec accidenti-
bus remissis, exitiali habetur. In omni abscessu
extenuatum corpus, in senibus præsertim, irreme-
diabile malum est; vel si coxendices stupore ten-
tantur. Ex diuturno apostemate macies contrahi-
tur tabida, in qua & femora & crura dissoluuntur.
Si ab initio his apostematibus statim recte occur-
ritur, vtilibus medicamentis, & accidentia minui-
tur, bonum signum est, si rumpatur, & ager leuior
evadat, & vrina incrassetur, cum optima & crassa
hypostasi, & sanies alba lenis non foetida fluxerit,
etiam bonum, ut paulo ante diximus; nec melius
signum reperitur, natura dominante supra mate-
riam apostematis. Si vrina sit rubea, ac resideat cum
sedimento laudabili, apostema resoluetur sine con-
uersione in saniem aut maturationem. In genere,
sanguinea apostemata minus mala, quam pituitosa,
aut melancholica, quia citius resolvuntur, & mi-
nus sua accidentia quam biliosa habent, cum &
minus

⁶
*Signa pro-
gnostica.*

⁵
*Si ad suppu-
rationem*

minus corrosiua sint. Item in rene sinistro minus mala est, quam in dextro, ceteris paribus: dextra enim hepatis communicant; sinistra spleni, membro minus nobili: & in concauo minus mala, quā in gibbo, ob colligantiam membrana; & dolor minor est in concauo, & magis materia parata educationi; & renum apostemata velocia sunt, ut in lapidem conuertantur, & si cum febre delirium multo tempore durans, cum aliis signis malis, lethale; cōmunicat enim cerebro vel membranis. Deteriora accidentia sequuntur, si in membrana; quietiora, si in carne renum. In calidis apostematibus renum, diu durans vrina alba, viscosa, malum, cum digestionem non obediatur; vel signū quod in duritiem conuertetur. Si diu durant, & indurantur, non curantur, & corpore extenuato & cruribus debilitatis tandem moriuntur. In macilentis periculosiora, & in senibus difficulter curantur, deficiente calore & humido radicali. Vrina si post maturationem apostematis maneat clara, tenuis, induratur apostema, si alba viscosa, perferat, mala quoque, & materiae continuum defluxum notat: eiusque continuatio efficit apostema magnam & malignum: & dura apostemata renum mala, hydropem praesagientia; & ubi totum renem vel ambos contineant, nulla spes salutis est. *Reliqua prognostica superius dicta sunt.*

OBSERVATIO XXXIII.

De apostemate bilioso renis dextri.

I Vuenis Delphenis, valde biliosus, vigesimum secundum ætatis annum attingens, anno 1561. cum Leydam urbem pedes accederet, & denuo rediret admodum lassus, sanguinem deinde mixxit, mox vehementiore dolore oborto, inflammationem renis dextri incurrebat. Ad quem cum vocatus essem, hæc signa aderant: inflammatio multo maior, quam in præcedente, cum frequentipunctione in ipso rene dextro, cum siti valida, febre quoque magis acuta, & vrina coloris citrei: nam corpus tenue erat, & diæta præcesserat bilem augens: & præcipue malum auxit pedestre illud exercitium violentum in iuvene bilioso. Hæc cum animaduertentem & bilem sanguine magis abundare, & cum iam tertius dies esset, ex quo hoc malum inceperat, & aluus adstricta foret, clysterem emollientem & infrigidantem hoc modo vel simili paratum, iniicere iubeo: ℞. rad. b. smaluz ʒj. foliorum viol. maluz lactuca ana m. j. florum viol. p. j. prun. damasc. num. xij sem. 4. frig. maior. ana ʒj. ʒ. hordei mundat. p. j. fiat decoct. in aqua communi pro ʒ viij. vel x. colatura adde cassia m. data ʒj. duo vitella ouorum, olei viol. ʒiij. salis ʒj. fiat clyster quo aluum deposuit. Deinde sanguinem detrahere iubeo, sed in pauca quantitate, ex sapphenæ pedis dextri. Et hoc deinde epithemate vel simili renes fomentabam: ℞. aqua ros. nymphae, solatri, plantag. ana ʒiij. olei ros. & viol. ana ʒj. ʒ. misce aceto pauco amixto. Mox hordei farinam cum succo intybi, portulacæ & solatri, oleo viol. & ros. adiecto, cum vnguento populeo & ros. ad emplatri modum apponebam lumbis, cum alle-

uiatione, febre nonnihil remittente: simul propinando emulsionem quat. sem. frig. maior. & sem. pap. albi, cum aqua lactuca, portul. & syr. viol. nymphae. pap. modo etiam pro siti & feb. aqua hordei mund. cum syr. dictis. Deinde in morbi augmento & versus statum, supradictis addeba rad. althææ & maluz, cum foliis, & lini cremorem, cum oleo ros. deinde & chamomill. adiacere iubeo una cum meliloto & fœnugraco, etiam in statu oleo chamæmel. adiecto. Et per os, dolore iam utcumque mitigato, exhibui hanc potionem: ℞. diaprurnis simplicis, cassiæ recens extractæ ana ʒ ʒ. syr. ex infus. ros. ʒj. ser. lactis ʒiij. fiat potio. Qua aluus soluta est, inflammatione sedata: post septimum diem ab omni dolore ac febre liberatus, & hic quoque conualluit.

SCHOLIA.

V Ictus ratio ac vitæ institutum, quod ad curationem attinet, in apostemate renum, omnibus vniformis esse non potest: etiam pro temporisatione: & licet in principio tenuis diæta conueniat, ut diximus, minus tamen, si ex causa calida apostema ortum fuerit; quibus & aer frigidus conuenit, non tamen extreme, ne humores incrassentur & inepti reddantur ad resolutionem: & ideo alia conueniunt in principio, alia vero in augmento, vigore, aut declinatione: ita & de aliis remediis sentiendum. Ab initio quidem refrigerantia in apostemate calido, mox quæ abstergunt, & emolliunt & dissoluunt in augmento & vigore: in declinatione, sine vlllo discussorio, quæ resoluunt; habito semper delectu, prout apostema calidum aut frigidum sit. In calido, initio quæ refrigerant, lumbis & renibus imponenda. In positionibus decocta refrigerantia, ut hic in calido exhiberi possunt, ex portulaca eiusque semine, viol. cum aqua solatri & syr. viol. nymphae & similibus, & aqua cucumeris grandis rotundi. Lauat & lac expressi seminis, melopeponis, vel cucumeris rotundi, grandis, vel cucurbitæ: nam vtrunque materiam educit, & refrigerat. Hordeacea farina ab initio imposita, santali albi ac rubri, intybique succus, vel aqua, cum stryphno vel cucurbitæ ramentis, adiecto oleo viol. hoc enim modo emplastrum confici potest. Et si maiorem refrigerationem requiras succus solani addendus, vel aquæ eiusdem; & in eis lintebli tepentes infusi vicissim imponantur, donec calorem sentiant. Et si cruciatus magis impatibilis fiat, vires ægri protegens, necesse erit papaueris calyces aut mandragoræ cortices cataplasmatibus imponere; mire enim iuuant. At morbo crescente, althææ ac maluz decoctum cum lini mucore ac oleo rosaceo infunditur. Inter cataplasmata, hordeacea farina, fabaceaque cum violis imponitur. Procedente morbo chamomillam addimus, & althæam texinde fœnugræ. ac seminis lini lentorem, ac oleum sesaminum: vel anethinum cum althæa. Sed & illud conuenit in inclinante morbo, quod ex hordei farina, in qua fœnugræci semen cum radice lili, anetho & althæa ac chamomilla componitur. De clysteribus & emollientibus, infrigi-

5 dantibus & diuertentibus dictum est prius; ita & de venæ sectione. Sed hic nonnulli ad diuersi-
 nem quoque secta vena vomitum leuem com-
 mendarunt, *ut inter Neotericos Gradus cap. pro-*
prio supra Rhafem, in iis, qui ad vomitum procli-
 ues sunt. Insuper vtuntur syr. materiam candidam &
 acrem contemperantibus, *ut dictum est prius*, eam
 que contemperatam & d. g. stam, leniente al. quo,
ut cassia vel manna, th. marindis syr. ex ir. f. syr. pal-
lid. dolore ex parte mitigato, euacuant; abstinen-
 tes a fortioribus solutiuis. Egregie valet *manna*
Syriaca cum sero lactis, quæ summam curationem
 complet: nam ventrem ducit, abstergit, refrige-
 rat, maturat, eluit, & membra recreat. Diuretica
 non danda nisi morbo inclinante, vel cum inten-
 tio est ruptionis. Si vero tumor vel inflammatio,
 aut apostema non disentiatur, atque ad octauum
 iam diem peruenierit, suppuratio tum imminet
 manifesta, tum grauitas ac febris in summo ver-
 satur. Vbi igitur inflammatio ad per s. permuta-
 tionem vertatur, quam celerrime (*ut quoque di-*
ctum est prius) adiuuare oportet tum si suppuratio-
 nem tum puris eruptionem, ex Acti & etiam ve-
 6 terum doctrina. In quem usum conferunt spon-
 giæ, fatus gratia admotæ, assidue imbutæ aqua
 aut oleo, aut eadem decocto imbuantur fol. o. u.
 & radicum althææ, chamæmeli, scænu-graci, & se-
 minis lini, & sæpius (*ut supra*) cal. de admoueantur.
 Alii emplastrum imponunt ex chamomilla,
 seminis lini farina addito fusi fure & oleo sesami-
 no. Vel anethi & althææ ex oleo decoctum, ita ca-
 lidum imponitur. Puls ex tritici farina in aqua
 mulsa decocta, aut ficuum pinguium ex eadem a-
 qua decoctum, mire maturat & dolorem lenit &
 cataplasma ex farina hordeacea, cum ficuum &
 althææ ex aqua mulsa decocto, eundem usum
 præbebit. Bonum quoque est ipsas si us admisce-
 re tritici & absinthii comam contusam, vel ex ea-
 dem farina hordeacea & erui oleo, & resina tere-
 binthina cum melle, & ficis pinguibus cataplas-
 ma fiat. Interim addere poteris candidamomi vel co-
 lumbar stercoris parum, *ut Paulo visum est*. Hoc
 cataplasma quoque vtile scribunt: nam & matura-
 rat & aperit. *℞. hora far. scænu-graci, seminis lini, me-*
lilotique cum althæa violæque arida, cum fici arida de-
cocto, addito oleo violaceo. Si difficulter maturatur,
 adde finum columbinum. Alii & tunc laudant
 decoct. seminis althææ ficuum pinguium, vel o-
 7 leum amygdalinum potum. Et vbi maligna fue-
 rit inflammatio, ex putrescentibus humo-
 ribus orta, quos ex febrium acrimonia co-
 gnoscas, etiam rosæ in cataplasmate commiscen-
 dæ myrtique bacæ, & erui ac lentis farina: hæc
 enim humorum putrefactioni resistunt, *ut eidem*
Actio placuit. Genito vero pure, ipsius eruptio
 procuranda erit. In quem usum ea, quæ vrinam
 ducunt in potu exhibeantur, veluti cucumeris se-
 men decorticatum, ex aqua mulsa, palmulis in i-
 psa incoctis: danda etiam iris cum melle despu-
 mato delingenda, *eodem Actio teste*: aut scenicu-
 lum, glycyrrh. & iridisque radicem in aqua mulsa
 decoquito, vel etiam chamæpityos, sceniculi, pu-

Puris gene-
 rationi quæ-
 do opitulan-
 dum sit, &
 cum quibus.

Pure genito
 quomodo e-
 ruptio pro-
 curanda.

legii, vel origani & aliorum similium decoctum.
 Remorantem quoque ruptionem iuuant cum inu-
 cum passo & ruta cum vino mulso, *ut idem fate-*
tur Aetius. Alii, si ea non aperiunt, clysteres acri-
 ores in fundunt, etiam tandem in co. iniecto hel-
 leboro: in co. enim conato sæpe pus erupit. Qui-
 etiam ad saltum agros euacant, aliosque similes
 motus, vt e gradibus descendant si fieri possit, vt-
 que spinæ vertebrae laboriose concutiant, & in
 equum conscendant. Rupto vero apostemate vi-
 dendum, numpus album & qualiter sine odoris
 grauitate per vrinam vtiliter effundatur (*ut dixi-*
mus) finita ex toto febris. Difficilior est materia,
 quæ per intestina & aluum fertur. Rursum q; de-
 terior (*ut diximus*) quæ in cauum ventris colli-
 gitur, vomica nomine. At omnium pessima vo-
 mica est, quæ extra renes non prorumpit. Ridicu-
 lum est, quod eam manu aperire proficentur. Me-
 mini forinsecus incisionem f. etiam in M. Petro
 Zuzio H-gano canonico, fratre Domini Pra si-
 dis Hollandiæ, ex consensu duorum medicorum
 alioqui excellentium, & abscessu aperto materiam
 crudam & sanguinolentam effluxisse, & tertio die
 mortem obuisse. Ceterum intus rupto apostema-
 te, & fluente pure, mulsa cum s. m. melopeponis
 frequenti potu medetur, aut cucumeris semine,
 syrupoque violaceo. Tum vlcus (*ut scribit Gale-*
nus) diligentiori cura atque protinus perlanandū
 est, diuturna enim rerum vlcera difficulter im-
 plentur: ob eam rationem. Benedictus Veronen-
 sis terram Lemniam cum mulsa potam frequenti
 haustu profuisse tradit. Ita & de thuris polline ac
 fiderite, quam sanguin. m. draconis vocari ob si-
 militudinem nonnulli scribunt, cum s. y hni a-
 qua aut seridis. Qui eam curationem negi genter
 ad dies prorogant, vlcus insanabile redeunt. At
 quæ præbenda sint post abscessus ruptionem, pro
 puris repurgatione, cum de ulceratione renum
 dicturi sumus, latius explicabimus.

Pessima va-
 num vomica.

OBSERVATIO XXXIV.

De apostemate renum fri-
 gido.

M Vlier quædam Delphensis, extra portam
 Schiedamensem decumbebat ex apostema-
 te renis sinistri paulo frigidiore. Nam huic dolor
 versus vesicam in parte sinistra descende-
 bat, cum grauitate maiore, & dolore minus pungente; ita
 vt in substantia renis potius, quam in eius mem-
 brana apostema esse dignoscerem. Melius quoq;
 in sinistro latere decumbebat, & cum in dextrum
 se conuolueret, suspensori rene magis dolebat: fe-
 bris quoque huic mitior erat, & vrina magis alba.
 Quartus dies ab initio morbi præterierat, cum ad
 eam accitus essem. Eodem die ventrem deposue-
 rat per se; vrina tamen cum difficultate & dolore
 exeunte. Venam saphenam aperire iussi, sed non
 adeo multo extracto sanguine, in mallo colo sini-
 stro: & vena secta paulo melius habere visa est. Sed
 statim fomentum adhibeo ex decoct. florum cha-
 momill. meliloti, anethi & malua ac althææ foliis,
 post fotum loco affecto inuncto cum oleo ros.
 anethi-

anethino & chamemelino. Deinde ex iisdem herbis tum floribus coctis & contulis, *parietaria adiecta, cum farina hordei, fenugrac. & lini, & oleo chamemelino & liliaceo*, emplastrum quoque admo- ui; hoc quoq; apozemate propinato: *℞. pariet. malua. capill. Ven. polytrichi, hyss. calamini ana m. j. absinthii. florum ros. rub. ana m. ℞. rad. ireos ℞. ℞. seminis feniculi, end. scariola, meliloti, cucum. cucurbi- ta curulli ana ℞. j. semin. carui ℞. j. hordei mund. p. j. uuar. pass. ab arillis repurgat. iunbar sebesten. ana ℞. ℞. glycyrr. ras. ℞. ℞. coquantur in aqua communi pro℞. j. colatura addendo syr. ex infus. ros. mellis ros. syr. capill. Ven. ana ℞. j. misc.* A fomento, emplastro, tum lini- mento, nempe supradictis dolor sedatus est. Im- peraui tamen ut forum continuaret, addita post- ea in emplastro absinthii coma, & rad. althææ & fursure, cum oleo anethino & paucio nardino, vs- que ad nonum diem: & apostema resoluebatur. Et tunc exhibuimus hanc purgationem: *℞. florum viol. horag. bugloss. foliorum, capill. Ven. ana p. j. uuar. passul. enucleat. ℞. iij. seminis anisi ℞. j. ℞. foliorum senæ ℞. ij. polypod. querc. ℞. iij. bulliant in sero lactis q. s. & huius fortiss. expressionis accipe ℞. iij. addendo diaca- tholici ℞. vj. mellis rosati colati ℞. ℞. misc.* quatuor vi- cibus aluum deiecit. Nono die optime profluen- te lotio, crassiore, & sine dolore, coepit melius ha- bere, ita ut 14. die in totum liberata fuerit per mo- dum resolutionis ipsius apostematis. At alteri mulieri magis pituitosæ & crassiori cum hæc su- pradicta adhibita essent, & apostema in rene de- xtro non resolveretur, sed ad suppurationem ve- niret, omnibus modis illam iuuantes, hoc sequens emplastrum, vel huic simile, maturans apposi- mus: *℞. rad. althææ ℞. iij. capitum lilior. alborum nu. iij. caricar. ping. num. xx. coquantur in hydromeli- te ad mollitudinem, pistentur, adde farina seminis lini, fenugrac. ana ℞. j. ℞. olei liliorum, chamomill. & axungia q. s. fiat emplastrum;* postea ut melius rum- peretur, etiam adiecto fimo columbino: cumque illa se immoderate moueret, facta ruptura pus o- ptimum & album fluxit, vna cum vrina per vesi- cam. Mox eb. bit decoctum hordei communis, cum melle rosaceo, ad absterisionem, deinde lac bubulum recens multum, cum zacch. aut melle. Postea exiguo puluere trochis. alkachengi sine opio insperlo ad maiorem consolidationem viens, & hæc quoque conualuit. Eoque tempore cum pus repurgatum esset, tam ad consolidationem, quam ad repurgationem carnibus laudabilibus, pulte ex amylo & lacte amygdal. dul. paucis quoq; amygd. amaris iniectis ad roborationem & mun- dificationem facientibus utebatur, cerato hoc quoque, vel huius æmulo ad consolidationem & roborationem lumbis in fine appposito, ex oleo myrteo, rosaceo, thure mastiche, mumia, myrrha, bolo arm. tritis & oleo immixtis, adiecta cera q. s. ad cerati format, quod satis erat, perfecte curata fuit.

SCHOLIA.

IN curatione apostematis frigidi, iniecto clyste- re, & vena secta, si opus est, materiam digerimus *mellis ros. syr. ex infus. ros. cum decocto mentha, pass.*

mund. rad. ireos, sem. 4. frig. maior. end. scariol. & si- minis feniculi, & liq. & similib. Sedato dolore vtcu- que, ad motis emplastris, fomentis supradictis, quibusdam calidis etiam inunctionibus adiectis, ut est oleum aneth. chamæmel. & in fomentis ad- iiciendo etiam flores rorismarini, in fine. Quod si non resoluatur, tunc ad maturantia dicta deue- nimus. Materiam digestam etiam derrahimus: a- liqui dant cassia ℞. iij. cum ℞. j. pul. diaturbith, cum sero lactis. Alii quoq; vomitu: sed is efficacissimus est. Infusum senæ præstat cum cassia aut diacatho- lico exhibere, & aluum quandoq; clysteribus e- mollire. Imponuntur aliquando calidiora, quale illud emplastrum est, quod fit ex amaraco, cymino, anisi seseli, apii succo, anethino oleo, vituli medulla, bu- tyro, anseris adipe, cum palmulis maturis atq; caricis. Sedato dolore, & omnibus iam dictis prius admi- nistratis, ad diuretica deuenimus, quæ celerius per vrinam transeunt, de quibus satis supra diximus. At si in calculum apostemata mutantur, calculi signa aderunt, & curandi erunt, ut de curatione calculi diximus. Sed si iuncta duritie tentantur, febres ægros relinquunt, grauitate permanente. Vten- dum oleo nardino, liliorum bdellio & ammonia- co, adipe ceruina, vili & leonis admixtis, modo resoluentibus, modo emollientibus, ut de aposte- matibus duris & schirrhosis constat. Sed in caus- sa calida quædam frigida humectantia adiungen- da, ne in tophos magis mutantur. Sed de ea latius in Scholio subsequente.

OBSERVATIO XXXV.

De quadam duritie renis si- nistri.

Q Vidam cum ex dolore renis valde torquere- tur, nempe in rene sinistro, ex medicini im- periti consilio cum longo tempore calidis inun- ctionib. vsus esset, ut oleo laurino, in duritiem eius- dem renis satis siccus & melancholicus, incidit. Ve- rum etsi durities renum ægerrime sanatur, tamen ne consilio vacuus hic æger a me discederet, cum niger & hirsutus esset, & aliquo modo sanguine melancholico abundaret, & in autumno essemus, prius alua inanita ex vncia vna cassiæ in bolo af- sumta, die sequenti venam lienarem secandam ef- fect duximus, & sanguine ad vncias fere sex fluente, commode ferebat. Materiam vero melancholicam præparauimus, sumendo syr. de fumo terre, epithy- mi, & oxymeli simplicis, & cum decocto senæ. po- lypodii, addendo elect. lenitiuum, purgauimus. Et emplastro diachylone cum gummis vulgatis- simo, mire duritiem emolliente, imposito: aliquan- do & emplastro de mucilagibus dicto. Quibus videbatur aliquo modo melius habere.

SCHOLIA.

D Vrities renum aut fit ex materia crassa visci- da renibus diu impacta, aut melancholica ter- r. stuzidque in principio: aut apostemate præce- dente, in duritiem cōuerso, cum nimium dissol- uentibus aut resoluentibus quis vsus fuerit, tenui materia resoluta & crassa in duritiem cōcreta, vel in schirrhum permutata. Si ex oppilatione, ea que recenti, facile quidem tollitur: at antiqua durities

admodum difficulter sanatur; quemadmodum & scirrhus, ob inobedientiam, & morbi profunditatem, & immensam viarum longitudinem, ex qua stranguria & mox dysuria, extremo vero hydrops perniciosus, cuius causa remoueri non potest. Interim methodus curationis est, ut in hepatis scirrho, crassa materia viscosa, siue pituitosa, siue melancholica prius paretur cum yr. conuenientibus & educta, ac vena secta si opus est & iis adhibitis, quæ ad lienem durum faciant. Renibus inunctis adipe gallinaceo, medulla ossium bouis, & dialthææ, aliisque emollientibus. Attamen minime præcipites si ex apostemate quoque præcedente aut aliter contigerit, in diuretica vel resolutiua administrando; sed alternatis vicibus oportet interficere mollificantia, ita ut ea ipsa dominentur in sesquialtera proportionem vel duplâ, quoniam maior timor est in excessu resoluentium, quam emollientium. Si alius sicca sit cassia damus; & valet hic decoct. malua alibæ cum semin. frigidis & emplastra ex rad. alibæ, seminis lini, meliloti farina cum chamomilla flore, vel farina fabacea, ceterisque passulis cum seuo caprino. Et valentius erit adiecto bdellio & ammoniaco in aceto dissolutum & sagapeno, adipe ursino, leonino, medullaque vaccina, & cernina quandoque adiectis. Reliqua habentur ex curatione scirrhii hepatis atque lienis.

OBSERVATIO XXXVI.

De renum inflammatione, quasi ad abscessum tendente, cum duplici febre tertiana, per modum consultationis ad Andream Lemmaricensem Frisium, medicum doctissimum.

1] Siis diebus, Andrea amicorum candidissime, Briclas euocatus ad filiolam quatuor annorum Baldum a Loo Qæstoris vestri curandam, honorifica per nobilem eiusdem uxorem tui facta est mentio; ita ut tacere non potuerim nostram aliquando in Italia familiaritatem, quum Bononia sub eodem tecto viremus, & una tuulum doctoratus eodem die susceperimus. Verum cum hanc filiolam satis sanitati restituissemus, rogauit mater, ut tibi medico huius Baldum familia inferienti morbum, puella transcriberem. Quo illebens facio, cum equo sponte sua currenti, calcariibus non opus sit. Gaudebam plurimum, mihi occasionem scribendi oblatam esse ad amicum & medicum. Filiola itaque hac cum extreme laboraret, medicus qui tunc præsens erat, omne malum in vermes coniciebat, eo quod venire dolere intellexerat. Lotium tunc temporis (ut male hic solet fieri) ad me transmissum est, quod crudum, lacteum, aut sero lactis simile cernebatur: quale in renum & vesicæ malis apparere solet. Quare & illas partes affectas esse in his suspicionem præbuit; quamuis nuntius omnia perfecte non referret, sed tantum de febre mentionem faceret, & filiolam per aliquot dies aluum non ducere, earraret. Mannam itaque ad ʒ ij. vel paulo plus ad aluum emolliendam præscribo, modo id medico præsentem placeat. Interea iubeo, si febris non mitigetur, ut lotium remaneat, vel potius me euocent ad puellulam. Quo factum est,

ut febre adhuc magis incrementum me coram, vocarent. Ad puellulam itaque ingressus, cum omnium primo pars affecta esset indaganda: deinde affectus ipse dignoscendus, ut ex utriusque curationem probe inirem, cœpi de dolore interrogare, ut filiola mihi locum dolentem ostenderet, qui sub dextro hypochondrio tendebat, versus partem posteriorem, sub costis spuris, ad anteriora procedens versus venter ipsos, ut illos ipsos tum renum dextrum affici existimarem. Lotium quod longo tempore lacteum minxerat, tum etiam durities quadam renitens, magis in dextra, quam sinistra parte, suspicionem de rene dextro affecto auxit. Rogabam præterea num & calculos, aut sanguinolentum quid per lotium recessisset? Mater de sanguinolento lotio ostendam interrogationem admirata, absque dolore sanguinem aliquando filiolam minxisse confirmabat: itaque ex hæc de se senaritate vasorum ob calefactionem, vel exercitationem aliquam in tenera puella factam putabam: quanquam & chirurgus quidam, ut referebat mater, subito sanguinem illum manum restringerat. Ab eo tempore lacteam urinam tenuem semper reddidit, sed sine dolore: quanquam nunc a mense uno dolere inceperit, & ex itinere molsto, ut arbitror Leouvarda veniens Briclas, tum ex mutatione aeris, materia siquæ obstrudat fuerat ibidem putrefacta febrem, tum inflammationem renis, sed lenem in puellula quatuor tantum annos nata incitauit, quasi ad abscessum tendentem. Videbatur autem febris esse duplex tertiana, ex eam genere, quæ ab aliis febres subintrantes vocantur, ita ut quasi continua videretur, quamuis secundo die magis affligeret. Quum autem urinam lacteam & tenuem viderem, lactis siri instar, id malum quidem erat, diuturnitatem morbi notans, potissimum scilicet in principis febrium appareat, vnde vel phibsis, vel hectica febris superuenire poterat, maxime ex dolore, in puellula extenuata. Ceterum, ut paucis absoluam, alia via quam medicis primus curationem institui; primo præscribens hordeatum cum emulsam, dulc. depilat. & semini quatuor frigid. maior excorticat. & zacccharo pro cibo. Pisum vero illam in infusum ex hordeo mund. & glycyrrhizâ paratam propotui. Materiam paratam prius cum decocto mulua, fumarie hordei mund. passul. ab arillis repurgat. iunbar. glycyrrh. semin. quatuor frigid. maior. adiectis syrup. violaceo ex infus. ros. syr. de cichor. Nicolicum rhab. (et am propie febrem) eduxi cum ʒ vij. cassia recens exeraclia in sero lactis dissoluta. Pro febre quoque sæpe utebatur oxyzach. simpl. Interim exterius unguentum emolliens duritiem, refrigerans, inflammationem compescens, dolorem sedans, quod paululum resolveret, adhibui: a valde calidis tamen, ne in pus conuerteretur inflammatio, aut abscessus fieret, & rursus a valde frigidis, ne in scirrhum ren dexter inflammatus mutaretur, abstinui. Constabat autem unguentum ex unguento ros. muccag. seminis malua, cotoneorum, alibæ, pinguedine gallina, & oleo viol. ros. & chamamelino. Dolore tam quieto, ad purgatiunculam illam lenem ex cassia perueni. tum ad illa que leniter urinam ducerent, decocto sup. scripto addens agrimoniam, ciceream

ciceres rubros, & similia, qua ab initio non conueniebant, ne materia magis ad locum deduceretur; ita ut tandem crassiora tum copiosiora mingeret: qualia in declinatione apparentia febris solutionem notant. Ita quoque factum est, ut filiola iam morti destinata sanitatem recuperauerit, licet nunc sub noctem quandam leuissimam alterationem ad duas horas sentiat. Sed cum lotum deinde magis flauum sit, parentesque iter ad proprios lares anhelent, ita ut abitum in patriam concesserim, cum hic diutius manere non possint; interim si quid oboriatur huic puellulae domum reuersa, id totum tua industria ac arti, *Andrea doctissime*, committimus: & si adhuc leui purgatiuncula opus erit, ne recidua fiat, & aliquid relinquantur, id ex manna ℥j. vel ex cassia ℥vj vel vii satis esse putarem; quamuis ego cassiam eligerem, qua ego cum sero lactis recte usus sum, dando ℥.vj. quo quinquies multa biliosa, mucosa & foetida excrementa per aluum deiecit, & deinde melius habere cepit: hac enim satis erit ad renes & vterus leniter expurgandos. Deinde renes confortarem cum aliquo corroborante unguento, ne imbecilliores ex longo morbo, nouam materiam rursus coaceruent. Similiter per os darem, conseruam rosaceam recentem, aut Zacccharum rosaceum, quod saluare remedium est, & ita temperatum, ut si latiores facti sint renes, ad conuenientem naturam suam statum illos deducat; si obstructi ac pleni, abstergat; si inpaluerint, refrigerent: nec tamen affectus frigidus nocet, ita ut renibus omnibus modis temperatissimum medicamentum sit, cum renes a calidis & frigidis facile ledantur. Consultum quoque iam abeunti puellula, ut mala citrea in taleolas sissa & zacccharo conspersa ac madida subinde sumeret: tum ad appetitum incitandum, cum & sua incisione optime renes mundificent, obstructionem tollant, & ad febre rem faciant, ac putredini resistent, similiter & calculos comminuant absque calfactione. Reliqua tuae prudentiae ac scientiae committo. Satis est haec pauca viro in artis operibus exercitato scripsisse. Plura addidissim, nisi parentes abitum pararent. Hisce itaque valeto. Raptim, Delphis, corrente calamo 7. die Junii. anno 1566.

Petrus Forestus, tuus ut suus.

SCHOLIA.

6 RENUM abscessus (inquit *Fernelius*) quo purulenta materia coercetur, rarius ex phlegmone fit, saepius ex sordido ulcere non repurgato. Concoctione tamen phlegmones pus gignitur, & abscessus tantus interdum, ut distento rene tumor circa lumbos, & ilia foras promineat. Febres tunc cum horrore oberrant (ut diximus) grauitatis sensus, quam ante magis infestat. Rupto autem abscessu pus cum vrina defertur, & interdum sordes aut corrupta caro ex putri renum substantia. At in hac puella leuis quidem inflammatio ad abscessum non peruenit, sed quasi per modum resolutionis inflammatione cessante, etiam febris postea eandem dereliquit. Sed in abscessu, in quo materia purulenta coercetur, saepe vlcus manet diuturnum admodum ac fere immedicabile. Quae enim substantiae portio, vel putredine, vel

attritu exesa est, neque refarciri vnquam, neque coalescere potest: quandoquidem (ut velle *Fernelius*) viscus hoc, ut cetera, spermaticum est, cuius etiam vrina iugiter praeterfluens vlcus agglutinari non sinit. Quo circa sordidum id, ut fistula perpetuo relinquitur. Huius signum est, quod modo pus, modo mucosum quiddam vrina permixtum defluit: hincque vrina redditur alba, turbida, lactis sero persimilis, quae tandem quiete sedimentum id purulentum mucosumve deponit. At in nostra puella erat quidem lactis sero persimilis, sed sedimentum purulentum tale non colligebat; alioqui facile abscessum & vlcus ostendisset. Vlcus vero ex abscessu phlegmone insolens admodum est, iuxta *Fernelium*. Nec minus id quoque insolens putandum, quod vena profluentis materiae acrimonia renem exedente, vel ab ictu, vel a casu eius venas dirumpente fieri tradunt. Ex acrimonia materiae profluentis, in nobilissima matrona fieri cognouimus, ex eodem ulcere mortua, quae in iuuetute calidis vinis via fuerat. Crebro autem ac fere semper fit a calculo intus coercito, qui vel pondere renem contundit, vel attritu comminuit exeditque, ut in multis vidimus, & in quodam ceruisiario, itemque alio frumentario mercatore, ambobus tandem, cum multis annis magno cruciatu milere vitam protraxissent, mortuis. Ita quoque (inquit *Fernelius*) saepe vidimus tota renis carne ac substantia peresca, ambiente tanquam marlupio membrana pus calculosque multos obuolui. Vlcus ab his causis ortum habuisse, argumento est, quod vrina antequam purulenta esset, saepe cruenta fuerit, praesertim ab exercitatione & labore, quod febris nulla aut per obscura fatiget. Si quando autem obstructio vteris capite pus cohibetur, id sensim per emolgentem venam in maiores venas redundans, sanguinem, habitumque corporis inquinabit (qua ex causa quasi ex leucophlegmatia calculosum tumore ac pallefcere saepe animaduerti: id quoque ego vidi in *Melchiorre Gherardi*, vicino nostro calculoso, etiam nuper in sartore, qui Delphis prope templum *Novum* habitabat) vel ea sede congestum illud lumbosque copia distendet, e quibus etiam aperta cute diu multumque manat. Nonnunquam & illinc calculus ingens cum pure alias excessit, alias euulsi est. Haec quum accidunt, tota iam pene renis substantia putredine consumpta est, illincque pus redundans inter peritonaei membranas fluctuat. Huius copia (idem *Fernelius* inquit) interdum vidimus totam ventris lumborumque regionem distendi, & pus hinc tum deiectione, tum vomitione reddi syncerum. Quoniam igitur de phlegmone renis eiusque apostemate satis egimus, & illa aliquando in abscessum & vlcus terminentur, nunc de ulcere renum tractabimus: quoniam non solum post abscessum (ut nunc diximus) rupturam renes ipsos exulcerari contingit, sed ab aliis quibusdam causis, ut nunc dicere coepimus: propterea de hac exulceratione verba facere intendimus.

OBSERVATIO XXXVII.

Dereum exulceratione, cum ardore vrinae.

I Vm in ciuitate Pithueriensi praxin exercere, sacerdos quidam annos 45. natus, anno 545. mense Septembri in pago quodam extra urbem, tribus mensibus ardore vrinae ac renum vlceratione laborauerat: nam continuo pus foetidum cum vrina dimittebat, modo saniem & sanguinem simul cum vrina: vnde paulatim macilentior factus, eodem tempore, nescio cuius medici empirici opera vtens, tandem & in manus tonforis incidens, illdem nihil proficientibus, malum semper in deterius progressum est; ita vt tandem me vocauerit. Hoc vlcus videbatur ex acrimonia humoris confluentis initium cepisse, cum etiam iam tribus mensibus ardor vrinae simul illum vexaret. Ideo omnium primo, cum secessum non haberet, medicamentum sequens propinaui: *℞ cassia fistularum recens extracta ℥j. cerebithina electa decies lota in aqua viol. ℥j. B. cerebithina torreatur, vt puluerisari possit, adiungaturque, & cum Sacch. asperso & puluere glycyrrhizae fiat bolus.* ex quo ter aluum deposuit cum magno iuuamine. Quia vero durioris alui erat, imperaui vt semel in septimana (vt materia diuerteretur per aluum) enema commune emolliens cum cassia, vitello vnius oui, oleo viol. & amygd. admixto, iniiceretur. Et vt deinde singulis tribus septimanis ℥j cassiae recens extracta in sero lactis sumeret. Tale aut simile enema componebatur: *℞ malua, althaea, violaria, acanthiana m. j. pruna x hordei m. B. decoquantur in s. q. aqua ad tertias.* Huius decoct. accipe ℔ j. adde cassiae recens extractae, cchari rub. ana ℥j olei viol. ℥ij vitellum vnius oui. misce. Et quia humores calidi acres ad renes confluebant, ardorem vrinae inducentes, sanguine quoque extracto in minori quantitate, cum iam tribus mensibus laborasset, venam iecorariae cubiti dextri secari iussi, & vt vitae institutum diligenter tum victus rationem obseruaret curauit; aeremque eligeret ad siccum inclinantem, in aetiuis temperaturis, aut paulo ad calidum: sicut frigidus vitari debet, ita & valde calidus, cum ardorem vrinae augeat: & de frigido patet quidem, nam frigidum vlceribus mordax, teste Hippoc. eph. 2. lib. 5. somnum moderatum concessimus, & conueto longiorem, cum immodice vigiliae his valde obstant: quietem iniunximus, & vt omnem delationem ac efferuentem gestationem, maxime, quae fit in equo, & omnem vehementem concitationem vitaret, praecipimus: hic enim conuerso perperuum otium (ex Aetii decreto 30. lib. 11.) confert: vice autem exercitii, agrum decumbentem molliter fricare singulis diebus mane conuenit. Commendabam quoque cubiculum temperatum, in quo decumberet, & vt ob eam causam etiam paludosa loca vitaret, & a Veneris in primis petulantia abstineret, & vt in curru minime veheretur; repletiones omnes declinaret, aluumque molliorem etiam habere curaret, clysteribus mollibus, & lenientibus iam dictis. Nihil enim hic praestantius, quam vt natura feces quotidie excernat. Et sicuti animi immodici affe-

ctus hic locum non habent, ita & omnibus renū & vesicae affectionibus, coitus quoque insensibilis, licet senibus magis; at natura imbecillioribus, & iste Aetio, minime etiam conuenit. Iussimus quoque ne super mollem culcitram plumeam cubaret, sed quae de gossipii lanugine facta sit: nec renū regio leuiter tecta esset. Nihil quoque edendum, quod salsum, acre, acetosum, amarum, vel nimis dulce aut praepingue sit. Oleosa enim hic maxime damnantur. Et bilem gignentia auerlentur: & quia acida nocent, si citranguuli apponantur, sine saccharo ne sint, ad tollendam aciditatem. Nihil quoque edendum praecipimus, quod crudum esset aut aegre concoqueretur, aut facile corrumpere, vel inflationes pareret, aut cito accresceret: inhibuimus etiam omnia, quae crassi humoris essent, & aegre secernerentur aut vrinā cicerent, ventremque plus a quo perturbarent: nam & acrida omnia efferuescentia, & quae accepta amplius astringunt, & magis resiccant & non nutriunt, & quae stomachi inimica sunt, & quaecunque bilem aut pituitam praecipue gignere possunt, cane prius vitanda sunt. Pro cibo commendaui in primis ptisanam cremorem hordeatum, auenatum & ptisanam ipsam, sorbitionesque ex hordei farina, amylo, addito lacte, & amygdalatum, & subinde oryzam. Est enim idoneus cibus amyli ipsi, aut similago lota cum lacte cocta; & lac quoque ouis permixtum, & gallinae iusculum pingue, ex Aetii sententia. Imo oua gallinarum tepida, & molliissima si edantur, valde proficiunt. Ego sane noui quendam, vt inquit Alexander Trallianus, qui oua, quae primum essent posita sorberet citra coctionem, dicebatque se plurimum adiuuari, & rosiones ac dolores, qui circa vesicam oriebantur, mitiores fieri, vt ferre posset, affirmabat. Concessi quoque vt oleribus uteretur, sed coctis, malua, intybo, fenestrade, rumice, portulaca lactuca, & quae simili facultate essent praedita. Omnia tamen cocta (vt diximus) conueniunt & cucumis, & asparagus palustris; nam & haec morsus obtundunt: nec quicquam crudum tales vident. Cruda etenim olera tam renū, quam vesicae vlceribus inimica sunt, eiusdem Aetii auctoritate. Summo opere ei commendaui auculas montanas teneram carnem habentes & carnem gallinarum, pullorum, phasianorum, starnarum; iuuenem magis, aucularum montanarum, quae antiquarum: & perdices assas praecipue, vel iuscula earundem, vel caponum, vel gallinarum gallinaceorumque, & ex quadrupedibus boe dorum extremitates, cum & animalium pedes etiam ex usu sint. Sed diuretica vitanda consulimus, tum vehementer dulcia. Insipida & leuiter dulcia & glutinosa, vt sunt vitulorum pedes, & aliorum animalium, non omnino commenda. Ex piscibus vt etiam attingeret concessimus asellos paruos, & gobios & gammaros ac locustas, & fluuiales canctos, qui velut remedium praebentur, vt ait Aetius. Erinaceus quoque recens familiariter permittitur. Similiter conueniunt & auxiliantur amygdala depilata costae, cum saccharo vel melle, aut saccharo incrustata, vel virides, maturae tamen, & probe mundatae: sicca vero & non

5 Et non vetusta, sed pramacerata & decorticata, pinea-
que nuges, sed recentes, duabus aquis macerata, pista-
chia, ac passula, nam vna passa omnis ex bellariis non
incommoda est, si dulcis fuerit & cum nucleis man-
ducata, & anellana & melimela quoque, mala puni-
ca dulcia, & melopepones, & quo dulciores fuerint: cu-
cumis quoque ater & ingens dulcis, ac bene maturus
innat; nam & sitim accensam sedat. Voluptatis quo-
que gratia acetum modicum concessimus. Edu-
liorum autem varietates, & superflua condimen-
ta, omniaque nidorosa, graueolentia, & putrida
inhibuimus; & ut omnia, quæ in cibo sumeren-
tur essent mediocris multitudinis consulimus,
etiam si utilia esse ferantur: ut & ficus aridas vita-
ret; nam aridæ fici ab omni schola medicorum
in ea causâ magnopere damnantur, cum & ni-
mium abstergant, & vlcera perfanari non sinant.
Pane vtendum esse suasi, accurate apparato & re-
centi. Frigidum potum inhibui, cum frigidum sit
vlceribus inimicum. Multus enim potus & me-
racior, ac ieiunis potus omnes incommodi exis-
tunt. Aqua tamen pluuia non corrupta omnino
aliis melior existit (ut inquit Aetius) quæ tamen
actu non sit nimis frigida. Sed potius pro potu v-
tendum vino albo adstringente diluto, aut aqua,
in qua hordeum torrefactum, & radix glycyrrhi-
zæ fuerint decocta. Vel detur vinum rubrum di-
lutum, si ferre potest hordei & glycyrrhizæ deco-
cto; vel lac caprillum, ouillum aut amygdalinum.
Lactis enim vltus in eo vitio maxime laudatur, afi-
ninum præsertim, quod repurgare & sanare dicitur.
6 Ita in Domina Principe de Chimay commu-
ni consilio cum aliis medicis clarissimis eo cõmo-
de vlti sumus. Secundi meriti equinum est; & ca-
melinum, postrema laus bubulo & ouillo, nã be-
ne alunt: caprinum vero alit & repurgat; cameli
proximum, purgat enim, corroborat & aggluti-
nat: bubulũ & ouillum bene alunt, quoniam pin-
guiora sunt: media portio est 3 iij. nec nisi tepens
datur: addita salis mica, & mellis exiguo, ieiunis
datur; nec nisi cõcocto priore aliud assumi debet.
Hæc pro victu conscripsimus. Sed præter clyste-
rem venæ sectionem & cassiam præscripsimus, et-
iam potiones ad dolorem & humores acutos, sal-
sos mitigandos & contemperandos: 4 hordei mun.
p j lactuca, malua. v ol. p. iul. intybi ana m. j. seminis
quatuor frigid. maior. ana 3 j. flor. viol. nymphaa a-
na p. j. sem. pap. albi 3 j. iunubar. sebesten. recent. ana
num. v. j. fiat decoct. in aqua communi pro lb. j. cola-
tur & adde syr. viol. nymphaa ana 3 j. syr. capill. Ven.
pap. ana 3 j. misce. Postea continuo bibeat ex de-
cocto malux, cum toto rad. & sem. quatuor frigid.
maior in sero lactis, adiectio melle rosæ ad deterfionem.
ac satis ex eo mingebat. Manebat tamẽ vrina val-
de feculenta, mucosa & purulenta, & dolor non
sedabatur. Postea ad maiorem deterfionem dedi
7 subinde pilulas ex terebinthina lota cõ aqua fce-
niculid. unde rursus terebinthina exficcata, & su-
per laminam ignitam parum tosta, vt puluerizari
posset, ex eo puluere cum succo glycyrrhizæ pilu-
las componebam ad magnitudinẽ cicerum. Tres
pro vice sumebat, superbibendo decoctum mal-

ux, cum sero lactis, paulo ante dictum: & iterum
dedi 3 j. cass. recens extracta in bolo, zacch. candi di-
cto super aspero. & superbibendo cyathum vnum
aquæ lactis. Et cum pilulas dictas continuasset, &
post duas septimanas denuo accepisset cass. recens
extracta 3 j. in bolo, cum 3 lb. super infuso, vel immi-
xto pul. trochis. alkachengi sine opio. Sed cum nondũ
dolor istis mitigaretur, æger desperans de sua sa-
lute, tædio remediorum affectus, omnia deinceps
præsidia relinquere voluit. Quare adhor-
tando, vt curationem adhuc prosequeretur, con-
sului, vt singulis septimanis semel sumeret 3 iij.
vel 3 lb. cassia recens tracta, cum 3 j. trochis. alka-
chengi: & vt omni die sumeret ex sequenti ele-
ctuario ad magnitudinem castanæ. & immediate
superbiberet cyathum vnum feri lactis: 4. zacch.
viol. 3 iij. conseruæ ros. huius anni, vel vnius anni 3.
lb. seminis mal. 3 j. seminis pap. albi 3 j. seminis qua-
tuor frigid. maior. mundat. ana 3 j. lb. seminis hyo-
scyami albi 3 j. pul. glycyrr. 3 j. granorum alkachengi
cum suis vesicis exsiccati, & subtiliter carpellatorum
(vt pharmacop. eorum more loquar) 3 iij. succi gly-
cyr. 3 iij. bol. armeni veri, trochis. de terra sigillat.
ana 3 lb. cum syr. capil. Ven. viol. fiat elect. liquidum
moderate. Cum his vltus esset per septimadam v-
nam, cœpit dolor mitigari, & vrina minus mu-
cosa exibat, minusque ardorem inferens indies in-
melius mutabatur. Quod si non iuuisset, portio-
nem hanc vtilem ad acutos & lallos humores ini-
tigandos, præscripsissem. Habet hordei. seridis,
9 lactuca hepatica, callitrichi, capni flo. is, seu floris su-
maria, ac malua ana m. j. seminis cucurbitæ, cucu-
meris, melopeponis, ac rotundi cucumeris, passul. xi-
zophorum, myxorum, seminis pap. albi ana 3 iij. florũ
viol. purpur. nymphaa ana 3 j. glycyrrhizæ succi semi-
nis altheæ ana 3 j. prunorum. memphucor. id est,
tamarindorum, 3 j. prunorum nostratum 3 iij. cum
aqua fontana feruescant, & percolato decocto adde
roris Syriaci, id est, manna 3 iij. & sacchari quan-
tum vis, ad passissitudinem, binæ dantur vnciæ vel
3 j. lb. cum aqua hordeacea. Ceterum cum quoti-
die melius haberet, sero lactis, quo in principio
utebatur, relicto, lacte bubulo utebatur, & vngu-
ento rol. lumbi inungebantur: & cum vlcera satis
viderentur repurgata, tunc resicantia adstrin-
gentia & glutinantia medicamenta, vna cum la-
cte ouillo, modo etiam vaccino, aliquid boli ar-
meni veri inieciimus: & dedimus conseruam ro-
saceam non veterem. Quibus ad tempus vtens, &
subinde solo lacte vaccino, recte deinde ha-
buit.

SCHOLIA

Exulcerantur renes, vesica, ac intermediũ vri-
narii meatus; de quibus aliqui sub vno capi-
te tractant, vt Gordanius: nos hic de rene loqui-
mur, & de vesica seorsim tractabimus libro se-
quenti. Appellant autem Græci afflictum hunc,
quandoque ἔλκος interdum ἔλκος σιν: Latine vero
vltus, & exulceratio dicitur. Nihil autem aliud
est, quam continui solutio in carnosa sub-
stantia contingens. Nam si in aliis partibus

10
Quid intel-
ligendum sit
per renem
exulceratio-
nem.

eueniat, cum in omnibus incidere possit, diuersa quoque nomina sortitur, ut liquet 4. & 6. method. medendi. Qua de re cum Donato appellabimus eorundem solutam continuitatem. Huius variae sunt causae, ut nunc Scholio precedente diximus: aut enim percussis interioribus venis, aut membris percussis, aut intus suppurata & rupta vomica, aut lapidis scabri aut asperi inter angustias vitio, vel iocinoris vomica adaperata, cuius purulentia renes pariter vlcerata patiuntur. Ex pleuritide quoque idem euenire solet, sed rarentur. Hæc ad causas remotas pertinent. Sed fit quoque aut humoris acriore vi mordente, aut falso phlegmate. Aqua quoque ex fontibus calidis, si bibitur continuis diebus, vlcerata parat, ac cruentam vrinam. Ex lassitudine quoque, ac athletico præsertim labore immodico, sæpe contingit. Mollis item culcitra hos affectus parat. Sed ex falsis cibis, calidis & acutis medicamentis, amarisque potionibus, aut herbis, & diureticis excalfacientibus, & ex Veneris intemperantia, maximam inueniunt causam, & nephriticis fere omnibus, ut Auerroes Arabs tradit, oriuntur; sicut & post vesicæ affectiones, quas quædam scabies antecedit. Nam & ea vitia ex piscium esu sæpe gignuntur. Referuntur aut hæc causæ vel ad internas aut antecedentes, vel ad externas. Internæ, iuxta Paulum, quatuor esse possunt: vel ex disrupto abscessu in renibus, vel ex disrupto aut exeso vase, vel ex calculo, vel ex acris humoribus, aut mordacibus succis ad renes confluentibus, vel in iisdem coaceruatis aut erodentibus. Et ita ad causas antecedentes referunt calidos acutosque humores, apostema in eis male curatum, vel post rupturam male expurgatum, etiam humores pituitosos viscosos inhaerentes, vel falsum excorians, vel calculum excoriantem, vulnerantem in transitu, vel sanguinis repletionem in venis rumpentem, & tandem sua virulentia excoriantem renes, ut 4. aphorism. 80. Alii hic causam coniunctam esse volunt, intemperiem malè introductam in ipsis renibus vulneratis, aut aliter solutionem continuitatis patientibus a causis antecedentibus vel primitiuis aut externis: nam causæ antecedentes vel primitivæ movent coniunctas. Externæ seu primitivæ sunt, calus percussio, vulnus: ad quæ sanguinis fluxio sequitur: nam post apertionem violentam fit vulnus, deinde vlcus. Huc pertinent & medicamenta erodentia, exulcerantia, & lassitudo, immodicus labor, Venus, & alia supradicta. Signa vero renes esse affectos, cognoscimus ex gravitate circa lumbos, si ambo affecti fuerint: si aliter, ut dexter, in dextra parte; si sinister, in sinistra dolor sentietur. Alia quoque sunt signa, renes esse exulceratos, quæ simul & affectum, & sedem affectam indicant. Affectus hic sub eo morbo, qui communis a Galeno appellatur, contentus, solutio continui dictus, & proprie in carnosa parte, hoc est, renum parenchymate eueniens. Quo fit, ut præter lumborum dolorem cum gravitate, sine impedimento vrinam reddant, cui pus mixtum

reperitur, carnosus particulis innatantibus (Paulo auctore.) Galenus autem 6. de locis affectis scriptum reliquit, *per seuerantis ulceris notas (ex abscessu potissimum orti) ex urina haud obscure deprehendi: adde quod creberrime in affecto rene dolorem sentit, atque interdum cum urina exiguum pus, veluti ab ulcere excernitur*: similiter ramentum nonnunquam cum vrina expelli videtur, per partes quasdam ipsius vrinæ inæqualiter dispersum, mediam conditionem seruans in eius commixtione pus ipsum: ac interim sanguis quoque cum vrina excernitur, qui erosi iam vlceris indicium est. Nam si sanguinem aut pus mingat, pluribus videlicet diebus ac mensibus, aut renum aut vesicæ exulcerationem significabunt, ut 76. aphorism. 4. lib. ab Hippocrate & Galeno decretum est. Et enim vocatur quidem ramentum vlceris: essentia vero proprietas aff. & us partis proprium indicium est, eodem Galeno auctore 6. de locis affectis. Et ita signa demonstratiua vlcerum renum, ut signa generis, per ea, quæ nunc diximus, sunt manifesta. At signa specierum ex causis suis magis innotescunt. Et ita si disrupto abscessu exulceratio succedat, ut recte quoque annotauit Donatus, caruncula parua oblonga cum vrina excernuntur; & si maligna fuerint vlcerata, humores foetidi, liuidi & mucosi. Nam & hic vrina, ut sæpe in pra. xi conspeximus, cum pure permixto & mucoso adeo foetet, ut nares facile ex eo foetore (nisi odore grato occurratur) offendantur. Si vero benigna fuerint, etiam pus ipsum album & æquale & leno absque odore graui, & paucum reperietur, ut inquit Aetius; præcesseruntque alia præcedentis abscessus indicia, velut ante dictum est de phlegmone & apostemate renum: quemadmodum si disrupto vel exeso vase aliquo renum exulceratio consequatur, eiusdem ruptionis seu excisionis signa præcedant, quæ antea de profluvio sanguinis renum fufius demonstrauius: nec minus & lapidis signa præcedant, si ex eo erodente exulceratio contingat. De calculosis prius dictum est, qui calculo renum laborant: & ab his etiam hæc clariora multo demonstrantur. At si propterea, quod acres & mordentes succi vrinæ permixti per renes pertranseunt, eorundem acrim ac mordacium succorum indicia redundantium aderunt, quæ non solum ex vrinis percipi poterunt, sed ex temperamento, ætate, habitu, anni tempore, præcedentique victus ratione, ac reliquis, nullumque aderit indicium rupti seu erosi vasis, nec ruptionis abscessus, aut lapidis. At emissio pure si sanguis sequatur, Galeno auctore, vlcerata, quæ serpunt, indicantur, phagedanas vocant Græci, quod nomen sine modo esurientium est. Verum causæ externæ, ut si contigerint ab assumto medicamento erodente, exulcerate, aut ex illato vulnere, aut aliis causis externis superius dictis, promte cognoscuntur ex infirmi, seu astantii loquela, ut non opus sit, his diu inhaerere, & ex iisdem quoque præcedentibus signa quoque præagientia vlceratione renū futurā vel expectandā, nō difficile

Aqua potus ex fontibus calidis nocuum.

Interna seu antecedentes.

Coniuncta.

Externa seu primitiua.

Signa renū affectorum.

Affectus hic qualis præternaturalis.

13
Vlceris renū signa

Signa causarum exulcerationis renum.

Causa interna quomodo dignoscantur.

14

Signa vlcerum serpentium.

Causa externa quomodo dignoscantur.

15 difficile innotescunt, ut si victu excalfaciente, vel medicamentis admodum calidis, ut diureticis v-
 tantur, si in balneis sulphureis & calidis diu ver-
 sentur, atque cibis falsis, & amaris, acutiq; vten-
 tes, & coitu, & calculo obnoxii sint, ex malo hæ-
 reditario, tum ea signa, quæ diximus apostemata
 prælagire, si adsint, & aliquando urinæ ardorem
 incurrant tales facile vlcerebus afficiuntur: nam
 & mictu sanguinis præcedente, & urinæ ardore,
 diutius ægrum instantibus & apostemate labo-
 rantibus, si his statim non occurratur, neque re-
 cte & debite curentur, facile in vlcerationem re-
 num incidunt. Ex quibus iam dictis prædicere &
 prælagire poterimus, vlcus renum futurum es-
 se, si non impediatur. At distinguenda signa vlc-
 eris renum, ab aliis partibus vicinis desumuntur:
 renum enim vlcera dolore circa lumbos indican-
 tur, sicuti in ima spina ac coxendice; nam vbi do-
 lor, ibi morbus; & ideo deprehendetur dolore
 circa renes, cum pure multo reiecto vna cum uri-
 nis. Discernitur a pure vesicæ, quod pus vesicæ
 viscosum magis & tenax sit, quia a parte nervosa
 defluit. Renum autem pus est quidem crassum,
 sed minus viscidum. Parum tamen certum est (ut
 etiam meminit Rondeletius) quod tradunt practi-
 ci, pus renum magis permixtum urinæ, vesicæ au-
 tem minus. Nam in vtriusque vlcere permixtum
 redditur, & postea in fundo residet. Id tantum ve-
 rum est in penis vlcere, in quo prius redditur pus,
 deinde lotium quasi sine pure. Sed renum vlcus
 & hoc modo a vesicæ vlcere distinguitur, si in
 summa vesicæ parte fuerint, in pectine ingens
 cruciatus erit. In venis intermediis albis (veteres
 dicimus) in ilibus punctiones ac intercisiones
 sentiuntur. Renes vero exulcerati tergi gravita-
 tem & dolorem præ se ferunt, sed sine offensio-
 ne urina demittitur; verum partes carnis parti-
 culæ (ut & antea diximus) cum urina mixtæ pro-
 fiunt. In vlcerebus vesicæ aut meatuum stillici-
 dium inuenitur: si vero cum sanguine, aut puru-
 lentia veluti albæ squamulæ substituerint, vesicæ
 vlcerationem ostendunt: nam tum urina alba
 est & grauiter olet: quod nec renibus, (ut quidam
 volunt) nec meatibus infra renes contingit, ex
 quibus plus virulentia subrubicundæ excerni-
 tur, quando quidem natura calidi & humidus sunt.
 Ex vesica tamen plus substat puris, quam exulce-
 ratas meatibus: ex renibus namque Galeni sen-
 tentia, putres veluti carunculæ, vel concreti san-
 guinis guttæ, ex vesicæ fufaracæ, vel squamulis
 similes prodeunt. Urina item exigua, pinguis si-
 ue crassa, exiguo sanguine, aut pure substante, ve-
 sicæ offensionem indicat: multa vero & pinguis,
 in qua quædam veluti rubicunda affuerint capil-
 lamenta, ex renibus effluit, Hippocratis testimonio.
 In vesicæ & meatuum vlcerebus præterfluente v-
 rinæ mordaci liquore, ingentes & frequentes
 sentiuntur cruciatus, parturientibus haud dissi-
 miles. Vlcera item renum febris non sequitur,
 sicuti vomica. Veruntamen membra paulatim
 tabescunt. Ceterum de vesicæ vlcerebus libro se-

quenti dicemus; nunc quædam prognostica ad-
 iiciamus. Si autem fiat post inflammationem &
 abscessum frigidum, cum post eruptionem abs-
 cessus remaneat vlcus, nisi id statim repurgetur
 (ut paulo ante dictum est) & renum vlcus cicatri-
 ce inducatur, difficiliorem reddet curationem,
 Galeni auctoritate o. de locis affectis, quamuis mi-
 noris malitiæ sint renum, quam vesicæ vlcera:
 quoniam carnosæ partes, quam nervosæ facilio-
 ris sunt curationis. Tamen nosse oportet, omnem
 exulcerationem & vesicæ & renum ægre curabi-
 lem esse; præsertim quæ ex erosione sit oborta:
 adeo ut paucos nouerimus, qui ab ea perfecte sint
 liberati, ut liquet ex Aetio; licet, recentia vlcera,
 non adeo ægre, ut diutina curari possint, siue in
 renibus, siue in vesica fuerint orta. Renum quo-
 que & vesicæ vitia in senioribus difficulter sanan-
 tur, ut inquit Hippocrates aphorism. 6. lib. 6. Quoniã
 & earum partium opus indefinens est (quære autem
 opus est, si quid sanari debeat) & quoniam excre-
 mentum acre exacerbare natum est: multo autem
 difficilius sanantur in senibus renum, & vesicæ
 passionibus, ut & omnes alii morbi, præcipue longi,
 ut testis est Galenus commen. eiusdem aphorism. Qui
 nimio iudem diuturnis morbis correpti fere com-
 moriuntur, ut eidem Hippocrati visum est aphorism.
 39. secundi libri. Et quæ iniqua vlcera atrii coloris,
 grauisque odoris, impatibili cruciatu, irritis me-
 dicaminibus morbi vetustate dampnantur irre-
 mediabilia; & vesicæ quoque difficiliora sunt sal-
 sugine humoris exasperante. Et si harum partiũ
 vlcera multis differentiis inter se distinguuntur:
 nam alia erodunt, alia phagedænica sunt, & valde
 maligna, & quædam compleri nequeunt: nam vl-
 cerum vetustati nullum fere remedium: antiqua
 non facile sanantur. Aliquando etiam ex vlcerebus
 renum fistulæ prodeunt, iuxta Auicennam, quæ
 nullo modo sanantur; quamuis aliquando certis
 temporibus pus non fundant, dum corpus a re-
 crementis repurgatur, materia puris ad loca con-
 traria medicamentis reuulsa; sed rursus repleto cor-
 pore, neque per remedia repurgato, pus denuo
 cum urina exit. Vidimus & nos renes per fistulam
 extrinsecus pus euomere, ut in Hadriano Junio
 Medico doctissimo, cui in senectute suæ morbo consilio
 exterius incisio facta erat, fistula tamen deinde perpe-
 tuo illi adherente & per intervalla pus euomente, do-
 nec moreretur, nostra Batavia decus, mihi que per to-
 tam vitam amissimus.

OBSERVATIO XXXVIII.

De renum vlcere post gonorrhæam & tertianam
 febrem oborto.

R Vsticus quidam triginta duorum annorum,
 cum Almaria adhuc praxin exercerem, ex
 pago Barringhorna dicto, anno 1554. mense Fe-
 bruarii me consultandi causa accessit, cum per se-
 miannũ renũ vlceratione laborasset, & simul in e-
 mittendo lotio ardorem sentisset. Ante vero labo-
 rauerat diutina gonorrhœa, unde lumbi admo-
 dum debilitati erant, & cum in tertianam febrem

Signa præ-
 sagientia.

Signa di-
 stinguenda
 vlcus renũ,
 ab aliis par-
 tibus vicinis.

Pus vesicæ
 quib. signis
 distinguitur
 a pure renũ.

17
 Signa pro-
 gnostica.

18

quoque incidisset, nullis remediis adhibitis, quamquam ab ea liberatus erat, tamen acuti humores collecti & coaceruati in renibus, dolore subsequente in lumbis, cum non repurgarentur, ad vlcus renum devenit, quod & dolor in renibus, tunc pus acre exiens cum ardore urinae, lotio simul permixtum ostendebant. Pro cuius ulcerationis curatione victum praescripsimus in *Observatione* 37. *precedente descriptum*. Et quantum ad medicamenta, ut acres humores illos concoqueremus, & deinde euacuaremus, cum in hyeme essemus, hunc syrupum propinauimus: \mathcal{R} syr. viol. \mathfrak{z} j. syr. de liquir. \mathfrak{z} ss. aqua fumarie, acetosa, malua ana \mathfrak{z} j. misce, fiat syrupus. Sed nausea ex syrupo afficiebatur, ita ut libenter vomisset; qui vomitus illis utilis est, & forte tutius erit, eos per vomitum euacuare, ubi ad eum fuerint potissimum parati. Verum si quis omni mense audacter vomat, forsan & renum vlcus, & quicquid inde mali accidere posset dissoluet, *Aetio teste lib. 11. cap. 18. de suppuratis renibus, ex Rufo*. Et ita non solum ad repletiones vomitum lauat, sed ad materiae vlcis diuersionem. Et ita quidam in paratis ad vomitum etiam ante syrupos, & apozema, vel syrupos humores acres contemperantes & concoquentes, & ante medicamenta lenientia, statim in principio vomitum prouocant, in paratis. Ideo etiam Rondelietius inquit, *Ne deducantur excrementa aliqua ad partem affectam, erit utile ante usum syrupum vel vomitu, vel medicamento leniente ventriculum & intestina detergere*. Quidam aquae tepidae potu & olei communis, ante pastum vomitum incitant; quo solo remedio saepe repetito, referunt hunc affectum curatum fuisse, cum vomitus humores ad renes defluentes reucllat & auertat. Verum cum a cibo melius vomant, Rondelietius iubet, id a cibo fieri, & ut aquam tepidam bibant cum paucis oleo, simul inungendo os ventriculi oleo liliorum ad eiusdem relaxationem, unde etiam minori molestia vomunt. Quod & nos fecimus: & ex vomitu videbatur lenior factus. At iis tantum haec iubenda sunt, qui facile vomunt: aliis non, cum ea quae vomitum excitant, vlcus irritent. Ceterum rusticus noster eo die, cum vomisset a syrupo abstinuimus: altero die iterum dedimus. Postea vero exhibui hunc bolum: \mathcal{R} cassiae recens extractae \mathfrak{z} vj. diacatholici \mathfrak{z} ij. trochisc. alkachengi sine opio \mathfrak{z} j. succi glycyrrhizae \mathfrak{z} ss. zaccaro candi dicto albiss. assperso: fiat bolus: eoque deuorato, ter aluum satis copiose deposuit, cum leuamine doloris & ardoris urinae; cum deinde sumisset semel adhuc syrupum superscriptum. Verum cum vlcus aliquandiu durasset; & quasi sordidum euasisset, & maiori deterfione opus esset: hoc apozema praescripsi: \mathcal{R} capill. Ven. ceterach. fumarie ana m. j. bis malua. agrimonie ana m. ss. seminis anethi. anisi s. min. pap. albi, sem. quatuor frigid. maiorum ana \mathfrak{z} j. granor. alkachengi cum suis vesiculis num. v. hordei communis p. j. glycyrrhiz. ras. \mathfrak{z} ss. fiat decoct. in aqua communis pro \mathfrak{t} b. j. ss. dulcoret. zaccaro: & capiebat ex eo bis in die. Postea capiebat mane & vespere tres pilulas, quae ita erant pa-

ratae: \mathcal{R} pul. glycyrrhizae \mathfrak{z} ij. terebinthina in aqua plantag. lota \mathfrak{z} j. fiant pilulae cicerum instar, & superforbebat \mathfrak{z} j. syr. ex infus. ros. rub. communis. Postea omni mane capiebat cyathum vnum lactis bubuli recenter mulcti. Rursus adhuc accepit cass. recens tracta in bolo \mathfrak{z} j. cum \mathfrak{z} j. trochisc. alkachengi. Deinde omni mane, & hora quarta pomeridiana sumebat cyathum vnum, moderate calidum ex sequenti decocto: \mathcal{R} lactis bubuli \mathfrak{t} b. ij. seminis plantag. \mathfrak{z} j. ss. seminis cotoneorum \mathfrak{z} j. seminis sanghin. \mathfrak{z} ij. ebulliant leuiter. Deinde colentur: & colatura adde mellis ros. colati \mathfrak{z} ij. boli arm. ad modum alcohol pulueris. \mathfrak{z} iij. pul. trochisc. alkachengi \mathfrak{z} j. misce. Rursus deinde pilulas supradictas sumit, & post aliquot dies etiam hoc modo paratas: \mathcal{R} terebinthina lota in aqua plantag. \mathfrak{z} j. pul. glycyrrhizae, amygd. boli arm. ana \mathfrak{z} j. trochisc. alkachengi \mathfrak{z} ss. misce, fiant pil. ad modum ciceris. Hoc quoque decoctum insequens cepit: \mathcal{R} glycyrr. rasa \mathfrak{z} j. rad. alihae \mathfrak{z} ss. fumarie, absinthii Romani ana m. j. flor. ros. rub. p. j. sem. plantag. pap. albi sem. quatuor frigid. maiorum ana \mathfrak{z} j. ss. sem. agnicasti \mathfrak{z} j. gran. alkachengi num. v. hordei mundati p. j. fiat omnium decoctio in aqua communi pro \mathfrak{t} b. j. ss. colatura adde mellis ros. colati \mathfrak{z} iij. misce. Eoque ebibito, sumebat omni mane bis in die ad magnitudinem castaneae ex hoc condito: \mathcal{R} conseru. ros. antiquae conserua flor. nenuph. albor. ana \mathfrak{z} j. trochisc. alkachengi sine opio \mathfrak{z} j. ss. cum syr. myrino, & melle rosaceo q. s. fiat ad modum cendri. Etiam hoc aliquando iniecit cum syringa per penem, cum ardore urinae vno tempore magis quam altero detineretur: \mathcal{R} aquae plantag. lactis bubuli ana \mathfrak{t} b. ss. mellis ros. colati \mathfrak{z} j. misce. Postea & has pilulas tribus vicibus capiebat: \mathcal{R} mummia, terebinthina lota in aqua plantag. boli arm. veri, trochisc. alkachengi ana \mathfrak{z} ss. gummi tragac. \mathfrak{z} j. succi liqui. \mathfrak{z} j. ss. terebinthina super laminam ferream tosta, puluerisata, aliisque adiectis, cum aqua equiset. fiant pilulae xv. Et adhuc has subsequentes texies cepit: \mathcal{R} mummia, boli arm. veri trochisc. alkach. gummi tragac. succi glycyrrhizae ana \mathfrak{z} ss. cum aqua equiset. fiant pilulae xv. Et sic magno cum meo honore, cum Alcmariae circa duos menses apud amicos suos mansisset, & quotidie illum inuississem, intra duos menses ab ulceratione & dolore, & urinae ardore perfecte curatus fuit. Sed, quod pene omiseram, in fine curationis pro cicatrice inducenda & consolidatione, etiam sumit mane singulis diebus ad quinque pluresue dies \mathfrak{z} ss. boli armeni veri, cum cyatho vno lactis vaccini recenter mulcti. Hoc autem erat vnum ex arcanis praceptoris mei Elidei, qui hospitali Vitae dicto Bononiae praeerat, quo in pauperibus pro renum ulceratione curanda utebatur, quod & vlcus repurgat, & simul consolidat. Quo cum quinquies, vel circiter sumisset, vlcus probe tandem consolidatum est, optima victus ratione obseruata, in praecedente obseruatione descripta.

S C H O L I A.

Hoc malum curatur medicamentis detergentibus, deinde resiccantibus, sed difficilis curationis est (ut diximus) ob continuum urinae transcurum.

5

6

7

Curatio.

transitum. Si sine inflammatione & siti facilius curatur; sed presente inflammatione valde difficile. Ea autem perdurante, utilis est sanguinis missio e poplite vel talo, vel ex iecoraria, si totius repletio corporis adsit. Deinde exhibenda sunt ea, quæ detergunt citra calfactionem, *ut serum lactis, aut capra, cum Zacccharo rosa. e. aut pauco melle.* Si febris non adsit, lac omne dari potest; si febris adsit, nequaquam, *ut Hippoc. in aphorismis docuit.* Pro deterfione, *ut ante dictum est*, prodest aqua mulla, ubi vis non fuerit ex vitiosis succis & mordacibus ortum. Victum commodum, & vitæ institutum præscripsimus. Vbi vero etiam dictis acribus, & mordacibus humoribus vlcus renum ortum habeat, ab eorundem humorum purgatione curatio auspicienda erit, ipsi tamen prius concoctis ac præparatis. Atque tali tantum vtendum, quod leniendo soluat veluti est *manna zacccharum viol. syr. ex pluribus infus. ros. diasebesen, & similia;* & præcipue confert, *bolum cassia bus in mense deuorare.* Forma enim spissa medicamenti commodior est liquida, propterea, quod per ventrem descendat liquida, & minus perueniat ad renes. Valent & his syrapi ex iis parati, quæ morbus eorundem obtundunt, *ex manna, cichorio, seu hortulana endiuia portulaca, viol. nymphæa, & papau.* Postea imo statim ac confestim præbenda ea, quæ vlcera repurgant, ex quacunque etiam causa orta. Inter quæ maxime conlucunt lac, præsertim cum melle, asininum potissimum & equinum, recensque mulctum, ac calidum, animal in domum, ubi æger decumbit, deducto. Vallet ad interna alia omnia vlcera graui puri maxime amicum, corpus probe nutriens. *Atio teste.*

Confert etiam aquæ mullæ aquosa potio; nec non cremor ptisanæ cum modico melle, *inquit Alexandr.* Aut fœæ ingræci decoctum, cum melle, seu cucumeris semen cum passo (*ut voluit Paulus*) vel maluarum, seu cucumeris aut melonum semen, cum eadem aqua mulla, aut adianthi, equiseti, seu graminis decocto: vel paratum ex hordeo cum corticibus torrefacto, *andiantho, glycyrrhizæ radice ad 3. j. vel iij. cum emuls. semine melonum & cucumeris.* Et pastillus confectus ex melonib. cucumer. semine maluarum, & haliacabæ, cum abrasa radice glycyrrhizæ, ac tragacanth. ac vna passa, & zacccharo: Vnumque vel duos ex iis vice qualibet propinabimus, cum decocto supraddicto, seu cum mulla aquosa; adiectis iis, quæ urinam leniter ducunt. Etenim a situ & figura partium indicatione sumta, in renum & vlicæ vitis, nedum mel ipsum, sed etiam eorum, quæ urinas mouent, quidpiam vlcera medicamentis misceri oportet, *ex Galen. 4. method. medendi.* Paulus eis, qui per urinam pus reddunt, bolum armen præbet, aut ferularum combustarum cinerem, quantum tribus digitis comprehendi potest, ex passo. Huius cuiuslibet dari potest 3. j. cum mulla, aut lacte, potissimum ubi munda fuerint vlcera: quod inde tribi palam fiet, si neque tectorum vlcera obduca cum urinis excretum appareat, neque etiam pus excretum sit feculentum, sed subalbidum, læue, &

æquale, & paucum, *ex Aetii auctoritate.* Hoc enim tempore (*ut recte etiam admonet Altimarus*) pro his, quæ urinam ciunt, quæ exsiccant, astringunt, ac cogunt, tum alimenta, tum medicamenta, simul atque ea, quæ conglutinant, adhiberi debent: quale illud est apud Donatum, exsicans, conglutinans, astringens, & dolorem sedans. Excipit *vna passa physticorum, pinei fructus amygdalarum dulcium torrefactarum ana 3. ss. seminis althææ haliacæ ana 3. j. seminis lactuca hyoscyami ana 3. ss. amydi, tragacanthi ana 3. j. radice dulcis 3. j. seminis melonum, cucumeris ana 3. ij. boli armeni, seu cineris ferularum combustarum 3. j. zaccchari dissoluti in aqua ros. & capill. Ven. q. s. p. in morsulis.* Ad inueterata autem vlcera, ea pharmaca assumenda, quæ ad exulceratam vesicam describentur. Extrinsecus quoque renes exsiccare ac roborare oportet vnguentis, ceratis, cataplasmate, aut emplastro, *ex oleo myrtino, cotoneorum, rosaceo, ac mastichino, polygoni, supplantaginis succo, mastiche, iburis corticæ, bolo armeno, santalis, hordeacea seu fabacea farina ouorum albumine, cera & aceto similibusque paratis* subinde quoque adiunctu medicamentis simul refrigerantibus, (maxime si cum inflammatione vlcus sit) & exsiccantibus in hunc vel similem modum. *℞. succi plantaginis solani ana 3. iij. olei rosacei, omphacini 3. ij. aceti 3. j. lixa g. tenuissim. pulueris 3. j. ss. cerussæ oia 3. ss. iuncta subtilissimo puluerisfata 3. j. sanguin. dracon. 3. j. pulueris ferulæ puluerisfata, & reducantur ad formam nutriti.* Vngantur renes, siue cum inflammatione sit vlcus, siue absque inflammatione.

OBSERVATIO XXXIX.

De ulceratione renum in quodam iuvene, cum afflitate aliquando lotium red-dente.

Iuuenis prope urbem Delphensem habitans, aliquo tempore pus minxerat, cum renum dolore. Hic anno 1, 69. 26. Iunii causa consultandi me accessit. Atq; hoc apozema pro deterfione propinabam: *℞. radice feniculi, apii, petroselin. aluæ, glycyrrhizæ radice ana 3. ss. foliorum maluæ m. j. charifolii, agrimon. bitonica, capill. Ven. polytrichi ana m. j. semin. 4. frigid. maior. semin. feniculi, anisi, petroselin. ana 3. j. granor. alkachengi nume. v. cichor. rub. 3. j. horæi mundat. p. j. coquantur in aqua communis pro 3. j. col. adde syr. ex infus. ros. de byzantiis, sine aceto, syr. capill. Ven. ana 3. j. misce, omni mane cyathum vnum capiebat.* Sexto Iulii die iterum cum lotio me accessit, quod & purulentum erat, & valde foetebat, dolore in lumbis hærente. Bolum itaque hunc deuorauit: *℞. cass. recens tract. 3. x. pul. seminis anisi 3. ss. pul. trochisc. alkachengi sine opio 3. ss. zaccch. canat. albisimo asperso fiat. bonus.* Post tres dies iterum redeunt impero, ut quotidie tres pil. sequentes sumat: *℞. cerebinth. tota in aqua agrim. 3. j. torref. parum, & cum suc. & pul. glycyrrhizæ pul. x. ij.* Mox & cochlear vnum abso-bebat iij. upi sequentis post pilulas assumtas: *℞. syr. ex multis infus. ros. 3. j. syr. viol. de byzantiis sine aceto ana 3. ss. misce.* Decimonono Iulii rediens, Delphis cubiculum conduxit, ut perfecte sanari posset; &

10
Quæ exsic-
cant, & con-
glutinant,
quando cō-
petunt.

11

gans me-
mentū.

a vlcera
ergant.

cum non solum in lumbis, sed etiam in vterib.
ad vesicam usque & ventrem doleret, neque pro-
be alium deponeret, hoc decoctum præscripsi-
mus: *℞. parietaria, malua, capill. Ven. fumarie ana*
2 *m. j. sem. anisi ℥ j. ℔ semin. quatuor frigid. maiorum*
ana ℥ j. foliorum sena ℥ ℔. rhab selecti ℥ j. ℔. schœ-
nanthi ℔ ℔. granor. alkachengi cum vesiculis num. v.
glycyrrhiz. rase. passul. enucleatarum ana ℥ ℔. hordii
mundati p. j. coquantur in aqua comuni pro ℥ ix. Post-
quam per noctem steterint infusa; colaturæ forti-
ter expressæ addendo syr. ex infus. ros. ℥ ij. syr. de ci-
chor. Nicoli, cum rhab. ℥ j. misce. pro iij. dosibus matu-
tinis. liliq; quotidie alium commode deponebat,
& sordes vna cum lotio exhibant. Vngu. vero rola-
to ad renum roborationem & calorem lumbos
inungebat. Rursus 28. Iulii hoc apozema descri-
ptum, ad sordes & purulentiam detergendam: ℞
rad. petroselin. fœnicul. malua, glycyrr. ana ℥ ℔. chare-
folii, parietaria (lotium enim difficulter subinde
reddebat) malua, capill. Ven. ana m. j. flor. chamomil-
la (ob dolorem) p. j. sem. quatuor frigid. maiorum
ana ℥ j. granor. alkachengi num. vij. cicerum rub. ℥ ij.
coquantur in aqua communi pro ℔. j. adde col. syr. ex
infus. ros. mellis ros. colati ana ℥ j. ℔. misce pro iij. dosib.
3 *15. Augusti, cum alius rursum resisteret, duab. vi-*
cibus tempore matutino hanc potionem ebibit:
℞. pariet. charref. agrim. betonic. malu. viol. hord. non-
excortic. ana m. ℔. capill. Ven. p. j. sem. anisi fœnic. ana
℥ j. ℔ sem. 4. frig. maior. sem. lact. sem. pap. ana ℥ ℔. fol.
senæ ℥ vj. rhab selecti ℥ j. ℔. (erat biliosus sine febre)
glycyrr. ras. ℥ ℔. iuiub. sebest. ana num. vij. granor. al-
kach. nu. v. vuar. ab arillis repur. ℥ vj. schœnan. ℔ j. fiat
decoct. in aqua com. pro ℥ viij. stent supra herb. per noct.
& fortiss. express. adde syr. ex infus. ros. sy. viol. mell. ros.
col. ana ℥ ℔. mis. Et alium optime excreuit, cum ma-
gno iuuamine. At 19. Aug. adhuc sordes & purulen-
tiam, vna cum difficultate mingenti, sequens a-
pozema præscriptum est: ℞. parietar. agrimon. be-
ton. malu. ana m. ℔. rad. alib. ℥ ℔. cherefol. m. ℔. hord.
com. p. j. sem. petros. apii. fœni. ana ℥ j. ℔. sem. 4. frig.
maior. ana ℥ j. rad. ononid. ℥ ij. (nam semel in lotio
arenulas rubras inspexeram, infundo matulæ re-
sidentes) gly. yr. rase ℥ vj. gran. alkachenchi num. vij.
cic. rub. ℥ ij. sem. mal. ℥ ij. coq. in aqua comm. pro ℥ ix.
vel v ij. adde syr. de byzant. sine acet. sy. ex infus. ros.
ana ℥ j. mis. pro iij. dos. 27. August. denuo & hoc
præscriptum est: ℞. agrim. beto. pariet. malu. ana m.
℔. sem. anisi. aneth. ana ℥ j. sem. petros. cucum. melon.
ana ℥ j. gran. alkach. num. v. coq. in aqua comm. pro ℥
vij. ol. addi syr. viol. de byz. an. sine acet. ex infus. ros.
4 *ana ℥ ℔ misce pro duab. dosibus. 29. August. alio rur-*
sus restricta, hæc potio propinata est: ℞. parietar-
ia, malua, agrimonia, capill. Ven. ana m. ℔. sem. anisi.
℥ j. vuar. pass. enucleat. ℥ ℔ sem. 4. frig. maior. ana ℥ j.
liq. ras. ℥ j. bulliant in aqua commun. & in ℥ iij. in-
funde sena ℥ ij. ℔. rhab. elect. ℥ j. ℔. schœnanthi ℔ ℔ per
noctem facta prius leu. bullit. & fortissima expressio-
ne mane adde syr. ex infus. ros. comm. ℥ ℔. misce. Qua
potione quinquies alium deposuit. Excrementa
valde muccosa, & in fine videbantur quasi san-
guinolenta. Tamen multo melius a purgatione
cœpit habere; & vrina postea purior euasit, ita ut

nō amplius sordes in lotio appareret. Tūc iussi, ut
omni mane sumeret lac ouillum recens multum
adhuc calidum cum melle rosaceo, postea etiam
adiecto bolo armen. & vncia vna rad. consolidæ
maioris incocta; fuitque consolidatum vlcus, ita
ut amplius nulla purulentia in lotio visa fuerit: in-
ungebat lumbos vnguento rosato, & tandem cu-
ratus fuit.

S C H O L I A

IN his vlceribus conueniunt, quæ alium molli-
endo humores temperant & auertunt; quem-
admodum cassia, manna, ut diximus, & pruna
memphitica & nostratia, ac syr. ex infus. ros. pal-
lid. in materia salsa & acuta; serum caprinum cum
epithymi decocto, & syr. ex succo fumarie, aqua
hordeacea, & aqua vesicariæ. Et vbi febris adest,
lacte ouillo vtendum. Hic syr. commendatur a
Rondeletio: *℞. rad. bis malua, consolid. maior. ana*
℥ ij. glycyrr. ras. ℥ ℔. corticis cucurbitæ ℥ ij. agrimon.
ceterach. plantag. ana m. j. sebesten paria xx. semi. ani-
si ℥ ij. sem. alkachengi & bis malua ana ℥ j. sem. pap.
albi ℥ ij. aut cap. pap. ℥ ij. flor. trium cord. ana p. ij. ros.
p. ℔. fiat decoctio in aqua hordei ℔. ij. dissol. zaeck. q. s.
fiat syr. Omnibus modis confert, si omni mane ca-
piantur ij. cochlearia argentea. Sed in hoc iuvene,
quoniam vna lotium reddebat cum difficultate,
decoctis adiecimus leuia quædam diuretica. At
postea ad lac ouillum & consolidantia in fine de-
uenimus. Renum vlcera sanat semen maluæ, vel
alihazæ, cum mulsapolum: addito semine fœniculi,
apii, aut schœnantho, vel aqua polytrichi, vel hordea-
cea, si lenia sint: vetusta vehementioribus indigent
& putrida; ut radices iridis tusæ cū mulsæ, & mar-
rubium & hyssopū cum polytrichi decocto pro-
sunt. Ad serpentia vlcera ea commendantur, quæ
in dysenteria valere scripsimus. Sed & phagedæ-
nici & hoc emplastrum vtile est, ex erui farinâ
hypocystide & vino austero. Et quæ difficiliora
sunt, iuuantur emplastro ex hordei farina, thuris
manna cum oleo cyprino aut lentiscino; nam ser-
pere vlcus nō sinunt. Sed de his latius, cum de ve-
sicæ vlceribus dicemus, ac sequenti libro. Cum
itaque omnes renum affectus & symptomata ab-
soluerimus, tempus est, ut huic libro finem impo-
namus; & ad vesicæ vitia transeamus.

FINIS LIBRI XXIV.

LIBER VIGESIMVS QVIN-
TVS, DE VESICÆ MALIS
ac affectibus.

OBSERVATIO I.

De stranguria, seu vrina stillicidio.



Maria, soror vxoris Adriani Nannij, præ-
toris Alcmarij, mulier admodum lu-
sciosa, anno 1546. Maiomense, stran-
guria laborabat, & vrinæ stillicidio; nā vehementi
dolore ac vrinæ ardore lotium guttatim stillabat,
ob acrimoniam irritatum. At paucis his remediis
& ab

& ab ardore urinae, & stillicidio fuit liberata, inter paucos etiam dies. Hoc quidem decoctum primo præscriptum fuit: *Radici malua glycyrrhiz. recentis rasa ana ℥ j. sem. quatuor frig. maiorum ℥ ℔. seminis hyoscyami albi ℥ j. hordei mundati p. j. fiat decoctio in aqua communi pro ℔. j. colatura adde syrup. violat. mellis rosacci colati. syr. de glycyrrh. & ana ℥ j. addendo trochisc. alkachengi sine opio ℥ ℔. misce, omni mane capiebat cyathum vnum.* Deinde hunc bolum deuorauit: *℥. cassiæ recens extracta ℥ j. cum saccharo candi dicto asperso, fiat bolus.* Bis excreuit satis copiose: & ilico iuuamen sensit, tam in mingendo, quam in ardore urinae, qui magna ex parte etiam mitigabatur. Propinaui & sequens decoctum: *℥. malua, portulaca, lactuca ana m. ij. coquantur in aqua communi pro ℔. j. colatura adde syr. nenupharis, papaueris albi, mīna coroneorū ana ℥ j. misce, pro tribus dosibus.* His præfidiis stranguria ac ardor urinae ex materia acri cessarunt. Hæc tamen cum ventriculum debiliorem haberet, & vrina aliquo modo tincta adhuc esset, absque febre, ex hac mixtura sumebat: *℥. conservæ violarū, rosacea huius anni ana ℥ j.* Ventriculum inunximus oleo mastichino. Sanitate recuperata, deinde optime se habuit.

S C H O L I A.

3 *Vitia vesicæ* plura sunt, de quibus in hoc libro sermonem habituri sumus. Nam ipsa vesica præter habitudinem, malamque compositionem, etiam vrina calculo apposita, suppressa, vel quod ipsa nimium sit angusta, vel nimium foras intumescat, hæc ipsa & vastitate damnatur, nam & exitialiter vulneratur, secundum Hippocratem, unde inguina dolent: nam aut vrina per vulnus exit, aut languis emingitur, stomachusque idem afficitur, bilem euomunt aut misere singultiant, frigidusque subsequitur sudor, ex quo & mors. Vesica præterea inflammatur, exulceratur. Sequuntur & urinae tormina, angulosi vel asperi lapidis iniuria, stillicidia, incontinentia, difficultas, ardor urinae, eiusque retentio: sed & sanguis intus concretus vesicam plurimum afficit. Damnatur & vrina, cum grauitur olet, si arenosa nimium, si purulenta, tortuosaque sit. De his omnibus agemus. Intemperie frigida tum calida afficitur: frigidiorum indicant, vrina alba, viscosa, mucosa, fursuracea, intus veluti squamulis discurrentibus, quæ guttatim destillat, ac ex interuallis. At calidiorum ostendunt, urinae acris mordacitas, cum dolore, quæ & tenuis est. Auxiliantur, quæ & de renibus dicta sunt. Calidiori tamen (ut experimēto constat) psylli mucillagine subuenimus. Infunditur tamen vtiliter rosaceum cum camphoræ exiguo. In potu frigida profunt, in cibo autem portulaca, cucurbita, ac cucuminis, cum melopepone: medentur ex aqua frigida spodii portiones maturinae, æstate præsertim, lac item asininum, inunguntur extrinsecus, & valet rosaceum, violaceum, ac cucurbitinum oleum, cum camphoræ. Frigiditatem vero vesicæ emendat nardinum aromaticum, oleum anethinum, illitum, purgami-

numque in cibo diuretica calida vesicam exalfaciunt. Emplastra quoque renum affectibus quærenda sunt, ne idem sæpius dicatur. De vesica parua meminit Galenus in arte parua cap. 72. inquit: Sic & cuiusdam vesicam contigit intueri, ita exposita ac parua, ut si quando urinam tardius excerneret, tumor quidam circumscriptus manifeste cerneretur: non tamen aliud ex interioribus quicquam mihi unquam manifestum præbuit indicium. Tentare autem oportet, quam maxime fieri potest, virtutem ipsorum ac vitium, etsi non certissima scientia, artificiosa saltem coniectura comprehendere. Sed tunc ut sunt, magna vel parua maneant oportet; quamquam in quibusdam, ut idem testis est Galenus cap. 87. eiusdem libri, quæ naturalem magnitudinem partes exsuperant, quiete ac commoda alligatione minores redduntur: augentur autem & naturali motu, & frictione moderata, & quibuscumque aliis plus sanguinis attrahere natura aptis. Licet partes ex semine ortæ deficientes propemodum corrigere impossibile existit: ex sanguine quidem corrigi possunt. Sed his omiſſis, quoniam de omnibus vitiis vesicæ ordine quodam dicturi sumus, sumamus initium ab ipsa stranguria seu urinae stillicidio. Cum autem vrina sit, proprie loquendo (ut diximus cap. 1. lib. 1. nostri contra vromantes) sanguinis superfluitas, in magna vena delata per renes & vasa urinaria in vesicam, ut & Galenus lib. 5. de usu partium inquit: reliqua autem adhuc subtilis & aquosa superfluitas, (quam appellamus & gov, hoc est, urinam) ut quidem discernatur, renes operata natura, prope hepatis posuit: ut autem probe excernatur, susceptorium quidem primo velut lagenam aliquā creauit vesicam: in fine autem vesicæ musculus custodem intempestiua fluxionis. Et sic vesicæ munus est statuto tempore, cum scilicet ratio iusserit, foras susceptum lotium propellere. Et propria eius actio est 6. de locis affectis *urina excretio*. Verum hic quaeritur a medicis, num tale excrementum, nempe lotium, vesica attrahat, an a renibus duntaxat ad ipsum excernatur? Nam Galenus 6. de locis affectis, vesicam non trahere a renibus vult, sed renes per vreteres excernendo in vesicam mittere. Libro 5. de viu partium appositum sentis. Sed respondendum, vesicam non pro sui nutrimento lotium attrahere, sed ut instrumentum a natura fabricatū, ipsum recipiat, ac statuto tempore excernat. Et ita sæpe numero contigit, ut eiusdem vesicæ functio multifariam oblectatur, ipsa aut propriis, aut communibus affectibus præter naturam offensa, de quibus tempestiuum est, ut dicamus; ab eis exordientes, qui ipsi soli proprii sunt, ut est *παρρηξία*, id est, stillicidium urinae: *δυσουρία* id est, difficultas urinae, & *ιχθυεμία* id est, supressio urinae, quæ sunt symptomata meiendi; quamuis quidam, præsertim de stranguria & dysuria, sub vno capite tractare consueuerint, & has affectiones seu symptomata inter se confundant; quamuis diuersæ sint: & ideo nos de vnaquaque seorsim verba facturi sumus, sumto initio ab ipsa

stranguria. Nam hoc modo inter se differunt, cū actio ipsius vesicæ proprie in stranguria sit corrupta; in dysuria diminuta: in ischuria omnino ablata. Stranguriam itaque, (*de qua primo sermo est*) urinæ stillicidium nuncupamus, quum urina stillatim guttatimque redditur: id alias quodam conata, sed dolore nullo: alias vehementi dolore & irritatione fit. Quæ nullo dolore fit, eadem causas atque ischuria obtinet, (*ut ait Fernelius*) sed sine leuiore, quod sit diminuta quædā ischuria: quæ cum dolore acri, tum dysuriæ, tum ischuriæ permixtas causas habet: quod enim guttatim stillat, ischuriæ; quod vero ardeat ac stimulet, dysuriæ rationem sumit: Quod vero urinæ stillicidium significet urinæ stillatim excretionem, nomen ipsum ostendit, *ut inquit Galenus commen. aph. 45. 7. lib.* Eandem sententiam confirmavit Aetius *cap. 19. lib. 11.* cum dixit, *Stranguria appellatur, cum paulatim & guttatim urina destillant, & assiduam ad mingendum irritationem faciunt.* At quod solius vesicæ proprium symptoma sit urinæ stillicidium præter id, quod Galenus scriptum reliquerit *6. de locis affectis*, ipsius propriæ actionis lætio ostendit, quæ est urinæ excretio. Immoderatus enim excretrix facultas in hac affectione mouetur: quanquam eadem vesica non perpetuo proprio ac primario affectu laboret, sed interim ex accidenti, ac per consensum pro diuersitate causarum, ex quibus tale vitium excitatur, *ut postea dicemus.* Porro quod affectio hæc symptoma sit in genere excretorum immodice, deprauatum motum excretoris vesicæ facultatis insequens, *ex eodem Galeno liquet lib. de different. & 3. de causis sympt.* Excitatur autem excretoria vis ad immodicum motum, quoties retentiuua facultas vel ex multitudine excrementorum acrimoniaue, vel ex propria imbecillitate laborat, *ut eodem 3. de causis sympt. scriptum est.* Quapropter non bre duas causas in vniuersum stillicidii urinæ Galenus statuit *aphorism. 10. 3. lib. 58. 5. & 48. 7.* Quarum vna eiuſdem urinæ acritudo existit: reliqua vero potentia retentiuæ, quæ est in vesica, imbecillitas. Assiduæ etenim excretiones fiunt, vel propter imbecillitatem, vel demorsum, *eodem auctore 3. de causis sympt.* Igitur urinæ stillicidium sit vitio contentricis; hoc autem ei aduenit, eo, quod nimis proritur: proritatio vero euenit aut urinæ ratione, quæ mordax est; aut vesicæ ratione, quæ cum sit imbecilla, etsi exiguam urinam continere nequit, sed statim ad pellendum irritatur: vel male affecta cum sit, ut vlcera mordetur: nisi placeat hoc caput (*ut quidam volunt*) ad debilitatem reducere. Vel ita potius dicas. *Fit stillicidium proritata expultrice; vel ex qualitate urinae, vel ex situ vesicæ, idque quia exulcerata ab omni, vel imbecilla ab exigua quantitate grauatur, ut dictum est prius: imbecilla vero sit, intemperie, tumore præter naturam, lapide.* Quæ igitur ob mordacitatem euenit, aliquando, teste Galeno, non est vesicæ affectio: quoniam ab aliis partibus hæc mordacitas gigni potest: non ita tamen intelligendum, quin afficiatur vesica; imo dolet ex affectu proprio, id

est, ex morſu; sed tamen non est in ea affectus perdurans; non enim aut vlcus, aut intemperies est in ea, ut in secundo causæ modo, ubi ob vlcus, vel debilitatem contractam ab intemperie, aut morbo instrumentali urinam retinere, etsi exiguam, nequit. Sed hæc multo clariora exemplis subsequentibus euadent.

OBSERVATIO II.

De stranguria ex recenti ceruisia orta.

Quum multæ causæ sint, tam internæ, quam externæ, stillicidium urinæ inferentes, inter præcipuas externas causas, præter nimium calidæ & diuretica (*quorum continuus vsus, ut lithontripsi, & elect. ducis & aromatum, hanc affectionem inferre solet*) etiam recenseri potest potus aquæ frigida, aut fessio in eadem, & similia frigida; maxime præ ceteris ceruisia recens continuo ebibita, id plerumque in multis facere solet, ut experientia quotidiana videmus. Id malum mihi quoque ab ineunte ætate, ex ceruisiæ potu recentis sæpe contingere solet. Nam ex Italia & Gallia in patriam reuersus, statim, si ceruisiam biberem, longo tempore consuetus vino uti, in stranguriam cum urinæ ardore incidebam. Adeo cum postea uxorem duxissem, & apud socrum habitarem, quæ superstitioni dedita aliquibus diebus in quadragesima vinum non bibebat, ne illam offenderem in sua superstitione, iubebam per uxorem, ut in meo poculo, in quo ceruisia erat, aliquid vini Rhénani immisceret; hoc enim modo bibens, urinæ stillicidium auertebam. Quod si in pagis degens, ubi vinum non esset, apud ægros, cogebar ceruisiam bibere recentem, sumta nuce myristica, ab hoc malo leuabat. Cum ex ceruisia recenti stranguriam quidam incurrisent, solo seuo candelæ umbilico inuncto, se ipsos curabant. Alii solo cochleari oxymelitis epoto vel absorpto, id malum a se depellebant. Sed & foliorum ribes nigræ odor, multoque magis eorundem decoctum id vitium emendare expertum habemus. Scuti mihi vinum Rhénanum profuit ad stranguriam, propter recentem ceruisiam illatam: ita apud Dodonæum *capite quadragesimo octauo suarum Observationum*, seni obfuit annorum octoginta, qui cum Rhénanum biberet in exigua quantitate, nec copiose, mox illi urinæ stillicidium valde molestum fuit. Ab aliis vinis, ut Gallico, Hispanico non offendebar. Tandem huic profuit ex ouorum testis in cinerem reductis, & vino Rhénano permixtis, lixiuium. Istud enim vinum, cum sit tenuium partium, citissime ad vesicam descendit, & facile crudos viscidosque humores secum ducit: quales in viis urinariis hærentes stillicidii urinæ causas esse potuerunt; quibus deinde per lixiuium incisis & expurgatis, liberior factus est urinæ descensus. Hic vinum e contra ceruisiam illam crassam attenuans iuuamento fuit.

SCHOLIA.

Vtrum ceruisia recens suis fecibus acrimoniā inferat vesicæ, aut sua crassitie & frigiditate vesicam offendant, cum vinum & mulceta nux, aliqua aromata id malum tollant vel mitigent,

7
Stranguria
quid.

Quid per
urina stillici-
dium intel-
ligendum sit.

Quod vesica
in eo affi-
ciatur.

Quis affe-
ctus præter
naturam sit
urinae stillicidium.

8
Dua causa
præcipua.

3
Causa strangu-
ria.

mitigent, id quidem considerandum. Nam & ex acrimonia ipsa aliquando, nedū ex humoribus acerbis, qui in venis existunt, & per renes, & vesicam expurgantur, fieri posset stillicidium: sed interim ob renum vitium, præsertim ipsis purulentis existentibus oboriri poterit, Hippocrate auctore, *præcitato aphorism. 58. lib. 5.* Fit etiam, ut *Rondeletius annotavit*, cum meatus urinae constrictus est, & non potest simul urinam reicere. Constringitur autem, cum urinae aut puris acrimoniam sentit. Tunc enim non solum hæc pars, sed & reliquæ concidunt in sese & contrahuntur, & hoc cum vlcus est in pene. Fit etiam stranguria ob urinae acrimoniam, quæ etsi pauca sit in vesica, non potest quiescere, donec multa aceruata sit. Acrimonia autem prouenit, vel a puris putredine, vel ob admisionem pituitæ salsæ. Has causas distinguere oportet, ut unicuique remedia conueniant. Id vero ita interstinguere valebis. Nam si ex humoribus intra vasa redundantibus acrioribus proritetur affectus hic, id urinae ipsæ ostendent, & totus habitus ad acriorem, biliosiorremque erit conuersus, *Alexandro teste cap. 6. lib. 9.* Si vero ob purulentos renes, aut aliud eorum vitium, acriores fient urinae, ex his, quæ in præcedentibus conscripsimus, pro renum affectuum dignotione perdisces. Nec minus, si ex alia quapiam parte mordaces succi, aut pus cum urina excernantur, & propterea urina acrior fiat, promte dignoscere valebis ex propriis indicibus talium affectuum, ac partium affectarum. Vbi acres humores, vel ad sint vel transfluant, aut aliquantisper hæreant, ardorem simul & dolorem, dum guttatim urina emittitur, sentiunt. Quod est contra illos, qui aiunt, in dysuria semper dolorem fieri, ut in lienteria; nunquam in stranguria. Sicque hac sola differentia dysuriam differre a stranguria, siue guttatim emittatur, siue e contra. In quo & sibi & experientia repugnat, ut qui alio loco scribunt, straguriam fieri eo modo, quo dysenteriam, ab acri humore confertim ad vesicam irruente, & alibi ardorem urinae adiungant, imo producant *aphorism. 55. lib. 5.* ubi Hippocrates ait, *stranguriam fieri a magna inflammatione uteri, aut intestini, aut renibus purulentis.* Quo pacto igitur hic dolor ad stranguriam nihil pertinebit? Ex quibus omnibus causis, vesica ipsa non proprio affectu laborabit, sed urinae vitio mortuum sentiens, ad excretionem excitabitur. Et propterea urinae stillicidium, non eiusdem proprius dicetur affectus sed symptoma, ut *Galenus refert eodem 6. de locis affectis.* Possunt insuper & urinarum acritudines fieri a quibusdam intemperaturis, & præcipue ab ea, quæ est secundum caliditatem, tum ab ea, quæ est secundum caliditatem & humiditatem, & tertio ab ea, quæ est secundum caliditatem & siccitatem, auctore *Galenocomm. aphorism. 16. lib. 3.* Quo loco animaduertant studiosi, codicem (verisimiliter quoque *Donatus*) tum Græcum, tum Latinum esse deprauatum, tum dicat, *Tertio ab ea, quæ est secundum humiditatem*, quod cum aperte fallum sit: castigandus

locuserit; ut sit, *Tertio ab ea, quæ est secundum caliditatem & siccitatem*; vel, *ab ea, quæ est secundum siccitatem*; a qua immodica tamen existente, in eodem commento dixerat, fieri posse urinae stillicidium. Id enim *Galeniphra*sis, ac ratio ostendit. Verum ubi neque vna iam dictarum causarum affuerit, vesicam ipsam proprie ac primario affectam esse, propter eius imbecillitatem, coniiciendum erit. Imbecillitas autem, aut propter eiusdem intemperaturam aliquam, seu tumorem præternaturam aut vlcus, contingit, ut in *præcitatis aphorism. a Galeno decretum est, & 6. de locis affectis.* Omnis autem immodica intemperatura imbecillam reddere vesicam potest; præsertim autem frigida, eodem *Galenoteste præcit. aphorism. 48. 7. lib. 6. de locis affectis.* Tunc enim plane grauari videtur, vel paucio admodum contento in ipsa humore, ut *idem Galenus inquit.* Ceterum cum ab intemperie vesica imbecillior redditur, urina magis alba apparebit, & ea, quæ præcesserunt, frigidiora fuere; tum victus, tum balnea, similiter temperamentum & ætas, ac reliquæ, id promte indicabunt. Nec admodum difficile erit percipere, si ex quapiam alia immoderata intemperie (licet raro id eueniat) eadem vesica imbecillior facta fuerit. Similiter si ob instrumentales affectus eiusdem vesicæ (ut & *Donatus quoque, recte annotauit*) talis fuerit orta imbecillitas, cum & ipsi imbecillitatem interdum inducere possint, ex *sententia eiusdem Galeni eodem 6. de locis affectis*, haud ægre perdiscere valebis, tum ex te ipso, tum ex his, quæ infra dicemus; velut si inflammatio, erysipelas, aut abscessus, aliquid tale in ea fuerint orta, aut etiam vlcus aliquod. Interim cum & vesica per compatiendi rationem patitur, ut diximus, utero videlicet aut recto intestino inflammatis, urinae stillicidium ab his excitatur. Ratione enim vicinitatis pati vesicam est necessarium, ut quæ intemperaturam participat, & inflammationem, & præterea, si prematur, atque angustetur & tumoribus præternaturam, qui in illis existunt, afficiatur, *Hippocrate & Galenotestibus, iam citato aphorism. 58. 5. lib.* Idque ex propriis indicibus dictarum partium inflammatione laborantium percipiemus, ut exempla infra scripta palam ostendent.

OBSERVATIO III.

De quibusdam ex variis causis stranguria laborantibus, & quibus remediis fue-
rint curati.

HVgo Iacobus, pharmacopola Delphensis, cum stranguria cum ardore urinae laborabat, neque multis præsidis cura. i posset, ab Antonio Harwero medico Hagano illi consultum fuit, ut brassicam rubram decoqueret cum iure veruecis: eoque iure vtens in spatio paucio puluere nucis muscatæ, a stranguria liberatus fuit. Forte ex frigidityte hoc malum contraxerat. Chirurgus Hartochius dictus, Delphensis, hoc modo stranguriam tollebat. Accipiebat *forum chamæmelis, thymæ anap. j. foliorum, senæ ʒ ij.* & decoquebat in aqua chamomillæ; huiusque expressionis cyathum propinabat. Ad causam frigidam recte valere arbitror. Verum

Iacobus Iohannis, quondam meus pharmaco-
pœus, cum aliquando stranguriam pateretur, ex
largiore potu vini, capiebat aquam rosaceam cū
albumine oui concussam, & ad medium scutellæ
ebibat; quo seipsum tum alios curabat. Senex
quidam Delphensis, cum modo dysuria, modo
stranguria & ardore urinx afficeretur, & lithoto-
mus catheterem in vesicam demississet frustra, pu-
tans lapidem in vesica esse, ex mulierculæ consilio
decoxit flores chamomillæ cum lacte bubulo; &
ita seipsum curavit. Lac ardorem mitigabat, &
flores chamomillæ lotium prouocabant. Quod
autem me stranguria laborantem ex ceruicis re-
centis potu, vinum iuuerit, ut præcedente obser-
uatione diximus, hinc factum est, quod vinum
prodest, si a causa frigida hoc vitium fuerit. Me-
deri enim traditur ab Hippocrate liberaliter po-
tum stranguriam, dysuriam; nam frigora intus
discutit, materiam concoquit & extenuat, & ven-
tum pariter dissoluit. At senem Haganum vlcus
in vesica habentem, nec detergentia, nec ardorem
mitigantia, aut alia remedia apta iuuerunt, cum
vsq; ad mortem illud malū perseuerauerit. Caus-
sam litius in scholio explicabimus. Viduæ quoq;
in utero vlcus habenti, stranguria perpetua vsque
ad mortem perduravit.

S C H O L I A.

³
Prognostica. Causæ prius distinguendæ, antequam apta fiat
curatio: quæ cum prius sint amouendæ, ex iis-
dem quoque prognostica habentur, quæ etiam
ante consideranda, quam ad curationem deueni-
amus. Si enim ob urinx acrimoniam, urinx
stillicidium exordium sumat, æger assidue ad mi-
ctionem cogendus est, & plurima aqua calida dul-
cis in potu exhibenda. Nam si acre recrementum
diutius in vesica moretur, partes ipsas corrodit, &
exulcerat. *Actio teste.* Quod si senioribus talis
affectio eueniat, difficulter sanabitur, veluti &
quodlibet aliud renum & vesicæ vitium, ut Hip-
pocrati visum est aphorism. 6. lib. 6. Idque potissi-
mum fit, ubi ex frigida intemperie cum frigido-
rum humorum redundantia ortum habebit. Ti-
mor etenim, erit ut ad mortem vsque eos comite-
tur, quemadmodum & alii frigidi ac diuturni
morbi, ut liquet comment. aphorism. 40. 2. lib. Et
sic a quadraginta annis quidam difficiliorem cu-
ratu esse volunt, & a causa calida in senibus peri-
culosior: in iuuenibus a causa frigida, iuxta
commentum illius aphorism. 34. lib. 3. In morbis
minus periclitantur, quorum naturæ, &c. cum ve-
hemens dispositio causa sit. Attamen senibus
magis frigidis, & vesica frigida existente, multo
periculosior, cum & tales fere omnes, iuxta eun-
dem Galenum, commoriantur, quoniam earum
opus indefinens est, quiete autem opus est, si quid
finari debeat; & quia superfluitas acris apta irri-
tare, siue vlcus, siue inflammatio, siue aliqua alia
passio in ipsis constituit. Et ita in stranguria pro-
pter vlcus quantum ad causam calidam; vel pro-
pter debilitatem vesicæ, quantum ad frigidam,
omnium sunt difficilissimæ curationis. Et subin-
deratione vicinitatis malo diu perdurante, mor-

tem tandem inferunt, ut in Illustri quadam Do-
mina, quæ cum diu stranguria & ardore urinx
laborasset, post eius mortem vlcus in utero & re-
nibus, causam mortis præbuit. Prout autem causæ
sunt diuersæ, pro eoque methodus curationis di-
uersa est, ut diligenter causis distinctis remedia
apta inueniantur. Si enim a pure sit, vel hepatis,
vel renum, vel vesicæ, tunc detergentia medica-
menta assumenda sunt: & si in vesica adsit pus,
vel in collo eiusdem, aut in meatu penis, tunc et-
iam talia iniicienda sunt. Detergunt serum lactis
cum paucis saccharo rosaceo, decoctum hordei, & ea,
quæ de vlcere renum prius diximus, & inferius
etiam de vlcere vesicæ dicturi sumus: ad illa loca
recurrendum erit. Si igitur vitio apostomatis sub-
stillum euenierit, a talo sanguis vela cubito de-
mendus, si nimium corporis venæ turgent, & a-
postemata prius curanda: ita quoque, si abscessus
sit in causa vel vlcus. Si autem vlcus in causa sit,
optimum quoque erit, supradictis detergentibus
admiscere syrup. rosac. vel de cucurbit. maxime,
cum vlcus valde inflammatum est: nam urinam
mouent, & acrimoniam extinguunt. Si vero fer-
uens causa fuerit, semina refrigerantia prosunt,
& lactuca semen. Sin autem ex urinx acrimonia
fiat, ea est tenuis, flaua, & corpus biliosius: tunc o-
portet serosa illa & biliosa euacuare recrementa,
& ad ventrem deriuare, medicamentis extin-
guentibus flauæ bilis acrimoniam, ut sebesten,
tamarindis, prunis syrup. violat. & multis infus. &
syrupo rosaceo laxatiuo. Deinde proponemus po-
tiones vel syropos refrigerantes, & extinguentes
bilis acrimoniam; qualis est syrup. viol. de nenuph.
de cucurbit. endiuia simplic. decoctum lactuca, portu-
laca tenera, plantaginis solani. Abstinentum ab
aperientibus, & nimis detergentibus. Dari potest
in summa acrimonia syrupus iuinibinus, cum paucis
syrupo de papauere, existente magno sensu in parte.
Inunctiones refrigerantes prolunt supra renes,
ut ex oleo viol. nenuphar. unguento rosato. item cly-
steres molles & refrigerantes: si ex ariditate, etiam ex
oleis humectantibus, iuxta Galenum. Et si mor-
dax urina causa fuerit, aut salislagio cibus ac reme-
diis refrigerantibus & mollientibus mitiganda
est, & quæ ad ardorem describentur. Tum oui
candidum cum lacte muliebri, glutinosa, ac refri-
gerantia indita iuuant, nam urinx mordacitatem
deacuunt. Et si a pituita salsa, purganda erit pitui-
tosis medicamentis, & decocto hordei, & aliis le-
uiter detergentibus euacuanda. In illa causa tan-
tum conueniunt, terebinthina lecta in aqua ro-
sacea, assumpta cum syrupo violac. & de glycyrrhi-
za. In aliis causis acrimoniam potius auget,
quam minuit. Danda autem erit a ʒj. ad ʒj.
Nunc aliud exemplum curationis proferamus.

O B S E R V A T I O I V.

De stranguria cum insigni dolore.

¹
IN principio mensis Decembris anno 1575. cum
ad agnum accitus essem, in portu Delphico de-
cumbentem in reditu oborta magna tempestate,
vêtis pulsatus & imbri, agmine aqua uel largius ex
concretis

concretis effuso nubibus, pluuia madefactus, per totam noctem in scapha manere coactus fui: unde domum rediens, statim incidi quasi in pleuritidem notham, cum tanto sinistris lateris dolore, ut vix in lecto me continere potuerim: sed epota ceruisia, in qua decocti erant flores chamæmeli, etiam linteis calidis sub axillis, & loco dolenti positis, sudorem prouocabam, simul latus dolens inunguendo oleo anethino & chamæmelino, sudore emanante: & sic omnis dolor statim sedatus omnino euauit. Altero tamen die hanc purgatiunculam cepi: *℞. electuar. lenitum ℥ vj. diaphænit. ℥ j. dissolu. in decoct. pectoral. ℥ iij. addendo syr. ex succor. solut. ℥ j. misce.* Hoc medicamento, cum octies aluum deposuisssem, ab intensissimo dolore, miraculi instar, fui curatus. Dolor totum latus sinistrum occupauerat, usque ad lumbos, tum pectus procedendo. At 2. Ianuarii die, anno 1576. in febrem incidi quali continuam, per tres dies ac noctes perdurantem. Sed hoc lenituo medicamento rursus assumpto, cum sexies aluum reddidisssem, mereliquit: *℞. electuarii lenitui ℥ j. dissolu. in decoct. communis, addendo syrup. ex infusor. commun. rub. ℥ j. misce,* febre non amplius redeunte. Postea quædam stranguria mihi adhaesit, sed in principio non adeo vehemens, quam suspicabar, obortam ob ceruisiam, forte recentem sumtam in ipsa febre, cum vino ob febrem vitæ ausus non fueram. At prout vxor referebat, non erat recens, imo quatuordecim diebus in penâ reſeruata. Quare hanc stranguriam primo non magni faciens, foras exhibam: sed ea ipsa post septem dies magis incrementum cœpit, adeo ut indies augeretur, cum tanta molestia atque dolore, ut ægre nisi guttatim lotium emitterem, non sine acrimonia & ardore: ad quem mitigandum, & ut vrina melius proflueret, hoc decoctum sumsi bis in die: *℞. hordei mundat. p. j. foliorum malua, capill. Ven. nam. j. cher. folium. ℥ glycyrrh. rasa ℥ ℔. semin. quatuor frigid. maiorum. a. a ℥ j. sem. pap. alb. ℥ j. ℔. iunubar. sebesten. anan. v. granor. alkachenginum. v. j. coquantur in aqua commun. pro ℔. j. col. addendo syr. iunibini ℥ j. misce,* malum hoc modo non mitigabatur, quanquam domi manerem. Sed 20. Ianuarii die, tempore admodum frigido, in asperissima hyeme, electo vocatus ad moribundum, multis precibus coactus, cum domum redirem, ita malum increbuit, ut amplius exire non potuerim, etiam dysuria accedente. Abstinebam ob acrimoniam vrinæ a vino, solum ceruisiam bibens cum zaccharo. 24. Ianuarii sumsi bolum cassiæ ita paratum: *℞. cass. recens tracta ℥ j. diap. lenitui ℥ iij. puluer. trachis. alkachengi ℥ j. zacchar. asperso fiat bolus:* ex quo aluum quinques vel sexies deieci, acrimonia vrinæ non cessante, tanquam pudendum diuelleretur, lotio guttatim ex unte, tenesimo etiam me vexante, vesica intestinum rectum comprimente, licet aluum non deponerem. Nulla remedia iuuabant, etiam albumine oui conuulso, & cum aqua rosæ pota, & aqua rosæ cum lacte bubulo cum syr. iunibini misce, nam lacte mulieb. saepe introito. O-

mnibus his neq; aliis remediis iuuantibus, cum ne vna quidem gutta lotii exiret, capillis rigidis cum sudore madidis, tanquam erectis ob dolorem, cum maximo eiulatu lotium reddebam: & malum ita increbuit, ut nihil lotii subsequeretur. Non potui tamen animaduertere, me calculo laborare, ut nec *Guilelmus de Dalen lithotomus* amicus meus familiaris, qui me inuisebat. Interea ut parietariam siccam poculo inclusam, vel eius loco chærefolium, in poculo stricti orificii in balneo maris decoquerem consulebat, ac pectini applicarem, ut sic lotium prolectarem. Sed acrimonia vrinæ magis aucta, licet etiam consuleret, ut lemen dauci & gemmas ribes nigræ ad ℥ ℔. decoquerem in vino Rhenensi, etiam in poculo stricti orificii in balneo maris, (quo militem nobilem, tum plurimos alios, qui vrinam difficulter redderent, cum ardore, curasset) a diureticis abstinere decreui, & hoc decoctum mihi præscripsi, quod idem laudabat, & ut a syringatione abstinerem: *℞. rad. bugloss. echor. ana ℥ j. ℔. rad. althææ ℥ ℔. pariet. malu. viol. ana m. j. sem. malua. althææ dauci ana ℥ j. semin. 4. frigid. maior ana ℥ j. ℔. semin. pap. alb. ℥ j. granor. alkachenginum. v. j. hord. mund. p. j. glycyrr. ras. ℥ j. fiat decoct. in aqua commun. pro ℔. j. col. vtebar.* Nullum inde subsequutum est iuuamen, stranguria magis aucta, cum dysuria & ardore vrinæ. Cōsultum fuit a lithotomo, ut pannum intinctum lineum aqua rosæ & solani tepide membro virili inuoluerem, ad acrimoniam vrinæ tollendam, & dolorem mitigandum: quo ita increbuit stranguria cum dysuria, ut vix cochlear vnum vrinæ reddere possem, cum insigni ardore. Varia proponebantur, etiam illa, quæ superius dicta sunt in Obser. 3. præcedente. Ut stipulas fabarum in cinerē q. oq. redigerem, & cum vino Rhenan. ebiberem, & infinita alia remedia. Sed omnibus illis diureticis relictis, proponebam potius illa esse mihi cōmoda, quæ vrinæ acrimoniam tollerēt, & sic accepi modo syr. viol. modo pap. & lacte bubulo cum zacch. vtebar. Atq; eodem tempore Cornelius Ericius collega meus, cum me inuiseret, ut iisdem remediis insisterem in eum sentiebat. Vtebar & sero lactis. Rursus hoc bolo assumpto: *℞. cassiæ recens tracta ℥ j. diap. lenitui ℥ j. syr. ros. solut. ℥ j. cum sero lactis fiat potio.* Ex ea l. xies secessum habui. At stranguria & dysuria magis incrementibus, pectinem his oleis inuoxi, ad ardorem vrinæ contemperandum: *℞. olei amygd. dulc. viol. nymphaeæ, ros. ana ℥ ℔ misce.* Deinde aurum cōsiliis ac remediis postpositis, hoc fomentum mihi ipsi præscripsi: *℞. radicis althææ ℥ j. foliorum malua, violarum. althææ. florum rosarum chamæmeli ana m. j. seminis lini ℥ ℔ semin. malua ℥ j. coquantur in aqua commun. pro ℔. j. pro fomento: bis in die ter quaterue pannis laneis calide immerfis, expressisque alternatis vicibus pectinē fomentabam.* Quo remedio cœpit vrina melius effluere: non tamen sine dolore & straguria. Abstinebam a vino, postea etiam ceruisia per tres quatuorue dies, ptisana hac sequenti tantum vtens: *℞. hordei mund. m. j. iunib. recens. f. besten ana num. v. glycyrrh. & rosa ℥ j. coquantur*

7 in aqua communi pro lib. j. Sub noctem cum dormire non possem, ob lotium singulis fere dimidiis horis guttatim exiens, cum summo dolore, utebar hordeato parato ex hordeo mundato, amygdalis dulcib. & emuls. semin. 4. frigid. maior. mund. & semin. papaver. adiecto zaccaro perlato. Utebar onis mollibus, in verucis iure, iniectionis, qua ad acrimoniam urinæ facerent. Postea lotium melius emanabat. Decoctio ptisana adiaci gemmas ribes nigra. Deinde lotio melius effluente, quamvis non sine ardore, acrimonia, & stranguria, per aliquot dies utebar solo decocto foliorum malua, adiecto syr. viol. Quo & ardor urinæ cessavit. Sed egre cessante: inter reddendum lotium, aut aluum, vasculum aqua calida repletum, in qua decoxeram flores chamomilla sedis perforata subieciabam; ex ea aqua calidum vaporem suscipiens, commodius aluum vel lotium reddebam, cum minori ardore, & continuando decoctum foliorum malua, cum syr. viol.

8 Tandem liberatus ab hoc vitio fui, cum tribus integris septimanis, fere macie consumptus ex dolore, hoc malo cum intolerabili dolore laborassem. Scribit Benedictus Veronensis, quod stranguria quandoque in decimum & ultra diem protenditur, magna vesicæ vexatione. Sed mihi adhæsit ultra tres septimanas, & nihil æque iuuit, quam decoctum malua, cum syr. viol. quo & alios multos postea, simili malo laborantes curavi. Verum postea vrina facile vitro effluxisset, ob debilitatem vesicæ, nimis fortasse relaxatæ; ita ut stranguria seu stillicidium foret sine dolore, vrina guttatim stillante. Quare a decocto illo abstinui; & vesicam roboravi cum inunctione olei myrti & mastichini.

S C H O L I A.

Curatio stillicidii urinae, si ex acrimonia eiusdem urinae proveniat

9 Si ab acribus succis intra vasa redundantibus, biliosis, inquam, urinæ stillicidium contrahatur, eis in uniuersum utendum erit, quæ alterant, humectant, ac temperant, Paulo & Alexandro testibus. Quapropter aer eligendus est, in passivis ad humidum inclinans; in actiuis temperatus: somnus moderatus, aut consueto parum longior: Vigiliæ immodice vitentur, quiescant ægrotantes, & exercitium vitent, & coitum præcipue. Aluus seruetur lenis, si non natura, saltem arte, lenibus clysteribus. Animi accidentia vitanda sunt, præsertim ira. A cibis calidis, acribus, aut salis omnino abstinendum, ut paulo ante diximus, & a tarda comestione, ut inquit Paulus. Quapropter his utilis est ptisana, eiusque cremor per se; interdum etiam cum lacte, ubi magna pars acrimonie finierit, quoniam lac (ut inquit Alexander) corrumpitur, si qualitate sicca, & acri præpollente multum exhibeatur. Poterit insuper eadem ptisana cum pullorum aut gallinarum iure parari, seu etiam cum amygdalis dulcib. cremore per se, interdum etiam cum lacte. Inter pisces quoque saxatiles eligi possunt; & inter olera lactuca, buglossum, malua ac portulaca. Pro potu vinum præberi non debet: dulcere tamen & optime dilutum concedit Donatus, eis, qui alio potu uti non valent, propter eiusdem vini consuetudinem, aut corporis imbecillitatem: reliquis vero pro potu

Vitæ ratio.

aqua præbenda est dulcis, calida, quemadmodum Aetius & Alexander iubent: in vicem cuius, aqua etiam hordei, aut decocta aqua dulcis, cum pauco zaccaro rosaceo permixta, seu radicis glycyrrh. decoctum præberi poterit, ut nos fecimus. Optimum quoque est lac ipsum calidum potatum, ut inquit Aetius, & amyllum cum lacte decoctum itemque cum palmarum decocto absorbendum præbere. Quod si neque his contemperetur redundans succus, ac eius acrimonia obtundatur, tunc exsuperantem vitium humorem, quam celerissime purgare oportet; aliisque medicamentis contemperantibus, ac morsum obtundentibus utendum. ut melle acreo, casti, fist. zaccaro violaceo syr. ex infus. ros. pallid. adiecto etiam diacatholico, si opus est. Præcedentibus quoque syr. vel etiam post, adhibitis morsum humorum obtundentibus, ex malua, cichorio, seu scariola (aliis hortulanamendiis am vocant) ex portul. nymphaea, ros. papau. confectis, aut buglossi succo, cum cremore, sem. 4. frigid. maior. mundat. cum aqua hordei vel palmarum, rad. glycyrr. decocto: vel pastilli in hunc modum, iuxta Donatum præbeantur: ʒ. semin. melon. citrulli, cucum. ana ʒ. j. vna pass. succo rad. glycyrrh. ana ʒ. j. sem. lactuca. portulac. ana ʒ. ʒ. amyli ʒ. j. zaccari in aqua ros. dissoluti q. s. misceantur, & fiant pastilli. Clysteres quoque ex hord. fol. malua, althææ, beta viol. exiguosale, olei viol. ʒ. iij. mellis viol. ʒ. ij. cassie fistula ʒ. j. fiat clyster. Balneum aquæ dulcis prodest, ex Alexandro & Paulo, ut dictum est prius. Et fomenta ex Actio circa pubem, ex decocto foliorum malua, viol. althææ, ros. florum chamemeli, fœnugraci. Circa vesicam etiam partes inungenda oleo viol. nymphaeæ, pap. amygdalar. dulcium, rosarum. Quod si acrimonia adhuc augeatur, etiam per colem lac ipsum cum amylo in vesicam iniiciendum ex Actio. Et lac ipsum per se, caprillum potissimum; item cremor sem. pap. melon seu cucumeris ac malua, althææ, cum aqua hordei, in qua etiam radix glycyrrhizæ fuerit decocta, profunt, si iniiciantur.

Medicamentorum ratio.

II

Alterantia & contemperantia.

Clysteres.

Balnea.

Fomenta.

OBSERVATIO V.

De stranguria ex causa frigida.

11 M Vlier admodum pituitosa, cum frigida aqua se lauasset, etiam ex propria intemperie frigida, vesicæ sæpe stranguriam incurrebat, nunc vero magis. Decoctum apii, fœniculi, dauci, cheresol. in vino maluarico ut sumeret, consului, cum diues esset, ac potius ut apponerentur iussi, (cum difficulter urinam redderet cum stillicidio) cheresolium, parietariam, cum oleo rutæ. Quibus mox stranguria cessavit.

S C H O L I A.

12 Hic ut edum iis, quæ calfacere possunt, tam in victu, quam medicamentis, recte docuit dam intemperantia. Trallianus, tum etiam Aetius, & ideo cibis ac potibus validioribus uti poterunt; & inter olera, apio, ac dauco petroselino, seu oreoselino. Et pro potu vinum calidius, maxime senibus, qui & hoc malo ex frigore sæpius obnoxii sunt, est idoneum. Similiter & aromatum decoctiones in potu exhibere convenit, & iuxta Aetium, etiam artemisiā, & scordii

Si ob frigiditatem intemperantia, curatio.

3 & scordii decoctum, ex Alexandro, & Theriacam in potu cum passo, & vino mullo, *ut eidem Actio visum est.* Nec minus confert oleo rutaceo calido pectinem fouere, ac ægrum in sampsuchi, aut rutæ decoctum desidere, imumq; ventrem contingere ac calfacere. Aliquando & per sedem oleum rutaceum infundere, *ex eiusdem Actii sententia.* Conueniunt item, quæ urinam ciunt, cum medicamenta, *ex eiusdem Actii & Pauli auctoritate:* & insuper confert aquis naturalibus pro balneis vti, & reliquis calidis vnguentis, *Alexandro teste;* quorum sylvam de dysuria iuniores inuenient. At si ex alia quapiam intemperie urinæ stillicidium excitari contingat (*quamuis raro id eveniat*) perpetuo suo curabitur contrario; quemadmodum si ab aliis frigidis pituitosisque humoribus, vel falsis, *ut prius dictum est,* illi ipsi erunt purgandi: & ita quoque, *ut paulo anterecensuimus,* si aliud membrum sit affectum, & id ipsum per vesicam expurgetur, aut vicinitatis ratione per consensum offendant, manifestum est illud primo curari debere; ita tamen, ut neque vesicam negligamus, *ut inquit Actius.* Nunc ad dysuriam & difficultatem urinæ transeamus.

OBSERVATIO X.

De difficultate meiendi, cum stranguria.

3 SÆPE stranguria cum difficultate mingendi, & rursus difficultas mingendi seu dysuria cum straguria permiscetur: quod cuidam mulieri gravidæ euenit, cui subinde menstruæ purgationes fluebant: quæ cum medicamentis quibusdā violentis constrictæ essent, postea incidit in dolorem ventris adeo enormem, & potissimum circa pectinem, cum stranguria & meiendi difficultate, ut obstetricem ad se vocauerit, metuens abortum futurum. Sed ad hanc cum accitus essem, glande aluo irritata, cum pauca deiecisset, dolor in ventre nonnihil sedatus est, permanente tamen difficultate mingendi cum stranguria: etiam in emitendo lotium ardorem sentiebat, paucum, idque frequenter cum stillicidio mingeat. Contra hæc symptomata, varia machinati sumus, exhibendo decoctum maluæ, viol. sem. maluæ, althææ sem. quatuor frig. maior. pap. albi. quæ in ceruisia decocta erant, cum paupercula existeret. Qua utebatur sine saccharo, cum dulcia respueret. Vt similiter est decocti pulli iure, cum foliis maluæ. Pectinem autem innoximus ob ardorem & stranguriam, oleo viol. amygd. dul. & ping. gallinæ: nam aliquam duritiem quoque sentiebat in imo ventre. Quibus remediis hic dolor sedatus est; & straguria ablata, etiam dysuria eam reliquit. Interea mulier laudabat cum decoct. folior. maluæ, viol. & parati erant sacculi ex foliis maluæ seminis maluæ, & florib. meliloti quadratis intersuti, qui decocti in ceruisia crassiore & expressi pectini applicaretur. Verum iis opus non habuimus, cum supradicta stranguriam abstulissent. Huic tamen dedimus hordeatum; lac acetosum, ob acrimoniam, & oua sorbilia; ac ter glande aluus irritata est, fecibusque eductis postea hæc optime se habuit.

SCHOLIA.

Cum autem sæpe hæc tria symptomata, ut dictum est, stranguria & dysuria inter se commisceantur, quibus postea & ischuria accedit; attamen ea ipsa diuersa sunt (*ut antea diximus*) in quibus omnibus dolorem sentiunt. Ab actione ipsa præstat potius (*cum diuerso modo in ipsis ledantur ægri,*) harum passionum seu symptomatum differentias sumere; & a rei natura, & læsionis in excretionis varietate, quam ex dolore, qui omnibus communis esse potest. De stranguria iam satis dictum est: sic vesica in stranguria siue urinæ stillicidio, ut alius in lienteria, non expectat, ut urina tota colligatur, sed statim tanquam grauantem (*ut ait Galenus*) aut mordentem expellit. In dysuria siue difficultate urinæ expectat quidem, atque aliquando diutius, quam oporteat: sed cum excernenda est, percipit æger dolorem, aut tantam difficultatem, ut sæpe nisi locum vesicæ comprimat manu, aut diu, & magno conatu enitatur, libere non profuat: & si totum supprimatur, iam erit ischuria. At si dysuria commisceatur cum stranguria, difficulter urina exit, ob aliquam causam deobstruentem: interea & stranguria est admixta, ratione humorum mordicantium, aut ex vicinitate aliorum membrorum laborantium, ut guttatim urina quoque emittatur, licet ægre aliquando exeat, via non satis lubrica & aperta. Ideo, *ut diximus,* hæc symptomata potius ex actione læsa inter se sunt distinguenda cum actio vesicæ (*ut antea diximus*) in stranguria sit corrupta: in dysuria diminuta: in ischuria omnino ablata. At de stranguria, eiusque signis & causis, & curatione, satis diximus: nunc de dysuria & hæc dicamus, (*cuius sermo etiam postea ab exemplis nunc subsequenter olarior euadet*) cum illa ipsa etiam inter eos præter naturam affectus numeretur, qui soli vesicæ proprii sunt; & a Græcis dicitur *δυσουρία*, Latinis vero difficultas *δυσουρίας* urinæ: cum videlicet æger meiरे cupit, & cum vi urinæ excernuntur, *teste Actio cap. 19. lib. 7.* Quamquam Galenus *Comm. aphor. 48. 7. lib.* bitariam mingendi difficultatem interpretetur: vno modo, quando cum dolore sit mictio: alio, quando cum difficultate aliqua; adeo, ut vix vesica operetur. Hinc Trallianus, *cap. 6. l. 9.* dicebat, *Vrina difficultas partim sine dolore oritur.* Id autem (*ut dicimus*) euenit ob causarum, ex quibus oritur, varietatem. Siue itaque cum dolore, siue citra dolorem (*sed cum difficultate aliqua, adeo ut vix vesica operetur,*) fiat hæc affectio; perpetuo urinæ difficultatem eam nominabimus, *ex Galeni decreto,* præcitato loco, *ut etiam annotauit Donatus medicus doctissimus.* Quod vero non solum vesica, sed etiam ipsa sola in hac affectione semper laborat, patere poterit ex eius functione oblata, quæ urinæ excretio est. Hæc enim ita oblata est, ut imbecilla, & veluti torpens reddita sit: similiter ex dolore cum posito hoc noscetur, si cum dolore mictio fiat. At quod symptoma sit in genere retentorum, vel excretorum immodice,

δυσουρίας

Quid per bitariam rina difficultatem intelligendum sit.

Partis affecta:

Quis affectus, præter naturam.

Causa.

6

lib. de diff. & 3. de caus. sympt. scriptum est. Ex eius quoque excretionis modo liquere id poterit. Namque cum dolore, aut saltem cum difficultate fit mictio. Cum igitur parum & frequenter, siue guttatim & maturius, quam pro naturali excretionemittitur, stranguria; quando tempore conuenienti, sed cum difficili motu aut dolore, dysuria nominatur. Dysuria si dolorem pro symptomate habeat, causa eius erit inflammatio, vel abscessus vel ulceratio ut ab usu medicamentorum acrium; vel spiritus flatuosus, vel inæqualis intemperies. Si vero difficilem aliquem motum pro symptomate habeat, tunc erit imbecillitas potencie excreticis, ut ob frigus vesicæ, aut colli: vel tumor præternaturam, vel obstructio a crassis & viscidis humoribus infarctis, aut adhærentibus ceruici vesicæ, aut urinae permixtis. Vide de his commentum Gal. aph. 48. lib. 7. Fernellius vero stranguriam sine dolore causas easdem atque ischuriam obtinere volebat (ut dictum est prius) sed leniores, cum existat diminuta quædam ischuria: quæ cum dolore acri, tum ischuriæ tum dysuriæ permixtas causas habere dicebat. Quod autem guttatim stillet, ischuriæ: quod vero ardeat ac stimulet, dysuriæ rationem sumit. Dicebat idem Fernellius *dysuriam penis & vesicæ ut dysenteriam intestinorum, difficultatem esse: urina quippe magno cruciatu atque dolore interdum affa im interdum guttatim redditur*. Causa vel in urina consistit, vel in vesicæ ceruice. In urina, quod acrior euaserit, id que aut victu calidior, aut bilis permixtione, aut acrimonia puris exrupto abscessu manantis. In vesicæ ceruice vel ulceratio vel inflammatio est, quam transiens urina acrius ferit. Sic aliquando una cum alia miscetur, etiam ex causis permixtis. Sed nos nunc de dysuria agamus seorsim; quamuis Practici quidam supra Rhal. scribentes, de his tribus affectibus sub vno capite tractant.

OBSERVATIO VII.

De urina difficultate, cum dolore, in senecalculofo.

Cornelius Bartholdi, vir senex, Graphiarius feudorum, ut vocant in Haga Comitum habitans, sæpe in difficultatem urinae incidebat, quamuis calculosus esset, cum in eius urina sæpe arenulas inspexerim, nunc etiam pituita falsa matule in hærente. Quare cassiam dedi, pauca immixta hiera picra. Curtius continuandum iubebat, ut senes præcipue affluerent hunc bolum frequenter accipere: *℞ cassia recens extracta ʒ ij. hiera picra Gal. ʒ j. fiat bolus*. dabat ad aluum senum ciendam ille doctissimus medicus Curtius statim ante cenam, ut a fide digno in Italia accepi. Id ipsum & huic consului, ubi dysuria, aut stranguria afficeretur; & ut simul ad difficultatem meiendi ius ciccerum decoctum cum paucis croco assumeret. Hoc modo matronæ Bononienses etiam menses euocant. Et ubi magnus adesset ardor cum difficultate meiendi, dabam semel in mense cassiam ad ʒ j. ubi bolum abhorreret, cum decoct. malua, althæa, pariet. & sem. quatuor frigid. maior. Aliquan-

do etiam dabam hoc decoctum sine cassia, cum syr. ex infus. ros. & mell. ros. Abstinebam ab oxymelite ob acetum. Et ubi crassior materia esset, magis obstruens, dabam syr. de byzantiis sine aceto. aquam vitæ, qua utebatur ad calculum, inhibui; & omnia ex pipere confecta, & alio aromate, excepto cinnamomo, cum tenuium partium sit, & eius vis facile euanescat. Concessi myrobal. ch. bullos. & conser. ros. unius anni ad renes & ventriculum roborandum, & vinum Rhenanum, sed lymphatum cum decocto malua. a vinis calidis ut abstineret præcepi: etiam Rhenano, si ardor una cum difficultate mingendi vrgeret: & ut in iusculis suis vteretur lactuca & malua, etiam asparagis, & cina- ra sine pipere: & similiter mandavi, ut vteretur carnibus laudabilibus, phasianis, caponis, gallina- ceorum, & similibus. Abstinento a ceruicia, potissimum crassiore & recenti. Et ubi ardor magis infestaret, dabam syr. viol. etiam Nicolicum rhab. cum decoct. liq. mal. & sem. quat. frig. maior. cum semine pap. Sæpe etiam pro deterfione utebar syr. capill. Ven. cum decoct. malua, cicer. & agrimonia; quibus aliquo modo hic senex iuuabatur, quamuis in totum non fuerit liberatus, magis recurrēte tempore hyemali & frigido & niuoso. Interim tamen, si valde acribus medicamentis vteretur, magis afficiebatur hac molestia. Et ideo ubi natum cognoscerem ex usu acrium & medicamentorum (a quibus teste Rondeletio aliquando quoque fieri solet) dabam tunc decoctum hordei mundati, cum paucis syr. viol. aut z. acubaro. Id enim (ut refert idem ille doctissimus Rondeletius) utilissimum est ad extinguendam acrimoniam relictam in viis urinae, & ab acribus medicamentis inductam, vel lac mulsum, aut lac amygd. paratum cum sem. pap. adiicio & ego emulsionem ʒ. sem. frig. maior. quo & in infinitis magna cum utilitate usus sum.

S C H O L I A.

Signa quidem demonstratiua difficultatis urinae per se nota sunt: at causarum signa diligentius perscrutanda, cum ex variis sint, & varia ex iis resultet curatio. Nam ubi cum dolore fuerit, tunc ortum habet aliquando ex inflammatione, aut abscessu, ulceratione, inæquali intemperatura (ut diximus) aut spiritu flatuoso. Si vero motus duntaxat difficilis fuerit, aut propter potentie imbecillitatem, vel tumorem contra naturam (indolorosum inquam) excitabitur, ex Galeni sententia præcitato aphor. 48. lib. 7. Sed & dysuria similis est dysenteria. Nam frequenter urina excernitur, & frequenter stimulat æger. Fit etiam hæc affectio propter usum acrium medicamentorum, ut empetri, laueris, & aliorum multum diureticorum, ut in hoc senecæ continebat, quod & in aliis multis & fere sine numero cōspeximus; quæ postquam mouerūt urinas, urinae difficultatem inducunt. Fit etiam hæc affectio ob frigidam intemperiem vesicæ, aut colli eiusdem. Ob crassos quoque & viscidos humores infarctos, aut adhærentes ceruici vesicæ, vel urinae permixtos. Contingit etiam dysuria propter hypofarcon, quæ meatum claudit ex parte, & crassam pituitam retinet,

Signa causarum.

ut

vt postea exemplis docebimus. Verum si dolor cum grauitatis sensu fuerit, quod inflammatione aut abscessu vesicæ infestetur, suspicandū est. Distingues autem inflammationem ab abscessu ex aliis propriis eorundem morborum indiciis. At si cum dolore pus quoque excernatur cum vrina, citra grauitatem, sed cum vehementi rosione, vlcerationem in causa esse iudicabis. Sed si absque grauitate, verum cum distensione sola dolor in vesicæ percipiatur, spiritum copiosum ac flatuosum difficultatis vrinæ causam esse suspicabimur, *Alex. teste* Vbi autem nullum tale affuerit indicium & cum dolore mictio fiat difficilis, ex inæquali eiusdem vesicæ intemperatura eandem vrinæ difficultatem oriri censeo. Verum quanquam ea & calida & frigida, & etiam sicca quandoque esse possit, sepe numero ex frigida contingit: etenim vesicæ ex sanguis & frigida est, & propterea a causis frigidis plusquam alias partes promptius afficitur, quemadmodum euenit in aquilonis flatu. Tunc namque vrinæ difficultates oriri consueverunt *Hippoc. & Galen. testibus aphor. 5. 3. lib.* Id autem percipere poteris, non solum ex aquilonis flatu, sed ex reliquis quoque causis infrigidantibus, quæ præcesserunt, atque etiam ex ætate, temperatura vrinæque tenuitate & albore, ex *Pauli auctoritate, & ex S. holio Observatio prima huius libri.* At si ex reliquis inæqualibus temperaturis excitari contingat cum dolore vrinæ difficultas (quanquam non saepius id contingat) ex propriis earundem indiciis, haud ægre percipi poterit: quemadmodum interim contingit in ardentissimis ac siccissimis febribus, ut *Aetio & Paulo visum est*, & nos quoque exemplo ostendimus *observat. 3. 8. lib. 7.* Ex eisdem quoque intemperaturis, licet non inæqualibus dolorem inferentibus, redditur potentia imbecillitas: ex qua citra dolorem cum difficultate mictio fit; licet præcipue ex frigida; quæ haud aliter cognoscuntur, quam prædictæ, quanquam vbi cum frigiditate simul pituitosus humor redundet, præter alborem vrina crassa apparbit, *Paulo teste.* Nec non & alia aderunt indicia redundantis pituitæ; potissimum, si in toto redundarit; & demum ad vesicam demittatur, eiusdem vesicæ cervicem obstruens: ex tumore item quopiam præter naturam (eodem *Gal. auctore*) difficilis quandoque fit motus in vrinæ excretionem. De eo tamen intelligendum est qui dolorem non parit. Nam de his iam meminerat inter eas causas, quæ cum dolore faciunt vrinæ difficultatē. Sunt vero hi scirrhi & cedematosi tumores: qui quoniam modo dignoscendi sunt, promte cui libet patere poterit, ex propriis eorundem tumorum indiciis. Si sit propter apostema, vel inflammationem, signa aderunt eiusdem, de quibus *prop. 1. cap. agemus.* Si autem sit propter vlceris præcesserunt signa, & si ob pus cohibeatur vel carnem collo vesicæ ingentem, aut verrucam, vel ex lapide concreto vel humore (quæ non tantum vrinæ difficultatem adfert, sed saepius omnino ipsam retinet) cathetere immisso cognoscuntur. Sed hæc pla si exitum omnino impendant, perti-

nent ad ischuriam; de qua suo loco. Si ex parte difficultatem vrinæ inferant, tunc ad dysuriam pertinebunt. Ita & cathetere immisso modo pus modo sanguis eius fini adhæret. Si ex sola ventositate, adest dolor extensiuus, cum grauitate sese dispergens. Si materia viscosa, simul cum vrina exit. At exemplis subsequētibz omnia hæc clariora euadent.

OBSERVATIO VIII.

De difficultate vrinæ, cum dolore circa pubem.

MVlier annos viginti nata, ex infima plebe, paupercula ac puercula, a quinto die partus difficulter lotium reddebat, cum ingenti dolore circa pubem; & postea in totum retinebatur. Habebat autem hæc Alcmarie. Ad quam anno 1553 mense Decembri, cum frustra multa remedia essent tentata, accitus fui. Sed hoc cataplasmate per me descripto, vt pectini apponeretur, incantamenti instar, cum eandem pro deplorata haberent, lotium libere reddidit; & ab eo dolore, qui pubem exercebat, fuit liberata: *℞ parietariam ij. charesfolium j. ℞. incisa ad mollitudinem decoquantur; adde butyri recentis 3j. olei scorpionis 3j. ℞. calide pectini applicetur: & ita profuit, vt nullis alijs remediis opus fuerit.* Suspicebam malum contractum ex solo frigore. Sola sæpe parietaria cum oleo scorpionis instar emplastri pectini apposita (quod experientum præceptoris mei *Elidei erat*) profuit, & me raro fefellit, etiam vbi obstructio esset ab humoribus crassioribus: tamen glande vel clystere emollienti præcedente, si alius resisteret, aut leni purgatiuncula prius propinata, siue ex frigore, siue ob ventositatē malum contractum esset. Memini in Clementia Foresta sorore mea, præmemoria, cum diu decubisset, & ex siccitate in difficultatem mingendi & retentionem vrinæ incidisset, parietariam similiter iuuasse, adiecto oleo zamino, & butyro. cataplasmatibus, aut emplastri modo pectini impositam.

SCHOLIA.

Malum minus graue est, si difficultas vrinæ dependeat ex causa procætarctica seu primitiua: ab aere frigido, vel similibus: etiam ex intemperie sola; quamuis tamen si ex frigida intemperie excitetur, sensibus periculosior est, veluti & ceteri morbi frigidi, vt diximus. Verum si vrinæ difficultas in ardentissimis ac malignis febribus fiat, mala est. Nam nedum vesicam affligi significat, sed indicium est, quod omnes nervosæ partes sint affectæ, ex *Aetii testimonio.* Ex siccitate, neque adeo bona esse potest, resiccatis nervis: verum ex aliis causis vbi oriatur, tanto salubrior erit, quanto dolore magis vacabit. Nuda intemperies si malum procreat, melius curatur, quam si sit cum materia. Sed quouis modo, in decrepito difficulte curatur. Ex stranguria vel difficultate vrinæ ileos vel tenesmus, pessimum est; nisi leui superueniente ephemera febre. Et illa quæ est ex vlcere præcedente, difficile curatur, cum acrimonia vrinæ & puris semper irriteretur,

2
Signa prognostica.

& in meatu ex carne vel verruca, magna ex parte incurabilis est, nisi cum maxima molestia, & magna diligentia, *ut postea exemplis docebimus*. In siccitatibus vrinae dysuriae fiunt, *aph. 1. lib. 3. & in autumno aph. 22. lib. 3.* Et mingendi difficultatem, stranguriam, vini potio & venae sectio soluit. Incidere autem in talo interiores, bonum, *49. aph. lib. 7.* Et difficultas vrinae ex sanguine coagulato pessima, & quae venit ex renibus vel vreteribus, difficilius curationem recipit; & ex vteri inflammatione aut ulcere. Ex calculo in collum vesicae impactio, si cathetere amoveatur, bonum est. Sed haec iam dicta aliquando, uti calculus, ad ischuriam & omnimodam retentionem pertinent, ut etiam antea de calculo in vreterem impactio diximus. Nunc loquimur de his causis, quae potius difficultatem meiendi faciunt, & non ita vehementes sunt, ut illae, quae ischuriam omnino adferunt; de quibus suo loco. Quod ad curationem dysuriae attinet, cum varias causas habeat, vario quoque modo eius curatio instituenda est. Si ex nuda intemperie frigida, calefacere oportet vesicam: si calida, refrigerare, *ut scholio primae observationis laius libri ostendimus*. Si ob pituitam crassam & viscidam, et toto corpore defluentem, Rondeletius euacuat pilulis mitioribus, vel pilulis huius vel alephanginis. Deinde exhibet syr. attenuantes & incidentes, detergentesque, cum aquis, vel decoctionibus similibus. Mox etiam pilulis fortioribus euacuat, nempe coctis, & aliis purgantibus pituitam, citra aliquam adstrictionem in crastinum deinde utilissime dat terebinthinam lotam cum vino albo ad $\mathfrak{z}ij$. Quod si non facile excernatur vrina, tunc tuto dare possumus cientia vrinam, cum leui deterfione, *ut syrupos attenuantes, cum decoct. foeniculi, apii, asparagi, betonica & aliarum herbarum diureticarum*. Si pituita in collo vesicae detenta id faciat, iniicienda detergentia erunt. Si est sine ulcere, detergentia iniicienda & attenuantia. Si vlus adsit, melicratum crudum, decoctum hordei & glycyrrhizae, vel serum lactis cum paucis melle, Sufficiant haec ad curationem. Quid praeterea agendum sit, exempla subsequenter docebunt.

OBSERVATIO IX.

De difficultate vrinae, seu dysuria, ex causa frigida.

Seni Delphensi cuidam dysuria frequenter oboriebatur ex vesica imbecilla reddita, ob causam frigidam, simul cum materia pituitosa, adeo ut actio vesicae lederetur: unde & difficultas vrinae iam originem traxerat. Ad hunc vocatus, cum & antea sepe hoc morbo affectus esset, praesertim in hyeme, dum aquilo flaret; quamvis illum plane pristinae valetudini non poteramus ob senium restituere, attamen ne nostro officio decissemus, ut malam saltem mitigaretur, ut illa, de quibus nunc dicemus, diligenter observaret imperavimus, imprimis ut aerem eligeret ad calidum vergentem. Somno moderato ac exercitio etiam moderato vteretur iussi: & ut cibi in quantitate modica, & bo-

ni succi, & in qualitate ad calidum vergerent; qui & vrinae quoque ciendae facultatem haberent. Propterea concessi & *oreoselinum, apium, foeniculum, asparagum, daucum, & reliqua similia; quae cum aromatibus, cinnamomo, garyophyllis, macere, galanga, zinzibere condiri possent*. Admisi vinum calidum, etiam illud, quod Hippocraticum dicitur, si eo vellet uti, aut aquam mulsam cum aromatibus quibusdam iam dictis paratam. Verum, quod ad medicamenta attinet, cum hic una cum frigida intemperie simul pituitosi succi redundarent, non solum in vesica, sed in toto corpore, videlicet in sene, qui facillime pituitam etiam in stomacho coaceruabat; ideo illos succos praeparare tum concoquere instituebam, antequam eosdem purgarem. His syrupis prius praescriptis: \mathfrak{L} *mellis ros. colati, oxymel. simplicis etiam scylliniana $\mathfrak{z}ij$, aqua foeniculi, melissa, betonica ana $\mathfrak{z}ij$ fiat iuleb. pro \mathfrak{z} . dosib.* Deinde purgavi eundem hoc modo: \mathfrak{L} *cassia fistula, diacatholici, diaphoenici ana $\mathfrak{z}ij$. dissol. cum aqua beton. $\mathfrak{z}ij$, mellis ros. colati $\mathfrak{z}ij$. misce.* Postea etiam adhibui decocta calefacientia & vrinam cientia, ut decoctum scordii, artemisiae, pulegii, foeniculi, origani, & similibus, adiecto syr. de byzantiis, & melle ros. & pectinem inungebam oleo anethino, chamamelino, rutaceo, nardino, & similibus, & Theriacam cum vino sumsi: quibus melius se habebat.

SCHOLIA.

Magna ex parte (*ut dictum est antea*) fit difficultas mingendi ex intemperie frigida per se, vel etiam cum succis frigidis. Si ex nuda intemperie frigida contingat, victus ratio huic seni praescripta, aliis quoque convenit simili malo laborantibus: ita & medicamenta calefacientia & vrinam cientia, ut est decoctum superscriptum vel hyssopi, thymi cum aqua mulsae: nec minus interdum theriaca, aut mithridatum, diagalanga, aut diacinnamomum, aut diacalamentum, aut dianisum ad $\mathfrak{z}ij$, cum vini albi $\mathfrak{z}ij$ aut tantundem praedictae aquae mulsae, cum aromatibus paratae. Extrinsecus quoque fouendae sunt partes circa vesicam, ex decocto pulegii, sampsuchi, origani & foliorum ruta, calamitae, florum chamamelini & foeniculi. Fiat autem quandoque decoctum non solum in aqua (*ut etiam admonuit Donatus*) sed etiam in vino albo, aut in duabus partibus aquae, & una vini, prout magis expedire videbitur. Ex quibus quoque infusus parari poterunt, praecipue pro diuitibus, qui sumtus ferunt. Item eadem partes illinendae oleis iam dictis in observatione praecedente, etiam irino, castoreo & similibus. Clysteres quoque iniiciantur *ex florib. chamamelini, pulegii, surfuris, caricarum decocto, oleo rutaceo, anethino ana $\mathfrak{z}ij$. b. adiect. & mellis ros. aut communis $\mathfrak{z}ij$. addita. & si sit materia admixta, spec. hierae simplicis & cass. ad elect. de dactylis adiciantur*. Nam ubi frigidi succi admixti sunt, praeparati cum syrupis in observ. positis, cum decoct. vel aqua foeniculi, betonica, & similibus purgentur agarico, pul. hierae simplicis; vel si mauis, cataplasma foetidis, de sagapeno, cum agarico permixtis. Vbi autem in vesica

dunta-

Curatio.

2

3

Curatio mingendi difficultatis, orta ex frigida intemperie.

4

Si cum frigida intemperie frigidi quoque succi redundant, curatio.

uratio.
uria ex
ritu fla-
so.

5
urina dif-
ultas fiat
feb. ardē-
p. ac mali-
is curatio.

duntaxat prædicti succi redundant, benefacit etiam compositum oxymel & mulsa, & decoctum radicis rhamni ac origani, quod mirifice iuuat, ut inquit Alexander. Item vtendum est hyssopi, pullegii, origani, vel thymi decoctis, cum aqua mulsa ex Pauli auctoritate: interim vtendum prædictis medicamentis; extrinsecus adhibitis iam dictis. Quod si ex flatuoso spiritu dysuria gignatur, medicamentis, quæ flatum discutiant, intus & extra exhibitis vtendum erit; quorum copiam requiras inter ea, quæ de colicis doloribus diximus. Ex ceteris item vesicæ intemperantiis, si excitetur, perpetuo eorum contraria medentur. Quapropter si in ardentibus ac malignis febribus fiat urinae difficultas, fouendæ sunt imi ventris, pectinis, inguinum & coxædicum partes, cum oleis, superfusio-nibus, fotibus, ac cataplasmatibus, quæ laxandi ac humectandi vim habeant, cum exiguo aut nullo calore. In quem usum conuenit oleum chamemelinum, anethinum, oleum commune dulce, fofus ac suspensionses, ex matuarum, althæa fenugraci decocto, similiter & infusionses: quæ etiam salubriter in hy & aofient, ex Pauli testimonio. Exemplum huius posuimus lib. 7. obser. 38. ut non opus sit idem repetere. Et si alius quoque adstricta fuerit, prædictorum decoctum oleo communi, anethino; aut amygd. dulce addito iniiciatur. Si vero difficultatis urinae causa fuerit inflammatio, abscessus, vlceratio, vel quiuis alius tumor præter naturam, ex eorundem vitiis curatione, quorum postea in sequentibus mentionem quoque faciemus, curabitur.

OBSERVATIO X.

De difficultate mingendi, ob callum carnosum, vel verrucam, aut excrescentiam carnis, intus in pene seu meatu urinario innatam.

Isbertus Pauonius seu Pauwius dictus, prætor in Pago Huysdunensi: at nunc Alemariæ ob passionem, quæ afficiebatur habitans, annum trigessimum quintum vel circiter agens, cum diu urinae ardore & difficultate mingendi laborasset, ad aliqualem urine suppressionem, seu potius maiorem difficultatem mingendi deuenit; urina enim instar tenuissimi fili cum impetu aliquando exibat; idque propter callum innatum, seu carneam excrescentiam intus in ipso meatu urinario obortam, urinae exitum impredientem non solum, sed si cum vxore aliqui pulcherrima concumberet, semen eiaculari non poterat libere; unde neq; proles ex ea exspectans magna melancholia afficiebatur. Passus autem fuerat antea gonorrhœam, multis innumeris medicamentis vsus, & iniectionibus infinitis ab aliis medicis præscriptis, postea & caruncula innata semper perius habuit. Quare cum hoc grauissimo malo torqueretur, Delphos ad me veni, ut ab hoc carnicis malo liberari posset, consilium ac remedium postulat. Addebat tunc, se quidem nunc sine dolore & ardore lotium reddere, verum adeo tenue exibat, acus instar, propter meatum urinarium obstructum: ac præ ceteris narrabat illud quoque potissimum sibi grauissi-

um ac molestissimum esse, quod semen in actu Venereo eiaculari non posset, cum & iuenculam vxorem haberet, eamque formosam: cum aliquot annis hoc malo cum priore vxore, quæ nunc obiebat, & nunc secundam duxerat, in magnum discrimen saepe adductus esset, & alios medicos peritissimos frustra consuluisse: tandem ad me venit oratum, ut si quo modo possem, tanto malo succurrerem. Mouit me, fateor, cum res ipsa, quæ satis per se miranda videbatur, imo molestissima: tum vel maxime viri lacrymæ, ac nimium miserabilis obsecratio. Cœpi igitur mecum cogitare, an id forte ex caruncula, hoc est, carnis excrescentia collo vesicæ, vel urine meatui innata euenerit, cum & statim mihi in mentem veniret similis casus Galterii illius Partinopolitani, qui describitur ab Amato centur. 4. curat. 19. de exstirpandis excrescentibus in collo vesicæ carunculis. Hic enim Galterius, vir nobilis & magnificus, annos natus quadraginta, quum iam diu gonorrhœam, hoc est, seminis proflauum pateretur, & nihil remedii contra malum inuenisset quoque, in urine al- qualem suppressionem deuenit. Hic cum accessisset Amatum, is quoque deprehendit carunculas esse in collo vesicæ & urine meatui inesse. Omnia hæc huic Gisberto aderant, excepta egerendi cupiditate, qua Galterius ille apud Amatum etiam detinebatur. Quamuis autem certis coniecturis id mihi persuasum esset, tamen, ut adhuc certiores essemus, chirurgum Guilelmum de Dalen lithotomus, amicum nostrum familiarem, vocari iussimus, ut id candela cerea vel cathetere exploraret, num ita esset. Immisso cathetere omnia ita esse inuenimus. Quare vna hominem curandum suscepimus: & sic tribus mensibus apud nos Delphis egit, donec curatio ipsa perfecta fuerit, in hunc modum etiam auertendo & educendo humores, ne ad partem affectam ruerent, & maiorem obstructionem parerent, aut excrescentiam carnis in callum aut tophaceam naturam magis conuerterent, exceptis iis, quæ lithotomus adhiberet, communi quoque nostro consilio. Ideo anno 1571. 27. die Augusti, cum ad nos venisset, hunc bolum primo deglutendum dedi: ℞. cassia recens extracta ℥ x. cum zach. candi dicto puluerisato, fiat bolus. Deinde imperaui ut diebus sequentibus sumeret bis in die ex hoc apozemate: ℞. rad. feniculi, petrosana ℥ β. agrimon. parietaria, malua, cheresfoli ana m. j. capill. Ven. polytrichi ana m. β. seminis anisi, carui, dauci ana ℥ j. semin. quatuor frigidorum maiorum ana ℥ j. gran. alkachenginum. v. j. cicerum rub. ℥ β. hordei mund. p. j. glycyrr. rasa ℥ v. j. coquantur in vino Rheneri, & aqua communis in duplici vase ad horas quatuor, pro ℥ j. β. colatura adde syrupi de byzantiis de cichor. Nicolii, cum rhabar. mellis ros. colati ana ℥ j. syr. ex i. fus. ros. ℥ β. misce. fiat apozema. Rursum fuit reiteratum in fine Augusti & 3. ac 6. Septembris. Bolus quoque super scriptus adhuc semel exhibitus. Et hic fofus circa pudendum, ad vias urinarias ampliandas, extrad althæa ℥ iij. caput. liliorum alb. num. v.

foliorum malua m. vj. florum meliloti, chamomillana
m. ij. pariet. m. iij. summitat. anethi, absinthii commu-
nis ana m. j. β. feminis fœnug. ℥ j. sem. malua ℥ ij. co-
quantur in aqua communi in duplici vase q. s. ut lb.
14. remaneant, non solum pro fotu cum spon-
gia, sed in fessione. Qui fotus rursus reiteratus 21.
Septemb. die. Die 1. Septemb. post fotum hæc olea
præscripta, quibus & penis & perineum inunge-
bantur: ℥ olei anethini, chamomillana ℥ j. Deci-
motertio Septembris, ad maiorem apertionem
mane cyathum vnum huius decocti. sumebat: ℥
feminis dauci, gemmarum ribes nigra ana ℥ j. co-
quantur in lb. iij. vini Rhenensis in duplici vase ad 2.
horas. Cum autem per duas tresve dies cepisset,
maxime incaluit, & lotium prouocabat, ac sudo-
rem. Verum lotium ex eo tingebatur, subsequen-
te febre. Quare ab eo decocto abstinuimus ad tē-
pus. Sed non redibat, cum tantum ephemera fe-
bris videretur. Postea aliquot diebus intermissis
hoc decoctum præscripsimus iterum: ℥ feminis
dauci, gemmarum ribes nigra ana ℥ j. coquantur in
vino pro lb. j. arom. cum ℥ j. β. cinnamomi selecti, &
dulcoretur cum Saccharo, & fiat claretum. Verum
cum per duos tresve dies bibisset, iterum incaluit
& febricitare videbatur: quare & tunc quoque a
decocto abstinuimus, etiam a fotu propter calo-
rem. Et cum amplius non febricitaret, lotiū quod
parum tinctum mingebatur, rediit ad pristinum
statum, & bonum colorem. Interea mandauimus
ut fomētis relictis, inungeret penem in balneo. o-
leis sequentibus: ℥ olei scorpionis ℥ j. olei amygd.
dulc. liliorum, anethini, chamomellini ana ℥ iij. misce.
atque illud oleum 16. Septemb. descriptum fuit.
Interea per totum morbi decursum, si alius du-
rior resisteret, & sua sponte non flueret, balano
vel clysteri saltem irritabamus, balano tamen po-
tius, cum nostri omnes fere ægri in hac re nasuti,
potissimum in nostra patria, clysterem auerser-
tur. Verum, quod ad opus chirurgicum seu ma-
nuale attinebat, chirurgus lithotomus Guilelmus
de Dalen candelas cereas albas, quibus parum te-
rebinthinæ immixtum erat, paratas habebat, lon-
gitudinis 12. digitorum transversorum, crassitu-
dinis vero prout meatus vrinarius ferre posse vi-
debatur. Eas autem pharmacopœus in rectum
nostrum vsu parabat, quas chirurgus sequenti
vnguento immergebat, vel oblinebat, & bis in die
imponebat. Vnguentum illud erat ex libro primo
pag. 20. de secretis D. Alexii Pedemontani ad vl-
cus sanandum carnosum, etiam si fuerit inuetera-
tum. Cuius hæc erat descriptio: ℥ feces ex melle
destillato, vel his deficientibus sumito mellis ad in-
stam crassitudinem cocti: deinde ponito in ollam ad
cremandum vel in figuli, vel vitriarii fornace, donec
auri colorem assumat. Hæc materia valet ad o-
mnes plagas; nam carnem putridam atque mor-
tuam consumit, postea mundificat & absque vlllo
dolore persanat. Qua de causa ad sanandum pla-
gas, multo melior est, quam æris flos præcipitati,
quo plurimi chirurgi ad eundem affectum vtun-
tur: ℥ igitur huius pulueris ℥ j. stercoris canini ℥ ij.
tartari albi ℥ β. sacchari albißimi, aluminis vsti,

tutia ana ℥ j. terantur omnia atque cribrentur. De-
inde, ℥ foliorum oliuæ recentium, contundantur
in mortario lapideo optime, adiciendo parum vini
albi: postea bene expresso succo, addatur tantundem
succu plantaginis, ponaturque ad ignem; infundendo
paulatim prædictos pulueres, atque continuo miscen-
do: postremo parum cere viridis adiungatur, parum
mellis rosæ fiat vng. molle, atque in vsum seruetur. Est
autem valde pretiosum ad carnem consumen-
dam, consistentem præsertim in locis valde sensi-
bilibus, quæ fortia medicamenta respuunt pro-
pter dolorem. Modus vero vtendi huiusmodi est.
Syringa parua vino albo impleatur, in quo rosæ
siccæ & folia plantag. cocta, deinde parum lactis
mulieris vel caprini adiectum fuerit, ponatur in
virgam, quæ ex vino optime lauatur; deinde mu-
cronem candelæ cere longæ ac parvæ; ut virgæ
meatum ingredi valeat, sumito: in eius mucrone
prædicti vnguenti parum affigito, atque in virgā
candelam prius calefactam, ne frangatur, per par-
uum temporis spatium immittito, quousque ad
vlcus pertingat, atque vnguentum ibi relinquat.
Hoc bis in die faciendum, mane scilicet & vespere.
Atque cum hæc administrantur, ægrotus in lecto
supinus recumbat; & sic admirabilem effectum
videre licebit: nam paucis diebus absque vlllo pe-
riculo æger sanabitur. Hoc vnguentum lithoto-
mus Guilelmus parauit, & bis in die cum candela
cerea, non tamen calfacta, imposuit: at non vte-
batur decocto illo per syringā ex ros. siccis & fo-
liis plantaginis: sed post septimanam, cum vsus es-
set illo vnguento, antequam candelam impone-
ret. 10. die Septemb. per syphonem vel syringam
ex hoc decocto semel, aut bis intus colluebat vir-
gam, iniiciendo decoctum, quod in officina hoc
modo fieri mandavi: ℥ agrimonia, betonica, fo-
liorum lauri, centauriana m. j. florum ros. meliloti
ana p. j. decoquantur in vino & aqua parietariae pro
lb. j. colatura addendo alum. vsti, myrrha tartari-
ana ℥ j. tutia ℥ β. mellis ros. ℥ ij. misce. Hoc reitera-
tum fuit 22. Septemb. Interim dum candela ce-
reo vnguento intincta imponderetur, subinde ca-
thetere prius inuncto oleo oliuarum tentabat,
nunquid ad fundum colli vsque in vesicam transi-
re & peruenire posset. Amatus autem cathete-
rem inungebat oleo amygd. dul. Ceterum bis aut
ter cum dolore emanante paucis sanguine con-
creto, capiti vel fini inhiærente ipsius catheteris,
tandem cathetere in vesicam vsq; imposuit; de-
inde rursus ad candelā ceream redibat. Ceterum
cum adhuc parum proficeremus, quamuis can-
dela cerea magis intromittebatur, minusque re-
sisteret, vtilius duxi, ut cerato Amati vteremur; cu-
ius descriptionem cum chirurgo ostendissem, o-
ptime illi placebat; quare hoc ceratum pharmaco-
pœo conficiendum commisimus. Paratur autem
hoc modo: ℥ viridis æris, aur. pigmenti, vitrioli, a-
luminis roche ana ℥ j. omnia hæc aceto acerrimo
perfusa inter duos porphyrites lapides, quam ac-
curatissime ducantur, in læuoremq; tenuissimum
reddantur, & soli æstuali exponantur. Hæc rursus
sic exsiccata aceto affuso ducenda sunt, & læuiganda,
solique

11. solique exponenda, quousq; puluis subtilissimus euadat, & a medicamentis suis prorsus acrimonia extincta sit: quod opus octo dierum spatio conficitur. Hoc confecto & parato puluere. *℞. olei ros. ʒ. iij. litharg. ʒ. ij. ad ignem fiat coctura, quousque emplastri modo corpulenti adquirat substantiam seu consistentiam:* tunc ab igne deposito adde prædicti pulueris ʒ. ij. & rudicula vel spatula misce, & ad ignem omnia tractato, quousque medicamentum duriusculum euadat: ita ut si candelæ cereæ, vel plumbeæ virgulæ hæreat, non diffuat, etiam si digitis tractetur. Imperauimus autem, ut dimidium huius pharmacopœus componeret. Ceterum chirurgus suo adhuc utebatur vnguento, cum candela cerea; donec aliud, quod nunc diximus ex Amato, præparabatur. Et ita 29. Septembris iterum imposuit: instrumentum argenteum, super quod calculi incidi solent, media parte excavatam, vsque in collum vesicæ; & cum maximo dolore eo penetrauit, & iussit, ut instrumentum intra intus permaneret per integram horam: eoque extracto vrina melius profluebat. Antea vero neque catheterem neque hoc instrumentum vsque in vesicam imponere potuit. Ceterum instrumento iam dicto extracto, iterum imposita fuit candela cerea vnguento delibuta ad tempus permanens, eaq; extracta, antequam mingeret, non solum ramenta, sed & purulenta materia exire cœpit, & purulentia ipsi candelæ adhærebat. Post aliquot tempus iterum immissa candela: & ut diutius ea intus permaneret, ut etiam cum ea ambularet, eaque rursus extracta sæpiusque rursus imposita processit. Altero die, qui erat 30. Septemb. chirurgus iterum imposuit catheterem, & melius ingrediebatur: mox aliud illud instrumentum argenteum solidum media parte excavatam, ut diximus, intromisit: non tamen sine dolore, ut antea: sed non diu tunc retinuit illud instrumentum in meatu urinario; eoque extracto, bis per syphonem collyrium antea descriptum iniecit, & ex acredine eiusdem æger sensit dolorem. Postea emissio collyrio iterum candelam more solito, ex nostro consilio imposuit, delibutam cum vnguento seu emplastro suo. Primo die Octobris, cum ego peregre profectus essem in pagum quendam nomine Sassen, inter Leydā & Harlemum situm, ad Adamum Pynson ex febre syncopali laborantem: Chirurgus imperauit ut candelam ceream, (quam nunc immittebat adhuc in suo vnguento, nunc deficiente) ipsemet æger imponeret. Sed cum deficeret eius vnguentum, ex decocto hoc ipsum, quod cum syphone immittebatur, nimis aquosum nunc redditum est ipsum vnguentum, quare minus candelæ adhærebat. Hinc imposita candela, cum diu per horam inhæsisset liquefacta, extrahi non potuit: quare accersito chirurgo, is tandem per funiculum candelæ iniectum & alligatum, candelam ipsam ceream extraxit, intus tamen aliqua portione ceræ eliquatæ remanente, quam tandem postea cum lotio eminxit. Verum tunc candelam ceream vix potuit imponere, ob ardorem vrinæ, quam contractum putabam ex

puluere corrorente immisto, & decocto, tum etiam ob catheterem vno die pluries impositum. 14. Neque placebat mihi ista frequens impositio argentei instrumenti. Cum itaque reuersus essem, ad ardorem vrinæ tollendum, qui supra modum vehemens erat, mandauit per syphonem iniici lac ouillum cum aqua ros. & aqua albuminis oui immixta. Die secundo Octobris, post impositionem instrumenti inuncti oleo sequentibus. *℞. olei ros. amygdal. dulc. ana ʒ. iij. etiam imposuit chirurgus candelam ceream vnguento non delibutam, sed tantum oleo superscripto inunctam. At iussit chirurgus, ut catheterem ita impositum æger tam diu retineret quam posset, & retinuit per duas horas. Et cum eo modo dolor ac ardor aueretur, ut illa mitigarentur, & meatus relaxari posset & ampliari, ut sequens decoctum omni mane sumeret præcepi. *℞. rad. glycyrrh. malua, ana ʒ. ʒ. foliorum maluar. m. ij. semin. quat. frigid. maiorum, ana ʒ. j. coquantur in aqua communi pro ʒ. j. colatura, adde mellis ros. colati ʒ. iij. misce. deinde decoctum sequens ad eandem intentionem ter quaterue vel pluries per syphonem iniiciebatur. *℞. rad. malua ʒ. j. rad. glycyrrh. ʒ. ʒ. fol. malua m. ij. sem. malua ʒ. j. b. sem. quatuor frigid. maior. ana ʒ. ʒ. coquantur in aqua communi pro ʒ. j. colatura adde syr. ex infus. ros. ʒ. j. misce, pro syringatione. Et tunc dolor mitigabatur. Die sequenti, qui erat tertius dies Octob. 15. cum Guilielmus de Dalen chirurgus & lithotomus peregre profectus esset, ac negotium filio suo commisisset, is cum mane catheterem imponere vellet, non potuit; vnde per syphonem decocto superscripto prius iniecto, candela cerea oleis prius intincta difficiliter quoque immittebatur per filium. Quare cum post primam horam a meridie iterum tertio die Octobr. filius non satis dextre forte diutius catheterem immisisset, ac per horam ægrum detinisset, eo quidem extracto incidit in dolorem intolerabilem, adeo ut subsequuta sit ischuria, & nihil potuerit mingere. Quare cum subito ad illum accitus essem, ac ibidem ad manus reliquæ ex fomento vltimo præscripto adhuc essent, herbas ipsas cum reliquiis contusas supra pectinem & perinæum calide imponi iussi. Nam ex dolore vehementi frigidum sudorem emittebat, & rigeat, ut sine febre non esset; etenim pedes ita frangebant ad genua vsque, ut calidis linteis impositis ac puluinarum calido pedibus supposito, vix cal fieri potuerint. Tandem ex continua impositione cataplasmatum, & totu 16. rursus adhibito, cum dolore & maximo ardore minxit, adeo vehementi, ut in lecto permanere non posset. Postea ad sedandum dolorem per syphonem decoctum superius scriptum iniici mandabam. At quamuis ex eo lotium redderet, dolor tamen post reiectum lotium permanebat: ita ut per catheterem fortius immissum, & diutius retentum corrosionem esse factam proculdubio coniectarem, ardore vrinæ adeo hominem infestante, ut syncopen & mortem vereretur. Quare cum hæc iniectio non satis iuuaret, lac muliebre, ut iniiceretur per syphonem, præcepimus. Cum neque***

hoc quicquam iuuamenti adferret, *lacti adieci pul-*
uerem trochisc. alkachengi. Sed omnibus istis dolor
 17 non mitigabatur. Quare & in nocte ex lecto sur-
 gens vltro eum accedens, per os ad refrigeratio-
 nem & dolorem consopendum hordeatum se-
 quens propinaui. *℞. hordei mundati. p. j. amygdal.*
dulc. excorticatarum ℥ j. sem. quat. frig. maior. mund.
sem. pap. albi, ana ℥ j. fiat emulsum pro ℔ j. & zac-
charo ad saporem dulcoretur. Deinde etiam conti-
 nuo frigide emulsum quoque sequens iniici
 per syphonem quoque iussimus. *℞. semin. 4. frig.*
maior. sem. pap. albi, ana ℥ j. ℔. confusa, cum aqua hor-
dei mundati, cui etiam incoxerint leuiter *sem. coto-*
neor. ℥ j. fiat emulsum pro ℔ j. pro syringatione.
 Quibus dolor paulatim cessabat, quamquam in-
 mingendo ardorem aliquem & dolorem sentiret,
 sed nullo modo cum præcedente comparan-
 dum. Eodem tempore præcepimus, ut renes tum
 lumbi inungerentur *vng. ros.* & incepit dormire,
 dolore utcunque sedato. Mane tamen die se-
 quenti, circa tertiam horam rigorem quendam
 habuit, leui subsequente febre. Verum mane circa
 septimam horam, cum denuo illum inuiderem,
 qui erat quartus dies Octob. pulsus erat remissior;
 18 acetiam melius se habebat. Extollebat & valde
 commedabat vltimam illam syringationem, tum
 hordeatum, ita ut diceret si iis non usus fuisset, il-
 lum iam mortuum præ dolore repperissem. Quar-
 to die Octobr. rursus sub noctem reiterauimus i-
 dem hordeatum. Et quinto Octobr. ne ex dolore
 materia aliqua ad locum affectum tum vias vrina-
 les conflueret, ac denuo febris subsequeretur aut
 inflammatio, hunc bolum cassiæ dedimus. *℞. cas-*
sia recens ex cannis tracta ℥ x. pul. sem. anisi, trochisc. al-
kachengi, ana ℔ ℔. zaccharo candi dicto albissimo asper-
so, fiat bolus. Quo optime excreuit, nec amplius
 febrem passus est, aut rigorem habuit, & dolor
 paulatim tum ardor vrinæ cessarunt. Die septimo
 Octobris, chirurgus iam reuerso, is denuo leuiter
 catheterem immisit, deinde singulis diebus im-
 missa candela, linita cum vnguento Amati, quod
 nunc paratum erat, procedebat: & singulis diebus
 optima fiebat operatio; ita ut post tres dies opti-
 mam faceret corrosionem, carnem illam intus
 latentem spongiosam paulatim corrodendo &
 consumendo; ita ut æger deinde paulatim sordi-
 tiem valde copiosam cœperit emingere, per dies
 sequentes, vsq; ad finem curationis ita proceden-
 do. Verum nono die Octob. euocatus fui Alcma-
 riam ad Augustinum Teylingium, filium Floren-
 tii Teylingii sororii mei, & redii 15. die Oct. tunc
 iterum præscripsi *bolum ex cassia, cum pul. trochisc. al-*
kachengi, ut supra dictum est, ad mundificandum
 19 vias vrinales. Decimo vero sexto die imperaui, ut
 sæpe ex syrup. sequenti sumeret. *℞. syr. de limonib.*
ex infus. ros. rub. non autem pallid. an. ℥ iij. capiebat bis in
die cochlear vnum atque alterum. Decimo octauo
 die Octobris, cum paulatim illius excrecentiæ fie-
 ret corrosio, ex candela sic immissa, ut pus exi-
 guum semper per lotium redderet, ad lotium ma-
 gis prouocandum, cum amplius neque ardore vr-
 inæ neque dolore afficeretur, & ad ampliandum

meatus vrinarios, & ad vlcus detergendum, se-
 quens decoctum fieri mandauit. *℞. rad. petros.*
fœniculi, glycyrrh. rasa, ana ℥ ℔. charesol. petrosel. pa-
rietaria, agrimonia, ana m. j. hordei communis non ex-
corticati p. j. sem. dauci, fœniculi, ana ℥ ij. granorum
alkachengi, num. vij. cicerum rub. ℥ ℔. sem. quat. frigid.
maior. ana ℥ j. coquantur in aqua communi pro ℔ j.
℔. colat. adde syrup. de byzantiu sine aceto, syrup. ex in-
fus. ros. syrup. de limonibus, ana ℥ j. misce. capiebat ter
in die, mane hora vij. & hora i v. pomeridiana, & ve-
 20 *speri hora decubitus.* Vigesimo Octobris die chi-
 rurgus iterum catheterem imposuit, & nullam
 tum sensit carnem spongiosam aut excrescen-
 tiam carneam, & libere ac sine vlla molestia ca-
 theter descendebat vsque in vesicam. Et ex de-
 cocto vltimo præscripto vrina optime reddeba-
 tur, ac libere exhibat, meatu magis aperto, & non
 ita tenuiter ac strictim, ut prius profluebat; & vlcus
 quotidie magis ex eodem decocto detergebatur.
 Et tunc iussimus, ut idem decoctum rursus phar-
 macopœus pararet, addendo *rad. lappa maioris &*
ononid. ana ℥ ℔. aromatizando cum ℥ ij. cinnamomi
electi, sine clarificatione, ut magis detergeret, adie-
 cto quoque vno exiguo capite allii. Chirurgus au-
 rem, ut referebat, solebat addere in similibus de-
 coctis, *tria capita allii,* ad maiorem vrinæ prouo-
 cationem: & miraculi instar tale decoctum iuuab-
 at. Nos tamen vno capite allii, eoque exiguo
 contenti fuimus, ne ex calore allii febris denuo ac-
 cederet: nam prius ob dolorem in febrem incide-
 rat. Vigesimo primo Octobris iterum, idem de-
 coctum paratum fuit; allii quoq; capite, ut prius,
 21 adiecto. Quod rursus eodem modo sumsit. Vige-
 simo quarto Octob. hoc decoctum ad vlceris de-
 terfionem & repurgationem descriptum fuit, quod
 per syphonem iniiciebatur. *℞. hordei non excorti-*
cati, agrimon. ana m. j. aristoloch. rotunda ℥ ℔. co-
quantur in aqua communi pro ℥ ix. colat. adde mellis
ros. colati ℥ ij. ℔. misce. iniiciatur cum syphone. Vige-
 simo quinto Octobris iterum *bolum cassia cum tro-*
chisc. alkachengi exhibuimus; & per syphonem rur-
 sus decoctum iniiciebatur, & incepit vlcus opti-
 me detergi. Et tunc concessimus lac ouillum, et-
 iam bubulum; & fuit probe curatus. Interea ta-
 men cum domum iam sanus repeteret, si forte
 sordities aliqua iterum per penem cum lotio eii-
 ceretur, dedi eidem in scriptis decoctum, quod
 per syphonem iniiceret, atque id negotium com-
 mitteret cognato meo Ioanni Teylingo Alcma-
 riano medico, qui etiam illum ante nos aliquan-
 do præmanibus habuerat. Deinde si opus esset,
 ad maiorem consolidationem & cicatricem indu-
 cendam, ut tunc decoctum sibi parari iuberet
equiseti plantag. cum melle ros. & postea illud quod
sequitur: ℞. cerusa ℥ j. litharg. aluminis roche, an. ℥
ij. cum aqua canda equina, fiat decoctum. Eo vitur A-
 22 *matius, sed pondus non apponit: potest ad ℔ ij. vel*
paulo plus fieri, decoquendo ad medietatem, &
per manicam lanceam traiectum & colatum, ut sit
magis clarum, & cum syphone iniici. Dedi quo-
 que consultationem in scriptis, si forte materiam
 crassam aut fœtidam cum mictione reiiiceret,
 cum

cum dolore colli vesicæ aut renum, ut tunc vteretur destillatione a Montano commendata Consultatione 82. ad similem casum conferente. Quæ ita componitur. ℞. pentaphylli cum rad. & foliis, iij. granor. alkachengi ℥ j. agrimon. m. ij. verbenæ ros. siccar. ana m. ij. limonum minutim confusorum simul cum corticibus suis, num. iij. contendantur omnia grosso modo, & aspergantur cum ℥ viij. infus. ros. postea distillantur per alembicum vitreum, vel per balneum, deinde in usum referuetur, de qua dentur mane duo cochlearia, vel ℥ v. ut Montanus facit. Syrup. de cicorio Nicoli sine rhubar. syrup. myrtini ℥ j. misce. usus est pro materia crassa & fœtida per urinam cum dolore renum exeunte. Si vrina fortasse rursus retineretur, & non satis proflueret, denuo redeundum ad decocta aperientia ex rad. lappæ, ononidis, &c. Verum postquam curatus esset, atque in patriam redisset, nulla accidentia reuerterunt, & egregie sanatus permansit, & optima deinde fruebatur valetudine, ita ut non solum excrescentia carnis supradictis præsidis fuerit ablata, & iam libere mingere posset, & hymenæo operam dare, obstructione excrescentiæ carnis in totum assumpta, sed etiam ab omni dolore & ulceratione liberatus, ut vix eo domū reuerso vxor etiam imprægnata fuerit, ac demum infantem pepererit, & deinde etiam annis subsequenibus plures proles, cum maximo gaudio & solatio, etiam superstites viderit. Laudet Deus, qui seruos suos hoc dono sanationum condecorauerit & illustrauerit.

S C H O L I A.

24 S Emper fecit illi, qui gonorrhœam diurnam patiuntur, in prædictis locis habere solent ulcera, quæ nisi cito curentur, in ipsis spongiosa crescit caro, ut aliis euenire percepimus ulceribus: quæ spongiosa caro, quo minus homo libere mear & hymenæo operam det, sua obstructione in causa est: ita enim urinæ meatus seu penis carunculis iis obstruitur, ut vrina difficulter excernatur & semen non eiacularur, uti huic nostro ægroto euenit, & apud Amatū Galterio Partinopolitano, ut ad longum videre licet curat. 19. centur. 4. cuius emplastro etiam in nostro ægroto magna cum experientia & utilitate recte vli sumus, quod merito huius Lernæi & Herculei morbi claua existit, & hymnis multis & laudibus variis decantari meretur: nec solum huic morbo prodest, sed varios alios arcet & explodit. Nam polypos vnice curat, & extuberantes carnes in aurium meatibus & aliis locis repertas vnice extirpat & refecat. At scribit Amatus septimo die in ægroto suo defecisse, & cognouit carunculas ex toto extirpatas esse, ex tribus quatuorue signis: primo quod candelam iam facile penetraret. Secundo ex multitudine caruncularum & humoris purulenti effluentis: tertio ex urinæ eiaculatione: facile enim & expedite, copioso ac recto tramite vrina emittitur, carunculis ipsis absumentis: neque minori facilitate semen genitale emittitur: quibus adde mordicationem, quam æger ob exulceratam particulam perferent. Et quamvis septimo die in ægroto Amati prius cognouerit ipse Amatus, ex signis iam

dictis, defecisse carunculas: in nostro tamen ægroto, difficilime laborante, opus fuit remediis circiter tres menses uti, antequam ad perfectam curationem deueniremus, cum in nostro ægroto malum inueteratum, & valde diuturnum fuerit: ideoque ægre admodum extirpatum est. Non obstante, quod refert idem Amatus, quod quidam Helias mercator, qui ex Aulone Anconam venerat, carunculas in urinaria fistula patiens, & difficulter urinam reddens, ut etiam illa virga curua ob morbum facta fuerit, ut liberis operam dare non posset, tamen per illum tractatus, intra sex dies ex emplastro iam dicto, libere & directe urinam emisit. Noster quamvis tardius emplastrum opus faceret, belle tamen curatus fuit.

O B S E R V A T I O XI.

De Stranguria in ischuriam transiunte.

1 S Tranguria, ut antea diximus, aliquando in ischuriam permutatur; quemadmodum euenit cuidam Gallo Pithuerensi, Anno 1545. mense Octobri, cum in Gallia praxin exercerem ex Italia reuersus. Plurima a vulgaribus tentata sunt remedia, quamvis frustra, cum iam quartus dies instaret, quod lotium non reddidisset. Post glandem iniectam, aluo soluta, hoc fortu adhibito, & emplastro appposito minxit. ℞. nasturtii aquatici, parietariae, surfuris in nodulo ligati, & inter coquendum sæpius expressi, folior. malvæ, ana m. ij. coquantur in vino albo, quo iussimus, ut pecten fomentaretur: reliquis decocti contusis cum butyro mixtis etiam apposisis statim minxit. Alteri vero, cui feces duræ in intestino subsisterent, cum enema emolliens iniiecisset, mox urinam per duos fere dies retentam reiecit. Huic similem casum refert Dodonæus cap. 47. de urinæ retentione propter feces in recto intestino hærentes. Retinetur quoque (inquit) vrina duris fæcibus in intestino subsistentibus: comprimuntur enim ab his vesicæ ceruix, qua compressa vrina retinetur. Atque idcirco dum exoneratur aluus, vrina tum demum procedit, cum rectum intestinum liberum est. Nobilis vir LX. annos compluerat, cum triduo vrina illi via præcluderetur, nullo lotio succedente: huic balneum, mox enema profuit. Emollitis siquidem atque expurgatis alui excrementis, mox vrina successit. Et ita paucis horis est liberatus, cui vrina suppressio totum triduum fuerat molestissima. Quando vrina supprimitur, & reddit nequit, sæpe non expedit, diuretica medicamenta propinare. Nam quo plures humores ad vesicam perueniunt, hoc amplius distenditur, & minus exonerare sese potest. Laxiores & patentiores vesicæ meatus reddi præstat, quod & fomentis & infusibus siue balneis efficitur. Quod si vero & feces intestino recto hæreant, has vel maxime educi enemate refert, quod non solum feces educit, sed & fomenti loco esse potest. Incumbit vesicæ colli superior pars recto intestino: proinde & hoc fecibus grauato, urinæ via præcluditur. Si vero feces adeo duræ fuerint, ut enema immitti nequeat, primū balneo vtendum; deinde nonnihil emollitis fecibus, enema adhibendum, veluti huic nostro ægroto, tum

leni apud Dodonæum contigit: & præcipue huius lenis feces adeo duræ in recto hærebant intestino, ut canaliculus clysteris immitti, priusquam balneo vlus esset, nequiverit.

S C H O L I A.

- 3 **D**E stranguria ac dysuria satis diximus: verum quod ad ischuriam attinet, hoc symptoma vesicæ insuper velut urinae receptaculo ac meendi instrumento superuenit, quod Græcis *ισχυρία*, a Latinis *suppressio urinae* dicitur; quin imo ipsi soli proprium est, Galeno teste 6. de loc. affect. Quod vero ischuria (ut etiam Donatus annotavit) urinae suppressæ affectionem significet, ipsum nomen declarat. Agris enim in totum in hac affectione urina supprimitur, ac cohibetur, ut liquet ex Aetio cap. 21. lib. 4. Quamquam nos ex Galeni sententia una cum Donato, non quamlibet urinae suppressionem, seu cohibitionem, *ισχυρία* appellamus, cum dixerimus, eam solius vesicæ proprium esse symptoma; sed illam duntaxat, in qua in vesica supprimitur urina. Supprimi nunquam potest urina, ipsa vesica haud quaquam affecta, sed renibus, vteribus, eodem Galeno teste 1. de loc. affect. Verum hanc urinae detentionem seu cohibitionem, licet vulgus medicorum non secus *ισχυρία* vocet, *ισχυρία* tamen non est, si proprie loquamur, cum videlicet urina in vesicam non veniat, ut liquet ex Gal. 3. de caus. symptom. Permittendi tamen sunt (ut ipse inquit) ita nominare, cum propriam eius affectionis appellationem non habeant. Non tamen latere debet amborum affectuum differentia: si quidem alter eorum est, cum vesica quidem est plena, sed nihil excernitur: de quo modo tractare intendimus: alter cum vacua est, nihil omnino in se continens. Ea de re diximus veram ischuriam esse omnimodam urinae retentionem vel cohibitionem in vesica, quæ sola & necessario in hac affectione laborat, quoniam propria eius actio, quæ est urinae excretio, oblata est: adeo, ut ab ea nihil excernatur, tumorque aliquis apparebit in pube satis evidenter in circumscriptione vesicam impletam esse ostendens, ut liquet ex Galeno eodem 1. de loc. affect. Quod vero symptoma sit in genere retentorum immodice, testis est idem Galen. lib. de diff. & 3. de causis symptom. Bisariam retinetur ac supprimitur, iuxta Galen. 3. de caus. symptom. ac 1. ac 6. de locis affectis. Vel occlusum est eius os, vel si hoc se pro lege naturæ habet, ipsa ad se adstringendam, ac lotium foras extrudendum est imbecilla. Vel enim plena supprimitur, interim novam propriæ functionis eius consequitur, quoniam præter eius imbecillitatem non valet se ipsam contrahere, ac urinam foras propellere: interim vero eadem illæsa existente, occluso tamen eius ore, efficitur, ut postea de causis clarius adhuc patebit.

OBSERVATIO XII.

De ischuria quatuor diebus perdurante.

1 **L**ucas Theodorus Delphensis, quondam calcarius; at nunc apud Anglos aliquot annis hærens, factus erat mercator insignis. Hic equidem calculo laborans, subinde Anno 1567. circa

mensis Nouembris initium, incidit in urinæ suppressionem, partim ex materia mucillaginosa, pituitosa, partim etiam ex calculis collum vesicæ oppilantibus, & meatum urinarium occludentibus, cum intolerabili dolore circa vesicam; eaque ita oppleta urina, ut tumor satis evidenter apparet in pube, sua circumscriptione vesicam impletam esse ostendens, adeo vehementer, ut ad desperationem laboraverit: & nunc quartus erat dies, cum ego ad illum accitus fuero, ex quo lotium non emisisset. Tractabant illum & Cornelius Ericius meus collega, & Guillelmus de Dalen lithotomus, de quo etiam observatione præcedente mentionem fecimus. Cum vero nullis remediis, & glande, clysteribus, ac purgatione tum aliis subsidiis, ab iisdem adhibitis lotium dimittere non posset, hoc sequens decoctum tum inunctio ac sacculi communi consilio descripta sunt. *℞. rad. malua, glycyrrh. rasa, ana ℥vj. folior. malua, parietaria, ana m.ij. fol. viol. m.j. ℞. capill. vener. polytrichi, charefolii, agrimonie, ana m.j. sem. malua ℥j. ℞. sem. 4. frig. maior. ana ℥j. cicer. rub. ℥℞. hordei mundat. p.j. ficuum ping. num. v. iuiubar. num. vij. passul. ab arillis purgat. p.j. fiat decoct. in aqua communi pro ℥ss j. ℞. colat. add. syrup. de bizantiis ℥ij. syrup. capill. vener. ℥j. misce. Pro apozemate capiebat bis aut ter in die. *℞. olei de mucil. olei de meliloto, scorpionis. ana ℥℞. misce. inungatur pecten, perinæum, deinde sacculi in vino Rhenano decocti & expressi calide pectini vicissim imponantur. *℞. rad. althæe ℥iij. folior. malua, viol. ana m.ij. parietaria m.ij. florum chamamelii, meliloti, ana m.j. ℞. charefolii m.ij. sem. malua, althæe, ana ℥ij. seminis fenugraci & lini parum conusti, ana ℥℞. concutienda concutiantur, & incidenda incidantur, & fiant duo sacculi quadrati intersuti, latitud. octo digitorum, & longitudine decem digitorum. Verum cum neque istis remediis lotium redderet, ex dolore vehementiore ad maximam imbecillitatem devenit. Quare & hoc condito præscripto communi consilio, utebatur. *℞. conferva borag. ℥vj. conferva. capill. ven. ℥ij. specier. latific. Galeni ℥j. ℞. conferva. buglosse ℥ij. cum syrup. de duabus radicibus, fiat conditum. Capiat sæpissime. Sub noctem vero, cum iterum adhiberetur fons cum sacculis, & inunctiones fierent ex oleis prædictis, & nihil iuvaminis inde subsequeretur, & in nocte graviter cum intenso dolore affligeretur, & ne guttam quidem lotii reddere posset, ad eum nocte evocati sumus: Guillelmus lithotomus immisso cathetere aliquid lotii, sed crassioris, prolextavit. Etiam mane octavo Nouembris die, paulo plus minxit: quamquam ilico rursus retineretur urina. Ideo rursus adhibitis sacculis, etiam hoc apozema præscriptum est, & emolliens clyster iniectus. *℞. rad. petroselinii, feniculi, brusci, asparagi, malua, glycyrrh. rasa, ana ℥℞. capill. vener. polytrichi, ceterach, betonica, agrimonie, malua, parietaria, charefolii, ana m.j. seminis anisi, feniculi, petros. ana ℥j. ℞. sem. saxifrag. miliis solis ana ℥j. sem. quat. frig. maior. ana ℥℞. granorum alkachengi. num. ij. fiat decoctio in aqua communi, & vino Rhenensi partibus equalibus, in duplici vase, pro ℥ss j.*****

Quid per ischuriam intelligendum.

Duplex ischuria.

De qua hic tractatur.

Quæ pars in ea afficiantur.

Quæ affectus præter naturam.

Causæ.

lib. j. col. adde mellis ros. colati 3 iij. aromat. cum 3 ij. cinnam. selecti, & fiat ad modum clareti pro quatuor dosibus. Sacculi iterum impositi sunt. Verum cum rursus vrina præ sua crassitie & materia viscosa, & ob arenulas detineretur, cathetere iterum immisso paulo copiosius vrina admodum crassa fluxit: quamquam postea iterum detineretur. Post duos deinde tresue dies admodum debilis euasit ob continuos & præcedentes dolores: quare hoc ius restituitans præscriptum est. ℞. caponem flagellatum, deplumatum, evisceratumq; & incisum in minutissimas partes, capite abiecto, addendo conferu. borag. bugloss. ana 3 ss. conferu. viol. (quia febre non carebat, leui tamen, ob dolorem, vt arbitror) 3 iij. manus Christi cum perlis 3 ij. ss. cinnamomi integri valde odorati in frustra confracti 3 vj. vini Rhenensis limpidissimi lb ss. aqua malua 3 iij. decoquantur in duplici vase seu balneo maris, vt artus est, per octo horas, & fiat ius expressum seu restaurans, quo utebatur ad vires roborandas. Interea pro dolore, cum adhuc non bene nec libere mingeret, sequens cataplasma pectini impositum fuit: ℞. foliorum malua m. vj. florum chamomill. meliloti, ana m. iij. summitatum anethi tantundem, parietaria, mercurialis ana m. ij. rad. alibæ, liliorum alborum cum foliis, ana 3 ij. panis lini 3 iij. decoquantur in s. q. aqua: deinde contundantur, addendo oleorum lini, amygdal. dulc. lilior. ana 3 ij. dialibæ 3 iij. butyri recentis non saliti q. s. fiat cataplasma, secundum artem, & pectini supra regionem vesicæ, bis in die reiterando, continuo calide imponatur: sed loco affecto prius inuncto oleis sequentibus. ℞. olei lini, amygdal. dul. anethini, irini, ana 3 j. olei scorpionis 3 ss. misce, pro linimento. Et iterum deinde immisso cathetere, libere tunc lotium reddidit crassum & mucilaginosum. Verum post diem, cum iterum cataplasma apponeretur, odorem non potuit ferre, adeo vt in syncopen fere præ dolore incideret: ideo cataplasmate ablato, mandauimus vt chirurgus lithotomus frequenter inungeret cum oleis superscriptis; & continuando potionem supradictam, libere deinde semper minxit, neque lotium amplius detinebatur, ita vt victu deinde restaurante, ac emolliente & aluum mollem reddente curatus sit; renibus tamen inunctis cum vnguent. ros. & infrig. Galeni, cum in iis etiam calorem sentiret: & optime deinde habuit, licet ab astantibus pro deplorato habitus fuerat.

S C H O L I A.

6 **I**n ischuria prorsus vrina suppressitur; nec huius quicquam exit. Humor pituitosus & mucilaginosus ore vesicæ occluso hic in causa erat vrinæ retentæ. Ischuria autem nascitur, obstructione meatus vrinarii; imbecillitate excreticis, intemperie. Obstructio fit vel cum collum vesicæ tumescit, vel induratur extra naturam, adeo vt via vrinæ claudatur: vel cum ibi aliquid præter naturam generatur, vt tophus, caruncula, vel tuberculum, cuius exemplum posuimus obs. 10. huius lib. quamuis non ex toto vrinam retinuerit; sed si totum meatum occlusisset, iam nihil vrinæ effluxisset: vel aliunde confluit aliquid in illam cauitatem, vt gru-

mus, lapis, vel etiam crassus humor, vt hie erat. Occluso etenim eius ore, seu meatu, quem vrinæ fistulam vocant, vrinæ si suppressio fiat, in vniuersum tribus modis quidam fieri volunt: aut enim corpus ipsius in tantum tumorem attollitur, vt meatus inde occupetur, quemadmodum si inflammatione, scirrho vel abscessu, vel alio quouis tumore fuerit affectum. Interim & clauditur propter meatus continentiam, ex nimia siccitate, aut aliquid ei præter naturam innascitur, velut caruncula vel callus. Aut a re quapiam obstruitur meatus, veluti a lapide, pure, grumo, vel crasso lentoque humore. Imbecillitas est ab intemperie, morbo organico, solutione continui, sæpe neglecta mediendi occasione, velut euerfa expultrice, ob copiam vrinæ immodicam: vnde etiam obturatur meatus. Sic nec vesica sese contrahere potest ad expellendum; nec si id fecerit, præcluso aditu vrina exire. Hinc quidam dicunt, quod vesica ipsa in lotio excernendo, imbecillis in has affectiones dupliciter reddatur: vel propter quampiam eius intemperiem, præsertim frigidam, vel obtuso eius sensu: ita vt laborans vesicam impletam vrina non sentiat, ob affectos eiusdem vesicæ neruos, citra tamē expultricis eius facultatis læsionem, cum videlicet proprie vesicæ nervi afficiantur. Tunc etenim immodice extenta ipsa vesica propter vrinæ multitudinem, quam in se contineri non sentit (interdormiendum potissimum) se ipsam contrahere non valet, nihilq; excernitur, contractrice eius facultate læsa, propter immoderatam tensionem: Id quod etiam interdum euenire solet aliis quibusdam tanis, cum vrgentibus negotiis, vel in concionibus, vel senatu, vel foro, vel conuiuio, vel propter aliquam similem causam longo tempore vrinam retinuerint. Fuit etenim vesica ipsa velut quodlibet aliud naturale instrumentum neruorum particeps, vt quæ molestiam sibi exhiberent, sensu quoque, velut reliqua dignosceret: quibus adeo affectis, vt torpeat vesicæ sensus, quod immodice repleatur, ac immoderate extendatur vesica, accidit: quapropter & contractrix eius facultas læditur, quoniam in se ipsam contrahi mediis transversalibus fibris, quibus in tali actione vtiuntur, haud quaquā potest. Quo fit, vt vrina suppressatur, nec excerni quicquam eius possit: citra tamen expultricis facultatis læsionem: namque ipsa expelleret utique, si contractrix facultas, quæ excretionem præcedit, suum munus perficeret; quippe vesicæ officium (vt pater o. de loc. affect.) vnicum est, contractio inquam. Imbecilla itaque redditur vesica in hac affectione, aut ad sese constringendam, aut ad lotium foras excernendum, eius corpore adeo affecto vt quod in ea continetur, exprimere non possit. Verum prima causa est immoderata extensio, propter immodicam repletionem, quinimo quantum amplitudo ipsius vesicæ expleta circumtenditur, tanto angustior se ipso fit meatus, vt ipse inquit Aetius. Reliqui vero causa est intemperatura aliqua, sæpissime autem frigida. Intemperies quoque a multa siccitate idem efficit, vt quidam volunt, vt in febribus ardentissimis & siccissimis.

Causa imbecillitatis.

Vesica bifaria in hac affectione laborat.

3

Causa.

Ex quibus causis vrina occludatur.

Ab intemperie.

OBSERVATIO XIII.

De ischuria in puero calculoso.

Pver quintum agens annum, filius Petri Teylingii cognati vxoris meæ, diu molestissimo vrinæ stillicidio detinebatur, accedentibus plurimis calculis in vesica, a quibus sæpe lotium in totum supprimebatur. Post multa & varia tentata remedia, mater, vt mihi narravit, *saluiam & galitrichum in vino Pictaviensi decoquebat: poculum vnum vini capiebat, & ad dimidium coquebat: ex quo decocto colato puer bis in die capiebat cyathum vnum, mane & hora quarta pomeridiana: & mox a suppressione vrinæ liberatus reddebat arenulas, & materiam pituitosam & glutinosam.* Neque alio deinceps remedio utebatur, si puer in idem malū recidisset: quo solo a difficultate & etiam retentione vrinæ semper euasit.

S C H O L I A.

2
Cur causa sint
diligenter consi-
deranda, & per
eorum signa di-
stinguenda.

Qui supra Rhasem scripserunt, tam causas illas, quæ proprio affectu ipsius vesicæ vrinam retinent, quam etiam illas, quæ aliorum membrorum defectu fiunt, vno & eodem modo explicant; vt & illas, a quibus vrina supprimitur, quæ omnium primo inuestigandæ sunt, tum affectus ipse, a quo hæc fiunt symptomata, & quæ affectæ sedes sint, quæ & sæpe obscuræ sunt. Necessè est igitur hoc symptoma prouenire, vel quia non attrahitur vrina; vel quia in vesicam non excipitur, vel quia a vesica non emittitur. Aliquando tamen auersione ad alias partes fit, vt ante rigores vrinæ suppressio fiat, vt *6. epidem.* In primo casu renum erit affectio, nempe cuius actio est, eius & symptoma, in secundo casu, meatuum deferentium: in tertio casu fistulæ vrinariæ dictæ. Sic etiam Fernelius de ischuria: *Vna, inquit, suppressæ vrinæ causa est astrictio vel obstructio. Hæcque vel vterumque amborum capita, vel vesica ceruicem opplet. Vtrum autem eorum in causa sit, certis notis peruestigandum. Si alterius duntaxat vterius via obstructa est, haudquaquam supprimitur vrina: per alterum enim elabitur: sed ambobus obstructis fit suppressio.* Nos tamen contrarium vidimus fieri, vno vterere obstructo retentionem vrinæ obtigisse, vt *observatione 29. precedentis libri ad longum contra Fernelium ostendimus*, in quo neque in pube dolor aut tumor sentiebatur, & vesica inanis ac vacua erat, adeo vt ne immisso quidem cathetere vrinæ quicquam emanaret. Quum vero obstructa vesicæ ceruix vrinam cohibet, assiduum meiendi desiderium premit, summusque sed irritus conatus est: pubes collectæ vrinæ copia distenditur, ac dolet: atque si catheter in vesicam inseritur, copiosior vrina impetu profluit, leuamentoque est. Obstructio, vt prius quoque dictum est, circa vterumque capita fere fit à calculis grandiusculis, qui pariter illis impacti sunt: raro vel ab humore crasso, vel a sanguinis grumo: rarius ab inflammatione & a pure. In vesicæ ceruice plerumque fit, vel ab inferto & hærente calculo, vel a tuberculo carnosio aut calloso, cuiusmodi ex virulenta gonorrhœa succrescit, vt antea dictum est *observat. x. huius libri: Hoc enim, (vni quoque dictum est) non diu subsistunt in via,*

Signa ceruicis
vesicæ obstructæ.

Vterus ob-
structus.

sed facile vrina cursu ac impetu foras impelluntur. Cuidam (vt idem Fernelius doctissimus ait) annum agenti trigessimum obstructa vesicæ ceruice, vrina affatim tamquam emissionem ex vmbilico in multos menses profluxit: idque citra tumorem, citra vllam aquæ in abdomine collectionem, & citra valetudinem offensionem. Quum hinc multi admiratione tenerentur, audirem vero recens in lucem edito male vinctum vmbilicum numquam coaluisse, exhincque semper nonnihil stillasse, existimaui necdum plane in eo inaruisse vrachum, & nunc illi perinde atque dum vtero gestaretur vrinam e vesica in vmbilicum refluere. Ceterum vt eo reuertamur vnde digressi sumus, si retineatur vrina, quia non attrahitur, cur igitur renes non trahunt? an debilitata vi attractrice? Inquit Iacchinus supra Rhasem. Hoc autem frigiditate fit maxime, vel ex intemperie, vel resolutione spiritus, vel ab apostemate, vel alia causa dolorem inferente, vt obliuisci faciat naturam proprii muneris. In secundo casu, necesse fieri est obstructionem, vel ex humore, vel ex lapide, vel tumore tuberculi, vel alias supercrescente carne, vel astrictione, seu conuientia: quæ fit ob aliquam inflammationem circa rectum intestinum vel partes vesicæ. In tertio casu similiter obstructio causa erit, vel quia multitudine distenta se nequit colligere. Dubitat Galenus, num vesica resoluta fiat vrinæ suppressio, vt quidam dixerunt: respondet Galenus quod non. Nulius enim, inquit, spina affectus vesicæ tantam imbecillitatem asferre potest, vt inde vrina supprimatur: quia opus naturale est non voluntarium: itaque tolli non potest ex lesione virtutis, quæ a neruis, quoniam ab hac fiunt motus voluntarii. Concluditur igitur, quod resoluta musculo vesicæ, non vrinæ suppressio, sed inuoluntarius exitus eueniet. Paulus vero contra cap. de vesica paralyin patiente scribit, aliquando fieri suppressionem vrinæ ex paralyi hac, aliquando inuoluntarium mictum, prout scilicet vel vesica corpus malum afficit, vel musculum, qui eius ceruicem ambit. Meminit huius quoque capite de paralyi. Ego vero (inquit Iacchinus) torpentem vidi vesicam ex opii porione, & suppressæ prorsus vrina erat. Musculus vero ceruicem ambiens validus erat, & optime claudibat: Et ratio dicit hoc fieri posse. Nam vbi molestiam vesica non sentiat, ablato sensu per resolutionem, non insurget ad expellendum: excipiet tamen vrinam perpetuo, sed supprimeretur. Galenus quoque hoc fatetur paulo infra, cum ait: *Accidit, vt non reddatur vrina ob sensum vesicæ obtusum.* Responso igitur est: non negare hoc Galenum de vesicæ resolutione, sed de resolutione musculi: attamen minus accurate scribit. Hæc rursus de causis suppressæ vrinæ, quæ etiam & vrinam difficilem faciunt. Superest, vt sedes affectas inuestigemus, & signa. Primum igitur causæ per notas sunt distinguendæ, vt sciatur, quæ modo affligat. Hic vero consulit Galenus primum procatareticas causas omnes examinare: secundo, si quæ antea visa sunt circa agrum symptomata. Dico autem procatareticas causas: vt

4
Historia Fernelii de vrina vmbilico profluente.

Renes non attrahentes vrinam

Ex obstructio

5
Voluntarius motus vrinæ

Ex paralyi vesicæ.

6

Vrina suppressa, signa.

casum

*casum & plagam circa dorsum, ut opipotum, ut frigidi
validi occursum, vel retentionem nimiam vrina alia
ratione.* Memini studiosum quendam, cui opium
exhibitum esset, in retentionem vrinæ incidisse:
inuasse vero & vinum generosum & theriacam.
Hinc enim affectum, qui sit agnosces, & non pa-
rum affectam partem coniectabis: quæ vero an-
tea in eo sunt, ut morbos vel symptomata præce-
dentia, febres, apostemata renum, vel vesicæ, vel
vlcera, & quæ ab his descendunt, sanguis, grumi,
pus: similiter & dolores circa lumbos, seu aposte-
mate, seu obstructione crassorum humorum, vel
arenarum euenientes: siue etiam in alia parte sint,
qui attineant ad instrumenta urinaria. In his
postea excrementis iubet considerari quantita-
tem & mistionem. Nam multus sanguis, vel pus
multum, non potest a vesica vel vteribus colligi,
ob exilitatem vasorum. Postea vero a renibus;
misticio autem id monstrat, si magna sit, ex renibus:
si parua, ex vesica. Sed melius est singulatim v-
numquemque casum examinare. Sit igitur pri-
mum vitio attractuæ renum; quomodo affectus
& pars affecta distinguetur? Hic est etiam primus
casus, quem & Rhases primum proponit, & sic
coniectatur. *Si vrina supprimitur, neque tumor ap-
paret in semine, aut grauitas, dolorue in renibus: per
primum enim signum exclusit, quod ad vesicam vrina
non descendit, neque per vterores: per secundum exclu-
sit, quod in renibus, neque obstructio a lapide sit, neque a
pure, vel crasso humore, vel apostemate: quare con-
cludit esse imbecillitatem renum.* Male exposi-
tores expultricis imbecillitatem aiunt esse; nam
statim grauitas apparet. Male etiam conclu-
sionem ad vesicam referunt, cum ad renes sit re-
ferenda: & est coniectura certissima, & affectus,
& partes affectæ: præsertim si nouerimus renes,
vel sento, vel longo morbo, vel a causa refrige-
rante esse debilitatos: adsint & signa propria frigi-
dorum renum, ut vrina alba, tenuis, ex Paulo.
His adde ad maiorem coniecturam, quod nihil
præcessit, neque casus, neque refrigerantia vesi-
cam: neque visa sunt, quæ obstruere queunt, lan-
guis, pus, phlegma, arenæ; ad quam etiam con-
iecturam iuuabit, præcedens victus ratio omnis.
Sic signa quoque aduentantis crisis excludes, cu-
ius ratione aliquando vrina supprimitur, 6. Epi-
dem. Alterum caput ad meatus pertinebat: quo-
rum est suscipere ac pellerere. Peccant hi obstructi-
one, ut diximus: priuatim vero vesicæ debilitate
pellendi, quæ vel distensione fit, vel stupore. Pri-
mum ergo de obstructione dicamus. Hæc vel fit
a pituita, vel thrombo sanguinis, vel arenulis, vel
lapide, vel sanguine: quorum singulis propria cu-
ratio danda est: Agnitio vero affectuum tum ex
præsentibus, tum ex præcedentibus fiet. Ex præ-
cedentibus quidem, quia notæ lapidis vel arena-
rum nullæ in vrina præcesserunt, sed ea crasso sedi-
mento, & mucoribus plena, causam obstructio-
nis significat. Si thrombus, sanguinis mictus præ-
cessit: si sanies aut pus præfuit, apostema in reni-
bus, aut mictus saniei, purgata alia parte corporis,
ut gibbis iocinoris. Quamuis Galen. etiam ab

aliis partibus prouenire posse dicat, tamen ad me-
dicum nihil refert, dum modo nouerit obstructio-
nem esse, & a qua materia. Sedem vero obstru-
ctionis, id est, in qua parte fiat, facile est coniecere.
Si enim renum meatus obstructi sint, ea parte gra-
uitas percipitur, & multa sit materierum cum vri-
na permistio: si in vteribus, situs docet, qui ex
anatomy est petendus: si in vesica, eius repleta si-
gna adsunt, quamuis sæpe non in vna parte sit
obstructio, sed in pluribus. Altera causa suppressa
vrinæ est ex his, quæ adnascuntur maxime circa vrin-
ariam fistulam. Sunt autem ea, vel in ea adnata, &
hæc proprie obstruunt, vel in coniunctis partibus,
& hæc coarctant. Sic igitur vrina supprimitur, ex
sedis inflammatione, vel vuluæ: quæ si accidunt,
propriam habent ex suo capite curationem. Si
autem in urinaria fistula fiat, vel tuberculum, vel
post vlcus supercrescens caro, vrina obstructione
supprimeretur. Et hic secundus casus sæpe euenit.
Appellant autem carnem callosam, vel tumen-
tem: & est callosum vlcus. Cuius sunt signa,
quod longo tempore præcessit malum, quod go-
norrhœam dicunt, cuius exemplum obseruat.
10. huius libri posuimus. At re vera gonorrhœa
non est, sed vlcus, ut vult Iacchinus, licet vulgus ob
similitudinem non distinguit naturam saniei, a na-
tura seminis. Tamen in nostro illo ægro gonor-
rhœa præcesserat male curata. Si ergo non bene
curetur eius vlcus, quod etiam plurimum euenit
ex coitu, equitatione, malo victu in cibo & potu,
fit cacoethe & tandem callosum. Signum autem
supercrescens carnis est, fistula immissa, quæ do-
lorem ciert, & cruorem. Altera causa vrinæ sup-
pressæ est lapis, qui vesicæ collo obualuitur. Igitur hic
præcessisse, vel adesse lapidis signa est necessari-
um, de quibus etiam suo loco agemus, cum de ve-
sicæ lapide dicturi sumus. De lapide renum satis
dictum est lib. præcedente: At si vrina supprimatur
ex paralyti vesicæ, necesse est præcedere causas id
facientes: ut si ceciderit (quem casum aliquando vi-
dimus) vel aliter refrigerata nimium parte, ita ut
sensus pereat, vel ex opii potu. Sed maxima nota
est, quod sine dolore tumet. Hæc exemplis palam
& aperte ostendemus.

OBSERVATIO XIV.

De ischuria ex nimia vesicæ distensione.

CVm autem ab externa aliqua causa sanis sup-
pressio vrinæ contingere possit, ut diximus, eo
quod longo tempore ob aliquam vrgentiam de-
tinuerint, facile ex loquela ægrorum id percipi-
mus, cum nullus præcesserit præter naturam affe-
ctus, qui ipsam cohibere potuerit. Hoc mihi ipsi
semel contigit proficiscenti ex Alemaria Leydam
versus, in curru, cum diu retinuissem lotium, post-
ea valde vrgente, cum lotium non auderem in
curru reddere, tandem descendens ex curru, non
potui mingere, & vrina suppressa fuit. Verum cum
ex distensione nimia hæc suppressio facta esset,
compressione utebar, & manibus calfactis vesi-
cam continuo comprimebam, & bonis ausibus li-
bere deinde minxi.

S C H O L I A.

2. **A** Ntequam ad curationem deueniamus, cum causæ sint diuersæ, *vt iam dicere cepimus*, ea de re omnes distinguere oportet, alioqui in curatione facile aberrabimus. Vt autem hoc fiat, omnia iam dicta percurrenda erunt; nec solum hoc distinguemus ex præsentibus symptomatibus, sed etiam iis, quæ præcesserunt. Præsentia ex te ipso inspicias oportet: præterita vera non solum a laborantibus, sed etiam ab ipsius familiaribus interrogando perdiscere licebit, *ex Galeni auctoritate 1. de loc. affect.* Vbi autem ex vesicæ imbecillitate orta fuerit urinae suppressio, sic percipies. Nam si hominem ita figuraueris, vt declius sit ceruicis vesicæ positus, ac manibus tumorem præter naturam compresseris, vtique expelletur urina: quemadmodum si ita nihil profeceris, urinae fistulam constipatam esse cognosces. Verum numquid expultrix duntaxat facultas ipsius fuerit oblata, vel torpidus fuerit, ipsius vesicæ sensus, propter proprios eius nervos affectos, adhuc non liquet. Sed illud hoc pacto distingues. Nam si propter excretoris facultatis læsionem originem sumserit, cum fieri non possit, nisi propter aliquam intemperaturam; præsertim frigidam vesicæ, ideo illud propriis intemperaturæ indicibus (*quæ antea notauimus*) haud ægre dignoscere valebis. Quod si nullum tale affuerit indicium, præcesseritque læsio aliqua spinalis medullæ; vt verbi gratia, si fuerint ipsius ad externas partes vertebræ luxatæ eo loco, quo ad vesicam proprii nerui distribuuntur: similiter si quomodolibet prædicti nerui fuerint affecti, ita vt animalis facultas ad vesicam non pertingat; ex obtuso seu resolutio eius vesicæ sensu causari urinae suppressionem censeto, propriis vesicæ neruis affectis, atque ita vesica propter immodicam repletionem immoderate extensa. Si ob urgentem aliquam causam, iam signa diximus *in obseru. precedente*. Ad quam etiam aliæ causæ externæ referuntur, quæ ex relatu cognoscentur, *vt iam diximus*.

O B S E R V A T I O XV.

De ischuria seu urina suppressione ex limoso humore penem intus obstruente.

1. **I** Vuenis annos sexdecim natus, filius hospitæ meæ, apud quam in Italia Bononiæ habitabam, per quinque dies lotium reddere non potuit: præsidii multis a medicis præscriptis non iuuantibus, hospita obnixè orabat vt aliquo modo, si possem, filium curarem. Diligenter inspecto pene, animaduerti in meatu virgæ obstructionem quandam adesse ex materia limosa actenaci: arrepto igitur spinthere seu fibula, qua mulieres populi sua capiti affigunt (*cum stylus argenteus mihi deesset*) leuiter sine dolore meatui urinario indens, ac aliquo modo aperiens, hinc inde tentando num humorem illum limosum dimouere possem, limus ille spintheri adhærens, materiam crassam instar filamentum concretam molliter rangendo & dimouendo illam viscositatem, quæ in meatu ipsius præputii inhærebat & intus in pene, subito vna in me erupit urina, cum maximo impetu, vt me val-

de conspurcasset; & matulam apprehensam cum admouerem, tam copiose lotium excreuit, vt totam matulam impleret, ac alia vascula, vt hoc modo, matre admirante & valde lætante, filius sanitatem consequutus fuerit. Hæc mihi optime successerunt, & per me acta sunt, cum in alma vniuersitate Bononiensi medicinæ incumberem, & vna cum præceptoribus praxin obseruarem.

S C H O L I A.

2. **M**Emini puerum annorum nouem, in nostra vicinia habitantem, cum lotium reddere non posset, ex lapillo in meatus principio ipsius colis inhærente, cum ingenti dolore penis, exiguo tamen instrumento, cum non cederet, digitis dextre locum compressum per Theodorum chirurgum & lithotomum, amicum nostrum, cum puerum vna curarem, a loco suo exempto & extracto, statim urinam emisisse. Erant ambo isti affectus ex eorum numero, qui ex occlusa fistula urinaria mingere non valuerunt: Vbi enim urinae cohibitio non ex corpore eiusdem vesicæ affecto, seu imbecillitate proueniat, sed meatu urinario, vel eius ore occluso (*vt diximus*) figurato etiam ægro adeo, vt declius sit ceruicis vesicæ positus, ac manibus tumore præter naturam compresso, minime expelletur urina. Occluditur autem vel ob inflammationem, vel scirrhum, vel alio quouis tumore præter naturam: sed inflammatio, ex propriis eiusdem signis, tumore videlicet, dolore, ac febre dignoscitur: similiter scirrhus vel abscessus, aut alius quouis tumor præter naturam. Si autem ob carunculam aliquam ab ulcere innatam vesicæ ceruix obstruatur (*vt antea diximus*) ex præcedentibus ulceris notis, & ex eo, quod immixta ænea fistula vel argentea (*alii catheterem vocant*) urina vacuatur, intelligere possumus. Interim cum urinae excretionem sequuntur & cruor, & carnis excrementa, *Galeno teste 1. de loc. affect.* Verum si fuerit trophus seu callus in ceruice vesicæ innatus, præter id quod longo temporis spatio ex crasso lentoque humore paulatim nasci potest, neque forte ulceris signa præcedent, neque ortæ carunculæ signa aderunt. Quod si a lapide meatus obstruatur, ante urinae cohibitionem lapidis indicia apparuerunt; urina videlicet aquæ similis, in qua subsident sabulosa quædam; insuper quod pudendum assidue scalpunt taliter affecti; postea vero urina derepente supprimitur; aliaque signa præcesserunt generati lapidis, aut in renibus, quæ libro præcedente conscripsimus, aut in vesica, quæ postea conscribemus. At nulla lapidis nota retentam urinam præcedente, si sanguis effluerit, par est, vt grumus urinae fistulam obturet: quocirca demissa per colem fistula, paulum urinae reddunt: qua deinde extracta, in ipsius ore grumi indicium apparet: quamquam fieri possit, vbi ulcerata fuerit vesica, vt paulatim in ipsa grumus concreseat, vel non præcedente sanguinis fluore, *ex eiusdem Gal. sententia 1. & 6. de loc. aff.* Ad quos grumos, qui in vesica continentur, veluti etiam ad alios, qui in intestinis, ventriculo, atq; thorace, animi defectio & color pallidus sequi solet (*vt libro quoque*

Si ex vesicæ imbecillitate orietur suppressio urinae, signa.

Si ex obtuso vesicæ sensu oriatur, signa.

Causa externa signa.

Signa si ex occlusione vesicæ urina supprimitur.

3.

4.

quoque precedente obseruat. 26. ostendimus) pulsus vero paruus, obscurus, frequensque apparet, & laborans ipse cum anxietate resoluitur; adeo ut mirari aliquis possit, quæ nam sit huius euentus causa, ut eodem 6. de loc. affect. scriptum est. Probabiliter quoque conicies, cum pus eundem meatum obstruxerit, num renes, aut vesica, aut alia quæpiam pars, quæ per vesicam expurgari potest, ante affectu aliquo laborauerit; per quem tale tantumque pus colligi potuerit, tenuisque pus prius cum urina profluere visum est, quemadmodum ubi ob crassum lentumque humorem obstruatur, eiusdem humoris redundantis indicia aderunt, quæ nos antea abunde de difficultate urinae adnotauimus. Similiter ex precedentium notitia in huiusmodi coniecturam inducimur, ut etiam recte dixit Donatus. Nam cibus crassus lentisque ac multis usus est. & in otio educatus est æger. Neque negligenda erit vniuersi corporis dispositio. Coniungente autem iam dicto meatu ex immodica siccitate, exsiccantes quoque causæ præcesserunt velut contingit in ardentissimis ac siccissimis febribus, ut in lib. nostri de febrib. quoq. diximus, in quibus laborantem sæpenumero, neq. loqui posse videmus, nisi os madefecerit.

OBSERVATIO XVI.

De ischuria perperam curata, & lethali.

1. Sacerdos quidam in Pago quodam Beaucom-mun dicto, cum Pithueris praxin exercerem, diu laborauit urinae ardore, & a multis cum frustra cutaretur, tophus seu callus in meatu urinario obortus est, qui adeo increuit, ut lotium omnino suppressum fuerit. Tonsor quidam, ut fere sit, pro chirurgo sese venditans, catheterem imposuit in meatum urinarium, existimans lapidem esse in vesica, impeditentem lotii exitum: eoque instrumento non transeunte ad vesicam, fortiter illud impellebat: unde suborto fluxu sanguinis & dolore intolerabili, mox subsequuta est inflammatio & febris continua, deinde & ingens testiculorum inflatio: urina in totum rursus, post sanguinis reiectionem, cum quasi guttatim urinam redderet primo, suppressa est. Nihil autem iuuantibus remediis per temerarium tonsorem exhibitis, & cum animam miser ægrotus agere videretur, ad eum accitus fuit. Cum aluum duobus vel tribus diebus non repurgasset, nec quicquam excreuisset, statim clysterem emollientem & sedantem dolorem ac inflammationem lenire iubeo, quo quidem aluum deposuit, nihil tamen ex eo adiutus, nec topicis remediis, pectini impositis & testiculis supra modum inflatis, relaxantibus emollientibus & inflammationem auferentibus; facto prognostico antequam medicamenta vix apponerentur, quod æger statim moreretur, neq. calculum in vesica esse, ut tonsor iactabat. Eoq. mortuo ac inciso, cum propinqui mortis causam hoc modo explorare vellent, tophus in fistula urinaria tantum inuentus est, neque calculus in vesica reperi-tus: ita ut ex violenta illa pertusione catheteris febre & inflammatione oborta & ingenti inflammatione testiculorum, urina magis impedita,

mors ipsa tonsoris inscitia subsequuta fuerit, ex mala eius curatione.

SCHOLIA.

3. QVam magnam & eximiam utilitatem præstet signorum dignotio; & rursus quam insignè damnum, imo quandoque & mortem, ipsorum ignorantia, aut imperitia, vel hoc vnicò exemplo ostenditur. Ita quoque ex optimo prognostico medici honor: ut ex malo, eius infamia omnibus innotescit. Præscriptis igitur in duobus præcedentibus Scholiis signis causarum, iisque diligenter perscrutatis, non minus ad prognostica nos diligentes esse debere, miseri huius sacerdotis casus nos admonet. Quamquam & tales laborantes, si recte tractentur, curari possunt, ut in obseruat. 10. precedente huius libri satis constat. Porro urinae suppressionem, quæ ob lauciata spinam, aut casum (ut in illo contigit fabro lignario, qui cum a summi adibus Iohannis Petri Pedemontani collapsus esset, spasmo correptus, & lotium non reddens, mox interit) aut vertebræ luxationem, aut ob lethales accessionum concursus suborta est, impossibile est curari: quare caute remedia adhibere oportet, ut inquit Artius cap. 24. lib. 11. Idem quoque auctor citato loco dicebat, quod ex his, qui paralyti exsolutam vesicam habent, alii præter voluntatem urinam emittunt, alii autem lotium non excernunt. 4. Minus periculo sunt obnoxii, qui præter voluntatem eam emittunt; at magis hi, quibus detineretur. Nam lotio suppresso vesica & lumbi eius distenduntur, similiterque pecten: femora autem tumefacta habent, & cum non eiiciant lotium, subiecta membra mortificantur: neque ita longe post moriuntur, ut ipse inquit. Quod vero perniciofa sit urinae suppressio, ex concreto sanguine seu grumo, decretum reliquit Galen. 6. de loc. affect. Nam & putredo partium, & marcor ipsum sequi solet, ut ipse inquit, & licet nonnullis medicamenta exhibuisset pro eiusdem curatione, nihilominus omnes perierunt, vno quodam seruato solutis grumis, quos paulo post cum urina excreuit. Ita nauta quidam Schiedamensis, cui circa perinæum instrumento ligneo intra femora resultantem & compresso, lumbi statim distendebantur, similiter & pecten & femora tumefacta, lotio suppresso mortuus est, cum nulla remedia iuuarent; ad quem morte instante acciti eramus. Nō tamen semper suppressa urina ex casu, spina lauciata, incurabilis est, ut patet ex illa historia Galeni lib. 6. de loc. affect. cap. 4. sic scribentis: Igitur cuidam quum cecidisset, spina lauciata est: quapropter urinam reddere non potuit. Nam & id aliquando fieri solet, quemadmodum ab Hippoc. dictum est. Verum non illico suppressa fuit urina, sed perendie, ob afflictarum vertebrarum ad interna luxationem, inflammata vesica. Itaque dolebat in ea parte, vel nemine tangente, si quis manu eum tangeret. Atque hunc curauimus, inflammationi remedia adhibentes. Rursus alter luxatis ad externas partes vertebris, urinam inuitus profudit, nullo infestante vesicam dolore: proinde spinam curare voluimus. Porro quamuis hic affectus, in sanis in conui-

Signa prognostica.

4.

5.

uiis diu permanentibus propter extensam vesicam, statim adhibita compressione, & aliis remediis aptis curetur, in senibus tamen hoc, si contingat, malum aliquando praesagit; *ut evenit Nicolao Verlanio seni septuagenario, Principi Atraco gratissimo*; apud quem, cum diu cum aliis nobilibus conuiuium ageret, & lotium diu retinisset, alioqui calculosus, necausus esset surgere ad melendum, domum postea reuersus non potuit mingere: & quamquam aptis praesidiis postea minxit, tamen incidit in febrem acutam & continuam cum aphthis, ita ut mors fuerit subsequuta. Quævis quoque urinae suppressio ex calculo in renibus & magis in vterem impacto, vel os vesicae aut collum ipsum occludente, nisi transponatur, & optimis ac aptis remediis vera methodo resistatur, periculum decernit. Quævis etiam urinae suppressio si duret usque ad x. vel xj. dies, mortem plerumque infert: a quacunque causa etiam pendeat, tales raro euadunt. Licet & ipse viderim, quibus ad septimum diem lotium retentum fuerit, & tamen superuixisse, quod & Gordonius, se quoque vidisse, testatur, & i. os iusticum ad 10. dies non minxisse & superuixisse nouimus, *de quo postea historiam adferemus*. Ceterum urina retenta in vterem aut renibus ad membra superiora regurgitat (*ut libr. precedente diximus*) cum in vesicam non delabatur, coarctans membra spiritalia, & suffocat: ac ea ipsa urina manens mixta cum sanguine in venis, inficit & corrumpit sanguinem, & fit causa magnorum nocumentorum & tandem mortis. Retentio quoque urinae (*ut quidam asserunt*) ex veruca aut carne innata, in via ab hepate ad renes, vel in vteribus, non recipit curationem, & non prosunt aliqua remedia, nisi fortasse tina (*ut dicunt*) & emplastra emollientia. In meatu virgæ, cum cautione tamen, melius curatur, *ut exemplum Obseru. 10. huius libri demonstrat*.

OBSERVATIO XVII.

De urina per quinque dies suppressa, cum ingenti circa vesicam dolore.

Iacobus Caupo admodum facetus, mercator, **B**asius communi nomine dictus, qui Alemariæ ad fossam aqueam habitans, in ædibus, quibus pro symbolo & insigni Mundus cœcus erat, Anno 1547. Februario mense, omnimoda urinae retentione adeo graui correptus est, ac dolore ingenti circa vesicam, ut quintus ageretur dies, quod lotiū non emisisset, & pro desperato habitus, multis ultro citroque a vulgaribus tentatus remediis atque frustra adhibitis, cum de vita anxius esset, me primum vocauit. Ego vero hinc inde discurrens, ut causam huius atrocissimi mali inuenirem, intelligens quod calculo nunquam laborasset, suspicionem mihi dedit vita eius otiosa, cum apud contubernales hospitem ageret, molliter & delicata viuens, ac genio valde indulgens, cibisque variis ac potibus crassis vtens, præcipue autem ceruisia crassiore, hoc malum contractum ex humorum crassorum ac lentorum obstructione, recte coniectabam, quod vita antecedens indicabat, cum nullo exercitio vteretur, vitam desidio-

sam & sedentariam agens, cum potatoribus & hominibus gulosis. Quamobrem cum aluum non deponeret, & libenter eidem enema emolliens feces, & simul educens præscripsissem; idque tantum leniens: (*cum lenientia ipsa hic sola conuenirent, præcipue enemata, tempore doloris, & non diuretica, ut iam saepe in precedentibus exemplis ostensum est.*) At quum homo hoc ipsum nollet admittere, glandem saltem iniici iussimus; qua & aluum deponerebat: mox forum adhibendo ex rad. foliis sem. & flor. alchææ, malua, parietaria & floribus chamomill. Et decoctum propinaui tandem ex malua cum radic. & semin. & emuls. sem. quat. frig. maior. cum melle ros. curationem incipiendo a mitigatione doloris, vitando solutiuia fortia & diuretica, quæ in principio non conueniunt, cum exagitent humores, qui agitati magis ad vesicam deturbant humores ac dolorem augent, cum & diuretica humores ventriculi ad renes & vesicam deducant, dirigantque & dolorem augeant: unde & Auicenna consulebat, ut omnium primo aluus mollior redderetur aliquo clystere emolliente. Sed cum aluus per se satis mollis maneret post inditam glandem, factu præcedente, hoc decoctum incidens ac detergens sequens in die bis propinaui. *℞ radic. asparagi, brusci, fœniculi, ana ℥ ℔. sem. fœniculi, carui, fenugraci, lini, ana ℥ ij. cicer. rub. ana m. ℔. coquantur in aqua & vino Rhensi tenui claro, pro ℔ j. colatura addendo oxymel. simpl. mellis ros. colati, ana ℥ j. ℔. misce.* Deinde mandavi, ut oleo sequenti pecteni & vesicæ regio inungeretur, ac cataplasma mox imponeretur. *℞ olei amygdal. dulc. butyri recentis, olei scorpionis ana ℥ ℔. misce. ℞ maiorana, pulegii, origani, thymi, ana m. ℔. concutiantur, & parum incidantur, coquanturque in modica aqua & vino ad liquoris consumptionem, leuiterque expressis adde butyri recentis ℥ j. pingued. anatis, axungia canis ana ℥ ℔. olei scorpionis, vermium terrestrium, ana ℥ j. fiat ad modum cataplasmatis.* Hisque impositis pectini, magna in copia minxit. Die vero subsequenti hanc purgationem leuam quoque sumsit. *℞ diacathol. ℥ vj. & ℔. castia recens tracta, diaprun. lenitiui, ana ℥ j. ℔. (lenientia præscripti medicamenta, eo quod aluum tunc non bene deponeret) dissolue cum decocto pectorali, in quo prius bulliant radic. malua ℥ ij. mellis ros. colati ℥ j. misce.* & accepit in diluculo & habuit quatuor sedes muccolas, & leuamento magno copiosius urina fluxit. Deinde imperaui, ut bis in die ex decocto sequenti sumeret, mox & tribus pilulis descriptis deglutitis. *℞ rad. glycyrrh. rasa & mundata. radic. malua, corricum, rad. fœnicul. ana ℥ j. flor. omnium cord. p. j. sem. lini, malua, sem. 4. frig. maior. ana ℥ j. ℔. cicerum rub. m. j. ℔. hordei mandati m. j. fiat decoctio in aqua communi pro ℔ j. ℔. colatura addendo mellis ros. colati ℥ ij. butyri recentis ℥ ij. misce. ℞ terebinth. clara Veneta parum tosta ℥ ij. succi glycyrr. pul. liquir. an. ℔ ij. fiant pilula ad modum cicerum: etiam subinde oxymel diureticum quoque sumens: hoc enim medicamentum egregie confert, si a crassis & viscidis humoribus ischuria ortū habeat: nam & in fine diuretica conue-*

conueniant, atque his prædiis feliciter curatus fuit, cum ex ora faucibus in lucem reuocatus videretur.

S C H O L I A

C Vrandiratio non vna duntaxat est, cum plures sint eiusdem causæ, *vt nunc diximus*, sed pro causæ varietate diuersa quoque ineunda curatio. Si crassi humores in causâ sunt vel viscidii, illi ipsi præparandi sunt, incidendi & purgandi, quemadmodum de difficultate urinae prius docuimus, in quibus profunt & balnea, infusiones. Ab his autem in totum abstinendum, quæ urinam ciunt, nisi prius materia crassa euacuata fuerit, atque eodem modo curanda, vt dysuria, si a crassis & viscidis humoribus retineatur urina. Eodem modo si ob renes obstructos a pituita, prius enemate infecto emolliente, foci emollientes tum infusus proderunt, corpusque vniuersum a pituita vacuandum, & ventrem ducere oportet hieris & electuar. indo, diaphœnico, terebinthina, sed non subito, neque ab initio, ne materia ad renes ducatur: postea & hæc iteranda, ob metum, ne obstructio maior fiat. Postremo ea, quæ incidunt, cum diuteticis miscenda, vt *oxymel simplex & scilliticum*, cum decoctis superius dictis: & balneis utimur. Sed terebinthina utrique prospiciet: nam & ventrem vacuabit, & renes deterget. His vero postremo aquarum vsus est idoneus, vt salinarum nitrosarum & sulphurearum. Quod si sit circa vesicam malum, primo relaxantibus utimur fomentis, & cataplasmate, & enemate, quod per urinariam fistulam, si opus est, iaciemus, idque per syringam, vbi & præcesserint sessiones, qui humores crassos illos incidunt, quæ semper & uti possemus in repleta vesica, etiamsi rhombi fuerint sanguinis, ad incidendum & dissoluendum, nisi apostema fuerit vel inflammatio, tunc enim proutatut locus, & ab iis cessandum. Quæ vero immittuntur sunt oxymel & lixiuum, de quo Rhases meminit. Verum vbi ardor urinae admixtus est, ab iis quoque abstinendum. Si a pure, curabitur detergentibus, vt de vlcerebus vesicæ quoque dicemus. Vbi enim multitudo ac crassities puris vesicæ cervicem obstruxerit, per eadem medicamenta mollientia ac relaxantia, nec non & incidentia, cura tenenda erit, intus & extra huiusmodi medicamentis adhibitis. Quod si neque his finem assequaris, modo dicta ænea seu argentea fistula immitenda erit, si non sit vlcera præcedens, ne vlcus irriteretur. Quomodo autem vlcera harum partium seu antiqua, seu recentia curentur, quod ad renes attinet, prius dictum est: & quod ad vesicam, postea latius diceretur. Nunc solum, si in fistula urinaria aut in collo vesicæ, vel vesica ipsa lotium retineatur, & præcipue tunc quoque symptomati occurrendum, tentando num syringa penetrare possit: tamen cum cautione, *vt dictum est paulo ante*, ne idem contingat, quod tonsori imperito euenisse diximus: si non possit, infundemus oleum amygdal. tepidum, & agrum in balneo ponemus, vel fomenta, inunctiones relaxantes adhibebimus, & minuemus potum, &

omnia, quæ urinam multiplicant. Quod si turberculum adsit, eius maturatori & citæ ruptioni est intendendum cum his, quæ extra apponuntur. Vbi enim ob callum retenta fuerit urina aut carunculam, per emollientia ac relaxantia remedia, ac urinae fistulam dilatantia, curanda erit; & vbi ea non suffecerint, ænea fistula seu argentea demittenda erit, vulgus syringam vocat: atque eam, si possemus, cathetere minuemus, & alius immitteremus; caute tamen, *vt ostendimus obseruat. 10.* vt dilaret meatum. Si vero propter inflammationem, aut alium quempiam præter naturam tumorem urina supprimatur, ex propriis eorundem capit. curatio petenda erit. In phlegmone, vt alii volunt, sanguis ex crure mittendus: mox ex hæmorrhoidibus, & aliis lenienda, & localibus utendum chalcicis, vt phlegmone exigit, *vt althæa, fenugraci, seminis lini decocto*. Rhases hic sanguinem mittit ex basilica. Hoc forte bonum esset, vbi malum ex sanguinis spontaneo fluxu fieret, idque inter initia: sed vbi iam eo deuenit, vt obstruat, & fiat a causâ procatartica, sapius eueniet, vt fieri debeat ex crure sanguinis missio. Galenus hunc calum ponit, & se curasse dicit cum his, quæ phlegmonem sedant. Signum huius, inquit (*vt paulo ante quoque diximus*) quod a phlegmone, quoniam non statim difficultas erat minigendi, sed superuenit. Sed de his paulo postea. Sed nunc rursus aliud exemplum adferamus: nam ex hoc tum aliis sublequentibus, quomodo reliquæ causæ curabuntur, facilius innotescet.

O B S E R V A T I O XVIII.

De quodam rustico, qui per decem dies mingere non potuit.

R Vsticus quidam in pago quodam Scermer dicto, anno 1554. mense Octobri, cum decem diebus urine suppressione grauiter laborasset, nec quicquam lotii reddidisset, ac frustra multa ac varia tentasset remedia, tandem vicinum suum consultandi causâ ad me misit. Sordidum hoc genus hominum, si vel bouem vel porcum aliquo vitio, aut quouis morbo affectum habeant, statim veterinarium medicum vocant; se ipsos autem ægrotantes negligunt: quod cum vicino dicerem, præstantius esse, vt apud agrum præsens causâ diligentius inuestigata, melius eidem consulerem, tamen instabat vicinus, vt aliquod saltem medicamentum præscriberem: rogavi numquid sciret, quomodo in hoc malum æger incidisset, & quo vitæ genere, & qua victus ratione vsus esset, vt ita causam morbi perdiscere aliqua ex parte possem. Dicebat agrum septuaginta annos compleuisse, & circa aquam victum quæsiuisse. & perpetuo pisces anguillasque captasse, & vitam hætenus ita in Waterlandia vulgariter dicta, hoc est, in terra aquosa, produxisse, lacte atque piscibus pro victu vsus fuisse, & in potu frequenter lac acidum sumxisse, vt rustici eo in loco solent. Quibus intellectis, ex causâ frigida & humoribus frigidis viscosis lentisq; in homine frigido ac sene, & in regione frigida aquosa habitante, hanc suppressionem urinae ortam esse coniectabam.

- Quare eidem, licet satis inuitus, tale medicamentum præscribo; prius tamen glande aluo irritata, cum secessum non haberet, uti vicinus mihi dixerat. *℞ rad. fœniculi, glycyrrhizæ rasæ, ana ℥ ss. parietaria, malua, viol. (ad feces emolliendas) agrimonia, summitatum ribes nigra, ana m. j. sem. anisi ℥ j. ss. vuar. passul. ab arill. repurg. p. j. follicul. senæ ℥ j. granorum alkachengi, num. v. fiat decoctio in lb ij. feri lactis ad medietatem, bis in die sumebat ex hoc decocto.* Regionem vesicæ tum pectinem inungebat oleo amygdal. dulc. postea adiecto oleo scorpionis: etiam imposito hoc cataplasmate. *℞ parietaria, malua, cheresolii, flor. chamom. ana m. j. cumini pulver. ℥ j. rad. althææ ℥ j. ss. coquantur in exigua aqua, ad mollitudinem pistentur, addendo butyri recentis ℥ ij. olei scorpionis ℥ j. misce.* Ex decocto cum summisset, aluus ei soluta est, & cataplasmate continuo imposito tandem minxit lotium copiosum: & ut postea relatum est, subsequuta est mictio sanguinolenta. At finito decocto, cum amplius ex eo non biberet, denuo suppressa est vrina, quod forte contigit ex sanguine coagulato. Et hic stupidi homines non aliter quam asini reliquerunt miserum ægrum in illo statu, ita ut rursus per integram septimanam lotium non reddiderit: ac neque tunc me vocarunt: sed rursus quidam ex astantibus me accedens, cum tunc Alcmariæ praxim exercerem, consilium pro eodem ægrotante petebat. Rursus præscribo hoc decoctum, tum fomentum sequens: *℞ centaurei minoris, nasturtii aquatici, summitatum ribes nigra, agrimon. viol. malua, ana m. ss. rad. liquir. fœniculi, ana ℥ ss. rad. althææ, ℥ ij. semin. petrosel. fœniculi, cumini preparati, ana ℥ j. sem. geniste ℥ j. ss. sem. quat. frigid. maior. ana ℥ ss. granor. alkacheng. num. v. hordei mund. p. j. fiat decoct. in aqua commun. pro lb j. ss. colat. adde syrup. acetos. simpl. syr. de duabus rad. ana ℥ j. ss. misce. ℞ flor. meliloti, chamomill. ana m. j. folior. malua, parietar. viol. ana m. ss. sem. cumini ℥ j. sem. lin. fœnugræ. ana ℥ ss. rad. althææ, rad. brancæ vrsinæ, ana ℥ j. ss. fiat decoct. in aqua comuni pro lb ij. fiat fons supra pectinem cum spongia, ut artis est. Deinde feces ex decocto cum butyro ad emplastri formam redigito, quod & pectini post fomentationem appositum fuit, & denuo minxit, primo sanguinem, postea & puram urinam, omnibus admirantibus: & conualuit, quamquam senes (ut diximus ex Hippoc.) a vitiis vesicæ & renum difficulter curentur. Laudandus Deus omnipotens, qui humili suo seruo dedit scientiam curandi, & miseros ægros subleuandi.*

S C H O L I A.

4. Quamquam hominem non videram, in senem tamen & piscatore perpetuo in aqua versante coniectabam malum hoc a causa frigida obortum esse. Refert Amarus similem casum, de puero, *centur. 4. curat. 10.* Puer, inquit, illius, qui ad hortum prope murum habitat, in vrina omnimodam suppressionem deuenit, adeo ut eius venter tumidus & eleuatus videretur: ex quibus puer ipse in vita periculum inciderat. Ad quem vocatus ipse, hinc inde inquiri, unde morbus originem forte trahere potuerit: tandem post longam inuestigationem, in-

uenio puerum hunc prope puteum diuersari, & pedes inde ex aqua madefactos contraxisse: quo audito, deprehendo a frigidityte aquæ illius, humorem aliquem inter collum vesicæ & pudendum contentum, concretum esse: unde urinæ exitus impediabatur, qui & sola frigidityte fieri poterat, non interueniente humore aliquo. Proinde contra morbum sic ordior. *℞ parietariam oleo frixam, & eam calidam ad pectinem superimponere, vel inter anum & pudendum; urinam enim cit: vel capam excauatam accipito, in quam infundito oleum anethinum vel commune ad cineres calidos, & pistam calidam supra prædicta loca imposito. Alliorum & caparum testa minutim cæsa & oleo frixa, atque admota iuuat: oleum liliinum idem præstat. Sed puer hic, cum multa essent tentata, ex oleo scorpionum inunctus, multa minxit, & liber euasit. At noster æger non solum ex simplici causa frigida, sed etiam humore frigido cum laboraret, ex decocto illo cum sena & aluum deposuit & minxit. Multa sunt, quæ lotium prouocant, sed præcipue folia ribes nigra: nam & his ad sanguinem usque urinam prolecebat. Verum non viâ curandi ratio est, cum plures sint eius causæ, ut diximus: sed pro causarum diuersitate variatur curatio, ut dicere cœpimus. Quare si propter vesicæ imbecillitatem generetur, citra tamen casum: relicta victus ratione, quam superius de urinæ stillicidio ad longum recensuimus, primo figurandus erit æger modo, quo iuxta sententiam Galeni diximus, ac manibus tumor præter naturam comprimi debet, ita ut vrina expellatur: musculi quoque abdominis, maxime medii, ægrotantis manibus seu alterius comprimantur, iuxta Galen. præcepta 6. de loc. affect. Deinceps assidui in seclusus, seu forus in scœntigræci, seminis lini, althææ, ruta, samfuchi, ac artemisiæ decoctum cum oleis eis apparentur, & loci ex oleo rutaceo calido sæpe per diem & noctem, & maxime post in seclusus irrigentur & perfundantur. Cucurbitæ etiam locis affigantur, & cataplasmata imponenda ex cruda hordeacea farina ex vino dulci, & mulso, ut testatur Aetius; præsertim si obtusus fuerit vesicæ sensus. Insuper confert, si vnguento hoc irrigentur loci. *℞ olei nardini, costini, & rutacei, ana ℥ j. olei de scorpionibus & irini, ana ℥ ss. mastiches, florum stœchad. ana ℥ ij. castorei ℥ j. sagapeni & bdellii, ana ℥ ss. dissoluantur gummi in vino albo, & addita cera, fiat vnguentum.* In hunc etiam versum confert vng. dialthææ dictum: & reliqua medicamenta ad difficultatem urinæ descripta, tam*

Si ex imbecillitate vesicæ, quomodo curatur.

Ex debilitate renum attractricis vel expultricis si fuerit curatio.

Rhases medicamentum ad eandem urinam efficacissimum.

luni-

7. iuniperi est efficacissimum, & facile parabile. Similiter inurant cantharides præ omnibus, quibus vt inutiles abscinduntur partes excarnes: similiter ammoniacum, amygdalæ amaræ. Cantharides non sine cautione adhibendæ, vt exemplo ostensum est, obseruat. 7. libri præcedentis, & obseruat. 29. Sed mitiora sabinæ potus, & seminum iuniperi, & spicæ celticæ, & rusci fructus. Hæ potiones dandæ sunt, vbi æger in balneo fuerit, vel paulo ante balneum; sed minime vbi calculus in rene aut vterere hæreat. Si autem vesica debilitate pellendi laborat, quæ vel distensione fit vel stupore; & id ex paralyti vesicæ fiat, necesse est præcessisse causas, vt casus, vel parte nimium refrigerata, ita vt sensus pereat, vel opii potu, vt diximus, & tunc sine dolore tumer. Tunc primum vacuanda, comprimenda vesicam; mox calfactoriis, fortibus, sessionibus curanda. Vel vbi propter ægrum vesicæ sensum contigerit, præter infusus ac irrigationes superius dictas, excitare eius actionem oportet, nitro aut nitri spuma ad meatum admotis, aut cimicibus contritis. Refert Gradus, se vidisse quendam, qui pediculum foramini virgæ cum imposuisset, ex eius proximo urinam prouocauit. Alii vero pulicem, alii cimicem viuum immiserunt. Hæc autem iuuant motu vel titillatione, aut punctione, quibus vis expulsiua stimulat. Quod si his non procedat lotium, ad catheterum vsum confugiendum: & ipso instrumento immisso urinæ prolestandæ, Aetio teste. Urinam ducentia nequaquam bibant, ne multitudine eius vesica distendatur: quibus etiam confert castoreum, itemque theriacam in potu propinare, & post euacuationes sinapismi tum pectini, tum lumbis optimi sunt, vt. eidem Aetio visum est: a quibus cerata, quæ partes mitigent, & malagmata odora imponantur, vt ipse inquit. Viscera quoque erinacei terrestres exliccata, ac suffita, ægro vnde quaque coniecto urinam suppressam sanant. Oportet autem ipsos sale condire, ac exsiccare: quin & in potu accepta viscera sicca trita, quantum tribus digitis apprehendi potest, ex vino iuuant. Vermes quoque terrenos tres aut quinque tritos ex vino mulso aut aqua mulsa præbeto, eiusdem Aetii præcepto. Item forinsecus artemisiæ folia, cum myrrha trita, pectini, & imo ventri illinantur: seu perdicium herbam terito, & affuso oleo feruefacito, atque vesicæ imposito. Sed & sedes quoque his illinenda est, quibus obtusus est vesicæ sensus, ex decocto origani, thymi, anethi, ac centaurii, cum oleo rutaceo; paucò admixto castoreo, Infundimus etiam per colem oleum rutaceum, de scorpionibus, aut nardinum, seu irinum; etiam paucò admixto castoreo, vt vesicæ actio reuocetur. Si ob debilem sensum retinetur, tunc iniectiones acres ex vfu sunt, vt irritetur vesica ad excretionem. Alii pediculos, vt diximus, immittunt: Rondeletio magis placet salem, vel ex melle immittere iniectionem, aut ex pauca hiera. In sanis autem, si accidat (vt dictum est) ob negotia nimis vrgentia, aut aliquod tale simile, vt lotium diutius retentum vesicam debilem reddat, auxiliari oportet ipsis,

ambabus manibus supra imum ventrem admotis, vt vrina lente expressa (vt iam quoque diximus) profluat. Et ita si distentio nimia facta sit, compressione vtemur, vel syringa: mox lenientibus dolo rem, ex vino & oleo acrois. Vbi enim detinetur, ex vesica distenta, quæ ita claudit meatum, vt non possit in se ipsam contrahi, urinamque propellere; tunc catheter immissus in vesicam confert, per quem aliquid urinæ excerni possit: deinde dilatato meatu facile redditur, quod reliquum est in vesica. Non est etiam inutilis fons aquæ calidæ, vel decocti maluarum cum apio, vel alio medicamento diuretico. Vesicam comprimere manu est etiam vtilissimum in hac causa.

OBSERVATIO XIX.

De ischuria & urina retentione, ob calculum in collo vesicæ hærentem.

1. Franco Bartholomæus, prætor Delphenis, vir obesus, crassus, cacochymia tū plethora laborans, vir senex, calculo vesicæ laborabat: qui aliquando in collum vesicæ collapsus, lotium retinebat; ita vt sæpe hac de causa in suppressionem urinæ incideret: & quamuis vna cum Cornelio Errico collega meo & Henrico Vergerio medicamenta apta præscriberemus, semper lapide ex collo vesicæ transmoto per catheterem, primo per Guilhelmu lichenotomum immisum lotium reddebat, ita vt postea edoctus, & in hac re versatus, se ipsum semper lotio retento cum cathetere immisso lapide depulso curauerit. Noui ego iuuenem Rotodamensem, filium illius viduæ in præclaro hospitio, cui Diuus Martinus pro insigni erat, calculo laborantem; qui cum mingere non posset, ob calculos exiguos, vel materiam pituitosam obstruentem virgam aut collum vesicæ, suo ipsius Marte, sine medico, ob verecundiam (vt arrior) iuncum flexilem per meatum urinariam immittebat, vsque ad vesicam ipsam, & sic sibi ipsi erat medicus, ac depulso lapillo, urinam sapissime prouocabat. Hoc tamen periculosum est, cum iuncus uti candela cerea (sed magis iuncus) dirumpi possit, aut eius pars in meatu urinario permanere, quod & candelæ cereæ aliquando contigit, vt refert Amatus centur. 4. cur. 20. de cerea candela per urinariam fistulam immissa & intus manente. Præstat cathetere uti, sed cum cautione, & vbi necessarium est: cuius forma etiam varia esse debet: incuruus viris seruiens, modo quindecim digitorum, modo duodecim, modo nouem; fœminis vero maior, quidem nouem digitorum, minor sex tantum. Verum vt dextre fiat, præstat vt lithotomus hoc faciat, qui & aliquando digito in anum immisso lapidem transponit, & cognoscit, num paruus aut magnus sit: nam & ipsa vrina tam a calculo paruo retinetur, in meatu urinæ contento, quam magno, & meatum occludente. Huic mendandum est immisione fistulæ, qua in vesicam protruditur calculus, & ex ostio colli mouetur, & vrina redditur. Si autem multum infra collum vesicæ non est, vrile erit (quemadmodum & Rondeletius dixit) digitis comprimere, parte inferiore, & sensim deducere ad extremum vsq; pudendi. Ali-

Ex vesica distenta si continetur, curatio.

paralyti vesicæ curatio.

propter ægrum sensum, curatio.

In sanis si accidat vrina retentio, quid faciendum.

quando ita est infarctus parti, ut neque intra, neque extra propelli possit. Tunc fortibus dilatantibus fovere partem oportet, & succum raphani cum pauco aceto extracti syringa iniicere, ut frangatur, vel succum limonum aut hyperici. Quod si hæc non proficiant, nouacula partem dissecare & inde extrahere. Sed hæc ad chirurgiam pertinent, & periculosa sunt.

S C H O L I A.

DE calculo renum, & qui in vterere hæret, dictum est libro præcedente. De calculo vesicæ postea quoque in hoc libro dicturi sumus, quomodo is sit conterendus & curandus. Verum si ex lapide vesicæ ceruix fuerit obstructa, præter ea, quæ diximus observatione præcedente, ut lapis ex meatu recedat, supino figurato ægro, ut crura reliquo corpore sint sublimiora, multifariam ipsum concuties: quibus peractis iube, ut æger urinam reddere tentet. Quod si nihilominus urina adhuc supprimatur, rursus concute: sed vehementius: atque si sic quoque permanferit, immissa ænea fistula seu argentea, simul & lapidem a ceruice repelles, & urinam euocabis, *Galen. teste 1. de loc. affect.* At in casu deplorato, si in collo vesicæ adsit lapis, vel caro innata, ita obstruens meatum, ut nullis præfidiis remoueri possint, ut æger propinquus sit perditioni, neque vlllo modo instrumento curari possit, & forte etiam adsit inflammatio, & catheterem ferre non possit, ut sacerdos ille, de quo diximus *obseruat. 16. huius libri* (quamquam in illo iam in mortis agone existente fieri non potuit) tunc, secundum Rhasem, iuxta collum vesicæ in latere eius locus scindendus est, & cannula imponenda ad emittendum lotium: *Auicenna (quod etiam a Serapione ponitur, & 10. continent. apud Rhasem)* scissuram efficit paruum inter anum & testiculos, & ponit in ea cannulam, ut egrediatur urina; qui locus minus periculosus est, ut ex cognitione anatomie habetur. Sed cauendum, ne accidat nocumentum per incisionem, aut fluxus sanguinis, & per consequens fistula subsequatur, quæ postea consolidari non posset, ut nos frequenter vidimus in iis, quibus lotium per fistulam regurgitabat, & non per penem. Attamen peius quidem est, si fistula succedat: at melius erit, quam ut æger moriatur: nam sic per fistulam longius adhuc vitam protrahet. De his instrumentis & hac operatione vide *Albucaſim in 2. par. sue chirurgie, cap. 58. 59.* & *Paulum Aeginetam lib. 6. de chirurgia cap. 59.* Ceterum si calculus obstruat meatum urinarium, & lotium impediatur, præcedentibus relaxantibus exterius admotis (*nam iuuat in hoc casu emollientia immittere & extra applicare*) deinde, si opus sit, ad incisionem virgæ veniendum, si in virga hæreat. Quidam deduxere nonnihil meatum glandis ferro, atque immisis teretibus forcipibus, & virga extraxere. Quandoque non ita magnus est, & elapsus ex vterere in vesicam impedit urinae emissionem, vel in vesica natus licet urinae suppressionem inferat, tamen aliquando cum iis, quæ urinam ciunt lapis expellitur. Sic quidam cum intolerabilem dolorem pateretur in lumbis, & vesica,

cum in omnimodam urinae retentionem incidisset, hanc potionem ebibens, non solum urina fuit prouocata, verum etiam septem vel octo lapillos ad magnitudinem pilorum vna cum lotio emisit: *℞ filipendula, urticarum, viol. pentaphylli, passul. enucleat. ana p. j. sem. geniste, gran. iuniperi, gummi cerasorum, ana ℥ ℔. fiat decoctio in aqua viol. & fœniculi pro ℥ iij. adde cassia recens extract. ℥ j. ℔. sanguinis hirci preparat. ℥ j. misce.* Monacha quoque annum agens sexagesimum primum, cum similiter dolore in lumbis & ilio sinistro afficeretur, hac potione vsa, lapidem hac forma oblonga & rotunda reiecit. *℞ plantag. pentaphyllonis, cum radic. foliorum seu extremitatum ribes nigra, ana m. j. saxifrag. m. ℔. granor. mili solis, sem. geniste, paonia, ana ℥ j. fiat decoct. in aqua commun. & huius accipe ℥ iij. cassia nouiter tracta ℥ x. sanguin. hirci preparati ℥ ℔. pul. specier. Iustini ℥ j. fiat potio.* Facto etiam lotio cum parietaria; addendo interea residuo decoctionis syrup. de artemisia, de duabus radic. ana ℥ j. & hoc decoctum sumens omni die, mane & hora quarta pomeridiana, cessante dolore, optime minxit, & bene habuit. Nihil æque expertum habemus, quam foliorum ribes nigra m. j. decoctis addere, quamquam aliquando vehemens est, ut sanguinem simul cum lotio educat, quemadmodum antea de rustico illo diximus, qui decem diebus lotium reddere non potuerat, de quo egimus *obseru. 18. huius libri*. Sed & hoc quoque mirabile experimentum est, quo usus est *Gisbertus* quidam *Alcmarianus* tectorum refector, ex ischuria in lecto decumbens adeo vehementi, ut quinque diebus urina suppressa maneret, qui cum nullis remediis curari posset, tandem duas tresve squibalas fimi equini, ponderantes uncias duas, uti mihi ostendit, cum vino calido Rhenensi colabat per pannum lineum: quam colaturam vna dosi, cum frustra multa tentasset remedia, sumebat, & ex incontinenti mingebat. Eadem dosis antea propinata fuerat patri *Nannii Alcmariani* professoris Latina lingua apud Louanienses, quondam præceptoris mei, cum per duodecim dies non minxisset, vti *Iusta Teylingia* socrus mea, matrona me hercule fide digna, retulit mihi, cum ipsamet vidisset, quod ab assumpto medicamento per tres aut quatuor horas copiose urinam minxerit. *Petrus* quoque *Gerardus Alcmarianus*, *Iunius* dictus, cum laboret ex calculo & omnimoda urinae retentione, idque per plures dies, eandem portionem sumens, statim, miraculi instar, lotium excreuit, & vna conualuit.

OBSERVATIO XX.

De sanguine concreto, ex renis dextri vulnere, ischuriam inferente.

IVuenis floridæ ætatis, robustus, annos viginti natus, cum in *Pagi Schagensi*, ab *Alcmaria* tribus milliaribus distante, cultro mensario vulneratus esset in lumbis, e regione renis dextri, urina ei deinde per sex dies omnino suppressa fuit, cum ingenti pectoris dolore, & vesicæ: quæ etiam inflata erat, ventre tumido & admodum eleuato: quod proculdubio ex sanguine a rene vulnerato per vterem in vesicam defluxo & in grumos concre-

3.
Curatio si ex
lapide vesicæ
ceruix fuerit
obstructa.

6.

Fimuequini

concreto eueniebat. Chirurgus Ludouicus nomine, noster familiaris, eundem tunc tractabat, multaque adhibuit remedia. Verum cum videret agrum in periculum vitæ incidere, eundem pro deplorato habens; vidensque rem ad restim deuenisse, vt prouerbum habet, cum iuuenis vulneratus iam sex diebus non minxisset, me in locum suæ curæ vocari iussit, cum ego eodem tempore, anno 1548. mense Octobri apud Dominum de Schagen, eiusdem pagi dominum hydrope laborantem agerem. Ceterum cum medicamenta ita ad manum non essent, statim iniecta glande, vt feces deponeret, excrementa communia eduximus. Deinde hæc subsequencia eidem præscripsimus. *℞ radic. apii, (incidebat quidem, & simul ad vulneris deterfionem faciebat) fœnicul. petros. ana ʒj. charesolii, folior. petros. communis & macedonici, malua cum toto, parietaria, artemisia, agrimonia, caulium rubrorum, melissa, ana m. j. valeriana m. ʒ. scabiosa, capill. ven. anap. j. gran. vesicarie seu alkachengi num. v. radic. glycyrr. ʒj. sem. anisi, cumini, anethi, ana ʒj. incidenda incidantur & contrundenda contrundantur, & secundum ordinem fiat decoctio in vino Rhenensi (nam hic, quod mirum erat, febris valida non aderat, imo quasi nulla) & aqua communis pro lb. j. ʒ. colat. a lde ʒj. acetopopuli (oxymel quidem imposuissimus: sed ad manum non aderat) dulcoratur autem & saccharo sufficiente. & posuimus ʒj. rubea tinctorum, in puppa seu nodulo lineo ligatam, & exprimendam dum potio propinaretur. Supra pectinem & vesicæ regionem sequens cataplasma, vt imponeret iussi: *℞ charesolii, petros. parietar. ana m. j. ʒ. folior. malua flor. chamom. melil. post coctionem ad molliorem pistentur, & in patella parum fr. gantur, adiecto butyro recenti, & paucopulvere cymini: fiat cataplasma.* Dedissem coagulum leporis, sed non erat ad manum: verum (quod mirabile fuit) cum vix bibisset ex decocto supradicto, & cataplasma pectini calide impositum esset, plus quam quatuor congios vrinæ sanguinolentæ prius quasi sanguinis conereti parum, deinde mixtæ cum sanguine, & aquosi plurima minxit: & quod magis portentosum videbatur, vulnus deinde subito deterg. nobis & mundificantibus, ac tandem consolidantibus probe curatum fuit.*

S O H O L I A.

3. **I** Rius dubitabam, num vulnus renem dextrum penetrauerat: sed cum omnia illa signa, quæ refert Cornelius Celsus animaduertentem, verisimile fuit vulnus ad intima renis penetrasse. Ita enim scribit idem Celsus lib. 5. de signis percussorum renum: *Renibus (inquit) percussis, dolor ad inguina, testiculos descendit, vrina diff. ulter redditur, (imo hic in totum supprimebatur) eaque aut est cruenta aut cruor fertur.* Sed vtrum vulnus hoc ad sinum anteriorem penetrauerit, aliquis & hic dubitare potest, cum eiusmodi vulnera ad sinum penetrantia (vt & Tagaultius testatus est) lethalia sint, sicuti & tenuium intestinorum & ventriculi & vteri, renum, vesicæ, folliculi, fellis discissiones lethales sunt. Quicquid tamen sit, constat hunc cruorem ad vesicam defluxisse a vulnere illato,

eumque in grumum conuersum, & deinde locum retentum fuisse: nam & eo sanguine dissoluto, hominem probe minxisse constat, & a vulnere deinde curatum. Et quamquam hic non aderant sæuissima illa symptomata concreti sanguinis, vel in grumum aut thrombum conuersi, vt refrigeratio, pulsus exiguus, & syncope (*quæ iam aderant mercatori, de quo diximus lib. præcedente obseruat. 26.* cum enim hic nulla nota adesset lapidis, vt ex eo retenta fuerit vrina, & quamquam sanguis non effluerat, vt significaret grumum vrinæ fistulam obdurasse, vt in mercatore illo prius effluerat: hic tamen facile coniectari potuimus ex vulnere renis læsi sanguinem defluxisse in vesicam & in grumum mutatum esse, qui fuit causa retentionis vrinæ. Et quamquam demissa per collem fistula, vt diximus aliquando paulum vrinæ reddunt tales. (Hic tamen, cum deesset fistula, id per chirurgum tentatum non fuit) qua deinde extracta in ipsius ore grumi indicium est ac apparet: quamquam fieri possit, vbi vlcerata fuerit vesica, (quod hic non erat) vt paulatim in ipsa grumus concreseat, vel non præcedente sanguinis fluxore, ex eiusdem Galeni sententia 1. & 6. de loc. affect. Verum hic sanguis ex vena renis aut eius substantia vulnerata ad vesicam fluxit, & vbi concretus in vesica continebatur: ad tales sequi solet animi defectio, & color pallidus, pulsus parvus & obscurus: quæ quidem aderant, licet nondum in animi defectionem incidisset, tamen maximo dolore circa vesicam valde intumescens afficiebatur. Sed hic ex vulnere præcedente facile coniectari potuimus, ex sanguine fluxo ad vesicam & congelato id contigisse; cum etiam dixerimus scholio obser. 26. libri præcedentis, hoc etiam posse contingere ex vena in renib. aut vretere perrupta vel vulnerata, vbi & signa sanguinis in grumum conuersi, tum etiam curationem posuimus. Ita & Gal. 6. de loc. aff. cap. 4. in illo, qui ceciderat sanguinem concretum causam suppressionis vrinæ fuisse animaduertit. Vbi igitur grumus vesicæ fistulam obturet, medicamentum, quod lapidem terere possit, ex oxymelle, atque ipsum quoque oxymel per se in potu dandum erit, præcepto eiusdem Galeni, lib. 6. de loc. affect. sed quia hic deerat nos commodè vrinam ciuentia dedimus. Valet & artemisia in potu sumta: & ideo nos in decocto illam posuimus, ita & rubi ac betæ succus, leporis coagulum, aut hædi, vnumquodque cum aceto mulso, ex Aetii auctoritate, cap. 27. lib. 4. Quod si hoc modo nihil proficiamus, necessitatem inducet catheteris adhibendi: per quem vbi vrinas eduxerimus, rursus prædicta in potu exhibeantur. Si vero neque sic grumi dissoluatur, intercapedinem inter anum & pudendum, πηξίρεον Græcis dictam, inferne dissecare oportet, vt eadem Aetio visum est. At Rondelerius a sanguinis grumo & sanguine concreto, satius esse ducit per syringam iniicere dissoluentia sanguinem, quam per os assumere, non nisi postquam coaluit vena. Carabe in retentione vrinæ (vt idem sentit) a crassis humoribus, sanguine concreto, & a pure retento: aut a vesicæ imbecillitate, data cum

Historia Galeni, de sanguine concreto vrinæ suppressione.

Thrombi curatio.

6.

vino, præsens est remedium. Cinis cancrorum marinarum, vel astacorum fluuiatiliū, multum prouocat vrinam: & dari potest etiam cum præsentia vulneris, addito gummi prunorum, aut ceraforum. Fovere regionem vesicæ in omnibus his causis valde est vtile, aut cataplasmata apponere. Conficiuntur autem ex relaxantibus & incidentibus, vt ex radic. aperientibus, fœniculi, apii, petroselin. asparago, rub. maior. asaro. semin. calidis maior. ex aqua & vino. In sanguinis concretione, si sanguis non defluat a vesica, vtile est etiam eadem decoctione fovere: vt etiam si a renibus non defluat. Cataplasmata fieri possunt ex residentia decoctionis, vel ex farina lupinorum, orobo fabar. cum oleo incidentibus, aperientibus, vt cum oleo amygdal. amar. oleo scorpion. irino, vel de spica. Si vrina retineatur ob vesicæ, aut aliquam partium vicinarum inflammationem, præterea, quæ diximus scholio Obseruat. 17. huius libri, curanda erit inflammatio, sanguinis missione, vt postea suo loco ostendemus, & aliis remediis propriis, curandæ inflammationi conuenientibus: fieri potest cataplasma proprium, sic: ℞ malue, viol. ana m. ij. bis malue ℥ ij. ficuum par. xx. omnia coquantur in aqua contusa, per cribrum transmittantur, quibus adde ol. liliorum, vel amygdal. ℥ ij. axungie porcin. cuniculi, gallinæ vel anatis ana ℥ j. butyri ℥ ij. misce, fiat cataplasma, addendo parum farinæ hordei. Non renitetur vrina, nisi inflammatio in magnum tumorem peruenerit, pro tempore medicamentis digerentibus est vtendum, aut sedantibus dolorem. Si ab inflammatione, & potius a tumore frigidus fiat, magis calfacientia & digerentia cum emollientibus miscenda erunt, & linimenta simili modo conficienda, vt quod paratur ex bdellio, ammoniaco, cum multo oleo liliorum, vel amygdal. terebinth. & cera, vel sic: ℞ succi apii & fœnicul. marini recentis, vel aceto conditi ℥ j. olei scorpion. ℥ ij. coquantur ad consumptionem succorum cum ℥ j. pinguedinis cuniculi, vel felis. Postea adde asari, semin. petroselin. cymini, ameos seseli ana ℥ j. spica celrica, schœnanth. ana ℥ ij. tereb. abietis ℥ j. cera q. s. fiat vnguent. tempore inunctionis adde vini vel aqua vitæ parum. Si in ardentibus & acutissimis febribus hoc symptoma contingat; quæ scholio obser. 9. conscripsimus, reperies de vrinæ difficultate. De ischuria nunc satis dictum est. Quare ad affectum huic omnino contrarium accedamus, nempe ad vrinæ incontinentiam.

OBSERVATIO XXI.

De quodam vrinam continere non potente.

1.

Religiosus quidam, septuagenarius, cum diu calculo renum laborasset, ac infinitis diureticis medicamentis vsus esset, in contrariam passionem incidit, vt vrinam non retineret, & præcipue noctu; quanquam etiam in die liber ab hoc malo non esset. Cum autem hic senex esset valde frigidus, & crassis succis redundaret, huic (quamuis difficulter curaretur) consulimus, vt acciperet pilulas de hiera, ac iisdem vteretur, quæ ad resolutionem faciunt, muscoli constringentis collum vesicæ, lib. 10. obs. 29. qualia & ibi schol. eiusdem

obs. annotauimus, ex lib. 6. Aetii, cap. 34. de vesicæ re-soluta, apponentes rutam, cuminum, anethum, in oleo elixata, exiguo adiecto castoreo. Consulimus quoque, vt gallinæ guttur combustum cum aqua tepida sumeret ieiunus; hoc enim a proprietate valet, vt leucanthemi flores, vel leporis testiculus, tostus ex vino odorato. Porro item calaminthæ & myrrhæ ante cœnam salutaris est, vt & Paulus docet, præsertim, si cum vino odorato præbeatur, Aetio quoque auctore. Sed his nequaquam, vt iidem auctores iubent, exhibenda, quæ vrinam ducunt. Commendabam & decoctum saluie, & herbe paralytis, myrtill. & gallarum, & nucum cypressi, ex Valeasco, & medicam. Serapionis, valde in hoc casu commendatum: ℞ granor. myrti. gland. torrefact. corticis thur. cumin. cyper. ana ℥ j. fiat pul. detur ℥ j. cum vino decoct. thur. sumach. balauft. & cupularum glandiam. Commendabam eidem, vt & ℥ j. castorei sumeret, & aliquando theriac. ℥ j. Vtebatur & vino rubro Gallico. Quibus melius habere videbatur, quamuis in totum non curaretur.

SCHOLIA.

Sicuti vesica paralyti correpta, iuxta Paulum, vt antea diximus, ex musculis circumstantibus, nihil reddit: ita quoque si musculo fiat ceruicem ambiente resoluta, incontinentia sequitur vrinæ. In qua vesica affecta est, non secundum propriam eius essentiam seu corpus, sed secundum musculum eius ceruicem stringentem. De his vide latius Galen. 6. de locis affectis, & Paulum cap. 18. lib. 3. & Aetium lib. 6. cap. 34. & Donatum ab Altomari cap. proprio, de his, qui in se ipsos mingunt, vel de his, qui vrinam continere non possunt. Estque symptoma in genere excretorum immodice, perpetuo noxam functionis consequens, non naturalis facultatis ipsius vesicæ, sed animalis prædicti musculi, quæ nequæ male fit, diminute aut deprauate oblata, sed nullo modo fit: nihil etenim in retinendo vesicæ opitulatur, animali facultate motrice voluntaria omnino priuata ac destituta. Indicium autem eius est, quod vesica haudquaquam vrinam retinere potest; sed inuitis, & præter voluntatem, paucis omnino interuallis excernitur. Huius autem causæ plures esse possunt, quas omnes alii ad externas vel internas referunt, vel ex frigore externo intemperiem frigidam in collo vesicæ aut musculo ceruicem ambiente inducendo, vt euenit sedentibus super marmora, aut lapidem, aut res frigidas, quemadmodum narrat Valesc. de quadam matrona nobili, etiam ab eodem sanata; quemadmodum & piscatoribus euenire potest, & natantibus in aqua frigida, casu, percussione, lapsu ex alto, tum aliis rebus, quibus resoluitur vesica, vel eius musculus, vt de resolutione & paralyti ad longum scripsimus: sicuti & musculi stringentis collum vesicæ incisione, dum lapidem extrahunt imperiti lithotomi, vel ex vulnere ipso, vt sæpissime in praxi quotidiana conspeximus, post incisionem male curatam, vrinam deinde retinere non potuisse, quibusdam & per idem foramen lotio per se emanante. Quod & aliquando accidit ex frigiditate, sed plurimum vul-

Ob vesicæ inflammationem si vrina retineatur.

A tumore frigido.

Ex febribus ardentibus.

3. Incontinentia vrina.

Parti affectæ.

Quis affectus præter naturam sit vrina incontinentia.

Causæ.

mum vulnere, vt in his, quibus lapis extrahitur, aut dolore multo, vt in *partu difficili*. Hoc casus & nos sæpe vidimus. Ex paralyfi vesicæ ac totius corporis subinde fit, se vsque ad collum vesicæ extendente, vel ex causa interna, antecedente, ex mala intemperie frigida vesicæ; vel etiam frigidis succis, ipsis musculis & nervis debilitatis, resolutis, mollificatis: quemadmodum decrepitis non solum debilitas contentiuz euenit, etiam in somno prolixo, & in ebriis ob vehementem vini potationem lectum commingentibus, & pueris in lecto mingere consuetis ob neruorum mollificationem, & decrepitis ob superfluum humiditatem & frigiditatem, quam naturaliter tum accidentaliter possident, & propter vertebrarum impulsionem ad interiora, & prægnantibus quoque ob compressionem fœtus in vtero vesicam comprimantis, aut ob apostemata partium vicinarum. *Signa* demonstratiua ægritudinis pro se sunt nota, vrina perpetuo vel per intervalla emanante, cum vestes ac lectus facile fœtorem emittant, nisi continuo mutantur. Causæ procatareticæ ex infirmi sermone habentur. Et si ex mala intemperie frigida, calida iuuant, frigida nocent, corpus frigidum est: & si sit cum materia, ex dominio humoris prædominantis frigidi habetur. Si ex impulsu vertebrarum, visu & tactu discernitur. Si ex apostemate membrorum vicinorum, signa apostematiz aderunt. In decrepitis plerumque incurabilis est, qui ob id hæredibus exosi filiis, ancillis, seruis, & vxori, propter abominationem. Infantes, quamuis iis non succurritur, ætate accrescente per se curantur. Aliis ætatibus aliquando facilis est curatio. Prægnantibus potius conuenit bona victus ratio & vini rubri potus: neque fortia medicamenta intus aut extra, ne abortus succedat. Quare in istis tum in cunctis præuideat medicus, ne infamiam incurrat. Quod vero pueris maxima ex parte soleat hæc affectio incidere, 45. cap. 3. lib. *Paulus scriptum reliquit*. sed ab externa causa musculo infrigidato, citius curatur, quam læsis eiusdem musculi nervis circa os sacrum, vt 4. de loc. affect. apud Galen. ob ceruicis vesicæ vulnus aut casum, aut vertebræ luxationem, nulla his medicina prodest, teste Paulo cap. 18. lib. 3. Curationem vero iam diximus, lib. 10. obseruat. 92. si ex paralyfi vesicæ fiat, ac scholio eiusdem, præter ea, quæ ibi diximus. Si sit ex ictu vel lapsu, missio sanguinis protinus necessaria est: cucurbitulæ, frictiones, ac ventris deiectiones prosunt, & quicquid materiam auertere poterit fluentem: si vero intrinsecus orta, ex causa vires neruorum aut musculum resolvente, quæ supra dicta sunt de paralyfi, de diæta, potionibus, & ventris deiectione, huc transferenda. Et quia sæpius ex frigida prædicti musculi aut neruorum ad ipsum deuenientium intemperie affectio hæc originem ducit, interim per se, quandoque vero frigidorum succorum abundantia, propterea ad curationem eius, cum ex hac causa exciteretur, aerem ad calidum vergentem eligemus, somnumque modicum, & moderatas vigilias. *Ocium ac desideriosam vitam declinabi-*

mus, ac moderato exercitio vtemur, & alui deiectionem singulis diebus procurabimus, natura vel saltem arte, glandibus seu clysterib. Vitabuntur & animi affectus, præter iram, quam aliqui conferre dicunt. Cibos eligent facili coctionis ac boni nutrimenti, ad calidum vergentes: Nam elculenta omnia calefacientia esse debent, ac exsiccantia, vnde assa vel fricta conueniunt: fontes propterea calidi, ac marinæ plunt natationes, perq; intervalla vomitiones, si concitantur, iuuant, venter enim eo modo pituita exoneratur. Eligendæ autem sunt carnes *auium paruarum, pullorum, gallinarum, perdicum, phasianorum, quæ perpetuo cum aromatibus condienda erunt: similiter in earum iure hyssopi parum, samfuchi, saluia, satureia, seu serpilli, fœniculi, seu oreoselinii incoquantur*. Interim eisdem carnibus dictis, vt paulo ante dictum est, assatis vtantur. Nam sicci cibi eisdem competunt, vt inquit Plinius. Pro potu aqua multa exhibeatur, vel vinum subrubrum, astringens, potissimus eis, qui ab eo se abstinere non possunt: & (vt summam dicam) vniuersa victus ratio calidior & siccior sit, vt inquit Aetius, nisi acriores & mordaciores appareant vrinæ. Quod vero ad medicamentorum rationem attinet, quoniam communia habet auxilia hoc vitium cum ischuria orta ex torpido vesicæ sensu, seu eius resolutione, eodem Aetio teste ca. 34. li. 6. idcirco iisdem commode vtare: & si resolutionis causa frigidi & crassi succi redundantes fuerit, eis quoq; vtendum erit medicamentis, cum alterantibus, tum purgantibus, quæ lib. 10. de resolutione probauimus. Purgationibus adicere poterimus myrobalanos, cum post purgationem relinquunt stypticitatem & roborationem. Vitanda itaq; sunt medicamenta, quæ refrigerant, potissimum ea, in quibus valida est hæc vis. Et calidis fouendi sunt ægri ac roborantibus potissimum. Paulo auctore, œnelæo calido, & similibus. Idem infundit oleum rutaceum commode, & oleum cucumerum erraticorum cum butyro & castoreo, & quæcumq; exsiccant & discutunt, rutæ decoctum, agni seminis, & cumini. Valet & diacyminon. Valet & hic pulvis: *glandis arida farina ʒv. thuris masculi pollinis ʒij. myrrh. ʒj. ʒ. sem. ruta, acori, cypriana ʒj. misce, fiat pul. detur ʒj. cum vino rub. vel decoct. seminis myrti*. Aetius his, qui vrinam præter voluntatem emittunt per mordacia cataplasmata & malagmata & per rubefacientia ex sinapi apparata curat, & ex arenæ iniectione a sole seruefactæ, aquisq; naturalibus, & maxime sulphurentis & bituminosis, primum quidem calidis, postea etiam frigidis, nec non & partes exercendæ & perfricandæ. Valet oleum de been, cum pyrethro, pipere nigro, & cortice pini, & nucis cupressi, oleum cicinum, inungantur circa radicem virgæ pettinem & perinæum. Theriaca quoq; danda, vt diximus, vel methridatum.

OBSERVATIO XXII.

De nobili puella quindecim annorum, ab incunata ætate vrinam non continente, curata.

Vbi vesica vrinam retinere nequit, quo symptomate affectos Paulus *inpyritas* appellat, a

Galeno vero *6. de locis affectis* ἀκύντος ἔκκρεσις τῶν σπέρμινος nuncupatur affectus hic: sed latinis urinae incontinentia, seu prater voluntatem excretio. Hoc malo admodum foedo. Nobilis puella quindecim annorum, cum ab ineunte ætate in hoc usque tempus laborasset, ut huic vitio ac symptomati occurrerem, hæc infra scripta remedia præscripsi, quæ adeo iuuerunt, ut ab hac molestia liberata recte deinde valuerit. 17. Martii die, anno 1561. hic bolus omnium primo præscriptus est. *℞ cassia recens tracta ℥vj. rhabarb. optime pulueris. ℥j. pul. sem. anisi ℥ss. sacchar. candi dicto asperso, fiat bolus*, qui commode ventrem mouebat, fecibus communibus ductis, & egregie profuit. 19. Martii: *℞ radic. acori veri, cyperi, ana ℥iij. galanga, xyloaloes, calami arom. nucum cypressi, balaust. cortic. granatorum, granorum myrti, cupularum glandium, radic. sigilli Mariae, radic. consolida maioris, radic. inula, ana ℥j. gallarum, thuris, sem. agni casti, ruta, ana ℥j. cinnamomi selecti ℥ss. omnibus puluerisatis & semel ebullitis cum vino rubeo styptico q. s. adiecto saccharo fiat claretum secundum artem. ad ℥j. ss. capiat bis in die cyathum vnum. ter reiteratum fuit.* 29. Martii. *℞ medulla glandium exsiccat. vel eius farina ℥iij. ss. thuris ℥j. ss. rasura eboris, spodii, galanga, ana ℥ij. cum ℥ij. ss. syrup. menthacei, fiat mixtura, cum eat dormitum: cum enim lectum commingeret quoque, capiat ad magnitudinem fabæ maiusculæ. Hoc quoque ter reiteratum fuit.* 18. Aprilis. *℞ equiseti, pentaphylli, plantag. cum radic. ana m. j. sanicula m. ss. radic. acori veri, cyperi, enula campanæ, sigilli Mariae, ana ℥ij. galanga, xyloaloes, calami aromatici, cupular. gland. ana ℥ss. gallarum thur. sem. agni casti, ruta, florum ros. balaust. ana ℥j. coquantur in vino rubeo q. s. aromatic. cum ℥ss. cinnamomi selecti, & adiecto pauco sacch. fiat claretum ad pintam vnā cum dimidia. Vicibus quatuor iterum fuit paratum.* 6. Maii. *℞ plantag. cum radic. pentaphyll. equiseti, bugla, polygoni, sanicula, vtriusque menthae, ana m. ss. radic. acori veri ℥ij. radic. consolida. maioris, radic. sigilli Mariae, ana ℥j. ros. rub. galanga, xyloaloes, calami arom. incisi, nucum cypressi, cupul. gland. ana ℥ss. sem. agni casti, ruta, thuris, rasura eboris, cyperi, ana ℥ss. fiat omnium decoctio artis ratione in vino rubeo pro pinta vna & dimidia, addendo cinnamomi electi ℥ss. sacchari q. s. fiat claretum ad ℥j. ss. addendo syrup. ex ros. ficis ℥j. ss. misce. quinquies innouatum fuit. Hoc enim clareto maxime delectabatur, & plus quam reliquis supradictis profuit: & ideo ad finem curationis eo utebatur.* 8. Maii. *℞ mentha, calamintha, flor. ros. rub. ana m. j. salvia, ruta, origani, ana m. ss. radic. inula, calami arom. radic. acori, cyperi, ana ℥ij. thuris corticum granat. sumach, cupul. gland. cypressi, balaust. ana ℥j. coquantur in vino rubro Gallico styptico ad ℥j. ss. misce pro fomento circa pubem. Id enim, si quid aliud, summopere iuuabat. Bis autem reiteratum fuit. Post fotum circa inguina, pectinem, & pubem, & perinæum, fiebat inunctio cum vnguento infra scripto. *℞ vnguent. Aragonis ℥j. olei costini, spica, ana ℥ss. misce.* 17. Maii. *℞ medulla gland. exsiccat. seu eius farina ℥j. thuris ℥ss. rasura eboris, spodii, cyperi, galanga, ana ℥ss. puluer.**

subtilissime & cribretur, & cum syrup. menthaceo ℥j. ss. misce. Cum aliquem calorem sentiret in renibus seu lumbis, hoc vnguento inungebat lumbos. *℞ vnguent. comitis. olei myrtini, vnguent. infrig. Galen. ana ℥iij. misce.* 10. Iunii. *℞ medulla glandium ℥ss. flor. ros. rub. rasura eboris, spodii, cyperi, galanga, ana ℥ss. fiat pulu. subtilissimus, dissolue cum aqua equiseti q. s. adiecto sacchar. optimo, fiat confectio in tabul. secundum artem, bis in die capiebat ℥ij. & sub noctem dum iret cubitum. fuitque sexies reiteratum, & iidem magno cum nostro honore fuit curata, puella nobilis & consiliarii filia.*

S C H O L I A.

Simili fere modo adolescentem octodecim annorum, qui ab ipsa pueritia, lectum semper commingebat, curauimus: cuius historiam posuimus lib. 10. obseru. 29. de vesicæ paralyti. Paulus pueritiam eo vitio teneri affirmat, lacerti ceruicis vitio resoluti, quod pueris quandoque contingit etiam mingentibus in lecto. Hinc quidam sub vno capite de incontinentia urinae, & de mingentibus in lecto scribunt, alii seorsim de vnoquoque vitio agunt, ut Valescus facit, quamuis eadem causæ, de quibus Scholio precedente diximus, esse possunt. Auicenna tum eius sequaces ad duas causas præcipuas illas reducunt, ad mollificationem musculi vesicæ, quam aliquando adiuvat acuitas urinae, & ad profunditatem in somno, in quo fiunt somnia a virtute imaginatiua, expultricem incitante. Et sic fit mictus in lecto non solum in pueris: sed & in iuuenibus & aliis, præcipue cum die precedente vel nocte supra modum potui dediti fuerint. Curantur calfacientibus & roborantibus collum vesicæ, ut obseruatione tum Scholio precedente dictum est. Proprie vero ad eos, qui se in somno permungunt, conuenit, ex sententia Aetii, primo hædi pulmo moderate affatus & citra panem large in cibo acceptus. Similiter leporis cerebellum siccum potatum ex vino, aut testiculum in vinum indito, & bibendum dato, ut ipse refert. Vesica quoque porcina per se vsta, & in potu exhibitā iuuat: alii cinerem vesicæ feminae suis combu- & potandum dant: simili modo & ouilla vesica facit. Renes asini, (ut quidam volant) in mero triti potique. Stelliones mire quoque prodesse traduntur, capite pedibusque interaneisque demtis: reliquum corpus inallatum, in cibo sæpius datur. At ego istis non libenter vtor. Interim urina infantum (ut etiam refert Benedictus Veronensis) muribus elixis in cibo datis cohibetur. Ego hoc expertum noui a quibusdam mulierculis Delphensibus, quæ pueris elixos mures commode dederint. Idem confert, si castorei ℥j. in vino odorato in potu exhibeas, pueris quidem grandioribus, non autem infantibus. Eandem vesicam ouillam seu caprillam vstam ex posca Gal. 9. de compos. medic. secund. loca præbat bibendam. Valescus magis laudat cum vino odorifero tepido tostam prius super regulam ignitam vel laminam candentem torrefactam: nam vinum suo calore inquit, opus felicitabit: aqua enim & acetum membris ob-

De mingentibus in lecto.

Ad eos qui sunt in somno permungunt.

bris ob-

bris obsunt, nervosis. Galenus quoq; leporis testiculum in vino odorato feruefactum, oblinereque iubet, pudendum cimolia terra, cum perdicii succo. Valescus cum cimolia, & felle tauri inungit pectinem & perinzum, alii pubem oleo rutaceo inungunt, & porce vesicâ laudant, vel tauri vel capræ ex vino nigro. Cum vero diuturnû & inueteratum fuerit hoc malum, velut eos, qui præter voluntatem ob resolutionem vesicæ urinâ emittunt, hos curato. Differunt etenim ii ab illis, in eo qd iis per somnû saltem hæc accessio cõtingit illis vero, quibus ob muscoli colli vesicæ resolutionem hoc accidit, etiam dum vigilât eodem modo afficiuntur *ex sententia eiusdem Aetii. cap. 25. lib. 11.*

OBSERVATIO XXIII.
De puero decem annorum, calculo vesicæ laborante.

Puer decem annorum, cum urinam crudam & colore subalbidam meieret, & sedimentum arenosum & sabulo simile conspiciebatur, & pudendum sæpe scalperet, atque id violenter & sæpe distentum haberet, atq; tunc magis cum ad urinæ excretionem vrgeretur, deinde continue quoque urinam propellens vexabatur, ex quibus signis, quæ ab Alexandro & Paulo referuntur apud Alexand. lib. 9. ap. 7. & Paulum lib. 3. cap. 45. intellexi puerum calculo vesicæ laborare, eoque magis, quod urina de repente eidem subinde supprimeretur, præsertim ubi lapis in vesicæ cervicem incidisset, cuius & Galenus meminit 1. de locis affectis. Cum autem hæc animaduernerem, & parentes a me consilium peterent pro puero, cum sectionem libenter non admitterent, ad quam, si non curaretur, deueniri oportebat, inprimis cum communem habeat hæc affectio curandi rationem cum calculo renum, ideo eandem victus rationem observandâ esse mihi ipsi proposui, quam in libro præcedente fusius de calculo renum curando recensuimus. Præter illa, quæ ibidem diximus imperauimus, ut puer sibi caueret a lacte, *ex Galeni decreto 6. de morb. vulg.* & per consequens ab omnibus lacticinis, vela lacte confectis & caseo, nec non ab aquis impuris, & multo limo refertis, ac vehementer frigidis, ut & Attius admonet. De curatione vero omnium primo considerare oportet, nunquid puer sit in ipsa accessione, & dolor vrgeat, & lotium supprimatur ex calculo os colli vesicæ obstruente vel grauate, quo minus lotium reddere posset, vel supprimatur. Aliter vero tempore remissionis procedendum quoque est. Verum nunc loquimur de calculo vesicæ, quamuis etiam calculus prolapsus e renibus aut vrereteribus in vesicam, permanens in ea mictum impedire potest, de quo satis dictum est, quomodo & is calculus curari debeat, qui aliquando in vesicæ capacitatē illapsus, si parvus est, paulo post facile mingitur: tunc quidem dolor cessat in renibus & vrerere, a quibus prius illapsus erat: sed si rursus in vesicâ obstruat, iisdem remediis, quibus lapis ex collo vesicæ amouetur, vel per urinam ducentia, cum emollientibus subinde emingitur vna cum urina. At in vesicâ, si nouus sit, nec

adhuc adeo magnus, præcessit crassi humoris & pituitosi mictus, adeo ut matellæ fundus tali pituita plenus appareat: hæc autem lapidis materia. Ipsius vero iam concreti signa clara sunt, cum urinam supprimat, ex syringa, hoc aut facit, cum minor meatum claudere exacte potest. Nam si magnus, potius grauando facit stillicidium urinæ. Sed antequam syringa utamur, videndum & aliqua signa, quæ & Rhases posuit ex Paulo: quoniam æge gestit sæpe penem contrectare, ut hic puer faciebat, & ipse penis sæpe erigitur: quod sane accidit & his, qui vlcus vel dolorem aliquem in eo sentiunt: nam dolore repletur & intumescit. At hic signa vlceris non erant. Quod si magnus sit lapis, & sæpe inequitando dolorem percipiunt, & quasi pondus graue in vesicâ. Ceterum ubi puer in dolore erat, & fomentis dilatantibus & emollientibus ac dolorem sedantibus relaxantibusque utebamur, etiam post ventris deiectionem ex glande, (*quamuis etiam clysteres molles inueniunt*) adhibitis iis, quæ simul lubricarent & urinam ducerent, ac lapidem comminuerent, *quorum exempla præcedente libr. posuimus, & paulo antea.* Quod si in totum urina suppressa sit ex calculo, qui eiusmodi remediis, neque fomentis, neque balneis cederet, nec supino figurato agro, ut crura reliquo corpore essent sublimiora, ipsum concutiendo, ut superius dictum est, quibus peractis æger iubendus est, ut urinam reddat, & si neq; hoc modo amoueatur, id cathetere cum cautione tentandum. Verum tempore remissionis consiliuimus, ut puer vreretur iisdem auxiliis, quæ ad calculum renum conferre diximus, postea etiam iis vtens, quæ paulo validiora essent. Tamen in puero commendauimus inprimis illud efficax auxilium ab extra, ab Alexandro comprobatum, longo tempore & experientia prius inuentum, caprillum seu hircinum sanguinem calidum extrinsecus illinitum, super vesicam impositum. Verum longe optimum esse fatetur, si in calido balnei ære ipsum illinas, atque ita deliges, id vero non modo semel, sed sæpe & per interualla. Dedimus & huic puero, sicuti & aliis, nostram destillationem de radice ononidis, de qua sæpius ante dictum est: quibus & hic puer, tum alii, ubi calculus exiguus esset, probe calculum cum lotio expulerunt. Sed illud quoque hic meminisse oportet, validioribus ibidem conscriptis, nempe libro præcedente, vri oportere, indicatione sumpta a parte affecta & præsertim ab eius positu. Namque crassities, quæ potissima causa (*ut etiam Donatus ex Aetio annotauit*) generationis calculi in vesicâ existit, per extenuantia remouenda est, ne multa materia crassa congregetur. Quapropter validis atq; efficacioribus medicamentis vtendum, de quibus quoque lib. præcedente ad longum diximus, cum de calculis renum ageremus. Peculiariter autem, ubi ea non suffecerint (*eiusdem Aetii auctoritate*) tanquam lapides vesicæ atterentia & urinam ducentia pharmaca hæc competunt, fœniculi sylvestris radix, graminis radix, artemisia, chamæmelum, amaracus, althææ radix & semen: non quod

circa aquas nascitur, adianthum, smyrnii semē, rumicis radix, lapis spongiæ, lapis Iudaicus, qui teolithos dicitur, asplenon herba, lithospermon lapis, qui ab ægris per lotium eiectus est tritus ac potatus, vermes terreni recenter cocti, triti cum vino, vitis lacryma. Horum vnumquodque (ut ipse inquit) cum vino albo datur decoctum, aut siccum inspersum, aut cum melle, seu cum quopiā ex vino & melle potu. Danda etiam in potu ea, quæ urinam cient, velut est cucumeris semen, apii, petroselinæ violæ albæ semen, & corporibus, quæ frigidiores habent temperiem, meon, phu, acorum, ac reliqua calidiora præbeto. Poterunt quoque varia medicamenta componi, ac prout usus exigit exhiberi cum vino albo, aut aqua mulsa, seu decocto asplenii & radicis graminis, aut etiam oxymelice. Puero imperavi ut semel in hebdomada, vel singulis mensibus bis acciperet hunc bolum.

℞. castia recens extracta. ʒ. vi. vel vii. olei amygd. dulc. ʒ. ii. cum saccharo asperso fiebat bolus, dabam lithontribonib. ʒ. ii. ʒ. cum ʒ. ii. decoct. rad. apii. ononid. cicerum rub. & graminis. Deinde imperavi, ut aliqua decocta fierent ex iam supradictis, quod si neque per hæc & similia lapis in vesica atteri possit, ubi meatum obturans urinæ suppressionem induxerit, eo modo curari debent, ex præcepto Galeni, quæ ischuria orta ex calculo curatur, & ubi ex multifaria concussione curari quoque non valeat, catheterem immittere oportet, ut paulo ante diximus. Sed si neque hæc suffecerint, consului ut ad sectionem transiret eo modo, quo a Paulo cap. 60. lib. 6. docetur. Deinde extracto lapide, & cicatrice ulceri obducta, ea victus ratio constituenda erit, ne eos renasci contingat, quam etiam Aetius instituit cap. 15. libr. 11. Præstat hos a cæna vomere, neque quicquam feruens in cibo sumere, quod renes & vesicam excalfaciat. Cauere oportet cibaria substantiæ duræ, & quæ ægre manducatione atteruntur, & ea, quæ multam substantiam habent, plurimumque nutriunt, & quæ aceruarim digeruntur antequam perfecte concoquantur: grauis item qualitatis, & quæ difficulter commutantur, ac supernatant, & ægre per aluum subeunt, ac inflant: item, quæ meatus obstruunt, aut alias diutius in corporibus insident. Ex huiusmodi enim cibis venter labore fatigatus, ipsos aut crudos, aut semicoctos ad hepar & renes digerit: atque ita quod crudum cumulatim allatum est, inepte præter naturam excolatur, & cum tumultu ad renes progressum, statim coactum inspissatur. Omne lac, præter asininum, vitet. Aetius calculosis hemina mensuram præbet post matutinas deambulationes id præseruat a lapidis generatione. Dat aquam calidam fontanam puram, leuem, aut vinum tenue, urinam cient, non valde vetus. Dulcia vina, ut etiam libr. præcedente diximus, calculosis nocent.

Porro, ut compendio dicamus, omnis diæta in frigidiore temperatura prædictæ exquisitæ attenuatoria sit, in calidioribus vero inter attenuatoria & impinguantia media. Satietatem vero præ omnibus aliis vitare oportet dulcium præferim, & ex caseo conflatorum ciborum: unde & cruditate infestissimam eis censere oportet.

in quam si quando incidant, impastum & absque cibo manere deest, frigora magis quam aestus cauenda. In temperatis locis degant, in quibus anni tempora & horarum numero seruire non infestant. Assumantur etiam ociosa deambulationes, & exercitia moderata: segnitie enim & ocium ei nocent. Ceterum ventrem prebe laxum habere oportet: hic enim, si bene subierit, puriora lotia prodibunt. Hactenus Aetius, qualia & huic puero post incisionem, si ea utendum esset, ut obseruaret, mandauit.

S C H O L I A.

Recte dicit Aetius lib. 11. cap. 9. quod etiam in vesica lapides generantur, pueris frequentius quàm ætate pronestis. Voraces enim pueri sunt, & perpetui motus, & cibis utcumque oblati & nociuis vtuntur, neque horam cibum capiendi seruant ordinatam, quin etiam prius quam prior assumptus cibus concoquatur, alium ingerunt, & cum vehementius a cibo moneantur, crudus & incoctus in venas cibus distribuitur. Mollia autem sunt illorum corpora, & quæ facile cedant eiusque rei gratia obturationem circa renes non perferunt. Quum vero crassissima lotia in vesicæ amplitudinem perferantur, ibidem veluti vini fex & limus aquæ subsistunt, ac postea ex loci caliditate desiccata lapidescunt. Ceterum aquæ impuræ & multo limo refertæ, itemque duriores & vehementer frigida lapidum generationem adiuuant. Vesicæ lapides, ut & Rondeletius contra Fernelium scripsit, ex pituita multum viscida & crassa in vesica indurata augmentum recipiunt, veluti cortex quidam supra lapidem generatur, ita ut videantur ex multis tunicis, aut multis veluti ostrearum testis confecti. Ob id difficillime franguntur vel medicamentis, vel ferro. Est autem hic affectus præter naturam morbus in numero ac in excessu, ut antea de renū calculo etiam dictum est, toto etiam genere præter naturam ut liquet 14. meth. med. Et eius prima potissimaque causa est urinarum crassitudo, ut 6. si. calculi in vesica.

Quæ affectus præter naturam causa generat calculi lapides.

de morbis vulg. a Galeno scriptum est, eaque in vesica collecta, & in vnum coiens cum semel aliquando non apto tempore excreta intus diutius remanserit, concrescendi coagmentandique initium capit: eo vero principio facto facile (quod iam superest) quicquid iterum crassi in vesicam delabitur, priori agglutinatur, maiorque inde tophosus calculus redditur, quemadmodum extra & in calidis aquis sponte nascentibus & innatis, ubi calefit aqua, quotidie lapis coalescere cernitur. Opitulatur autem non parum in hoc vesica ipsa ut quæ frigida sit, nervosa, ac pauci sanguinis, nec non amplissima inferius concavitate inanis. Et sic vesicæ calculi in pueris magis, ut diximus, quam viris generantur, neque a tanta caliditate, sed materia potius crassiore, & ad generandos calculos, prompteq; ab insita caliditate concrescendos idonea. Atque caliditas ad coagmentandum lapidem etiam non parum operatur, licet non ipsa præcipue, sed materiæ qualitas ipsius compunctionis causa existat. Et propterea quicquid calor, etiam mediocris, ut in pueris reperitur, ad huiusmodi materiam

iam tres anni præterierunt, 'quod etiam per vulnus alium lapidem seu calculum sponte reiecerit, nucis iuglandis magnitudine, ab vna parte cuspidem ob longam habentem. Ceterum Iohannes



Guilhelmi, subsecretarius Ordinum Hollandiæ,
mense Augusto, anno 1594. cum multis annis cal-
culo laborans miseram vitam traxisset, tandem
mortuus est. Ad cuius cadauer incidendum in Ha-
gam Comitis vocatus sum: chirurgus corpus inci-
dente, in vesica inuentus est lapis ponderans vn-
cias tres & 3 ss. qui causa mortis fuit: erat subro-
tundus, ouum magnum excedens, vesica quoq; re-
perta fuit vlcerata, ex collisione lapidis tantæ mo-
lis. Renes quoq; alterati & quasi vlcerati specta-
bantur, potissimum vero sinister.

OBSERVATIO XXIV.

L Apis hic vesicæ ab utraque parte depictus per vulnus, in quo longo tempore prius facta fuerat incisio, sponte reiectus fuit a iuvene quodam Delphensi in domo orphanorum agente, cui nomen erat Cornelius Florentii, ætate 16. annorum. Hic anno 1587. 28. die Aprilis nocte intra horam duodecimam & primam, cum ad mictionem sese præpararet, ultro hunc lapidem reiecit, ponderantem uncias duas mercatorum cum dimidia: siccatu vero unciam vnā cum dimidia pendebat. Cum tertium annum ageret, facta fuit incisio per Guilhelmum de Dalen lithotomum. Rursus cum annum quintum excessisset, ab alio calculo re ita urgente facta quoque est incisio. Et iam et-

Refert Gradus multiplices esse lapidum seu calculorum differentias, alius enim (vt iam prius quoque dictum libro præcedente, cum de calculis renum loqueremur) in renibus præcipue noxam inferens, alius in vesica, alius vero in viis mediis nempe vteram, alius in ipsa virga aut pene, vel fistula vrinaria. Quidam rursus durus, quidam mollis, alius frangibilis & substantia arenosa, & facillime dissolubilis, alius dissolutioni omnino resistens. Rursus hic magnus, alius parvus, alius vero mediocris: quidam rursus rotundus, alius oblongus vt hic erat, etiam magnitudine excedens, in iuvene prædicto: quidam angularis, spinosus quidam magis equalis, modo vnus, modo plures. Hinc Rhases 10. Continentis inquit. Id iam penes nos certum est, quendam emisisse lapides septem modico tempore instar auellanarum, alium autem habuisse lapidem ouo gallina maiorem, & rursus fatis in vesica numerus multus vsq; ad decem lapides: & erat lapis ad magnitudinem pomi, rursus lapis modo albus, rubens, cineritius, niger aut differenter coloratus,

modo in corpore pingui, macilento, aut malum hereditarium est, modo incipiens, modo ladens, modo confirmatus calculus, fixus, vel mobilis, aut periodos habens, & cum sauisimis symptomatis, de quibus iam satis dictum est in precedentibus. Causæ autem lapidum, quod huius vel talis formæ sint, sumuntur ex parte loci, in quo generantur. In vesica plerumque rotundus, albus, aliquando cineritius in renibus rufus, aliquando asperi lædentes, in vreteribus parum oblongi, parui instar prunorum: modo sunt angulares, spinosi ob nitrosam urinam transeuntem. Sed de his satis dictum est. Portiones vero ad calculum salutare, ex diuersis auctoribus collectas, tum simplicia & composita quæ ad calculos eiiciendos faciunt, vide ad longum apud Alexandr. Benedictum Veronensem, medicum doctissimum, lib. 22. c. 43. 44. & 45. in quibus latissimum campum remediorum contra calculos inuenies: & commentarium Guainerii, qui hanc materiam sua praxi, quamuis barbara egregie exornauit.

OBSERVATIO XXV.

De quodam cui post calculum vesicæ excisum urina mucilaginosa permanebat, ut rursus metus esset de nouo calculo.

Martinus Alcmarianus cui mercator cognomen erat, eo quod diuerlas merces venderet, utcumque senes existens, cum iam 45. annum attingeret, & longo tempore calculum in vesica habuisset, & intolerabili cruciatu quasi excarnificaretur, tandem eo deductus fuit, ut lithotomo accito lapis magnus eidem excisus fuerit. Hic tamen post aliquot annos, cum in urina ardorem incideret certis periodis & perpetuo urinam mucilaginosa & albam redderet, metuebat sibi rursus de calculo. Cum itaque ad me consultandi causa venisset, anno 1551. mense Iulio, cum mihi vicinus esset, ac in platea frumentaria, dicta habitaret, ne rursus calculo afficeretur, consului, ut corpus mundum a multitudine humoris pituitosi, ex quo lapis generari solet, teneret, & ut vitaret exercitium immoderatum post repletionem, atque cibos crassos, pituitosos, flatulentos, legumina, lac, caseum, & ventrem quoque molliorem sibi conseruaret, natura vel arte, panem azymum declinaret, mustum & ceruisiam crassam, & cibi satietatem: comederet vero carnes pullorum gallinarum, caponum, turturum, columborum, oua mollia, vinum biberet clarum, ceruisiam claram: a crassa & recenti ut abstineret iussi: & carnibus in bulliêdo adderet rad. petros. pastinacæ, & ut ius cicerum sæpe sumeret consului. Quod ad medicamenta attinet, ut sumeret cassiam pro lenitione ventris, & si opus esset purgatione, ut acciperet d. acatholici, elect. lenitiui & diaphanici, propter pituitam ana ʒ ij. cum ʒ ij. decoct. rad. feniculi, malua, & cicerum rub. Si quoque ad vomitum procliuius esset, ut raphani decoctum caperet, cum oxymelite, iussi: Nam vomitus ad præcautionem est valde utilis, & raphanus cum oxymelite etiam facit ad materiam viscosam phlegmaticam incidendam. Quod si ardor urinae illum etiam tunc fatigeret, addendus syr. viol. is etiam rela-

xabit stomachum, ut melius vomat, & contemperabit urinae ardorem. Præterea consului, ut etiam medicamenta, vomitu præcedente (nam vomitus præter id quod ad præcautionem utilis est, ut modo diximus, etiam facit ad ventriculi deterfionem, & generationem & incrementum lapidis impedit) vel etiam ante vomitum dentur leuiter detergentia (postquam antea cassiam sumperit aut lenitiuum) deinde detergentia & aperientia simul permixta: postremo, si lapis rursus increuerit, etiam incidentia & lapidem frangentia. Talem potionem commendauimus. ℞. rad. feniculi, petros. glycyrrh. rad. malua, an. ʒ j. ficuum ping. ix. passul. enuclear. ʒ j. sem. anisi, feniculi, ana ʒ ij. sem. quar. frig. maior. (ob ardorem urinae) ana ʒ j. B. sem. m. lu. solis. ʒ ij. betonica, charesfoli. an. m. j. coquantur in aqua communi pro lb. j. adde oxymel. simplicis, syr. de limonibus, ana ʒ j. B. misce. Deinde iterum fuit purgatus potione superscripta, vel his pilulis. ℞. pilul. de hiera. ʒ ij. rhab. optimi ʒ j. cum aqua betonica, fiant pilulae xij. Deinde capiat sequens. ℞. lithont. ʒ j. cum aqua decoct. malua, rad. alihæ, saxifrag. ononid. ʒ ij. fiat portio. Iussi quoque, ut frequenter adliceret olei amygdal. dul. recent. expressi, succi limonum, ana ʒ j. & si opus esset, ut nostra destillatione vteretur, de qua sapius dictum est.

SCHOLIA.

Ponunt autem medici celebriores tripliciter in vesica lapidem generari, Ex arena, sed raro, unde fit tophus ex lapide iam in renibus concreto, & ex fæce urinae. Cum vero lapis iam vlcus excitauerit, aut carnem, signa confundi. Omnibus tamen (præter signa superius relata) certiora signa, digiti in rectum intestinum, cui vesica incumbit, immissio, & catheter, sed quæ non sine dolore adhibentur. Suppressa urina corpore supino & concusso si prodeat, tunc lapis meatum occludit, ut ante ostensum est. Neque catheteri semper fidentum. Mercatori cuidam (ut Hollerii interpreti referi) omnia calculi vesicæ signa aderant. Cathetere probari non potuit. Mortuo duo magni calculi inuenti sunt, singuli ʒ ij. B. membrana inclusi, utriusque sua. Vbi concreuit in vesica, fere maior euadit, ob maiorem capacitatem vesicæ, nec nisi vi extrahitur. Refert Beniuenius de muliere calculo euulso sanata, sic scribens. Calculum non in viris tantum, sed etiam in feminis concretum certum est. Monialis quadam duodecimo iam die urinam non reddebat, propterea quod ipsius urina iter calculo obstrueretur, quo etiam materia multa confluerat. Quare cum neque anea fistula, neque medicamentis aliis vinci hoc malum posset insolitum aliquem, sed tamen opportunum consilium capiens, vncum calculo initio, ne scilicet conuulsus iterum in vesicam reuolueretur. Tum ferramento priore parte reuulso calculum ipsum percussio, donec sapius ictus in frustra comminuitur: & tunc omni qua potui diligentia, ne quid intus omnino laderetur, vncum ipsum pariter a ferramentum reduco, ex quo simul urina a que calculis remissa, statim sanata est mulier. Vidi similem fere calum de muliere magnum ac insignem calculum habente, iam extra vesicam delapsum in tenui membrana pudendo inhæ-

Lib. de abditi
causis morb.
cap. 80.

do inhaerentem, secat lithotomus membranam: & calculus excidit. Atque ita citra omne periculum a calculo matrona annos supra lxxv. nata liberatur, & qui alias spōte (vt videbatur) casurus erat calculus, ope atque auxilio sectoris prius cadit. Superuixit hæc pluribus deinde annis, sed vrinam continere non potuit.

OBSERVATIO XXVI.

De calculo magno vesicæ, qui incisus extrahi non potuit, vnde tandem ager post diuturnos cruciatus mortuus est.

Iuuenis quidam annos 20. natus, cum calculum in vesica magnum haberet, multis tentatis remediis, etiam a Paracelsicis, qui iactauerant, se lapidem, quantumuis magnum suis arcanis posse resolvere in tenuissimum puluerem, cum nihil iuuamenti sentiret, acciuit chirurgum lithotomum: is quædam fragmenta extraxit, sed totum lapidem facta incisione ad se attrahere non potuit: vnde perpetuo cum intolerabili dolore tabe cōsumtus perijt. Caduere inciso nobis præsentibus, lapis ab vna parte primo præruptus, ad magnitudinem oui relictus in vesica repertus est: in renibus vero nihil lapillorum inuentū. Hic & ante incisionem, & etiam post plurimos annos vitā misere protrahens, tabe cōsumtus obiit. Præstitisset, cum præ magnitudine lapis extrahi non posset, sectionem reliquisse: nam cum totum eum extrahere conarentur, occasum mortis dedit.

SCHOLIA.

In calculo vesicæ licet fortioribus medicamentis sit opus, quam in calculo renum, prius tamen præstata vomitione & purgatione (modo in bollum vesicæ non sit impactus) & detergentia & aperientia & postremo fortiter incidentia & lapidem frangentia propinanda. Quod si forte obstruat cernicem vesicæ (vt istis diebus contigit in fere) & vrina repente supprimatur, cum ex supina figuratione cruribus reliquo corpore sublimioribus, etiam concutiendo senem, lapis non exiret, statim iussimus argentea fistula lapidem ex ceruice vesicæ dimoueri, ac lapide in fundum detruso, ægro mingente, & dolore sedato, pectinem & perineura fomentauimus cum decoct. maluar. althææ, cum rad. anethi. chamemel. melilot. sem. lini, & fenugrac. inuncto loco cum oleo amygdal. dulc. axung. gallinæ, oleo lilieo, succo helxines adiuncto, & exiguo sang. hirci: sumta etiam cassia recenter extracta, adiecit. pauco oleo amygdal. dulc. & iniecto clystere exhibens sanguinis hirci præparati ℥ ij. cum ꝑ j. syr. capill. Ven. Faci & iniectio per syringam olei scorp. amygd. dulc. & liliorum. His atque similibus ad tempus senex ille optime postea habuit. Verum cum ita vesicæ inhæreat, sicuti matula excrementa hærentia contrahit, ita & imbecillior vesica. Deinde imbecillitate vesicæ, & angustis viarum impeditur exclusio. Hinc mors, quia febris & inflammatio sequuntur. In consilio secandi videndum qua parte sit, & an sine periculo eximi possit, an pertinaciter hæreat, an sit in meatu virgæ, & an fractu colli eiusdem. Cōtusio ab asperiore & longiore operatione inflammationem, gangranam,

mortem denique infinitis adfert. Sunt qui iniecto oleo scorpionum, & aliis per penem frangi posse contendunt. *Interpres Hollerij vidit mulierem, qua inunctionibus & suctu penis multos liberauit.* Calculus aliquando si non sit magnus, vel in vesica, vel in ipsam a renibus collapsus ex vesica aliquando expellitur, vrinam retinendo in pene. Nam vrina sic retenta viam dilatat, & præparat ad calculi euacuationem, & concutiendo corpus, & affatim, cumque impetu reiiciendo vrinam. Sunt qui napo orbiculato oleum accommodatum immittunt. Napum coquunt: deinde ad modum emplastri pubi admovent. Alii dicunt, quod si in raphanum cauatum veretrum immittatur, lapidem, nisi magnitudo obstet, trahet. Quidam in raphano excauato crocum adiiciunt. Nec solum calculi causa hoc faciunt, sed etiam difficultatis vrinæ ob crassum, viscidum & glutinosum humorem, aut sanguinis thrombum meatum obstruentem. Sunt qui (vbi nulla remedia prosunt) aperto vesicæ collo, quomodo lithotomi faciunt, viam aperiant, nulla vi eiusmodi illata, quæ inferri solet a variis generis ferramentorum, vbi calculus extrahatur. Atq; ea ratione facta via, aliquando sponte natura calculus, nisi grandior sit, excluditur. Hoc in mulieribus facile, ob breuitatem & rectitudinem colli vesicæ administrari potest: vix tamen sine lésione aut laceratione sphincteris: vnde sequitur inuoluntarius vrinæ exitus, vt superius quoque ostensum est. In viris difficilius, ob reflexionem, quæ fit in modum literæ S. Tutior tamen videtur hæc ratio. Sed si lapis grandior sit, instrumentis intra frangendus. Deinde sectio facienda paulo supra anum, qua parte est sphincter, secundum fibras rectus. Sed hæc ad lithotomos pertinent, quibus hæc cura, sed peritis, ex Hippocrate, committenda est.

OBSERVATIO XXVII.

De vesicæ inflammatione lethali.

Nauta infelix, quamuis robustus, Schiedami habitans, cum in vasto mari tempestate valida ingruente guberhatorē nauis ageret, malumq; eligeret, lignum istud versatile, quo in altū malus ducitur, vi ruptum est, & nautam inter crura, fœmora ac perineum ipsum in altum leuans, eundem fere extra nauem in mare proiecerat, & perinaeum ac pectinem ita læsit, vt in inflammationem vesicæ non solum inciderit, verum & mortem deinde incurreret, cum in naui chirurgus præsens ad manum non esset. Ceterum miserum hunc nautam & semianimem Schiedami ferunt: & tunc accitus chirurgus, neq; venæ sectionē adhibuit, sed testibus mirum in modum inflatis, emplastra: & pectini & perinæo apponit, & linimenta adhibet: & mox lotium in totum suppressum ac relictum fuit. Cum omnia in peius vergerent, re deplorata me vocarunt. Integer testium locus, & totius veretri, ex magna inflammatione, & inflatione supra modum ingenti, niger euaserat: ego ex esthio meno mortem prælagiebam. Glande tamen iniecta ter aluum excreuit, quod prius facere non poterat. Continuo febricitabat, delirabat, vigiliis

tum doloribus consumebatur, at phlebotomia tunc adhibita nihil iuuaminis attulit, & cum lotium reddere non posset, neque foris, neq; infusus, nec cataplasmata anodyna adhibita iuuerunt, neque catheter leuiter immissus, vt lotium prolektaretur, quicquid effecit, & quaecunq; per superius exhibebantur, non retinebat, omnia enomebat. Postea cum rursus ad eum accitus essem; dolor & inflammatio cum sauis accidentibus augebantur. Iniecto clystere nihil profecimus, ita neque diuretica post emollientia, non admodum vehementia ob inflammationem, profuere. Duo adhuc adhibiti chirurgi, post meum discessum. Sed facto prognostico quod ager moreretur, instante morte, cum & sextus dies age retur a mali principio, vocatus est Guillemus lithotomus de Dalen. Cum lotium non redderet, exclamabat miser vt chirurgi testes & veretrum abscinderent, quod in homine iam moribundo tutum minime esse dicebant. Mox infelix nauta misere cum clamore obiit, ad septimum diem fere vitam protrahens, cum magna atrocitate eam amittens.

S C H O L I A.

³ *Vesica infl. m. mata signa.* **H**uius mors miserabilis erat: forte euasisset, vel saltem mitior fuisset, si medicus aut chirurgus peritus eidem adfuisset in naui. Præter alia saua symptomata aderat hic vesicæ inflammatio, testabantur illam ipsam communia inflammationis signa, & quædam propria. Nam ardor, dolorque cum grauitate circa pubem ac inguina eundem molestabant, febris aderat, eaque continua, mentis alienatio, vomitio bilis syncere, & vrinæ reddendæ impotentia, imo postea, malo crescente, eiusdem retentio. Hæc quoque a Paulo numerantur. Vigilant quoque & delirantes aliena loquuntur, & durus fit eis pectus, & pubes, vna cum vehementi dolore, & egerendi appetentia, velut in renesimo fieri solet: quod vero egeritur tenue est, & subsidientiam non habet: aliquando & inflationes sequuntur, & aluus adstricta est, intestino recto ob inflammationem vesicæ compresso, *Aetio teste.* Causæ cum variæ sint, vt externæ & primitiue, vti hic erat ictus in nostro nauta, ita enim fit vulnere, obuiatione rei duræ, attritu, assidua equitatione, potis pharmacis & vesica aliquando inflammatur, cum lapis importune eximitur, quod magnitudine, aut chirurgi imperitia contingit, qui lapidem queritando excruciat, sed ex lapidis duri offensione: nam & lapis aut dolor ex eo succedens causa antecedens esse potest, & affluxu humorum vt ceteræ inflammationes fieri possunt. Et ideo raro fit, vt dicebat *Rondeletius*, nisi præcedat magna quædam exasperatio, vel ob dolorem vehementem ab vlcere, vel a calculo, & post vsum medicamentorum acrium. Phlegmone itaque oriri potest in vesica, vt *Paulus scribit*. Vesica multas venas habet, & prope magnas venas sita est. Quare non minus inflammationem patitur, quam aliæ partes internæ posteriores raro vesicam circa ceruicem inflammari arbitrantur, alii vero, vt *Auicenna scribit*, vt plurimum apostema circa collum vesicæ fieri. Causas coniunctas esse volunt *Neo-*

terici, vt *Valescius*, conculcatione humorum constrictorum in parte vesicæ, aut colli ipsius ibidem permanentium, & cum non euacuentur, nec a natura recte gubernentur, tumorem producant, apostema & putrefactionem. Quidquid sit, inter omnes morbos; qui circa vesicam oboriuntur, grauissimus & maxime mortiferus inflammatio existit (*eodē Aetio auctore.*) Hinc sequitur, quod (*vt quibusdam visum est*) inter omnes inflammationes in vesica, ea lethalior sit, in qua vehementiore excitatur dolor, febris acuta magis, ac cum vrinæ, tum alui deiectionis omnimoda suppressio adest, e contra minus lethalis erit ea, in qua prædictorum signorum contraria apparebunt. Etenim febris ex inflammatione vesicæ non absque ratione fit: & quanto illa maior est & grauior, tantum augeri febrem contingit, ex *Galenī auctor. comment. aph. 44. lib. 6.* Addunt alii in septimo mortem portendere, si sub ala panus ortus fuerit, periculosior quoque, si superueniat vlceri. *Auicenna* malum pronuntiauit, ob ingentem dolorem in membro neruoso & sensibili, & ob nobilem actionem toti corpori necessariam, quæ ablata & impedita mortem intert vel minatur, etiam ob malignitatem symptomatum, quæ succedunt. Grauis quoque est vesicæ inflammatio, cur citissime conuertatur in gangrænam, ob magnitudinem.

O B S E R V A T I O XXVIII.

De vesica apostemate seu inflammatione.

Vit quidam ætate quadraginta annorum, tumorem supra pectinem habebat cum febre continua, & vrinæ retentione, ac alui excrementorum, adeo vt in sudorem syncopalem & delirium animi quasi incideret, & vomitus biliosus subsequeretur, & magnus dolor circa vesicæ regionem: & quasi deliraret, & venter omnino illi lusteretur, vnde & inflatio ac ructus aderant: cui & breuib; aliquando & maioribus interuallis exacerbationes fiebant. Ad hunc ingressus, statim clysterem mollem, in hunc vel similem modum, etiam infrigidantem iniici iubeo. ℞. folior. malua, viol. mercurialis, lactuca, cucurbita. ana m. j. prunor. sebesen. recent. ana num. ix. sem. lini, malua. ana ℥ ij. fiat decoct. in aqua communi. pro ℥ x. (aluus enim leniri debet pauca quantitate, ne intestina valde repleta vesicam extendant & magis comprimant) in qua dissolue castia recens extracta ℥ j. B. (quia aluus nihil reddebat) mellis viol. ℥ j. olei viol. ℥ ij. salis valde exiguum addatur, & statim iniiciatur. Postquam aluum deiecisset, cubiti venam internam secari iussimus, sanguine vtcunque extracto, reuulsionis gratia, & altero die subsequenti ex tali vena, reuultudine seruata, euacuationis gratia cum deriuatione, cum satis robustus esset, & egregie contulerunt hæ sanguinis detractiones: Statim post primam sectionem in unum locum dolentem vnguen. rosa. & oleo violaceo, hoc etiam vel simili cataplasmate imposito. ℞. radic. bis malua lb. j. folior. viol. m. ij. prun. dactyl. mund. ana num. xx. coquantur in aqua communi, contundantur, & transmittantur per setaceum, addendo de decoctione quantum poteris, adde farina hordei ℥ ij. olei ros. ℥ ij.

5
Signa prognostica.

2

ros. ʒ ij. misce. & cum lorium non bene redderet, forum quoq; adhibuimus, sed leuem, ex decocto sem. lini, scœnugr. in hydrelæo: alii addunt paucum anisi & seminis dauci, & ægrum in eo decocto insidere faciunt. Nos iussimus per irrigationem fieri, vel potius in vesicis semiplenis admoia, aut spōgiis. Et cum imbecilla esset vesica, ad expellendam urinam, vt æger mingeret, iussimus vt ipse vel aliquis ex astantib. scite ac placide pectinem premeret, neq; id vltra modum, ne dolor inde intenderetur, vt *Aetius admonebat*. Cum morbus adhuc procederet, & dolor nondum mitigaretur, chalcetica hunc in modum adiecimus: vt *℞. olei amygd. dulc. ʒ ij. olei chamomill. & de sem. lini ana ʒ j. butyri recentis & pingued. porci ana ʒ ij. misce, fiat linimentum;* vngatur regio vesicæ. Idem præstat vnguent. resunt. lotum in aqua hordei. Deinceps quoq; modo vno modo altero vtens, etiam locos vesicæ irrigando ex oleo chamamel. anethino, seminis lini, aut eo, in quo alibæa rad. & folia fuerint incocta, cœpit iis melius habere. Interea consului vt meatus urinæ aliquo modo detergeretur, vt melius meieret, vel aliquid saltem urinæ redderetur, & id quod a parte inflammata exsudat. Sufficit autem iniicere serum lactis (vt *Rondeletius facit*) cum paucis zaccharo. Si prædicta non satis fecissent suum munus, cucurbitam supra pectinem aut pubem vna cum scarificatione adhibuissim; vel melius, vt alii faciunt, lumbis & ilibus. Et vbi istis medicamentis malum non cedit, papaueris calicem simul cum oleo incoquant, & adipem anserinum, & gallinaceum in ipso oleo eliquatum simul infundunt, vt *Aetio visum est*: qui & *Ruffi* auctoritate, vehementioribus existentibus doloribus, opiatīs medicamentis vritur, ex opio, modica myrrha, & croco composito medicamento, lanæque illito in podicem indit, similiter cataplasmatibus alii vtuntur, ex crudo hordeacea farina, capitib. papau. hyoscyami foliis, ac modico mandragoræ succo adiectis. Interim & illi quoque, si urinæ suppressæ periculum vrgeat, necessario ad catheteris vsum confugiunt, non quod affectionis molestiam tollat, sed vt vrgentem urinæ suppressionem corrigat, & a præcipiti periculo liberet, vt liquet ex *Aetio*: quamquam periculo non careat catheteris immissio in viris, vt supra diximus & exemplis ostendimus: mulieribus vero ipsum adhibere nihil absurdum. Brevis enim (vt antea quoque retulimus) ipsis urinæ meatus existit, & recta situs, vt citra dolorem hoc molimen admittant. At post urinæ prolestationem, rursus ad eadem mitigatiua auxilia accedendum, vsq; quo inflammatio soluatur, aut suppuretur, vt eidem *Aetio visum est*. In declinatione vero per os dedimus leuiter detergentia, cum emuls. sem. 4. frig. maiorum quæ nō sua acrimonia, sed aquea & tenui substantia urinas mouet. Et dolore iam sedato cassiam quoque exhibuimus in fine morbi, scilicet ʒ j. cum aqua malua, vesicaria ʒ ij. & cum iam minus febri citaret, etiam vinum aquolum assumsit ad maiorem urinæ prouocationem. In principio tamen quantum potuimus ægrum asseruauimus paucotibo & potu; & a vino abstinuimus, eius loco ex-

hibendo aquam hordei, in qua cinnamomi valde exiguum erat decoctum: & quantum ad alimenta, quæ parum nutrent concessimus, & quæ refrigeraret; vt cremorem hordei, lactucam, viol. maluan; & ex fructibus, quæ urinas acres contemperarent, vt pruna, poma, sebesten; a pyris & adstringentibus abstinuimus, & ab iis, quæ multum detergunt, vt sunt ficus, passulæ, & reliquam victus rationem instituiamus, quam in renum inflammatione scripsimus conuenire. Quibus præfidiis hic recte deinde se habuit.

SCHOLIA.

Curatio inflammationis vesicæ, satis ex hac obseruatione constat. Ceterum fiunt iuxta recentiores in vesica vel eius collo, modo calida modo frigida apostemata. In calida, continua febris oritur, vesica vehementi dolore intumescit, difficultas adest anhelandi, sitis accenditur, bilis vomitus concitatur, dolor capitis adest, immodicæ vigiliæ, facies cum oculis rubore confusa, aliena loquuntur, lingua aret cum nigritie. Ea; symptomata, teste *Oribasio*, in pueritia atq; adolecentia, quæ calidis diureticis exasperantur vel catarticis acutis mordentibus, tum reliqua adsunt, quæ in obseruatione præcedente diximus. Frigidi vero non contrariæ cernuntur. febris cum dolore, ac siti remissa cernitur, os non ita æstuat, neque tumor, sed grauis tantum sentitur, æger somniculosus est: pituitam vomit, facies pallet, lingua salua madet. At suppuratis collectionibus, atque ruptis, vrina purulenta demittitur, grauius olens, tumor residet ac dolor quiescit. Cum vero extrinsecus in anteriori parte rumpitur apostema, innocentius, quanquam intus in cauum erumpit, habetur. Huius curatio contuenit cum curatione inflammationis renum: sed minus astringentia & refrigerantia regioni vesicæ sunt admoenda, ne accadat ischuria, quod symptoma est valde frequens per se in hoc malo, & maxime molestum periculosumq;. Magis vero vtendum relaxantibus & dolorem lenientibus. Hic ergo præferuntur linimenta, epithemata, perfusiones, cataplasmatīs & emplastris: quoniam hæc suo pondere partem grauant, ita, vt ea multo difficilius dilatarī queat: vnde fit, vt dolor affligat vehementius. Inclinate autem morbo, cum iam dolor & tensio remissa sunt, cataplasmatīs sine vllo incommodo vti possumus. Id quoque obseruandū, quod in apostemate vesicæ, sicuti renum, non oporteat urinam prouocare, neque euacuatione, maxime in principio; neque clysteribus, sed lenibus emollientibus, minimeque attrahentibus vti. Et catheter in principio non adhibendus, neque syringa, sed in statu vbi vrget urinæ suppressio: sed cum cautione. Ab initio si materia calida fuerit, protinuse cubito sanguinem demere oportet, vbi fluat; idque a dextro vel sinistro, prout tumor magis in vna parte, quam in alia adsit, deinde ex talo vel saphena. Leniatur aluus ante, etiam post, si opus est, clysteri emolliente, ex viol. althæa, prunis, myxa, oleo viol. addita cassia, cum iure pulli, & similibus: & vtatur hordeato satis liquido, & iusculis mitigantibus. Abstineat vino,

diureticis, & mellitis: & ubi aluus resistat, clysteribus iam dictis leniatur. Et si sit materia calida, biliosa, in principio conveniunt refrigerantia, sine magna adstrictione, ut *℞. succi viol. vel lactuce, vel solani quart. j. olei ros. quar. ℞. agitentur simul valide.* Hoc imbuti panni admoveantur. Vel, *℞. olei ros. omphac. ℥ ij. olei viol. ℥ iij. aqua ros. parum.* Sed istis frigidis non diu utendum. Adicienda, si metus sit ex frigore, etiam quædam lenia discutientia; vel cum vesica hydrelæo plena locus fouendus, vel cum spongiis. Et ad sedandum dolorem, hoc, quod sequitur: *℞. rad. malvæ, bis malvæ ana ℥ iij. viol. m. y. flor. chamom. meliloti flor. viol. ana p. j. sem. pap. albi ℥ ℞. misce. fiat decoctio,* qua foueatur pars affecta. Efficacius erit medicamentum; si addas *farinæ seminis lini, & fœnugr. ana ℥ j.* post fctum fiat linimentum hoc: *℞. mucilag. sem. psyllii & cydon. ana ℥ j. olei chamom. lilior. ana ℥ ij. ping. gallinæ, anseris, butyr. recentis ana ℥ j. farinæ hordei ℥ ij.* incorporentur simul, & fiat linimentum pro parte affecta. Accedente statu, miscenda sunt discutientia, ut farina fabarum, orobi, & similia. Præstat & foris ad dolores; ex *anethi, fœnigr. althææ rad. decoct. lana succida infusa leuiterq; expressa foris medetur,* etiam lac asininum cum psyllio decoctum iniici potest. Post septimum diem chamomillam, lini semen, fabarum farinam, cum sapa decocta efficaciter impone, quæ & dolorem sedant. Damus & decoct. *sem. 4. frigid. maior. & portulacæ, & malvæ, & althææ, cum syr. viol. eodem tempore,* & in statu morbi *farinæ fabar. sem. lini, & chamomilla cum sapa cocta medentur:* si tamen nimium tumet, adde violam & maluam. Si sit ex materia non adeo calida, iuuat rapum, seu napi decoctum, vel in cinere tostū emplastri modo impositum, & illa, quæ in statu valere diximus, & brassica cum hibisco decocta, & imposita, & balnea aceuaporationes, ex emollientibus & resolventibus. Suppurante apostemate, decoctum infundimus *meliloti, chamomill. fœnugræ. seminis lini, cum oleo viola lutea:* nam & idem infusa spongia prodest impositum. Et emplastrum mitigatorium ex *meliloti farina, seminis lini, fœnugræ, chamomilla, tritis cum arida ficu, adipe gallinaceo, ac anatinæ, oleo ex violis luteis.* Vbi enim ad suppurationem vergat, eadem iuuanda erit cum his, quæ in aliarum partium inflammationibus ad suppurationem vergentibus conscripsimus, & sæpe diximus. Et post maturationem, si non disrumpatur abscessus, eidem quoq; mature opitulandum est, pro eius disruptione; quo disrupro, quam præcipiemus mox in sequentibus, vlceris curationem conuenientem adhibebimus. Et si sit apostema frigidum, ex renum quoq; curationibus auxilium inuenies. Si apostema tandem in duritiem conuertatur, nec remediis cesserit antedictis, tum oleum amygd. dulc. ac siliquæ Egyptiæ succum atrum cum aqua melonis, apii, fœniculi, & similium damus vtiliter: duritias enim mitigant apostematis: vtilis quoque portiones facit ius brassicæ vel seminis decoctum ex oleo amygdalino. Extrinsecus imponenda emollientia etiam balnea, *ex mal. alth. caulibus, & frequens infusio iuuat.*

Si ad suppurationem vergat.

Ad dura apostemata.

OBSERVATIO XXIX.

De vesicæ vlcere.

Non raro contingit ipsam vesicam exulcerari: quod & Hippocrates *aphor. 81. lib. 4.* docuit, his verbis: *Si sanguinem aut pus minxerit quis, ac squamulas, ac grauis dolor adsit, vesicæ vlcerationem significat.* Sic rusticus quidam ex oppidulo Schaga, anno 1558. 22. die Ian. vna cum lotio purulento ad me venit consultandi causa: qui cum ardore vrinæ simul detineretur, & purulenta mingeret, & sub pube vehementer doleret, & in imo ventre, & cum difficultate stillicidium pateretur, & simul dolor pectinis adesset ac pubis, cum quadam duritie, & simul cum quadam egerendi appetentia, ut in tenesmo aliquando fieri solet, cum & vrina purulentum protinus destillaret, graueolens, in quo & veluti squamæ, furfuraceæ veluti laminæ discurrebant, & furfuracea in imo vitri residebant sedimenta, iudicabam vlcerationem vesicæ adesse, quanquam is putabat, se calculo laborare, ac lapidem in vesica habere. Cum vero nihil sabuli vnquam in lotio apparuisset (*illo testante*) neque signa lapidis vnquam adfuisse ex eius sermone intelligere potui, cum prius neque vrina cruda fuerit, neque colore subalbida. At quod vlcerus in vesica esset, ex dictis Pauli facile animaduerti, qui ex dolore vehementi in pube, & imo ventre, vrinæque difficultate, & ex pure, quod ubi redditum est, subsidet, squamulisque frædi odoris vel laminis similibus vesicam exulceratam indicari scriptum reliquit, *cap. 45. lib. 3.* Cognoui quoque quod vlceratio esset in vesicæ amplitudine: idq; ex perpetuo dolore, qui circa pubem sentiebatur. Verum antequam curationem instituerem, cum ex variis causis fieri possit, (*de quibus latius in scholio*) cum non ex abscessu aut apostemate aut calculi asperitate originem haberet. (*nam paulatim ab acerbis humoribus a toto corpore confluentibus ad vesicam originem sumsisse mihi videbatur, aliquo tempore prius etiam præcedente ardore vrinæ, quo & nunc etiam afficiebatur, cum vrina acris esset vna cum pure:*) Ideo cum grauis futura esset curatio, præsertim in rustico annum quadragesimum excedente, qui facile, tardio remediorum afficeretur, & vno quasi medicamento (*ut ceteri rustici solent*) putabat se posse curari, cū scopus curandi diuersus esset, neq; vno remedio, sed pluribus opus esse indicaret; propterea ut hic in vrbe maneret donec curatio absolueretur eidem consului, alioqui parum nō posse in tam graui ac difficili malo præstare. Ceterum cum illud illi integrum nō esset, & ego post septimanam Delphos accedere cogebar, consultationem, ut petebat, sequentem eidem in scriptis dedi. Quod igitur ad methodum curandi attinebat, duplex scopus sese nobis obtulit, vnus in curatione morbi, nempe vlceris, repurgandi primo, secundo consolidandi. Alter vero in curatione accidentis versabatur, sc. in mitigatione doloris, & ardoris vrinæ, & difficultate mitigandi. Vbi puris acrimonia contemperabitur, ardor citius cessabit: & si fortasse pus crassius fuerit, ut difficulter mingat, cum leuib. vrinam puocantib. & detergentib. curabitur, modo non sint

3
sint valde calida, vt vlcus irritent. Itaque cum hic
vulceratio fieret ob acrium humorum fluxum, illi
ipsi primum præparandi sunt & purgandi; deinde
vulcus curandum. Dedit igitur hunc bolum cassiæ:
℞. cassia recens extracta ℥ j. saccharo violaceo asperso
fiat bolus. Quo sumto duabus horis ante paltum,
præcepi ne dormiret. Sumto enim medicamento
leui ac debili solutio dormiendum non est, ne
natura, quæ somni tempore intrinsecus est for-
rior, quam in vigiliis, tanquam nutrimentum me-
dicamen in suam substantiam conuertat. Vbi au-
tem medicamentum est acre aut forte, siue sit po-
tio, siue bolus, siue pilulæ, eo sumto dormiat egro-
tus. Solutiuum autem medicamentum non ope-
ratur, nisi reducat de potentia ad actum a calo-
re naturali, qui intrinsecus in dormiente fortior
est, quam in vigilante. Minus autem dormiendum
potione laxatiua sumta, quam bolo: minus vero
sumto bolo, quam pilulis. Humores deinde acres
vt præpararentur & contemperarentur, hoc de-
coctum, vt ebiberet, consului: ℞. decoctiones hor-
dei mundati, sem. quat. frigid. maior. lactuca, capill. Ven.
℥ ix. syr. ex infus. viol. mellis ros. (etiam ad deterfio-
nem) ana ℥ j. misce. pro tribus dosibus. Deinde rur-
sus purgetur leuiter materia biliosa acris, quæ ex
toto corpore affluebat ad vesicam: ℞. cassia recens
extracta ℥ vj. diaprunis solutiui ℥ ij. cum saccharo a-
perso fiat bolus. Præstat autem in huius mali cura-
tione vti bolis, quam portionibus. Victum autem
4 præscripsi talem, qualem conuenire antea scri-
psimus ad vlcérationem renum: & mandauit, vt
pro deterfione vlceris subinde mane acciperet
cyathum vnum atque alterum feri lactis, quo ru-
stici vti consuevi sunt, & vt se in lecto compone-
ret: & si decumbere non posset, (quod tamen Ae-
tius lib. ii. cap. 29 his verbis suadet: Primum igitur
persuadendus est ager vt decumbat, & in lecto quietem
toleret, idque maxime, si febres simul adsint: deinde
remedia f. b. in te mittentibus adhibenda) sal-
tem vt quietum se teneret, cum non ita febricitar-
et: & sumto quatuor vel quinque diebus sero la-
ctis, ad potum lactis veniret. Maxime vero hic
prodest lactis potus. Neque scio, inquit Aetius, an
post vllum aliud remedium secundo saltem loco id sit
habendum: nam & asperitates lenit, & vlcérations e-
luit, aliasque affectiones extergit. Dedit autem ouil-
lum, cum caprillum deesset, vel bubulum. Pro v-
rinæ ardore, sub noctem iussi, vt caperet hordea-
tum, & lac amygdalatum cum emulsione semin. qua-
tuor frigid. maior. & papau. albi, etiam ad doloris seda-
tionem. Iubebam quoque, vt cum syringa lac ouil-
lum cum emulsione seminis cucumeris, & interdum de-
coctum hordei non excorticati, foliorum plantag. & rad.
glycyrrh. iniiceretur: & propter actimoniam adde-
retur aliquid amyli aut seminis althææ, malua. cucu-
meris, vel fenugraci cremor. interim etiam & seminis
papaueris. Alii in hunc vsum in vesicam infundunt
mulsam dilutissimam, vel lac cum pauculo mellis,
aut cucumeris semine, seu albuminis oui liquore, cum
pompholyge, vel similibus medicaminum aliquo, ex
Pauli sententia. Nos vero & trochiscum vnum
Gordonii sine opio, modo in lacte caprino, si in-

ueniri posset, modo cum hordei decocto inieci-
mus: cuius hæc est descriptio. Vlcus purificat, do-
lorem sedat, & ardorem, & conglutinat, & habet
virtutem ad omnia iam prædicta, quibus hic æger
afficiebatur: ℞. quatuor sem. frig. mund. maior. sem.
papau. albi, sem. malua, bombacis, sem. portul. sem. coto-
neor. myrtill. drag. gummi arab. pinear. mund. fistico-
rum, candi, pensid. liquir. mund. hordei mund. mucila-
gin. psyllii, amygdal. dulc. ana ℥ ij. boli armen. sanguinis
dracon. spodii, ros. myrrhæ ana ℥ j. conficiantur cum
hydromelle, & fiant trochisc. & cum iis vti volueris,
distemperetur vnus cum lacte, & exhibeatur: va-
let in vlcere renum & vesicæ. Et si fuerit vlcération
in vesica, distemperetur vnus cum lacte, & pro-
iciatur per syringam. Sint autem ponderis ℥ ij. qui
cum vti voles, dissoluantur, vt dictum est. Hoc au-
tem idem fecerunt aliquando Iason ille Pratenfis
eximius medicus, & M. Ioannes Tiengius, in Do-
mina de Beueren simili malo laborante. Si vlcus
sit satis purum, tunc trochiscum vnum cum lacte
ouillo (nam glutinat) cum syringa in vesicam ini-
ciemus mane & vespere. Si vero pus magis inhæ-
ret crassum, tunc vnus ex trochiscis in vesicam in-
iiciatur, vt dictum est. Hæc autem magis condu-
cunt, quam sumta, quod ab ore ad vesicam longa
sit via. Interea tamen consulimus, vt per os acci-
peret eodem tempore, hunc bolum primo: ℞. cas-
sia recens extracta ℥ j. pul. trochisc. alkachengi ℥ j. fiat bo-
lus. Valde hic conueniebant trochisci alkachengi
seu haliacacabi, cum valeant ad renum & vesicæ
vlcera, & natam inde dysuriam: & ideo aliquan-
do vt ℥ j. caperet cum lacte ouillo iussi. Dedit & an-
tea hoc decoctum, cum multis remediis vti pos-
set, nam rusticus diues erat: ℞. rad. cichorii, penta-
phylli, bistorta glycyrrh. ras. malua ana ℥ j. agrimonia,
pentaphyllon, plantag. portulaca, equiseti, malua. ca-
pill. Ven. ana m. j. florum nenuph. viol. ana p. j. sem. pap.
albi ℥ ij. sem. quat. frigid. maior. portulaca, an. si ana ℥ j.
℞. sem. althææ ℥ j. iuiubar. sibsten ana num. vj. gra-
ner alkachengi num. v. fiat decoctum, in aqua com-
muni pro ℞. j. ℞. adde syrup. ex infus. rosar. commun.
violar. mellis rosar. celati ana ℥ j. syrup. ex rosis sic-
cis ℥ j. arom. cum ℥ j. ℞. trochisc. alkachengi sine opio.
Capiebat & has pilulas sequentes: ℞. terebinthina
Veneta clara, lota in aqua equiseti. ℥ ij. glycyrrh. pulu. ℥ j.
succu glycyrrhiz. ℥ j. fiant pilula instar cicerum, &
dentur tres, & superbibat cyathum vnum decoct. supra-
scriptæ. Postea & his pilulis, vt vteretur, manda-
ui, ad maiorem consolidationem: ℞. terebinthina
lota in aqua plantag. mummia. trochisc. alkachengi si-
ne opio, boli armen. veri ana ℥ j. succu glycyrrh. ℥ ij.
gummi traga. ℥ j. cum aqua equiseti fiant pilula ad
modum cicerum, dentur vt prius. Interea iubebam,
si forte dolor ægrum valde vrgeret in meiando,
vt hunc in modum mitigaretur: ℞. maluar. radi-
cis althææ ana m. j. chamameli, meliloti ana m. ℞. ra-
dic. nymphææ, & semin. eiusdem ana ℥ j. ℞. seminis ha-
liacacabi ℥ j. calami arom. ℥ ij. decoquantur in a-
qua, in qua calida mad. facto filtro & expresso fiat so-
tus super pectinem. Fortus autem spongia non facien-
dus, propter faldedinein quam a mari habet; nisi
prius in aqua calida sæpe immersa faldedo extracta
ZZ 2

7 fuerit, filtrum in hoc casu magis conueniens est. Post fotum inungatur vnguento sequenti: ℞. olei amygdal. dulc. ʒ j. β. olei viol. muccag. althae, & fœnugrac. semin. lini ana ʒ j. semin. haliacacabi in tenuissimum puluerem redacti, semin. nymphae ana ʒ j. β. croci (ingreditur enim omne medicamentum sedatiuum doloris) ʒ j. adiecta cera fiat vnguent. quo vngatur pecten & perinæum post fotum. Verum sedato dolore, iis non diu insistendum, ne relaxetur vesica, cum & vlceratio post puris deteriorationem exsiccantia maiora & consolidantia desideret: & tunc in decocto, & in eo, quo fit iniectione addenda radix consolidæ maioris, & herbæ saniculæ, & buglæ, &c.

S C H O L I A.

8 **C**ontingit autem vesicam vlcerari, teste Aetio lib. ii. cap. 29. aut propter præcedentem abscessum, aut ob tuberculum, quod præcessit, aut ex ruptura, seu ob fluxionis rosionem, aut alia similia quapiam causa. Exulceratur præterea propter scabiem, ob vsum cantharidarum, aut propter calculum asperum, aut propter pituitam aliquam salam, aut bilem lotio permixtam. Ab apostemate, vel vasis disruptis, vel erosio ab acri humore, & calculo, Paulo auctore. Percussis quoque, teste Galeno, exemplo cuiusdam, in quo vehementer iusto, triduo abstinentia usus est; quarta die vesperi chirurgus curante, vrina, quæ antea substiterat, per os vulneris egressa est heminæ mensura, hoc est, ʒ 60. ac statim dolor sub pectine sæuus cum grauitate leuatus est. Ardor vrinæ diu perseverans, vlcus producit, vel idem cum vlcere existens, vlcus irritat, vel ex pustulis intus ortis. Vlceratur autem vel in cauo, vel in carnosâ ceruice. At nonnulli sub vno capite scribunt & de scabie & de vlcere vesicæ, & quæ in virga virili contingunt, vt Bertrudius facit. Alii seorsim id agunt, vel saltem hæc vlcera distinguunt. Iuniores ad causas externas seu primitiuas referunt cantharides assumptas, aut medicamenta vel aromata acria (quorum frequens usus apud Polonos & Germanos superiores) & ad cibos acres salios, & omnia illa, quæ ardorem vrinæ inducere possunt; huius generis sunt collisiones, casus, vulnera, ictus, & similia. Ad antecedentes, apostemata, abscessus, humorum acutorum confluxionem, vel vrinæ acrimoniam. Dignoscitur autem vesica (præterea quæ diximus obser. præcedente) exulcerata, ex ea excrementorum qualitate, quæ partibus adhærentia essentia proprietatem obtinent: cuius generis est id, quod Græce ἐφελκίς Latine crustula, seu ramentum dicitur, lamarum speciem referens, Gal. i. auctore, de loc. aff. Similiter a dolore cum positu; nam vehemens tormentum in pube, imoq; ventre sentiunt ægrotantes. Fit etiam ex actione læsa, quoniam vrgebit vrinæ difficultas, vt ex Paulo quoq; diximus. Sed quoniam non satis est, (etiam Donato admonente) ad affectæ sedis inuentionem, ea duntaxat symptomata, quæ in præsentia infestant, intueri, vt idem Gal. fatetur 6. de loc. aff. sed ex his, quæ præcesserunt subinde definimus. Ea de re id quoq; inuestigari debet, vt certior dignotio fiat; num videlicet æger circa vesicæ positum

simul cum horrore ac febre dolores præsenlerit; interrogando. Cum quibus etiam indicis non nihil confert, si id quod excernitur, sit cum ipsis vrinis confusum, aut contra. Nam id aliquando quidem exacte commixtum videtur, aliquando mediocriter, interdum vel nullam habet mixtionem, vel quodammodo superfertur, vel solum excernitur. Quapropter Galen. non ab re eodem 6. de loc. aff. de vesicæ affectibus verba faciens, dicebat, quod vesica suppurata, solum pus sine vrina excernitur, licet citato libro, cum de colicis affectibus loquitur, deprehendi manifeste, atq; secerni vlcus penis ab eo, quod in vesicâ ortum est præceperit; quoniam in primo protinus exitu, signum vlceris apparebit, vrinam præueniens si in pene sit ortum: quod vero a vesicâ egreditur, vrina admixtum videbitur. Nono etiam de composit. medicamen. secundum locum, discerni, dicebat corpuscula, quæ excernuntur ex exulcerato pudendo, ab eis, quæ ex vesicâ feruntur, quoniam illa statim circa primum exitum apparent: verum quæ in vesicâ, ipsis vrinis admixta sunt: quamquam interea, si ramentum, seu pus vrina admixtum excernatur, in vesicâ vlceribus, confestim tamen, vt inquit Paulus, ubi redditum est, subsidet, licet interim eueniat, vt solum pus sine vrina etiam excernatur, vel nullam habens constitutionem cum ea, quemadmodum sæpenumero accidit in penis vlceribus. Et propterea, vt facilius vnum ab altero discernatur, addit Galenus, quod assidue inter meiendum mordicus dolent pudendorum vlcerâ, præcipue cum vel crustula, vel sordibus solutis pura fuerint: id quod in vesicâ vlceribus haudquaquam fit, nisi iuxta collum eiusdem vlcerâ consistant, vt inquit Aetius: tunc enim mixtionis tempore duntaxat, & maxime ubi mingere cœperint, aut cessauerint, dolor sentitur; atque id amplius contingit, si vrinæ sint aciores, vt ipse inquit cap. 29. lib. ii. Quare licet in vlceribus, quæ in pene fiunt, etiam sine vrinis & pus & sanguis exeat, vt plurimum (eodem Galen. teste comment. aphor. 72. lib. 4.) nihilominus & simul cum eisdem vrinis statim circa primum exitum, quandoque pus emittitur, etsi cum eis nullam habeat mixtionem, quemadmodum de vlceribus vesicæ diximus. Sic etiam in vesicâ vlceribus euenit interdum, vt vrinæ admixtum videatur id excrementum, quod vlcerâ comitari solet, confestim tamen subsideat, vt inquit Paulus; idque sæpius accidit: interdum etiam vel nullam habet mixtionem, vel quodammodo superfertur, vel solum sine vrina excernitur, vt idem inquit Galenus. Attamen vtrâ potius istarum partium fuerit exulcerata, dolor, qui in differentibus accidit locis, & proprietates eorum, quæ cum vrinis excernuntur, indicabunt, quemadmodum idem Galen. scriptum reliquit comment. præcitati aphorism. 75. lib. 4. Pro discernenda exulceratione renum, aut vesicæ (quod quidem indiscriminatim Hippoc. in eodem aphorism. conscripserat, sic dicens: Si sanguinem aut pus mingat, aut renum, aut vesicâ exulcerationem significat) saltem ex dolore cum positu, illud discerni poterit. Vel dicas, aliud esse, si pus ex vesicâ excernatur eadem suppurata; & aliud, ramentum ex ipsius vlcere. Nam primum

Ab illa, quæ in cernuntur.

A pene si pus emanat.

A vesicâ

II

Si vlcus sit in collo vesicæ, quod signa adsim.

Quibus indicibus distinguendum sit vlcus vesicæ a penis vlcere.

12

primum relatione ad alias superiores partes suppuratas, quæ per urinam expurgari possunt, solum sine urina excernitur, *ut inquit Galenus*, licet non semper, quod in aliis superioribus partibus haudquaquam euenit. At ramentum, si ex eiusdem vesicæ exulceratione secernatur, collatione facta ad penis vlcera, urinæ admixtum videbitur: præuenire autem consuevit urinam in penis vlceribus, ac protinus in primo exitu apparere, quamuis etiam idem ramentum in vesicæ vlceribus, relatione ad alias exulceratas partes se ipsa superiores, interdum vel nullam habeat cum urinis mixtionem, vel quodammodo superfertur, vel solum excernitur, *eodem Galeno teste*. Itaque relatione ad penis vlcera, ut plurimum urinæ admixtum videbitur ramentum ex vesicæ vlceribus decidens, quia non protinus in primo exitu apparebit, aut urinam præueniet, ut in penis vlceribus contingit. Verum collatione ad alias superiores partes facta, vel nullam habebat mixtionem, vel quodammodo superfertur, vel solum excernitur, *ut diximus*, quia neque exacte, neque mediocriter cum urina permixtum videbitur, sed vel nullam vel exiguam cum urina mixtionem habebit. *Hæc etiam Donatus adferebat ex Galeno, Aetio & Paulo*. Verum hæc multo clariora exemplis subsequen- tibus euadent.

OBSERVATIO XXX.

De vlcere in collo seu ceruice vesicæ.

Iuuenis quidam, cum in agrum per vimen descenderet, quasi saltando, sub infima pube ita se læsit, ut in abscessum deueniret colli vesicæ, subsequente vlceratione. Potest autem vesica, sicuti & collum eius, exulcerari multis de causis, ut ante diximus; quæ equidem vlceratio accidit, modo cum inflammatione, modo citra inflammationem. Hic vero collum vesicæ seu eius ceruix ad vlcerationem deuenit, quod etiam facile cognitu fuit ex loco affecto, & ex iis, quæ præcesserant: nam tales tempore mixtionis tantum, & maxime ubi mingere cœperint, ac cessauerint, dolorem sentient; atque id amplius continget, si urinæ sint aciores, *ut Aetius dicebat*. Erat autem hoc ipsum vlcus cum inflammatione, ideo curandum ut de vlcere renum diximus. Sed chirurgus quicum tractabat, venæ sectione omissa; reliqua medicamēta sine vlla vtilitate adhibuit: neq; fots neq; iussiones, neque syringationes quicquam ægro profuerunt: ita, ut iuuenis hic non accersito medico breui obierit. At alteri, cui etiam vlcus ex fluxione materiæ acris cum repletionem, & inflammationem ceruicem vesicæ occupauerat, commode secta fuit vena in talo, clysteres lenientes & emollientes ac refrigerantes vtiliter per nos adhibiti, & inunctiones ex *ung. ros.* & *injectiones profuere* ex lacte muliebri (*cum ardor adesset*), & liquore albuminis oui instar aquæ concussi, *adiect. mucag. psyllii, cydon. extracta in aqua cucurbita vel viol.* & *malua* etiam ad deterfionem ex decoct. hordei non excorticati cum sero lactis. Per os dedi cassiæ recens extractæ \mathfrak{z} j. *trochisc. alkachengipul.* \mathfrak{z} j. *cum* \mathfrak{z} iij. *seri lactis*. Postea iniici iussi lac caprinum, ut magis detergeret:

postea ad maiorem consolidationem ouillum & bubulum, *adiecto exiguo amylo, & trochisc. alkachengipul.* Deterfo satis vlcere prius cum sero lactis & saccharo, subinde iniicere iussi ad maiorem consolidationem sarcocollæ \mathfrak{z} j. *amydi, ceruse lotæ an.* \mathfrak{z} ss. nutriatur in lactis muliebris aut caprini aut ouilli \mathfrak{z} iij. *fiat iniectio in virgam*, quæ ter quaterve in die repetatur. Quæ egregie iuuerunt. Sic quoque vesicæ vlcus curatur, si sit cum inflammatione, iisdem remediis, quibus vlcus renum cum inflammatione, nisi quod maiorem, (*ut Rondeletius iubet*) quantitatem syruporum aut aliorum remedium sumere oportet, ut ad partem affectā peruenire possint. Possumus & quatuor sem. frig. maiora addere. Nam alia prouocantia urinam non sunt ponenda, nisi sint ex numero eorum, quæ adstringendo id faciant & exsiccando, ut herniaria, lingua passeris, cortex mali granati & hoc maxime post totius corporis purgationem. Si sine inflammatione sit, curatur eodem modo, quo vlcus renum sine inflammatione, nisi quod magis oportet resiccare, ob partis intemperiem, quia medicamēta multa infarcta & debilitata ad partem perueniunt. Tentandum est etiam per fistulam æneam aut syringam oblongam aliquid in vesicam iniicere; quod cōmodius fiet, si æger in dorsum decumbat, cruribus sursum elatis, & digitis propellendo vsq; ad perinæum. Iniectiones autem fiunt ex detergentibus sine morfu, vel ex decocto hordei, decocto corticis cucurbitæ & corticis fabarum in minori proportione, *ut ex herbis leuiter detergentibus, cum pauco melle ros.* Aliqui & decoctum guaiaci iniiciunt. Post deterfionem addi debent, quæ magis resiccant, & cicatricem inducere possunt. Et ista sunt vtilia in vlcere sine lapide.

S C H O L I A.

Hic autem erat vlcus in collo vesicæ: quod cognouimus ex dolore circa pubem inferiorem, & dolore in mingendo. Si fuisset in amplitudine vesicæ, dolor totam pubem occupasset: Si fuisset in pene, etiam pus exiisset sine urina; *cuius signa iam diximus*. Ceterum cum vesicæ vlcus morbus sit in soluta continuitate, omni tempore dolor acutus comitatur ægros, maxime vero mictionis tempore, & excretionis puris: assidue etiā decumbunt, neque erecti stare possunt, neque reclinati quiescunt ægri, si quidem dolores acuti sunt, & vlcera iniucunda, partim quod urina assidue ea contingat, partim quod ea natura acris existat. neque quamuis plurima excernatur, vniuersa vesica vacuari potest, sed semper ex urina quippiam in ipsa relinquitur quod continue vlcera contingit; *ut ait Aetius*. Et si quidem sordida fuerint vlcera, *fœculenta* (*ut idem fatetur*) simul excernuntur, & mucosa, & quæ crassam subsidientiam ad modum farinæ habent, aliquando autem & pelliculæ tenues ad modum foliorum & laminarum cum urina excernuntur. Si vero serpendo depascant vlcera, suberuenta excernuntur, & saniosa, & fœtens: ad hæc accedunt urinæ emittendæ difficultas, & pudendi arrectio, & petulantia, & dolor non solum cum urinæ meatus fuerit affectus,

*Ulcus vesicæ in
quib. differat ab
ulcere renum
& aliarum par-
tium.*

Signa caussarū.

4 sed cum tale quippiam in profundo existat. Ex pure licet de ulcere possimus iudicare, non nisi cum alia animadversione de sede affecta. De qua re recurrendum ad ea, quæ de ulceribus renum, v-
reterum & aliarum partium superiorum diximus lib. præcedente. Ulcera renum sunt cum facilita-
te urinæ: vesicæ vero cum difficultate. Et cortices in ulceribus renum sunt rubri: in vesica albi & crassi. Fœtor, squamæ, & odor gravis arguunt vl-
cera vesicæ, & difficultas, retentio, & pectinis do-
lor, eoque maior cum sit in membro nervoso. Si autem veniat pus a parte superiore ex abscessu ali-
quo, siue ex liene, siue ex pleuritide, dolor in illis locis id prius indicat. Si ex renibus, vide ea, quæ de renum ulceratione prius diximus: dolor adest in lumbis. Si in vterere, dolor in medio inter re-
nem & vesicam hæret. Signa caussarum, quantum sunt ad ulcus vesicæ vel eius colli, ex propriis signis & indicis percipies. Si enim a ruptura venæ, vel per calculum, vel ex ictu, casu, percussione, vel præcedente inflammatione, vel abscessu euenerit, ab astantibus facile dignosces, & ex iis, quæ præcesserunt. Si ab humorum acrimie vel falso-
rum defluxione, signa humoris prædominantis aderunt, de quibus sæpe dictum est, ut eadem repe-
tere non sit necessarium, cum & causæ facile cognoscantur etiam ex iis, quæ postea de ardore uri-
næ dicemus.

OBSERVATIO XXXI.

*De ulcere vesicæ, cum summa gravitate odoris in
urina, valde diuturno ac lethali.*

1 **V**Lcus diuturnum in ipsa vesica Melchior Gerardi vicinus noster habebat, cum tanto fœ-
tore, ut vix apud eundem aliquis consistere pos-
set: tradunt enim auctores, ex meatuum ulceribus superiorum urinam nunquam graviter olere, sed in vesica præcipue. Hic autem cum valde diureti-
cis longo tempore vteretur, multo peius habebat, & urinæ acriores reddebatur, cum summo crucia-
tu, & ardore. Aliquod solamen ei præbebat deco-
ctum folio malvæ, cum syr. viol. quod cum deesset, capie-
bam aqua malvæ ʒij. cum ʒj. sacch. viol. vel iuleb viol. ʒj. β. lac amygdalinum ex amygdal. dulcibus, sem. quat. frig. maior. mund. & pap. adiectis paucis amygdal. ama-
ris ad deterfionem iuvabat. Huic consului ut lacte o-
uillo cum saccharo vteretur: uti & alteri mulieri, hoc eodem malo longo tempore laboranti, quæ tamen aliqua intervalla subinde habebat; & quia vetula, licet adhuc superstes sit, difficulter curabi-
tur, uti hic senex, qui tandem tabe & senio confe-
ctus ex hac malo eundem excarnificante mor-
tuus est. Deinde & vetula post aliquot annos cum dolore vitam finiit, antequam hæc scripta in lu-
cem prodirent.

SCHOLIA.

2 **O**Mnes autem fere qui vesicæ ulcere laborant (quemadmodum & hic senex) ab indefinente dolore, febribus, vigiliis & colliquatione perimū-
tur: alii quidem citius, alii tardius: & propter hoc ipsum & quoniam nervosa est vesica ipsa, insana-
bilia ut plurimum eius ulcera existunt: periculo-
siora autem sunt, quæ ex erosione sunt orta, & mo-

dica spes ea restaurandi, ut eidem Aetio visum est. Verum ulceribus existentibus in eius ceruice, quo-
niam non nervosa eatenus, & ex sanguis est veluti eius cavitas, sed carnosæ haud ita periculosa sunt, neq; ad curationem difficilima, quemadmodum de eius discissione comment. aph. 18. lib. 6. Gal. sen-
tiebat. In summa, vesicæ ulcera difficiliter sanantur, quam etiam ea, quæ in renibus fiunt: vesica enim nervosa est, ii vero carne constant. Ceruicis vero vesicæ exulcerationes facilius curantur. Sed quæ circa vesicam fiunt, potissimum in senibus, diffi-
culter, imo raro aut nunquam curantur. Qua de re, tum propter hæc ulcera, tum etiam quoniam sæpe præter expectationem quædam eveniunt, cu-
ra aggredienda erit, per quam si nihil aliud certe accessorii dolores minuentur, ut etiam apud Aetium legitur. Ulcera vero (quod ad curationem attinet) cu-
ramus haud dubio univèrsam, cum materiam prohi-
bemus, cumque præparamus, aut alio avertimus; & cum ulcera demum repurgamus. Iis enim mo-
dis persanantur. Sed magnam partem ex antedi-
ctis renum remediis inuenies. Itaque a missione sanguinis (potissimum si etiam adsit inflammatio una cum ulcere) e cubito, si per vires licuerit, curatio-
nem ordieris: postea etiam ex talo, vel si præterie-
rit initium, etiam ex talo. Si id non expedit, acuta vel falsa materia præparanda est suis potionibus, ac victu quotidiano: dum damus, quæ materiam vrentem detrahunt & avertunt, tum vomitu, tum alui leui deiectione. Syrupus viol. ad intestina hu-
mores ducit, & myrobalani citrini, indi, aqua viol. macerati: sed & utiliter manna Syriaca, vel cassia: cum aqua fumarie, aut lupuli liquefacta, syrup. ex infus. ros. pallid. etiam cum rhab. Interea inflammatio seu dolor si adsit, iis prius succurrendum: deinceps ulceri, ut obser. 29. tum aliis præcedentibus ostendimus. Sic etiam ulcera si sunt cum lapide, non curantur, nisi lapis auferatur: cuius extractio valde pericu-
losa est, propter ulcus. Cum enim distenditur ve-
sicæ collum, periculum est ne disrumpatur. Si ulcus iam fuerit profundum, tunc satius est uti cura pal-
liativa & ulceris & lapidis; utendo quibusdam em-
plastis & viscosis, ut lapidi inducatur quædam læuitas, quod fiet commode usu lactis cum paucis amylo, aut aliis viscosis mane assumtis. Nam si læ-
vis sit lapis, minus vexat ægrotum. Si ulcus a can-
tharidibus factum fuerit, & a principio neglectum, difficiliter curatur. Si recenter assumptæ fuerint, (quamvis lib. præcedente harum curationem diximus) & fluxum sanguinis faciant, earum acrimoniam & vim extinguere oportet, multo lacte asinæ aut alio: deinde fluxum sanguinis sistere, & ad ulceris curationem venire. Curatur iisdem reme-
diis, extincto veneno, quibus supra. Peculiare au-
tem remedium est, terram sigillatam, bolum arm. cum lacte amygdal. aut cum earundem oleo, vel cum lac-
te asina, vel capra, vel vacca sumere. Expurgat enim venenum, & partem resiccat sine morfu, & sanguinem constringit. Contra ulcera vesicæ habes egregia medicamenta apud Rondelium, syrup. magistrale, opiata, lenientia, repurgantia, con-
solidantia & iniectiones: tum apud Aetium ex di-
uersis

*Ulcera cum in-
flammatione
aut dolore.*

4 *Ulcera cum
lapide.*

*Ulcus a cantha-
ridibus factum
quomodo cura-
tur.*

versis antiquis auctoribus collecta; ad quæ loca & auctores dictos lectorem relegamus. Breuiter, ad vlcera abstersionem valet hordeacea aqua cum zaccharo pota & iniecta, vel mulla dilutissima. Quibus addes & ea, quæ in obseruationibus dictis retulimus.

OBSERVATIO XXXII.

De vlcere vesicæ, concavitatem eiusdem occupante, valde diuturno ac lethali.

Nicolaus Dammius, prætor Haganus, longo tempore vlcus in vesicæ amplitudine habebat: cui & hæc signa aderant; dolor perpetuus circa pubem hærens: nam & in profundo vesicæ cum ægrum doloribus perpetuo affligeret, subinde pelliculas tenues instar foliorum & laminarum cum vrina excernebat, & semper dolorem, nec solum emictionis tempore, sentiebat; vnde & tabidus euadebat; magis macilentus, a chirurgis potu gualaci ita tractatus, cum illum male indicarent morbo Gallico affectum: quibus macilentior indies factus, doloribus ingentibus ex vlcere admodum molesto conficiebatur. Tentatisque etiam multis remediis per excellentissimos medicos, tandem & per Ægidium chirurgum Traiectensem, cum & me vna consuleret, cumque scirem in sene malum incurabile esse, victum tantum commodum præscripsi, & leuia quædam remedia ad solamen tantum; iubens vt æstiuos soles, hyemem vehementer frigidam vitaret, lassitudines, etiam deambulationes, uestiones in curru, & equitationes: & ne humectantia loca incoheret: omnia enim hæc, vlcera fatigant; e contra loca montana sana habentur. Balnea quoque vitanda, & supinus incubitus, mollis pluma, Venus, & inter cibaria acrida, salsa, acetosa, & valde dulcia, vti & amara; vinum quoque multarum vitium, & quæcunque difficulter concoquantur, vel ignaui alimentum, vt raphanus, bulborum omnia genera, aromata vniuersa, & quæ iis condiuntur, & piperis & caryotarum vsus, caricarum & ficuum aridarum. Lactis omnia genera commendauimus: ius quoque gallinaceum & ptisanam hordeaceam, & lac cum amylo & zacchar. & cum similagine; & oua sorbilia. Inter aues turdum, phasianum, perdices, attagenas, alaudas, ficedulas, merulas & similia, auesque minimas & pinguiusculas, & cerebella: hædos quoque, agnos, vitulos, & eorum pedes: & caneros fluuiatiles. Nonnulli & conchulas laudant, sed falsedo earum me terret. Palmulæ, passulæ, pinæ nûces non contemnuntur, & asininum lac, aut equinum, & obsonia assa quidem potius quam elixa, sine sale præparata, & vinum nullarum vitium, multa aqua infractum, decocta vel ferrosa. In hac maxime iuuat abstinentia, vel imprimis parciore potus: æstiuis temporibus, in fortioribus, cucumis, lactuca, cucurbita, melopepones, ingens cucumis, & eorum semen, vel papauerinum album duntaxat, lac amygd. hordeata, & pyra, mala cydonia vel condita cum puro saccharo: cerasa saccharo condita. Alius si resisteret, iussimus vt nil nisi mannam vel cassiam sumeret, cum sero lactis: & vt ab omni molestia sese liberaret consulimus: in hoc enim affectu plurimum animi secu-

ritas valet. Et quia multis iniectionibus vsus esset post hydromel dilutum, lac caprillum cum trochi. alka-chengi, & postea ouillum satis esse existimabam: & si venter durior esset, vt ex hac opiata vel confectio interdum caperet: *℞ syr. ex infus. ros. pallid. mannatis selecti ana ℥ij. fiat mixtura*, capiat subinde cochlear vnum. Hoc medicamentum hic valde vtile est. His quidem vtens, solamen aliquod habebat; quamuis senex ab eodem malo macilentior factus tandem, prognostico longo tempore prius habito, & hic quoque obiit.

SCHOLIA.

Quibus modis vlcera curentur, iam satis dictum est, nempe iis, quæ vlcera abstergunt, iisque repurgatis etiam consolidantia adhibenda, vt de renibus exulceratis dictum est, vt est hordei non excort. decoctum, cum glycyrr. & melle ros. etiam lac caprillum cum melle rosa. & alia iam supradicta. Sed vbi eadem vlcera sordida fuerint, tunc pharmaca infundenda, quæ vim repurgandi maiorem habent; & augenda mellis, aut mellis rosacei quantitas; mordacitatis etiam tempore instante. Abstergant vehementius mulla, cum ficis aridis, aut fufuris marcor, vel decoctum. In intestinum quoque per sedem ptisanæ succus infundendus est, & seminis lini succus, & cucumeris semen decorticatum tritum, cum lacte, rosaceo oleo ad singula instillato. Vbi vero vlcera putria & atra fuerint, aliqui lixiuium, ex ficulneo cinere infundunt, aut querceo vel abrotani decocto, vel adiecta mulla. Si vero minus putria fuerint, mulla per se valet, aut serum casei recentis infusum. At si exulceratio serpendo serpat, subastringentibus medicamentis ab extra adhibitis vtendum est; atque his quidem calidis actu, vt ob calorem quidem partes circumdolitantes leniendo iuuent: ob potestatem autem ipsorum vicinos locos exulcerationem, depascere prohibeant: sunt autem hæc, vna passa, palma, galla, malicorium, alumen, acaria, hypocystis, & similia. Singula autem ex his, aut palmis excipiantur, aut cataplasmatibus ex loliacea farina. Decoctio autem fiat in posca, vt præcipit Aetius. Similiter etiam in vesicam infundatur lac recens multum, per se aut cum amylo, aut rosaceum optimum recens tepefactum. Cum vero repurgata fuerint vlcera, adiuuare oportet vt ad cicatricem perducantur, atque id per infusus astringentes, & eiusdem facultatis epithemata. In quem vsus emplastrum ex ouis, hordeo vsto & cadmia, tripla eorum parte cum cerato myrteo aut rosaceo temperata, commode superponitur. Paulus palmas imponi iubet, cum passula, galla, & acaria, hypocystide, ac alumine. Nec minus confert si medicamentum ex amylo, sarcocolla, & cerussa, pauillo oleo rosaceo & cera additis, & cum lacte dissolutum iniiciatur in vesicam: generosiusque euadet, si vsum plumbum ac thuris corticem adicias. Ceterum si ad multum tempus exulceratio perseveret, quemadmodum in plerisque fieri consuevit, tunc sane exacerbationes, & interualla siue remissiones ægros apprehendunt. Quare in exacerbationibus quidem cataplasmata, & fomenta, & irriga-

Ad vlcera putrida.

Ad noma, & serpentia vlcera.

menta liniendi vini habentia adhibeantur. Remissionis vero tempore, ductu ad destruendum, (ut etiam antea admonuimus) malum apto vten- dum erit; quemadmodum ab eodem Aetio scriptum est, lib. 11. cap. 29. de vesicæ ulceribus, ex Raso. Habes ibidem veterum probata medicamenta, & Andromachi, & Asclepiadis, & Oribasii, & Olympii Sophistæ.

OBSERVATIO XXXIII.

De vesicæ scabie.

Vitæ vicinitate de scabie vesicæ aliqua subiun- gemus: ex peruersis enim humoribus gene- ratur: adurit enim vrina, quæ & furfuracea e- mittitur. Eo inueterato morbo contabescit cor- pus, Hippocratis testimonio, ac vesica intus pru- rit. Nam & vrina grauitur olet, & quod in imo re- sidet, surfuraceum cernitur: & assidue æger min- git, & cruentam interdum vrinam, cum altius sca- bies penetrauerit. Sic quidam hoc malo labora- bat, quamuis nondum eo peruenerat quod cru- entum mingeret. Aderant autem ea, quæ ab Ae- tio lib. 11. cap. 22. de vesica scabiosa traduntur. Quibus enim vesica scabit, his pruritus, tum imi ventris, tum pectinis succedit, inque vrinis asperæ & furfuraceæ subsidentiæ deferuntur: progredi- ente vero morbo, vesica ulceratur, accessionesque ad ulcera præscriptæ inducuntur. Cum autem cu- rationes huius communes sint cum his, quæ pau- lo ante de acutis ulceribus vesicæ diximus; ideo nos in cibo ptisanam hordeaceam frequenter de- dimus, quæ acrem humorem mitigat, vti & oua sorbilia, ac tritici decocti ius, vel cibarium ipsum commanducatum: nam & lactis omnia genera valent: & ex quadrupedibus extremorum par- tes viles sunt, quia viscosæ & mucidæ, iuraque pingua ex amygdalino oleo. Frequenter vero ut vteretur pulte hordeacea, cum lacte mandauimus. Ex oleribus concessimus lactucam, betam, spinachium. Commendatur & atriplex, intubus, ac seris fatiua, prunæ acidula, cerasa acris, cucumis, melo- pepon, cucurbita, vel saccharo (ut nunc fieri solet) condita passula, amygdala dulcis vel recens poti- or, nuces pineæ, aquæ maceratæ & commandu- catæ in potu hordeacea aqua. Derraximus humo- res acres salios cum manna, syrup. viola. & ex infus. ros. & castia. Dedimus decocta ex viol. lactuca, gly- cyrrhi. semin. quatuor. frigid. maior. portul. syrup. pap. iuiubino, viol. In sessionem aquæ repentis laudauimus, modo ex decoctis lenientibus, mitiganti- bus, & emollientibus, ut de vesicæ ulcere dictum est; & etiam lac muliebre cum rosa. infundi iussimus; pube inuncta cum vnguent. ros. Et si fortasse eo perueniret malum, ut sanguinem funderet, vl- cere altius penetrante, ut hoc emplastrum sub pu- be poneretur consulimus, ex rubricæ armenia- cæ, rhois, acaciæ, masticis, ros. part. æqualibus tri- ta, & cum aceto mixta. His solamen habebat; quamuis non omnino, cum & hic senex esset, ma- lum tolleretur, hoc est, quod dicebat Aetius loco citato. Nosse igitur operæ pretium est, quod non penitus curabile sit malum: conandum tamen, ut pro viribus leniatur.

S C H O L I A.

Non alia ratione curatur scabies vesicæ, quam simili victus ratione ac medicamentis deter- gentibus atque exsiccantibus circa morsum, ac ip- sæ vesicæ ulcera: Vnde & Aetius libro 11. cap. 22. iubebat abstineri a mordacibus, quæ humores aciores redderent. Exhibebat vina dulcia, & lac, & gallina aut hædorum aut agnellorum carniū iuscula, palma- rumque cremorem & siliginem, & amyllum, ac sorbitio- nes ex his apparatus, pisces molles carne; & omnes coctos. Ex oleribus quacunque vrinam subducunt, nihil vero mordax in se habent, velut est, pastinaca probe cocta, critisma, fœniculum, apium, hipposelinum, asparagus, cucumis, & quacunque eius generis existunt: nam & vrinam clementibus, mitioribus tamen, vesicam subpurga- re oportet: periculum enim est ne fortioribus exulceretur, quod omnino peius exstat. Vrinam (inquit idem) commodè clementi cancri, & pine concha, & herinacei marini recentis caro exsiccata, & drachma pondere in potu accepta. Neque minus commoda cicada censenda, & vermes terreni tres ex passo potati. Non inconue- niens item fœnugraci succum cum melle sorberi: id ipsum enim & intestini morsus obtundit: & si ad vesicam procedat, scabiem eius mitigat. Idem etiam tragacan- thus facit. Iucundus est item baccarum myrti cremor, cum vino potatus; aut mali cotonei cremor, aut cuius- cunque alterius astringentis fructus. Hac autem a- stringentia, inquam, pruritus quidem mitigant, affe- ctionem vero non sanant. Diata porro optimi succi sit, & per aliquot dies vomant. Sero autem lactis alius sub- ducatur. Mediocribus exercitiis moderate vtantur. Hæc Aetius.

OBSERVATIO XXXIV.

De ardore vrinæ, cum diuersis symptomatibus, per modum consultationis, pro magnifico D. Ioan. Dammio Rationariorum præfeto in Haga- Comitibus.

Qvinque sunt affectus præter naturam, de quibus magnificus hic vir conqueritur. Dolor in rene dex- tro potissimum, deinde vergens ad imum ventrem, ver- sus ilia & pectinem. Ardor cum deiectione materiae mucilaginosæ & nitrosæ. Vrina impedimentum, ita, ut ea non libere exeat. Appetitus deiectionis. Exanthema in modum morsus culicum ad cutem expulsa. Hu- ius domini intemperies seu temperatura ipsa est calida atque biliosa, exigua sanguinis portionem commixtam habens. Renes huic calidi sunt: ita & hepar, licet ventriculo debiliore. Hinc humores crassi ex mala ventriculi coctione accumulati, crudi, ob hepar cali- dum attracti, & in renibus assati, materiam ad calculum aptam indurarunt. Antea enim & arenulas vna cum lotio emisit. Non solum hepar & renes calidi horum symptomatum causæ existunt, sed & tempore iuuentutis valde fuit laboriosus, cum officium Procurato- ris generalis ageret, deinde Graphiarius sedendo, scriben- do vitam consumpsit: mox a rationibus cum esset, & anno præterito, apud Westphalos & Frisios delegare- tur, ob curruum insolitam celeritatem & equitatum toriusque corporis concussionem, renes plurimum labo- rarunt: ita ut tandem vena aperta sint, & sanguinem minxerit; vel forte vena dirupta ex calculorum fragmen- ti-
tu:

id: id medicus scire potuit, qui illum tunc curauit, cum
verumque contingere potuerit. Mox corrosione subs-
quuta, renes tum vrinarios meatus lacinando, &
quasi exulcerando, ardor vrinae etiam nunc hominem
fatigat, cum eiectione vrinae mucillaginosa & nitrosa ac
salsa. A mictu sanguinis euasit ope Henrici Verge-
rii, medici doctissimi, pia memoria, (qui & ani-
mi deliquio subito in mensa obiit,) quamuis tamen
difficultas vrinae, & ardor, & dolor renis dextri
permanerent, quibus & nunc afficitur: atque horum
caussa consilium a me petitur. Hic morbus est qua-
si hereditarius: nam & frater eius Nicolaus Dam-
mus, de quo ante diximus, calculo vesicae laborans,
deinde ex vesicae ulcere tandem obiit. Hic tamen
dolorem patitur, ut ab eo incipiamus, in reno de-
xtero, & in vterere, & differt a colico dolore. Ar-
dor deinde successit, vel ex concussione aut veni-
ruptis, vel ex fragmentis calculorum precedentibus ac
corrodentibus; unde ardor vrinae potius ex materia
salsa mucillaginosa. Pus tamen non vidi in lotio
quod subsidere solet. Saepe autem pituita putris & salsa
(ut in senibus) aut pus acre vrinae permixtum, vri-
nam ipsam acrem reddit. Et quanquam nunc pu-
rulentia non viderim in vrina, potius antea post san-
guinis eruptionem adfuit. Attamen, si ex ulceratio-
ne adhuc permansisset, tamento in lotio conspexissemus, &
purulentiam. Pus enim praecedit dolor, cruor, grauius
olor, minus viscosum est. Contraria in pituita: nam
tunc ratio dolor adest, nisi cum putris, salsa aut frigida
fuerit. Hic erit salsa. Annotauit interpretes Holle-
rii, Hollerium frequenter vidisse interceptam vrinam
crassa plicata, quae ardorem, & dolorem, ut in cal-
culo excitaret. Vidit & intolerabili cruciatu ali-
quot diebus affectum, qui pituita partes, velut cry-
stalli aut concolitissacci, quem gelatinam vocant, glo-
bulos colore aquae pellucidos minxit. Duos item
quibus pituita putrescens in vermes vertebatur, quos
eminebant. Bencler Aduocatus post dolores renum
magnum vermem eminxit. Quidam literas ad Hi-
spanum scriptas ostendit, quibus consilium petebatur
pro calculoso, cui circa calculis aliquot arenulis prodie-
rant duo vermuli acuto capite, comiculato, ventre &
dorso testula inductis instar testudinis, nigri, nisi quod
rubebant ventre. In quo videtur generatio quedam
esse a putredine pituita, calore multo totius venosi gene-
ris eam pituitam ita conformante. Quemadmodum
cum triphlora, id est, capillitium illud, de quo agit Ga-
lenus aphorism. 79. lib. 4. id est, pituita, quae in lon-
gum diducta a calore exurente capillos repraesentat ali-
quando ad dimidium cubitum, ex vasa crassiora alimen-
ti genita, quae cum vrina crassa externitur. Visci-
dior enim fit, & resiccatur, non omnino quidem,
sed ut longitudinem produci possit. Aliquando ani-
matur, ut cetera animalia, quae ex putredine ortam
habent. Archigenes fieri putauit a fluxione mucosa,
unde & foliaceae sunt, & velut pili, aliquando implexi,
breues, longi, & materia quadam e renibus ad renes,
ubi cogitur. Galenus scribit, in quibus talia exeunt,
semper vrinam esse crassam. Contrarium experientia
docuit. Quidam annis plusquam viginti tales vrinas
cum capillitio emisit, ruffas, mediocri consistantia, non

crassas. In praeside Longueil pituita lenta, corrupta quae ant
incredibili quantitate multis mensibus eminxit, & die-
cit, quoties sumsit medicamentum cum vrina tenui, se-
rosa, simili sero lactis. Opportunus erat arthritidis
& calculo. Sed utroque affectu liberatus, vigilis,
frequenti mictu dolorifico torquebatur. Malum modo
remissius, modo acerbius, per frigora & humidum coe-
lum: modo stillicidium, mictus exiguus, & frequens,
modo vrina largior, remittebatur dolor, tum acerbior
redibat. Penis & crura condolebant. Vrina nudo
mordax, modo contra. Eadem omnino apparuerunt
in Procuratore ad Paruum pontem. Vtrique etas an-
norum circiter 52. hepar calidius, sitis multa. Sed Prae-
ses naribus nihil expurgabat: alter contra. In sacerdo-
te Normanno multa mucosa per vrinam prodibant;
sepe eminebat. In his omnibus, cum pituita acris, sal-
sa, putris, frigidior erat, dolor excitabatur. Cre-
ditur tamen pituita viscida & parum permixta,
cum dolore excreta, & magno conatu in ulcere re-
num aut vesicae calculo tantum emitti. In asthmate
aut simili affectu, morbi vel magnitudinem, vel muta-
tionem significat. Quae omnino sine dolore exit, & in-
fundo crassiori farinae similis apparet, crudus succus est:
quem saepe sequitur renum aut articulorum dolor, aut
calculus, aut morbi longitudo, aut corporis consumptio.
Pus resudat & effluit ab abscessu inflammationis, vlcere.
Non semper sanguini permiscetur. Multi enim
renum abscessus reperiuntur, in quibus pus solum, cer-
tis intervallis cum vrina excernitur, ut in duabus
mulieribus, altera vxore senatoris consulis Claudii Fa-
bri: altera vxore Vincentii Fabri negotiatoris. In
aliis quoque, qui inde tabidi mortui sunt. Sanguis-
nolentum aliquando, utrumque exacte vrinae permi-
xum, aut residens, sed post longum tempus, vrina
etiam inde crassiore reddita, e renibus est, praeser-
tim si dolor fixus in lumbis praecesserit, aut calculus
reiectus fuerit, aut ex vteribus vlceratis transiit
calculi, vel in illorum cauitate orta post vlcus ca-
runcula. Sed copiosius e renibus, quam vteribus.
Cito subsidens, viscidum, magis permixtum, cum
squammulis minutis carnosissimis, e vesica; si nullus dolor
in lumbis, aut circa pubem grauitas praecesserit. Si v-
rina profluit e pene, ut diximus alias. Neque tamen
e renibus, aut vesica semper exit. Ab omnibus enim
fere partibus superioribus miro naturae artificio, &
per corpus conflatile facta ex sudatione modo in inte-
stina, modo in vesicam exoneratur. Mulieri cuidam
intolerabili cruciatu vrina purulenta profluebat.
Mortua post quartum mensem, & dissecta, duo calculi
in corde cum multis abscessibus paruis inuenti, reni-
bus integris, & viuis vrinae. In qua verisimile est aut
potius necessarium, pus acre per vrinas naturam expur-
gasse, quo ad fieri potuit. Verum licet in hoc magnifi-
co viro, pituita salsa in vrina nunc appareat, & non
purulentia, ea ipsa tamen potuit fuisse in principio, cum
prius sanguinem minxerit, & subsequuta fuerit exco-
riatio; vel ex calculo, & iam etiam dolor in rene dextero est.
Quicquid sit, oportet ardorem mitigare in homine bilio-
so, & acrimoniam eiusdem tollere, quous modo hic ar-
dor originem habeat; & imprimis oportet dolorem amo-
uere, qui vires deiecit. Praeterea ad calculum, cum fra-

6 gmenta aliquando reiecerit, oculum habendo, cum hic duæ cauffe exiftant; prima hepatis ac renum caliditas, altera vero materia mucilaginofa, qua facile in calculum mutatur: viraque cauffa submouenda, vt horum membrorum caliditas mitigetur, & humorum copia euacuetur cum his, qua calorem non inferunt ob ardorem vrinae, & horum denuo coarctatio inhibeatur. Si enim simplex affectus effer, vnicam & simplicem curationem postulare. Nunc vero multiplex, multiplici curatione indiget. Materia acris ardorem inducens, ne vlcerationem inferat contemperanda, & mitiganda. Viscosa vero & crassa detergenda leuiter; & lotium, si ea ratione impediatur, cum lenibus promouendum, qua tamen non exasperent aut ardorem inducant. Calculi quoque, si impedimento sint, expellendi potius cum viscosis & lubricantibus, vt calculis inducatur quadam leuitas, vt sic melius expellantur, sine calore, minus acres vrinas inferentes, & per consequens ardorem vrinae minuentes. Verum haec omnia duobus instrumentis peragenda, nempe victus ratione & medicamentis. De priori prius dicemus; deinde posteriori. Sub victu etiam res non naturales intelligimus, omnes excessus aeris, tam frigidi quam calidi. Dominus vitabit, ventos austrinos & boreales, coelumque nocturnum, nebulas, nubes, & reliqua eiusmodi, cubacula, porticus, stationes, eligendo temperata: declinando habitationes humidas terreasque, aestum, ac solem & hyemem. Neque in magnis aestibus sine stragulis aut natus quiescat, aut in sole deambulet, vel cum venti exagitentur. Capitisque operimenta ita moderabitur, vt neque aggrauetur caput, neque refrigeretur. Et ideo catarrhos destillationesque summopere cauere oportet, ne fiat defluxio ad renes & vesicam. Et quamuis nuper inspecto lorio, in eo non animaduertim purulentiam, nunc vero Dominum sapius inuifendo pus in lotio animaduerti, vnde & vlcerationem leuem metuo, qua etiam vrinae ardorem magis augeat, quam minuat; cuius etiam ratio habenda, tam in vita instituto quam ipsis medicamentis. Quamobrem reliquas corporis partes inducentis, siue noctu, siue interdiu, talibus munies, qua nec nimis calefaciant, nec parum a frigoris iniuria tueantur. Renes praecipue tueberis, vt nullo qualitatis excessu laborent. Omnino renum affectus proprium est, vt pariter tam ab immoderato frigore, quam calore excitetur & exacerbetur. Ergo vtrumque vitare oportet, nec lumbos ad ignem calfacere, nec zona firmiter stringere, aut vestes pellibus circa dorsum obducere, nec impense refrigerare. Somnum meridianum, vt hostem, fugies: octo autem horas dormiisse satis est. Interea non admodum vigilandum, ne humores aciores fiant ex siccitate. A coena, non nisi post duas horas dormiendum censeo. Somnus quoque supinus euitandus: nam super lumbos dormire, vel in lecto plumis referto, renes inflammat. Exercitia superiorum partium potius quam inferiorum licet conuenirent, cum tamen debilis exsistat, ob varios affectus, potius corpore & animo quiescendum erit, multoque minus feret equitatum aut asperas unctiones. A cibo quiescat ab omnibus negotiis: stet aut molliter ambulet; sine labore tamen. Non scribat neque legat,

nisi post duas horas: ea quoque legat, qua voluptatem coniunctam habent, neque hominem fatigent. Statim enim a prandio & coena a seriis negotiis ferendum. Si qua tractanda, matutino tempore id commodius fiet. Ab his enim & coctiones deteriores fiunt, & feruor sanguinis praeter naturam plurimum augetur. Magis autem ab ira se absteineat, omnique animi grauiore molestia, & perturbatione: a tristitia quoque corrumpente digestionem. Recte nos admonuit Galenus primo, de sanitat. tuenda, sic scribens: Oportet medicum, qui sanitati mortalium studet, pro virili operam dare, quibus aditus agitudinis corporis pateat: quippe furor, fletus, sollicitudo, ceteraque id genus magis, quam par est, febrium morborumque ceterorum sunt principia. Tristitia autem; teste Salomone, etiam ossa exsiccat. A Venere, quantum potes, temperabis: nam ea excedens renes lancinat. Sit igitur moderata, & minime frequens per longa interualla, qua agrum non fatiget. Sed cum senes in eam non nimis inclinent, vix admonuisse opus est; quamuis in his morbis praestat egros esse temperatissimos. Quod ad inanitionem atque repletionem attinet, singulis diebus operam dabit, vt alui excrementa sponte vel arte educantur (ob humores acres, & ardorem vrinae, & renum caliditatem) cum iure puli, in quo cocta fuerint mala lactuca, viol. mercurialis, aducto zaccharo rubro, vel saltem glande, cibisque leuibus, vt prunis & huiusmodi. Neque hic vomitus inutilis, nauseabundo tamen & cui facile succedat, diuertit enim materiam. Quod ad cibum attinet, panis sit probe coctus, & bene fermentatus, non adeo antiquus, sed duorum aut trium dierum. Vetus, iuxta Auenzoarem, desinit esse panis. A cineritio absteineat, pastillis cuiuscunque generis: a ferculis diuersis & insartagine frixis, carnibus antiquis, salitis, fumo induratis, larido rancide, & similibus, salsis omnibus & acidis, & aromate coispositis. Ad cibum ne accedito, cruditate adhuc in ventriculo existente, sed sensum aliquem appetitus expecta. Verum, cum is nunc aliquo modo prestratus sit, comedas in die more consueto, parcius tamen in coena. Interea & ordinem comedendi obseruabis, vt initio mensa iusculum aliquod vel liquidum edulium sumas, vt pruna damascena vino suffocata, & zaccharo aspersa. Mox ad solidiora deuenies, ex multis ferculis potius vnum, atque illud optimum, eligens. Nihil enim magis laedit, quam varietas ciborum in vna mensa sumpta, vt carnes cum piscibus, aut fructus cum lacticiis commiscere. In ventriculo cibi diuersarum naturarum admiscendi non sunt, & praecipue si illi, qui facile putrescunt, succedant solidioribus, vt lac aut fructus horarii carnibus. Maxime igitur vitabis cibari ex diuersis generibus confecta, qua vulgus Tartas appellant. Ex ferculis potissimum conuenient puls hordeacea, hordeatum, lac amygdalatum, & lac recens multum, pro ardore vrinae. Serum lactis dulce ad calorem mitigandum mane sumtum, & ad acrem vrinam contemperandam, oua recentia & mollia, carniū iura cum beta, borag. lactuca, spinachio. Inter fructus pruna matura statim ab arbo-re excissa, in prima mensa, vna passa; poma cocta, zaccharo aspersa. A piscibus salsis, marinis, glutinosis, vt anguilla

8.

9.

anguilla & similibus cauendum. Asellus vti licet ac saxatilibus, aut in aqua pura degentibus, luccio, perca, & similibus. Conueniunt & lepisculi, cuniculi, perdicæ, fasciani, turtures, palumbi, passeræ, turdi, merula, alaudæ: & ex domesticis animalibus hœdi annales, vituli lactantes, pulli gallinacei. A bubula plane abstinendum. Potus sit vinum Rhenanum, subtile, minime potens. Ceruisia quidem, sed non recens, aut valde crassa aut acida. Hæc interim victus ratio aliquando dimmutanda, pro vrina ardore eiusque retentione. Vbi enim retinetur, conueniunt asparagi, & alia; vbi ardor vrget, cremor hordei. Quod ad medicamenta attinet, censerem omnium primo corpus euacuandum, vt tollamus materiam salsam & biliosam, quæ ardorem inferunt; & darem cassiam, quia lenit humorem salsum, diuerit eundem per intestina, & euacuat humores arenibus, etiam crassos, vt Actuarius testatur; & vt parum diureticum & absterfuum, darem electuam de sebesten (cum educat materiam acutam a vis uirinalibus & vesica) & propter calculos & difficultatem vrina addere parum hiera, quia parum diuretica est, & puritatem mucilaginosam non tantum detergeret & parum incidere, verum etiam educeret: Darem quoque hos syrupos: ℞ syrup. ex infus. ros. viol. nymphaeæ, syrup. de fumoterra (propter morsus illos culicum) ana ℥ j. ℞ aqua chid. citræ. malua, sumaria ana ℥ iij. misce. pro quatuor dosibus. Hoc enim contemperabit humores calidos, faciet ad calorem hepatis, renum & exanthemata illa. Et vbi ardor vrinae vrgeret, exhiberem sequens: ℞ syrup. viol. nenuphar. pap. ana ℥ j. decoct. portul. semin. quatuor. frigid. comman. sem. pap. ℥ ix. misce. pro iij. dosibus. Vel: ℞ aqua malua ℥ iij. syrup. viol. ℥ j. misce. Et si opus esset, tursus purgarem cum manna, aut cassia, cum aqua malua. Renes ac lumbos inungerem vngu. ros. & ad dolorem, si opus esset, fotum componerem ex folia malua, viol. parietar. cum melilot. & flor. chamomill. & semin. altheæ, malua, & lini. Quod si vrina esset, nimis mucilaginosa, impediens mictum, vel dolorem inferens, & foetida, ac crassa, iuberem fieri eiusmodi destillationem: ℞ pentaphylli cum radic. malua cum radic. parietaria, agrimonie ana m. ij. granor. alkachengi ℥ j. ℞ semin. milii solis ℥ j. rad. ononid. ℥ ss. limonem vnum minutim concissum. Aspergantur cum succo ros. & destillentur per alembicum vitreum, & vsui referuetur. Huius capias ℥ iij. addendo ℥ ss. olei amygdal. dulc. recens expressi. Vbi ardor vrinae vrgebat, aliquando capiebat lac ouillum, & etiam tepidum, & recentè mulctum cum syringa in vesicam immittebat, aliquando & aqua albuminis oui cum lacte & oleo violaceo utebatur: modo aquam albuminis concussi solum aut cum lacte capiebat. Hæc supradicta, cum illum sæpe inuiserem, iuuabant; quamuis malum non totum in lenē auferebatur. Interea commendabam hunc potum præceptoris mei Benedicti Fauentini, ad omnia symptomata quibus afficiebatur conuenientem. Quo & præceptor meus post euacuationes conuenientes vti solebat in ardore vrinae: ℞ aqua fontis clara lb x. cicerum rub. lb j. ℞ bulliant simul vsque ad consumptionem tertiae partis aqua, deinde colentur: & colatura addo liquir.

ras. subtiliter incisa ℥ j. sol. malua cum rad. radicem altheæ munda. rad. graminis, agrimonie, cassia, ana m. j. iuiubar. sebesten recent. ana num. x. sem. melonum mundat. ℥ ij. granor. alkachengi m. ss. granorum solatri ℥ ss. osium mespilorum contusorum ℥ iij. mil. i solis ℥ ss. bulliant omnia vsque ad consumptionem tertiae partis aqua. Et utebatur huius iuris decocti colati ℥ vj. cum ℥ j. ss. zacch. duarum costarum. & dabat in diluculo, & iubebat, vt æger superdormiret per horam vnam. Hæmorrhoides quoque in consuetis eas habere commode aperiebat, cum earum apertio curet vrinae ardorem. Et sic etiam huic magnifico viro, cum iis aliquando solitus esset laborare, vt eas fricando leuiter aperiret commendavi, ad hos omnes eius affectus valde utile remedium. Habes apud præceptorum meum in sua empirica alia utilissima remedia ad ardorem vrinae.

SCHOLIA.

Ardorem vrinae aliqui vocant, & fere omnes, cum inter meendum dolor sentitur; qui multos morbos sequitur, vt lapidem vesicæ, vlcus eiusdem, & renum, vel illarum partium inflammationem. Aliis dicitur ardor vrinae, lotii acuitas, exacerbans vrinæ meatus, præsertim renes, & ipsam virgam inter mingendum, cum tantus dolor & ardor in vesica vel eius collo sentitur, tanquam ignis transiret per collum vesicæ, virgam vel penem, vt ardere videatur, vnde nomen suum contraxit. Hinc Rhases & Auicenna huic capiti titulum ardoris vrinae imposuere. Et quia plerunque contingit ex apostemate, abscessu, vlceratione renum vel vesicæ, ita, vt virulenta materia, purulenta, acuta, mordens, mixta cum vrina, vrinam reddunt mordacem; ideo post apostemata membrorum dictorum atque eorundem vlcerationem, adiungunt caput, De ardore vrinae. Et sequitur subinde vlcus renum, vterum, vesicæ vel penis; quod si non veniat ab horum membrorum iam dictorum exulceratione vel inflammatione, quod cognoscitur præterea, quæ diximus, ex ramentis carnosiss, quæ a renibus soluntur, sicuti fursuracea, a vesica, vt ante diximus, non tamen semper. In febre enim ardente & colliquante a tunica venarum exesarum acrimonia (quomodo in curis superficie pituita salia & mordente erosa sit) fursuræ redduntur. Aliquando in eadem febre ardente ab adusto sanguine, præsertim crassiore & melancholico ac veluti in cinerem resoluta. At in vrina mediocriter habente, ægroto non febricitante, a vesicæ scabie, pituita salia, vel prurigne oriuntur. Semper præter naturam & voluntatem effluit, vasis relaxatis, imbecilibus post coitum, colliquo corpore, vlcere irritante, frigidis flatibus generantibus, ardore, semine retento ob contorsionem pudendi, parastata aut glandulæ semen retinentes, quæ sunt in vasis circulatoriis in parastatas desinētibus, aliquo præter naturam affectu laborant. Hinc quidam volunt esse ardorem vrinae proprie inflammationem glandularum, seu adenum parastatarum, vel illarum partium exulcerationem: & ob saniei acrimoniam, dolorem sentiant in extremitate penis; sequitur coitus immodicos, vel equitationes longas, &

12.

13.

Ardor vrinae
quid.

Causæ

14.

Ardor vrinae
ex inflamma-
tione glandula-
rum seu adenu-
parastatarum.

15. celeres. Sed ob seminis potissimum aut illius serofæ substantiæ, quæ coitum præcedere solet, corruptionem, vel propter infectæ mulieris vitium, quod contactu contrahitur, idque potissimum, cum quis semen attractum retinet, & iam commotum. Affectus secundum alios multi esse possunt, vt inflammatio, vlcera, scissuræ; resiccatio. Inflammatio sine coitu a semine retento, & illic putrescente, puris reiectio, pudendi mador, erectio, aliquando etiam a partibus vicinis inflammationis, vt in hæmorrhoidibus: nonnunquam defluxu humorum post equitationem longam, celerem, acrium nimium vsum. In vlceribus maior puris quantitas, minor ardor, quam in inflammatione. In scissuris, solus vrinæ ardor absque puris emissionem. Si post coitum, præsertim cum infecta, parastatæ aut glandulæ inanitæ & calfactæ halitum quendam tetrum contraxerunt: a concubitu efficitur ardor vrinæ, quem vulgo proprie vocant Gallice *Chaudepisse*. Erigitur veretrum, vrina cum maximo dolore redditur, sanies liuida, virescens, mordicatio in meatu. In erectione pudendi fit etiam contractio cum dolore, non in neruo cauo, vt nuper non nulli scripserunt. Nam ficerigeretur potius quam inflecteretur: sed ob plenitudinem, vel inflammationem vel inanitionem in meatu vrinæ. Vnde sæpe fit, vt qui tum vtiuntur coitu, vt erecto membro illis scissura fiat, vel vlcus. Hinc vel exitus vrinæ quasi cuniculis factis per anum aut aliquam aliam vicinam partem vel carunculæ, tanquam fungi concrecentes, aut tubercula in anfractu colli vesicæ, aliquando in reliqua fistula penis; a quibus & *ισχυρία* & dolor grauis in meiando. Oribasius calore loci scribit huiusmodi phymata celeriter suppurari, ex Hippocrate, *vt sæpe vidimus in praxi*, & postea etiam exemplis docebimus: Experientia tamen docet sæpius carnem absumentibus curari, vt quoque in pene intus delitescente, *vt in Pauonio illo superius ostendimus*. Sæpe hic decipimur specie calculi, vt nobilissimo viro referente interprete Holle-
 16. rii, post vrinæ cruciatum in octauum mensem ambigentibus medicis & chirurgis de calculo, adhibitis frustra remediis, tandem apertio facta, *vt solent lithotomi*, liberatus omnino dolore, non inuento calculo, sed carne in collo vesicæ, quæ paulatim consumpta est conuenientibus remediis. Sæpe tamen malorum omnium origo ab hepatis inflammatione. Ideo quidam ex Neotericis, *vt Leonellus*, ad quatuor causas hunc affectum deducunt: & prima est humor acutus, acris, admixtus vrinæ, qui est vel bilis citrina vel pituita salsa, vel alius humor adustus; qui si vrinæ admiscetur; inducit ardorem & punctiorem. Si autem venerit ex bile citrina, apparet vrina citrina. Et quando prouenit ex pituita salsa, vrina videtur alba, cum aliquali crassitie. Si autem ab humore adusto, tunc vrinæ sunt adustæ cineræ. Ad secundam causam referunt *vlcus in vesica, vel in ejus collo, vel in virga*. Ad tertiam adferunt *consumptionem humiditatis viscosæ, existentibus in carnibus glandulosis colli vesicæ, quia humiditas ibi existens remittit acuitatem vri-*

na. Et similiter etiam adherent partibus illis nervosis, prohibent ne vrina pertingat membra nervosa. Causæ vero procatacticæ, quæ humores acres augment, sunt, *labor excedens, iter longum pedestre, tempore calido aestiuo, & quoduis exercitium longum, diuturnum, inordinatum, equitatus vehemens, violentus, in equo pessime gradiente, vel in curru aut quouis celeri motu: coitus quoque continuus superfluens & diuturnus, vsus aromatum; salis quoque & rerum acrium, sal-sarum*. Antecedentes sunt, *humores acres supradicti, apostemata calida, abscessus, vlcera in renibus, vesica aut viis vrinalibus, calculi corroderentes, & humiditatis exsiccatio*. Horum signa satis constant ex præcedentibus, tum etiam iis, quæ modo in obseru. præcedente diximus.

OBSERVATIO XXXV.

De ardore vrinæ, cum variis accidentibus.

Simon Cornelii, Loripes dictus, longa difficultate meiendi laborabat, cum maximo clamore, & ardore vrinæ, dum lotium emitteret; aderat huic renum obstructio ex humoribus pituitosis, tandem caliditatem & falsedinem habentibus. Qui cum frustra ab empirico curaretur, (*qui tamen pro medico habebatur*) anno 1546. mense Maio, cum ex Gallia Alcmariā veneram, ad eum accitus sum; imperauique; vt victu conueniente vteretur, & vt a falsis & ceruicia crassa, tum flatulentis, & ab acribus abstineret: hunc bolum præscripsi *℞ cassia recens extracta ℥j. succi glycyrrh. ℥ij. zaccchar. candi asperso fiat bolus*; immediate superbibat (cum in lumbis doleret, & obstructio quædam quoque esset in renibus) *℥iij. aquæ fenicu.* quo quidem bolo quatuor vicibus aluum deposuit, cum facilis solutionis esset. Iisq; humoribus euacuatis, appetitus, qui eidem longo tempore prostratus fuerat, rediit. Postea & ex hac portione lumbat, & pilulis deuoratis ex terebinthina Veneta, lota cum aqua fœniculi & viol. cum pul. liquiritiæ confectis, & adhuc semel cassia deuorata, a dolore in lumbis expituita renibus inhaerente & ardore vrinæ curatus fuit. Potio autem talis erat: *℞ cicerum rub. rad. malua, glycyrrh. sem. quat. frigi. maior. an. m. ss. coquantur in aqua communi pro ℥j. ss. col. adde mellis ros. colati ℥iij. butyri recentis ℥ij. capiat omni mane coctlear vnum; deinde pilulas dictas*. Lacte ouillo etiam utebatur, & renes inungebantur vnguento rosac. Postea cum minus vrina flueret, renibus obstructis, iisq; inunctis oleo chamomill. & scorp. dolore cessante & vrina melius profluente, deinde solo oleo ros. & chamomill. crassam pituitam per lotium reddidit, & a dysuria & ardore curatus fuit, renibus obstructis & repurgatis eiusmodi abstergentibus: & sic causa ardoris vrinæ fuit ablata, quemadmodum & in vxore Theodori Isbrandi, quæ anno 1547. puerpera post decimum octauum diem a partu in lumbis dolorem sentiens difficulter vrinam reddebat, & inter meiendum ardore afficiebatur, hoc solo decocto sequenti curata: *℞ rad. malua glycyrr. an. ℥j. folior. parietar. virid. m. ij. sem. anisi, sem. 4. frigid. maior. pap. albi an. ℥j. sem. hyos. albi ℔j. gran. alkachengi nu. vij. hordei mundati m. ss. coquantur in aqua communi ad ℥j. colatura adde mellis ros. colati ℥j. ss. zacc. albiss.*
 pro

pro sapore; fiat apozema in quo pendeat hic nodulus: *℞ trochis. alkachengi ℥iij fiat nodulus in pan-*
nolino raro, pendeat in dicta decoctione, exprimend-
us dum cyathum bis in die biberet, mane hora 6. &
meridie hora 4. Atque ita liberata fuit ab illa mole-
stia; neque aliis remediis opus fuit, nisi quod ut
præcedentes, cremore hordei subinde vteretur, &
ob ardorem aliquando lacte ouillo.

S C H O L I A.

Ardor urinae in decrepitis difficulter sanatur.

Et si diu durat, etiam sine ulceratione, facile tandem vlcus inducit vesicæ, aut colli eius, aut virgæ. Magis affligit in calculosis ob lapillos asperos & angulares. Qui vtuntur cibis salis, & longo tempore diureticis, & senes præcipue macilenti, & nimio coitu vtentes, hoc malum facile incurrunt. Signa ex iis, quæ superius annotauimus satis nota sunt; etiam signa causarum, ex humore prædominante, & prægresso vlcere in locis dictis, vlcere, scabie vesicæ vel colli eius, vel partium vicinarum, & ex ægri sermonibus. Iam & in iudiciis febrim acutarum bilis plurima aliquando excernitur a natura; quæ si diffluit in vesicam, ardorem urinae facit. Urina vero sero sanguinis & bile constat. Cum autem alterum acrius est, vel augetur proportio bilis, tunc ardor urinae fit. Urina omnis acris est, sed multo maxime sentitur acrimonia si pars ulcerata est, quæ effluit. Ad vesicam, ut diximus, glandulosa sunt corpora, quæ humorem reddunt; unde urinae acrimonia temperari potest. Ea exsiccantur in modico coitu, morbo, aut medicamento: quæ causam ardorem urinae gignit. Sannes quoque acris (ut iam diximus) ex superiori corpore in vesicam defluit, quæ urine mixta ardorem facit. Cognita causa, de venæ sectione, purgatione & aliis remediis cogitandum. Sectio tum conuenit, cum calidius corpus est, vel inflammatio adest, e brachio. Purgatio & diuertendo & acriorem humorem repurgando conuenit. Sed prius videndum, an solum leniendum, an etiam detergendum. Vbi sola acrimonia humoris est leniendum solum: vbi vlcus etiam detergendum. Leniendo conuenit cassia, detergendo terebinthina. Vtriusque virtus augetur, aut temperatur iis, in quibus dissoluitur. Sic leniendo, cassiam, si non demus in bolo dissoluemus in decocto iuiubarum, febesten, prunorum, & similium. Si detergendum simul & leniendum, in aqua hordei, sero caprino vel iulebo violato, quod simul lenit & detergit. Commode sepe dedit $\mathfrak{z}j$ vel $\mathfrak{z}iij$ rhab. cum $\mathfrak{z}ij$ cassia, cum $\mathfrak{z}i$ saccharo in bolo. Remedia, quæ diximus de stranguria ob urinae acrimonia, huc quoque transferenda. Urinae acrimonia leniunt iuleb & syr. viol. malua. b. smalua. & aqua ex iisdem destillata, decoct. $\mathfrak{g}ij$ yr. ras. passif. mund. prun. iuiubar. febesten sem. com. in frigid. psylli, cydonior. lac mulieb. oua & similia. *℞ aqua malua ℥iij. iuleb. viol. vel syr. viol. ℥j β* Vbi leniter detergendum, utemur syr. viol. ex infus. ros. rub. de iuinib. de renaph. de pap. Ex his quidem magis, si maior ardor est, & dissoluemus in decocto supradicta, semina melonum excorticata (ut Hollerius iubet) & in un-

data \mathfrak{z} . pondere, aut ex iisdem sem. & cucum, cucurb. cum amygd. dulcibus lac amygdalinum conficiendo, vel amygdalis vteris in decocto prædict. seminum. Atque vbi vigeat ardor, semen hyoscyami albi & pap. alb. & psylli commiscebis, seminis lini albae malua & cydon. eidem vni esse possunt, si parentur, ut dictum est, ut vel hordearis, vel lacti amygd. misceantur. Deterget iuleb ex aqua sacchari: sed leniet magis si sit sacch. violaceum, laudatur iuleb viol. $\mathfrak{z}i$ cum $\mathfrak{z}j$ trochis. alkachengi. Hocque vtendum, vbi maior adest ardor. Lac mulieb. & bubulum leniens magis, caprinum, asininum detergens magis. Onillum magis consolidat. Serum separatum ab his generib. lactis magis deterget. Sed quia ardoris sensus magna ex parte sentitur ad collum vesicæ, & extremitatem glandis, propterea iniectionibus in col. m. turundis quoque in foramen virgæ vtendum est. Leniendo lac mulieb. iniiciendum: vel liquor tenuis albuminis oui agitati & despumati: vel ex mucill. psylli, cydon. extrac. cum aqua cucurb. viol. malua, ut a ras. diximus, vel lac mulieb. cum liquore oui. In maximo ardore etiam pap. & hyosc. turundæ ex cerato ot. Gal. adiecto grano vno atque altero opii, & si extremitas virgæ ulcerata est, ex cerato n. fig. cum succo plantag. Si detergendum iniectionibus supradictis addes saccharum, vel aquam hordei aut serum lactis cum saccharo, ut etiam lenas ac detergas. Deterfa vlcera consolidanda cum lacte coli. $\mathfrak{d}j$ amygd. crissalota ana \mathfrak{d} . β cum lact. mulieb. caprim (ut dictum est) vel ouilli $\mathfrak{z}j$ in virgâ inieci. Aliud: $\mathfrak{℞}$ aluminis plumbi (scissile vocatur a Galeno) \mathfrak{z} acch. ana $\mathfrak{d}j$. mellis $\mathfrak{z}j$. β . vini albi ass. v. s. $\mathfrak{z}j$. leniter bullant. de colatura fiat in iulebo. Vel $\mathfrak{℞}$ succi virgæ pastoris depurati, succi plantag. ana $\mathfrak{z}j$ boli armeni. mummia. ana $\mathfrak{z}β$. misce pro iniectione consolidante: vel trochis. de carabe, de terra sig. ll. bol. arm. tragac. troch. s. de spodio. drachma unus pondere dissoluantur in $\mathfrak{z}ij$ succo equiseti, plantag. iuleb. viol. syr. myrtill. dilute, vbi consolidandum est. Sed trochis. de carabe in maiori ardore vtendum est. Hac commendantur ab Hollerio.

OBSERVATIO XXXVI.

De ardore urinae ex sola caliditate acris urinae, ob bilem cum ipsa permixtam.

Iuuenis biliosus, Germanus, cum falsis ac acribus & diureticis, & vino albo tenui diu vsus esset, in ardorem urinae incidit, sine vlcere, & sine calculo, cum ex præcedentium vsu urina non solum acris euassisset, sed bilem coacernasset, quæ etiam urinam supra modum igneam reddebat. Cum autem urina bili permixta foret, ex illa quidem acrimonia facile in ulcerationem renum vel vesicæ incidisset. Ideo omnibus modis & falsa, & acris, & aromata, & vinum album, atque diuretica eidem interdiximus; iulebo sequenti statim exhibito: $\mathfrak{℞}$ syr. viol. $\mathfrak{z}j$ β . aqua myb. satini $\mathfrak{z}ij$. aqua portulacæ $\mathfrak{z}j$. misce. & quinque diebus repetatur. etiam hoc, cum ardor urinae magis augetur: $\mathfrak{℞}$ syr. de portulaca, de pap. de acetos. curi ana $\mathfrak{z}j$ aq. &

AAa

nymphæe malua, end. ana ℥ij. *misce, pro duabus vi-*
cibus. Purgauibilem hoc modo: ℥. *cassia recens*
tracta, mannatisolecti ana ℥ss. *syr. ex infus. ros. pal-*
lid. cum rhab. ℥j. *aqua acetosa, cichor. end. ana* ℥j. *mi-*
isce. In hoc affectu præstat uti medicamentis mi-
 nime fortibus, nec acribus, nec compositis; quo-
 niam maiorem acrimoniam inducunt: sed leni-
 bus & simplicibus utendum. Vacuato corpore,
 bilem reuellere studuimus leni frictione capitis,
 brachiorum & scapularum, ne ad renes deflueret.
 Etiam vomitu, sed leuiori, cum ad vomitum ap-
 pus videretur, *ex aqua tepida cum syr. viol. & oleo*
amygd. dulc. Quod si etiam frictione subsequatur
 sudor, confert, cum ad cutem humoris biliosi fiat
 diuersio. Operam dedimus, ut alius quotidie sol-
 ueretur. Vbi enim durior fiat, præstat his semel
 in hebdomada hoc enemate aluum emolliri, di-
 uertendo quoque materiam biliosam ad intesti-
 ma: ℥. *rad. alibæ, cunct. foliis malua, viol. ana m. j.*
prun. num. xij. *cōquantur in aqua ad tertias, huius*
accipe ℥ss. *j. cassia recens extracta* ℥j. *olei viol.* ℥ij.
iniiciatur sine sale ante pastum. Si enema admittere
 nolunt, in simili casu danda ℥j. *cassia recens ex-*
tracta, baccar. oxyacantæ num. iij. *adiecto zaccb.*
fiat bolus. Etenim renes calidos habebat, ac hepar,
 quæ urinam ad calidum alterant: epithema hoc
 vel sequens ad mouere iussi: ℥. *aqua end.* ℥viij. *a-*
qua acetosa, ros. nymphæe ana ℥j. *santal. albi & rubri,*
& corall. rub. & albi ana ℥j. *spicanardi* ℥j. *aceti* ℥j.
fiat epithema; hepatis tepide mane & vespere an-
 te pastum adhibendum. Etiam hepate inuncto
cum ung. ros. & santalino. Epithemata quæ hepa-
 ti aut cordi refrigerandi gratia adhibentur, tepide
 tamen ad moueri debent, & refrigerata auferan-
 tur, & rursus tepida ad moueantur. Verum ne-
 que hæc, neque vnguenta refrigerantia, septum
 transuersum attingant, ne difficilis respiratio sub-
 sequatur. Lumbos inunxi & renes *ung. ros. & in-*
frigidante. Iussi quoque ut vteretur *triasant.* &
diatr. frig. cum confer. nymphæe viol. acetosa ad est
syr. nymphæe, pap. & viol. instar conditi; singulis die-
 bus capiendū ad magnitudinem castanæ. Cete-
 rum cum bilis ab hepate cum urina iam solita sit
 defluere, & hepatis quoque quantumuis tempera-
 tum sit, bilem generet, nec prohiberi possit, quin
 adhuc cum urina aliquid bilis feratur, ideo medi-
 camentis glutinosis & muccaginosis quidam vim
 humorum ad renes, vesicam, meatusque urinæ
 transeuntium recte obundum; hoc vel simili
 medicamento vtentes: ℥. *seminis alibæ semin.*
mal. cotoneor. ana ℥j. *gummi trag.* ℥ij. *maceren-*
tur in decocto rad. malua, alibæ, seminis pap. albi &
vesicariæ; fiatque muccilago, de qua sumatur ℥j.
 j. ss. prædicti decocti mane per dies octo aut no-
 uem. Verum cum id bis sumisset, sapor eidem
 non placebat. Iussi pro calore mitigando, ut qua-
 rtor horis ante pastum sumeret ℥ij. *lactis ouilli*
acidi, a quo butyrola pars separata sit. Iub. bam
 quoque ut modo hæc tepidum per syringam in-
 funderetur modo aqua albuminis oui diu agita-
 ti cum lacte & oleo viol. commista. Et ut loco
 tubinde aquæ albuminis oui, in ardore magno

muccago psyllii substitueretur; & ut prudendum
 in vas lacte plenum aliquantisper teneret, ad ma-
 gnum ardorem mitigandum; & ut perinæum ac
 pectinem inungeret *oleos nymphæe.* Quod si ne-
 que illa iuuarent, ut pectinæ lineæ infunderentur in
 liquore sequenti calefacto, quæ expressæ super pe-
 ctinem & perinæum ponerentur: ℥. *aqua nenu-*
pharis ℥ij. *aqua viol. semperuini ana* ℥j. *succi sola-*
tri, semperuini ana ℥j. *lactis muliebri* ℥j. ss. *misce.*
 Lact muliebri, & interdum vaccinum iniiciatur
 per syringam in virgam, vel vesicam. Albumina
 ouorum conquassata fortiter ad inuicem, & amo-
 ta spuma aqua illa cum lacte muliebri portioni-
 bus æqualibus iniiciatur. Perseuerante ardore, la-
 uetur irrigeturque in balneo *ex decocto malua-*
viol. lactuca, & florum nymphæe; & detur *diapap.*
vel zaccbaram viol. vel diatrium sant. modo vnum
 modo alterum. Vfus quoque emulsionis *quatuor*
seminum frigidorum maiorum, per syringationem
 laudatur, aut per os; addendo *seminis pap. albi parū,*
 quo & nos commode in hoc iuvene, tum aliis
 multis, vti sumus.

S C H O L I A.

Si ardor sis ex humore aliquo acuto, acri, mor-
 daci ex bile vel salsa pituita, secundum aliquos
 duas exigit intentiones generales: quarum prima
 remouet materiam & causam ipsius ardoris, &
 malam qualitatem humorum, & membrorum he-
 patis & renum: secunda remouet ipsum ardorem
 & malam qualitatem. Alii vero quatuor scopis
 curationem perficiunt; primo, bilis purgatione
 per leniora chalogoga, ne ab acribus bilis acrimo-
 nia ea, aus salsa pituita augeatur: qua ratione et-
 iam vitanda acris alimenta & vretica omnia. Se-
 cundus scopus est, acris humoris diuersio ad alias
 partes, quam urinæ. Tertius est, alteratio hepa-
 tis & renum ad frigiditatem. Quartus, topicis re-
 mediis acrimoniam humoris acuti, & acris ob-
 tundere. Quod ad primum generalem scopum
 attinet, qui tres prædictos etiam sub se continet,
 materiam minorabimus, quæ ardorem infert,
 hoc vel simili medicamento: ℥. *sebesten. num. viij.*
iniubar. num. x. prun. num. vj florum viol. nenuph.
ana m. ss hordei mund. p. j bulliant inf. q. aqua ad me-
dietatem colentur. huius accipe ℥ij. *cassia* ℥j. *vel*
mannatis ℥j. ss. *misce. fiat potio:* adde *syr. viol.* ℥ss.
misce. valent & syr. in obs. dicti viol. cum aqua end.
portul. syr. de portul. & de pap. Deinde purgetur cū
 cassia vel manna. Vel ℥. *myrob. citr.* ℥j. *infunde in*
aqua decoct. pass. facta in aquis end. & acetosa per no-
ctem. Demum fiat expressio, adde *rhab. pulue-*
risati ℥j. ss. *syr. ros. laxat.* ℥j. *misce. fiat potio.* Ab-
 stinendum a scamoneatis. Diuersio fiet per fri-
 ctiones & vomitum, ut diximus in obseru. etiam
 clysteribus mollibus refrigerantibus, materiam
 per aluum deducuntibus. Alterantia hepar & re-
 nes, per epithemata, sacculos, vng. ut in obser. di-
 ximus. quæ & habes apud Fontanum & Ronde-
 letum, quæ tam renes, tam hepar refrigerant,
 etiam dando *confer. ros. nymphæe, florum ci-*
chor. cum semine acetosa, santal. adiectis troch. &
camphora in exigua quantitate. Non desunt,
 qui

Curatio ar-
 doris urina
 ex humore
 acri.

qui camphoram omnino respuunt; ideo in opiat-
 tis relinquenda. Secunda generalis intentio erat
 ad ipsum ardorem urinae, qui erat quartus scopus
 apud Rondeletium: perficitur cum iis, quæ tam
 intus, quam extra adhibentur: quale erat illud per
 os sumtum ex mucillaginibus. Alii ex succo cu-
 curbitæ, & succo portul. depurato, scilicet \mathfrak{z} iij.
 facta residua conficiunt syr. cum zaccharo. De
 liquoribus, qui iniiciuntur ex aqua albuminis cõ-
 cussi, lacte mulieb. & aliis, in duabus præcedenti-
 bus obser. & scholiis satis dictum est. Sed hic et-
 iam annotanda illa historia, quæ contigit olim
 in Bononiensi monasterio, ex ardore urinae a caus-
 sa primitiua, nempe veneno, quod etiam discipu-
 lus vidit in actu prædicto (ut habetur apud Leonel-
 lum Faentinum cap. 70. de ardore urinae) cum suis
 præceptoribus, scilicet cum magistro Ludouico
 de Leonibus, & magistro Leonello, & hoc in Mo-
 nasterio Sancti Saluatoris Bononiæ. Fratres enim
 comederant ranas in fine mensis Iulii, quæ semi-
 scuerant cum bufonibus, vnde magnus factus est
 ardor urinae. Magister Ludonicus dedit eis \mathfrak{z} j. cas-
 siæ dissolutæ in aqua maluæ q. s. M. vero Leonellus,
 dedit cassiam dissolutam in aqua sem. commun.
 frigid & aqua rutæ q. s. & c. Postea præscripsit ta-
 lem portionem ad urinam prouocandam, & renes
 mundificandos, & biberunt per tres dies. Exer-
 citio talis: \mathfrak{z} iij. aqua maluæ \mathfrak{z} x. iulbi viol. \mathfrak{z} iij. mi-
 sce. Illud sciendum, quod pauci euadant ab illa æ-
 gritudine, cum impressionem fecerit, ut præce-
 ptor referebat. Vltimum & satis efficax reme-
 dium est, bibere aquam balnei, thermarum. Et si
 hoc non proderit, nil auxilii reliquum erit. Ve-

Ex cantha-
 ridib. vel a-
 liis urinam
 valde pro-
 uocantib. si
 originem ha-
 beat, quo
 modo cure-
 tur.

rum si ardor urinae contingat ex cantharidibus,
 tunc lac præbendum est, tum alia, quæ diximus in
 præcedentibus, de iis, qui cantharides sumserunt.
 Solet enim ardor urinae frequenter fieri propter
 vsum acrium & prouocantium urinas, ut post can-
 tharides assumptas, vel propter empetri aut laueris
 vsum, nasturtii, & aliorum, quæ affatim urinam
 prouocant, ut est potus nimis ceruiciæ recentis,
 quæ nimis detegendo partes, quæ sunt veluti
 mucro obductæ, ardorem urinae prouocant. Illa
 sola assumptione albuminis oui, aut cibi viscosi, ut
 decocti pedum veruecis, aut aliorum, facile cura-
 tur, Rondeletii auctoritate.

OBSERVATIO XXXVII.

De nauta, qui cum pilulas præcipitatas accepisset, go-
 norrhœa laborans, & mingendi difficultate, in ar-
 dorem urinae duplo maiorem incidit.

ANNO 1552. Martinus Petrus, nauta Alcmaria-
 nus, vir robustus, annos circiter xxxij. na-
 tus, cum difficultate mingendi longo tempore
 vna cum gonorrhœa pateretur, ac urinae ardorem
 experiretur, tonsorem adiit: qui cum eidem pi-
 lulam vnam atque alteram ex præcipitato d. dif-
 fer, ardor urinae non incrementum cum reliquis accidē-
 tibus, ut in primis quoque enormem incide-
 rit, tum ventris fluxum, animi deliquio suble-
 quente, ut pro mortuo haberetur. Ad quem ac-
 citus, aqua in faciem aspersa ab animi deliquio
 excitatus fuit. Tunc propter urinae ardorem ex-

hibui decoctum hordei mundati, seminis maluæ,
 cotoneorum, & seminis pap. cum syr. viol. illud ad
 tempus cū bibisset, ardor urinae plurimū mitiga-
 tus est. Post aliquot dies viribus utcunque recrea-
 tis, exhibui \mathfrak{z} x. cassiæ seminis dauci pul. & succi gly-
 cyrrh \mathfrak{z} j. trochis. alkach gran. vj. cum zacch. candi
 fiat bolus. Ter ex eo aluum satis copiose depo-
 suit. Cum autem lotium deinde valde crassum es-
 set, & mucilaginosum: ne materia corrupta ipsius
 seminis ex gonorrhœa intus maneret ac putresce-
 ret: mandavi, ut sequenti decocto vteretur: \mathfrak{z} j.
 glycyrr. ras. \mathfrak{z} j. rad. althææ, maluæ ana \mathfrak{z} ss. rad. fœni-
 culi \mathfrak{z} j. foliorum maluæ, viol. capill. Ven. fumarie fœ-
 niculi, scolopend. ana m. j. flor. cord. p. j. seminis anethi
 \mathfrak{z} j. ss. sem. quatuor frigidorum maiorum sem. pap. albi
 ana \mathfrak{z} ij. seminis cumini præpar. ad exsicc. \mathfrak{z} ss. granor.
 alkachengi num. septem, vuar. pass. cum arill. p. j. cicer.
 rub. \mathfrak{z} j. coquantur in aqua communi pro \mathfrak{z} j. ss. colat.
 adde syr. viol. de fumarie ana \mathfrak{z} j. mellis ros. colati
 (propter lotium crassum mucilag.) \mathfrak{z} ss. misce. ca-
 piebat bis in die ex hoc decocto. Verum, ut mate-
 ria venenosa ex gonorrhœa expurgaretur decoct.
 adieci folia senæ, myrobalanos, polypodium & e-
 pithymum, & pruna damasc. ex quo decocto
 duas quotidie habebat sedes, senæ nempe \mathfrak{z} j. po-
 lypod \mathfrak{z} j. epithymi \mathfrak{z} j. & myrobal. omnium ana \mathfrak{z} ss.
 Dedi quoque serum lactis cum trochis. alkachen-
 gi & albumen oui agitatum dilutum cum aqua so-
 latræ, & iniici curavi, modo lac recens mulctum:
 quibus præsidis curatus fuit, ut aliis remediis o-
 pus non haberemus.

SCHOLIA.

Sicuti in gonorrhœa fit aliquando ardor urinae;
 ita etiam ob seminis potissimum, aut illius se-
 rosæ substantiæ, quæ coitum præcedere solet, cor-
 ruptionem, vel propter infectæ mulieris vitium,
 quod contactu contrahitur, idque potissimum,
 cum quis semen attractum retinet, & iam com-
 motum. Quod si ab ista causa proveniat, aliqui
 iubent statim missionem sanguinis fieri e poplite,
 quæ citissime curat. In nostro nauta, cum iam diu
 durasset, id non fecimus. Quidam cõmendant y-
 sum repellentium, modo in principio adhibean-
 tur. Inuus autem iniiciunt, quæ detergant cum
 quadam refrigeratione, cum decocti hordei & syr.
 viol. & ex aquis destillatis, cum syr. ros. laxat. \mathfrak{z} a-
 qua plantag. solatræ ana \mathfrak{z} iij. syr. ros. laxat. \mathfrak{z} ss. mi-
 sce, fiat injectio, quæ detergit semen illud corru-
 ptum, & id quod a parte inflammata resudat. Se-
 rum lactis id etiam præstat, nisi quod minus refri-
 gerat. Conuenit in processu, ad deterfionem ad-
 iect. zacch. ros. vel syr. ex ros. siccis. Si dolor adsit, vel
 magna inflammatio, albumen oui agitatum, dilu-
 tum aqua plantag. vel solatræ iniiciendum, aut omne
 lac. Cum autem multa sanies reicitur, tunc ad-
 iungenda sunt detergentia magis, deinde venien-
 dum ad ea, quæ detergant & exsiccant; & eodem
 modo curantur, quo vlcera vesicæ. Inter alia, a-
 qua destillationis corticis malorum granat. & aran-
 ciorum multum valet, aqua peculi ros. myrull. & po-
 tissimum cum iubar. Coquantur in huiusmodi a-
 quis. Post sanguinis missionem vtatur cassia nomi-

ter extracta, cū sem. berberis, vel cathol. vel diasebesten. Dantur syr. lenientes, leuiter detergentes, & refrigerantes, *ut syr. viol. cum decoct. hordei assum-tus*; lenit ventrem, *syr. nenuph.* refrigerat, *syr. ros. laxatiuus* laxat & deterget. Optimum est illis ter-tio vel quarto die dare talia medicamenta ad de-riuationem: poma cocta, pruna & sebesten va-lent ad ventrem mouendum, ad humorum fer-uorem exstinguendum. *Muccilago sem. psyllii ex-tracta cum aqua viol. vel cum decoct. prun. sebesten,* pauco *zaccharo & glycyrr.* ventrem laxat, & ardo-rem minuit. Extrinsecus, fots vel vnguenta ma-gis penetrant, quam emplastra. Sed fots quia calidi apponuntur, periculosiores sunt: satius erit vng. ex refriger. & resiccantibus paratis vti. Vt, *℞. ol. ros. vel myrsi, vel cydonior. ℥ij. aceti ros. ℥j. vngan-tur* renes, & locus perinæ & totius pubis; vel ad-dita cera, fiat linimentum, vel ex metallicis succis herbar. & aceto fiat ad formam nutriti, vt *℞. li-tbarg. ℥ss. cerusa lota, tertia ana ℥ij. aceti & succi plantag. q. s. fiat ad formam nutriti*: quibus si adda-tur caphura, citius penetrabit, & erit efficacius. Iniiciantur clysteres refrigerantes, vt in mictu sang. superius dictum est, ex succis & decoctis herbar. refrigerantium & constringentium. Inii-cienda autem parua quantitas, ne statim prorite-tur ad expulsionem, & non nisi post excremento-rum reiectionem. Quod si alius esset astricta, ex *decoct. mal. viol. tantum, prun. & quat. sem. frigid. maior.* paranda esset decoctio, & in ℞. j. colatura dissoluenda *cassia, vel mel. viol. vel zacch. rub. vel ca-thol. cum succo cicla, olei viol. pul.* descript. a Ron-deletio cap. de vesicæ vlcere, ad exlicationem conuenit in fine, *cum aqua caudæ equæ & plan-tag. vel cum albumine oui fortiter agitato.*

OBSERVATIO XXXVIII.

De ardore vrinae una cum dysuria, vrina salsa acri quasi purulenta, & mucilaginosa.

E Meretiana Kerckweruia, matrona nobilis, quā saepe feliciter a multis morbis curauimus; pro-gressa ad annum 27. his symptomatis, nempe ar-dore vrinae vehementiore, dysuria, vrina mucil-laginosa, salsa, acri, quasi purulenta corrosionem quandam inferente, afficiebatur. Vnde in Brie-lam vi bem. in qua habitabat, ad eam accitus sum. Alias hæc ipsa nephritide laborauerat, quod & a-renulæ rubæ in fundo matulæ ostendebant, & paulo antequam hæc symptomata eam apprehē-derunt, dolor quoque renum præcesserat. Sed & nunc, præter iam dicta symptomata, mensium aderat profluium continuum, dolor insignis circa pubem, ad inguina tendens, & in muliebri-bus quasi corrosio, ex vrina salsa subinde etiam retenta, aut agre exeunte, mox rursus copiose effluente & stillante, non sine stranguria. Pulsus huic erat paruus, debilis satis, tam ob mensium fluorem quam dolorem, & ob vehementissimum vrinae ardorem. Quamuis singulis 14. diebus, vel tribus septimanis ad minus, ante quoq; men-ses largiter fluxerant, & in fine menstruationis subinde quid carneæ molæ instar deiici bat: tunc

demum cessabant menses. Sed hæc ipsa, vti nar-rabat, cum ante mensē equo duriter incedente vna cum marito in villam equitasset, mictione tamen sanguinolenta post equitatum non subse-quuta, mox accidentia supradicta & ardorem v-rinae incurrerat, quem tamen antea nunquam fuerat passa. Vel ob arenulas vel ob equitatum humores aciores redditi sunt, & ardor atque a-lia iam dicta symptomata eam ipsam vrgebant. His malis ita conflictata, per octo dies, nempe an-no 1564. mense Iulio, me vocauit. Cui cremo-rem hordei & amygd. ac hordeatum statim præ-scripsi ad humores obtundendos, dolorem mi-tigandum. Quale etiam & hoc erat quod sequi-tur: *℞. horde. mundati, viol. malua cum toto ana m. j. glycyrr. rasa ℥vj. coquantur ad hordei crepaturam pro ℥viij. addendo sem. 4. frig. maior. mund. ana ℥j. s. j. sem. pap. albi ℥j. bisque contusis, & facta emul-sione cum decocto iam dicto, insuper addendo syr. viol. pap. nenuphar. ana ℥ss. misce pro duabus do-sibus, egregie contulit.* Interim illam nutrebam lacte ouillo, cum febrem non haberet. Pro potu ptisana utebatur ex decoctione hordei mundati & glycyrrhizæ. In fine concedebam vinum Rhe-nanum, aqua hordei dilutum. Sub noctem etiam ad somnum conciliandum, & dolorem conso-piendum, hoc sequenti hordeato utebatur: *℞. hordei mundati m. s. amygd. dul. depillat. ℥ij. sem. 4. frig. maior. mund. ana ℥j. sem. pap. albi ℥ss. fiat hor-deatum.* Demum menstrua purgatione per se ces-sante, ad renes expurgandos & vias vrinales, acce-pit *℥j. cassia recens extracta in balo. zacch. candi dicto adiecto*: & sexies aluum excreuit. Rursus decocto supradicta vtens, renesque inungens hoc vng. *℞. vng. ros. Mes. absq; opio, axungia porcine olei ros. ana ℥ss. misce lauatur cum aqua ros. addendo cera alba parum. fiat vng. molle.* Atque his remediis egregie fuit curata, vt aliis remediis opus non fuerit. Post trestamē dies incidit in fluxum ventris ac tenes-mum; & excreuit mucilaginosa, & subinde cru-enta ac purulenta: dixisses vlcerationem. Adde. Rursus reuocatus sum, cum & simul ardorem v-rinae pateretur. Post lotium medicamentum, ex *decoct. hordei non ex corticaci, adiecto syr. ex infus. ros. rub.* rursus exhibui emulforium *sem. 4. frig. maio-rum, cum hordei cremore, pauco adiecto melle ros. & emuls. seminis pap. albi.* Et continuo vtens lacte o-uillo, modo amygdulato & hordeato: ita vt abster-sa acri materia fluxus ille cessauerit, remanente ad-huc leui ardore vrinae & excoriatione in mulieri-bus. Ea autem lauabat *decocto malua viol.* dein-de lacte recenter multo, & solo oleo: mox o-leo violaceo. Quibus magnum iuuamen sentie-bat, vt referebat. Mox pro ardore vrinae, stran-guria, dysuria, bis sequenti decocto utebatur in-die: *℞. malua, cum rad. m. j. liquir. ras. ℥. ij. semi-nis malua cotoneor. ana ℥ss. seminum quatuor f. igit-dorū & aiorum ana ℥j. sem. portulacæ ℥ss. granor. al-kacheng. num. iij. sem. pap. albi, ℥j. s. s. bulliant leuiter in aqua commun. pro ℥ix. syr. iuniperi ℥j. misce pro ℞j. Postea capiendō saepe cochlearia iij. eiusdem decocti, cum syr. ex infus. ros. commun. addendo*
semper

semper ꝯ ꝯ. trochis. alkachengi sine opio; cumque id sexies accepisset, denuo ab ardore vrine & reliquis symptomatis liberata recte deinde valuit.

S C H O L I A.

Viscosa egregie conferunt ad ardorem vrinæ: qualis est hæc mucilago; ꝯ. psyllii ꝯ. vj. semin. coron. ꝯ. v. semin. quatuor frigidorum maiorum ana ꝯ. j. sem. pap. ꝯ. j. ꝯ. conquassentur, & fiat mucilago cum aqua hordei multæ decoctionis. Huius pars datur cum aqua hordei per os, & altera cū syringa iniiciatur. Remouebit enim & remittet caliditatem in membro derelictam. Trochisci quoque infra scripti mirum in modum commendantur pro alteratione, refrigeratione, & renis ac viarum vrinalium mundificatione, cum & vesicam ab humoribus acutis liberent; ꝯ. sem. quatuor frigidorum maiorum mund. ana ꝯ. j. ꝯ. gummi arab. tragacanthi ana ꝯ. j. ꝯ. sem. portul. sem. pap. albi ana ꝯ. iij. ꝯ. santali rub. ꝯ. j. ꝯ. hyoscyami albi ꝯ. j. fiant trochis. cum mucilago psyllii, datur ꝯ. j. mane & ante coenam, vel dum lectum intret ager, cum aqua hordei.

OBSERVATIO XXXIX.

De ardore vrine, cum vesicæ ulcere.

Senex quidam vlcus in vesica habuerat longo tempore, cum ardore vrinæ: qui quamuis difficulter curari posset, vt ex dictis patet, tamen, vt ardorem quouis modo mitigaremus, habita etiam ratione vlceris, cuius curatio consistit in vlcere repurgando, & demum in consolidando, consulimus, vt modo aquam hordei cum zaccharo optimo per os caperet, modo etiam per virgam in vesicam iniiceret, modo lactis serum cum zacch. albo etiam tepide iniiciendo cum syringa: aliquando per os etiam sumendo cum aqua hordei trochiscos supradictos. Postea pro aliquali etiam vlceris mundificatione iniicere iussimus lac vaccinum, idque tepide. Mitigat enim & mundificatione serositatis (vt loquuntur practici) & consolidat ratione caseitatis. Iubebam quoque vt per os sumeret infra scriptam mixturam: ꝯ. loch. de papau. diatr. frig. ana ꝯ. j. ꝯ. syr. viol. ꝯ. j. trochis. alkachengi ꝯ. j. misc. Et vt magis consolidaret, loco trochil. potest addere quis ꝯ. j. boli arm. veri.

S C H O L I A.

Curatio ar-
dor is vrine
ab ulcere.
Vratio ardoris vrinæ ab vlcere, siue vlcus existat in vesica, siue in eius collo, aut in pene, vel in eius meatu vrinario, a quouis causa illud originē habeat, duplicem intentionem curandi exigit; scilicet mundificationem atque abstersionem, secundo consolidationem. Quæ vero vlcus mundificant & detergunt, per iniectionem præcipue id diximus, per iniectionem (inquam) aqua hordei, capiend. ꝯ. viij. & zacch. ꝯ. j. vel aqua lactis ꝯ. vj. zacch. ꝯ. j. tepide cum syringa iniiciatur. Consolidatur vero lacte vaccino iniecto, vel hoc paulo fortiore: ꝯ. albumina ouor. num. 4. conquassentur, vt sæpe dictum est, adde boli arm. sang. draconis ana ꝯ. iij. mucilago psyllii, lactis mulieris ana ꝯ. iij. pulueriz. anda pulueriz. entur. misc. & per syringam iniiciatur. Sed & illud ad ardorem vrinæ expertum habetur, etiam in dolore colis: ꝯ. lactis seminum quatuor frigidorum maior. extracti cum

aqua solatri ꝯ. vj. mucilago psyllii ꝯ. iij. olei nenupharis ꝯ. j. Alii addunt croci, opii, camphora, succi hyoscyami ana gran. iij. vel paulo minus. Alii terunt semen hyoscyami, & papa. albi cum aqua ros. addendo albumen oui: & iniiciunt, aut lac muliebre, addito grano uno aut altero opii. Et cum indicatio consolidandi est, inungunt pectinem & perinæum hoc sequentilimento: ꝯ. ros. rub. cort. granat. balaust. sumach ana ꝯ. j. ꝯ. thuris ꝯ. j. boli armeni, sanguinis draconis ana ꝯ. j. pulueriz. entur pulueriz. anda omnia subtiliter, & reducuntur cum oui albumine ad formam linimenti. Vbi autem ob puris e renibus, aut aliunde descendens acrimonia, ardor vrinæ oriatur, præsens remedium erit ante vrinæ emissionem (quo & Rondeletius utitur) iniicere solum albumen oui fortiter agitatum: post emissionem vero lac, & vt cunque obtundere sensum partis in vehementissimo dolore. Nam, vt ex dissectione nouimus, sentiunt dolorem citra aliquem affectum in pene a salugine & puris acrimonia. Sed quia, quæ sensum obtundunt, frigiditate maxima meatum cōstringunt, optimum erit vel in decoctione relaxante, vel in oleo aliquo illa dissolvere: ne propter constrictionem pus retineatur, vel maiorem moram faciat in transitu, ex quo sequitur dolor vehementior. Eligantur relaxantia, quæ succum lētum habent, vt abducant viam, vt minus vrina vel pus partem sensilem tangat: vt, ꝯ. rad. bismal. aut consolid. maioris ꝯ. j. cortis. mandrag. ꝯ. j. misc. & fiat decoctio. Capita pap. in eadem decoct. possunt decoqui: & iniiciantur. Alii addunt, vt & ipse, si opus est, aliquid opii. Eadem in oleo amygd. dul. vel viol. dissolui possunt, & iniici. Vel oleum extractum ex semine pap. vel ol. mandrag. misceantur lacti vel decoctioni supradictæ, vel mucilago seminis lini, vel coron. vel psyllii. Sed dilui debent mucilagines multa aqua viol. vel plantaginis, quo facilius infundi possint. Id in vehementissimo dolore faciendum est, & magna necessitate. Idem laudat puluerem requiei, secundum suam castigationem, in dolore vehementissimo.

Finis libri vigesimi quinti.

LIBER VIGESIMVSSEXTVS,
DE PENIS AC VIRGÆ

VITIIS.

OBSERVATIO I.

De abscessu penis in perineo in fistulam abeunte, & in excrecentiam carnis, cum stillicidio, & dysuria, & ulcererenum.



Odefridus Isbrandi, Zythepsa Delphensis, pro cuius ædibus, ac in cupis, cornu ceruinum pro symbolo erat, cum ultra semiannum deplorate decubisset ex renum vlceratione, multorum Medicorum opera vtens, primo Paracelsici cuiusdam, sanitatem pollicentis; deinde Cornelii Eritii, collegæ nostri: postea per suasu quorundā, in perditissimi illius Iudæi

AAa 3

& impostoris manus incidit, qui Lugduni Bata-
uorum ob facinora publice, tum Mechliniæ anno
1551. flagellatus est. Hic multis calidis medicamē-
tis adeo humorum acrium fluxionem irritauit, vt
tandem abscessus factus sit in perinæo, in parte il-
la, quæ est intra anum & testiculos, atque is disru-
ptus, in fistulam abiit, etiam carne incrementa, vt
stillando vrina per fistulam exiens, dolorem in-
signem & acrimoniam induceret. Ob vlcera renū
confirmata, per Iudæum Empiricum eo deductus
fuit, vt ab omnibus Medicis tandem pro deplora-
to haberetur: ita vt neque ex lecto surgere, aut se-
se erigere posset, ob continuos dolores renum.
Pus etiam vrinæ commixtum a renibus vlceratis
defluens ad locum fistulæ, acrem vrinam, & ingē-
tem acrimoniam inferebat; ita vt ex dolore præ-
cedente, tum febre ac vigiliis ad tabem quasi, illis
diureticis medicamentis per Iudæum descriptis,
peruenerit; & corpus tabidum ac ex sanguine euase-
rit, cute rugosa existente, ossibus quasi solum re-
lictis. Cum iam ad extremum malum deuenisset,
omissis Empiricis omnibus, opem nostram im-
plorauit; tantum a me id flagitans, vt saltem a do-
lore subleuaretur, vel si perpetuo in lecto illi de-
cumbendum esset; atque etiam si per fistulam cō-
tinuo vrina fluere deberet; dummodo posset a
dolore lumborum liberari. Ceterum, Dei omni-
potentis auxilio, diligentia magna adhibita, homi-
nem non solum a dolore liberaui, sed in integrum
restitui. Ad hunc accitus fui 18. Aprilis, anno 1558.
quo anno Delphos quoque accesseram. Quod ad
cibum attinet, ad deterfionem, & dolorem sedan-
dum utebatur cremore hordei cum saccharo: modo
amygdalato bordeato, tum aliis, quæ de vlceribus re-
nū scripsimus. Verum cum hic opus esset maiori
aliqua deterfione, nam materiam crassam fœtidā
per vrinam deiciebat, cum dolore renum, 18. A-
prilis hæc præscripsimus: ℞. rad. liquir. rase, rad.
pentaphyllonis, cichorii, rad. ononis seu aristæ bonis,
ana ℥ ss. betonica viridis, agrimonie, folior. penta-
phylli (etiam propter fistulam & cylum) plan-
tag. cum rad. ana m. j. malua cum rad. parietar. sco-
lopend. ceterach, capill. ven. ana m. ss. flor. borag. viol.
nenuphar. ana p. j. sem. anisi, fœniculi, melonum, cu-
cubite, cucumeris, althæa ana ℥ j. sem. pap. alb. ℥ ss.
prun. damas. num. viij. limonem vnum integrum in-
cissum (vide distillationem pro syr. Mag. serali huic
decoctioni, haud ab similem apud Montanum
consultatione 82. de deiectione materiæ crassæ & fœ-
tidæ per vrinam, cum dolore renum) granorum
alkekengi ℥ j. fiat omnium secundum ordinem de-
coctio in aqua malua, althæa, ana lb. j. aqua fumarie
℥ iij. aceti vini albi ℥ iij. aqua raphani ℥ j. bulliant
ad consumptionem tertiæ partis: colatura adde syr. de
cichor. Nicoli, mellis ros. colati, oxymel. simplicis, syr.
absynth. maioris descript. Mell. syr. de fumo terra, ana
℥ ss. aromat. cum ℥ iij. trochis. alkekengi sine opio. al-
bumine oui depuretur & fiat potio clara. 21. Aprilis
secundo descriptus est hic potus: ℞. cassia recens
extracta ℥ j. dissolue cum ℥ iij. potionis suprascriptæ.
Deinde rursus accepit sequens apozoma: ℞. gly-
cyrr. rase ℥ j. fumarie, agrimonie, betonica, malua,

viol. capill. ven. ceterach. pentaphyllonis ana m. j. flo-
rum buglosse borag. nenupharis, ana p. j. seminis ane-
thi, cumini, pap. albi, seminum quatuor frigidorum
maiorum, ana ℥ j. granorum alkekengi ℥ j. ss. cice-
ram rub. ℥ j. fiat decoct. in aqua fumarie, malua, al-
thæa, ana lb. j. ad consumptionem tertiæ partis: cole-
tur & colatura adde syr. iuiubini, viol. oxymel. sim-
plicis ana ℥ ss. misc. pro apozemate. Tercio: ℞. The-
rebinthina Veneta lota in aqua plantaginis, pulue-
ris liquir. ana ℥ j. ss. trochis. alkekengi, succi liquir.
mumia, ana ℥ j. fiant pilule instar cicerum. Capie-
bat manetres, & post meridiem hora quarta su-
per bibendo ℥ iij. vel v. decoctionis suprascriptæ.
Quarto: ℞. decoct. hordei mundati lb. j. ss. qua vi-
num Rhenanum (quo utebatur ob vitium imbe-
cillitatem) diluebat, pro maiori abstersione vlceris,
& virium roboratione. Quinto, cum diceret se ha-
bere tormina in ventre, & ventositates, libenter
clysterem iniecit, sed cum enemata abhorre-
ret, cum sapius per Iudæum nescio, quæ infecta
essent, a quib. referret, se temper male habuisse;
confectionem hæc in tabulis præscripsi: ℞. Cu-
mini præparati & subtilissime puluerisati, ammos,
trochis. alkekengi, specierum Diarod. abb. specierum
diatr. frigida. (ob hæc dicam, quæ ammetuebam) ana
℥ iij. dissolue in aqua althæa, adiecto saccharo optimo
q. s. fiat confectione in tabulis. Bis reiterata fuit. Sex-
to scilicet 27. Aprilis: ℞. cassia cum manna ℥ ss.
cassia recens ex canis tracta, confectionis hamech,
ana ℥ j. ss. diacatholici ℥ j. trochis. alkekengi, semi-
nis anisi puluerisati ana ℥ ss. dissolue in ℥ iij. aqua al-
thæa, fiat potio. Dum sit in diuculo: optime excre-
uit, magno cum iuuamine. Septimo, nempe 28.
Aprilis: ℞. hordei non ex corticati, pentaphyllonis
cum rad. ana m. j. granor. alkekengi num. v. fiat deco-
ctio in aqua communi cuius accipe ℥ iij. syr. myrtini
℥ j. mellis ros. colati ℥ ss. trochis. alkekengi puluerisati
℥ ss. misc. detur unica vice. Deinde adhuc bis ce-
pit. Octauo, nempe ultimo die Aprilis: ℞. rad. li-
quir. althæa malua pentaphyll. ononid. cichorea rad.
consolida maioris ana ℥ ss. fumarie, absynthi Roma-
ni foliorum pentaphyll. ros. rub. plantag. cum rad. cau-
da equina cum rad. capill. Veneris, scolopend. agri-
monia, ana m. ss. florum nenuph. borag. ana p. j. absin-
thi communis m. ss. seminis pap. albi ℥ j. ss. seminis
quatuor frigid. maior. seminis althæa coron. ana ℥ ss.
seminis fœnug. ane. th. cumini præpar. portulaca ana
℥ ss. hordei non ex corticati m. ss. granorum alkeken-
gi num. ix. cicer. rub. ℥ iij. fiat decoct. in sero lactis ad
lb. j. ss. stent per noctem. supra herbas mane fiat cola-
tura: cui adde mellis ros. colati syr. myrth. ana ℥ j. syr.
de liquir. ex ros. siccis ana ℥ ss. syr. absynthii commu-
nis, viol. ana ℥ ss. trochis. alkekengi ℥ iij. trochis. sub-
tiliter puluerisetur misc. fiat apozema: capiat bis in
die ℥ v. vel vj. decoctio ob rad. ononid. & pentaphyl-
li, habebat colorem rubeum egregium. certisq.
rubiuf. ulæ instar. Nono, finita decoctione, hoc
modo denuo illum purgaui: ℞. plantag. cum
rad. malua pentaphylli. parietaria fumarie, ana m. j.
seminis anisi ℥ iij. prun. damas. num. ix. Uuar. pass. ab-
ar. ll. repurg. hordei mund. ana ℥ j. follicul. seræ ℥ j.
coquantur in cernisia communi pro auctus cyathis
colat.

6 colat. adde cassie recentis tractæ ʒij. misce, pro duabus dosibus. Habebat ex eo decocto semper sedes copiosas muccosas, cum maximo iuuamento. Singulis quatuordecim diebus, prout nobis utile videbatur, sumebat cyathum vnum illius decocti: quod valde commendabat. Decimo, scilicet die 2. Maii: ʒ. mellis rosacei colati, syr. ex ros. siccis, syr. de fumo terre ana ʒ. ʒ. aqua malua, fumarie, nenupharis ana ʒ. j. misce. Hic syrupus læpis fuit reiteratus. Per hæc decocta superscripta fistula fuit optime mundata, pure bene detergo: ita, vt Guilielmus de Dalen lithotomus, qui vlcus illud externum, inter ambos testiculos in perinæa in fistulam productum, tractabat, tandem cum minori negotio curauerit, quanquam deinde post mensem ibidem noua materia collecta fuit; vt denuo difficulter mingeret, ob carnem innatam intus in meatu vrinario circa fistulam, vt vrina subinde retineretur, etiam inflatione subsequuta: quæ cessauit foris florum chamomill. meliloti florum rosarum rub. & corticum quercus arboris, & materia ibidem collecta per resolutionem euanescere. Præcedentibus remediis, dolore, qui erat in lumbis & renibus, paulatim mitigato, etiam vlceris renum optime detergo; ad maiorem consolidationem & mitigationem, lac vaccinum tepide dedimus. Verum cum rursus conquereretur de ventositate; vnde decimo, nempe 4. Maii hæc præscripsimus: ʒ. cumini preparati, semin. ammi ana ʒ. j. trochisci alkekengi sine opio ʒ. j. ʒ. specierum diarod. abbat. spec. diatrag. frig. ana ʒ. ʒ. pulueris cinnamom. electi ʒ. ʒ. omnib. puluerisatis & dissolutis in aqua alibæ, adiecto ʒ. saccharo albisimo q. s. fiat confectio in tabulis. Duodecimo potiones fuerunt reiteratæ: etiam materia purulenta in lotio diminuebatur; ita vt iam ex lecto se mouere posset, quod antea non poterat: & similiter baculo innixus per cubiculum incedebat. Lumbi quoque inungebantur vnguento ros. & ad maiorem roborationem renum, & ad febrem hecticam, quæ latebat, & ad mundificationem & deterfionem, tum consolidationem vlceris renum, conuenienti semper descripta dec. ta, de qua libro præcedente satis diximus. 14. Maii hæc inscripta parata fuere: ʒ. conserua rosar. florum nenupharis ana ʒ. ʒ. conserua florum buglossæ, florum herb. paralytis, conserua summitatum absinthii Romani, conserua medullæ limonis, succi citri, corticum citri conditi ana ʒ. iij. ʒ. sacchari violacei ʒ. sacchari rosarum, specierum diatrag. frig. ana ʒ. j. ʒ. trochiscorum alkekengi ʒ. iij. seminum quatuor frigidorum maiorum mundator. ana ʒ. j. semin. papau. albi ʒ. ʒ. pulueris cinnamom. electi, succi liquir. ana ʒ. ʒ. cum syrupo myrbino, de liquir. ana q. s. fiat conditum secundum artem. Decimo tertio, videlicet 17. Maii: ʒ. decoct. hordei non excorticati ʒ. j. mellis rosacei colati syr. de cichor. N. col. syr. nenuphar. syr. ex infus. ros. ana ʒ. ʒ. misce. Decimo quarto: ʒ. conserua rosarum antiqu. conserua florum nenupharis, buglossæ. ana ʒ. ʒ. conserua summitat. absinth. conserua florum herb. paralytis, corticum citri conditi, ʒ. sacchari viola. ana ʒ. j. trochisci alkekengi sine opio ʒ. iij. seminum quatuor frig. dor.

maior. mundat. ana ʒ. ʒ. specier. diatr. frig. ʒ. j. pul. cinnamom. electi succi liquir. ana ʒ. j. excipiantur cum melleros. syr. myrb. & liquir. ana q. s. fiat conditum. 8 Decimo quinto, nempe 20. Maii, pro renum calore: ʒ. cerati infigid. Galen. ʒ. j. inungantur renes. Cum ab apostemate intra testiculos & anum in perinæa, vbi fistula erat, per chirurgum curatus esset, post duas tresve septimanas, sensit in eodem loco quandam duritiem. Pro qua sequens vnguentum præscriptum est; decimo sexto, nempe 21. Maii: ʒ. olei chamomill. lilior. viol. ana ʒ. iij. olei rosacei, ammoniaci in aceto dissoluti, pinguedinis gallin. ana ʒ. j. cer. alb. par. ʒ. j. fiat vnguentum molle. Decimo septimo, scilicet die 24. Maii: ʒ. conserua ros. viol. nenupharis, absinthii Romani ana ʒ. j. corticum citri conditi ʒ. j. ʒ. trochisci alkekengi sine opio ʒ. j. specierum diatr. frig. trochisci de carabe (ad maiorem sigillationem vlceris renum) trochisci de terra sigillata ana ʒ. j. pul. cinnamom. selecti ʒ. j. ʒ. sacchar. viol. ʒ. ʒ. cum syr. myrb. iunibino, de liquir. fiat conditum sumat cum decoct. ultimo præscripta. Decimo octauo, nempe 6. die Iunii: ʒ. conserua rosarum nenupharis, corticum citri conditi ana ʒ. j. trochisci alkekengi sine opio ʒ. j. specier. diarod. abb. specier. diatr. frig. trochisci de terra sigill. ʒ. sacch. viol. ana ʒ. ʒ. cum syr. myrb. ex infus. ros. ana q. s. fiat condit. 19. nempe 12. Iulii ʒ. f. m. pentaph. capill. Pen. agrim. plantag. cum rad. hordei non excorticati. ana m. ʒ. rad. liquir. ʒ. iij. gran. alk. k. n. num. v. fiat omnium decoct. in aqua commo. pro ʒ. j. co. et colatura adde mell. ros. colat. syr. ex infus. ros. ana ʒ. j. ʒ. misce pro quatuor dosibus. Fuit reiteratum cum conditum. Vigesimo, pro abstersione & consolidatione, tali potu quotidie utebatur: ʒ. plantaginis cum radic. pentaphyl. cum radice fumar. agrimon. hordei non excorticati, florum rosar. rub. ana m. j. rad. liquir. ʒ. ʒ. coquantur in cerussa communi: & hac colatura utatur bis terne in die. Et istis sæpe reiteratis, optimam victus rationem obseruans, qualem antea pro vlcerib. renum & vesicæ commodam præscripsimus, miraculi instar, sanus euasit. Ex cuius curatione, cum ad Delphenses a Consul. vocatus essem eo tempore, haud exiguus honor nobis accessit; vt multis quoq; innotuerim. ita vt praxis deinde feliciss. mihi succederet. Laudandus Deus, a quo donum omnium sanationum.

S C H O L I A.

10 P Ræter vitia penis ac totius virgæ (de quibus omnibus in hoc libro agere instituumus) intus in penem non solum fit excrescentia carnis; vel verruca, aut aliquid callosum innascitur, vt exemplo docuimus libro præcedente, Observatione 10. Sed fit etiam intus abscessus; vt hic contigit in parte illa, quæ perinæon dicitur. vnde & fistula oborta est, atque caro supra fistulam excreuit, vt vrina per fistulam stillaret; quamuis subinde per penem exibat, non sine stillicidio; & dysuria aliquando. Quæ symptomata ab vlceratione renū subsequuta. magno cum nostro honore non tantum cessarunt; sed ab omni dolore liberatus, ad tempus recte valuit: licet postea malum redierit, vt sequenti Observatione dicemus. Similem vero casum refert

11 *Amatus centur. 2. curat. 61. De ulceribus renum.*
Historia A- firmatis. Quem & hic apponere libet, in gratiam
mati. tyronum medicorum: Leuiori nephritide corri-
 piebat ut apud Anglos Altaraius, vir probus, tri-
 ginta natus annos: qui lucri gratia, quum Græ-
 ciam nunc Turciam dictam, intrasset, & Anco-
 nam se recepisset, ob labores habitos auctus est
 morbus, & sanguis illi per integrum annum (quod
 tamen nostro agro non euenit) cum vrina effluxit.
 Cui malo nunquam curationem aliquam molit-
 us fuit, aut præsidium adhibuit. Cessante vero
 sanguinis fluxione, lotium crassum, scabulosum,
 purulentum emittere cepit: cum quo & obtu-
 sum quendam dolorem circa renum regionem
 per sentiebat. Elapso vero nonnullo tempore, dif-
 ficulter is vrinam mingere cepit. Sed postea suc-
 cedente adhuc morbo, inter anum & testiculos
 huic oborta est inflammatio, siue apostema, tactu
 molle, vrinæ ei aculationem omnino impediens.
 Sed non ob hæc febricitabat: grauitate tamen an-
 gebatur. Et merito sane: quia morbus periculum
 minabatur. Immisso igitur cathetere, nihil pro-
 fuit: quum tamen aliis profuisse videramus. Et ea
 de causa concessio purgatorio medicamēto hoc,
 ad topica condescendimus auxilia. Habet autem
 12 pharmacum sic: ℞ syr. ros. solut. ℥ iij. decoct. senæ cū
 glycyrr. & fructu haliacabi, alkakengios Arabes di-
 cunt, apparatus ℥ iij. diabenedit. ℥ iij. misc. & ieiuno
 stomacho bibat, & parum, si voluerit, desuper dor-
 miat: quo optime egressit. Topicum medicamen-
 tum: ℞ axung. gallin. parum. desuper ponatur. A-
 liud: ℞ chamomill. malu. maluanisci anam j. in
 aqua sufficienti fiat decoctio; facta colatura in mor-
 tari prædicta triturentur, quibus adde farin. cha-
 momill. fabar. hordei anap. j. & cum prædicto deco-
 cto q. s. fiat emplastrum; & in lineo panno admouea-
 tur, & ligatura optime adaptata pro loci ratione lige-
 tur. At interim, dum hæc fiebant syr. sequentes
 ebibat: ℞ syr. capill. Ven. liquir. de absint. ana ℥ j. ℞.
 aquar. alkakeng. absint. ana ℥ j. ℞. misc. Postea vero
 iterum ex pharmaco ab excrementis alleuiata al-
 uo, inflammatio ad suppurationem utcumq; per-
 uenit: cuius pus contentū, ne vesicæ collum rode-
 ret, ilico de illius extractione solliciti fuimus. Sed
 an candente ferramento, vel frigido incisório, in
 dubium vertebatur. Demum hinc inde pro ratio-
 ne add. cto cauterio ignitio, apostema apertum
 fuit, quod forte contra rationem pro loci positu-
 ra factum haberetur. Sed, ut postea experientia
 deprehensum est, perinde fuit: ut paulo post dice-
 mus. Nam per prædictam incisionem vrina emit-
 tebatur: circa quam plura alia foramina sua sponte
 aperta sunt: per quæ omnia, vrina quoq; expelle-
 batur; & illa quidem sanie infecta, sabulosa, sub-
 13 albida, & interdum ad nigritiem declinans. Erant
 vero inferiora illa adeo flaccida, & corruptione
 infecta, ut ea ad consolidationē trahere impossi-
 bile videretur: per dictam tamen incisionem, sy-
 ringæ ei aculatoria, medicamenta abstergerendi, &
 vlcera exsiccandi vires habentia mittebantur.
 Per quod & tuberculum altero testiculo insitum,
 prædurum & contumax, dissolutum fuit. Nec e-

nim vnquam mihi animus fuit, prædicta ad cica-
 tricem trahere foramina: quia timor erat, si occlu-
 derentur foramina ipsa, & via lotio crasso & sabu-
 loso interciperetur, quæ vlcera maligniora fierent:
 & per consequens, ipsum in obitū traherent. Ce-
 terum quum is per longum tempus sic affectus
 maneret, Ferrariam se contulit, vbi medicorum
 consilio ad balneas Calderias, postea ad Lucenses
 ferreas iuit. Vbi ipsarum medicatarum aquarum
 potu, vrinæ clariores & limpidiores euaserunt.
 Sed octo interpositis diebus, ad consuetam crassi-
 tiem & malignitatem sunt redditæ. Vnde iudica-
 tum fuit, vlcera renibus substantiæ sordida infixæ
 esse, quæ confirmata prædicti vocant. Contra quæ
 Ferrarienses medici multa machinati sunt, sed
 frustra. Qua de causa Anconam rediit: vbi ab
 epoto Guaiaci decocto paulatim marcore infe-
 ctus, fluxu ventris superueniente, obiit. Sed no-
 ster æger, iis, quæ in *Observatione* recensuimus,
 probe curatus est; quamuis rursus anno 1560. ex
 carnis excrescentia in fistula innata denuo, omni-
 moda suppressione subsequente fere mortem in-
 currebat: sed tandem ab hoc malo euadens, rursus
 curatus fuit; ut sequenti *Observat. declarabimus.*

OBSERVATIO II.

*De omnimoda suppressione vrinæ, ab excrescentia car-
 nis in fistula urinaria circa perinaum, apostemate
 subsequente prope locum fistulæ, cum magno testium
 inflatione.*

Idem Godefridus cum fistulam haberet in me-
 14 tu urinario, in tauro, seu perinao dicto, inter
 testiculos versus anum tendente: (quæ quidem fi-
 stula, cum ea septem sam annis, etiam ante primam
 curationem, de qua diximus, laborasset, modo fuit
 per Guilbelmum de Dalen lithotomum curata, mo-
 do rursus aperta) cumq; per illam ipsam guttatim
 vrina stillaret, & semper quædam humiditas ex
 carne spongiosa fistulæ exsudaret: tandem circa
 eam caro quædam increuit; vnde neq; ipsa fistula,
 quæ prius videbatur curata, post aliquot annos
 consolidari potuit. Et cum illa excrescentia carnis
 per chirurgum dimoueri non posset, existens in
 loco admodum periculoso, colluue eo facile de-
 fluente & retenta; non diu post, sub carnis illa ex-
 crescentia rursus factus est abscessus, vlceratione
 maligna subsequente. Quæ modo decoctis deter-
 gentibus satis deterisa, curabatur per iniectionem &
 syphonem, vel syringam; & deinde consolidabatur:
 postea vero breui tempore iterum rediit. Ac eo
 tandem res deducta est, anno 1560. mense Aprili
 ut longo tempore nihil ex fistula exsudaret, facta
 retentione vrinæ & saniei. Idque ex malo vitæ re-
 gimine. Prius enim per nos, ut diximus, recte cu-
 ratus fuerat. Incidit igitur nunc, non solum in o-
 mnimodam vrinæ suppressionem; verum etiam
 in febrem satis malignam & acutam, & herniam
 humorosam, ac in testiculorum inflationem adeo
 magnam, ut capitis humani magnitudinem exce-
 deret, & ad apostema deueniret, cū maxima du-
 ritie, nō tantū occupans scrotum & testes, sed vsq;
 ad anum perueniens; duritie præsertim perinæ
 versus anum & meatū urinarium præoccupante,
 ut per

2 vt per penem nihil lotii exiret, neq; per fistulam. Catheter immissus, vt lotium proleclaret, ob vl-
cus callosum, & excrecentiam carnis, ad vesicam
transire non potuit. Et ita ego s. Aprilis die, anno
1560. cum pro deplorato haberetur, accitus fui.
Quare & mihi vtile videbatur, cum apostema du-
rum esset, vt aliquod emolliens, dolorem sedans,
Imo maturatiuum, statim apponeretur: nisi enim
abscessus statim molliretur & maturesceret, adu-
fore de ægro: ex retentione enim vrinæ, & dolore
intolerabili, spasmus, deinde mortem subsequu-
turam, cumq; illo die per se secessum habuisset,
clysterem, quod alioqui fecissem, non inieci. An-
tea autem alius lubrica erat ex cassia & terebin-
thina, qua sæpe utebatur ex nostro consilio, etiam
post primam curationem. Nihilominus, cum cly-
sterem nollet admittere, glande alius rursus irri-
tata fuit: præstabat enim tunc aluum per inferius
ducere. Sed lotium non reddidit. Locum dolen-
tem, & vbi fistula erat, fouebamus cum fomen-
tis ex melilot. flor. chamomill. folior. malua, viol. fœ-
nugraci, alijsq; anodinis & emollientibus. Hoc vero
emolliens, resoluens, maturans, loco affecto, tum
testibus apposimus: ℞. rad. althææ ʒ iij. foliorum
malua m. iij. viol. flor. chamomill. meliloti ana m. j. s.
coquantur in modica aqua ad mollitudinem, pisten-
tur: adde farina hordei ʒ j. farina fabar. ʒ s. olei cha-
momill. ros. amygd. dulc. butyri recentis ana q. s. fiat
cataplasma. Decoctum sequens injectum est sy-
ringa per meatum vrinarium: & reliquam partem
per os dedimus: ℞. rad. liquir. ʒ s. fol. malua cum
rad. m. ij. sem. malua ʒ j. s. sem. quatuor frigid. maior
ana ʒ j. coquantur in aqua commun. ad lb. j. mellis
ros. colati ʒ iij. misce. Septimo die accitus est Hen-
ricus Vergerius, medicus Haganus, & adhuc se-
cundus chirurgus: factio prognostico, nisi breui
lotium redderet, eundem moriturum, ob vehe-
mentem inflationem & inflammationem. Sed in
dubium vertebatur, de venæ sectione peragenda,
tam ob febrem, quam inflammationem. Sed quia
apostema durum phlegmaticum conclusum e-
rat, fomentis isdem insistendum, adiunctis cortici-
bus exterioribus quercus, conclusum est. Hoc
lithotomus in hernia humerosa, aut aquosa, sæpe
expertum habebat: adiunctis, inquam, m. ij. &
cumini ʒ iij. adiecta, cum superioribus iam dictis,
etiam parietaria: & decoctis in vino Pictaviensi. fiebat
fotus. Cataplasmati prædicto etiam hæc adiunge-
bantur, ad maiorem mollificationem & matura-
tionem: ℞. rad. althææ ʒ iij. lilior. albor. ʒ ij. farina
seminis lini, & fœnugraci ana m. j. s. fursuris fru-
menti exacte comminuti & cribrati m. ij. caricarum
pinguium concisarum num. vj. cocta & traiecta colo
addantur superiori cataplasmati, adiectis oleis lilior.
albor. chamamel. anethini ana q. s. Apponebatur
perineo, vbi fistula erat, ac toti membro virili vsq;
ad anum, vbi erat caro innata, & magna durities,
4 quæ nec resolui nec maturari poterat. Testiculis
post fotum & hoc cataplasma impositum fuit: ℞.
parietaria, absinthii, verbenæ ana m. iij. farina hor-
dei m. j. florum chamomill. melilot. ana m. ij. farina

fabar. m. iij. cumini exacte cribrati ʒ ij. musci quere.
m. j. s. herba cum floribus & musco coquantur in
vino Pictaviensi: & in fine prædicta in mortario tri-
turentur, adiectis farinis, & oleo irino, chamamel-
ino, anethino ana q. s. Hic etiam glans inditus est,
ad vrinæ emissionem, & secessum: ℞. pul. biera
picra ʒ j. salis communis ʒ j. salis gemma ʒ s. cum
melle fiat suppos. longum, quo aluum egressit: sed
lotium non reddidit: & inflatio aucta est; similiter
& dolor & vigilia. Vergerio tunc abeunte, & non
redeunte, cum dictis chirurgis curationem tamē
prosequuti sumus. Octauo igitur die Aprilis lo-
tium necdum emisit, viresq; eidem deiectæ sunt,
ac moribundus apparebat. Ter in die fotu uteba-
mur, & decoctum sequens præscriptum, partim
per virgam injectum, partim per os sumtum: ℞.
Cicerum rub. ʒ ij. hordei mundati m. j. folior. malua
m. s. sem. althææ, malua ana ʒ j. s. sem. 4. frigidior:
maior. ana ʒ j. liquir. rase ʒ s. fiat decoctio in aqua
communi q. s. & in fine emulsionem quatuor. sem. fri-
gid. addantur, & huius foriss. express. accipe lb. j. ad-
dendo mellis ros. colati ʒ iij. misce. Et iterum immis-
so cathetere per lithotomum, nihil profecit; & li-
quore injecto cum syringa, nihil lotii subsequu-
tum, regurgitante liquore, & meatu vrinario, ob-
structo propter excrecentiam carniū. Ager
vero non dormiebat, & magis febricitabat. Nono
vero die Aprilis, hoc cataplasmate resoluente, e-
molliente, & maturatiuo vsi sumus: ℞. rad. althææ
mund. ʒ viij. rad. lilior. albor. ʒ iij. foliorum malua
m. iij. viol. flor. chamomill. meliloti ana m. ij. caricarū
ping. concisarum num. viij. decoctis in aqua commun. &
contusis, ac colo traiectis, adde farina seminis lini, fœ-
nugraci ana m. ij. s. fursuris frumenti exacte commi-
nuti & cribrati m. ij. olei lilior. alb. chamamel. anethini
ana q. s. fiat cataplasma secundum artem, & loco affe-
cto & fistule apponatur. Deinde: ℞. parietar. absin-
thii, verbenæ ana m. ij. flor. chamomill. meliloti ana m.
iij. s. coquantur in vino Pictaviensi ad mollitudinem:
pistentur: adde farina fabar. m. iij. farina hordei m. j.
cumini exacte comminuti & cribrati ʒ iij. olei irini,
chamamelini, anethini ana q. s. fiat cataplasma secundū
artem, testiculis apponendum. Illud non solum valet
ad resolutionem herniæ aquosæ & humorosæ,
verum etiam ad testium inflationem in hydropi-
cis. Locus affectus prius fomentabatur fotu su-
prædicto; deinde primum cataplasma abscessui
imponebatur; secundum vero testiculis: idq; ma-
ne & sero. Et tandem abscessus disruptus est in lo-
co, in quo erat fistula, per excrecentiam carnis
superexcrecentis nunc obstructa; & per fistulam
exibat sanies; deinde vrina per locum fistulæ cœ-
pit transsudari primo; postea etiam vrina per fi-
stulam stillabat: mox copiose erupit per fistulam
in perinæo existentem; & vrina amplius non exi-
bat per penem, aut meatum vrinarium, sed tantū
per fistulam; & dolor sedabatur vna cum febre, v-
rina sic paulatim emanante. Sed, q̃ apostema ma-
gnū esset, maximā partē occupans perinæi, chi-
rurgi priusq; r̃ imperetur, multū metuebāt rupti-
onē circa anū futurā, de corruptione sphincteris.

7 Verum, Dei nutu, circa fistulam facta est eruptio, sanie paulatim emanante: unde & melius sperarunt. Interea tamē, cum tumor immensae magnitudinis esset, tam testium, quam loci apostemosi; procedebamus cum dicto cataplasmate, ad maiorem maturationem, & mollicationem. Ceterum cum tædiosum esset, semper applicare cataplasmata ob loca inferiora, cum & cogeretur habere brachiale, ut herniosi consueverunt; apposuimus ceratum nostrum de ammoniaco, cuius descriptionem posuimus lib. 20. Obs. 10. Quo quidem materia scirrhusa partim resoluebatur, partim maturabatur, & partim emolliebatur: valet enim ad tumores duros & scirrhosos: quo & hic commode usus sum. Antequam vero illud apponeretur, prius fiebat fots more solito: & tandem vrina non solum per fistulam guttatim, sed & copiose reddebatur; & cum liquor sequens syringa iniiceretur per virgam, per fistulam exibat: per penem autem neque vrina, neque liquor emanabat. Ita & ex fistula sanies subinde concreta, imo subinde & pellicula inuiscata, carnosae, ac induratae erumpebant; quae & eandem, tum penem ac meatum urinarium obstruxerunt. Tandem tamen vrina erupit in magna copia, sed tantum per fistulam. Quamobrem ad maiorem deterfionem vlceris & fistulae, & ad vrinae prouocationem, hoc decocto sequenti vli sumus; cuius pars etiam per syringam iniiciebatur: ℞ rad. liq. malua, fœniculi, petroselini, ana ℥ ℥ rad. apu ℥ j. foliorum malua, m. ij. parietar. m. j. sem. malua sem. quatuor frigid. maiorum ana ℥ j. cicerum rub. ℥ ij. fiat omnium decoctio in aqua communi q. s. pro ℥ ℥ j. colat. adde mellis ros. colati ℥ i. j. Omnia optime succedebant; singulis diebus & sanies exibat, & durities cerato mollior euadebat, & omnis sanies, tum pus per fistulam expurgabatur probe; & indies vrina commodius per fistulam, non autem per penem aut virgam, reddebatur. Hoc itaque decoctum 14 Aprilis praescripsi: ℞ rad. liquir. ℥ j. rad. malua ℥ ℥ foliorum malua fumaria, agrimonia ana m. j. sem. malua ℥ j. sem. quatuor frigid. maior. ana ℥ j. cicerum rub. ℥ ij. ℥. fiat decoctio in aqua commun. pro ℥ ℥ j. ℥. mel. ros. colati ℥ iij. misc. fiat apozema, pro repurgatione & deterfione vlceris & fistulae. Et hoc per syphonem seu syringam iniiciebatur: ℞ rad. apu, liquir. ana ℥ ℥ rad. petroselini, fœniculi ana ℥ ij. agrimon. equiseti, plantaginis, cum radice (pro aliquali consolidatione) ana m. j. summitatum centaurii minoris (pro maiori absterfione) betonica ana m. ℥ sem. quatuor frigid. maior. ana ℥ ℥. coquantur in aqua communi pro ℥ ℥ j. adde col. mellis ros. colati ℥ ij. misc. Ter quaterue in die iniiciebantur. Fots neque cataplasmata pro testibus descripta relinquebantur; neque ceratum pro loco apostemoso. At vrina nondum effluente per virgam, pilulas sequentes sumebat, de super sumendo cyathum vnum decoct. supra scriptae: ℞ terebinthina Veneta clara ℥ ij. pul. liquir. troch. alk. k sine opio ana ℥ j. fiant pil. instar cic. ℞ rad. liq. ℥ ℥ rad. apu, petroselini ana ℥ ℥. agrimo. m. j. ℥. betonica. plant. cum rad. centaur. minor. ana

m. ℥. cio. rub. ℥ ij. sem. 4 frigid. maior. ana ℥ ℥. fiat omnium decoct. in aqua commun. pro ℥ ℥ j. col. adde mellis ros. colati ℥ ij. syr. iuiubini ℥ ℥. misc. 23. Aprilis pro hernia humorosa, hic fots testiculis admotus fuit: ℞ corticum exteriorum quercus, quibus vtuntur calcearii m. ij. cumini ℥ iij. sem. anisi fœniculi ana ℥ ℥. florum chamomill. meliloti, hyperici, agrimonia, centaurii minoris ana m. j. misc. & fiat fots. Decoctio fiat in vino Pictaviensi ad ℥ ℥. iij. eaque tam diu vli sumus, donec tandem inflatio illa testium & scroti, tum hernia cessarunt. Sed & hac sequenti vli sumus: ℞ florum chamomill. pulu. cumini ana ℥ iij. corticum quercus m. j. ℥. coquantur in vino Pictaviensi pro ℥ ℥. iij. Multum hoc decoctum valet in omni hernia aquosa, humorosa, hydrope; mirabileque est in omni testium inflatione ex causa frigida: & raro nos hoc experimentum fefellit, modo abesset inflammatio: in qua minus calidis & exsiccantibus vtendum. Post fots tam loco apostemoso, quam scroto, ceratum nostrum de ammoniaco apposuimus, & 27. Aprilis hoc decoctum praescriptum fuit: ℞ rad. ononid. liquir. ana ℥ ℥. agrimonia, sanicula, bugula (ad maiorem consolidationem fistulae) ana m. j. summitatum centaurii minoris, garyophyllata, hypericonis, equiseti, betonica ana m. ℥. rad. consolid. maioris ℥ ij. sem. quatuor frigid. maiorum ana ℥ ℥. fiat omnium decoct. in aqua commun. pro ℥ ℥ j. adde post colaturam mellis ros. ℥ iij. misc. Antea nepe 25. Aprilis hoc decocto vtiebatur: ℞ rad. liquir. fœnicul. petrosel. malua ana ℥ ℥. rad. apu ℥ ij. malua, parietaria, agrimonia ana m. j. sem. quatuor frigid. maiorum ana ℥ ℥. fiat decoct. in aqua commun. pro ℥ ℥. j. col. adde mellis ros. colati ℥ ij. misc. 28. Aprilis, ut & hoc iniiceretur, mandauimus: ℞ rad. liquir. ononidis, ana ℥ j. agrimon. pentaphyllonis summitat. centaurii minoris, fumaria, sanicula, utriusq. garyophyllata, cauda equina, bugula, brunella, hypericonis, betonica, valeriana, ana m. j. rad. consolid. maioris ℥ iij. infundantur per noctem in vino Rhenensi, & coquantur in balneo Mariae: & huius col. accipe ℥ ℥. j. adde mellis ros. colati ℥ ij. misc. Egrege detergebat vlceris & fistulam, & melius vrina reiciebatur per fistulam, sed nondum per virgam. Atque ita, cum fots ac cerato processimus, donec tandem fomento relicto, cessauit hernio humorosa ac aquosa, & testes omnino detumere, inflatioque omnis recessit. At dolore oborto circa penem, & circa partem superiorem virgae, ad id symptoma depellendum, prima Maii virgam inungi iussimus, sequenti vnguento: ℞ dialib. ℥ ℥ olei verm. terrest. amygd. dul. ana ℥ ij. cera par. fiat vng. Chirurghi putabant, hunc dolorem procedere ex vasis spermaticis, cum ex applicatione cerati, pus maturum ex fistula emanaret: aliquando vero ex fistula pelliculae eiaculabantur magnae, exulceratae, nervosiores quidem & albidiores, quae & vrinam prius obstruxerant, ut ante dictum est: aliquando etiam partes carnea prodibant, ab excrecentia carnis intus delitescente intra fistulam: quo factum est, ut per fistulam vrina liberius emanauerit. Chirurghi tamē adiuuantes forcipib. & tenaculis excrescen-

11. excreſcētias illas, tū partes nervoſiores, cōmode attrahebunt. At nondum per virgam lotium ei-
culabat. Quarto itaque die menſis Maii, pro ma-
iori deterſione conſolidationeque fiſtulæ & abſ-
ceſſis vlceraſi in perinæo, & pro diminutione ex-
creſcentiæ carnis, etiam pro mundificatione & a-
pertione meatuum vrinariorum, hoc ſequēs de-
coctum propinauimus: *℞ rad. ononidis liquir. ra-
ſæ, ana ꝑ ℔. agrimonie, equiſeti, pentaphyllonis, plan-
tag. cum radicibus, centaurii minoris, fumariæ, ſa-
niculæ, anam. ꝑ ℔. cicerum, rub. ꝑ ℔. ſemin. quatuor.
frigid. maior. ana ꝑ ℔. fiat decoctio in aqua comuni
a ꝑ ℔. j. colatura adde mellis roſ. colati ꝑ ℔. j. miſc. pro a-
pozemate.* Septimo Maii, & antea ſingulis dua-
bus ſeptimanis, vel citius, vbi alius non ſatis flue-
ret, ita illam purgauimus: *℞ caſſ. recens ex cannis
tracta ꝑ ℔. j. terebinthina electa ꝑ ℔. j. confectionis ha-
mech. ꝑ ℔. aduſto ꝑ ℔. j. fiat bolus.* eo ſumto ad mi-
nimum ſemper quinquies aluum deponebat, &
fuit fiſtula repurgata, & vlcus egregie abſterſum.
Oſtauo Maii, ad maiorem vlceris deterſionem, &
fiſtulæ mundificationem, hic liquor iniiciebatur
ſyphone, & poſt iniectionem pus, ſanies, ac vrina
melius ſubſequebantur ſemper. Ter in die ad mi-
nus iniiciebatur etiam faciens non nihil ad con-
ſolidationem: *℞ ſaniculæ garyophyllatæ agrimonie,
caudæ equinæ, hypericonis, centaurii minoris, ana m.
j. rad. conſolidæ maioris ꝑ ℔. j. fiat decoctio in aqua &
vino Rhenenſi pro ꝑ ℔. j. mellis roſ. colati ꝑ ℔. j. ter, vt
dixi, ad minus iniiciebatur in die, atque indies vl-
cus & fiſtula paulatim deterſa conſolidabantur;
quamuis nondum per meatum vrinarium vrina
efflueret. Decimoquarto Maii, & hoc decoctum
12. iniiciendum mandauimus: *℞ ſaniculæ vtriuſque,
bugulæ hypericonis, caudæ equinæ, ſummitatum cen-
taurii minoris, garyophyllatæ, agrimonie, anam. ℔.
rad. conſolidæ maioris ꝑ ℔. j. bulliant in vino Rhenenſi
ꝑ ℔. j. aqua betonica ꝑ ℔. j. ad conſumptionem mediæ a-
uſſere; & colatura uſui reſeruetur pro iniectione.* De-
cimoſexto Maii, & hanc potionem præſcripſi-
mus: *℞ ſaniculæ vtriuſque, hypericonis, ſummita-
tum centaurii minoris, garyophyllatæ, agrimonie,
equiſeti, betonicæ, anam. j. bugulæ m. ℔. liquir. raſæ ꝑ
℔. j. fiat decoctio in ceruiſia comuni pro ꝑ ℔. j. colatu-
ra zaccaro dulcoretur.* Vigeliſimo primo Maii &
hoc decoctum præſcriptum eſt: *℞ rad. ononid. li-
quir. raſæ ꝑ ℔. j. ſaniculæ vtriuſque, bugulæ, agrimonie,
equiſeti, betonicæ, garyophyllatæ, ana m. j. fiat decoctio
in aqua betonica & vino Rhenenſi in duplici vaſe,
poſtquam ſteterint per noctem inſuſa pro ꝑ ℔. j. colatu-
ra adde mellis roſ. ꝑ ℔. j. miſc. pro ſyringatione; & reliqua
pars per os ſumatur.* Hoc igitur tempore fiſtula
probe deterſa cœpit conſolidari, ita vt vrina tunc
prius per penem, virgam & meatum vrinarium,
eiaculari cœperit. Quod videns æger, magno
gaudio perſuſus lætabatur, optimam ſpem de ſua
ſalute concipiens; cum intra ſex ſeptimanas, &
vltra, ne guttam quidem lotii per virgam reieciſ-
ſet, vrina ſemper per fiſtulam exeunte. Quamob-
rem nec inde ceratum amplius apoſeimus: vbi ſi
13. Maii pro iniectione per ſyphonem hoc deco-
ctum præſcriptum fuit: *℞ agrimonie, equiſeti,**

*bugulæ, garyophyllatæ centaurii minoris, ana m. ℔. li-
quir. raſæ ꝑ ℔. j. bulliant in aqua betonica & vino Rhe-
nenſi pro ꝑ ℔. j. iniiciatur.* Eodem die ita illum pur-
gaui: *℞ caſſia recens ex cannis tracta ꝑ ℔. j. terebinthi-
na electa ꝑ ℔. j. cum zacc. candi dicto ſubtiliſſ. pul. fiat bo-
lus, hora ſeptima mane ſumſit, quo bene egeſſit.* Pro-
cedendo cum hac vltima ſyringatione, & deco-
cto vltimum præſcripto, tandem, præter exſpe-
ctationem, fiſtula conſolidata fuit, quæ durauerat
per 7. annos: eaq; nunquam poſt aperta fuit; nec
amplius vrina per eam tranſudauiſſet, aut diſtillauit,
aut eiacularata eſt; ſed per penem, aut virgam, vt in
ſanis fieri conſuevit. Interim tamen, vt colopho-
nem huic curationi imponeremus, pro ſigillatio-
ne & maiore conſolidatione, & aliquali deterſio-
ne, ad meatus vrinarios etiam aperiedos, 27. Maii
hoc decoctum adhuc præſcripſi: *℞ rad. liquiritiæ,
ononidis ana ꝑ ℔. agrimonie, pentaphyllonis, ſummi-
tatum centaurii minoris, fumariæ, ſaniculæ vtr. uſq;
bugulæ, garyophyllatæ, betonicæ, equiſeti, anam. fiat o-
mnium decoctio in aqua betonica, & vino Rhenano,
poſtquam ſteterint per noctem ſupra herbas, pro ꝑ ℔. ℔.
colatura addendo mellis roſ. colati. ſyr. de liquir. ana
ꝑ ℔. j. miſc.* Poſtremo imperaui, vt vteretur ſolum-
modo pro maiori conſolidatione, ne fiſtula ite-
rum aperiretur, decocto ceruiſie communis ex agri-
monia, bugulæ, garyophyllatæ, ſaniculæ vtræque, beto-
nicæ, centaurio minore, brunellæ, & pilofellæ. Quibus
Dei gratia, omnibus, qui præſentes apud illum
fuerant admirantibus, perfecte ſanitati reſtitutus
eſt, fiſtula conſolidata ad finem vitæ permanente,
& vrina per virgam optime emeante. Poſtea vero
hic optime valens uſq; ad ann. 1576. pancratice
vixit; quo tempore in Germania, (quo paulo ante
obturbaſſet & bellum, quod in hac patria agebatur, ac-
ceſſerat) mortuus eſt.

S C H O L I A.

14. D E inflatione teſtium & hernia humeroſa hic
nihil dicemus, cum ſequenti libro de vitiis
teſticulorum ac ſcroti acturi ſimus. Quod vri-
na hic non niſi conſolidata fiſtula, per penem &
virgam exierit, primo in caſſa fuit excreſcentia
carnis ſuper fiſtulam enata: quæ cum emollita in
abſceſſum mutata eſſet, erupto, pus emanauit
per fiſtulam, deinde & vrina. Dolebat poſtea &
virga, ſed in iunctione dolor ille ceſſauit; neque
ſubſequuta eſt inflammatio in pene. Quod etiam
vrina fuerit ſuppreſſa ob carunculam innatam
circa fiſtulam, vltra per penem exire non potuit;
neque etiam in fine, donec in perinæo abſceſſus
eſſet ruptus, pure excreto & repurgato, & fiſtula
conſolidata. Ceterum, quod ad penem attinet
ac virgam, variis afficitur affectibus: nam & penis
potest incurrere inflammationes, vlcerationes,
cancros, inflationes, dolores, pruritus: de quibus
omnibus in hoc libro dicemus. Namque hoc ge-
nitali membrum (iſte Ariſtotele) homini foras
propendet carnoſum cartilaginofumque; & qua
parte carnoſum eſt, non tumet neque infla-
tur; reliqua vero pars ſubeunte ſpiritu intume-
ſcit excreſcitque; hoc eſt, dum ad coitum a natu-
ra irriteretur animal, turbinata carnoſque cum

Vitis virga
& penis.

integenti cute pars, præputium dicitur: quod ludæos a ceteris distinguit nationib. recutitos. Præputium autem, vna cum cole vel glande ablatum sæpe vidimus ex lue Venerea, *ut in libro de isto morbo si Deus me superstitem fecerit, dicturi sumus.* Nunc vero de penis vitiis sermonem producamus: qui quia foras propendit, multis de causis offendi potest; præcipue vero ex nimia Venere, ut sequens exemplum ostendet.

OBSERVATIO III.

De inflatione & inflammatione Penis seu Virgæ, ac apostemate transiente deinde in abscessum & ulcerationem.

I Vidam nimia abutenti Venere, virga inflata est cum maximo pruritu, accedente deinde inflammatione & apostemate. Hic cum chirurgi opera vteretur, postea ad ulcerationem fere devenit cancerosam. Cum vix apta remedia essent exhibita, ad hunc accitus, ut ei sanguis detraheretur imperavi, (*cum etiam ob dolorem in febrem incidisset*) ex vena basilica brachii dextri, alio prius, nempe die præcedente, cum cassia & pulpa thamarindorum cum sero lactis soluta, inanita. Ad inflammationem sedandam, quæ adhuc adere, iussi, ut lauaretur decocto hordei communis, solatri, plantaginis, adiectis succis earundem herbarum. Deinde, ut chirurgus vnguento apostolorum dissoluto in aqua solatri, *ut simul mundificaretur ulceratio*, ablueret imperavi; & ut putrida caro amoveretur, lauabat cum vnguento Ægyptiaco soluto in aqua plantaginis; ut soliti sumus facere in ulceribus penis inueteratis in lue Venerea. Ad exsiccationem commode quoque adhibetur vnguentum album; postea & diapompholygis, ad finem curationis. Sed in principio, cum etiam adesset pruritus, pro pruritu ut tale vnguentum (*quo & a me curatus dicitur quoq. a virgæ pruritu*) fieret iussi: ℞. cerus. plum. ʒij sulph. albi ʒij opii gran. iij adiect. acet. fiat linimentum. Succus ebulli extract. & exsiccat. cum ol. ros. in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo ducatur ad spissitudinem vnguenti; quo pruritus tollitur, ut expertum est.

S C H O L I A.

2 *Inflammatio virgæ vel apostema.* Sicuti alia membra, ita & virga seu penis pruritu pati ac inflammationem potest, ex omni genere quatuor humorum; quamvis magna ex parte ex humoribus calidis fiat. Alii & apostemate frigido penem occupari posse, scribunt; ut Gordanius, qui & duplices causas adfert: externas, ex casu, percussione; & ex concubitu cum muliere, cuius uterus est immundus, vel sanie aut vitulentia repletus, vel ventositate, & similibus corruptis humoribus. Internæ causæ sunt, humores corrupti & mali, descendentes ad virgam & partes inferiores. Signa sunt manifesta, cum membrum sit in propatulo, & externæ causæ ab ægrotante facile dignoscuntur. Signa humoris peccantis ex dominio eiusdem facile habentur, ut sæpius nunc dictum est. Iam quoque in apostemate calido adesset rubor virgæ, cum tumore & ardore, & febre continua. Ea si sit ex bile, ardor, dolor & calor magis infestant, & minus rubet, & tumor etiam mi-

nor. Ex sanguine fit e contrario. Signa vero apostematis frigidi hæc: adesset tumor sine rubore, & dolor non adeo vehemens: ita ex pituita tumor albus mollis; ex melancholia durus, niger. Ceterum vitia pudendorum seu penis, uti & aliorum membrorum inferiorum, sunt difficilis curationis, eo, quod superfluitates facile decumbant & fluant ad loca decliviora; deinde quod membra sint sensibilia, & dolorosa, unde facile attrahuntur humores: præterea, cum sint membra frigida, nervosa, debilia, facilius coaceruantur superfluitates. Curatur ut reliquæ inflammationes, quiete, optima victus ratione, & si particularia conveniunt, venæ sectione. Materia parata, veniendum ad purgationem, præmissa quidem euacuatione cum phlebotomia in causa calida; in causa frigida cum pharmaco conveniente. Quod ad topica remedia attinet, in principio aliquantulum emplastra & vnguenta repercussiva conveniunt. In augmento addantur resolutiva. In statu adhuc magis, & in declinatione pura resolutiva. In apostemate calido Gordon. accipit sol. hyoscy. coctam in aqua, & contrita cum axungia porcina applicat. In augmento hoc emplastro adiecit malua, bis malua folia. In statu vitur ex sænugræco, sem. lini, farina volatili molendini, & oleo communis. In frigido decoquit radices malua, bis malua, & lapatum acutum in aqua conterit cum axungia porcina veteri; paratque emplastrum. In augmento addit sænugræcum, cum semine lini. In statu adiungit radices liliorum. In dolore vero virgæ micam panis contemperat in lacte, adiectis vitellis ovorum, cum oleo rosaceo, croco & opio in exigua quantitate admixtis. Illud emplastrum mitigat omnem dolorem, ubiqueq. fuerit, corpore tamen prius mundificato. Et si calor sit admodum vehemens, folia hyoscyami decoquantur sub prunis, & involvantur foliis cantium quibus postea abiectis apponatur. Ad virgam inflatam & tumidam valet emplastrum ex butyro, aqua rosacea ana ʒij adiecta hordei farina q. s. pro emplastro conficiendo. Apostema autem aliquando in vlcus transiit, præsertim si male curatum sit, quamvis plerumque facilis sit curationis, si Medicus in principio vocetur, & ag. r. nullum errorem admittat maxime vero si terminetur per resolutionem: malum vero, si per saniem: penis adhuc, si per schirrosin. Fit quoque vlcus, uti & pustula virgæ (*de quibus sub uno capite agi. Valefens*) ex causa primitiva, nempe ex vulnere, attritione, coitu cum foetida & immunda muliere, vel cancroso; ex femoralibus nigris, foetidis, immondis. Vel ex causa antecedente, nempe materia spermatica vel corrupta, aut retenta intra caput virgæ, & præputium, ex humoribus malis inficientibus ibidem retentis, & non euacuantis, qui corrumpunt locum, quem tangunt & vlcérant; vel, ut diximus, ab apostemate male curato; vel ex repletione, aut co. fluxu humorum acutorum & corrodentium, & calidam intemperiem inducentium ac corrumpentium, ac membrum virile exulcerantium. Et sic vlcera ac pustula fiunt in virga, quæ aliquando ex mala aut dia-

3
Prognostic

Curatio inflammationis virgæ.

4

Ad dolorem

Vlcera quomodo fiant & curentur

5

Signa.

6
Signa.

aut diuturna curatione fiunt cancroſa, in tantum quod aliquando virga perditur, vel eius pars. Aliquando exterius contingunt in pelle; vt plurimum vero intus, etiam ex excreſcentia carnis innata intra penem, vt antea oſtendimus. Et ſi intus deliteſcat vlcus, facile cognoscitur (vt prius dictum eſt) ex pure exeunte ante vrinam. Cauſæ procatacticæ ex relatione ægri manifeſtantur. Si exterius, ſigna manifeſta ſunt ex ſolo viſu: & ſi ab apoſtemate præcedente, id quoque ex ægri ſermone habetur. Dignoscuntur & ab humoribus præterea acutis, ex dominio eorundem, tum iis, de quibus paulo ante dictum eſt, inflammatione, ſeu apoſtemate. Auicenna de vlceribus, quæ in teſtibus, virga, aut ano fiunt, prognosticum fecit, ea eſſe mala & ambulatiua (vt medice loquar) ex quibus facilis contingit putrefactio, cum ſint in loco abſcondito, declinante ad caliditatem & humiditatem, per quem excrementa defluant; vt hic vrinæ mordicantes, curationemque impediētes. Aque ideo illa ſunt deteriora, quæ ſunt in muſculo, qui eſt in radice virgæ, vt & in ano; vnde & vehementiori exſiccatione egent. Retardatur etiam curatio aliquando talium vlcerum, cum non libenter ea medicis peritis oſtendant. Moriuntur aliquando cū eo peruenerint, vt adeo ſint putrefacta, vt neceſſarium ſit, virgam abſcindere, non abſque periculo vitæ. Sic Valeſcus ſcribit de quodam, qui tarde medicum vocauit: ita vt tota virga correpta vlcere cancroſo cum duritie, efficeretur rotunda naptiſtar: & homo, inquit, erat ſemimortuus & deſcoloratus. Tales enim vitæ periculum ſubeunt. Ideo nihil præſtantius, quam ſtatim his malis occurrere: vt etiam exempla quædam adhuc inferius dicenda oſtendant. Verum hæc vlcera, tum puſtulæ, quemadmodum & matricis, vt re-

7

Curatio vlcerum, penis fert Galen. in Arte parua, indigent ſiccioribus medicamentis; quem & Paulus ſequitur lib. 3. cap. de pudendo, um & an remediis. Naturalium (inquit) anique vlcera circa inflammationem, oborta, medicamentis indigent, quæ vehementer reſiccant: cuiusmodi ſunt ex charta combuſta, anethum uſtum, aridum, cucurbita concremata. A ſociis recentibusq; vlceribus, etiam aloë præſens eſt remedium, ſi arida in puluerem redacta applicetur. Porro omnium leuiſſimum eſt, & nihilominus efficax, pompholyx. At ſi humidiora euenerint vlcera, piceæ cortex per ſe & lapis hamatites. Sin alie deſcenderint, manna miſcebitur. Si paſcendo ſerpant, lenticula cum malicoris illinetur. Actius quoque ad depaſcentias pudendorum fomentis vtitur aſtringentibus ex decocto myrti, rubi, roſoleaſtri, malicorii, plantag. & cataplaſmate ex lente elixata, cum modico pane, malicorio, & polygono. Vide plura apud eundem lib. 1. 4. cap. 16. ad pudendorum depaſcentias cap. 17. Hoc vtitur ad carbunculos pudendorum: Spuma arg. ʒ iij. ceruſſa ʒ ij. arg. ʒ j. omnia ſimul trita in ſperg. 10, & panniculorum ſruſta applicatio. Vel ſeuum caprinum cum paſſulis ſubactum illinito, id enim ſine dolore confert: deinde adipem cum pice liquida apponito, vel caprarum pilulas uſas cum melle ſubactas applicato. Habet idem & in

8

gnia remedia lib. eodem cap. 18. ad vlcera meatus vrinarii: ad quem lectorem relegamus. Vlcerata caput virgæ exſiccantia magis, quam ſupra præputium indigent: nam caput virgæ eſt vehemētioris ſiccitatis & complexionis, vt etiam a Valeſco & Auicenna citatur: Egent iſta membra vlcerata nullo medicamento molliſicante, niſi aliquando ad pellis præputii reuerſionem intētio exiſteret. In principio igitur mundificetur locus, & refrigeretur aquarof. & plantag. Et ſi opus eſt maiori mundificatione, lauetur cum aqua decocti hydromellis cum bombace: vel cum aqua, in qua diſſolutum eſt alume de rocha oſtum; deinde rurſus lauetur cum vino & aceto mixtis, in quibus decoquantur gallæ aut nuceſ cypreſſi, & alumen; & panni linei antiqui inter caput virgæ & pellem ponantur, & præputium de ſuper deducatur, & cum minxerit, remoueat, & alia pecia poſt mundificationem, reponantur. Hæc frequentanda. At ſi magis ſit deſiccandum, vtendum unguento albo camphorato, & lauetur cum decocto balauſt. etſi multum præcipue valet, diapompholyge vti; qua & nos uſi ſumus. Interea femoralia continuo mutantur, & ſint munda ac alba. Si vlcerata magis profundentur neque in principio bene mundata ac curata, poſt lauatoria ſupradicta, puluis ex aloë de ſuper ponatur, vel plumbum uſtum, thuria, & unguentum diapompholygos, & litharg. nutritum, & ceruſſa, iuxta Galenum, & cinis charta combuſta, ubi magna exſiccatione opus eſt. Valeſcus vluſ eſt fuligine nigra repert. in oriſicio furni. Quod ſi in cole, iuxta Paulum, intra genitalis foramen vlcus delituerit, pus vel ſanguis citra vrinam redditus, fatebitur. Curatur primum dilutiore muſſa collutum, mox lacte, poſtea colly. io Aſterilaſte miſto, aut albo paſtillo. Penna tincta illinitur. Inde tenue linamentum tortile vinctum imponitur. Præſtantiffimum vero eſt etiam quod capit gallæ, pompholygis, & aloës pares modos, roſaceo & plantaginis ſucco maceratos.

OBSERVATIO IV.

De dolore Penis cum inflatione.

1

Vuenis quidam, cum ſupra modum incaluiſſet, ac Venere violenta uſus eſſet, iniecit in totius penis dolorem, ac inflationem quandam ſine inflammatione & febris. Iuſſimus, vt penem inungeret cum oleo roſaceo & chamamelino. Deinde etiam cum unguento popul. & dialthæ ſimul mixtis. Quæ etiam dolor mitigabatur ex parte. Fouimus autem cum decoct. malua, biſmalua, florum chamo-mill. ſurfuris, meliloti, & ſeminis lini ac anethi. Quibus præſidiis tumor ille ac inflatio ceſſarunt. Quibus remediis & aliis ante nos commode uſus fuerat.

S C H O L I A.

2

R Ecte dixit Valeſcus, quod vitia in pene magis contingunt in iuuenibus quam ſenibus, qualiæcunq; illa fuerint. Et licet aliquis contrarium ſuſtinere poſſet, ſenes ſcilicet magis ſuperfluitatibus abundare, quam iuuenes, caloremq; habere debilem, facile proinde humores ad illa membra decumbere, atq; pruritus, apoſtemata vlcerata, vel

dolores inde magis contingere iis, quam iuuenibus: frequentius tamen hæc iuuenibus potius eueniunt; primo, quod sint salaciores, & ad Venere procliuiores; præterea sine delictu etiã concumbunt cum mulieribus impuris, habentibus aliquando vlcus in vtero, vel alio scdo malo laborantibus: vnde etiam cōtagione facilius inficitur virga, pruritu, pustulis ac vlcere. Deinde iuuenum humores sunt multo calidiores, & acriores, & ideo iuuenes citius inficiuntur; quorum virga magis quoq; est parata, quam senum, suscipere corruptionem. Nervi quoque senum sunt duriores, solidiores, & non ita suscipiunt superfluitates, vt iuuenum nervi, qui magis sunt rari atque molles.

Quare, (*quemadmodum & Gordonius dicebat*) virga iuuenum citius apostematur. Interea tamen illa apostemata, quæ fiunt per viam congestionis, fiunt potius ex materia melancholica, cum nutrimento eorum assimiletur. Si per viam deriuationis, tunc contingūt magis ex humoribus calidis,

Ad dolorem. cum tales potius fluant. Quantum ad dolorem si sit cum ardore, apponatur emplastrum mitigatum positum Scholio *Obs. 3. præced.* Paulus, ad naturalium dolores, *butyri, resina paribus portionibus pulcre liquatis* perungito, vel ex *seminis lini succo, equum myrrha & resina fricta pondus leuigatum* im-

Ad inflationem. ponito. Si sit inflatio ex materia frigida pituitosa, vt in hydropicis contingit, fiant *fortius magis exsicantes, & calidiores, & plus resoluentes*, quales scripsimus cōferre ad testes inflatos hydropicorum. Ad inflationem virgæ Gordonius iubet, vt *absinthium, anisum, & fursus, & pes columbinus*, decoquantur in vino crassiore, & vt deinde contrita deluper apponantur. Bertrutius adhibet emplastrum resoluens ex *st. rcore columbino, vel vaccino, florum, chamomilla, ruta recens, sem. lini, anethi, anap. j. fermenti p. 3. salis niri, vel saponis quar. par. prius bull. in aqua vel oleo ros. & applicat cum lana succeda.*

Vtitur & ad testes inflatos. Sed videndum num etiam ad sit dolor, vel ardor, aut inflammatio; iuc ab eiusmodi calidis abstinendum. Ad intumescētia pudenda, inquit Paulus, vitis foliorum tenerorum pondo denarii, cerussę pondo denariū quinque trita applicantur. Ceterum fotu ex aqua marina frigida coles recreator, penisque deligator. Earum partium pruritus tollit lentis decoctum cum mali punici cortice. Et ad verendorum rhagades, & sedis, valet resina fricta cum rosaceo contrita, vt sordium fiat spissitudo, adiecto etiam luteo oui, opioque, vel hederæ foliorum combustorum cinis cum rosaceo in plumbea pila tritus admouetur. Ad vulnera virgæ hoc commendatur: *litharg. cerussalote, cadmia lota, myrrha, sarcocolla, tutia exstincta, tragac. tharis, pulueris ligni putrefacti, misceantur, fiat pulvis, quotidie mundetur locus cum vino tepido, & desiccetur, deinde pulvis aspergatur: vel ex dictis fiat vnguentum oleo ros. adiecto, & cera.*

Ad fluxum sanguinis e virga. Ad fluxum sanguinis e virga: *℞ bolum arm. sang. dracon. hypocist. mastichen. ihus, pilos leporis minutissimi contritos, cum aceto, emplastri modo, & appone.* Cuidam ex mentula sanguis egrediebatur, ob corrosionem viceris in collo velicæ; & is fuit curatus, primo di-

uertendo cū ligaturis in brachiis, inde per os exhibendo hunc syrup. *℞ syr. de portul. myrrhini, cotoneor. ana 3 ℔. trochis. ac carabo spodio, ana 3 ℔. aqua portul. plantag. ana 3 ij. misc.* Syphone & hoc iniiciebatur: *℞ vtrioli Romani 3 ij. aqua communis ℔. j. fiat bona decoctio.* Vlcus erat pullus bullitus in aqua ferrata cum sem portul. & plantag.

OBSERVATIO V.

De Penitus exulcerato.

Vlcera interna penis, quia vrina frequenter irritantur, tardius curantur, quia medicamenta partem minus constringunt, sine quo contactu curari non possunt. Sunt autem in inferiore penis parte, quando urinam continere non possunt, & si retineant, multum in reddenda vrina postea laborant. In aliquibus hæmorrhoides inflantur, dolet sphincter ani per consensum. Intenditur penis, pus magis redditur cum vrina, quam separatim. Tali vlceratione quidam laborabat: cui consultum, vt frequenter ventrem leniret, vt eo deriuaretur materia, & vt poma cocta, prunaq; in prima mensa caperet, sapius enim vētrem leniunt, & humores temperant. Exhibitus eidem quoque fuit syr. ros. laxat. Rondeletius talem opiata in hoc casu commendabat: *℞ cassia recens extracta 3 ij. j. zamarind. sebesten, ana 3 ij. cathol. 3 j. cum syr. ros. laxat. fiat opiata. capiat 3 j. in forma boli, vel cum decoct. hordei, aut prunorum.* Idem præstat diasebesten, cathol. syr. ros. laxat. Pro potu in principio vtatur decoct. hordei mundati, deinde integri. Iniectum frequenter serum lactis, ad detersionem, & decoct. hordei integri: postea etiam lac addendo trochis alk. kengi; atque id itidem frequenter. Et vbi dolor magis vexaret, iniectum cum syphone modo albumen oui diu concussum, aqua instar, modo lac vel lac muliebre: aliquando & cremor hordei. Adiecti quoque sero lactis (modo lactis) trochis. albi Rhafis; & ad magis consolidandum, ung. pompholygos cum a. bismine oui, liquore & aqua hordei, & sero lactis in fine cum lacte, ad magis consolidandum. Renibus quoq; inunctis, vt ardor vrinæ minueretur, cum ung. a bo Gal. aut vero santalino, vel etiam nutritio albo Rhafis.

SCHOLIA.

Penis varia vlcera patitur in diuersis partibus, vt dixim⁹. Alia sunt interna, alia externa. Rur- *Vlcera penis varia.* sus externa, alia sunt in glande, alia in præputio, vel mentula. Interna vel in extremitate, vel in radice, vel in medio. Hæc facilitate & difficultate curationis differunt, & medicamentorum formis facultatibusque. Quæ in externa parte, sunt putrida, phagedenica, & alia. Quare inuenta forma; recurrendum est ad aliarum partium vlcera, hoc tantum addendo, quod fortiter & sine morfu exsiccare debent hæc medicamenta. Illud genus horum vlcernm est, quod magna ex parte a lue Venerea initium sumit. Quod si communibus & propriis resistat remediis, ad vniuersalia remedia confugiendum, in vnguentis vel mercurium permittendo; vt recte docet Rondeletius. Si in interna præputii parte fuerit vlcus, & cura

4 *citra inflammationem, iisdem remediis curandum erit. Sin cum inflammatione, vel chymosi, medicamenta diluere oportet aquis, & syringa immittere. Quod si denudari possit, medicamentis fortiter exsiccantibus cito curabitur, ut unguento pompholygos, & cortice maligranati, vel cerussa v-
5 *la & lota, vel aloë lota, vel atramento scriptorum.* Pars facile fert talia medicamenta insigniter re-
ficcantia; pānus detritus carminatus frequenter mutatus, caua vlcera curat. Quod si putridum sit, tunc auripigmento in aqua ros. dissoluto, & plantaginis, pars curanda, ne amplius serpat, vel lixi-
uio cum paucis ægyptiaco, vel apostolorum; de-
inde ad mitiora deueniendum. Postquam pars a putri carne mundata est, supradictis remediis cu-
randa. Vlcers interna, ut diximus, vrina frequen-
ter irritantur, pus redditur cum vrina. Si vero sit in extremo penis, sponte fluit & cum digitis pre-
mitur vel cum cerea candela immittitur, & dolo-
rem sentit. Tunc considerandum, recens ne sit, vel antiquum. Si recens sit, cum quadam calfacti-
one, tunc leniter oportet detergere & refrigerare: ob id iniiciuntur aqua plantag. solatri, nenuphar.
myrtillorum: vel succi decoctiones, ut decoct. hordei
tum alia ut iam diximus; renibus quoque im-
positis refrigerantibus, & quæ ex oleis frigidis, leni-
terque astringentibus parantur. Si parum bibant, & parum meient, citius curantur: leniendo quo-
que ventrem, ut dictum est. In diuturnis vero v-
tilis est vsus decoctionis Guaiaci, prouocādo sudo-
rem. Euocat enim vrinam & facit, ut siccetur vl-
cus. Vomitus frequens non parum confert ad
huius curationem. Trochisci alkekengi, cum aqua
peculæ ros. & hippur. profunt. Non facile curantur
hec vlcers, ob lotium acre, quod nimis detergen-
do vlcus exasperat. Unguentum, quo curatus est
Agnelloni Taurini filius, a Petro Bayro Tauri-
nensi medico, qui habebat veretrum cancrum, & magna parte corruptum, quo quidem breui
tempore sanatus fuit: ℞. succi extremitatum mol-
liorum rubi. succi molliorum extremitatum plantag.
rosarum, aceti ana ℥ij. thuris, mastichis ana ℥ij.
libarg. aurei ℥ij. vini maluatici optimi ℥vj. succi
semperuiui ℥ij. aquæ vitæ ℥iij. viridis aris ℥ij. ℞.
vitrioli, aluminis combusti ana ℥j. ℞. thutia Ale-
xandrina preparata ℥ij. caphura ℥j. olei rosac. ℥vj.
pulueris subtilissimi pulueris sandis, & cribro ex-
ceptis, coquantur omnia simul lento igne. excepta ca-
phura, usque ad consumptionem succorum, & vini
maluatici, donec debitam formam unguenti decen-
ter mollis acquirant, addita q. s. cera; in fine additur
caphura. De eo ponatur supra partes exulceratas
extendendo super rasuram panni telæ antiquæ,
& super ipsum ponantur paruæ peciæ, infasæ in
aquis dictis: ℞. aquar. ros. plantag. & prunellorum
syluestrium ana ℥ij. solatri ℥ij. viridis aris ℥ij. thutia
Alexandrina preparata ℥j. ℞. caphur. ℥j. misc.
6 & applicentur ut supra. Intingere simbras, aut ra-
suram telæ veteris prædictam in melle rosaceo, &
aspergere subtilissimo puluere aristolochiæ ro-
tundæ, carnem mortuam corrodit, siue sit in vl-
cere, siue in fistula. Verum si pellis præputii non*

posset inuersioni, & vlcers remaneant in capite vir-
gæ; tunc sine apertione, propter præputii inflati-
onem, mundificantia per syphonem immittenda,
ex Auicennæ consilio. Tarantanus vtitur hoc la-
uatoria: ℞. vini albi optimi lb. ij. aluminis vsti ℥j.
℞. viridis aris ℥j. & ista puluerisata mittantur in
vinum, & tale vinum iniiciatur frequenter, & cura-
bitur vlcus, & detumesceat præputium, donec per se re-
uersetur. Id sequens valde exsiccatur & incarnatur vlcus:
℞. thutia, aloes, sarcocolla, thuris, lapid. hamatidis.
corticis canna combusta, gallarum balaust. acacia ana
℥ij. fiat puluis. & cum oleo rosaceo fiat unguentum.
Illud commendatur tam ad vlcus internū, quam
externum. Nam & pul. aloes & sarcoc. curat vlcus
virgæ non corruptum.

OBSERVATIO VI.

De Pene esthiomeno affecto, & ex corruptione
radicis exidente.

1 Inflammatione penis laborabat sartor quidam,
cuiusdam sartoris quoque filius, annum agens
vigesimalium nonum, vir procerus, niger, & robu-
stus. Quam inflammationem cum ex Venere cū
muliere infecta contraxisset, primum hoc ma-
lum non magnificiens, habens vxorem, matri,
(quæ etiam medicastræ erat) ut secretum maneret,
aperuit. Quæ eidem purgationem satis fortem,
ex electuario de succo rosarum præbuit. Inflam-
matione, vna cum inflatione virgæ ac testium au-
gescente, tandem chirurgum quendam adiit, qui
calida, nescio quæ admodum fortia medicamēta
membro virili cum apposuisset, intra tres dies to-
tum veretrum ad esthiomenum peruenit. Chi-
rurgus cum instrumenta omnia penes se haberet
parata, ut membrum nouacula abscinderet, me
tunc prius in consilium vocarunt. Cererum cum
ad agrum peruenissem, (decumbebat Delphis, in
domo angulari platea Chorea dicta) & animadu-
terem, esthiomenon totam virgam non solum
occupasse, sed vsque ad testes peruenisse; verebar,
si fieret totius membri abscissio, ut æger in mani-
bus chirurgi moreretur. Ab altera parte, cū cor-
ruptio adeo esset augmentata, ut penis appareret
niger, & corruptus, & quasi mortificatus, (ut me-
dico loquar) ac foetens; sciebam, iubere in eo casu
auctores, Guilelmum de Saliceto, Guidonem,
ac alios omnes, ut remoueamus totū illud, quod
denigratum ac corruptum est, cumq; illa ad for-
mam naturalem reduci non possunt; atq; id cum
ferro ignito, vel ungula, vel saltem cum causticis
medicamentis. Nunc si hoc fiat, (inquit Taran-
tanus) totum membrum corrumpetur, ac mar-
tidum fiet, & totum corpus tandem periret. Ve-
rum totum membrum nunc corruptum, (cuius
corruptio etiam processerat vsque ad testes) noua-
cula abscindere, ut chirurgus volebat, non satis
tritum in ea arte, cū periculosum mihi videre-
tur; consului, ut & collegam meum Cornel. Eri-
cium medicum, similiter vocarent, & Guilhel-
mum de Dalen, chirurgum lithotomum in hac
arena versatum, ut sic vna cōcluderemus, quid fa-
ciendū esset in tetam graui & periculosa. At con-
frater & collega, eo tempore leui apoplexia in

3 paralyfin mu ara decumbens. venire non potuit; sed chiru gus lithotomus accessit. Hic, cum vidisset, esth omenon adeo progressum fuisse, nullo modo membrum nouacula esse abscindendum nobilem iudicabat. Ideo communi consilio, h ec cataplasma omnium primo appositum fuit: \mathcal{L} . *farina hordei* \mathfrak{z} \mathfrak{j} \mathfrak{ss} . *farin. fabarum* \mathfrak{z} \mathfrak{j} . *decoque cum lacte* \mathfrak{z} \mathfrak{vi} \mathfrak{j} . *succo semperuue iniectis*, ad consumptionem succi, adiciendo pul. ros. rub. *florum chamomell. ana* \mathfrak{z} \mathfrak{j} . *misce.* Quo cataplasmate inflatio & inflammatio sedabantur ex parte. Attamen membrum putrescebat indies magis, febre quoq; in crescente. Ver æ sectio in principio nō fuit adhibita; nunc adeo debilis ferre non potuit. Nam habuerat primo enormes quoq; secessus, ex medicamento, nempe de succo rosar. a matre perperam exhibito. Quare, vt iuleb sequens sumeret, præcepimus: \mathcal{L} . *Aqua fumar. boragin. cichor. end. lupul. ana* \mathfrak{z} \mathfrak{j} \mathfrak{ss} . *syr. de ace. ositate curi, de fumaris, syr. nenuphar. ana* \mathfrak{z} \mathfrak{j} . *arom. cum* \mathfrak{d} \mathfrak{j} . *specierum triasant. & fiat iuleb.* Quia non poterat dormire, sub noctem utebatur hoc emulsorio: \mathcal{L} . *hordei mundati* \mathfrak{p} \mathfrak{j} *amygd. dulc. depilat.* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} *semin. quatuor frig. maior. mundat. semin. papau. albi ana* \mathfrak{z} \mathfrak{j} . *fiat hordei mundati* \mathfrak{p} \mathfrak{j} *adiecto z acchar. albissimo, vt artis est.*

4 Ceterum esthiomenos erat adeo aspectu horribilis, vt paulatim totum membrum vlcere nigro affectum in gangrænam transeunte, per præter putresceret, cum tanto foetore, vt nemo apud ipsum exsistere posset; & hoc in tam breui spatio: nam 28. die Februarii, anno 1571. ad illum prius acciti sumus. Dum itaque chirurgus Guilhelmus lithotomus putrefactas partes abscinderet, foetor adeo increbuit, vt vix, quod dixi, apud eundem permanere quis posset, dum vlcera gangræna infecta reficerentur. Febris insuper magis aucta, & ex fœ ore inflammatio gutturis & aphthæ subortæ fuerunt: pro quo accidente tertio die Martii hoc gargarisma descripsimus: \mathcal{L} . *decoct. hordei mundati, & glycyrrh.* \mathfrak{lb} \mathfrak{j} . *syr. viol. ex ros. siccis ana* \mathfrak{z} \mathfrak{j} *syr. granat.* \mathfrak{z} \mathfrak{ss} *misce. pro gargarism.* Etiam & hoc sequens: \mathcal{L} . *aqua solatri. p'antaginis ana* \mathfrak{z} \mathfrak{vi} \mathfrak{j} . *syr. quol. granat. diamor. ana* \mathfrak{z} \mathfrak{j} *misce. pro gargarism.* Pro fiti ac aliteratione capiebat hæc sequentia: \mathcal{L} . *syr. viol.* \mathfrak{z} \mathfrak{j} \mathfrak{ss} *syr. granat.* \mathfrak{z} \mathfrak{j} *misce.* \mathcal{L} . *syr. viol.* \mathfrak{z} \mathfrak{j} *syr. de limmbus, syr. boraginis, syr. granat. ana* \mathfrak{z} \mathfrak{ss} *rob. cerasorum* \mathfrak{z} \mathfrak{j} *manus Christi cum perlis* \mathfrak{z} \mathfrak{vi} . *fiat mixtura.* Ex hac sæpissime capiebat, tam pro febre alteratione, & vt cora putredine defendere-
rur: lumbis quoque inunctis; cum & ibidem dolorem sentiret, unguento rosato. At febris ob putredinem ad tantam perniciem deuenit, vt per septem dies deinde singultum pateretur, & ab omnibus pro deplorato haberetur; ita vt nos hominem moriturum, & quicumq; illi adessent, existimaremus: pro quo accidente hic nodulus, in ceruicia tenui, quam bibebat, suspensus, exprimē-
dus, præscriptus est: \mathcal{L} . *sem. anethi* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} *sem. pap. albi* \mathfrak{d} \mathfrak{ij} . *manus Christi cum perlis* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} . *fiat nodul.* Sexto Martii, ex hoc syr. sequent. sæpius sumebat: \mathcal{L} . *syr. viol.* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} . *E hoc iulebo 7. Martii descripto, iā ad singultum & febrem faciente, utebatur: \mathcal{L} . hordei*

mund. m. j. semin. & frig. maior sem. pap. albi ana \mathfrak{z} \mathfrak{j} *semin. portul. & actuca ana* \mathfrak{z} \mathfrak{ss} *semin. anethi, anisi, feniculi ana* \mathfrak{z} \mathfrak{j} *florum cord. p. j. glycyrrh. ras.* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} . *coquantur in aqua commun. pro* \mathfrak{lb} \mathfrak{j} . *coletur, & arom. cum spec. diatrag. frig. diarroa. abb. triasant. ana* \mathfrak{d} \mathfrak{j} . *addendo syr. viol.* \mathfrak{z} \mathfrak{j} \mathfrak{ss} *syr. acetos. citri. syr. ex infus. ros. ana* \mathfrak{z} \mathfrak{j} . *misce. & fiat iuleb.* Cum & tussiret, pectus, tam pro calore, quam tussi, inungi imperauimus, cum oleo viol. & amygd. dulc. simul mixtis. Postea febris desit, & partes corruptæ a chirurgo lithotomo paulatim amputabantur, vel excindebantur. Interea 9. Martii, his tabulis utebatur: \mathcal{L} . *specier. diatrag. frigid.* \mathfrak{d} \mathfrak{ij} *specier. triasant.* \mathfrak{d} \mathfrak{j} . *dissolatis in aqua borag. adiect. z acch. albiss. q. s. fiat confectio in tabulis.* Cataplasma supradictum continuo & veretro putrefacto & scroto similiter putrescenti applicabatur. Putrefactio erat ingentis magnitudinis, ita vt etiam ad testes vsq; procederet. Supra cataplasma pannum lineum duplicatum, & immersum in vino Rhenensi, ob foetorem, Guilhelmus de Dalen apponebat; altero chirurgo, qui illum male prius tractauerat, non redeunte. Inciderat autē chirurgus ille in fluxum diuturnum sanguinolentum, ex quo & cachecticus obiit, cū etiam asthma iam pridem laborasset. Chirurgus igitur lithotomus, qui apud agrum solum mecum remanserat, 10. Martii die partibus putrefactis abscissis, hoc digestiuum in locis bonis apponebat: \mathcal{L} . *terebinthin. select.* \mathfrak{lb} \mathfrak{j} *vitellos ouorum* \mathfrak{vi} \mathfrak{j} . *mellis ros. col.* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} . *oleos. ros.* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} *farin. hordei* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} . *fiat digestiuum secundum artem.* Decimo tertio Martii, etiam hunc puluerem incarnationum immiscuit bat digestiuo iam dicto. \mathcal{L} . *sanguinis draconis* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} *masticis, thuris myrrh. ana* \mathfrak{z} \mathfrak{j} . *gummi elemi tot. arm. veri, aluminis vsti ana* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} . *pulueriscentur subtilissime, & per pannum lineum cribrentur, & puluis vsui reseruetur.* Postea cum filamentis digestiuum per vinum tractum apponebatur. Deinde & 18. Martii, ad malam carnem consumendam, præscriptus est hic pul. præcipitat. ad \mathfrak{z} \mathfrak{ij} . & fuit adhuc semel reiteratus pul. suprascriptus ad vsum iam dictum. Verum 28. Martii die, vt magis pul. suprascriptus exficcaret & consolidaret, addebantur \mathfrak{z} \mathfrak{j} . *aluminis vsti.* Sed & 19. Mart. digestiuo hæc adiungebantur: \mathcal{L} . *gummi elemi. sang. dracon. ana* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} . *aluminis vsti* \mathfrak{z} \mathfrak{ij} . *fiat pul. subtilissimus.* Adiectus hic pul. fuit digestiuo, ad maiorem exsiccationem & consolidationem. Verum adeo putrefactio aucta est, vt totum membrum virile tandem ita putrefactum, cataplasmati adhærens, exciderit, & ablatum fuerit. Neque putrefactio scroto cessauit; quin in oita processit, vt vnus testis carne denudatus & carne scroti putrefacta, & ablata, corruptus videretur. Cum autem & febris & symptomata supradicta cessassent, & æger superstes in vita maneret, radicatus ad ventrem vsque virga ablata; præstitisset simul & testes ablatos fuisse, & eunuchum abique testibus vitam produxisse, quam irritæ, sine pene Veneris tingini obnoxium remansisse. Ad eum modum, licet scrotum corruptū foret, ac testes denudati cernerentur, & virga tota vsque ad pubem ablat. vlcus profundum

profundum spectaretur; tamen natura istis remediis adiuta, & optima chirurgi diligentia, profunditas illa carne tandem repleta fuit; & foramine paruo permanente, per quod deinde mingeat, carneque putrida prius amota, testes (*quod dictum mirum est*) denuo carne noua accrescente vestiti sunt. Hic autem æger egregie curatus, ex ventre per foramen vrinam emittens, cum mentula careret, tentigine quadam Veneris, ob testes, qui & postea sanati sunt, irritatus, & nescio quo furore agitatus, aliam vxorem duxit; qua tamen vti non poterat, nec Veneri sacrificare. Verum ille paulo post, vna cum aliis, vt Harlemum ab obsidione liberarent, profectus, exstinctus est: atq; vxor, quæ etiamnum viuit, alio deinde viro copulata, multas proles peperit.

S C H O L I A.

9 **H**oc certe exemplum admonet tam iuuenes, quam viros, vt a scortis abstineant, ne in talia, vel peiora mala, ira diuina in eos iuste sæuiente, incidant. Verum de his vitiis latius agemus libro de lue Venerea, si Deus nos superstites faciat. At hoc fere omiseram, quod huic ex longo morbo decumbenti (*nam intra duos menses prius sanus factus est*) in nate facta fuerit excoarctatio: pro qua curanda vnguentum de cerussa impositum fuit, & pul. cerus. per pannum lineum cribratus inspers. deinde & hoc præscriptum, ad maiorem exsiccationem: ℞. vng. cerus. ℥ ij. pul. lapid. calaminaris per pannum lineum cribrat. ℥ ij. misce. Fuit quoq; a nobis ita purgatus; dum chirurgus eundem nobiscum curaret: ℞. folior. senæ ℥ vij. rhab. select. ℥ j. β. sem. anisi ℥ j. schœnanthi β. infunde per noctem, facta prius leui ebull. in aqu. fumar. lupul. borag. ana ℥ ij. aqu. end. scabios. ana ℥ j. β. deinde fortiss. express. adde syr. de fumaria ℥ j. mis. pro ij. dosibus matutinis.

10 Accepit alternis diebus, cum minus febricitaret, & satis copiose aluum deposuit. In fine curationis incidit in dolorem coxæ & femoris, tandem & in inflationem quandā: sed istis remediis & hæc accidentia cessarunt: ℞. vnguenti dialth. olei vulp. lumbricorum ana ℥ β. vnguent. Agripp. ℥ ij. mis. Et impositum fuit emplastrum de mucilag. Cum adisset inflatio quadam cum duritie; & hoc modo adhuc semel purgatus: ℞. confectionis hamech, diacatholic. ana ℥ β. dissolue cum aqua fumaria, scabios. boraginis ana ℥ j. syrup. de fumo terr. de epirhymio ana ℥ β. misce, detur in diluculo; egregie, cum ab omnibus pro deplorato prius haberetur, fuit curatus.

OBSERVATIO VII.

De præputio non potenter reduci.

1 **N**ouimus iuuenem, cui, cum crebrius cum nuper ducta vxore Venerem lasciuior exercuisset, præputium, cole valde inflammato, reduci postea non potuit. Aduocatus chirurgus fotum adhibuit, ad inflammationem vtilem, & relaxantem, ex decocto malu. cotoneor. sem. lini. & malu. ac viol. & hyoscyami: cumq; cepisset detumescere, reducebatur: deinde leui strictura constructa, ad tempus tegebat glandē: donec tandem ind. stricta ipsius chirurgi æger perf. & curatus sit.

S C H O L I A.

A Etius lib. 14. cap. 15. Inflammata pudenda, inquit, rosarum aut meliloti decocto fouebis; vel folia betæ, in tenuissimas partes dissecta, & aqua feruefacta applicabis, quæ etiam ad præputia, quæ reduci nequeunt, vtiliter admoventur. Cataplasma vero e pane cum palmularum decoctione madefacto; aut malicorium in vino elixatum, & cum pane tritum illinetur. Aliud. Hyoscyami & lomenti (*scilicet. farin. fabarum*) singulorum partes æquales in aqua, vel brassicæ folio in aceto decocto apponito. In pene vero & alia passio contraria contingit huic, apud Paulum Phymosis dicta, cum glans a præputio denudari non potest, ob præputii stricturam. Sic os vteri, quando ita constringitur, vt virilem mentulam recipere non possit, Phymosis quoque dicitur: quæ duplex est. Aliquando enim est a naturali constitutione, quo minus aperta sit vulua; vt Rondeletius vidit vnam in Italia, Romæ. Nos quoque vidimus filiam obstetricis Alcmariæ, cui vulua adeo erat stricta, vt quasi per paruum foramen vrina exiret. Sed obstetrix, per me edocta, fecit leuem incisionem: & ita curata fuit filia. Id etiam ferunt de medico quodam doct. ssimo, quem nos nouimus, qui cū duxisset vxorem & phymosi vxor laboraret, facta incisione illam curauit, ex qua postea multas proles procreauit. Altera Phymosis fit ob tumorem, vel cicatricem contractam. Quæ naturali constitutione minus est aperta, vel omnino clausa, nouacula aperire oportet. Quod si aperta sit, sed nō satis, tentare oportet pessis, & spongia ad formam pessis formata dilatare, vel radice gentianæ: quos pessos ligare oportet filo, & indices crassiores immittere, & partem oleo relaxare, vel decoctione fouere vt facilius dilatetur. Oleum amygdalarum, liliorum, irinum, conueniunt, decoctio ex radic. bist. malua, vel cucumeris agrestis, ficibus sem. lini, fœnugræ. & sæpe fouere. Vnguentum hoc conficitur in omnibus causis valde vtile a Rondeletio, siue in vitiosa constitutione, & a natura, siue a cicatrice: vt ℞. mucilag. ficum & fœnugræ. ana ℥ j. styriac. myrrhæ, ammoniaci dissoluti in oleo irino ana ℥ j. cera noua q. s. fiat vnguentum, vngatur pars. Pauperibus adipēs anseris, gallinæ, vrsi, porci, butyrum, conueniunt. Vnguenta parata ad id profunt, vt de adipibus, pectorale, resumtinum, dialthæa, cœsyus humida, pessaria ex massa emplastri diachilonis conferunt. Quo minus adhæreant, vngatur prius oleo amygd. dulc. vel lilion. vel inuoluatur panno raro, & ligetur. Si merferint sensim, coitu dilatatur satis, præterquam quod voluptas dolorem tolerare facit, nisi mentula viri crassior, & foramen tam angustum sit, vt nullo modo caput mentulæ admittat. Paulus duplicem Phymosin causam adfert lib. 6. cap. 55. Aliquando enim inquit, si glandem præputium tegit, ne nudari possit: aliquando retrorsum deductū reduci non potest. Hæc species pp. ie Periphymosis dicitur. Prior itaq; differentia, aut ex cicatrice, qua in præputio cōcreuerit, aut ex carnis incremento, quæ illic coaluerit. Altera genitaliū inflammationibus fertur.

accepta, quoties deducto præputio glans intumuerit, nec ultra reducto operiri ea possit. Quomodo autem curentur per chirurgiam, vide locum citatum eiusdem Pauli.

OBSERVATIO VIII.

De ganglio penis, seu pudendi, ad Iohannem Duuium, Medicum.

- 1 **A**ffectus, quem vna, mi doctissime Iohannes Duuie, in Iodoco Augustino, fratre consulis Harlemensis, Harlemi diligenter conspeximus, est durities quasi scirrhosa, non solum glandem occupans, verum etiam neruum ipsius dorsi priapi; estque ex genere illorum, qua ad ganglia referuntur. Est autem ganglion nervi præternaturam coactio ac tumor: cuius causa, iuxta Galen. 6. Epidem. comment. 3. textu 14. varia est, modo a frigidityte in nervis, modo natura inutile deponente in gangliis, vel ex ictu, lassitudine, & laceratione, ut in pudendo priapismo laborante, quod dum vi distorquetur, fit, ut nervus dorsum ipsius priapi percurrens disrumpatur. Pariter ob nimiam salacitatem ganglion succedere solet, vel refrigerando materiam in loco congestam, vel quando materia, quæ naturâ sapit nervi, hoc est, pituitosa, tenax & per se frigida, fluit. Sûnt & ganglia, quæ sapiunt naturam cancerosam, quando fiunt a materia atrabiliari, quæ chirurgia minime sunt tractanda. Hoc est, quod Aetius dicebat lib. 15. cap. de ganglio, ex Philagr. Ganglion est, inquit, nervi tumor, plerumq; a percussione, vel impulsione præcedente, & raro sponte proveniens. Non dubito, quin hic aliqua impulsio præcesserit, membro quasi rigido, deinde etiam in meatu urinario admodum angusto, circa colem seu glandem caruncula videtur innata, ex ulceratione præcedente, uti Lambertus chirurgus, qui illum diu tractavit, prius vidit, pure ex guo excreto ante lotium exeunte. Stranguria etiam afficitur, aliquot guttulis in fine mictionis subsequentibus, ex acrimonia materiæ eo facile confluentis, & dolorem inferentis. Quod ad ganglion attinet, licet manuum radices & palmas, pedumq; plantas frequentius occupet, rarius cubitum & caput (ut Aetius refert, & Paulus lib. 4. cap. 16. & lib. 6. cap. 39.) tamen in aliis partibus, etiam in ipso pudendo, fieri potest. Quantum ad notas attinet, Aetio teste, occurrit tumor inæqualis, stupidum sensum in compressu excitans, differtque a meliceride & atheromate tumoris inæqualitate, & renitentia, & quod sicut illa orbiculatim non transferatur, sed dextrorsum tantum & sinistrorsum pro nervi situ flectatur. Sic & Paulus lib. 6. cap. 39. Ha comites (inquit) sunt nota, tumor concolor, renitens, indolensq;. At si violenter premas, stuporis sensum exhibet, non in alto, sed ipsa sub cute radices agens, & ad latera spectans. Sin autem vi adigas, tum ante, tum post, nequaquam id facit. Quod ad signa prognostica attinet, A gangliis autem (inquit Aetius loco citato) chirurgicum opus arceamus, præsertim si in manibus aut pedibus evenerint; sed medicamentis tantum curabimus. Idem refert Paulus lib. 6. cap. citato, inquiens: Quæ igitur in cru-
- 2
- 3

ribus, aut brachiis, aut summis partibus oriuntur, excindere tutum non est: periculum enim, ne particula reddatur mutila. At quæ caput aut frontem inuadunt, cute scalpello diuisa curamus; & si quidem parva fuerint, vulsella comprehensa ex basi præciduntur: si maiora, hamis trāsfixa excoriataque tolluntur. Oris futuris commissas medicamento ad cruenta apto persanamus. Verum si neq; in manibus, aut pedibus, chirurgia curetur ganglion, multo minus in pudendo; in quo etiā si sit curandum medicamentis, difficilis est curatio; in reliquis enim paribus non æque difficilis. Imo in pudendo, cum naturam canceri sapiat, & in cancerosam naturam facile mutetur (ut ingenue dicam) cum hic iam diu hoc malo laboraverit, nullam spem habeo, posse eum curari. Nā & ipse novi iuvenem Alcmarianum, qui, cum priapismo, & ganglio in pudendo, ut hic, laboraret, licet aliqui chirurgi curationem pollicerentur, longo tempore misere trahens vitam, tandem tamen mortuus est. Idem vereor & huic viro euenturum; eoq; magis, cum etiam excrecentia carnea intus in meatu urinario hæreat, unde modo stillicidio urinae, modo dysuria, aliquando & ischuria tentatur. Ideo diligenti curatione opus erit, eaq; varia, ob variam affectionem, quamvis vinculum quoddam habeat, ac symptomata inter se concurrant, in membro tam sensili & delicato. Caruncula enim intus latens medicamentis aptis, ut inter nos convenimus vna cum chirurgo, demenda ac auferenda est, cum candela cerea iisdem oblitata; idq; per chirurgum dextre administrandum. Ego in simili casu, præcedentibus uniuersalibus remediis, vna cum lihotomo usus sum remedio Alexii Pedemontani, descripto lib. 1. cap. 20. cui hic titulus præfixus est: *Ad sanandum vlcus carnosum in virga inueteratum. ℞. feces ex melle destillato, &c.* Hoc tamen non iuvante, vti sumus experimento ipsius Amati: (describitur autem cent. 4. curat. 19.) quo & f. liciter curatus fuit æger: nec dubito, si iisdem hic recte vtatur, quin ab hoc symptomate liberandus sit. Verum quod ad curationem ganglii in pudendo attinet, hoc opus, hic labor est: quamquam ad ganglion Archigenes (ut refert Paulus lib. 4. cap. 16. de ganglio) calcem viuam, vna cum adipe anserino, & terebinthina imponendam censebat. Utendum quoque medicamine, quod lapidem achatem recipit. Ad ganglion in pudendo alii vtuntur frictione, sed leui; & deinde veniunt ad styrac. ad laminam plumb. & ad emplastr. de muccil. hoc modo confectum: ℞. muccil. alib. fenug. sem. lin. cid. ana ℥j. ℞. ol. amygd. dul. ping. gall. ans. ana ℥ij. styr. sic. ℥j. plum. lot. ceruss. lot. ana ℥ij. ℞. cera par. mis. & vti. Præstat autem hic vti medicamentis emollientibus, dissipantibus & discutientibus; emolliitionemq; tentarem cum ol. amygd. dulc. de muccil. & aliis. Cōuenit & ammoniac. emollit. cū cera & oleo, ac impo. situm. Item styrac. sicca alba, emolita cum ol. amygd. dul. madef. et. & impo. sita. Ad discutiendum Aet. hoc vti tur: & ceruss. olei an. n. q. res. pini ana lb. ℞. cer. ℥j. ammoniac. thymam. ga. b. ana ℥j. ℞. ceruss. cum oleo decoquit. donec non amplius

simplus inquinat; deinde ammoniacum tritum, postea resinam & ceram: tandem galbanum premollitum adiecit. Eadem fere probat Oribasius apud Paulum loco citato. Hæc sunt, mi Duue doctissime, quæ de morbo Iodoci Augustini censeo, ad quem vna acciti fuimus 21. Decemb. die, anno 1584. ad quem postea etiam cum Theodoro chirurgus & lithotomo vocatus fui. Vale.

S C H O L I A.

Excrefcentia carnea intus latens in fistula urinaria, unde lotium minus reddere poterat, fuit quidem curata. Sed ganglium in pudendo in maiorem scirrhosam materiam commutabatur; quâvis primo nostris remediis aliquanto melius habere videretur. Verum postea in inflammationem, atque etiam febrem incidit: quare, post nostrum discessum, ut in morbo periculoso fieri asolet, ad diuersos chirurgos & empiricos, sanitatem ipsi magnifice pollicentes, se contulit. Malum interea semper in peius vergens, ad cancerosam, ut prædixeramus, naturam deuenit; factaque corrosione, & insuper fistulis, uti nobis relatum est, in pene obortis, biennium tantum, ægre vitam trahens, superuixit; ac tandem misere ab empiricis excarnificatus, doloribusq; & vigiliis consumptus, ut longo antea tempore prædixeramus, vitam finivit. Animaduertant igitur Medici tum chirurgi, si in similem casum incidant, ut non tam facile sanitatem, uti homines imperiti ac temerarii, polliceantur: quamuis enim prima fronte, uti in aliis locis, ganglion videatur curatu facile, tamen in pudendo non ita curatur, præcipue ubi malum protractum fuerit, ut in hoc Iodoco euenit, qui iamdiu isto malo laborauerat antequam ad eum acciti essemus.

OBSERVATIO IX.

De Priapismo.

Inter multa adeo (ut recte annotauit Donatus ab Altomari) atque admiranda instrumenta, quæ ad generis propagationem a natura sunt comparata, nihil minus admirabilem constructionem inspicias ipsius pudendi, seu colis: corpus liquidè nervosum, cauum, seu cauernosum & durum, ex ossi quidem emergens, non aliter, quam reliqua alia ligamēta, eo dumtaxat ab eis discrepans, quod cauum, atque cauernosum sit, propterea, quod eius utilitas ita flagitabat, ut 15. *De usu partium, a Gal. scriptum est.* Cum namque libidinis impetu quispiam stimuletur, volentibus nobis pudendum ipsum intendi debebat exacte, nedum coitus causa, sed ut semen, quam longissime ab eodem iaculetur: propterea eius essentia talis est, qualis in nulla alia nostri corporis parte est videri: nervosum siquidem corpus existens (ut diximus latius in Prefatione) ac omniquaque fistulosum & durum excepta ea parte, quam glandem vocant: distenditur autem protinus ubi ad coitum animal insurgit a naturali facultate, quæ illum attollere potest. Nam eas actiones, quarum gratia a natura partes instituta sunt, protinus ab initio citra doctinam aggreduntur, cum usus requirit; eodem m. Gal. auctore 6. *De loc. aff.* Verum cum sic extensus

fuerit a vaporoso spiritu ab arteriis influente, in tumorem attollitur. Atqui a spiritu in tumorem ipsum attolli manifeste patet iis, qui celeritatem eius, & cum intumescit, & cum iterum residet, perpendunt; spiritu eodem modo eius extensionem sequente, quemadmodum pulmo thoracem, ob eam quam habet ad motum ipsius sequelam. Et ob hanc rem repletis fistulosum nervum spiritus vim cum ad coitum irrumpit animal non ad arterias proprie referre debemus; sed ad eiusdem nervi propriam actionem, quæ ex propria eiusdem partis essentia proficiscitur; ut liquet eodem 6. *de loc. affect.* Etenim probabile est, vniuersi corporis arterias eandem habere actionem, quippe cum eodem tempore totius animalis omnes inter se se similiter producantur. Itaque haud quaquam par esse videtur, ut arteriæ pudendi siquid aliam quampiam habeant facultatem, præter eam, quam antea in toto corpore habebant, nisi quod ampliora sint ipsis, quam ceteris arteriis ora: & quidem iure optimo, ad celeritatem sequelæ, ad id, quod euacuatur, sic præparata. Sæper enim natura, quod unicuique actioni vile est, undique explere videtur. At quoniam quandoque euenit, ut nullo præcedente ad libidinem stimulo, atque desiderio, talis fiat pudendi, seu colis, extensio in longitudinem, atque circulo quoque totus augeatur, propterea afficitur quidam excitatur, quia Græcis *πριαπισμός*, Latine quoque *Priapismus* dicitur, deducta denominatione a priapo, quem ita finxerunt, atque pictura descriperunt homines, quasi ei suapte natura huiusmodi coles esset; eod. Gal. auct. citato lib. 6. *De loc. aff.* Sic quidam viator (a Cicrone stator dicitur) loco tempore, noctu præcipue, priapismo laborauerat, non tamen proprie dicto: nam in die liber erat ab hoc vitio: tamen per totam fere noctem rigidum manebat membrum, ut eidem molestissimum esset. (Interim hoc vitium & eodem modo curari debebat, cum longo tempore hoc malo laborasset. Sed de vero priapismo latius in Scholio dicemus.) Cum hic alterius Medici medicamentis frustra usus esset, me anno 1589. mense Maio consultandi causa accessit. Huic consului ut victu attenuante vteretur; cum & pharmaca eiusdem facultatis attenuatorum citra manifestam calfactionem his conveniant, ut Gal. docuit *De compos. medic. secundum locos* Ideo & victum eidem præscripsi, qui & flatui aduersaretur, & siccaret, ex mente Gal. ut ad longum refert 14. *Methodi medendi.* Quamobrem etiam consului, ut a cibis calidioribus abstineret, qui materiam in spiritum resolvunt, aperiuntque arterias tendentes in pudendum. Et ut non solum ab eis abstineret, imperavi, verum etiam & ab his qui viscosum humorem pariunt, aut multum seminis efficiunt; quemadmodum & Alexandro Tralliano visum est. Nam & auctores in primis huius morbi diebus ad tres dies inedia eos asseruant, deinde cibum paucum generis frumentacei, qui leuiter attenuare valeat citra manifestam calfactionem, atque omnino nihil inflantem, exhibent (ut Actius quoque facit;) eosque in aqua potu continent, seu ea in qua coriandri semina præparata

fuérint incocta. Verū cum iam diu hoc malo laborasset, tam stricta dēta opus non erat. Tenuem itaque ceruissiam concessimus, modo a vino, præsertim rubro, & aliis nutrientib. abstineret. Motu quoque, tum exercitio, ut vteretur, mandauimus. Commendant autem auctores, lusum parue pilæ, & frictionem partium superiorum. Præcepi quoque ut in latus decumberet, & ut in lecto substerneret, quæ semen extinguunt; veluti viticis semen, vel folia & flores; cum credantur non comesta tantum, sed & in potu sumta, & substrata, Venerem cohibere: nam & matronæ in Thesmophoriis Atheniensem castitatem custodientes, iis foliis cubitus sibi sternebant. Similiter ut a spectaculis, narrationibus, turpi consuetudine, imaginatione, ac commemoratione eorum, quæ Venerem excitare queunt, ut penitus se arceret consului, licet uxorem habens noctu magis hoc malo detinebatur, si supinus dormire; & si se in latus volueret, fac le tamen in somno in tergum verte-batur. Id eo vnice studeret, ut in latus decumbere posset, admonui. Nam qui præter victum calidū, ac humidum, quo semen rursus gignebatur, etiam a turpibus desideriis non cessarunt, hi quoque post mortem rectum intentumque habere pudēdum deprehensi sunt, ut ref. *re Alexander Trallianus*. Nulli etiam Venus prodest, nisi quibus ex huius abstinentia semen abundare conicimus, ut inquit *Paulus*, quemadmodum cuidam amico Galenus consuluit, modo post seminis excretionem, postea a narrationibus, spectaculis, ac meditationibus libidinem suscitare potentibus summo opere caueret, ut ab eodem 6. De loc. affectis scriptum est. Quod ad remedia attinet, cum hic faciem rubicundam haberet, & sanguine abundaret consului ut sectionem venę admitteret statim ex vena basilica in brachio dextro, sanguine utriusque extracto.

6 Nam quod ad medicamentorum rationem attinet, priusquam ad medicamenta veniamus, totū corpus vacuare oportet, modo id capax vacuationis sit, ea tamē utemur vacuatione, quam æger aptissime sustinere possit: & quoniam iuuenibus magis, quam aliis ætatibus hoc excitatur vitium, ex Gal. auctoritate; ea propter his sanguinis missio præcipue est salutaris; ceu nec ætate eorum tam reusante, ut idem *Galenus* fatetur lib. eodem 14. Meth. cap. 7. A principio itaque statim propter dolores & inflammationes ab hac affectione prehensis venam secare conuenit; potissimum si multo semine abundant, ac præter consuetudinem a Venerem se abstinerint. Huic etiam, quamuis iam quinquagesimum annum excessisset, & licet iam principium præterisset, tamē venę sectio moderata adiumento fuit. Commode vero secatur interna dextri cubiti vena; utpote quæ celerrime, & plurimum ex iis quæ principes sunt partibus, corpus vacuat, ut quarto *De rat. victus in morbis acutis a Galeno decretum est*: nec non & ab inferiorib. eadem promptissime reuellit. Præterea ad reuulsionem hoc vel simile vomitorium commendatur: *℞ rad. asari ℥j. bulliant in ℥x. aqua ad consumptionem medietatis, colem; colatura adde oxy-*

mellis simplicis ℥ij. fiat vomitorium. & capiat repide; & post quartam partem horæ, iuris pinguis gallinæ sumat ad uncias quinque vel plures; & post exiguum spatium, digitū in ore ponat, & sibi ipsi vomitum prouocet. Vbi enim & vitiosi humores in corpore redundarint, licet purgatione sit utendum, in priapismo potius vomitum Gal. 9. De compos. medic. & *Paulus lib. 3. cap. 57. De Priapismo*, commendant. Interea tamen in illis (licet vomitus auersionis causa fiat) qui vomitoriis uti recusant, leuioribus quibusdam medicamentis aluum subducentibus uti possumus, quæ vicinas partes fluxione haudquaquam infellent, cum neque id etiam Galenus, nec Aetius negarint. Sic etiā optimū duxit Aetius, (ex mente Gal. lib. 11. cap. 32. De Priapismo & Satyriasi,) aluum submolli-re per betæ & maluæ decoctum, pauco mercurialis succo admixto; concharum item decoctum in potu exhibendum; ab efficacioribus autem purgantibus pharmacis in totū abstinendū. Consului, ut mannam, seu mel aere m sumeret, talia enim sunt nostro æuo quæ leniendo purgant; veluti & *Zaccharum violaceum, syr. ex pluribus infus. rosarum, vel violarum, & reliqua eiusmodi*. Quamuis & clysteribus lenibus emolli-re possimus, & betæ & maluæ decocto ut iam diximus ex Aetio; nam acerbis abstinere oportet. Noster æger maluit istis superiorib. per os uti. Post leuem purgationem imperavi, ut decoctum sequens sumeret, in hunc modum descriptum: *℞ rad. nymphae cum floribus albis ℥ss. portulaca. lactuca. mentha ana m. j. ruta ℥ij. semi. agni casti ℥j. ss. flo. nymphae albap. j. fiat decoctio in aqua communipro lb. j. colatura adde syr. menthacei, pap. ana ℥j. syr. nenuphar. ℥ss. misc.* Valde id cōmendabat, & ideo sæpius reiteratum fuit. Ea equidem sunt præbenda, quæ naturali efficacia prædita per experientiam sunt inuenta, veluti est nymphae semen ac radix, viticisque semen (agni casti nostris dicti) ac etiam rutæ: ea namque potui exhibenda sunt. Leonellus probat syr. ex ruta confectum. Ruta etiam viridis obsoniis admiscetur, ac ipsum rutæ semen copiose comedatur: non tamen a principio hoc fiat, sed posterius post aliorum extenuantium usum; nymphae autem semē & radix a principio præberi poterit, ex sententia eiusdem Galeni præcitatis locis. Est namque illud commune præceptum omnium ferme quos vitiosus succus creat morborum, quod in fine calfacientibus & siccantibus sit utendum; quippe hæc quod reliquum humoris sit, prorsus absument, ut ipse inquit. Præterea imperauimus, ut lumbos inungeret sequenti vng. *℞ ung. infrigid. Gal. ros. vng. sandalini, ana ℥ss. misc.* & ut totum priapum inungeret vnguento ros. Sic Aetius quoque, loco citato lumbis admo-uet ea, quæ euidenter refrigerant, velut est *solanum, portulaca, hyoscyamus, & sempervivum*. Necessario etiam colem & intercapedine, inter anum & pudendum ex aliquo leniter refrigerante illinit; velut est argenti spuma, cimolia, & cerussa, si aceto aut posca, aut aqua sint diluta. Optime autem conducit, iuxta eundem, ex sententia quoque Galeni, ceratum ex rosaceo optimo apparatus,

ratum & frigida aqua sæpe elotum, si tum puden-
dis tum lumbis imponatur. Sic & Paulus lib. 3. c. 57. de
Priapismo Notum vero, inquit est cumbere, particu-
las non esse calfaciendas, sed leniter refrigerandas. e-
ratorosacco cum aqua contuso, item chamamelino in
genitali & lumbis impositio. Aetius quoque irrigat
(idque post venæ sectionem) ab initio pectinem &
coxendices vna cum pudendo ex lanis succidis vi-
no & oleo imbutis. Nam & ipsi particulæ laboran-
ti medicamentum, si ea calidior sit eff. Et, quod
ad portionem caloris abundatis refrigeret impo-
nendum: sin aliter, inter initia quidem omnino,
quod modice refrigeret, postea vero id necesse
non est. Pari modo & quæ circa lumbos sunt par-
ticulæ omnes eiusdem facultatis medicamento
sunt comprehendendæ, ex eiusdem Galeni mente,
eodem 14. Method. medendi. Valde namque frigi-
da, præsertim, quæ astringunt, & torporem indu-
cunt, cauere oportet, ne affectus difficilis ad discu-
tiendum reddatur; ut Alexander inquit lib. 9. c. 10.
De Priapismo, præsertim ubi hoc vitium ex flatuo-
so spiritu in cavernoso nervo orto fuerit excita-
tum: nam quæ siccant ac flatum discutiunt absque
valido calore hoc modo affectis adhibenda sunt.
Ceterum huic nostro ægro etiam consului, ut cu-
cubitalas cum scarificatione natibus imponeret.
Hoc & Aetius ex Galeno his verbis iubebat: Quod
si, inquit, diutius duret affectio, et in cucurbitula
cum scarificatione affigenda sunt: & si amplius san-
guinis multitudo adiacere videatur, hirudines ad-
hibenda in ipsum locum; cataplasmata vero imponen-
da sunt ex cruda hordeacea farina. Idem Paulus
etiam in satyriali suadet lib. 3. cap. 56. At nihil æ-
que in hoc ægro profuit, ac radix nymphææ de-
cocta & pota, eo modo, ut superius dictum est. Sed
cum ex toto non curaretur, denuo ad empiricum
lapsus est.

S C H O L I A.

Priapismus, iuxta Paulum lib. 3. cap. 57. est fir-
mum genitalis incrementum, quod in lōgum
latumque intumescit, citra Veneris appetentiam.
Vel est affectus (ut Aetio placet lib. 11. cap. 32.) ten-
tatio pudendi, atque auctio in longum & spissum,
citra rei Veneris appetentiam, ex caliditate qua-
dam acquisiticia cum inflammatione quadam &
dolore locorum consistens. Galenus autem 6. De
locis affectis, Priapismum esse dixit, cum coles & in
longitudine & circulo totus augetur, nullo sti-
mulante ad libidinem aut desiderio, aut acquisi-
ticio calore, ut quibusdam accidere consuevit, qui
supini decumbunt. Verum breviori compendio
(ut ipse inquit) dicere poteris, Priapismum esse
permanentem colis, aut auctioem, aut tumo-
rem. Idem 9. De compos. medic. secund. locos ait: Pria-
pismus est auctio pudendi stabilis in longitudinē
ac orbem tumefacti, citra rei Veneris appeten-
tiam. Consulto autem ab eo (inquit Donatus) ad-
dita sunt verba illa, aut acquisiticio calore: nā ubi
ob supinum decubitus calfacti sunt lumbi adeo
ut coles extendatur, etiam nullo stimulante ad li-
bidinem desiderio, haudquaquam priapismus
dicitur, sed par est (ut idem Galenus inquit) ut cal-

factis lumbis & artibus etiam calidiores res reddan-
tur, & propterea magis pateant earum ora; quam
ob rem non exiguum tunc spiritus essentiam in
fistulosum nervum effundant, qui paulatim im-
pletus, colem extendit, stimulante ad libidinem
ipso calore ob supinum decubitus acquirit orat-
tamen neque firmum, neque stabile incrementum
erit. Et deo noster hic æger laborans
nocte erectione pudendi, in die nequaquam, pro-
xime accedebat ad priapismum; & eodem modo,
ut verus curari debebat. At uenisse ille Alcm-
arianus vero priapismo mortuus fuit. Quam peri-
culosum quidem hoc malum sit, priapo semper
rigido & intento permanente, & nunquam flac-
cescente, postea de signis prognosticis dicemus.
Quod vero priapismus colis, seu pudendi affe-
ctus sit, ex Galeno patet 6. De locis affectis. Ipse
namque, siue præcipuo & proprio affectu, siue se-
cundario & per consensum, afficitur, prout diuer-
simode affectio hæc generationem habet, ut dice-
mus: illudque confirmari poterit ex eiusdem fun-
ctione læsæ: autem eius functio, ut protinus
stimulato ad libidinem animali distenderetur na-
turaliter ab eius naturali facultate: tum vero nul-
lo præcedente desiderio aut libidinis impetu, ne-
que supino decubitu ipsi se intus distenditur, cuius
distentio præter naturam existit. At ipse affectus
morbus est in magnitudine & quantitate: nam
ex inflationum genere existit, ut inquit ex eodem
Galeno 14. Method. medendi. Præter autem inquam
erectionem pudendi priapismo laborantibus do-
lores contingunt quales tetanici habent, & ii, qui
reliquis membris distenduntur: etenim in flatum
& distentum pudendum ipsum consensionis mo-
do afficitur, ut testatur Aetius. Causam vero Pau-
lus dicit esse flatulentum spiritum, particulam in
tumorem attollentem, humorum viscosorum
crassorumque sobolem, modici caloris beneficio.
Iuxta Aetium. Fit hæc affectio aut ob dilatata ve-
narum in pudendo ora, aut flatu vaporoso iuxta
antrorsum nervum, ipsum inquam pudendum,
oborto. Mihi autem, inquit Galenus, propter v-
trumque fieri videtur; sæpius tamen ad dilatata ve-
narum ora consequi. Aliquando autem propter
abstinentiam a rebus Veneris quidam hac affe-
ctione apprehenduntur; atque hoc ipsi in eis, qui
multo sanguine abundant, simulque præter con-
suetudinem a concubitu se abstinere, evenit, quū
non per frequens & multum exercitium sangui-
nis abundantiam discussint. Maxime vero hoc
illis contingit, qui rebus quidem Veneris opus
habent, in imaginationem autem ipsarum perve-
niunt per visiones, quæ ipsos in rerum Veneriarum
recognitionem impellere possunt: aliis etiam, qui
mali succi alimentis ac acerbis usi sunt: atque et-
iam quidam ubi ante nequaquam cingi consue-
vissent, in hanc affectionem incidit, cum de obus
meritis peregre proficisceretur, ex Gal. testimo-
nio. Fatetur idem experientia & ratione se vidisse
hanc affectionem excitatum ob arteriarum iam di-
ctam dispositionem, semel autem ob ipsius ner-
vi præcipuum ac proprium affectum. Perpetuo

Qua pars in
priapismo
afficitur.

Quis affe-
ctus præter
naturam sit
priapismus.

Causa.

31

Immediata
priapismi
Causa.

11
Priapismus
quid sit.

Causse ex
Neotericis.

14

tamen halituosi spiritus impletio affectum hunc
ex itat: *ut 14. Meth. med. 3. de causis symp. & 9. De
compos. medicament. secundum locos*, scriptum est:
ex humoribus viscosis ac crassis per moderatam
caliditatem interim genito eodem halituoso spi-
ritu. Neoterici hæc addunt, *ut Rondeletius*: Præ-
ter id, quod fiat ob flatum neruum cauum disten-
dentes, aut arterias calefactas, & orificia nimis di-
latata, fit etiam interdum his, qui coitu incalue-
runt; & tunc videtur lassitudo tensiva. Etiam fre-
quentius ob penis vlcerà, quæ cum calfactione
sunt tuncque distenditur, vel quia inflammatio
est in glâdulis parastatis, vel quia vlcus est in sum-
mo pudendo, ad quod curandum aliqua acria po-
nuntur. Idem accidit iis, qui Venerem sopitam
in muliere volunt excitare, medicamentis, siue
balano appposito. Alii fieri volunt sicuti & satyria-
sin (*de qua postea*) ex sanguinis aut spermatis mul-
titudine; vel ex prurigne seminis, eiusque acuita-
te & caliditate: vel ex multitudine humiditatum
præparatarum, ut vocant, unde fiat semen: vel ex
multitudine ventositatum erigentium virgam.
Tarantanus vero ad ventositatem refert: nam hu-
mor non tam cito evanescit & causa antecedens,
inquit, est pauca caliditas, quæ infert illam vento-
sitate: estque illa ventositas multa, crassa, non
facile solubilis. Et causa huius ventositatis ma-
terialis est multa humiditas in vasis spermaticis,
vel locis vicinis. Signa autem priapismi sunt ma-
nifesta, quia tensio pudendi adest magna & terri-
bilis, ita ut venæ ac nervi ita tendantur, ut dolo-
rem inferant. Et si sit materia in vasis spermati-
cis a qua fiat ventositas, fit cum tremore, saltu, &
iactigatione. Vel melius, *iuxta Galenum*, si sit in
eodem fistuloso nervo flatuosus spiritus genitus,
ex continua eiusdem, quæ præcessit palpitatione
dignoscitur: quemadmodum e diverso, ubi su-
pra modum arteriarum ora, quæ ad pudendum
deveniunt, fuerint patefacta, atque propterea af-
fatim spiritus multitudo ad ipsum colem affluat,
nullum tale symptoma præcedere solet. Incidit
hoc vitium non sane multis, sed iuuenibus magis
quam aliis ætatibus, *ut inquit Galenus 14. method.
meden.* Neque ipsum despiciendum erit. Nam ex
præcipiti perire solent, nisi confestim eis auxiliū
feratur, *Act. o teste.* Cum vero moriuntur, ventre
inflantur, & frigidum exsudant: id quod & eis e-
uenit, qui aliis convulsionis modis perimuntur.
Ira & Avicenna, Nisi cito succurratur, tetano af-
ficiuntur, & vasa spermatica conuellantur, & in
pudendo, seu veretro, causabitur apostema, ob de-
flexionem & concursum humorum ad locum af-
fectum, unde & in mortem præcipitantur. Quod
senes minus hoc vitio afficiantur, in causa est,
quod exiguum habent calorem, non sufficien-
tem dissolvere talem humorem, a quo eiusmodi
ventositas generatur. Curationem vero iam di-
ximus in *Observat. præcedente ex Galeno, Actio. &
Paulo.* Neoterici quoque abstinere ab omnibus
medicamentis, & alimentis semen augmentanti-
bus & ventositatem generantibus; præscribunt
vomiturum ad diuersionem; & incipiunt a venæ se-

Signa.

15

Signa caus-
farum.

Prognostica

16
Curatio.

ctione, de qua satis dictum est; & ventrem non
soluunt medicamento solutiuo, ne cū fluxu ven-
tris materia inferius deriuetur; membraque supe-
riora fricant & exercent, inferiora nequaquam
coitum inhibent, nisi necessitate compulsi, in iis,
qui longo tempore a coitu abstinerunt, atque
eius causa in hunc affectum inciderunt: præscri-
bunt, quæ vi occulta profunt; ut rutam, agnū ca-
stum, licet calida, cum & ventositatem consumat,
& generationi seminis resistent; frigida vero, ut
caphuram, portulacam, nymphæam, cum libidi-
nem extinguant: secant venam, *ut dictum est*, &
vomiturum incitant eum oxymellite, & usu rapha-
ni, vel aliis: dant muccaginem psillii cum aqua ne-
nuph. vel portulacæ: fouent virgam & genitalia
eum aqua decoct. rutæ, & agni casti, & similibus
ad ventositates carminandas. Leonellus hoc for-
tutur, si sit a ventositate: *℞. pulegii, calamintæ,
origani, anam. b. carui, anisi, ammeos, fœniculi, cumi-
ni, anæ, ʒij. bulliant in aqua q. s. virga spongia fo-
mentetur: sed hæc satis calida sunt.* Si nimia ca-
liditate, utitur frigidis & caliditatem extinguen-
tibus. Valet tenere virgam in aqua frigida, & in-
ungere oleis frigidis, ros. nymphæ, adiecto mo-
dico aceto, & tenere membrum virile extra aerem
discoopertum circa coxas; renesque & virilia in-
ungere & fouere cum succis herbarum frigidis. In
cibo vtendum portulaca cum aceto; & succum li-
monis sumere, & acetositatem citi, iisque cibum
condire, vtile est: pectinem iis quoque inungere,
vel eidem admoovere. Consultum sit & laminam
plumbeam, & cerata in frigidantia peni & lumbis
applicare. Si sit ex multitudine spermatis, fiat ve-
næ sectio, & vomitus. Si contingat (cum & vlcerà
sanguinem arteriosum & flatuosum trahant, qui-
bus distenditur penis) ob copiam spirituum san-
guinis & seminis, secetur (*ut Rondeletius consu-
lit*) vena poplitis, aut saphena. Postea foueatur
pars, & illi partes vicinæ aqua frigida, vel succo
plantaginis, nenuph. vel aliorum repellentium. Et
sic ubi erigitur virga ex multitudine spermatis, vi-
tet illa, quæ augent & multiplicant sperma; & vta-
tur illis, quæ semen extinguunt, ac minuunt. Et
propterea si malum ortum fuerit ob medicamen-
ta Venerem irritantia, abluantur aqua tepida, &
foueatur posca, cessabitque affectus. Si vero ob
medicamenta acria, auferatur repellaturque a parte
illa sanguis attractus. Si ob vlcus internum, abluat-
ur & refrigeretur, iniecta aqua nenupharis, myr-
thi, plantag. vel solatri. Bibant omnes aquam, pa-
rum comedant. Quod si post immodicum coitū
id accidit, oleo ros. vel oxyrhod. foueatur, & ob-
ambulet per loca frigida; quod in omni causa est
vtile; ut & frigida abluere pedes, & refrigerare re-
nes. His enim partibus refrigeratis, nunquam pe-
nis distenditur, aut erigitur. Ob id vng. albo Ga-
leni (*ut nos fecimus*) refrigerantur renes, peri-
næum, & plantæ pedum, vel vng. popul. vel cera-
to sandalino, vel vng. albo Rhal. ex ceruis; vel fiat
tale: *℞. olei nenuph. ʒij. cerussæ ʒij. aceti ʒij. misc.
fiat ut nutritum, vs. hanc adde caphura ʒj. agni ca-
sti ʒss. unguatur partes.* Si perseveret morbus,
Ronde-

17

18

19

Rondeletius etiam clysterem mollem refrigerantem iniicit, in quo dissolvantur succi cicla ꝑj. mel. viol. butyri ana ꝑj. olei viol. & nenuph. ana ꝑj. Si medicamento opus sit, detur cassia cum decoct. malua, & sominis agni casti. Intus non est inutile dare tabulam vnam diagalangæ, superbibendo parum aquæ endiviæ, ad discutendos flatus, & alia plura præscripta De colica a flatibus, & tympanite, si ob flatus morbus fiat. Vbi pruritus spermatis, & acritas & caliditas in causa sint, potius lactis acetosi convenit, a quo extractum est butyrum, & lactuca, & portulaca. Quocunque modo hoc malo tentantur, abstineant ab flatuosis, & quæcunque fomitem Veneri subministrant; ut rapum, capis, crucca, eryngio, satyrione, lacte, dauco, & similibus.

OBSERVATIO X.

De Satyriasi.

Monachus quidam salax, (ut nobis relatum fuit Bononiæ, cum ibidem praxin cum præceptoribus observaremus) incidit in satyriasin, cum imaginationibus Veneris valde indulgeret; adeoque tentigine, non sine dolore, in Venerem stimulabatur, ut furore quodam agitari videretur. Is, ut tentiginem illatam reprimeret, mentulam in ollam aqua frigida plenam immergit; sed ex vehementi motu cum veretrum moveretur, ollam in frontem impexit: accitus Medicus ut cicatricem inflatam curaret, rem gestam cum magno risu aperuit.

SCHOLIA.

NVM hæc historia, satis certe ridicula, vera sit, penes illum, qui nobis narravit fides sit. Verum quod ad Satyriasin attinet, vno capite auctores, ut Aetius de Priapismo & Satyriasi vna scribunt: sic & neoterici omnes, ut Rondeletius, Donatus, & Tarantani, ac alij cum eadem etiam sit curatio. In hoc enim tantum differt priapismus a satyriasi, quod in priapismo mentula erigitur sine desiderio coeundi, ad differentiam tētiginis, quæ fit cum homo ad coitum stimuletur. Si palpitatio accidat, dicitur Satyrismus, vel Satyriasis. Neoterici, ut Tarantani atque alij, licet sub vno capite tractent de hisce duobus affectibus; atque adeo in aliquo conveniant; tamen etiam in aliquo differre fatentur: quia scilicet, ut etiam idem Tarantani ex Gerardo Cremonensi citant, in priapismo non est concupiscentia coitus, nec per coitum mitigatur: in satyriasi vero est virgæ erectio sicut in priapismo: & insuper adest concupiscentia coitus, & per coitum, ut ipse ait, sedatur. Græci tamen simpliciter dicunt satyriasin in hoc tantum differre a priapismo, quod cum eodem colis tumore, seu augmento, eiusdem colis palpitatio contingat: ut recte etiam docuit Paulus lib. 3. capite 56. qui seorsim de satyriasi tractat his verbis: Satyriasis naturalium palpitatio, qua nonnulli seminis vasculorum inflammationi cum intermissione superne: hæc nisi finiatur, eadem generura conceptacula in languorem resolutionemque, aut convulsione, ex hoc vitio solet precipitare. Moriunturque et

convulsione ista celeriter homines, cum tumore alio, & frigido sudore. Quare & non minus malum est, secundum Paulum, quam priapismus. Satyriasis vero, vel Satyrismus, dicitur a Satyris, qui a poetis finguntur veretro extento ob lasciviam. Curatur ut priapismus: quamobrem vno eodemque capite de utroque affectu agunt plerique; Paulus tantum ut dixi, de satyriasi seorsum tractat. Igitur, iuxta eundem loco citato, sanguinem protinus dimittere convenit, victu uti tenui, & abstemio, eumque assumere quotidie, valenter nunquam, sed paulatim. Laudatissimum igitur est remedium beta, malua, & mercurialis momentum, & ius esculentum cochlearum: quibus Aetius (ut Scholio precedenti dictum est) ad priapismum quoque utebatur. Nil mali fuerit, iuxta eundem Paulum, etiam ex simplicibus clysterem ab inferiore parte iniicere. Quæ vero urinam movent potestates, & hic cavenda sunt: lumbis refrigerantia quoque admoveere oportet, ut solani succum, aut portulacæ, aut alterci aut cicuta. Necessæ vero est colera, pubesque, frigidorum quibus leniendi vis inest, aliquo amulcere; nempe argenti spuma, cum olea creta, cerussa, aceto diluta, aut aqua, aut vino dulci, aut sapa. Sapino cubitu quiescere nocuum est. Rursus confert bibere nymphæ radicem, videm, & adianthum. Rata vero succi potius profuerit, & seminis proflenta laboranti, & cui naturalia sunt a recta. Cibum datur frumentaceus medicus: si is indicatur. At si progatur vitium, cucurbitula ante ferro incisa defigenda sunt. Si plentendo adhsit, etiam hirudinibus vacuare, & ventrem cruda polenta oblinere, alienum non est. Hactenus Paulus. Ex quibus satis constat, quod eadē sit curatio cum priapismo. Verum id hic quoque annotasse vrile est, quod hæc affectio, satyriasis & tentigo dicta, etiam accidat mulieribus: ad quam consequitur ingens pudendorum pruritus cum dolore, ita ut mulier locis assidue manus admoveat. Atque ideo intolerabili Veneris desiderio contabescit, & falsi ea humoris effluentis acrimoniam, ac mordacitatem percipit, locique vero vicini inflammantur; ut loquitur ex Aetio cap. 82. lib. 26. Quanquam eis raro hoc malum accidat. Illud vero ardens coeundi desiderium sæviorem reddat ægritudinem. Quam enim affectæ partes distensæ sint, neque semen excerni possit, quoniam meatus inflammatione obstruuntur; maior materię copia frustra ad locum attrahitur. Eis ergo statim, iuxta Aetium, a principio vena secanda est, (ex qua vena, non dicit, ex saphena fieri potest, vel in principio ex basilica) & alimentum contrahendum, pubique ac lumbis illinenda, quæ leniter refrigerandi contrahendique vires habent: caput oxyrrhodino irrigandum; serum lactis potu exhibendum; sorbiliaque alimenta offerenda, quæ flatu prorsus ac vi excitandæ Veneris careant: duobusque diebus a sanguinis missione interiectis, cucurbitulæ locis cum scarificatione affigende sunt. Reliqua autem curatio eadem erit cum inflammatione vteri, de quo suo loco dicemus. Hac passione satyriasi (ut quidam Discipulus in Praxi Leonelli refert) laborans viros

Curatio.

4

Satyriasis etiam mulieribus accidit.

5

Priapismus & Satyriasis in quibus secundum neotericos conveniant & differant.

Satyriasis quid ex Paulo.

quadam Vestalis monacha, adhibito mutoniati cuiusdam monachi (pelli vice) phallo, seu rutabulo, perfecte curata est. Id quod praeceptor meus (inquit ille Discipulus) Tosetus Patavinus Medicus (ut fuit homuncio facetus) se consultore factum fuisse, palam testatus est. Praestitisset tamen antea, ut huiusmodi, iuxta praeceptum Divi Pauli, matrimonium contraxisset, quam ita vri, & non se excusare postea (ut refert Tarantianus) si satyriasi cum appetitu ad coitum laborant, & dicere se a Diabolo tentari, ut dimittant castitatem.

OBSERVATIO XI.

De Gonorrhœa ex abundantia seminis.

Iuuenis, alioqui robustus, gonorrhœa afficiebatur. Sed cum ei vires non debilitarentur, neque extenuaretur eius corpus, signum erat ob multitudinem seminis euenire, ex nimia repletionem; nam plenus sanguine videbatur, & venæ valde apparentes: multitudo enim spermatis vniuersaliter causatur a multitudine sanguinis. Quare cum hic statim ab initio consulturus ad me veniret, videns ego corpus carnosum esse ac rubicundum, & iuuenem sanguine repletum, consului, ut statim vena basilica brachio dextro aperiretur, sanguine ad uncias fere octo extracto; & ut victu satis tenui vteretur, atque simul ab omnibus iis abstinere, quæ sanguinem multiplicarent, aut semen augerent. Cum autem in vniuersum pro seminis profluvii curatione refrigerantibus, atque exsiccantibus, tum cibis, tum medicamentis, utendum sit; & potissimum in quibus cum seminis copia, & facultas retentrix infirma est, ut testatur Alexander Trallianus lib. 9. c. 4. De seminis profluvio; (est enim cura huius affectionis communis cum ea, quæ in omni fluxione adhibetur, Aetio auctore lib. 11. cap. 33. De seminis profluvio, ex Galeno) primum, inquam, in quiete, & paucio cibo, & aquæ potu, affectos adseruare oportet, & vniuersam victus rationem resiccatoriam & adstringentem constituit, & similibus quoque medicamentis vri. Præcepi igitur, ut aerem eligeret siccum, atque ad frigidum vergentem; somnum moderatum in cubili frigido, non valde molli; decubitum vero in latus dextrum, vel sinistrum, supinum cauendo; quibusdam etiam herbis arefactis substratis, quales, portulaca, nymphæa, solanum, umbilicus Veneris, lactuca, rosæ, ac viticis folia; modo hoc illi liceret, ob alios; cum non vellet aliis suum morbum notum esse. Interim iussi, ut quouis modo in somno vitaret formam dormiendi supinam, ne lumborum arteriæ inde supercalfierent; & ut studeret quotidie alui excrementa natura, vel arte cum balanis excernere; & ut præcipue abstinere a spectaculis, & lectionibus, quæ Venereæ rei usum in memoriam reuocare possent. Imo oportet, ut Aetius loco citato admonebat, omnem de rebus Venereis cogitationem excludere; & potius utantur his exercitiorum generibus, quæ per supernas partes fiant. Quod ad cibos attinet, imperavi, ut paucis contentus esset, atque eis, qui ægre corrumpentur, & difficulter permutarentur, ac vim resiccandi haberent; ut idem Aetius consuluit. Vitandi autem sunt

flatuosi, ac etiam valde calidi. Nam velut semen generant cibi, qui bene nutriunt & flatuosi sunt, ac totis substantiis familiares, & medicamenta flatuosa & calida: ita exstinguunt ipsum desiccantia, & refrigerantia omnia, quæque totis substantiis sunt contraria. Etenim quæ refrigerare sunt nata, tum edulia, tum medicamenta, semine cogentia, incrasantia, & stabile reddentia, vim habent ipsum supprimentem, non autem corrumpentem; velut est lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, cucumeres: quæ vero resiccant, nec semen promittunt, ut nymphæa, vel etiam si calida sint natura, velut ruta; quemadmodum Gal. lib. 5. de simp. medic. facul. scriptum reliquit. Quia vero hic etiam semen & tenue & acre apparebat, quod emittebatur, infrigidantibus magis, quam resiccantibus, tum cibis, tum medicamentis utendum erat: nam hi contemperantia, refrigerantiaque exigunt, ut genitura, sensim crassior & temperata reddita, non amplius effluat: cum prædictis autem cibis viticis, aut canabis semen, præsertim tostum, rutæ item semen, & caliculi, nymphææque radix ac semen præbenda sunt. Quare cum eidem genituræ profluvium ex copia etiam proveniret, utile præcepi a copiosis cibis esse abstinendum, & iis præsertim, qui generant bilem, & ampliores flatus, irritantque materiam, ut proclivius foras effleratur; quemadmodum & recte consuluit Alex. Trall. loco citato. Ab his igitur abstinendum, ut sunt nuclei pinei, fabæ, ciceres, bulbi, cruca, rapa, & præsertim semen eius, & dauci maioris semen: & urticæ semine & costus, quæ ex mulso Venerem stimulant, & satyriion & slyncorum partes, &c. Pro potu, quamvis aqua, præsertim pluuiialis, vel ea in qua ferrum exstinctum est, laudatur ab Aetio, cum hic iuuenis non esset consuetus bibere aquam, concessi eidem ceruissiam tenuem; sed imperavi, ut a vino abstinere, & ab omnium rerum acrium usu. Quod vero ad medicamenta attinet, post venæ sectionem, cum viderem bilem etiam ex sanguine bilioso non nihil adesse, exhibui altero die infusum Rhab. cum cassia, cum decocto myrobal. citrinorum. Et quia vrina acrimoniam contraxerat ex spermate acriori (nam cum ardore emittebatur) dedi syrupum sequentem: ℞. syr. ex ros. siccis, nenuphar. myrtini. ana ℥ss. aqua portulacæ, nymphææ, plantaginis, ana ℥j. misc. bis terve reiteratum fuit. Ceterum ardor hic non erat magnus: alioqui, licet Medici & agroti gonorrhœam etiam vocant, quando ob inflammationem illarum partium, reicitur cum dolore aliquid seminis boni vel corrupti, quod expurgat; potius id referri debet ad caput de ardore vrine, in quo de inflammatione illarum glandularum etiam tractauimus. Dedi tamen post syrupum rursus hanc leuem purgationem cum adstrictione: ℞. cassia recens extracta ℥j. rhabarb. optime pul. ℥ss. in bolo. Deinde consului, ut ad restrictionem caperet pul. folior. rubi. ℥ij. ℥j. cum aqua plantaginis, in qua chalybs septies exstincta esset, hoc enim simplici remedio feliciter Petrus Medicus Bononiæ utebatur. Totam spinam & os sacrum (ut & is quoque facere solent), inunximus vlg. sequenti: ℞. un-

6 *Unguenti sandalini, comitissa, ana ʒ ss. succi solatri ʒ iij. capbura ʒ j olei nenupharis parum.* fiat unguentum, quibus bene habuit. Alioqui dedissem ʒ j. cum aqua mentha ex trochiscis sequentibus, quos Leonellus ad gonorrhœam procedentē ex multitudine & acritate spermatis, post venæ sectionē, & purgationem ex rhab. & myrobalanis citrinis, in hunc modum paratos, commendat. *ʒ. trochisci de rosīs ʒ iij. seminis lactuca, cucumeris, an. ʒ ss. capbura. gr. ij. ros. rub. ʒ ss. pulueris sanda pulueris sentur, & cum mucag. sem. cotoneorum fiant trochisci, quorum quilibet sit ʒ j.* Ceterum cum hic esset causa calida & multa materia, si supradictis remediis malū non cessasset, consuluissem, ut hic iuuenis matrimonium in Domino contraxisset, melius est enim nubere, teste Diuo Paulo 1. Corinth. 7. quam uri. Etiam nunc curatum idem, ut faceret admonui, ne in idem malum relaberetur.

S C H O L I A.

7 *Uitium vero, quod circa seminis excretionem sæpenuero cōtingit, a Græcis γονορροία, a Latinis Seminis profluvium appellatur, nomen siquidem compositum ex γόνι, quod semen genitū ē, & ρέειν, quod fluere significat, quasi genitalis seminis profluvium dixeris. Semen autem modo γόνι, modo γόνος a Græcis nominari solet, ut liquet ex Gal. lib. 6. de locis affect. cap. 2. Est autem (ut ipse inquit) affectus hic seminis excretio inuita, quam etiam involuntariam nominare licet sed manifestius dixeris, seminis esse assiduam excretionem, cole haud quaquā extento, quam descriptionem confirmavit Aetius lib. 11. cap. 33. cum dicit: Profluvium seminis, excretio est eius præter voluntatem, citra pudendi tentionem. Nomen autem habet ex eo, quod inuitis profluit semen. Paulus quoque lib. 3. ss. Seminis profluvium, inquit, est inuita ac præter voluntatem excretio, quæ continue, naturalibus non intensis, ex retentricis natura facultatis imbecillitate provenit, quod sine Venere, sine nocturnis imaginationibus sic fertur, ut interposito spatio tabe hominem consumat, Celso auctore cap. 21. lib. 4. Propterea non ab re in hac affectione sola vasa spermatica affici manifestum est, ut constat cap. 6. De locis affectis, cum dixit Galenus. Igitur gonorrhœa instrumentorum seminis affectio est, non pudendorum, quæ seminis genitalis via sunt, quæ excernatur. Id etiam confirmavit Aetius loco citato. In ipsis namque & generatur, & continetur naturaliter genitale semen. Quod vero symptoma sit in genete excretorum immodice, 3. De causis sympt. a Galen. scriptum est. Triplex tamen est Gonorrhœa, Galeno & veteribus olim ignota, ut egregie docet Ioannes Langius epist. 5. lib. 2. Una ob feruorem renum, ac seminis copiam, mentisq; intranquilla somnia, pollutio dicta: iis qui hac laborant quæ refrigerant, adstringunt, ob vasorum imbecillitatem, & sperma exsiccant, sunt salutaria, altera est ob malorum humorum & phlegmatis a cerebro & hepate, ad matricem & vasa spermatica alluvionem, simul enim phlegma cum semine exit putidum. Prædicta hic sunt noxia & perniciofa, namque hæc gonorrhœæ species non adstrictoriis & ingrossantibus*

frigore indiget, sed ob humorū cruditatem & putrilaginem, sui per vomitū, aut alui deiectionem, ablationē indicat, qua methodo, ausim deierare, solis purgationib. ac sobria victus ratione, plures sanitati restitui. At tertia ex lue Venerea gonorrhœa est, quæ ob id fœdā virulentamq; appellant: in qua principio vigilanti pariter ac dormienti virus albū, aut subcitrinum e vasis seminalib. sine sensu destillat, ac nō raro penis cannā exest. Ex hac virulenta lue accidit, ut quicquid in vasis coaceruatū fuerit, male oleat, & putredine acescat, ardor dysuriæ similis in emictione, & dolor in mentulæ tēgine, at si funis subtus penē extenderet, vlcus internū subesse produnt. Hoc virulento fluore præter rationē suppresso, tum plerunq; abscessus colligit, alias quidē circa testiculū in epididymide (ut istis dieb. iuueni cuidā evenit, qui a nobis tamē curatus est) alias in perineo: quo rupto continuus fluor cōsolidationi obfistit ac postremo in fistulā desinit, per quā lotium tandē defluit. At hæc ex lue Venerea ichoris virosi eluies, non melius quam ligni guaiaci decocto curatur. Eodem fere modo & Fernelius varias differentias gonorrhœæ facit, inq. ens: Gonorrhœa est inuita & nimia seminis profusio, citra Venere, citra libidinis insomnia, leni quodā aut nullo oblectationis sensu utillationeve facta. Sed & gonorrhœa species quæ tā est, quum occasione minima semē emittitur, ut in eo, qui sola chysteris perfusione semen eiaculari consuevit. Sed & quendā vidi, qui longa gonorrhœa consuetudine per insomnia, atq; etiam cogitatione sola, parum sanguinē, non minori voluptate, quam semen effunderet. Inuasit & hoc seculo in humanum genus ex lue Venerea quoddam vitium gonorrhœæ finitimum, quod idcirco & fœdā virulentamq; gonorrhœam appellamus. Hæc Fernelius, qui & ea adiungit, quæ mox ex Langio attulimus. Sed hic de vera gonorrhœa agimus, qua hic iuuenis laborabat, ex abundantia seminis: nam probus & castus erat. Interea & alia adhuc, etiam rigido & extento quodammodo pudendo sit, & est velut conuulsio quædam, teste Gal. 2. de causis sympt. Sed hæc omnia cum de causis agemus & signis, latius patebunt, tum etiam exemplis subsequentibus.

OBSERVATIO XII.

De Gonorrhœa ex aquositate seminis.

Vir pituitosus, pallidi coloris, cum aliquanto tempore gonorrhœa laborasset, tamen vxō ē habens, consilii causa, me accessit. Verum ut recte huius causam intelligerem, videns eius temperiem esse pituitosam, & intelligens quod victu humectante usus esset, cœpi interrogare qualis nam color esset seminis quæ ita profunderetur: dicebat autē sperma aquosum valde esse, & quod sine aliqua delectatione exiret, crudū valde, & sine vlla concoctione. Cum igitur intellexissem, illud genus profluvii seminis venire ex aquositate spermatis imperavi, ut ex succo mentha cum melle cocto & dissimato syrupus conficeretur, & ut huius ʒ j. ss. acciperet cum decocto myrthi & florum ros. ac insularum glandium. ʒ iij. & ut tribus continuis diebus mane hanc dosinsumeret. Remouet enim aquositatem spermatis, & sperma similiter exsiccat. In-

terea imperavi, vt aquofitas illa euacuaretur in hunc vel fimilem modum; ℞ diacath. ℥℥. turbith. boni & electi non correcti. ℥iij. diffolve in aqua mellis ℥iij. fiat potus: detur in diluculo. Sciendum vero, vt & Leonellus admonuit in sua Praxi cap. proprio de gonorrhoea ab aquofitate & fluxibilitate spermatis, quod turbith non correctum euacuat phlegma aquofum & subtile. Facta euacuatione, confului vt hoc vel fimile decoctum fumeret. ℞ mentha, abfinthy romani. an. m. j. feminis agnicasti, ruta, myrthi, cupularum glandium, flor. ros. rub. ana ℥j. ℞. fiat decoctio in vino rubro Gallico, pro ℥℥. dulcoretur Zacch. & capiat omni mane cyathum unum. Et inungatur renes hoc vnguento, vel eius æmulo. ℞. olei mastich. ℥j. olei rutacei. ℥ij. olei menthacei. ℥ij. feminis agnicasti, urtica, ruta, ana ℥j. puluerifentur, addendo mentha, garyophyl. pulu. an. ℥℥. cera q. s. fiat unguentum. Deinde vt etiam fumeret omni mane ad magnitudinē castineæ parua ex hoc electuario, præcepi. ℞. conferva ros antiqua ℥j. ℞. conferva summitatū abfinthy romani. ℥iij. farinæ glandium, cornu cerui vsti, an. ℥j. ℞. lapidis hematitis, feminis agnicasti, an. ℥℥. mentha sicca, garyophyl. thuris, balau. storū. an. ℥j. puluerifentur puluerifanda, & cum mella diffumato fiat electuarium, vt artis est. Quod si neque illa inuarent, intus etiam illa exhibenda erant quæ semē extinguunt, veluti viticis semen torridum, aut folia, seu flores similiter canabis semen, seu nymphææ semen, aut radix eiusdē cum vino nigro austero, ex Tralliani sententia. Atque hic tandem victu paululum incrassante & astringente vrens conualuit.

S C H O L I A.

3
Causa.

V Ariz causæ huius seminis profluij ab auctoribus refertur. Aetius, vel ex facultate retentricæ imbecilla in vasis seminariis, aut ex resolutione eiusdem facultatis fieri vult, ex Galeni testimonio, quam facultatē imbecillam reddere possunt excedētes omnes intemperaturæ, præsertim humida, aut calida, seu quæ ex his conflatur. Vela copia ipsius seminis eandem retentricem facultatem vasorum seminariarum grauante, vt semē ipsum haud quaquam retineri possit, & sic inuoluntarie excernatur. Coacervatur autem talis seminis copia eis, qui Venerem exercere consueverunt, & crebriore vti concubitu, demum vero continentius, & purius innocentiusq; degant, vt refert Alexander, lib. 9. c. 9. Interdum autem ex seminis acrimonia, ac tenuitate, adeo vt eam continere non possit eadē contentrix facultas, etiam excitatur seminis profluuium. Aliquando etiam ex conuulsione violenta, vt in comitiali morbo, iam & effluuii causā, iuxta Fernelium, est spermaticarum partium imbecillitas, qua vel non concoqui, vel non retineri semen potest tantisper dū coquatur atq; crassescat. Quam ob rem frequens iis esse solet, qui impuberes, nec dum matura ætate, Veneri petulantius sese addixerunt. Nam imbecillæ partes euadunt, in quas longa consuetudine humores abundantius confluunt. Quam per insomnia libidinis, aut in attenta rei Veneræ cogitatione semen affatim procidit, non vt in ve-

ra gonorrhoea, crudū id & aquosum, ac line sensu, sed magna vtiq; voluptate exit. Effluentis huius causā est, seminis vel exsuperantia, vel calor & acrimonia naturam proritans, vel ingens spermaticarum partium robur. At ex lue Venerea aliam causam habet. Rondeletius potissimum fieri vult ob vasorum imbecillitatem, & flatuum copiam, vel ob compressionem, vel tensionem, vel succussionem membrorum, vt in conuulsione & epilepsia. Profluit interdum ob seminis aquosi & flatulenti copiam. Cum enim tenue multum est, a vasis contineri nequit, reliciturq;. Et ita alii ad tres causas referunt, alii ad quatuor. At quatuor reducant, Vel ex parte vasorum spermaticorum, vel ipsius spermatis. Aut renum, aut ex parte principiorum. Ex parte autem vasorum spermaticorum, rursus in triplicem diuidunt: Vel ob debilitatem virtutis retentivæ, aut robur expulsiuæ, Vel ob mollificationem ipsorum, vnde relaxantur vasa retinentia sperma, Vel ob eorundem vasorum ipsimum, vt in epilepsia contingit. Ex parte vero spermatis, Aut ab eius multitudine, vt in robustis & sanguinis, (& præcipue, vt sæpe obseruauimus, in monachis, Præatis, delicate & in ocio videntibus & monialibus seu vestalibus.) Vel ex parte fluxibilitatis & aquositatis ipsius spermatis, sicut in phlegmaticis, & mollibus vt in hoc ægro nostro, de quo egimus in Obferuatione : Vel ex parte acuitatis spermatis, vt in biliosis, in quibus semen est acutum mordicans, stimulans virtutem expulsiuā vasorum seminalium, vnde & semen facile exit. Ex parte renum propter nimiam caliditatem eorundem attrahentium continuo spermatis materiam ad vasa spermatica, seu seminaria, vnde vasa dilatantur, & semen citius effluit. Ex parte principiorum, idq; primo ex desiderio & concupiscentia, coitus & actū venereorū; nam ex concupiscentia desiderio, & imaginatione coitus, tū actus Veneri, sperma mouetur, & emittitur: quandoque ex nimio & frequenti tactu, præcipue pudendorū mulierum conuersatione. Sed & has quatuor causas ad tres præcipuas rursus deducūt, ad multitudinem seminis, ad debilitatem virtutis vasorum spermaticorū, & ad acuitatem, seu fluxibilitatem seminis. Denique alii has ipsas in externas, tū internas, atque antecedentes transferunt. Ex

Tres prae-
pue causas
gonorrhoeae, vel
quatuor in-
tra alios.Causa ex-
terna.

Interna.

O B S E R V A T I O XIII.

De diuturna Gonorrhoea, & quomodo fuerit curata.

Q V I D A M annos 45. natus, cum diuturna gonorrhoea afficeretur in Hagha Comitibus, ac diuturne

ac diuersis remediis vsus effecit, istis infra scriptis remediis per me probe curatus fuit. Quū autem videretur, quod malum contraxisset ab impudica muliere, atque id confiteri, quod vxorem haberet, non vellet, hoc lenitium & purgans medicamentum prius dedi. *℞. electuarii lenitui, confectionis hamech. ana ℥ ss. aqua fumaria. ℥ iij. syr. de epibymo, de fumoterra, ana ℥ ss. misc. & fiat haustus.* ex quo satis copiose excreuit, deinde vt tres pilulas ex his sequentibus sumeret, mandavi. *℞. terebinthina Veneta lota cum aqua ros. ℥ j. ss. torreatur parum vt puluerisari possit, adde mastichis, trochis. alkekengi, ana ℥ j. mumia. ℥ ss. pulu. liquirit. pulu. myrobal. citrinorum. an. ℥ j. cum mucagine gummi tragacanthi fiant pilula pisorum instar.* Cum autem aliquo modo & capite doleret, has quoque pilulas sumit. *℞. pilul. de fumoterra ℥ j. pilul. cochiar. aurear. an. ℥ ss. cum syr. ex infus. ros. fiant pilula vij. dentur longe a coena.* egregie excreuit, & dolor sedabatur. Sed cum profluuium perseveraret licet iam non ita citrinum & putridum semen efflueret, sed magis album & concoctum, & maciem contraheret, accessi ad magis restringentia paulatim, præscribendo iterū has pilulas, & puluerem sequentem, tum alia, quibus tandem, cum hoc profluuium per aliquot menses adhæssisset, cessauit. *℞. sem. plantag. boli arm. veri, cornu cerui vsti, ana ℥ j. trochis. de carabe. ℥ j. ss. cum mucagine tragacanthi fiant pilula ad modum cicerum, prabeantur tres, vt supra.* *℞. sem. portulacæ acetosæ, plantaginis, lactuca, melonis, pap. albi, ana ℥ j. sem. ruta, agni casti an. ℥ ss. sem. coriandri præpar. sem. canabis torrefacti, sem. ros. cornu cerui vsti, sandal. rub. anagr. v. rad. nenuphar. ℥ j.* (at cum radicem ad manum non haberet pharmacopœus, accepimus flores nenupharis albi) *fiat pul. subtilissimus: dosis erat ℥ j. ss. cum vino rub.* Postea. *℞. sem. portulacæ, acetosæ, plantaginis ana ℥ j. farina glandiū ℥ j. cornu cerui vsti ℥ j. ss. lapid. hamatis subtilissime & cotem triti ℥ j. coralli rub. sem. ruta sem. viticis, seu agni casti an. ℥ ss. trochis. de carabe, ac terra sigillata flor. nenupharis, ana ℥ ss. nucis moscatae, sar. coccolle, anagr. an. v. fiat pul. subtilissimus: dosis ℥ j. ℞. vnguenti ros. ℥ ss. vnguenti comitissa, vnguenti sandalini. an. ℥ ij. misc. inungantur lumbi.* *℞. mellepilorum, exsiccatorum* (nam fluxus perdurans deliciebat vires) *farina glandium, radic. consolida maior. exsiccata. cornu cerui vsti, an. ℥ j. ss. lapidis hamatis ad cotem contriti ℥ j. sem. plantag. agni casti, lactuca, an. ℥ ss. fiat puluis subtilissimus, addendo conseruæ ros. antiquissima. ℥ ss. mich'eta Nicolai, & diacodii. an. ℥ j. cum syr. cotoneorum. q. s. fiat conditū. moderate liquidum. sumat mane ad magnitudinem parvæ castanæ, fuitque in duplici dosi reiteratum, & profluuium seminis restrictum est, & nunc optima sanitate etiam fruitur, cum hæc recolligerem anno 1589. cum anno 1582. hoc malo admodum diu conflictatus esset.*

SCHOLIA.

Signa gonorrhœæ.

Quod autem gonorrhœa hic laborabat, facile ex eo notum erat, quod semen aquosum profluebat, ac tenue existeret, quamvis postea etiam putidum, & excernebatur citra appetentiam coe-

undi, & vt plurimum citra sensum, licet quandoque tale cum voluptate quadam quibusdam promanare solet: corrumpebatur etiam sensim eidē vniuersum corpus, ac gracile scēbat, præsertim circa lumbos, cuius etiam, de signis loquens Aetius, meminit. Os quoque ventris quibuldam resoluitur & toto corpore (vtrumque huic contirgebat) non solum relaxantur, imbecilique fiunt, sed etiam sicci, graciles, pallidi, cauique oculis cernuntur, vt colligitur ex Gal. 6. de sanit. tuend. Interea signa causarum sunt distinguenda. Si enim imbecillitas sit in vasis seminariis, vel resolutio ex intemperie humida, aut calida, id ex propriis earundem intemperierum signis distingues, simul cū totius corporis natura, ac præcedentis victus ratione: Nam & importuna Venus, aut nimia abstinentia sæpe causam ostendunt. Si autem propter multitudinem seminis contingat, ægri nō debilitantur, neque extenuantur, imo videntur retinere propriū colorem, ita vt neque æger maceretur, neque sentiat grauedinem, & exundantiam indicat corpus satis viuendum, & in profluendo quædam voluptas subinde, sed exigua, & in emissionē grauitas non sentitur. Vbi enim exit ob debilitatem retentricis, ex improviso, & sine sensu hoc fit. Et si est ob fortitudinem virtutis expulsiuæ, effluit cum aliquali delectatione. Si autē est ex aquositate seminis, effluit aquosum, minus coctum, & absque delectatione aliqua. Vbi enim semen tenue est, nec in vasis retineri potest, decolores fiunt, & imbecilles, sensim corpus cōtabescit, circa lumbos dolorem sentiunt. Si sit ex acrimonia seminis, ex colore ac substantia innotescit; quoniam biliosius tenuiusque apparbit. Ad hæc prægressæ causæ, tum victus, tum superior vita illud manifestabunt. Nec non mordax atque præcalidum inter emittendū semen sentiunt. Signa ex parte seminis ita innotescunt. Vbi enim semen aquosum est, facile exit minus coctū & tenue: Et tenuitatem indicat continuus fluxus, vel humor in lintheolo seruatus nō glutinosus, & panni parum maculis inficiuntur, nam & effluit, & non inhæret. Et vbi semen frigidum, sentitur frigiditas in exeundo, & in aliquibus accidit dolor capitis, & grauitas totius corporis. Vbi enim est ex acuitate seminis, vel ex caliditate eiusdem, calor sentitur in exitu, adestque præter calorem & rigor & mordicatio, idque cum virgā transit: facit & aliquando titillationem cum al. quali delectatione, & inter exeundū mordicat. Ex parte vero vasorum seminalium, ob imbecillitatem exit absque delectatione & erectione virgæ, nullamque adferens tentiginem, & ob debilitatem retentricis; vt diximus, ex improviso & sine sensu. Si enim contingat ex mollificatione vasorum spermaticorum, tunc paralytis membrorum præcessit, & semen exit insensibiliter, absque pudendi erectione. Si ob conuulsionem seu spasmum, contractio adest in partibus illis, ac dolor in partibus vicinis circa lumen & pectinem. Et propterea si fiat ob passionem aliorum membrorum, indicabitur illud per dolorem & aggrauationem loci, ob paralytin membrorum fit sine erectione virgæ. Ob spasmū ner-

Signa causarum.

5

Signa ex parte seminis.

6

Ex parte vasorum seminalium.

Ex passionibus aliorum membrorum.

7

uorum vel musculorum, cum dolore pectinis, & inguinum, ut in epilepsia, vel alia conuulsione. Et sic si ob aliquam dispositionem paralyticam, cole haudquaquam extento provenit. Si ex conuulsione, adest quædā conuulsio rigido seu extento quodam modo pendendo. *Gal. teste 2. de causis sympto.* Excitatur tunc, quasi conuulsioni quid simile instrumenta patiantur, ut ipsemet testatur 3. de causis sympto. Evenit autē, ubi aliquis vel comitiali morbo, vel conuulsione violenter irruente fuerit correptus quamvis haudquaquam absurdum fuerit dicere, in temerariis valis, & quidē solis, aliquando eiusmodi dispositionem excitari, quādo videlicet conuulsioni aliquid simile patiantur, quod idem *Gal. confessus est 6. de loc. affect.* quemadmodum alias partes aliquādo videmus ut manus, aut pedes, aut digitos, conuelli, modo simul cum vniuersi corporis conuulsione, modo ipsis solis affectis. Percipies autem hanc differentiam gonorrhoeæ (*licet fere improprie gonorrhoea dicatur, ut aerea quoque diximus: ea proprie est vere existente, in qua cole haudquaquam extento semen prater voluntatem emittitur, ut diximus*) quoniam rigido & extento pene, licet inuoluntarie, semē emittitur: at ubi citra morbum comitiale, aut aliam vniuersalem conuulsionem id fiat, nullum dictarū aderit adfectionum indicium; sed ipsa vasa seminis duntaxat conuulsioni similem dispositionem patiuntur, quæ dispositio non alio modo generari poterit, quam conuulsio quævis alia particularis, potissimum autem quæ a flatuoso spiritu ortum habet. Si propter calorem membrorum istorū, tunc læduntur a calidis, & iuuantur a frigidis. Et si in summa glande mordet materia, vel renes calidi sunt, urina viridis aut crocea acutum profluvium denunciat, & victus præcedens faciet fidem certam. Et ita signa gonorrhoeæ prouenientis ex caliditate renū, adest manifesta caliditas circa lumbos & regionem renum, & semen profluens in exite habet aliquid acuitatis, & mordacitatis. Ex parte principiorū, cognoscuntur ex appetitu præcedente & desiderio coitus, ac cōtinuis imaginationibus rerum Venerearum, sicuti & quævis alia causæ primitiua habetur ex agrotantium relatione, cum diligenti Medici inquisitione, tum etiam ex iis, quæ præcesserunt: ita quidem ex concupiscentia, quia præcessit inordinatus appetitus ad coitum, amplexus & contactus mulierum plurimum impudicus, conuersatio multa cum iisdē, colloquia impura, & si equētes imaginationes, & cogitationes de re Venerea. Recte quidam dixerunt, quod ad signa prognostica attinet, (*de quib. nunc dicendum, postquam signa causarum iam retulimus*) gonorrhoeam non solum damnum indiuiduo inferre, sed & omni speciei humani generis; nam si omnes homines paterentur gonorrhoeam, cito genus humanū periret, cum materia ex qua generatur embryo, fluat & deperdatur. Præter hoc igitur quod turpissima hæc sit passio, est etiam generi humano noxia, quæ etiam nonnulli pereunt, ob verecundiam, cum non audeant Medico hoc vitium reuelare. Quæ quidem si superfluat,

& diu durat, perducit ægrum ad hecticā senectutis: nam semine plurimo profuso, spiritus quoque resoluuntur, & corpus in frigidatur. Quidā & gonorrhoeam lethalem pronunciarūt in iis, qui stomachū frigidum & hepar calidum haberent: augetur enim his frigiditas, & laxitas, neque remedia intus administrata frigida malitiam stomachi tollere possunt. Ceterum seminis profluvium licet in omnibus ætatibus oriri possit, maxime tamen contingit pubertatem transgressis citra 14. annum, ut inquit *Acetius*, quod item non solū viris, sed & mulierculis accidit, licet in sceminis ægre tollatur affectio, ut ipse refert.

OBSERVATIO XIII.

De Gonorrhoea cum sanissimis symptomatibus.

Petri Roberti Pistoris filius, qui ad fossam aqueam Delphis habitabat, cum gonorrhoea afficeretur, & nescio quas pilulas ex præscripto filii cuiusdam chirurgi acceperat, sanguinē per superiora enomuit, & in grauissima symptomata, tum syncope incidit, ut pro mortuo habitus sit. Corrupto eo deinde somno grauiore, me vocarūt: adhibitis aut frictionibus manuum ac digitorum, mox expergefactus, paululū ad se rediit. 17. itaq; die Augusti, anno 1577. ad illum accitus, cum valde siti- ret, hanc sequentem ptisanam propinaui. *℞. hordei mandati p. j. glycyrr. rasa ℥ iij. coquantur in aqua comm. pro ℥ viij.* Id quoque valebat ad abster- sionem medicamenti venenosi quod sumserat, & ad sitim. Sed & hoc eclegmate etiam utebatur. *℞. diatrag. frigid. in tab. recenter fusi ℥ ℔ manus Christi cū perlis ℥ i. syr. iunibini ℥ j. ℔ syr. myrthini, de portulaca an. ℥ ℔ misc. sumebat cum spatula liquir. ad libitū.* & capiebat pro siti & alteratione cerasa cōdita. Et qui tussiendo adhuc exspnebat sanguinem, pro tussi continuo sumebat ex tabulis diatrag. frigid. recenter fusi cum aqua vngulæ caballinæ. Vigesimo die Augusti cœpit vires recuperare, & melius habere: tunc iussi ut sæpe sumeret ex mixtura sequenti. *℞. syr. ex ros. ficcis, syr. granator. ana. ℥ i. syr. nenupharis, myrthini ex infus. ros. an. ℥ j. misc.* capiebat subinde cochlear vnum. Cum iam vomitus sanguinolentus non rediret, nec sputum cruentū amplius expectoraret, & symptomata, deinde & tussis ac sitis, consopita essent, remanebat gonorrhoea, quæ diu antequam illas pilulas sumisset laborauerat. Quamobrem 2. Septemb. die hoc apozema sequens illi præscripsi, & a gonorrhoea hoc solo apozemate sanatus, perfecte conualuit. *℞. rad. consolid. maior. mundata ℥ ℔. plantag. equiseti, bellidis minoris polygoni, ana m. j. acetosa m. ℔. simpl. plantag. ℥ j. sem. acetosa, malua, an. ℥ ℔ flor. ros. rub. p. j. vuar. passul. cum arill. ℥ ℔. glycyrr. rasa ℥ iij. coquantur in aqua commun. pro ℥ ix. col. adde syr. de portul. syr. myrthini, ana ℥ j. ℔ misc. fiat apozema prou. do- sibus matutinis.*

S C H O L I A.

Quod exsiccantibus & refrigerantibus, tum bis, tum medicamentis, opus sit ad curationem, diximus. Obser. ii. ubi & vitium quoq; præscripsi, cum & hic cōmunis scopus curandi sit cum

Ex caliditate renum.

Ex parte principiorū & quomodo causæ primitiua cognoscuntur.

Prognostica.

Curandi Methodus.

Adicamur
rum ratio.
cum es, quæ in omni fluxione adhibetur, ideo vi-
ctus aliquantū etiam adstringens adhibendus. Et
quod ad medicamentorum rationē attinet. Græ-
ci circa lumbos & pubem medicamentum ex ro-
faceo, maxime ex omphacino apparato, ac pauco
vino, cum linteis apponunt, idque sæpius. Vel ex
melino, aut cenanthino oleo, pauco addito vino:
etiā spōgias posca imbutas adhibēt, & cataplasma-
ta ex palmulis, malis, acacia, hypocistid. cenanthe,
rhoe, & similibus, ac infessibus vtuntur ex lētisco,
rubo, myrtho, & id gen^o aliis, in vino austero, siue
mero, siue diluto, aut etiam ipsa aqua, decoctis,
ex communi consensu Pauli & Aetii. Quamquam
vbi ob seminis tenuitatem atque acrimoniam fiat
tale profluuiū, etiam temperatis balneis vti con-
uenit, ex Alexandro; quinimo ad lauationem fri-
gidæ confugere non inconuenit, maxime si me-
dicamentaria qualitate aqua prædita sit, velut
sunt in albulis aquæ sapore subsalfo, & tactu lactei
teporis, ex Aetii testimonio: quale est apud Italos
balneum Puteolorum, quod vulgus Balneolum
appellat, modo eius actualis caliditas fuerit tepi-
da, aut infrigidetur. Per interualla etiam vnguen-
ta adhibenda sunt, ex cera, rosaceo, succo aliquo a-
stringente, aut refrigerante, adiecto: quales sunt
semperuiui, solani, vmbilici Veneris, sanguinariæ,
nymphææ, portulacæ, &c. Verum ab assiduo eo-
rum, quæ vehementer refrigerant, vsu, tum his,
quæ forinsecus apponuntur, tum etiam his,
quæ per os exhibentur, cauere oportet. Valet &
laminam plumbeam lumbis apponere, tum eo-
rum, qui in somno, tum qui alias semen profun-
dunt, multum enim refrigerare consuevit. In his
vero, qui plumbi duritiem ferre non possunt, ex
prædictis herbis refrigerantibus quædā arefacta
substernantur: quibus etiam viticis folia, rutæ, ac
calaminthæ commisceantur, maxime vero & rosæ:
profunt enim hæc citra renum læsionē: nam ve-
hementer refrigerationes eorū, quæ lumbis sub-
duntur, renes iniuria afficiunt, teste Aetio. quan-
quam ante eum Gal. non modo hæc, sed nonnul-
la alia medicamenta *6. de sanit. tuenda*, ponit. Intus
quoq; sumenda sunt, quæ semen extinguunt, ve-
luti viticis semen torridum, aut folia, seu flores: si-
militer canabis quoq; semē, aut lactucæ, seu nym-
phææ semen & radix, cū vino nigro austero in po-
tu exhiberi debent: iuxta Trallianum: vel ex aqua
præbeantur, præsertim in qua ferrum sæpe fuerit
extinctum, aut in quā fuerint decocta portula-
cæ, seu sanguinariæ folia, iis potissimum, in qui-
bus semen biliosum ac acre reperitur: quib. etiam
confert corticem radic. halicacabi cum eadem a-
qua calida bibendum exhibere. Valet quoq; pe-
culiariter ad hoc non solum temperamento, sed
tota ipsius substantia, licet calida sit, ruta, vt idem
Alex. inquit. Sed hic, vt Neoterici recte admonēt,
caussa ipsa prius consideranda: nisi enim causa
cognoscatur, difficulter curantur. Et ideo si fue-
rit ex causis externis illæ remouendæ sunt, vt cor-
pus reducatur ad sanitatē, vt si sit ex caliditate, ea
amouenda, ita & frigus, si ex frigore originē tra-
xerit. Sic Rondeletius nouit quendam nobilem, qui

ab abscessu frigido renum, diu hoc morbo laborauit, Historia Rō-
& semper multo deterius habuit, cum semen exstin- delectii.
guentibus frigidis vel calidis uteretur. Tandem in- 6
stituit contrariam victus rationem, iussitque bibere
vinum generosum, & vt vinceretur alimentis optimis
exsiccantibus, non flatulentis, & curatus est. Is par-
tes imbecilles habebat ex coitu frequentiore. Et ob
torem renum frigidum, multos humores crudos
colligebat, a quibus flatus multi generabantur. Hi ve-
ro dilatabant meatu spermaticos, distendebant, & ir-
ritabant semen, quod ei aculabatur noctu, post quam
ei aculationem tam imbecillis erat, vt sese continere
erectum non posset, aut ambulare, sed cogeretur in le-
cto decumbere, vel in cathedra, crurib. eleuatis. Ta-
libus qui ob flatus laborant, danda sunt discuti-
entia, & siccantia, parum alentia, & quæ non mul-
tos flatus gignant. Curabuntur ergo tales optima
victus ratione, & medicamentis bonā concoctio-
nem facientibus. Quare illa præscribentur, quæ
ad inflationē, vel ventriculi cruditatem fuere in-
stituta, vt pilulæ de arom. fabellinæ, ante cibum,
de hiera. ex his capiet ʒ ss. semel in hebdomada,
ante prandium. Vtatur etiam sequenti opiata. ʒ
confect. arom. ros. ʒ j. cineris int. stinor. gallina loto-
rum cum aqua absinthii ʒ ss. iridis. flor. & semin. agni
casti. an. ʒ ij. cum syr. confert. corticum citri fiat opia-
ta. Vtatur & puluere post pastum ʒ cineris in-
testinor. gallina, vel pellicul. stomachi, ʒ j. anisi ʒ ij. ga-
langa ʒ ij. corall. alb. & rub. vsti & loti ʒ j. agni casti
ʒ ss. z acch. candi ad terriam partem ponderis, capiet
cochlear unum ante cœnam vel post, non superbiben-
do. Mane exerceat corpus, (sed potius superiora,
quamuis eius Rondeletius non meminerit.) nō sero.
Dormiat supra matalitium factum ex lana & fo-
lis agni casti. Sobrie viuat, vitet cruditatem. Vta-
tur vino generoso, & alimentis non flatulentis.
Fricet mane brachia. Abstineat a colloquio &
lectione impudica. Occupet animū in rebus gra-
uibus. Hæc sunt in omnibus causis faciendæ, tum
in his, qui ob seminis copiā id reiciunt, nisi quod
a generoso vino debent abstinere, & frequentius
ieiunare, vtique pilulis. Quod si sanguinis pletho-
ra adsit, non erit inutilis phlebotomia e brachio, Si ex abun-
dantia semi-
frictiones, exercitia, balnea calida, & quæcunque nis & ple-
thora quo-
modo cure-
tur.
minuere possunt bonum habitum: quæq; seminis
feruorem & acrimoniam extinguere possunt, vt
flores nymphææ, semen lactuca, cucurbita, portulaca,
& olera, malua, acetosa, & alia herba. Fructus frigi-
di, vna suspensa, poma. Vnguenta, tum alia iam su-
pradicta etiam cap. De priapismo, hic conueniunt.
Si igitur sit ex abundantia & multitudine seminis
ac sanguinis, curetur venæ sectione, & hoc modo,
cuius exemplum curationis posuimus Obs. ii. huius
lib. At si sit ex acuitate sanguinis, mundifice
tur sanguis facta prius venæ sectione, & euacuatur
cum iis, q̄ bilē euacuant, nempe cum rhab. myrobal.
citris, vel cum cass. & rhab. vt etiam diximus, ea-
dem Obser. & contemperetur bilis, & exhibean-
tur ea, quæ paulo ante diximus. eadem Obser. ii.
dentur lentes coctæ in aqua, & coriand. & alia quæ
extinguunt semen, vt portulaca, aqua lactis mul-
tum acetosa, a qua butyrum extractū, adhibeantur

8 frigida emplastra, & adstringentia, & quæ experientia comprobata sunt semen minuere: qualis est syr. Donati, qui recipit. *Sanguinaria, acetosella, plantaginis, ana p. j. portulacæ, & precolorum vitis, umbil. ci Veneris. & rubi, an. m. j. s. myrtill. sem. coriand. prepar. pap. albi, an. ʒ. s. folior. lactuca, flor. nenuph. borag. & viol. an. m. s. folior. ruta, viticis, mentha, calaminta siccorum, an. ʒ. iij. bulliant secundum artem in aqua pluuiali q. s. de qua ʒ. lb. iij. deinde succi ros. rubeæ. granatorum, & pomorum acidorum, an. lb. s. adijcto, & cum saccharo exiguo, aceto. fiat syr. quo utatur ager saepius singulis diebus ʒ. ij. vel iij. absq. benis. Item præter pastillos. i. Obser. descriptos, tales & hoc modo confici poterunt. ʒ. sem. ruta, agni casti, urtica. an. ʒ. s. sem. lactuca, portulacæ, plantaginis, & pap. albi, ana ʒ. j. sem. coriand. prepar. & canabis torrefacti, an. gran. iij. diacalamintha ʒ. ij. cornu cerui vsti, sem. ros. sandal. corall. rub. an. gr. vj. sem. melon. ʒ. ij. sacch. dissoluti in aqua ros. q. s. formentur pastilli: quorum vnum cum paucis vino rubeo astringenti, aut pauca aqua, in qua saepius ferrum fuerit exstinctum, aut etiam eisdem simul permixtis, assumant pro qualibet vice. Hoc quoque vnguentum fieri potest. ʒ. olei ros. omphac. cydonior. nenuph. myrthini, ana ʒ. j. cremoris seminis lini, sem. cotton. extract. cum aqua ros. ana ʒ. s. folior. ruta, agni casti, mentha siccorum, ana ʒ. s. succi polygoni, portulacæ, semperuui, ana ʒ. j. pul. corall. & sandal. rub. sang. draconis, boli arm. ana ʒ. j. cera q. s. & aceti parum, misceantur, & fiat vnguentum. Valent hæc*

Ex longo decubitu & vitiamento- rum euchy- morum.

ad acrimoniam seminis, & quemcunque fluxum ex debilitate virtutis retentiuæ, etiam vasorum seminalium. Si vero fiat ex longo decubitu, & vitiamento euchy- morum, minuenda hic sunt alimenta, & danda quæ minus nutriunt, & curatur eodem modo, ut ex abundantia. Rondeletius putat, inuare iniectionem per syringam in anum exigua quantitate, super ventrem incumbente ægro. ʒ. rad. ireos ʒ. j. myrtill. folior. lentisci & cupressi, ana ʒ. ij. ros. rub. & salvia. ana ʒ. j. seminis agni casti ʒ. s. seminis ruta. ʒ. ij. fiat decoctio in vino. inijciatur lb. s. pro vice reiectis prius recrementis. Huius rationem apud illum vide cap. 57. de Gonorrhœa. Interea fouet regionem pubis, & perinæi, prædicta decoctione, & hoc vng. inungit. ʒ. olei myrtill. mastich. urini, ana ʒ. ij. nucis cupressi. myrtill. ana ʒ. iij. macis, garyophyll. agni, ana ʒ. ij. cera q. s. fiat vnguent.

Ex compressione. Obviatore.

Ab aquositate seminis.

Tempore inunctionis adde aceti albi parum, ad penetrationem & contractionem partis. Quod si accidat ob compressionem, auferatur quod comprimit, & non retineatur vrina, vel stercus. Quod si alio tumore, curetur propriis remediis. Si proueniat ab aquositate & fluxibilitate spermatis, eius exemplum posuimus Obs. 12. huius lib. Fac, ut ibi dictum est, euacuetur aquositas, & adhibeantur eadē, quæ proprietate valent ad gonorrhœam, & quæ inspissant semen, & vnguentis roborantibus vtilicet, & etiam adstringentibus. Si virtus contentina debilitatur a frigido, cum calidis rebus sperma minuentibus misceantur stiptica calida, ut est thus, mastix, cortex thuris, anisum torrefactum, ruia, origanum, & cyminum torrefactum, & utatur

vnguentis iam dictis. At si contingat quod æger ex gonorrhœa diuturna exsiccetur, & macilentus euadat, ac ad tabem conuertatur, tunc exhibenda electuaria resumtiua, & cibi facili digestionis & boni nutrimenti. Si ob renes calfactos, refrigerentur: & si ad sint alia vitia renū, propriis remediis curentur. Ita quoque ubi rigido, seu intento pene seminis profluuium fiat, & propterea, quod morbo comitiali, aut alia vehementi conuulsione æger laboret, eueniat, his opitulandum est cum his medicamentis, quæ prædictas affectiones curare valent, quorum copiam propriis locis studiosi reperient. Neque tamen prætereundum, circa lumbos, & pubem prædicta medicamenta adhibenda. Ita gonorrhœæ factæ ex spasmu curatio est similis curationi epilepsiæ, inungendo musculos circa renem & pectinem oleo castoreo aut castorino. At si particulare quampiam dispositionem conuulsioni similem seminaria vasa patiantur, & propterea seminis profluuium accidat, iis quæ De priapismo superius retulimus utendum erit, potissimum si ex flatuoso spiritu eadem in eis excitetur affectio, quanquam lentium decoctum in potu sumtum, præter id quod semen exstinguat, membri etiam turgentem remittere ac sedare valeat, ut quidam aiunt, ex Actii testimonio. Tarrantus cap. proprio De gonorrhœa, lib. 6. inquit, si contingat ob paralyin, aut spasmus vasorum spermatis, curetur sicut dictum est in propriis locis De paralyi & spasmu. & cap. De paralyi vesicæ. In quouis loco fuerit paralyis, hoc vnguento inungit, ex qua origo mouentium nervorum illud membrum fuerit. ʒ. myrrhæ electæ, aloes hepaticæ, spicæ nardi, sang. dracon. thuris. mumia opopanax. bdellij, carpo balsami, croci, mastichis, gummi arab. styracis liquida. styracis rubra, ana ʒ. ij. s. mosci ʒ. s. cerebini hina ad pondus omnium misceantur. Hæc omnia puluerisata distillantur in alembico vitreo & reponantur in vase vitreo. Hanc distillationem vires olei balsami æquare scribit.

OBSERVATIO XV.

De Gonorrhœa in muliere.

Vxor illius Iosephi, qui Alcmariæ p. fillos cōficiat, cum gonorrhœa laboraret, hoc vno decocto a profluuiio seminis, & urinæ ardore, post vniuersalia remedia, adhibito, euacuatione prius præcedente, ex continenti per me curata fuit. Postquam enim & decoctionis hordei lb. s. sacch. ʒ. ij. & syr. myrthini ʒ. j. s. pro duabus vicibus sumisset. Bis deinde in die hoc decoctum præbui. ʒ. glycyrr. ras ʒ. vj. seminis myrtill. coriand. prepar. plantag. agni casti, ana ʒ. j. sem. pap. albi ʒ. ij. sem. hyoscyami ʒ. s. hordei munda. m. j. acacia, sumach, ana ʒ. j. semina contundantur crasso modo, & omnia bulliant in aqua chalybeata pro lb. j. s. col. adde troch. s. a. kekengi ʒ. j. misc. & sumach, inquam, cyathum bis in die, neq; aliis medicamentis opus habuit. Benedictus præceptor meus Fauentinus in simili caso, magno cum succ. s. & experientia utebatur: si & gonorrhœa ad sit dolor & ardor, dabat septem diebus lactis ouilli ʒ. ij. aquæ plantag. vel succi eius ʒ. j. boli arm. ʒ. j. misc. & tepide dabat.

10 Si ad tabem inclinat.

Si ob alias a- gitudines, quomodo curetur.

11

S C H O L I A.

Recte dixit Aetius lib. 11. cap. 33. quod gonorrhœa non solum viris, sed & mulieribus accidat: in quibus quamvis id ex mente Galeni dicat, quod ægre tollatur, tamen hæc mulier tam cito, & unico quasi remedio, præcedentibus tamen universali-
 2 bus præsidiiis, curata fuit. Quod autem mulieribus tale vitium excitetur, lib. 2. de semine, testatur Galenus, exemplo mulieris, quæ vteralibus morbis vexabatur, cui in vulvam prius, deinde ex ea foras, & copiosissimum & crassissimum semen effluere visum est: tale autem collectum erat, propterea quia diu vidua permanerat: tempore autem, quo ipsum emittebat, lumborum, manuum, & pedum, distensiones quædam eandem inuadebant; adeo, inquit, ut conuulsa esse videretur. Hæc quoque præ nimio pudore quandoque periclitantur; interdum ex nimia caliditate, addita humiditate membrorum, magisque si a venere diutius abstinerint; aliquando & humoris in concoctione. Etiam ex contagione viri habuimus aliquando mulieres gonorrhœa infectas quas & multas curauimus, prius ipsis optime purgatis, deinde assumpto decocto guaiaci, deinde & constringentibus. Si sine infectione seminis profluvio mulieres laborant, his eadem remedia, quæ superius diximus, erunt instituenda, sed topica supra ventrem, vel circa renes, & maxime ad latera eo in loco, in quo testes mulieris sitii sunt. Vbi autem ob earundem partium inflammationem tam viris, quam mulieribus reiciatur aliquid seminis boni, vel corrupti, quod expurgatur, tunc recurrendum ad caput de ardore urinae, in quo de inflammatione illarum glandularum etiam dictum est prius. Si plura desideres de gonorrhœa, videas Consultationem Banerii 82. de gonorrhœa, & Consultationem Montani 85. de gonorrhœa cum passionibus pudendi ardore urinae, difficultate mingendi, & febr. erratica, & Consilium 197. de gonorrhœa.

OBSERVATIO XVI.

De Gonorrhœa, & testicul. inflatione, ac genu, cum suspitione luis Venerea.

Iuuenis quidam, alioqui doctus nuper ex Italia domum reuersus, in gonorrhœam incidebat, cui & testiculus vnus inflatus erat cum genu quoque inflatum; adeo ut hæc mihi suspitionem morbi Venerei præberent, quamvis omnia signa, quæ in lue illa apparere solent, nondum perf. & aderant. Huic autem statim exhibui cassiam, mox & confectionem hamech, deinde & pilulas de fumoterra, etiam secta vena; aliisque medicamentis, quæ mihi apta videbantur administraui: & tandem hoc quoque decoctum. ℞. rad. inula. fœniculi, apii, cichorii, buglossæ, ana ℥j. fumarie m. ij. borag. viol. scolopendrii, capill. Vener. summitat. lupul. herba paralytis ana m. j. florum borag. & florum herba paralytis, ana p. j. chamæpit. chamædr. stœ. had. ana ℥j. & sem. fœniculi ℥ij. sem. citri ℥j. omnia hæc infundantur per diem, ac noctem in s. q. aquæ pluuialis, & aquæ fumarie: quibus hæc addantur; myrobal. citri. nor. chebul. indorum, ana ℥j. & contundantur hæc leni-

ter, & facta leui contusione, simul infundantur, addēdo folio. senæ & Alexand. epithymi, polypod. querc. glycyrrh. rasæ, ana ℥j. cortic. hellebori nigri ℥j. (in fortioribus pono ℥ij. vel ℥j. s. in hoc sufficebat ℥j. quod debiliior esset ex gonorrhœa, quæ aliquo tempore durauerat, cum & facilis solutionis esset) rhab. selecti ℥j. & fœcænantib. ℥j. infundantur simul, & decoquantur suff. ienter ex arte, & linteolo crassiori colentur, & fiat potus longus pro ℥ij. addenda syr. ex infus. ros. ob hepatis caliditatem, ℥j. syr. de fumoterra ℥j. & zachari albi ssimi q. s. pro sapore delectabiliore. Omni die ter quaterue secessus habebat cum tanto successu, ut non opus fuerit accedere ad decoctum ligni gaiaci: & quod dictum mirum est, non solum a gonorrhœa, sed & aliis symptomatis curatus fuit. Ad gonorrhœam quoque curandam egregie commendatur succus limonum ad ℥ij. etiam ad urinæ suppressionem ex humorib. lentis, cum cautione tamen, referente Amato ceter. 5. curat. 71. cum impotentem hominem reddat aliquando, & ad procreandam sobolem inhabilem ut cuidam ex Principibus Italiae superioribus annis, in bello Germanico euenit, eodem Amato testante.

S C H O L I A.

Nunc fere gonorrhœa indubitatum signum morbi Venerei existit, si vel vlla alia leuissima argumenta eiusdem morbi appareant, ut Amatus in Monacho illo Ordinis Prædicatorii ostendit Centu. 4. Cur. 69. ad longum. Hæc quidem gonorrhœa, ut paulo ante diximus ex Langio & Fernelio, differt a vera gonorrhœa, & curatur decocto gaiaci, ut lues Venerea. Verum non potius alio decocto vti sumus, & plerumq; vtimur, uti & Montanus suadet in Consultatione quadam de morbo Venereo recenti, cum & is simili decocto vtatur, absque herbis supradictis cum infus. myrob. epichymi, polypodii, & helleboro, quo se testatur plurimos in initio morbi Venerei curasse; ac tale decoctum laudat ante ligni gaiaci exhibitionem. Sed & hoc decocto, etiam cum herbis feliciter vtimur, vbi vel leuis suspicio de hoc morbo sit, ante ligni gaiaci potum. Verum de his latius dicturi sumus De Lue Venerea, cum hæc gonorrhœa ad eam quoque pertineat, & ex fœdo ictero, aut muliere impudica, fiat. Pessime quidem faciunt, qui hanc gonorrhœam subito cum adstringentibus medicamentis curant, uti quidam Chirurgus facere solebat pulvis quibusdam ex terebinthina lotæ cum aqua ros. & pulvere sarcocollæ, mastichis, nucis musc. & glycyrr. simul mixtis, in modum cicerum paratis, quarum exhibeat v. vel vii. ante purgationem. Verum his, tū aliis, post purgationem nos commode vti sumus ad restrictionem, tū in hac, quā in vera gonorrhœa. Sed oportet, ut corpus sit purum, & optime repurgatum. Nam impurum & putidum semen si restringatur, pessima aliquando inducit symptomata: ideo eiusmodi remediis nequaquā vtendum, nisi remediis vniuersalibus præcedentibus. Idē de topicis præsidiiis intelligendū, potissimum si impura sit gonorrhœa, vel semen crudū impurum: illud enim subito non est retinendum:

sed ubi malum protrahatur, & vires deiciat, ad adstrictionem veniendum.

OBSERVATIO XVII.

De seminis in somnis profluvio, vel pollutione nocturna, ut vocant.

Religiosus quidam singulis fere noctibus, paucis exemptis, patiebatur pollutionem nocturnam, qui consulendi causa me accessit, ut ab hoc malo liberari posset. Cum hic iuuenis esset, robustus, pilis abundans, optimae habitudine, colore subrufo, venis repletis, delicate ac in otio vivens, cibis ac potibus utens semen multiplicantibus, non erat admiratu dignum, quod hoc malo laboraret: eoque magis cum salax esset, & non solum causas in se complecteretur, quae sperma mouerent, sed imaginationibus foedis indulgens, noctu facile cum quadam concupiscentia semen proflueret. Nam & concupiscentiae receptae, & vis imaginatiua, & speculatiua, & cogitatiua mouent virtutem naturalem expulsiuam, ad expellendam materiam spermaticam. Sic quidam non solum (ut dicebat Aetius lib. 11. c. 34. *De seminis in somnis profluvio, ex mente Philagrii*) cum pudendi intentione, sed etiam cum quadam proposita imaginatione, quae in somnis occurrit, inordinate semine profundunt. Fit enim corpus noctu in somno interius calidum & humidum: quale id scilicet secundum Arist. 6. probl. esse debet, si coitu utendum sit: cum & sperma tale sit. Propter istam causam de die raro accidit pollutio: quia in vigilia interius minus calidum & humidum est. Leonellus tamen scribens, de pollutione ex fortis imaginatione & concupiscentia, reperisse & vidisse se quendam rusticum iuuenem, ait, qui ex sola inspectione mulieris, incurrebat pollutionem in die. Pueris vero non accidit pollutio, nec in die, nec in nocte: & causa est, quia materia nutrimentalis eorum non superfluit pro generatione seminis. Nam nutrimentum ipsis est necessarium pro augmento corporum eorum. Ceterum hic magis hoc malo tentabatur, cum uxorem non haberet, quam praestitisset cum habuisse, cum & viduis iunioribus salacioribusque; Diuus Paulus praeeperit, ut in Domino nuberent. Verum cum hic alia praesidia quaereret, eidem prohibuimus spectacula Veneris, colloquia, lectiones impuras, imaginationes foedas, & tactus impudicos somnum lupinum; ne in molli quoque pluma decuberet; suadimusque, ut ieiunaret in pane & aqua, si posset, & ut a cibis delicatis, & iis abstinere, quae semen augent, imo potius iis uteretur, quae semine extinguunt; uti sunt lentium decocta, viticis semen tostum, & ruta comesta, & aqua fabrorum ferrariorum, qua ferrum saepe extinctum est; haec enim assidue potata, iuxta Aetium, citra molestiam imminuit semen, ut & folia salicis, agni casti, lectis substrata. Praecepimus, ut sub lumbis laminam plumbeam portaret. At illa lamina debet perforari multis foraminibus, ne intra vapores retineant, alioqui maiorem caliditatem introduceret, resolutionem vaporum prohibendo. Et cum praecipua curatio consisteret in euacuatione materiae, & diuersione (ex abundantia enim seminis & sanguinis repletionem, hoc vitium hic fiebat) imperavi, ut san-

guis illi satis copiose, ut robusto & viribus valido, detraheretur, & ad diuersionem vomitus illi concitaretur, cum oxymel & decoct. rad. raphani. Volunt enim auctores, vomitum in hoc casu utilior esse solutione ventris; quauis & clysteres lenes commendant. Interea, & ut iis uteretur iussimus, quae similiter auertunt; ut sunt frictiones brachiorum vehementes. Praeterea his ieiunia utilia sunt, plurimumque iuuant: uti & simplex aquae potus, ut diximus paulo ante, & illa, quae refrigerant, & calorem debilitant, & Venerem consopiant, ut dormire supra folia salicum, & tenere solatrum supra se. Haec & similia dicuntur pollutionem prohibere: nec minus supra agnum castum & rutam recentem dormire, iuxta Rhases: nam & Auerrhoes 6. *Collectaneorum* ait, *Salernitanos cum ad conuiuia irent, secum apportasse herbam agni casti, & super eam sedisse, ut in eis sopiretur & remoueretur Venus, ac coitus desiderium*. Aeris quoque frigiditas vehemens geniturae exundantiae ex vi robusta calida, & humida, renum & membrorum genitalium, vel ex acuto semine, vel pruriente, summum est remedium. Sed & odorata frigida & sicca virtutis, qualis caphura habetur, quae castrare mares dicitur odore. Venus quoque offenditur, si nudis pedibus quis ambulet. Galenus sterni tomentum recentibus rosis iussit, & eo modo intemperantiam coercuit. Libidinum quoque imaginationes compescit lactuca satiuae semen, tritum ex aqua potum. Nymphaea a ieiuno pota, & in cibo sumpta, & illita radix genitalibus, inhibet non solum somnia Veneria, Veneremque ipsam, sed & affluentiam geniturae prohibet. Ruta commanducata crebro per somnia Venerem imaginantibus prodest. Venerem quoque extinguunt, cicutae folia illita testibus citra pubertatem. Ut pollutionem itaque hic noster arceret, consului ut praedictis uteretur. Vel imitaretur illud exemplum, quo nobilis quidam, ex consilio mulieris, ut refertur apud Leonellum, cum per quatuor menses passus esset continuo pollutionem, curatus fuit. Quando dormitum ibat nobilis, ligabat filum vel chordulam, ad collum, quae chordula descendebat usque ad collum virgae, & cum ea virgam ligabat, non multum stringendo. Et quando in somno inflabatur & erigebatur membrum, propter ligaturam illius chordulae dolorem virgae incurrebat, & sic excitabatur, ut semen in somno non reiceret, & ita fuit curatus.

S C H O L I A.

Aetius lib. 11. cap. 34. *de seminis profluvio, ex Philagrii*, Semen, inquit, profundere dicuntur, quicumque dum dormiunt natura genitale semen emittunt: quod ipsum eis ut plurimum ob vitiatum humoris materiam, aut materiae multitudinem, aut partium seminalium robur, contingit. Iam vero quidam & ob animi deliquium, aut inediam, per somnos praeter consuetudinem semen excreuerunt: atque id materiae acrimonia irritati, non ob partium seminalium robur pertulerunt. Huiusmodi sane, qui videlicet animo linquntur, aut inediam diutius pertulerunt, in totum fere nulla imaginatione praecedente, citra sensum etiam, in somnis profluit

6 profuit semen. Reliquis autem non solum cum pudendi intentione, sed etiam cum quadam proposito imaginatione, inordinate semen profunditur. Raro autem id fit ex inedia, sed potius ex abundantia seminis, ut huic sacerdoti eveniebat. Ceterum pessimus corporis habitus hic est, iuxta eundem Aetium, quum semen multum & calidum aliqui generant, quod eos ad excretionem urget, atque postquam per coitum eiecerint, exsolutione oris ventris patiuntur, & toto corpore exsoluntur. Debilesque fiunt, & sicci, & tenues, & pallidi, oculos etiam caecos habent hoc modo affecti. Quod si a coitu Venereo abstineant propterea, quod ita afficiantur, capite discruciantur, itemque stomacho, & æstu, fastidioque anguntur, nihilque magnopere ex continentia iuvantur: contingit enim eis per somnum semen profundentibus consilia perpeti offendicula qualia coeundo perpessi fuissent. Quidam vero ipsorum mordax & calidum semen percipiunt in excernendo, veluti ipsi confitentur. *Hic, inquit Gal. consilium oportet, quo a cibis semen gignentibus abstineant: accipiant autem cibos, tum pharma, qua semen extinguunt, de quibus nunc diximus: cum & eadem conveniant semen extinguentia, de quibus in gonorrhœa prius dictum est.* Habemus & apud Aetium loco citato, vnguenta, & refrigerantia, & alia, tum ea, quæ ad seminis profluvium valere scripsit. Neoterici tres præcipuas causas pollutionis referunt, primitivas, antecedentes, & conjunctas. Primitivæ sunt, crapula, nimia repletio ciborum delectabilium, medicamenta, vel cibi semine augentes, & ad Venereum incitantes, frequens imaginatio ac cogitatio fortis circa Venerea & de coitu, amor diuturnus alicuius mulieris, cuius effigies vel species in mente conservatur, quæ & aliquando a virtute imaginationis in aliam transmutatur, unde contingit, quod aliqui somnando se polluant, non tanquam cum dilecta, imo ut cum alia. Inter easdem causas enumeratur & longus somnus supinus supra dorsum, & decubitus renibus concalactis atque vasibus seminariis, ita ut semen eliquatum cogatur exire. Hæc ex ægri relatu cognoscuntur, & amovenda sunt suo contrario. Si sit ex crapula, iuvaticinium & abstinencia: cibi delicati, vel medicamenta incitantia Venereum, relinquenda, & ea quæ semen extinguunt propinanda. Si somnus longus, vel desubitus in dorso, causæ sint, vigilandum erit, & in latus alterutrum decumbendum. Si ex amore vel imaginatione, studendum ut potiatur sua amica, uxoremque ducat. Iuvenibus enim lascivientibus potius id præcipimus, quam ut Diogenis illius spurcitiem cum Galeo nostro ethnico, lib. 6. de locis affectis cum s. laudemus, cuius manus hymen eum celebrando meretricis adventum prævenerat. Non, inquam, pro castitate illud laudandum, imo gravissimæ vituperandum, cum Christianissimus, sciens, quod neque scortatores, neque adulteri neque molles, masculiniores, neque qui concumbunt cum masculis, regni Dei hereditatem accipient, ut Divus Paulus 1. Corinth. 6. scribit: qui & ultimo cap. ad Hebræos ait: Formæque & adulteri iudicabit Deus. Horum

rabile, inquit, est inter omnes coniugium, & stabile impollutum. *Uti igitur quis a nocturna pollutione liberetur, nihil præstantius est, quam uxorem ducere.* Sed de his hæcenus. Ad causas antecedentes referunt, nimiam abundantiam sanguinis, & seminis, & humorum, vel acuitatem seminis, vel repletionem seminalium. Hæc satis sunt manifesta ex dominio humorum, & ex iis, quæ diximus de gonorrhœa. Vbi enim adest repletio, venæ sectio præscribenda, tum vomitus, ac abstinencia, & quæ semen extinguunt, & refrigerant, ut satis dictum est. Si sit acuitas seminis, frigidum temperanda erit, & ea quæ calorem extinguunt semenque minuunt adhibenda. Ad causam conjunctam alii referunt materiam spermaticam existentem in vasibus spermaticis. Si abundat, minuenda atque extinguenda. Si acris, temperanda & consopienda. Non desunt, qui adhibendam hanc passionem, pro arcano habeant, *potum vini rubri austeri, cui iniectus fuerit cinis ranarum ad 3 j. vel 3 ss.* Eadem autem omnia fere valent, quæ de gonorrhœa prius descripta fuere.

Causæ antecedentes pollutionis.

Causæ conjunctæ pollutionis.

OBSERVATIO XVIII.

De coitus diminutione & impotentia coeundi.

1 Quidam cum nuper uxorem duxisset, & ad rem Veneream præter expectationem impotens effectus esset, (vir alioqui bene valens, & qui ante ductam uxorem Venere optime uti potuerat) de ea re apud me conquestus, auxilium petiit: atque ego non potui non huic viro succurrere. Equidem non minus sævi, quam impii diceremur, si pauperculis illis, qui nuper uxorem duxerunt, eisque potissimum quibus magistratus, aut regni amissio imminet, nec non & mœstis, male nuptis eorum vxoribus auxilia non præberemus, cum inefficaces ipsi in Venereis congressibus deprehenduntur, contrario vitio laborantes, quæ priusismo & satyriasi. Istis qui afficiuntur, sæpe salacioris nimium propensi sunt in Venereum: hi vero impotentes ad rem Veneream exercendam, quamvis ea uti cupiant, quemadmodum huic viro contingebat. Ut autem ei recte consulerem, iis uteretur præcepti in communi, quæ Venereum concitant, & seminis copiam faciunt, & etiam membrum virile flaccidum erigere possunt: ut sunt cibi delicatiores, quiq; maxime alunt, ac vinum meraciusculum, quale creticum est dulce, muscum redolens, omnium suavissimum. Hic enim conveniunt, cum seminis inopia adsit, (ut in hoc videbatur, nam paulo macilentior erat) tam alimenta, quam medicamenta calefacientia & inflantia: nec non & seminis gignendi potentia prædita esse debent, ut colligitur ex Aetio lib. 11. c. 35. Sunt autem talia, cicer, fabæ, halica, porri, bulbi, pastinacæ radix & semen moderatæ, nuces pineæ, ari radix cocta, itemque dracunculi, urticæ semen, crucæ tum folia tum semine, maxime agrestis, costus & piper cum vino mulso, saryrium, tesamum, horminum, amygdalæ moderatæ, anilum, polypodes, & concharum genera omnia: perdicis item ova ad coitum excitant, & testiculus galli. Seminis vero multitudinem augent

2

7 Causa primitiva pollutionis.

Curatio pollutionis.

omnia bono succo prædita: testes vulpis sicci triti, cochlear i mensura potati, innocuam, & minime vanam membri tentiginem faciunt: partes etiam renes scinci amplectentes ad tentiginem pudendorum excitandam bibuntur. Orchis herba est, quæ testiculi appellationē habet: eius maior bulbus cum lacte potatus tentiginem cit, minor vero cum aqua potatus, tentiginem remittit. In genere autem semen prouocant, quæcunque calida sunt, & flatuosa absq; deficcatione. Enimuero cū seminis substantia ex bona superfluitate generationem sortiatur, sitq; etiam flatuosa: ea quæ bene nutriunt, & flatuosa sunt, semen certe procreare & coitum prouocare possunt. ex Galen. 5. de simplic. medicament. facult. Propterea mandavi, vt pro cibo carnes eligeret gallinarum, caponum, perdicum, phasianorum, iuuenum columbarum, turdorum, merularum, passerulorum, nec non reliquarum auium montanarum; & vt rapis coctis cum lacte, pauco insperso pipere, vel zinzibere, vesceretur; & radice etiam siferis, & pastinaca in iure coctis, & caryotis, eryngioq; in montib. arenosis apud nos crescente (volgo a venatorib. dicitur *Nasentöl*) vteretur. Noui ego quendam generosum virum, & stemmate valde illustrem, qui cū multas concubinas aleret, quæ hominem fere exugebāt, valdeq; macilentum efficiebant. verū vt alacrior ad coitum esset, vtebatur illis radicib. eryngii crescentibus in nostris montibus arenosis, cum carne bullitis, loco pastinacæ, bauciæ, & caryotarum. Commendaui passerū cerebella masculorum, vt frequenter iis vteretur, & vt fabas excorticatas recentes comederet in aqua coctas, deinde ablata aqua contusas, adiecto oleo amygdal. dulc. recenter extracto, pipere albo, & zinzibere exiguo immixto: nam hæc valde iuuant ad coitū. Præterea vt sæpe quoq; lumeret ex electuario infra scripto. *℞ zinzib. recenter conditi, radicem eryngii recenter conditarum, rad. pastinacæ condita, an. ʒj. pinearum præpar. fistulorum, auellan. assatarum, diaspyrionis, an. ʒ ss. sem. bauciæ, naporum, an. ʒij. testiculorum vulpis cerebellorum passerum, an. ʒ ss. cum syr. confer. zinzib. virid. fiat electuarium: capiat cochlear unum, & superbibat vinum dulce.* Vel fiat hæc opiata a Rondeletio cōmendata. *℞. testiculorum vulpis decoctorum in hydromelite ʒj. contusis adde pinearum, & auellanarum infusarum in pauco lacte & melle. ana ʒ ss. carnis leutra, stercoris muris, mosci, ana ʒ ss. cum syrup. conferu. corticum citri fiat opiata.* Iussi autem, vt & frequenter comederet castaneas molles, dactylos, erucam, & bulbum. Eryngiorum rad. conditæ cum melle, egregie huic profuerunt, vt & electuarium prius scriptum. Cum itaq; duobus ferme mensibus vxorem habuisset, optime Veneri sacrificauit, ita vt postea vxor illi etiam multas proles pepererit.

S C H O L I A.

5 **E**st autem hic affectus impotentia quædam ad rem Veneream exercendam, quamuis ea vti cupiant, vt *Aetius recte dicebat*, propterea quod ignaua & impotentia genitalia membra habent. Afficitur autem in hoc vitio pudendū, cuius pro-

prium munus est, vbi ad coitum insurgit animal, media eius naturali facultate, quæ ipsum attollere potest, vt protinus distendatur pudendum, iuxta Galeni sententiam. Attamē nos nouimus quendam iuuenem raræ & siccioris temperaturæ, qui, cum nuper viduam duxisset, mihi conquestus est, (vti & alii non pauci) se cum coitu vteretur, vterro licet optime extento & rigido, semen tamen eiaculari non posse; quamuis ille, tum alii nonnulli, cum aliquo tempore in coniugio vixissent, vtētes iis, quæ semen augerent, ad Venerem exercendam deinde potentes fuere. Vtrum nimis cōcalfacti, vel nimio amore incitati semen minus eiaculari potuerint, posteaq; animo sedatiores id optime fecerint, considerandum. Attamē in hoc vitio magna ex parte afficitur pudendum, iuxta

Gæcos, vt dicere cœpimus. Affectio autem, secundum eosdem, lympoma est in genere noxæ functionū naturalium, ac eiusdem pudendi propriæ ablata: nam neque hi in Venerem ruunt, & propterea ignaui fiunt, vt inquit *Paulus lib. 3. capit. 58. de particulis inefficacibus*; eoque animum perdunt. Causa horum est, eodem teste, particularum resolutio, vel seminis inopia. Et ita excitatur, vt plurimum, vel ex pudendorum resolutione, quæ ob frigidam aliquam intemperiem in eis extortam efficitur, vel ob seminis inopiam. Quamquam etiam ob reliquas causas quandoq; excitari contingat, renum præsertim occasione, aut reliquarum partium principum. Ob hoc Neoterici varias causas adferunt: cū & impotentia coeundi aliquibus accidat ob membrorum generationis imbecillitatem, quæ ab intemperie, vel a conformatione dependet. Nā qui membra frigida habent, non possunt alimentum sufficiens attrahere, & in semen conuertere, vel ob penis breuitatem intromittere semen. Alii hoc morbi genere detinētur, propterea quod parce comedunt, nec sufficit alimentum ad corporis nutritionem, & ad generationem. Vel si multum comedant, alimenta sunt parui nutrimenti, vt olera, fructus, &c. At quamuis causæ diminutionis coitus, & impotentia eiusdem variæ existant, nonnulli ad tres magis principales deducunt: nam earum quædam se tenent ex parte virtutis; quædam ex parte instrumentorum; aliæ vero ex parte materiæ. Rursus quæ fiunt ex parte virtutis, cum etiam ex variis causis contingant: ad quinq; alias causas reduci poterunt. Primo enim vel virtus concupiscibilis est diminuta, vel debilitata. Et hoc quia virtus imaginatiua & cogitatiua sunt distractæ ad alia negotia, vt contingit in religiosis, cogitantibus, & imaginantibus diuina; quemadmodum & assidue studētibus, vel hominibus negotiatoribus. Tales omnes distrahuntur a cogitationibus Venereorum. Secundo, quandoque contingit, quod homo in actu coitus existens acquirit & incidit in aliquam imaginationē turpem, & ad aliquem actum abominabilem, vnde remanet impressio in mēte illius, & quotiescunq; venit ad exercendum actum coitus, recordatur illius rei abominabilis, & spurcæ, & tūc cessat a coitu. Vnde contingit aliquando, quod aliquis

Quis affectus præter naturam sit

Causa. 7

Tres principales causas diminutionis & impotentia coitus.

8

9 quis paratus ad coitum, cum impetu fertur, & incipit Venerem exercere, animo deicitur, & ille apperitus a virga erecta subito cadit, nec amplius erecta stat. Ita scimus quosdam, cum in Venere cōiugali essent, vel promtiores facta inter eos de re tristissima mentione, ab opere imperfecto solitos desuigere, ut veluti inter mortuum clanguesceret genitale membrum. Quosdam in coitu sordidum auditum verbum, de Venereo diuerticulo perturbat. Alios eo improba & nefanda Venus dūtaxat excitat, peruersa naturali voluptate. Verba quædam extinctæ virilitatis speciem præstare nouimus, & quosdam maleficiis quibusdam quasi incantatis vxores nunquam cognouisse, subducto virilitatis spiritu; nec vnquā reuocatos. Alios rursus verecūdia tener, nonnullos metus ipse: tot modis suspenditur cum animo coitus. Qui enim, ut *Tarantianus refert*, de aliqua foemina verecundatur, nil boni cum ea operabitur, nisi cum ea frequenter affuescat, & familiaritatem ineat. Sic religiosis diuturna castitate virilia contrahuntur, & consuetudine segnitie oritur: pariq; ratione nutritibus, sublato puerperio, māmæ resiliunt. Tercio, quandoq; contingit ex debilitate virtutis virilis; sicut accidit in illis, in quibus calor naturalis est valde debilis, quemadmodū in extenuatis. Ita & quidam naturali habitudine Venerem non amant, ut qui præparci sunt animi ac senes. Quarto, quandoq; ex parte virtutis naturalis debilitate, ut puta quando in membris non fit bona digestio. Quinto, quandoq; ex parte virtutis animalis sensitiuæ: quia ad actum coitus omnia ista conferuntur. Quæ vero ex parte Instrumentorum (quæ erat secunda causa præcipua) rursus in alias multas causas, & infinitas quasi deducitur. Aut enim ex parte virgæ & membrorum genitalium, aut ex parte membrorum principalium deferentium eis tam præparatorie, quā delatorie, aut ex membris mediis inter genitalia & principalia membra. Ex parte virgæ, ob paucitatem inflationis virgæ, sicut contingit in mirach, quando in illo non fit materia ventosabilis (ut *Prædicti loquuntur*) neq; etiam in intestinis; unde non communicatur virgæ. Fit etiam ob malitiam complexionis in virga, frigida præcipue & sicca; vel quod membra vitata vel mutilata sint. Eunuchis spadonibusq; & quibus in vniuersum sunt excisa genitalia, Veneris usus ex omni parte sublatus est. Virga quoque nimis curta brevis atq; gracilis, coitum diminuit & proprie gignitium: quoniam sperma non deducitur in concavum vteri, qui est locus ei proprius: quare in collo matricis resoluitur & coll. quatru a frigido continente, & sic effluit saluatum. Aliquando contingit, propter nimiam longitudinem & virgæ, quæ aggrauat virgam & virga nō erigitur, nec potest summum eleuari. Et si erigitur, statim iterum cadit, vel concidit. Ita & aliorum membrorum genitalium ratione, & testiculorum. Propter malam scilicet complexionem ipsorum, cuiuscunq; generis sit illa mala complexio, maxime vero frigida & sicca: aut propter nimiam paruitatem eorum, cum parum spermatis contineant; aut propter eorum-

dem magnitudinem, unde tunc virtus spermatis in ipsa contenta dissoluitur & dispergitur. Virtus autem vnita fortior est seipsa dispersa. Aut vero propter solutionem continuitatis factam in ipsis vel ab extrinseco, vel ab vlcerebus intro. Sic in Venere segniores sunt, quibus spina, vel caput, atque cervix percussa est, vel vena, quæ post aures fertur, si incisa fuerint: multo magis si hæc genitalibus contingant, ex percussione, offensione, vulnere, vel quavis alia læsione. Quandoque etiam contingit ex parte corporis totius, quando in toto corpore sunt pauca humiditates ventosabiles, ut dicunt, quæ totius corporis debilitas est vel quia est siccum & extenuatum naturaliter, vel decrepitarum, vel fame plurimū, vel vigiliis exhaustum, vel diuturna ægitudine consummum, vel maceratione aut labore fatigatum. Ex parte vasorum seminalium, vel plurimum contingit ob oppilationem factam in eis, ab aliqua causa oppilante: unde rō descendit sperma ab eis ad testiculos, qui sunt obstricti. Ex parte etiam membrorum principalium dixi: & sic contingit, aut propter defectum materię ipsius a corde scilicet, quando non transfunduntur spiritus a corde per arterias ad testiculos: vel ob animi debilitatem, utpote quia passionibus pluribus anastatur. Vel fit propter defectum materię spermatis. Et hoc contingit ex parte hepatis. Nam materia spermatis, est materia humoralis. Aut ex parte cerebri: nam maior pars spermatis decidit a cerebro: & sic cum deficit imaginatio ad coitum, etiam semen deficit, & hoc ex cerebro. Sic deficit desiderium & erectio virgæ, id euenit a corde. Præterea cum deficit appetitus coeundi, & concupiscentia, illud contingit ex defectu hepatis. Ex parte membrorum mediorum etiam potest esse diminutio Veneris, & ex debilitate eorundem inter membra principalia, & genitalia: sicut ex parte renum & stomachi, & ex debilitate istorum membrorum mediorum: nam & malis complexio renum & stomachi, ut plurimum ex causa frigida, vel nimium calida, minuit coitum. Quibus enim stomachus inualidus, & renes infirmi sunt, iis tenuia crura cernuntur, facile semen non mittitur, & proinde minus possunt vti Venere. Quod si salaciores ea re plurimum supra vires vrantur, iis crura magis extenuantur; atque oculi interius resident. Nam inter omnia animalia, homo ac equus, libidine plurimū dissoluntur, quoniam plurimum seminis demittunt. Sed, ut eo unde digressi eramus reuertamur. Causa tertia præcipua erat, ex parte materię spermaticę. Id itaq; euenit ob paucitatem eiusdem, aut quietem & immobilitatem; aut propter priuationem mordicationis materię. Rursus ex paucitate materię, quando pauca quantitas spermatis generatur, ut in extenuatis, & macilentis, & senibus: vel propter aliquid aliud, ut ob ægitudinem variā. Sic schiadicis & quibus nuper mariscæ excisa sunt, minus coeunt. Proflauium item vrinæ, infirmitatem virilium efficit, nam pinguedinem renum ac robur absomit. Rursus ex parte quietis, cum sperma tarde ad membra mouetur genitalia; vel

12

13

Causa ex parte materię.

14

Causa ex debilitate virtutis virilis, & animalis.

Ex parte instrumentorum

quia existit crassum & fere congelatum. Vnde non mouetur sperma ad membra genitalia, nisi tarde & leue. Vel quia meatus, vel v. e. sunt aliquantulum stricti & oppilati, per quas semen a membris debet decidere vsque ad membra genitalia.

15 Denuo ex parte priuationis mordicationis materiam, ut quando sperma non mordicat: hinc non incitat virtutem expulsiuam ad expellendum. Has omnes tandem causas in tres causas rursus partiuntur: in primitiuas, antecedentes, & coniunctas. Procatartice, seu externae, & primitivae, sunt indebitum vitae regimen, scilicet sex rerum non naturalium, tendens ad frigidum & siccum, aut frigidum & humidum excessiue. Sic aer frigidus nos circundans & penetrans inducit paralyin in membris genitalibus, & nimia caliditas dissoluit & resoluit ventositates, & consumit materiam, & non permittit ventositatem generari. Sed & balneatoribus Venus semper infirma est; nimia enim humectatione laeduntur. Ita & tabellarii longa equitatione, & qui cursu vel immodica succussione quatuntur, offenduntur. Huc etiam referuntur, casus percussiones, vulnera in ipso cerebro, vel capite, & in membris genitalibus, aut principalibus. Ad antecedentes referuntur, quauis mala intemperies existens in membris principalibus, & eis vicinis, & intermediis, mala ventriculi coctio, haemorrhoides incisae, & quauis nocumeta in viis communibus iuxta anum & virgam, & testiculos, vesicam, renes & vretres, & vala-

Antecedentes.

16 Causa coniuncta.

Signa.

Quibus notis infirma genitalia cognoscuntur.

Signa causarum.

17

seminaria, & agnitudines praecedentes totius corporis, vel partium dictarum. Ad causam coniunctam referunt eandem malam dispositionem existentem in membris genitalibus, praemissas etiam varias causas ipsius diminutionis coitus, paucitatem & totalem priuationem rerum omnium, & materiae seminalis, vel ventositatis erigenis membrum, appetitu coeundi ablato. De quibus omnibus nunc satis dictum est. Signa demonstratiua per se satis nota sunt, cum membrum non erigitur, vel, si rigidum fiat, semen eiaculari non possit, qualia & ex aegri sermonibus nota sunt. Si itaque Veneris usus praeter consuetudinem cuiuspiam eripitur, membra grauiora redduntur, cum cibi tadio, sensus obtunduntur, sineque ratione iracundus efficitur, sudoreque membra madent, & in Veneri lassescit, & cum sudore ab opere imperfecto exsurgit. Signa vero causarum etiam diligenter perscrutanda sine quarum cognitione non recte curantur. Si itaque fuerit ex causis primitiuis & procatarticeis, facile cognoscemus ex aegri relatu: ut si fateatur, se in aere frigido transisse per montes, aliaque loca niuosa, vel in capite fuisse percussum, vel partem caluariam ablatam, vel praecessisse casum ab alto, & quod ab eo tempore uxorem amplecti non potuerit: ita & de aliis membris inuestigabimus, num aliquis laesus fuerit in membris genitalibus: ita nobiles miles apud Tarantanum retulit eidem, cum pulcrum uxorem haberet, in inguine se & peritonaeo fuisse percussum, in bello, adeo ut partes genitales ignauae redditaerint, & in coitu deinde admodum impotens factus sit, ut uxor deinde im-

pragnari non potuerit. Si sit ob animi debilitatem, metum, vel verecundiam, aut ob famem, aut vigilias praecedentes, ex praemissis ea quoque facile intelliges. Causae antecedentes similiter indaganda. Si enim ex habitudine frigida, semen abunde fluit liquidum, vel sponte interdum destillat, sine voluptatis nota, & tum infirma virilia sunt, frigidique renes. Si paralyis vitio contigerit, membrum flaccidum manet, neque villo erigitur modo, neque tactu manus mulieris, & genitalia quandoque per somnos etiam effunditur, sine vlla Veneris auiditate ut Aegineta scribit. Exemplo nihilominus constat, in ea genitalium resolutione, aqua frigida perfusa virilitatem ad Venerem concitatum, quamuis (ut alii referunt) nec in hac causa, etiam si ponatur in aqua frigida, virga contrahetur. Tum semen paulatim destillat, & faciem pallor occupat, & membra macie consumuntur. Vbi enim fit ex paralyi, seu frigidityte in neruis virgae, semen est abundans, lubile, & facile egrediens, & desiderium constans, sed ad erectionem summa existit debilitas. At nonnulli ex aduerso nimia caliditate offenduntur, quia spiritus naturalis, priusquam profiliat semen, ante corripitur. Siccitatem ostendunt, quod semen non emittitur. Intemperies eiusque seminis exiguitas, sine Veneris auiditate; & si quid emittitur, in parua quantitate, & cum maxima difficultate exit, idque accidit plurimum extenuato corpore, & ex sanguinis paucitate. Verum melancholicos quosdam, tradit Aristoteles, venti affluentia in Venerem facile concitari: sed illos corporis macies & sanguinis inopia indicat, hos balnea iuuant, & quae bene alunt cibaria. Diastemperantiae compositae, frigidae ac humidae, notas ostendit, seminis aquosi ac liquidi affluentia: contrarias vero qualitates, contrariae ipsis genitalibus notae demonstrant, tum corporis & victus praecedentis ratio. At si vitio iecinoris & renum fuerit, vel ventriculi, ex propriis eorundem passionibus percipietur, nam si ob debilem coctionem stomachi, per dolorem & grauitatem eiusdem indicabitur, & ructus acidos atque famosos, perque signa propriis in locis descripta, cibi fastidium aderit, ac faciei pallor, cum ceteris cachecticae dispositionis notis, ex quibus macies sequitur: atque eadem ex hepate, aut renibus, iuxta propria sua signa. Si debilitas fuerit ex debilitate cordis, vel cerebri, ex propriis locis facile colligetur. Ex cordis etenim origine frigida ac humida, penis nunquam intenditur: at si vitiosum fuerit & praeparatum animi, seminis nihilominus adest exsuperantia, verum pulvis tenuis, ac molis, frigidiusculumque corpus apparet. Cerebri vitium adiudicamus, cum sine vlla ferme voluptate semine profluit: titillationis enim sensus deficit, nam & reliqua membra stupore quodam tentantur, oculorum acies obtenebrantur. At si membra superiora integra sunt, ac bene valent, cum seminis affluentia, ex calidiori ac sicciori qualitate vitium oritur; quam rem genitalium densa pilositas arguit, difficulter penis target, atque ad Venerem aegre concitatur, verum quae inflant remedia, prouiores reddunt. Interea si sit ex defectu ventosi-

ventositatis, cognoscitur ex manifesto defectu erectionis virgæ, aliis virtutibus saluis existentibus; & cum hoc adest appetitus coitus, & dū tangit mulierem, exit æquositas, & liquor viscosus: Isthis confert administratio rerum generantium ventositatem. Si autem ex defectu motus seminis, quando frigidum est, & phlegmaticum, non aptum ut exeat in hora coitus, tunc illud effluit post coitū, liquidum, & in magna quantitate, frigidum. Et si fiat ex frigidity testiculorum, adest paucitas pilorum in iisdem, nullus appetitus, semenq; tarde exit, & tactu frigidū ac crassum erit. A caliditate testiculorum raro venit paucitas coitus: potest tamen euenire sterilitas: sed quando semen est calidum maxime, tunc isti sunt salaciores, & testiculi ac partes vicinæ sunt pilosæ, venæq; latæ, & semen cito expellitur, ut in siccitate (ut prius dictum est) paucumq; exit semen, & est habitudo sicca & extenuata. *Hæc latius inuenies apud Galen. Arte parua, tractatu de testiculis.* Si vero est ex quantitate diminuta membrorum genitalium, visu & tactu cognoscitur, & relatu infirmi. Vidit al' quos viros Tarantanus, qui habebant virgam adeo parua, ut aliquis puer duorum annorum. Si virilitas demum carmine (quod aliquando fieri visum fuit) aut veneficiorum iniuria intercepta fuerit, sine vlla id corporis iniuria, aut membrorum vitio, primitiuaq; causa, euenire haud dubitamus. Quod ad signa Prognostica attinet, etiam hæc pauca adiungemus: vitia quæ in conformatione sunt, ægre curantur, potissimum quæ in defectu sita sunt: ideo si venit ob paruitatem genitalium, in viris ætate perfectis non recipit curationem. Hinc & nonnulli dicunt, quod ablatio similiter, & diminutio potentie coeundi, si fuerint ex generatione ob malam complexionem frigidam & siccam testiculorum innatam, curationem non recipiant: quoniam deficiente domina Natura, oportet & Medicum ministrum deficere. Item ablatio difficiliter curatur, quam diminutio. Viri quoque cum multis mulieribus sese associantes vasa seminaria habent debilia in radice, ideo raro generant, vel quod generant imbecille ac debile est. Quod dixerunt Medici, venas retro aures transuersim incisas homines steriles facere, id Tarantanus verum non esse, experientia se compertum affirmat, cum sectionem venæ in iis partibus in viris, & mulierib. fieri iusserit, qui postea tamē fecundi apparuerunt. Veneris quoq; usus, ut dictum est prius, spadonibus atque eunuchis, tum iis, qui testiculis carent, omnino ablati est. Æstate præterea viri, scæminæ hyeme minus natura Veneri incumbunt, auctore Hesiodo: testes enim eo tempore languidi dependent, qui hyeme resiliunt. Vnde segniorib. in coitu viris, scæminæ per cauillum Euronoto eos affari obiciunt. Cōtra viris per hyemem, mulieribus per æstatem acrior est Venus, quod viris calidior ac siccior natura sit; mulieribus autem frigida humidaq; existat. Pingues non sunt potentes in coitu; sicut nec extenuati, qui tamen citius deficiunt: causa est, cū pinguedo arguat frigiditatem; extenuatio calidi-

tatem: ac calidi potentiores sunt frigidis, deinde macilenti habent vias latiores, ideo & materia citius potest fluere. Pueri quoq;, & decrepiti, & crapula affecti, & qui habent virgam nimis longam, & qui vtuntur nimio coitu, non generant, aut raro. Aristoteles tamen dicit in mentione senum, quod homo & equus generant, quā diu coire possunt. Interea si hæc passio senibus contingat, difficilime curatur, tã in senibus primis quam secundis. A coitu in propatulo, & sine verecundia, viri honesti deterrentur, neq; id facere possunt, verū aliqui sunt tam turpes & malitiosi, accynici, ut quanto foetidior est & turpior, tanto magis coitu delectantur. Istorum in Centiloquio fit mentio, eorumq; Saturnus in natiuitate dominatur.

OBSERVATIO XIX.

De ignavis partibus genitalibus ob frigiditatem.

Vir quidam, qui alioqui pulcerrimam vxorem habebat, consultandi causa me accessit, & conquestus est, quod virgam erigere non posset, & quod statim in principio, primoq; actū coitus, salialis humiditas, sine delectatione, exiret. Puitosus hic videbatur; nam & genitalia ei non erant pilosa, sperma quoq; frigidum esse significabatur, ut quod plurimum subtile, & aquosum esset: quare calida ei conueniebant tã in cibis, quam medicamentis. Quamobrem vsum diatrion pipe-reon commendavi; præterea & diasatyrion eidem præscripsi, & diagalangam. Solet autē frequentius contingere ob frigidam intemperiem illarū partium, nempe testiculorū. Quia itaq; erat defectus propter testiculos, & renes, & vicina membra præscripsi, ut diasatyrioni adicerentur caudæ scincorum. Propter autem frigiditatem virgæ, simul etiam huic aderat paucitas erectionis, cum priuatione inflationis: cōsului ergo, ut cum cibis calidis etiam iis vteretur, quæ ad inflationem virgæ iuuarent; ut fabis videlicet vteretur, subinde pis, & cicerib, phaseolis, & rapis, adiecto in super pipere semper, etiā cœpis, & carnibus modo assis, modo elixis. Ob eandem partium frigiditatem, imperavi, ut tale vnguentū sibi in officina parari iuberet.

℞. olei castor. ℥. de nucē indica, an. ℥. j. olei muscat. ℥. j. castorei, euphorbi, an. ℥. j. mosci ℥. j. aliptæ moscata ℥. j. cera parum fiat vnguent. quo iussi, ut inungeret mane plantas pedum, & regionem renū, pubis, & perinæ: & ut in cibo suo sinapi vteretur, & crucca illa enim commendantur a Rondeletio, quem admodum & hæc opiata. ℞. cornu citri, zinzib. virid. an. ℥. j. conser. eryng ℥. j. carnis leuæ, & testicul. vulpis priapi tauri, vel cervi, ana ℥. ij. pul. diamosci dulc. & diambra, ana ℥. j. cum mellis, quo dissoluantur, fiat opiata: capiat ad quantitatem auri lanæ, superb. bendo parum vini maluatici, duas horas ante cœnam, quæ pauca sit. Ego abhorreo cantharides, ob graua accidentia, quæ inferunt; ut nos aliquando exemplo eorum qui eiusmodi vti sunt ostendimus. Ideo postea parari sine cantharidibus. Interea vtere radicib. eryngiorum, pastinaca siluestris, & satyrionis, vel or. his,

3 *in melle condita.* Et si libet vtere *diamosco dulci*, *diambra* vel *mithridato*, vel *diatyr*. cuiuslibet accipiendo ℥j. cum paucis vino odorato. Valent & hæc nō solum in hoc casu, sed etiam in iis, qui ob particularem resolutionem, vel seminis inopiam hoc affectu laborant, dando ℥j. cum paucis vino odorato. Vel conficiantur morselli in hunc modū. ℥. *seminis eruca, urtica, anisi, ac feniculi, pastinaca, ana ℥. nucis pineæ, amygdal. dule. ana ℥. j. piperis, cinnamomi, ana ℥. ramenti genitalis cervini, ac satyrii, an. ℥. j. diambra, seu diamosci, vel diatyr* ℥j. ℥. *zaccob. dissoluti in aqua melissophylli, & res. q. fiant in morsulis ponderis ℥j. & cum odorato vino fuluo, seu subrubeo præbeantur ante cœnam, vel etiam mane ante prandium.* Eo vtebatur Donatus. Alii addunt renes slynchorū, cū præcipue huic malo cōf. rant. Sed slynchi veri nō adferuntur ad nos, ut dicebat Rondel. neq; qui Venetiis vulgo venduntur, veri sunt. Nostri vero quos pharmacopolæ habēt, sunt aquatici. At veri sunt terrestres crocodili. Rondel. tunc semel vidit unicum duorum cubitorum. Iuvat optatus contuitus: suaue olens anhelitus, & vnguentis spiritus reuocatus Veneri fauet; elanguescentem eam in primis excitant amplexus, quibus subinde grata & formosa blandaq; coniunx proniorem maritū excipiat: nam cū & talis tibi contigerit, vbi dictis remediis aliquandiu vsus fueris, aliis quoq; adminiculis Venus irritāda erit. Ita iocosa fabulæ. Veneriq; cantus, & pro tempore voluptarii ceteri actus, (alioqui damnandi) maritos seigniores ad Venerem stimulant; omne deniq; hilaritatis genus inter festa coronasq; abunde inuitat. Hæc nō porcis, adulterisque nec scortatoribus, sed maritis duntaxat dicta sint, quibus virilitas infirma sit, ut ita prolem suscipiant. Interea (quod in primis est faciendum) cum vxore proba & honesta Deum precaberis, ut tibi prolem ad eius gloriam concedat, cuius præcipue gratia coniugium initur, voluptate nihilominus non exigua intercedente, a natura membris genitalibus, tam mulieribus, quā viris, inserta, ad generis humani conseruationem. Eoque magis coniugium probatum est ab ipso Iesu Christo. Seruatore nostro, cum & ipse nuptiis interesse voluerit, ac primo miraculo (*teste Dino Joanne cap. 2. Evangelii sui*) confirmauerit, ratumque habuerit, ut quas sua præsentia cōdecorauerit. Sed eo reuertentes vnde digressi, Lactis pondus cum cinnamomi vncia continuis diebus quadraginta si bibatur, reficere id infirmitatem viriliū tradant, etiam consumptos Venere reficit. Tenuioris fortunæ oua cum capis & butyro frigūt. Sed regum impensa est, virilitatem opobalsamo, & renū partes cum mero diluto mosco inungere. Sed quia opobalsamo caremus, possumus naturalia oleo inungere, cui adiectum sit narcisci radicis momentum, coccique Gnidii, seminis vrticæ, & pyrethri. Vel hoc modo conficiatur: *Pyrethri ℥j. cinnamomi ℥j. euphorbi ℥. ℥. tunde cum oleo sesamino, adiecto exiguo oleo garyophyll. & mosci gran. v.* Pecten cum verendis iilatur, planta que pedum bene confricari debent, demortuam enim

Venerem suscitabit. Hæc sunt, quæ huic viro utilia esse censui, & in scriptis dedi. Plura addere hic potuissim, sed cum de iisdem Paulus lib. 3. cap. 58. & Aetius lib. 11. cap. 35. scripserint, apud eos plura medicamenta, tū simplicia, tum composita (*apud Aetium præcipue*) inuenies.

S C H O L I A.

PRout variæ sunt causæ, etiam curatio hic variatur. Quare qui hoc morbi genere detinentur, propterea quod parce comedant, ut diximus, his imperandus est cibus largior in prandio, isque sit multus, nutrens, & semen generans, ut est *succus carnis, testes gallorum, vel vulpis, vel carnes letrarum, castorei, polypi, ostrea, muscoli, seu concha, & pinearum nuclei in lacte macerati*, tū dulcia quæcunque, & ea quæ cum lacte, vel melle, vel zaccaro parantur. At qui vino sese ingurgitant, ad somnum potius quam ad Venerem impelluntur. Qui alimentis parum alentibus vtuntur, immutent victus rationem in eam, quam ante diximus ita si fuerit ex causa primitiua, ut ex metu, vel verecundia, & tristitia, illa auferantur. Verum si sit ex incisione vasorum spermaticorum, vel ob fracturā nerui tendentis ad virgam, vel ob ineptam virgæ ac testiculorum paruitatem, vel ob ætatem decrepitam, non oportet multum laborare: vbi enim instrumenta vitiata sunt, aut mutilata, nō curantur; & quæ in cōfirmatione sunt vitia, ægre curantur, potissimum, quæ in defectu sunt sita. Attamē quod ad breuitatem virgæ attinet, si haberi posset aliquo modo, & proprie ante tempus consistentiæ, & cum adhuc membra crescunt, tunc aliqui iubent, ut virga tota abluatur cum aqua calida decoctionis piperis, vel synapi, vel tithymalli, fricando donec rubere cœperit, ac inflari; deinde inungatur oleis calidis attractiuis de costis, de spica, vnguento Martiato, Aregon, dialthæa, vel Agrippæ & post vñctionē imponatur emplastrū ex pice calida liquida, alba, munda, & ammoniaco æqualiter mixtis, & extensis super corium album molle. Idq; volunt fiat singulis diebus bis terue ad 40. dies vsque, vel plus. Hoc enim modo impinguatur membrū quodlibet, & corpus totum, & assidua tractatio virgæ com manib. iuuat, cum dilatatione & extensione, & frequentatio coitus cū fricatione leui perdurante. Contra si fuerit ob longitudinem nimiam virgæ, tunc masculus vel fœmina (*inquitt Gordonius*) teneat radicem virgæ, strictam cum tota manu, & tota virga non intro mittatur, ut semen in via non infrigidetur. Si autem fuerit ob mollificationem virgæ, tunc curetur sicut paralytis. Vbi enim sit a resolutione, quæ ad resolutionem sunt inscripta medicamenta, *teste Paulo*, conferunt. Valet inunctio virgæ assidua cum vngu. & oleis calidis descriptis *in capite de paralyti*. Si fuerit ob defectum membrorū principalium, vel etiam genitalium, vel renū, horum passionibus prius curentur. Si ex debilitate cerebri, vtatur mithridato, nuce muscata, diamosco, & pliris cum mosco, & proprie si accidat ex debilitate cerebri, vel cordis, & diambra. Confer *aromaticum rosa. & diagalanga, & diatrion-piperem*.

Curatio

6

7

pipereon, si ex stomacho: & *diaZinziber*, *dialacca*, si ob hepar: & *diatyrion cum canis seincorum*, si defectus fuerit propter renes, testiculos, & vicina membra. Si adsit totius corporis debilitas, corpusq; exsiccatum, fame exhaustum, vel longitudine consumtum & tabidum; curatur totius roboratione & impinguatione, & regimine conualescentium, cibisq; multum nutrientibus, carnis pullorum, hædorum, agnorum, iusculis inspissatis, cum vitellis ouorum, ouis sorbilibus, lacte capræ. Iam si sit ex defectu seminis, valet & humectatio corporisq; impinguatio, & ea quæ semen ac sanguinem multiplicant, cerebella passerum, coturnices, capones, perdices, & alia iam dicta. Tota vero substantia semē gignunt coagulum leporis, testiculus eiusdem, & matrix, priapus tauri, cor leporis, cerebella passerum, phasianorum, perdigum, assa, aut condita cum pipere aut zinzibere. Si ex frigidityte, calida adhibeantur: & si adsit ventositas inflata pauca, dentur cibi inflantes, vt sunt legumina, ciceres, napi, & rapæ. Interea etiam illa, quæ proprietate sua Venerem incitant, de quibus iam satis dictum est. Maxime vero (vt iam satis patet) habere oportet rationem causæ. Memini quendam nobilem cum hernia laboraret, ac intestina in scrotum descēdissent, fortibus multis adhibitis per chirurgum, & manu intestinis in locum deductis, postea minus Venere vti potuisse; cui & diatyrion, tum alia medicamenta, descripsimus. Membra itaque, vt si cui obrenum vel vesicæ vitia, vrina nimium profluente, partes genitales ignauæ fiunt, ea ipsa roboranda sunt, & demum illa adhibenda, quæ ad erectionem virgæ iuuent & semen augeant. At senibus & decrepitis parum hæc profunt. Hispano tamen cuidam seni, qui vxorem ambibat, hæc a Medico Antwerpiano præscripta fuere. ℞. croci orientalis, piperis longi, cardamomi, pyrethri, ana ℥ss. cardamomi stynei cum renibus suis ℥ij. galange ℥ij. sem. rapæ, pastinacæ, erucae, urticæ, lingvæ, anis, mentha sicca, ana ℥j. porrorum, Zinzib albi, cinnamomi electi, ana ℥ij. diatyrionis descriptionis Mesue ℥ij. cum syrupo conseruationis Zinziberis fiat mixtura, & seruetur in vase vitreo transparente: capiat ad quantitatem nucis vsualis mane & ante cenam per horam, & desuper bibat haustum vnum vini dulcis; & inungat membra genitalia & plantas pedum cum oleo sambucino, lilior. nardin. Sed audi aliud libidinosi senis facetum exemplū, quod ab Alexandro Benedicto Veronensi, lib. 24. cap. 18. refertur. Quidam (inquit) a nobis nobilis Venereus quæsiuit, vt aliquo adiumento senectutis effectam virilitatem reficerem: septuagenarium hominem demoror claudens, hemiplexia debilitatum, tam impudenter lenocinia adhuc per vicos perquirentem: roganti capulari seni diatyrion concitatorium promissum: ac diaphoenicon medicamentum abstulit hilaris senex, quo assumpto, inter meretricis amplexus, saluariaq; oscula, pigritantem Venerem primum demorans, ac subinde damnans, turbato ventre ad sellam properare cogitur, non sine intestinorum tormentis: atque eo modo alium decies stolidus homo exoneravit.

Ferunt alii idē Monacho euenisse, at alio modo: Medicamentum ad continentiam faciens expectabat Monachus: alius eodem tempore sponsus, vtique, senex medicamentum exposculabat ad Venerem concitandam: sed pharmacopole errore, contrarium Monacho exhibitum fuit: ita vt illa nocte tentigine Veneris supra modum affligeretur: contra sponsus non nupta nihil hilaritatis attulerit.

OBSERVATIO XX.

De quodam ex Veneris intemperantia mortuo.

NOuimus a dolescentem nobilem Germanum, annum 29. agentem, cui vna nocte inter duas puellas lasciuienti, cum se prius vino impleuisset, & plusquā 13. amplexus expertus esset, subito vena in pectore perrupta fuit. Vidimus eum inde in febrem ardentē incidisse, nullisq; remediis iuuantibus, inter quatuor, pluresve dies, misere obiisse, cum maximo delirio. Ita & quidā senex ex morbo conualescens inter amplexus vxoris interiit, vt ab vxore mortuus (vt nobis relatum fuit) vix a ventre depelleretur. Legimus apud Galen quoq; cuiusdam exemplum, qui postquam ex acuto conualuisset morbo, post concubitum subducto spiritu, deficientibusque viribus, eadem nocte frequentiamini deliquio mortuus est.

SCHOLIA.

Diximus ex Aristotelis Quæstionibus, Venerem hominem plurimum inter cetera animalium dissolui, quod plurimum genitura spiritalis vno initio diffundat, atque ita salaciores laxare, breuiorisque vitæ fieri, passerum natura, quibus vitæ brevissima est. Ex nimia (vt constat) non solum hi, sed & plures Veneris voluptate interiire. Exemplo cuiusdam Viturii senatorii ordinis, qui admodum senex in Venere obiit. Id malum congenitos spiritus subito subducit, propterea calculorum imbecillitatē facit, cerebrumq; extenuat. Spiritus enim, vt refert Aristoteles, voluptatis Venericæ causa est, unde Aphrodite dicta est, a Democrito plurimum damnata. Nam corporis vires (vt quidam scribunt) plus vno concubitu exhauriuntur: quam si quaterdecies tantundem ex missione sanguinis demum fuerit. Mire enim genituræ materia corporis vires tuetur. Ea facile in homine grata ciborum alimonia iucundoq; vini potu restituitur, quod in brutis non contingit: nam & hominem inter reliqua animalia sanguificæ naturæ esse constat. Ex quo seminis materia haud difficulter comparatur. Qui importune coeunt, agricolæ imprudenti (inquit Aristot.) similes sunt, qui plantas solstitio euellit, & transfert, quæ subito languent: propterea membra frigidiora aridioraq; redduntur, cum plurimū enim sudore diaphoretico torripiuntur: & si frequens admodum fuerit, renes in primis afficit, qui protinus extenuantur, atque macrescunt, mox reliqua membra intempestiuā senectus atque canities occupat. Iuuenes salaciores, fumeo vapore sublato hispidos fieri Gal. scribit, & cuidam dissecto corpore, cerebrum diminutū resectores inuenisse: nam eo vitio capillorum barbæ, superciliorum ac palpebrarum euenit defluuium. Neruis obesse præcipue compertū est.

Homini magis quam ceteris animalibus Veneris nocere.

Incommoda Veneris.

9
Libidinosi senis facetū exemplum.

4
Causse in-
temperan-
tia.

Signa

Fœminarū
rabies.

Nimia Ve-
neris tempe-
rantia, quos
lædit.

6

Veneris ni-
mius usus
noxius.

& præcordiis. Fatigata Venere alius cita reddit, vitata concoctione, & oris graueolētia. Hinc renum & lumborū dolores, spasmique, membrorū lassitudo, vnde extenuari venter & ossa quoque creduntur. Conualescentibus extenuatis periculosa Venus est, somniculosum hominem reddit ac tremulum. Malæ præterea habitudinis corpora eo malo afficiunt, calidiora præsertim (*ut tradit idem Galenus*) ex quibus semen calidissimum effertur, tum macies, & oculi caui fiunt, pallor, & icteric⁹ color occupat faciem. At Veneris intemperantia oppositas superioris valetudinis affectui causas habet; sed eadem quandoque principia sunt, sicuti qui diu sese a Venere abstinerint, vel qui medicamentis stimulauerint, aut bene alentibus cibariis vti fuerint; tum iis, qui oculis inuitantibus, frequenter de amore cogitauerint: fauet iis naturalis genitalium feruor, ac seminis ipsius vis quædam pruriens, ac spiritus quædam immodica concitatio, qua nerui supra modū intenduntur; vt & de priapismo & satyriasi antea diximus. Ex ea Veneris inflammatione, oculi faciesq; rubore suffusa est, ardet præterea vrina, venæque in corpore turgent. Meatus tum seminarii (*inquit Gal.*) robustiores sunt, & intermissa Venere, aggeratis in venis humoribus, fauentibus oculis, vis illa intemperans hominem inquietat. Et ob eam causam hypochondriaco morbo laborantes ex retento spiritu affligit. Fœminas ad insaniam rabiemque vertit is morbus, atque intemperantia, si membra seminaria principiis naturalibus robustiora genita fuerint, aut si circa naturalia ora humoris prurigo quædā orta fuerit, papularū modo, quæ incessanter pruriunt. Verum ad coercendam eiusmodi intemperantiam, quæ faciant, satis superq; enarrauimus, de Priapismo, Satyriasi, tū de ignavis partibus genitalibus, &c. agentes, vt eadem repetere superuacaneum sit. Verū nihilo minus eosdem nimia quoque temperantia lædit, vnde capitis grauitas nausea, & ventris fluxus oritur. Quosdam & intestinorum dolor ex incluso spiritu vexat. Ita & fœminis concitata Venere, si genitura retenta fuerit, non sine periculo spiritū sæpe præcludit, & suffocantur. Temperatus enim coitus ad sanitatem utilis est, vt Galenus in *Arre par. cap. 85.* docuit contra Epicurum, qui male censabat huius usum non esse salubrem. Confert itaq; si modus adh beatur, vt neque resolutio aliqua sentiat, & ipse quodammodo leuior factus ac melius spirare sibi videatur: nam & semen si corrumpatur, retentum vertitur in venenum: magis vero mulieribus, quibus abstinentia plus nocet quam viris. Constat tamen multa morborum genera primo coitu finiri, sicuti potētia fœminarum mense, aut si id non contingat, longinquæ fieri, maximeq; comitiales morbos. Quin & a serpēte & scorpione percussos, coitu leuari produnt; verum fœminas ea lædi, *auctore Plinio*. At nimia Venus primo nocet cerebro humido, catarhum aget, eliquat eius humiditates, cæcitātē inducit, phthisin, epilepsiam, vel vertiginē, & ideo cordi quoq; nocet, quum & hæticam producat:

hepati vero, dum inflammationem parit, arderem, febres putridas, aut interna apostemata perniciofa, maxime si supra cibum fiat. Stomacho frigido ac laxo nocet, robur eius dissoluit, coctionem impedit, cibum fluctuare facit, suo motu conquassando calorem, & spiritum a centro ad circumferentiam distrahendo. Renibus inutilis, si excedat, macie eos conficit, vt in sanguinem emingentibus. Ideo moderata Venus tantum commendatur, *iuxta Hipp.* Cibus, potus, labor, Venus, omnia mediocria. Hinc versus:

Balnea, Vina, Venus, corrumpunt corpora nostra.

Ad vitam faciunt. Balnea, Vina, Venus.

Raritas tamen eius utilior. Propterea cum ex ancipiti voluptate tot mala oriri videmus, abstinentiores esse debemus, nec ita temere Venus, nisi ad suscipiendā prolem, amplexanda est. Hac etiam de causa a natura quodam pudore obseruari tradit Aristoteles. Nam abdita & occulta sæpe querit Venus, cum in cibo & potu, vel publicis symposiis in propatulo cœnæ fiant; quod hoc pro vitæ necessitate, illud pro generis propagatione fiat. Genitalium itaq; vitis, ac penis affectibus absolutis, hunc librum finiamus, & in libro sequenti reliqua Scroti ac Testiculorū mala explicemus, quæ etiam partes vbi ignauæ sunt, vel laborant, temperatæ Veneri, quæ in coniugatis maxime prodest, ad prolem suscipiendam (*ut per transennam diximus*) etiam obsunt.

Finit Libri XXVI.

LIBER VIGESIMVS- SEPTIMVS,

DE SCROTI AC TESTICVLO-
rum affectibus vitisque, ac de Ramicum
diuersis speciebus.

OBSERVATIO I.

De Testium, aut Testiculorum, dolore, ac inflatione
cum duritie, tandem inflammationem mutatā,
cum febre continua ex profluvio semi-
nis intempestiue retento.



ICOLAVS Nauta, vir admodum robustus, annos vigintiseptem natus, qui ab aliis nautis cognomento Puer Iunior appellabatur, Alcmariæ habitans in platea Noua dicta, cum Anno 1548. mense Maio, gonorrhœa detineretur, tonsoris cuiusdam, quamvis elati, imperitia, feminis profluvium ei intempestiue restrictum fuit. Vnde incidit in duritiem quandam haud exiguam testium, & maximam inflationem, cum insigni dolore, vt astantes hominē præ dolore morituum putarent, febre continua accedente, quantumvis lenta. Ad hunc cū accitus essem, intolerabiliter affligebatur. Ego, post assumptum medicamentū lenitiuū ex cassia, quo & aluum deposuit, cū & ea restricta foret, altero die vanam basilicam secare iubeo, sanguine utcunq; demisso; mox testiculos inunxi oleo rosaceo; quo remedio inflammatio aliquo modo sedari videba-

2 videbatur, febre quoq; mitiore facta, adeo vt vix febricitare videretur. Quamobrem ad inflationem & testium duritiem, hoc linimento præscripto, & insuper appposito cataplasmate sequenti, inflatio, ac durities cessarunt. *℞. unguenti dialth. ʒvj. olei amygd. dulc. ros. ana ʒss. misce.* Deinde: *℞. mucilaginis psilly, althææ, extractæ cum aqua maluæ, ana ʒj. mucilaginis seminis lini, fœnugr. ana ʒss. farina hordei, farina fabarum, an. p. j. olei ros. q. s.* ad consistentiam cataplasmatidis, butyro recenti exiguo adiecto fiat cataplasma. Interea ex hoc decocto bis sumens in die, optime aluum deposuit quotidie, & non solum a febre, sed & reliquis omnibus accidentibus liberatus fuit, & probe sanitati restitutus. *℞. glycyrr. rasæ, radic. petrosel. ana ʒvj. rad. maluæ, althææ, ana ʒss. folior. viol. endiu. fumaria, agrimonie, bethonica, ana m. j. folior. senæ ʒj. epithymi ʒij. polypod. querc. ʒss. sem. anisi ʒj. prun. damasc. num. xij. passul. mundat. hord. mund. ana m. j.* fiat omnium decoctio in sero lactis pro ʒss. colatura dulcoretur & accharo.

SCHOLIA.

3 Scrotum, & qui in eo sunt testes, tum dolent, tum labefactantur inflammatione, tum tumore duro, scirrholoq; afficiuntur. Apostemantur & testiculi, & scrotum ipsorum, patiunturq; vlcera, pruritus, contractionem, & alia consimilia vitia, de quibus omnibus nunc agere instituiamus. At omnium primo de dolore agemus. Dolent itaq; supra modum testes ex calida vel frigida habitudine, vel vento, aut ictu, vel abscessu, quorum signa ex sæpius iam dictis, & sermone ægri querenda sunt. In testium epiphoris, vel percussione, aut tumor, aut inflatio apparet. Summouetur autem dolor, pro materiæ ratione: in calida namq; materia, & sanguinis demissio & deiectio alui laudatur, non vehemens, sed lenis: quæ & in nostro ægro egregie contulerunt. Ardores testium mitigat rosaceum, addito opio, & thure; etiam oleum hyoscyami, & alia, quæ mox dicturi sumus. Ex frigore oleo carthamino, euphorbio exiguo intus mixto, tumor leuatur, aut dolor discutitur: felle quoq; taurino cum melle, ac nardino oleo, vel anethino, addito castoreo, imponitur & trifolium sylvestre. Prodest & id emplastrum, quod habet cymini, anisi, fabarum farine, passulæ pares portiones, cum melle subigi debent, exiguo croci adiecto. Verum dolorem testium leuat anserinus, gallinaceus, vel anatinus adeps. At si percussi fuerint testes, mittere protinus sanguinem præcipuo & præsentis remedio est, & tum quæ discutunt imponenda sunt, nō adstringentia, qualis viola est, ac nympha, & cucurbita, mox althææ & chamomillæ decoctum, & similia propitia sunt. Pini quoq; effluens lachryma & myrrha ex aqua frigida pota valet. Nobili vero, cui ex ephippio equitanti testes intumuerant, & quasi contusi erant, post vniuersalia remedia, per fusis oxyrhondino ad tumorem & dolorem, folia hyoscyami cum farina fabacea in lacte & oleo chamomillæ, & rosaceo, emplastri modo recte imposita sunt, quæ

Testes contusi, egregie profuerunt. Ceterum ex contusione sæ-

pe testes intumescunt. Hi autem contusi subinde exsiccantur (*Rondeletio teste*) si oxyrato, vel oxyrhondino perfundantur. Si vero adsit tumor cum dolore, & sine inflammatione, sufficit cataplasma ex farina fabarum & fœnugr. decoctis in oxymelitis. Si vero ex contusione inflammatio oboriatur, curetur, vt supra monstratum est. Ille vero, qui inflationem scroti habebat cum testibus inflatis, sine febre, cum applicaretur fimus columbinus cum farina fabacea & axungia porcina cum vino mixta, statim ab inflatione liberatus est. Aliqui & addunt ad dolorem sedandum, & inflationem simul tollendam, folia hyoscyami. M. Ioannes Tien-gius, Medicus Amstelrodamentis, pro arcano agrimoniam decoctam in aceto, vel vino, & contusam apponebat. Expertus est, a tota proprietate valere inflationi testiculorum, & remouet omnem dolorem etiam aqua illius decocti cum panno lineo admota. Valet & hoc cataplasma ex rad. alih sem. lini, fœnugraci, adiecto pauco cumino puluerisato, & farina fabacea cum vino albo, aut oleo anethino admixto. Vel: *℞. florum chamomilla, meliloti, secum caprarum, vaccarum, baccarum lauri, ana ʒss. trita & probe mixta cum vino & oleo anethino, calide apponantur.* Alii addunt ceram & terebinthinam, & ad modum cerati super telam extensam apponunt. Aliud, quo & ego felicissime sum usus. *℞. fursuris tritici, crassi, subtilissime comminuti, & cribrati m. ij. farina fabarum ʒj. cumini subtilissime comminuti, & cribrati ʒij. farina hordei ʒij. cum vino dulci, aut oleo anethino, fiat cataplasma.* Anno 1596. cum hæc rescriberem, quidam ad me venit consultandi causa, qui in duritiem testis inciderat, cui solum ceratum de mucilaginis suffecit ad duritiem tollendam. Fungebatur hic suo officio, etiam per plateas ambulando, sine febre, aut alio affectu.

OBSERVATIO II.

De tumore Testiculi sinistri, cum magna duritie, intra tres dies curato.

Iuuenis ditissimus cum nuper uxorem duxisset pulcerrimam, nimium Veneri indulgens, incidit in tumorem vehementem, & duritiem haud exiguam testiculi sinistri, quæ ingens dolor subsequerebatur, sine febre tamen. Ex quo ad hunc accitus sum 14. Nouemb. anno 1578. subsequen-tibus his remediis intra tres dies perfecte curatus fuit. Prius enim loco dolente inuncto oleo sequenti, & cataplasmate deinde imposito, mox subligaculis & fasciis idoneis iniectis, statim testiculus detumuit, dolore similiter ablato. Hoc tamen & ante leniens medicamentum assumsit. *℞. elect. lenit. ʒj. dissolue cum ʒij. aqua fumaria, syrup. ex infus. ros. rub. commun. ʒj. ss. misce. ℞. olei ros. chamom. olei de meliloto, ana ʒss. misce. ℞. rad. althææ mundatæ ʒj. florum chamomill. meliloti, florum rosar. rub. ana m. j. coquantur in aqua communi, ad mollitudinem persistant, addendo farina fabarum ʒj. farina seminis lini, farina hordei, ana ʒss. fursuris tritici ad modum alcohol, & cribrati ʒij. olei chamomill. de meliloto, hyoscyami, ros. ana q. s. fiat cataplasma.*

5
Ad inflatio-
nem scroti &
testium.

Testium do-
loris causa.

Testes per-
cussi, quomo-
do curantur.

SCHOLIA.

Hic nulla aderat febris; alioqui post leniens medicamentum sanguinem detraxissemus. Ceterum scrotum modo per se tumet, modo testiculi vna inflantur, vel indurantur, sine inflammatione: facile tunc curantur, ut huic Iuveni evenit. Verum ubi simul cum tumore aut duritie adlit inflammatio, aliter tunc curanda est, ut Observatione precedenti ostendimus. Vbi autem tument per se inflammanturque testes, vna & scrotum, vel nerui eos continentes, tunc afficiuntur impatiibili interdum dolore, ac non sine febre acuta, tum sanguis protinus mittendus est ex cubito, ac alvus subinde mollienda. Et si rursus alia vena secanda est, quæ intra minimum & sequentem digitum in manu ferienda est; demum ex talo (*scopus est*) qua parte genitale dolet demedus est sanguis: tum abstinētia magnam curationis partem continet; interea linteolus aqua ros. acetosq. infusus imponendus est, vel cum stychni, vel cucurbitæ sativæ succo, cum oleo rosaceo crociq. exiguo addito. Aliter hordei & lenti farinam fabarumque ac violæ pares portiones ex rosaceo imponuntur. At ubi vehemens dolor est, hyoscyami folia imposita dolorē sedant. Et si genitalia induruerint, quæ emolliunt & maturant superdanda sunt, qualia sunt, cum fabæ farina chamomilla, althæa, lini seminis farina, vel eius mucilago, addita hordei farina, & melle. Item tritici farina ex mulso cocta cum cypressi pulvere. Deinde quæ emolliunt aq. discutiunt emplastri modo imponimus, passalis adiectis cymino & vino: aut brassicæ folia cum fœnugræco decocta. Conferre etiam traditur hordei farina cum vaccino fimo, & aceto, ac stychni succo, caphurag. modico adiecto. Brassicæ item cinis ex ovo: cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita. Maxime proficere traditur lactucaradix ex mulso cocta, si durities diu inueterata fuerit, cum hordei farina, aut fœnugraci semine liniq. cum cœpæ decocto. Fex quoque vini cum hordei farina. Ex istu quoque eadem ferme servanda sunt. At si testis sola durities absque febre & inflammatione afficiat, (quod a magno labore, & multum stando fit) tale ceratum utile est. ℞. farina fabarum ℥j. farina seminis lini ℥ij. emplastri de mucilagimibus ℥j. olei de meliloto ℥j. ℞. olei ros. hyoscyami, ana ℥℥. seminis cymini pulveris. ℥j. misce. coquantur simul ad consistentiam cerati mollioris, ut artis est, & ducatur supra alutum, & testiculo indurato applicetur. Istud ceratum his diebus cuidam pannos tondenti commode adhibuimus. At de Scroti inflammatione nunc exemplum adferamus.

OBSERVATIO III.

De Scroti inflammatione.

Scroto aliquando inflammatur sine testiculorum inflammatione, ut monuimus, & etiam latius scholio sequenti dicemus. Sic cuidam nuper ex calida fluxione scroti dextra pars inflammata fuit: quod equidem facilius cognovimus, quam si testiculus ipse inflammatus fuisset. Nam exterior pellicula dextri scroti calebat, rubebatq.

cum quodam tumore. Aderat & huic febricula, sed levis. Postquam illi alvus soluta esset clystere emolliente, basilica vena brachii dextri secta fuit, sanguine utcumq. extracto. Deinde statim a venæ sectione cataplasma tale, vel huius æmulum, impositum, ex succo plantaginis & solatri, cum farina hordei, & oleo rosaceo paratum: scroto prius quoq. inuncto cum unguento nutrito ex litharg. & oleo ros. ac aceto concinnato, exiguo adiecto succo plantaginis, alio similiter soluta cum cassia & thamarindis. Victu interea hic vtens tenui, & abstinens a vino, statim curatus fuit.

SCHOLIA.

Scroti inflammatio hisce agnoscitur notis: Locus levi contactu, quam primum indolescit, feruor, duritiesq. intensa apparet. Testiculo autem inflammationem sentiente, non ex levi tactu dolent affecti, sed impactis validius digitis, rubor & durities ipsius per summa minus exstare videntur, altius autem impressis illis, durities occurrunt, & febris nonnunquam oritur. Sic quoque Aetius lib. 14. cap. 20. de testium scrotiq. inflammationibus ex Leonida, inquit, Nonnunquam soli testes prius inflantur, nonnunquam, testibus ipsis bene habentibus, scroti textura patitur, (ut in hoc nostro ægro) nec raro testes simul cum scroto afficiuntur. Ita vero in his, sicut in reliquis corporis partibus, inflammatio, vel sponte confluentibus ad locum humoribus, vel a percussione, aut collisione, contingit. Solo itaque testiculo inflammato, scroti color secundum naturam est; ipse autem testis tumidior, durior, latiorq. tactui occurrunt, ac dolor concomitatur pulsatorius, usque ad renum loca progrediens. Sed si scrotum inflammetur, superficialis tumor rubens, renitens, & tactu dolens, apparet. Vtrisque vero testibus, inquam, & scroto, inflammatis, ex signorum incremento inflammationis magnitudinem discernemus. Sic etiam Fe-nelius: Inflammationem accendit tenuis feruidusque sanguis præternaturam in scrotum & testes profluens. Scrotum in tumorem distenditur, durities inest, rubor atque calor, dolor lancinans, qui levi contactu exacuitur, febris plerumque comes. Quod si inflammatio testem solum occupet, hæc in profundo demersa sunt, tactu melius quam visu comprehenso: sin vero in scrotum effunditur, omnia foris exstant oculis obvia. Quod ad curationem attinet, ex Aetii quoque sententia, cibi parsimonia & aquæ potione per totum curationis tempus uti oportebit. Et si inflammationis vehementia coegerit. Præsertim in adolescente sanguineo, a cubito, si fieri possit, sin minus, a mal-leolo sanguinem mittes: nam & hanc venam fecare, ubi multus sanguis non fuerit, pdesse consuevit. Sic etiam Paulus lib. 3. cap. 54. Testiculorum inflammationibus proprie convenit sanguis ex talo dimissus: idem & ex recentioribus Rondeletius affirmat, cum inflammatio testium subito fiat ob frequentes venas ibidem existentes, & ob situm in parte inferiore. Fit autem vel ab ictu, vel ulcere, vel ob medicamenta acris ad curationem frigidi affectus adhibita, vel ob fistulam immixtam, vel ob aliud quoddam instrumentum. Itaq. huic inflammationi

Ad testium tumores curationes ex diversis autoribus. Si sit cum febre acuta.

Genitalia indurata.

Testis durities absque febre & inflammatione.

De inflammatione scroti testiculique ex Paulo & Aetio.

Curatio.

Sanguinis detractio.

mationi confert missio sanguinis. Quare sanguis detrahendus e brachio maiori copia, si vires ferat. Sed hic (ut sapius diximus) cum alii ex brachio, alii ex malleolo sanguinem detrahant, intelligere oportet, quod in principio, ubi repletio magna est, ex cubito; postea, vel ubi repletio minor est, ex malleolo. Sequenti autē die a sanguinis missione, ut & Rondeletius iubet, affigendæ sunt cucurbitulae coxis cū scarificatione, ad derivationem. Quod ad localia attinet, communiter omnibus & cerata & cataplasmata imponunt, ut dicebat Paulus. Imponi igitur debent, iuxta eundem, ex lomento diluta vini mixtione, cocto cum vis pinguius acinorū expertibus, & cumino, vel hastulae regiae radix incocta contritaq; misceatur polenta aequali portione illiniturque, vel lini semen ex diluto vino, vel fenugracum ex mulsā, vel lili radix ex mulsā recentibusque vini flocibus cum pollente polline. Vel senecion & coriandrum viride cum vis quibus acini sunt exemti. Sin multus infestat ardor, foliis alisci cum iriticea farina aut ciceris delinuntur, vel calami foliis, vel cucurbita sylvestri cruda. Sed de topicis remediis postea latius, hac Observatione sequenti prius interposita.

OBSERVATIO IV.

De Scroti & una Testis inflammatione.

Vir 30. annorum, D. Isis scroti & simul testis inflammatione afficiebatur, sed in principio levi, & sine febre, cū cataplasma ex rad. althææ (ob duritiem qua aderat & inflationem) farina fabar. & lini foliis malua, & flor. chamomill. meliloti, impositum esset, maior subsequuta est inflammatio, febre quoque eundem apprehendente, cum maiore dolore. Corpora repurgata cū cassia, & sectione venæ peracta in cubito, admoto solūmodo per aliquot dies cataplasmate ex decocto folior. malua, deinde foliis contusis, adiecta farina hordei, æger ab inflammatione, dolore, ac duritie, liberatus sanitatem consequutus est. Habent enim illa folia aliquid pinguedinis ita decocta, & mox contula addita farina hordei ad consistentiam cataplasmaris concinnata, ut non opus sit aliquid olei addere.

SCHOLIA.

Sanguinis vero missio (inquit Oribasius) ad inflāmatos testes præsidium efficacissimū est, multoq; magis si vna & scrotum sit inflāmatum. Interea & corpus prius repurgandum, mox ad topica deveniendum. At pro localibus quoque remediis & præsiidiis, inquit Aetius, si testes sint inflāmati præcipue, quando simul suspensoria vasa compatiuntur, lana oleo communi, aut anethino calido madefacta totum affectum locum fovebimus, & cōmode ligabimus. Præstat autē semper, quæcunq; medicamenta applicentur, ligatura ad superiora tendat, ut testes minus pendeant, ita fluxio magis ad locū affectum impediatur, quo eo minus fluat. Ad has quoque partes inflāmatas, præsertim dolorem afferentes, egregie confert verbenaca recta in oleo elixata, vini portunculæ adiecta, & scroto applicata, deinde lana superligata. Subsequentibus vero cataplasmatibus ad inflammationes solvendas idoneis subinde utemur. Estq; præ cæteris admi-

randum, præsertim ad testium inflammationem, cataplasma ex faca ægyptiaca. Decorticatur elixa faba, postea cum modico melle subigitur & illinitur. Præcellit autem ad testium scrotiq; inflammationes ex puro pane cataplasma, quo ego iugiter utor (inquit Aetius) interdum cum oleo & aqua, interdum cum mulsā confecto, confert etiam insigniter, quod ex passulis cum cymino torrefacto & trito, modico melle adiecto, preparatur. Facit & asphodeli radix cum polenta in vino elixata, & lini semen in mulsā decoctum, & senecio cum polenta, & cupressi folia prius eodem Aetio auctore, vel cum mica panis confecta. Ceratum ad testium inflammationes efficacissimum. Cera, resina pinea, anethini & narcissi olei, an. ʒ. x. cymini ʒ. vi. asini fini pilas tres. Finum asini torrefactum terito & cribrato, cyminoq; admisceto, deinde cum cerato liquefacto conficito, applica ac su-

Ceratum
Aetii ad tes-
tium inflā-
mationes ef-
ficacissimū.

per cataplasmate lanam narcissino, aut rosaceo madefactam apponito. Nec parum confert emplastrū diachylon cum rosaceo dilutum. Perseuerante vero inflammatione, aqua marina calida utilissime locus perfunditur, & cerata adhibentur, quæ ad discutiendas inflammationes parari solent, quæ lia sunt ad inflāmatas mamillas descripta. Inflammatione autē minime soluta, sed potius ad trāsmutationē conuersa, si purgationi cum cataplasmatibus opitulari oportebit, perfectoque iā abscessu, manuum operatio administranda est, cōmuniq; medicatione utendū. Quod si depascentia superuenerit, hic quoque eandē prorsus curandi rationē accommodabimus, quam superius ad sedis depascentias tradidimus. Neoterici vero, ut Rondeletius, ad testes inflāmatos, si defluxio non constitit, statim a sanguinis missione repellentibus utuntur, & quæ ex succis herbarum frigidarū adstringentibus, vel earundē aquis parantur, addito aceto modico, vicinis partibus admoventi iubent. Iis autē addere possumus repellentia crassa, ut bol. arm. cortic. mali granati & similia ut melius fluxus inhibeatur, postea cataplasmatibus ex repellentibus & discutientibus confectis uti, quæ parantur ex succis semperuivis, vel plantag. vel solani, & farina hordei, cort. mali granati, & ros. & similib. Fiat igitur cataplasma si quæ ʒ. succi plantag. vel solani. lb. j. farina hordei. lb. ʒ. ros. rub. cort. mal. granat. ana. ʒ. j. ol. ros. ʒ. iij. fiat cataplasma, Solanum & plantago, quia ob frigiditatem repellunt, & quodammodo siccant, magis conueniunt. Lithargyrū nutritum in oleo ros. & aceto, vel succo plantag. digerit & refrigerat. Si dolor oboritur, mitigandus est iis, quæ maiore vim relaxandi non habent. Pars enim ob copiam humoris, v. l. recrementorum, facile putrescit. Fiat igitur sic. ʒ. malua, viol. solani. an. m. j. furfuris p. y. decoquantur in sapa, & parti applicentur. Si vero mitigandus est dolor inflammationis vergens ad supurationem, humidioribus utendum. ʒ. malua, bis malua, anam. j. farina frumenti q. j. fenugraci, & sem. lini, an. ʒ. y. ol. viol. pingued. porci. an. q. j. decoq. & confusa per cribrum trāsmutantur, & fiat cataplasma. Si hisce remediis parum profeceris cataplasmate ex foliis hyoscyami viendum est. Decoquantur ergo folia hyoscyami sub cine-

Ad testes in-
flāmatos.

Repellentia.

Cataplasma.

Dolor quo-
modo miti-
gandus.

Dolorem sedans, & inflammationem naturā.

ribus, & confusa excipiantur axungia porci, reducanturque ad formam cataplasmati. Dolorem sedat, & inflammationem maturat. Fit autem cataplasma sedans dolorem ex farina hordei & lacte. Si tumor resoluatur (quod cognoscitur cum minuitur) fiat cataplasma ex farina orizæ, vel cicerum, vel orobi cum oxymelite, vel sapa, vel vino, & applicetur: vel emplastrum ex calchytide reductum in formam cerati cum oleo antiquo, vel anethino, vel rutaceo, vel irino. Si vero discuti non possit, sed suppuretur, ubi suppuratus fuerit, tum cuti ferro discissa, pus excernatur, vlcerique vt in omnibus aliis sordidis moris est, medeatur.

OBSERVATIO V.

De teste admodum indurato post inflammationem male curatam.

SCIENDUM quod male curata inflammatio testium, illis sæpe prædurum tumorem ex calore præpropere exstincto relinquit. Tum tumor, calor, & dolor absunt, durities vna persistit, cuius non nihil plerumq; immedicabile permanet. Tale nuper contigit adolescenti, qui ad me consultandi causa venit. Præcepi vt ceratum de muccilaginibus apponeret: quod cum diu fecisset, neq; ad rem faceret, iussi vt emplastrum meum de ammoniaco imponeret, quod equidē egregie profuit: maxime enim emollit, & digerit non nihil. Eius exemplū dedimus in inflatione & duritie scroti illius ceruisiarii Delphensis, qui nec lotium reddere potuit. Vide obser. 10. lib. 20. Observationum nostrarum. Item huius libri secundam.

S C H O L I A.

Emollientia duritiem.

Digerentia.

Cataplasma mirabile ad duritiem testium.

2 **D**ifficile emolliuntur scirrhii testium, & carnosia hernia. Pars enim interna laxa est, ob id facile recipit excrementa, & recepta retinet in uolucris illis, quibus testes integuntur. Ea autem materia congelatione indurata, maximo cum negotio emoliri potest, & euacuari. Emolliūt fœtus ex oleis amygd. dulc. lilior. oleo dulci decoctis, vel insapa, butyro recenti, vel axungia porci non antiqua exceptis. Post emollientium vsum digerentibus vti conuenit. Digerunt oleum amygd. amar. urinā, emplastrum de ammoniaco, oleum antiquum, dulce, rutaceum, nethinum, possumus ad mouere in eundem vsum emplastrum ceroneum. Valent & vnguenta dialthæ, martiatum, si cum oleo amygdal. & viol. applicentur. Quod si horum omnium vsum longo, tumor induratus emolli non possit, tentandum est sequens cataplasma mirabile. ℞. rad. mādragoræ recens. lb. ss. hyoscyami, & alkek. an. m. j decoquantur in sapa, & per cribrum simul confusa mittantur, quib. adde radicis panacis ℥ j. (opoponacis loco rad. panacis, quæ in decoct. macerare, liquare, deinde miscere oportet) & fiat ad formā emplastri, addendo cera parum, vel ad formam cataplasmati addendo styracis ℥ ss. Si post huius cataplasmati vsum durus tumor permanferit, de eius curatione desperandum, nisi per abscissionem, vel castrationem testis auferatur. Ceterum contingit, potissimum senibus, aliud vitiū scroto indurato omnino contrarium, nempe vt scrotum ipsum vna cū pene indecore pendeant. Solent enim iis, qui equo

Si scrotum cum pene indecore pendeant.

vehuntur genitalia laxi, ex materia frigida relaxante, aut ex longo & acuto morbo virium defectu pendet. Hic pituita primum digerenda est, ac repurganda, tum & astringentia illita iuuant. Vitanda sunt acetosa, lactuca, omneque olus frigidum. Et exsiccantia demū calida imæ spinæ, hoc est, ossi sacro, imponenda sunt, vnde nerui earum partiū ortū habent: ac in pube item si imponuntur, iuuant, nam & quæ Venerem excitant, huic vitio auxiliantur. Si ex nimia fuerit aeris caliditate, aut corporis defatigatione, in balneo frigido insidere genitalia resurre facit.

OBSERVATIO VI.

De Scroti Apostemate ac Testium, agri ignavia in corruptionem permutato, mox in gangranam, hectica subsequente, & in mortem desinente.

Hæc membra, vt antea dictum est, facile inflammantur, & in apostema, ac demum in abscessum, transeunt, adeoque vlcerantur genitalia, vt & vitia quæ serpunt de facili oriantur. Putrefieri enim has partes facile contingit, qualia sunt quæ in humido fiunt: his accedit excrementorū & fœditatis propinquitas. Vnde & rustico cuidam, ac ignauo & sordido, cum tempestate valida ac pluuioso tempore equitaret, pluuia distillante & descendente in scrotum, atque ob ephippii duritiē molesta equitatione, suborta est ingens inflatio tam scroti quam testium, mox apostemate subsequente cum ingenti corruptione. Hic rusticus, forte paulo attentior ad rem, sui negligētissimus, ad longum tempus nullum admittit Medicū, donec corruptio subsequeretur, mox & gāgræna succedente, adeo vehementi, vt carne corrupta ac mortua paulatim decidente, scroto putrefacto, tandē testes denudati fuerint. Tunc demum coactus, chirurgum ad se vocat Petrum Briensensem, nostrum familiarem amicum, cum rusticus prope Brielas habitaret. Chirurgus vero cū agro perpetuo adesse nō posset, vt ager Brielas accederet, vix tandem impetrare potuit. Accitus est Hugo Nieuenius Medicus Haghanus, qui & multa ac varia frustra adhibuit remedia, quantumuis optima, malo semper in peius procedente, hectica febre etiam subsequuta. Postremo & ego sub finem accitus sum, agro nec tunc quidem victus rationem præscriptam obseruante. Quare tādē magna cum miseria mortuus est: quod fore, ab ipso discedens, prognosticum ante feceram.

S C H O L I A.

Quomodo in his partibus sæpe oriantur inflammationes, seu (vt Neoterici ac practici aiunt, qui Auicennam & Rhasem sequuntur) apostemata, satis id ex supradictis liquet. Causæ enim externæ, vt casus, percussio applicatio vnguentorum, & similibus corruptentium naturam, facile innotescunt, vt in hoc rustico, qui tempore pluuioso equitauerat: interne vero causæ ex fluxione humorum prædominātium habentur. Et quamuis ex omni genere humorum fieri velint, magis tamen ex calidis. Hæ enim partes plurima innata caliditate participant, nempe testes ipsi, ob spiritum gi-

Signa.

tum gignitur. Interea ex frigidityte (ut in iis qui testiculus priuantur, sicuti eunuchi, qui frigidi sunt & pituitosi, & in impotentibus per naturam) ex confluxu humorum frigidorum. Si a sanguine, tumor & rubedo magis apparent. Ex bile ardor & dolor calor & febris, magis intenduntur. Si ex pituita, tumor mollior, & color ad album inclinans. Ex melancholico humore, tumor durus & niger. Signa vero causarum primitiuarum ex relatione agri dignoscuntur. Si in scroto & pellicula exteriori, facile innotescit. In substantia testiculorum, non per visum, sed tactu, ut dictum est, deprehenditur, tum ex maiori dolore ac sensibilitate. In scroto citius curatur, in testiculis etiam in principio, si aeger errorem non admittat, & precipue si terminetur per resolutionem, per saniem, malum. Curatio vero satis, ex superioribus habetur, praemissa euacuatione vniuersali, & sectione venae, in causa calida, in frigida; cum pharmaco. Adhibeantur vnguenta & emplastra, in principio ex reperiuentibus, in augmento addendo aliquid ex resolutionis: in statu prauealeat resolutione reperiuentibus, in declinatione solari, solutiva satis faciunt. Vide de his practicos, Constantinum, Valescum, Gordonium, & B. tritium, in quibus sylvam medicamentorum inuenies. Vbi igitur sit ex causa calida, facta venae sectione, ut antea dictum est, praecedente clystere leniente, mox humor calidus thamarindis & cassia exputgetur: loco affecto argilla, vel cimolia terrea, adiecto aceto ac oleo ros. vel herbis frigidis una permixtis imponantur. Si calor sit vehementior, fol. hyposc. mandr. papaueris addantur, victus tenuis & qualis febricitantium praescribatur. In augmento utilis farina fabacea, lentum, & mucilagin. psylli, & oleum ros. In statu adiect. rad. althea, mucil. sem. lini. In declinatione, adiectis oleis lilio. c. sterco. re vac. ino, & succo bulb. Reliqua vide apud B. tritium, & alios antedictos. Si apostemata calida non resoluantur, & fiat suppuratio, ea acceleranda medicamentis iam saepe dictis.

OBSE RVATIO VII.

De Apostemate frigido Scroti ac Testiculorum.

NO bilis cum oreia durum habebat ex longa equitatione tempore hyberno, cum ingens frigus esset. Frigidum hoc apostema esse, recte coieciimus, cum nulla adesset rubedo, & omnia accidentia remissa forent. Non solum scrotum tumidum erat, verum & tumor digitis compressus intus delitescerebat, cum exiguo dolore, sine tamen punctura, calore, & febre. Huic autem cum alius durior esset, clysterem statim iniici iussimus hoc modo paratum. ℞. mercurialis, pariet. caulium rub. flor. chamomille, meliloti, summitatum anethi. an. m. j. seminis foeniculi, carui (aderant & ventositates) anisi, an. ʒ. j. ℞. seminis lini ʒ. iij. fiat decoctio in aqua communis pro lb. j. colatura adde benedicta laxativa, & electuarii hiera picrae an. ʒ. ℞. diaphoenici (nam pituitosus erat) ʒ. iij. olei rutacei, anethini, chamomill. an. ʒ. j. vitellam unius oui, salis gemmae, & communis, an. ʒ. ℞. m. sc. & fiat clyster. Cum iam aluum satis depotuisset cataplasma sequens ut chirurgus, qui tunc aderat, loco affecto apponeret, mandauimus. ℞.

florum, chamomille, meliloti, foliorum caulium, an. m. j. coquantur in aqua communis, ad molliitudinem, pistentur, addendo farina fabarum ʒ. j. farina fenugraci ʒ. ℞. Postea, cum dolor aliquomodo augeretur, adiacin. folia hyoscyami probe cocta & coarsa, insuper addendo olei liliorum quantum sufficiebat ad consistentiam cataplasmatum, exiguo quoque olei chamomill. ad resolutionem adiecto. Verum cum adhuc durum maneret scrotum una cum testiculo, ceratum, ut apponeretur praecipimus, ex ammoniaco, & diachylon cum gummi, & de mucilaginibus concinnatum, quibus & seminis hyoscyami, & foliorum non nihil incoctum esset. Hoc autem cerato per aliquod tempus utens ad perfectam sanitatem deuenit, facta resolutione, tumore paulatim liquecente.

SCHOLIA.

IN apostemate harum partium frigido ex materia pituitosa, conuenit purgatio ex diatribis, si febris absit, & emplastrum ex farina fabarum, fenug. aut cum capis liliorum, & foliis caulium, ac ficibus, inungendo frequenter cum oleo chamomelino, liliorum, ac nard. no, praecipue si scrotum apostemate frigido afficiatur, vel si posset resolui, resoluatur cum diachylone gummi, aut de ammoniaco, tunc enim resoluatur, aut breuius maturabitur. In apostemate frigido testiculorum Gordonius applicat emplastrum ex farina fabarum, ficibus, fenug. sem. lini, foliis caulium, chamomill. farina ciceris, & lipe renum. Si autem fortius requiratur, dissoluatur bdellium in vino adiecto oleo sampuchino. Si in saniem apostemata testiculorum conuertantur, non sunt diu dimittenda (teste Valesco) ne corrumpant substantiam testiculi, quae multum tenera & mollis est, & passibilis, & post corruptionem irreparabilis, ut de rustico egimus Obs. 6 huius lib. Et tunc statim, ubi vires constant, non est aliud remedium, nisi totius testiculi ablatio, sicut fit in herniosis. Sed hoc in rustico nunc heretica affecto, & viribus consumptis fieri non potuit, in principio tamen corruptionis fieri potuisset, dum vires constabant. Si autem sit apostema ventosum, fomentetur cum vino decoctionis rutae, anisi, cumini, & similium. Si vero sit apostema aquosum, praecipue in scroto, ut in hernia aquosa tunc conuenit fons ex corticibus quercus, quibus coriarii seu calcearii vtuntur, quo fons ego saepissime feliciter usus sum, ut de hydropicis diximus. Et in istis omnibus, vel similibus, fiant setones, si opus est. Si testiculus nimis in molem augeatur, emplastretur cum hyoscyamo, & foliis coriandri recetis. Si paruus euadat, aut contrahatur versus interius, adeo ut aliquando non possit tangi, tunc foueatur locus frequenter cum aqua decoctionis calameti, & inungatur cum vnguento Aregon. Si fuerint ibi varices, curetur sicut apostemata dura: & si nimis prolongaretur, ut cadat versus inferius, tum fomentetur cum stipiticis. Si corrumpatur, abscindatur. Sed haec ad hernias varicosas pertinet, de quibus latius suo loco.

OBSE RVATIO VIII.

De Scroto insigni pruritu, longo ac diuturno.

Ohannes Roeladus Delphensis, vir circa quinquaginta annos natus, anno 1581. cum scroti

Prognostica.

Curatio.

Apostema causa calida.

Apostema frigidum.

Apostema ventosum.

Apostema aquosum.

Testiculus si augeatur, aut contra quid agendum.

Ad varices scroti.

in signi pruritu longo ac diuturno laborasset, ac nullo modo ab hoc foedo malo curari posset, me denique accito, post uniuersalia remedia adhibita, mense Martio, vena secta, & purgatione debite administrata, & corpore saepe ab humoribus salis repurgato, tandem hoc vnguento ad tempus commode vtens, a pruritu admodum molesto liberatus est. Ita habebat vnguentum. *℞. vnguenti albi caphurati ℥j. vnguenti diapompholygos ℥℥. lithargyri auri & argenti. an. ℥℥. terra sigillata ℥j. creta alba ℥iij. sublimati ℥j. ducantur simul in mortario plumbeco cum pistillo plumbeo, admodum diu bene incorporando (vt ita dicam) fiat vnguentum.* Alias vt magis exsiccarent, in altero, cui ad scabiem humidam magis accedebat, huic vnguento adiecta fuit fuligo fumarum, vel cacabo adhærens.

S C H O L I A.

Scabies (inquit Aetius lib. 14. cap. 19.) quoque & pruritus, ex acrium humorum superficiem erodentium delatione, circa scrotum frequentissime exoriuntur: & si delati humores plures aciores fuerint, superficiem exulcerant, sin pauciores crassioresque concreti, squamulas gignunt, tunc magis pruritus, intenditur. Curatur id morbi genus congrua victus ratione, ac medicamentis, non nunquam, licet perquam raro, etiam chirurgia. Ager igitur ab acriū esu quā maxime abstineat, præcipue tamen ab oleribus: olera enim mali succi sunt: omnia vero quæ offeruntur, bonum succum præstare oportet, qualis est potius lactis assiduus, prisana, chondrus, gallinarum oua, porcellorum extremitates, ventriculi, vinum tenue dilutissimum & album. Pro localibus vero præsiidiis, præcipue squamulis vlceri adhærentibus, & dolore comitante, cataplasma e lomento cōuenit, vlcera enim simul mitigat & repurgat: lomentum autem proprie Aegyptiarum fabarum farina appellatus. Idem facit lesamum crudum, & ruina farina cum melle subacta, & apposita. Locis deinde repurgatis, & pruriendi sensu hebetato, ad cicatrices inducendas properabimus, q̃ in eiusmodi partibus optime facit misy cum sulphure viuo tritum, & myrrhino cerato exceptum, & medicamentum quod e cadmia, quodq; ex hordeo cōficitur. Sed & hoc, iuxta Bayrum, egregie ad pruritus testiculorum, vel scroti facit. *℞. cerussa ℥vi. sulphuris citrini ℥ij. opii ℥j. tere cum aceto & aqua, & unge trib. vel quatuor vicibus.* Fomentatio cum decoct. ebuli. applicare ipsa folia cocta calida, aut fomentare cum eis, & abluere cum decoctione saluie, remouet pruritus testiculorum. Sal ammoniacum cum aceto est vltimum. At vbi leues exulcerationes, rosaceo & myrrhino oleo inungimus, aut cerussa & rosaceo, addita gallæ farina. Exulcerationes vero vehementissimæ, quibus testes ex his tunicis denudati apparent, rosa, santalis ac caphura, cum limbo rota, qua ferrum acuitur, sedimento, ex aqua strychni restituantur.

OBSERVATIO IX.

De Scroti Pruritu cum excoriatione.

Vir doctissimus, nobisque familiaris; sed admodum senex, octuagenarius, & fere decrepitus, incidit in molestissimam scroti pruri-

tum, cū excoriatione epidermidis, cui vltro vrina ex lotii scaturigine in lecto effluebat, vnde & scabies pruriginosa exoriebatur, atque scroti excoriatio, ex lotii acredine. Hunc mense Apriliano 1565. cū ad eundem acciti essemus, ab hoc malo, tadium haud exiguum inferente, vnguento subsequenti liberauimus. *℞. vnguenti de cerussa. ℥℥. lithargyri ℥j. olei rosacei, parum, fiat vnguentum.* Pannus lineus mundus hoc vnguento imbutus, frequentissime locis excoriatis & pruriginosis apponebatur, ac statim cōtulit: alioqui ad maiorem exsiccationem addidissim paululum pulueris lapidis calaminaris.

S C H O L I A.

Egregie etiam opitulatur (teste eodem Aetio loco citato) scroto in superficie extumescenti, cimolia terra cum aqua diluta, & illita, quam post illitionem exare fieri fines, deinde loco aqua tepida abluto, myrtum, aridam contritissimam, adiecta myrrhæ portiuncula, insperges: obducta vero cicatrice, nulla que iam molesta re, nec pruritu infestante, de curationis fine cogitari oportet. Sed si scabioso affectu sanato, pruriendi sensus derelictus aut etiam exauctus sit, vel scrotum destillationem patiatur, nitrum cum vua taminia & alumine liquido, aceto rosaceo dilutum in balneo illini hortamur, deinde post balneū, albumen oui cū melle applicari. Ad vehementem autem intolerabilemque scroti pruritus, fex aceti arida cum vino irrigata confert, quam eodem prorsus modo adhibebis, sicut de alio medicamēto proxime diximus, illito postea oui albumine, cuius vires si intendi volueris, ipsam adurito, idē potest alumen cum melle affatim decoctum, ac reliqua, quæ ad pruritus prædocuimus. His ex Neotericis adiungere poteris tū ea, quæ scribemus de pruritu vuluæ, tum quæ inferius de pruritu & scabie.

OBSERVATIO X.

De Scroti vlcere ac Testiculorum.

Autores fere plerique sub vno capite tractant de vlceribus virgæ & testiculorum, & quæ in anno contingunt, & Neoterici in hoc ipso potissimum sequuntur Auicennam. Paulus Aegineta idem facere videtur. Et ita vlcera quoque contingunt in scroto, & si vltius procedant vsq; ad testiculos, fiunt multo maligniora, quemadmodum & alia vlcera maligna, quæ in virga acano (vt antea quoque diximus cum de iisdem vlceribus ageremus) sæpius fiunt depascentia, cum facile eiusmodi partes ob humiditatem corrumpantur. Potissimum vero, inquam, id in istis vlceribus testiculorum fieri consuevit, vt de rustico paulo ante ostendimus: sæpe adeo ad mortē terminatur, nisi præsto, peritus adsit Medicus vel chirurgus. Sic nuper cuidam omnium primò scrotum exulcerabatur, & breui ad testiculum vsque vlcus processit. Ad hunc cum chirurgus accitus, ne sua malignitate magis serperet, ante omnia purgationem exhibui, primo tamen medicamento leniente, ac minorante, ex cassia cum aqua fumarum præcedente. Post paratam materiam, syrupis conuenientibus epotis, eam ipsam materiam purgauimus cum

confectio.

Egregie ad pruritus testiculorum, vel scroti faciens.

2 • confectioe bamech, & cum syr. ex infusione ros. pal-
lidarū vt methodus exigebat. Chirurgus vero ad
mundificationem peragendam procedebat cum
vngue apostolorū, paucis mox adiecto vnguento Æ-
gyptiaco. Et subinde ne vlcus ambulando magis
serperet ac penetraret, tale vnguentum etiam pa-
ratum fuit. *℞ tuthia preparata, mini, plumbi vsti,*
anymony, ana ℥ ij. puluerisuntur, & cum oleo myrti-
no, q. s. paucis adiecta cera, formetur vnguentū. Modo
redibat Chirurgus ad mundifi- ationem cum vn-
guento apostolorum, adiecto quoque vnguento
Ægyptiaco, iis vtrunq; administratis plus additū
est de vnguento Ægyptiaco: sic enim caro in li-
gna postea facilius amouebatur, cum presentia o-
ptimæ sanctei, vel puris, vt deinde ad incarnationē
perueniret. Deinde paulatim procedebat cū in-
carnan ibus: quale illud est, *℞ aloes hepatica, sar-*
cocolla, anethi comb. vsti, thuris, lapidis hematit. ana ℥
ij. aluminis vsti, acacie floris aris, ana ℥ ss. puluerisen-
tur, vt decet. & cum oleo rosaceo fiat vnguentum. La-
uabat etiam vlcus cum decoct. ros. rubr. balaustiar.
myrtill. cum modico aluminis in vino rubro & aqua
plantaginis decenter decoctis cicatrifabat vltimo (vt
ita loquar) cum vnguento de mmo.

SCHOLIA.

3
Ad vlcera
scroti & te-
sticuli
qua valent.

Ad vlcera scroti ac testiculorum eadem valent,
quæ de vlcerebus virgæ scripsimus ac penis:
atq; hoc vnguentum precipue prodest, quo Gor-
donius vtitur. *℞ lithargyry, cerussalota, cadmia, a-*
cacie, corticam granat. sanguinis draconis tuthie ana
℥ ij. aloes, sar cocolla, thuris, aluminis, ana ℥ j. pulueri-
sentur, & addatur cera & olei ros. q. s. fiat vnguentum.
Hic tamen si indum, quod in vlcerebus & com-
munis aliorum vlcerebus scopus sit obseruandus,
vt prius mundificentur, deinde consolidentur, ac
cicatrifent, sed hic, vt alias saepe diximus, siccio-
rib. opus est. His adiunge ea, quæ de vlcerebus geni-
talium antea scripsimus. Quod si a sudorib. vlcera
in scroto excitentur. Paul lib 3. c. 54. g. lam detri-
tam, vel alumen inspergit pingui & hircino f.lli,
& perungit. Porro ad testes incensos, terrā cimo-
liam cum aqua prius illitam, finito siccescere, ca-
lidam aqua abstergito, myrtū siccam, & si y. nūi
p. m. in puluerem redactum applicato. Si caro
in testiculis excreuerit, cinis fermentaceus nitro
& aqua imbutus curat inductus. Pruritu scrotum
irritante, nitrum, pedicularia, (Græci staphydragriā
appellant) alumen liquidum, aceto contritum, ro-
saceoq; illinitur in balneo. Vbi laueris candidus
oui liquor cum melle parti inungitur. Bertrutius
vero ad vlcus & corrosionem in virgā, aut testi-
culis, commendat oleum vitellorum ouorum, q
sic fit. *℞ oua 12. gallinarum recentia, elixentur in*
aqua, donec indurentur, & deinde vitella ouorum fri-
centur in sartagine, donec quasi adurantur, & tunc
succus, qui est in eis exprimitur cum spatula, vel de-
stillatur in alembico, sicut aqua rosacea, quod melius
est, corrosionem prohibet cum virtute. Idem fa-
cit vng. album & curinum Nicolai. Nunc ad Ra-
mices & Hernias descendamus.

OBSERVATIO XI.

De Ram. & inguinis, Græcis Βεβαιονήλη dicto.

ANNO 1549. mense Aprili, filia Iohannis Pyn-
sonii. Præfæci de Wassenæ, puella anno-
rum 12. quæ per semiannum hernia inguinali, la-
borauerat, neque a Medicis, quantumuis doctis,
quorum opera vñ fuerat, sanari potuerat, ad me,
cum Alcmariæ habitarem, consultandi causa vna
cum matre accessit. Huic inprimis vñ con-
uenientem præscripsi, vt a leguminibus cibisque
flatulentis abstineret, atq; vt hunc bolum omni-
um primo deuoraret p. æcepi. *℞ cassia recens ex*
cannis tracta. ℥ ij. seminis dauci pulu. ʒ j. ss. zacch.
asperos fiat bolus. Inde bis aluum deposuit, & sic fe-
cibus communibus hoc modo educis, hoc fotu
vñ sumus, vt commodius intestina prolapsa in
suum locum reducerentur. *℞ rad althæe mun-*
data ℥ ij. folior. malue, florum chamomill meliloti,
summitatū anethi, an. m. j. seminis lini ℥ ss. fiat omniū
decoctio in aqua communi pro lb. j. ss. quo quidem
fotu hoc tempore sine magno negotio intestina
in locum suum reducta fuere. Quare matri præ-
cepimus, vt filia diligenti cura quotidie locum
affectū inungeret oleo ouorum, myrteo, & hype-
rici simul commixtis, & vt mox ceratum, contra
rupturam applicaret per plures dies, & subliga-
culis ad hoc aptis vtens, recte cincta semper filia
procederet. Præterea præcepi, vt interea perpetuo
vteretur ceruicia, in qua decocta esset radix con-
solidæ maioris, exiguo adiecto zacch. ad sapo-
rem. Et si venter aliquando constringeretur,
cassiam recenter e cannis tractam ad vnciam v-
nam sumeret, ad aluum deponendam. Istis con-
tinuatis remediis, & victus rationem diligenter
obseruans, qualem in scriptis, dederam, & opti-
mum vitæ regimen ad eiusmodi affectum faci-
ens, hæc tandem recte curata fuit.

SCHOLIA.

KHΛH Græcis, Hernia, seu Ramex, Latinis,
Ruptura & Crepatura barbara Medicinæ scri-
ptoribus dicitur. Est enim κήλη nomen commu-
ne inflammationibus arteriæ, umbilici, scroti, &
inguinis, sed varias propter affectiones materiæ,
siue parvis accipit appellationes. Si enim in aspera
arteria fiat tumor, vt plerisq; accidit ex potu aque
ex liqu. factis niuib. quæ Alpinis & aliis mon-
tanis in usu est, Βεβαιονήλη Græcis gutturis Hernia,
Gallis dicitur. Quando vero umbilici ligatura la-
xatur, ὀμφαλοκήλη Græcis vocatur. Quod si inte-
stinū supra inguina exeat, Βεβαιονήλη Græci Ra-
micem inguinis, Latini appellant. Hæc Hernia Bi-
bonoceli, seu Ramex in inguine prominens, virorum
atque mulierum communis est, secundum enim
inguinis partem fit, quam & Bubonicā Herniam
vocant. Mulieribus saepe accidit, cum laxatur fo-
ramen illud, per quod ligamentū vteri ad internā
inguinis partem descendit, aut disrumpitur peri-
toneum, propter fetus magnitudinem, aut mul-
titudinem, vt in his, quæ duos aut tres pariunt,
accidit aliquando. Contingit & puellis, ac pingui-
bus (quemadmodum & huic puella contigit) ex alia
caussa quacunque violenta. Sed alias de causis.
Nunc de nominibus agamus. Illabuntur aut. in

2
Κήλη.
Ramex,
Hernia,
Ruptura,
Crepatura.

Βεβαιονήλη.
ὀμφαλοκή-
λη.
Βεβαιονή-
λη.

Si caro in de-
sticulis ex-
creuerit.

Oleum vitel-
lorum ouorū
valēs ad vl-
cus & corro-
sionē in vir-
ga vel testi-
culis.

4 varia ex quibus Ramicum differentia statui solent. Cum, inquam, intestinum in scrotum infra delapsum est. *Intestini ramex*. Græce ἐπερχήλη dicitur. Proinde si rupto peritoneo, omentum duntaxat in scrotum descenderit, ἐπιπλοκήλη Græcis, *omenti ramex* Latinis dicitur. Si & simul omentum & intestinum quoque delabantur, Græce ἐπιπλοονπερχήλη, id est, *omenti intestiniq; Ramex* nominatur. Si vero flatus vel aquæ huius affectus sunt causæ, ab his nomen accipit hernia, ut si aquosus humor in parte aliqua corporis implicatus in scrotum colligitur, ὕδρηνήλη. *Hernia aquosa* dicitur. Si & alius humor præter aquam in scroto continetur, vocatur & hæc a barbaris *Hernia humoralis*, seu *Hernia humorosa*. Quod si flatus hunc aff. Cū gignit, αἰσθητικήλη, id est, *Hernia ventosa, vel flatulenta, vel flatuosa*, vocatur. Sicuti ab aqua hydrocele dicitur, ita & ab adnata carne Sarcocoele. Nam & duæ sunt species præter dictas: quarum una περικοκήλη Græcis, Latinis vero, *carnosa Hernia* dicitur, altera κηροκοκήλη, id est, *Varicosa*. Vbi itaq; venæ, quæ testiculos nutriunt varicū more dilatantur, & ultra modum repletæ glomerantur, Græci vitium hoc κηροκοκήλην, hoc est, *varicosum Ramicum* appellant. Aliquando etiam complicantur hi affectus, ut aqua cum spiritu descendat, aut simul cum omento, ut paulo ante diximus, intestinum delabatur, tunc & nomina eorū complicantur, ut de Epiploenterocele dictū est. Idem de aliis est iudicium utriusque appellationis nomina coniungentes. Ita & situ partium: sic *Bubonocoele* dicitur, quia in inguine fiat: *Oscheocoele*, quia in scroto, & hæc ipsa hernia, quæ in scroto fit, viorum duntaxat est. Hanc distinctionem præcipue Græci faciunt. Barbaram autem sectantes Medicinam, qui Auicennam & reliquos sequuntur. Prædicti, *Herniam* in septem species seu differentias distinguunt, voluntque *Herniam* ad rupturam & relaxationem nomen generale esse, tum ad *Herniam* humoralem, aquosam, varicosam, & intestinalē. Hoc nomen *Herniæ* quidam ut *Valesius*, deducunt ab hæreo, eo quod fortiter adhæret ægris, in quo vocabulo demonstratur fortitudo adhesionis & difficultas separationis. At melius *Hernias* (ut inquit *Celsus*) vocant a duritie pellis, quæ fit post intestinorum descensum. *Hernium* n. durum & asperum dicitur, tractum a Sabinorum lingua, qui *Hernia saxum* vocant. Prima itaq; species est apud eosdē *Ruptura*. Neotericos, *Ruptura*, quæ *Auic.* teste 21. 3. cap. proprio, proprie fit propter fissuram panniculi continentis zirbum, seu omentum, & intestina, id est, peritonei, postquam per foramen transit zirbus, vel intestinum, usque ad inguina, vel partes inferiores, & ista proprie dicitur *Ruptura*, quæ species hæc nō, secundum quosdam, rarius fit: quamvis etiam subinde frequenter fit, potissimum in nautis & maritimis. Alia species herniæ est, quæ huic assimilatur, quantum ad eminentiam, quæ dicitur *Relaxatio*. Unde *Relaxatio* est dilatatio didymi ultra suam naturalem stricturam, cum descensu zirbi, vel intestini, per concavitatem eius ad partes subiectas, & aliquando usque ad testiculos. Hæc evenit frequentius, & potissimum in pueris, ob superfluum hu-

miditatem eorum, & nervorum molliem. Istæ autem duæ species, secundum *Prædictos*, sunt magis famosæ. Tertia species herniæ, secundum eosdem, est *Humoralis*, quam alii proprie reuocant ad apostema scroti, vel testiculorum, de qua antea dictum est, atque eius causas recensuimus. Quarta est *Hernia Aquosa*, quæ fit ab aqua descendente ad scrotum, vel ad unam partem in folliculo, ut illi loquuntur. Quinta species dicitur *Varicosa*, cum multis crassis venulis circa oscum involutis, quæ dicuntur varices. Sexta vocatur *Carnosa*, quia ibi generatur caro in eodem loco, aliquando in inguine, ut nonnulli volunt, sed rarissime. Septima species dicitur *Ventosa*, eo quod ventositas congregatur in scroto testiculorum. Hæc de nominibus. Vide Leonellum *De morbis med. c. 72. de Hernia generib.* De quibus omnibus agemus, & primo exemplo hic interposito, de *Hernia inguinali*.

OBSERVATIO XII.

De viro quodam *Hernia inguinali* laborante.

Solet autem *Ramex* inguinis, vel intestini, accidere ex violenta quadam occasione præcedente, nempe ictu, aut saltu, aut clamore, aut immensæ molis sublatione, quod viro cuidam crasso & pituitoso evenit, cum pondus graue sustulisset, ita ut peritoneo perrupto, intestinum ileon descenderet, ac in meatu illo remaneret, nec ad scrotum peruenerit, & in bubonocelen inciderit, seu herniam inguinalem, in ipso nimirum inguine affecto consistente. Eminentia apparebat exterius ad magnitudinem oui: cumque tempus tunc niuosum ac frigidum, & hyems asperissima esset, loco plurimum dolente, quod intestinum fecibus tandem repletum minus impelli posset, quibusdam sacculis calidis apposis, dolor plus æquo auctus est, ita ut tandem ad hominem accitus fuero. Cum igitur alius illi resisteret, ac ob excrementa intestino impacta, durior esset, ventositate quoque impediens, statim præcepi ut clyster sequens inuiceretur. ℞. rad. althæe mund. ℥j. β. folior. maluæ, althææ, biancæ vrsinæ, mercurialis, beræ, anan. j. florum chamomillæ, nictloti summitat. n. anethi, anap. j. semin. lini, fenugr. an. ℥ij. fiat decoct. in aqua commun. pro ℥ij. β. libra una & semis roboratur pro fort. altera ℥β. pro clystere, in qua dissoluitur. β. cassia pro clystere. β. an. ℥j. electuarius hic. ℥vj. olei chamomillæ, amygd. dul. olei commun. an. ℥j. vitellum unius oui, salis commun. ℥j. salis gemmæ ℥β. misc. & fiat clyster, qui statim injiciatur. Ter aliud deposuit, prius dura stercora in fine liquidiora: mox, decenter cum spongiis adhibito fotu, intestinum prolapsum reductum fuit in locum pristinum. Locus deinde inunctus unguento infra scripto, vel huius æmulo. ℞. olei hyperici, ab. etini, ros. myrtin. cotoneorum, mastichini, an. ℥j. corticis thuris, mastichis, myrræ, boli ar. m. sanguinis draconis, sarcocollæ, an. ℥β. pulverisuntur, & cum prædictis oleis probe commiscendo, adiecto ceræ exiguæ, fiat unctio. & desuper ponatur emplastrum de pelle arteriana & compressiomb. demum constringatur, subligaculis debite inunctis, ut aris est. Istis prædictis utens, quiete se domi ad tempus continendo, recte deinde se habuit.

SCHOLIA.

3 **N**on defunt ex Neoteficis, qui tantum duplicem Ramicem constituunt, *Mirachialem* & *Oscchealem*. Est autem vnaquæque ex crescentia & magnitudo scroto, vel partis mirach. Ex quib etiam patet quod hic sit morbus cõpositionis, quoniam est in quantitate aucta partis ramice affecte. Interea hic affectus habet causam multiplicem, prout omentũ vel intestina in scrotum vel inguina descenderint, ex relaxatione, mollificatione, aut solutione continui, aut ruptura: vel quod aquositas ex vitio hepatis, digestionem eiusdem diminuta, ad scrotum effluerit: vel ventositas, quæ genita fuit a cibis, & calore debili. Verum antequam causas horum affectuum explicemus, primo præstat inquirere causas rupturæ & relaxationis, deinde vniuscuiusque ramici seu herniæ per se; vt & probe certis deinde signis vnaquæque species inter noscatur. Quod vero ad causas rupturæ & relaxationis attinet, quædam sunt primitiua, vel procatactica, estque omne illud quod facit ad fortem expulsiõem omenti, vel intestini, versus partes subiectas, vt sunt, casus, percussio, ludus, balistæ, vibraturæ, hastiludiũ, cursus, saltus, clamor, vociferatio, hinc concionatores, cantores, tubicines, athletæ, rupturam incurrunt: adhuc etiam, leuare & portare grauiâ pondera, lapidum iactus, equo celeri currere, lanceis sese exercere, vt nobiles ac milites; potissimum hæc ipsa tum vehementia exercitia, post repletionem. Oritur quoque malum post coitum superfluum, inordinatũ, ac propter tussim fortem & laboriosam. & nihil æque nocet ac coitus super repletionem. Si fortes hæc causæ fuerint, ac violentæ, magis rupturam inferunt. Si debiles, accedentibus aliis causis internis, relaxationem inducunt; quamuis præcipua causa relaxationis est humiditas excedens in partibus iam dictis, & humorum fluxiones ad easdem partes, præcipue debilitatas, defluentes, & quæcunq; remolliunt & relaxant, & quamuis humiditas sit causa præparans, fortis tamen cõpressio omenti, vel intestini, perficiunt relaxationem. Sed quod ad particulares causas attinet vniuscuiusque speciei, iuxta eos, qui Græcos sequuntur. Ramices intestinorum, vel inguinis, fiunt, vel quod peritonæum plus æquo extenditur, vel quod rumpitur. Vtrumque (vt iam diximus in præcedente obseru.) ex violenta quadam occasione præcedente: nempe ictu aut saltu, aut clamore, aut immensæ molis sublatione, accidit. Aliæ causæ nunc dictæ idem malum quoque inferunt. Aquosus vero ramex quandoque ex occulta, quandoque ex manifesta contingit causa. Ex occulta quidem, quando ex auctis vasis in scroto contextis, aquosus humor propulsus, & sanguini permixtus, ad eas partes decubuerit. Ex euidenti autem quum, propter ictum collisis aut fractis vasis, sanguis subinde alimentiratione defluens, in aquosam ferosamq; substantiam mutatur. Sed de his latius cum de hydrocele exempla aliquot adferemus. Satis est nunc scire, quod inter erythroidem & testiculũ, darton & erythroidẽ, aut etiam in scroto, aquosa sanies, aut

aqua colligitur, vnde Hydrocele. Id recens natis puerulis sæpe contingit, facileq; discutitur: vt etiam flatulentus Ramex; cuius origo quicquid flatum gignit, vt cibi omnes flatuosi, legumina, &c. Carnosus vero ex latente causa nascitur, testiculo fluxionem experto, induratoq; aut imperita post ramicis succisionem curatione. Reliquorum ramicum causæ ex eorundem descriptionibus satis patent. Hæ autem causæ clariores euadent ex obseruationibus sequentibus.

OBSERVATIO XIII.

De Ramice inguinis recenti, & facile curato.

Adiuuenem in inguine ex forti saltu dolentem vocatus, ex eminentia animaduerti, leuem esse rupturam in inguine, ad formam nucis iuglandis. Imperavi, vt se quietum teneret; & compressione facile subidente ruptura, intestino etiã recedente, locus inunctus est oleo nepitæ, ouorum, & myrte. Iussi deinde, vt ceratum contra rupturam apponeretur, fasciis latis supra inductis. Atq; is bono victu ac consolidante vtens, breui admodum fuit curatus.

SCHOLIA.

Cum de causis diximus, ad signa progrediamur, & primo de communib. signis agamus, & quantum ad signa communia attinet, omni speciei herniæ est eminentia & additio augmentata. Differunt tamen omnes inter se multis modis. Enim vero distinguuntur a ruptionib. laxationes. Rupturæ enim in lateribus ilei fiunt post ictum, aut saltum vehementẽ, vt in hoc iuvene, vel corpus contorquendo: nec in his apparet magnus tumor in principio, sed progressu temporis. Magis enim ac magis peritonæum disrumpitur, & tumor immensæ magnitudinis, & in summa cute eminens, quod scilicet intestina extra peritonæum dilabantur, & a sola cute sustineantur. Has consequitur dolor pungens, & quasi lacerans. Relaxationes autem tantum eueniunt circa foramen per quod vasa & muscoli cremasteres ad testes descendunt. Præterea distinguuntur ab inuicem relaxationes. In aliquibus magnus & inæqualis tumor: in aliquibus crescens & decrescens citra dolorem apparet. Eadem fere considerat interpret Holle-rii, an ruptum sit peritonæum, an relaxatum. Ruptura, inquit, fit in lateribus ossis ilium, post saltum ictum vehementem corporis contorsionem. Initio tumor parvus, progressu temporis augetur: paulatim enim magis disrumpitur peritonæum, & prolapsa non sine dolore reducuntur: nam in ruptura fit dolor magis, si intestinum elabatur; quoniam membra habent sensum acutum. In relaxatione, etiamsi reducuntur, non dolent, quouis modo contractetur relaxatio. Sed & notæ utriusque, intestinorum nimirum & inguinis ramici, communes sunt. Conspicius enim in scroto, aut in inguine, tumor est, qui in exercitiis, itinere, spiritus retentione, aliisq; occasionib. maior quàm ante euadit; cõpressus tarde quidem recurrit, celeriter autem rursus deuoluitur. Sed habent hæc, tũ reliquæ species etiã signa sibi propria. Nã Enterocoele augetur vel minuitur ratione materię collectæ. Intestinũ, ægro quiescente, vel resupinato

Causa flatuosi Ramici.

Carnosi Ramici causa.

Signa distinguuntur a ruptione a laxatione.

3

Nota communes ramici inguinis & intestinorum.

Signa Enterocoeles.

rursum retrahitur, & in loco permanet, aliquādo pars altera in scroto residet: tumore vel cibi satietate crescit, frigore contrahitur: intestinū clamore relaxatur, scrotum relucet, & multum distentū apparet, & magis in vna, quam in altera parte. Aliquando tactu discernuntur excrementa indurata. Cum autem remouetur intestinum, & ad inguen retruditur, sentitur flatulentum murmur. Tumor autem sine inflammatione, si intestinum descenderit, non minuitur; modo increscit, si ambulauerint; mane detumescit, estq; sine dolore cū quiescunt: aut iacet ex toto interdū: pueris præsertim desidet: clamore, satietate, vel pondere crescit, frigore contrahitur, calore diffunditur; scrotumq; est rotundum, est & tactu lene; si comprimitur, ad inguen diuertitur seu reuertitur, dimissumq; iterum cum quodam murmure deuoluitur. Si autē ileon, vel omentum, in inguine exeat, rupto peritonæo, tumorque ibi remaneat, nec perueniat ad scrotum. *Bubonocoele*, ut diximus erit; in ipso nimirū inguine affectu consistente. In mulieribus (ut antea quoq; retulimus) fit ob foetus magnitudinem aut multitudinem. Alioqui raro hernia laborant, quod peritonæum firmiter continendo foetui habeat. *Epiplocele* dignoscitur a tumore, qui magis in osse pubis fit, q̄ in scroto. Tumor autem permanens est, nec minuitur, sed semper perseverat, siue ieiunet, siue huc & illuc corpus moueatur, aut quouis modo collocetur. Si vero retineatur spiritus, nō adeo increscit, tactu inæqualis, mollis & lubricus sentitur. At quāuis in *Enterocoele* fit quoq; tumor mollis, & repente natus, augetur tamen, ut diximus, vel minuitur pro ratione materiæ collectæ: iam quoq; scrotum multum distentum apparet ac magis in vna quam altera parte: retruso intestino murmur percipitur: tū reliqua supradicta adsunt, atque insuper excrementa nonnunquam indurata per os reddūtur, ut in iliaca passione. De aliis signis aliarum specierum mox dicemus: nunc iterum exemplum adferamus, de infante lactente *Bubonocoele* laborante.

OBSERVATIO XIII.

De Bubonocoele in infante.

Solet autem pueris, etiam infantibus, aliquando ex fletu eiulatuque modo *bubonocoele*, modo *enterocoele* cōtingere: imo aliquando ex repletionē immoderata, & forti in egerendo expressione, & flatuū aliquorum plus iusto irrepentium superabundantia, quum eorum peritonæum sit tenerum, facile rupturæ obnoxium. Ita infans, qui nutrice adhuc sugebat, ad me delatus est, tumorem admodum exiguum in inguine habens. Hoc vero malū cum puerulis sæpe accidat, uti & *enterocoele*, tanquam magis humidis, facile tamen aliquando curatur absq; manu medica impositiue medicamentorum, & commoda ligatione sola sepius curatur. Tamē, ne nutrix & mater pueri sine remediis a me discederent, consului, ut medicamentum ab Auic. & Gal. commendatum, (quale etiam ponitur a Sebastiano Austrio in libello suo, *De puerorum morbis*), ammeos, inquam, semen cum oui albo nutrix aspergeret, atq; panno subtili in-

uolueret, demū ramici superponeret; aut lupini assati, cum myrrha friam, portiunculam cū vino cocti, sub æquali pondere denuo cum panno, emplastri modo inguini vtiliter apponeret. Quæ si non iuuarent, ut ad emplastrum ipsius Auicennæ venirent, quod & puerorum herniam consolidat. Habet corticis granat. ʒ x. gallarum immatur. ʒ v. cum vino adstrictorio coquantur exactissime, intestinis vero prius ad interiora retrusis, atque cum aqua loco adfecto abluto denuo emplastrum hoc applicetur; neque deponatur, nisi unius hebdomadis, aut decem dierum, ad minus spatio elapso. Plura vide apud eundem Sebastianum ex Auicenna, Galeno & Rhasi, tum Neotericis collecta.

S C H O L I A.

ANtequam iterum ad reliqua signa perueniamus, sciendum quod tendo quidam membranofus sit, vtrinq; ab inguinibus procedens, in peritonæū exporrectus, cuius robore peritonæū confirmatur. Atque hinc omentum & intestina. Relaxatus herniam facit, descenditq; plus minusve intestinum & omentum, aliquando in inguina nonnunquā in scrotum, ut diximus, vnde nominā *Enterocoele* & *Epiplocele*, & in inguine *Bubonocoele*. Aliquando rupto peritonæo idem fit, ut diximus. Grauius malum est, ut postea de signis prognosticis dicemus, cum intestinum descendit, intestinumq; in scrotum deuoluitur. Supprimuntur feces, regurgitatq; in ventrem. Testiculus crythroidē tunica vestitur. Post hanc vero adnata est dartos. In superficiem extenditur folliculus genitalis, quod ὄρχος Græci, *scrotum* Latini vocant. Ad ossa pubis nō perforatur peritonæum sed productio quædam illius descendit in scrotū, per cuius meatū vasa spermatica, arteria scilicet & vena, perreptant ad testes, & per eundem locum eiicatoria ascendunt, ut inferantur collo pudendi. In hac productione multi tumores fiūt, quos Græci (ut diximus) κίλας vocāt, modo in scroto, modo supra scrotū, qua parte in illud descendit. Quorū omnium causæ est (ut de causis latius retulimus) vel flatus, vel aqua ibi contēta, aut caro, aut tumor venarū varicosus, vel delapsa pars aliqua ex hi, quæ intra peritonæum continentur, ut intestinum & epiploon. Idq; fit vel rupto peritonæo, vel relaxato & hiantē. Ex omnibus autem intestinis solum ileon (ut etiam probat Interpretes Hollerii) in quo chylus semper continetur procidit. Nam rectū in anum cum relaxatur, descendit. Colum adligatū est renibus, & altius ascendit in ventriculum. Ieiuna & tenuia intestina, sublimiora sunt. Ileon itaq; tantum superest, vel cæcum. Neque enim de duodeno vlla dubitatio. Duo igitur in his affectibus statim initio distinguēda sunt, an sit aqua, vel flatus, vel caro, vel varicosus ramex: in mulieribus, ut paulo anterecensuimus, laxatio foraminis ligamenti descendētis ad internam partem inguinis, aut ileum delapsum, vel epiploon: nonnulli addunt musculos ruptos epigastri. Deinde si quid descenderit, qua parte sit, & an ruptione, an relaxatione id fiat. Si aqua fuerit (ut in Scholio Observationis undecimæ huius libri narramus,) hydrocele

Signa Bubonocoeles.

Signa Epiploceles.

5
Differentia inter Epiplocelem & Enterocoelem.

cele: si flatus, pneumatocèle: si caro, sarcocèle: si varices, cirsocele: si ileon, enterocèle: si epiploon epiplocele nominatur. A situ vero partium bubonocèle (de qua nunc aliqua exempla protulimus) in inguine: oscheocèle in scroto dicitur. Quibusdam testiculus in inguen translatus imposuit, ut herniam crederent. Aliquando etiam hi affectus (ut etiam prius admonuimus) inter se complicantur. Sæpe vehemēti imaginatione libidinis colligitur semē inter tunicas testiculi, ut videatur quædā esse sarcocèle aut hydrocèle. In quibus omnibus cauendum, ne iudicando fallamur. De signis enterocèles & Ramicis inguinis ac intestinorū, scilicet & bubonocèles, ac epiploceles, & de earū inter se differentia Scholio præcedente diximus. Illud his quoq; addendū, quod in epiplocele percipitur veluti strophilū molliusculum, lubricum, inæquale, præter alia nunc relata. Vtrumq; quoq; in his duobus fit, nempe in enterocèle & epiplocele. Videndum autem in primis an ruptū sit peritonæum, an relaxatum: quod & inuenies in principio Scholii obs. 13. Nunc ad aliarum specierum signa progrediamur, iterum, ad maiorem enucleationem, obseruatione aliqua interiecta.

OBSERVATIO XV.

De quibusdam ab Hernia inguinali probe curatis.

BUBONOCÈLES, seu Herniæ inguinalis curatæ aliquot exempla recensebimus. Iuuenis quidam an. 1556. in principio mensis Maii Snello Nicolaus (sic illi nomen erat) filius Ioannis Præf. & Neoburgii, auunculi vxoris meæ, annos triginta quatuor natus, cum fortiter equitasset equo duriter gradiente ab vrbe Alcmaria Harlemum versus, incidit in bubonocèlem, seu inguinis ramicē. Ad quem statim accitus dum malum adhuc recens esset, & nō adeo magnum (nam vix ad magnitudinē nucis ingulandis ruptura in inguine apparebat) reductis facili manus impulsione intestinis, locum inungere feci oleo myrteo, & ouorum; demum emplastro imposito contra rupturam, ex pelle arietina; ligaturaq; consueta, ut fieri solet, adhibita, deinde eundem per totū tempus curationis supinū in lecto detinui. Et quod mensis Maius esset, ac omnia viridia ad manus forent, præcepi, ut bis in die ex hac potione sumeret: ℞. rad. consolida maioris, rad. sigilli Salomonis, rad. glycyrrh. ana ℥ ss. herbarum, viridum valerianæ, nepuæ, consolida minoris, osmundæ, plantaginis, flor. ros. rubr. ana m. ss. seminis anisi ℥ j. fiat decoctio in ceruisia communipro ℔ j. ss. Satis dulcis erat decoctio ob glycyrrhizam, ut non opus fuerit zaccharum addere. Fuit ter quaterue hæc potio reiterata. Pro potu utebatur in cœna & prandio subinde vino rubro, & optimam victus rationem obseruabat: interea abstinendo ab omnibus flatuosis cibis, a lacte, fructibus, omnibusque leguminibus, rapis, aliis, & cœpis, & omnibus oleribus; ab omnibus denique cibis humorem crassum gignentibus, quales sunt res frictæ in sartagine, pisces, panis azymus, caro porcina, bubula, caeus, vina crassa & dulcia. Madaui quoq; ut abstineret ab omni motu, saltu, & neciā curatus scalas ascēderet, aut mon-

tes; neque equitaret, potissimum in equo feroci, aut curreret, vel cito ambularet, neq; ut alta voce caneret, aut anhelitum fortiter retineret; ceratum vero contra rupturam non amoueret, neq; ligaturam aptā omitteret. Et ita perfecte curatus est, atque intestinum non amplius extra profiliit. Alius vero Iuuenis Delphenis ditissimus, cum anno 1568. mense Octobri bubonocèle etiam correptus in inguine sinistro esset, re similiter recēti ad me consulturus venit: cui eadem quoq; consului, vel his similia. Quare loco inuncto cū oleo ouorum, & myrteo, & insuper imposito emplastro contra rupturam, omnium primo intestino in locum reducto, & subligaculis debite adhibitis & hic quoque breui sanitati restitutus fuit. Hic vero antea consuluerat mulierem quādam vetulam Frisicam, quæ Delsis multos pueros ac infantes curabat, præcipue autem diuitem, cuius multum hac in re felici curationi tribuebatur. Applicabat intestinis reductis cataplasma vulgare ex melissa & nepita, & similib. Vtebatur & alia etiam herba quasi stellata & aculeata quā quidam eryngiū esse volunt. Crescit vero circa aggeres dirutos, & copiosissime eandē vidi crescentē apud Sgrauefandam; folia eius insignem amaritudinē habent: decoquebat autem illam in ceruisia, aut vino, & ita propinabat. Ego autem felicissime vtor rad. sigilli Mariae vel Salomonis. Inter arcana quoque M. Ioan. Tiengii, quondā Medici Amstelrodamensis, & hoc erat, quod quidam potans trib. septimanis ex decocto rad. sigilli Mariae in vino, curatus sit a ruptura. Ita & folia acetosæ mane comesta in magna quantitate, uti & folia valerianæ cocta in vino albo, & ebibita, curant. Sic & Benedictus Veronensis laudat hippurim communem anducatam. Alii, radicis consolida maioris abrase m. ij. cum melle pistos & coctos emplastri modo apponunt. Monachus quidam Dionysius hac decoctione rupturam curabat: ℞. herba osmundæ, garyophyllata, bugula, fœniculi, verbenæ, bettonicæ, agrimonie, pilosellæ, plantaginis, consolida viridis, hyperici, caulium rub. tanacetii, summitatum canabis, millefolii, iacæ nigra, bursa pastoris, ana m. j. rubæ maioris m. ij. coquantur fortiter, & bulliant in una quarta vini albi ad consumptionem medietatis, addendo mellis q. s. fiat potus longus. Aliquando & sequenti utebatur: ℞. rad. consolida maioris, sigilli beate Mariae, rad. valerianæ, osmundæ ana ℥ ss. pimpinellæ, pilosellæ, agrimonie, ana ℥ ij. centaurii minoris ℥ j. fœniculi, bugula, polemonii, ana ℥ j. bursa pastoris, artemisie, eupatoris, ana ℥ ss. fiat decoctio in ℔. vj. vini ad ℔. iij. Loco rupto applicabat emplastrū contra rupturam. Spiringius Medicus quondam Louanienis insignis & magni nominis, cuius bibliothecam, quæ omnibus patebat, testamento scilicet publico studiosorum vsui legatam sæpius accessi, semenna sturtii agrestis exsiccatum in patella, & puluisicatum, dabat cum ouo sorbili omni mane. Gordonius prædicat idem semē assitum, & puluerisatum, cū lacte cocto: curat, inquit, omnē rupturam a principio, & fluxum ventris; cōuenit autem præcipue pueris. Radices quoque brusci minutim incisi pistæ in vino, & multis vicibus sumitæ.

5 laudantur. Alii dant flores calēdulæ cum vino, vel ex ouo forbili, & intra nouem dies, vt ferunt, percurant. Non desunt, qui decoquant sigillū Mariæ aut Salomonis, peruinçam, gramen, vtramq; cōsolidam, hepaticā, primulam veris eoque decocto vtuntur. Prodest & lāceolata herba, pilosella, millefolium. Matrona Cornelia Heutera, vidua D. Casparis de Halmale, dixit M. Ioan. Tiengio Medico, q̄ infans ruptus hoc modo fuerit curatus: *Accipiebant tria vel quatuor frusta radicis osmundæ sex vel septem annorum. & decoquebantur in vino Rhenensi, bibebatq; mane & ante cœnam cyathum unum, atq; bis in die inungebatur infans cum oleis do vitellis ouorum, mastichis, & terebinthina, ligaculo, vt artis est, loco constricto.* Cornel. Ioannis Flander habuit in sua familia multos ruptos a natiuitate, quos omnes ipse curabat, dando mane per quatuor vel quinq; dies puluerem vermium terrestriū, & supponebat oxycroceum, subligaculis consuetis inuictis.

S C H O L I A.

6 *Signa sarco-*
celes.
Quib. notis
distinguitur
sarcocele ab
entarocele.
Signa bubonocesium diximus: quomodo alia species sint interstinguendæ, nunc dicamus & primo de sarcocele. Dignoscitur hæc tumore, duitie, & colore vbiq; sui simili. Est enim tumor rotundus, oblongus, durus, testiculi formam referens, & pedetentim auctus. Quibus duob. ab enterocèle distinguitur, quæ mollior est, & repente oborta. Fit enim (vt diximus) a carne duriore in aliqua scroti parte nata. Galen. ad scirrhum refert. Aliquādo testiculi, aliquando nerui, a quib. testes dependent, indurantur, aut inter tunicas caro illa generatur. Causæ, vt ante dictum est, sunt, fluxio, ictus, succisio ramicis non recte curata, & similia, quæ scirrhos procreant. Cardea itaq; hernia tactu duro cognoscitur, & vt alii dicunt, paulatim nigrescit, ac sine dolore est. Si autem tumor in scirrhum coalescat, nec color vllus, nec sensus adest: si maligni referat naturam, dolor vrget punctorius. Hic tamen videndum ne ob duritiem decipiamur. Sic Delphis Ioannes Cornelius, habitas in Asino cœco, annos circiter 40 natus, testem vna cum scroto vltra quinque annos adeo durum habebat in modum scirrhii, paulatim in maiorem molem auctū, vt chirurgus sarcocelelem esse iudicaret; & ego etiam eram in eadem fere sententia, remediis nihil iuuantibus. Tandem eo chirurgus mortuo, me rursus vocari iussit cum duobus aliis chirurgis, cum æque durus esset tumor, & magis auctus, & cum maiori quam ante dolore. Tandē impositis maturatiuis mollior euadebat tumor, & facto abscessu, magna copia aquæ, quæ intus laterat, impetu quodam erupit; & mox detumuit scrotum, & etiam testiculus, ac præter mētem curatus fuit. Videbantur tamen longo tempore signa apparere, quæ in sarcocele describūtur, & nullo modo hydroceles: nā obiecta cerea candela non erat pellucida caro, sed semper dura permansit. Contingit tamē aliquando durities in hydrocele (cuius signa postea latius declarabimus) quæ plenitudine & tensione fallit, vt videatur esse carnosā, aut intestinalis: sed pelluciditas, inquit Interpres Hollerii, fraudē detegit. Hic tamen nulla, nec in prin-

cipio nec in fine, apparuit pelluciditas: sed post maturationem, perrupto abscessu, aqua in copia effluxit. Oportet igitur, quod profundius intus la-
8 *Signa cir-*
celes.
tuerit. Nunc ad cirsocele, id est, varicolum ramice veniamus. Est autem cirsocele, vt antea dictum est, cum venæ testiculum nutriendes intumescunt. Sentitur diuersitas tumorum & paruitas in epididymo & vasis spermaticis, quæ sunt veluti cōglomerata, & intorta. Paulus vasorum aut darts dilatationem *νεγες*, id est, varices simplici vocabulo appellat, eorum vero, quæ testiculum nutriunt, *νεγες* *αυτῶν*. Celsus ex loci varietate quatuor differentias facit, omnesq; vno nomine comprehendit. Quod autē ad hydrocele attinet, seu herniam a-
9 *Signa hydro-*
celes.
quosam, primo in ea cognoscenda omnis aditus lucis intercludatur, & obiecta cādela cerea videatur nunquid pelluceat. Est enim durities, quæ plenitudine & tensione fallit, vt videatur esse carnosā aut intestinalis, sed pelluciditas raro non, vt dixi, fraudem detegit. Sed quia pelluciditas etiam con-
10 *Differentia*
inter hydro-
celem, entaro-
celelem, sar-
cocelelem, &
pneumatoc-
celelem.
uenit flatuosa ad lenitatem respiciendum. Nā aquosa obscurior est & grauior quam flatuosa. Vbi vero cōstitit de aqua, videndum quo loco continetur. Quia in re Veteres satis perplexi, & cōfusi videntur. *Galen. de tumoribus scribit*, in tunicis, quæ testes ambiunt, cōtineri. Paulus, in corporib. scrotum implicantibus. Celsus, integris membranis colligi: alii, ruptis etiam & relaxatis. Alii modo intra tunicas, modo intra membranas. Si inter tunicas, vel inter summam & mediam, vel mediam & imam. De loco certe, & ad prædictionē, & ad curationem non est ambigendum. Nam aliquando in superficiali scroto (vt *Interpres Hollerius annotauit*) continetur, aliquando profundius. Sed cum testiculus duabus tunicis in signibus inuoluatur, erythroide, quam sequitur dartos, fere semper hydrocele fit vel inter has duas, vel in toto scroto. Hic totum scrotum intumescit sine rugis, vesicæ inflatæ simile: illis tumor tantum in testiculo percipitur, videturque rotundus & tensus rugato & laxiore scroto; quod & in multis seorsim quoq; animaduertimus. Aliquando, vt *Paulus scribit*, peculiari quadā tunica humorille comprehenditur, quæ supernascitur, veluti atheroma quoddā, aut steatoma, vt videatur esse tertius testiculus. Quod hoc anno, inquit Interpres Hollerii 1564. mense
Historia in-
terpresis
Hollerii de
tertio testi-
culo.
Decembri, dum *Lutetia* hæc scriberemus, videre nobis contigit in puero Typographico, in quo omnes tertium testiculum esse existimauerunt. *Asunt D. Gabriel Danagneus Belignaceus*, vir doctissimus. & cui plurimum in his omnibus nos debere fateamur. Sunt tamen, qui asserant, quibusdam famitis, peculiare esse, vt tertium habeant testiculum. Talem & ego quondam noui iuuenem Antwerpianum, cum Bononiæ Medicinæ operam nauarē, sed valde luxuriosum. In mulierib. Aetius tumorē quodolum fieri scribit circa pudendialas, inflationi similem, debilem, mollem, vt humor fluctuans appareat, modo in vna parte, modo in vtraq; Sed illa ad muliebres morbos pertinent, de quib. agemus libro sequenti. Aquosi igitur ramicis cōmunis nota est tumor dolore vacans, firmus ac stabilis in scroto, qua-

quacunq; tandem occasione, non euanesces; sed in iis, qui modicum continēt humorem, cedens; in illis, qui copiosum habent, non itē. At in quib. erythroides tunica humore distēta est, tumor rotundus paululū & oui modo lōgiusculus apparet. His testiculus in conspectum nō venit, vt qui vndiquaq; sit implicitus. Si extra erythroidē membranā sub darto habetur, per pauca corpora sublabitur, testiculusq; intra notas tactui occurrit. At si humor in membranā superadnata coierit, propter contractionem ex omni parte, & rotunditatem, tumor alterius testiculi imaginē præbet. Eadem fere habet Rōdeletius. Interea in hydrocele tumor cum grauitate est, & cachexia; & iis notis a pneumatoccele distinguitur, de qua postea. Sed cū & alius humor præter aquā ibidem cōtineri posset, ideo Neoterici his Herniam humoralem adiecerunt, quæ fit per modum congestionis & defluxionis. Ita & fieri volunt herniam sanguineam, quamuis raro, in criticis transmutationib. ægritudinū sanguinearum; idque ex cibis calidis humidisque sanguinem multiplicantibus: cuius signa sunt, tētio notabilis in loco, caliditas humiditasq; quæ tacta percipiuntur, partium rubedo, & pulsatio, & fere semper fit cum inflammatione & apostemate. Vnde & Valescus de testiculorū ac scroti apostemate, & hernia humoralis, sub vno ca. tract. De biliosa Montagnana dubitat: ideo illā omittit, cum eam nunquā viderit; nisi forte ea fuerit apud Valescum cuiusdam militis, cui per incisionem aqua citrina effluerat: sed illam potius ad herniam aquosam pertinere existimabat. Phlegmaticam admittit & frequenter cōtingere asserit, potissimum in iis, qui sæpissime coitu vtūtur, præcipue post satietatem; cognoscitur ex frigiditate, ex foueæ remanentia, vt in cedemate, nō translucente, & fixatione continua partis eminentis. Atque in his de humoris natura cogitandum, an tenuis, an albugineus, an sanguineus, aut feculētus, vel alterius speciei, vt naturæ humoris remedia adaptentur. Sic si ægri vter tumeat, symptoma est hydropis. Ceterum non tantum colore indicatur, sæpe etiam & ex iis, quæ præcesserunt dignoscitur; magis tamen post incisionem innotescit. Ita in Helia Delphesi, qui organi spiracula follesq; ducendo mouebat, apparuit, post incisionem herniæ adeo magnæ, vt capitis magnitudinē adæquaret: quæ admodum in mendicis solet, quia d. Templorum fores sedent herniosi. Hic cum multo tempore scrotum adeo immensum ac tumidum habuisset, & admodum graue, atq; multis annis hoc malum moleste misergestisset, post, inquam, incisionem, non solum materia purulenta foetidissimi odoris variūq; coloris, effluxit, sed & similia, quæ atheromata & steatomata continent, spectabantur. Post autem incisionem peractam a Valentino illo Restauratore, optime deinde habuit senex. Si vero sit hernia ventosa, vel pneumatoccele, nō magnopere increfcit tumor, actuque sonum elidit, inæqualis est, mollis, ac lubricus, qui neq; pondere fatigat ægrum. Sæpe soli flatus hanc herniā repræsentat. Id recens natis puerulis (vt antea quoq; diximus)

sæpe contingit, & facile discutitur: est enim in ea quidam rugitus, & mouetur vêtositas ab vna parte ad aliam. Breuib. in pneumatoccele similia sunt omnia, vt in hydrocele, nisi quod perspicuitas & leuitas maior adest, quia dilatatio fita flatulento spiritu. Fit aliquando vel in quatuor vasis testiculos alētib. vel in arteriis darton intercurrentibus. Ille durior, nec compressu digitorum euanescit, recipitque curationem: hic oppresso digito intro recurrit, & euanescit, vixq; curatur, periculo ab incessabili sanguinis profluvio imminente (sed hæc ad signa prognostica pertinent.) Fit sine hydrope & cum hydrope. Hæc de signis indicantibus, mox de prognosticis.

OBSERVATIO XVI.

De Enteroccele lethali.

Quidam apud Fossam aqueam Delphis, cui cognomen Mutus Vicinus, enteroccele, seu hernia intestinali cum laboraret, ac lithotomus intestinum in scrotum illapsum in locum suum vix vi intropellere posset, & nullis remediis iuuantibus, febris singultuosa accessisset, haud diu post obiit. Alteri quoque, frumentorum baiulo, enteroccele laboranti, cum circa mœnia tēpore frigido & ventoso alium deponeret, mox intestina in scrotum prolapsa sunt; cumq; statim remedia nō adhiberet, refrigerata tandem illa in locum nunquam reduci potuerunt: ita, vt ileo sequente, deinde singultu superueniente, miserrima morte interierit, remediis nihil proficientibus.

SCHOLIA.

Cum omnes notas ramicū iam exposuerimus, nunc ad præagia & prognostica veniamus. Signa prognostica. Omnium specierum periculossima est enteroccele; præsertim si reduci nequeat intestinum. Sinistra parte adhuc grauior, vbi colum conuolutum desinit in rectum, & multa intestina tenuia incumbunt. Quibusdam inde singultuosa febres, in quibus reposito intestino mors acceleratur; in aliis, non reposito gangræna. Experientia etiam docuit, paulo post mori, quibus vi reponitur; vt in primo ægro, cui per lithotomum vi intestinū reductum erat. In altero cum neq; intropelli posset, idē & mortuus est. Et ita herniæ quædā, aliæ curantur, aliæ autē difficulter, aliæ vero, nullā admittunt curationem; vt carnosæ, si sit insignis nullo modo potest curari, sed castratione testis auferendus est. Cirlocele, seu ramex varicosus, curationem item non admittit, verum nō ita est molesta, vt epiplocele. Omenti ramex difficile curari potest; vix enim, ob tenuitatem & molliem, omentum reperiri potest, & cedit impellenti, si reducatur. Hinc, vt referunt quidā, epiploon ob molliem vix reducitur. Neoterici & barbari hæc adiiciunt. Ruptura siphach in pueris, & mulieribus, & omnib. humidam temperaturam habentibus per naturā, & proprie sanguineis, & carnosis, est facilis curationis: adultis vero, senibus, tum siccis per naturā, difficilis. Ruptura quoq; recens & parua, & in qua nihil descendit in oscheum, sed tumor solum in inguinibus nuper accidit, facilis est curationis; (vt iam aliquot exemplis bubonocelæ & inguinalis

ostendimus. Antiqua vero herni, & magna, in qua testiculi sunt inflati, atque inguina, difficulter curationem recipit. Aquosa vero subinde tollitur, subinde non, & prænuntiat hydropem ascitem, & in ea sæpe adest; ut alias de hydrope recensuimus, adductis aliquot exemplis. Ventosa vero subinde tympanitem præfagit. Interea aquosa est deterior ventosa, sicut ascites tympanite: nam & in hernia aquosa peccat secunda digestio: ut in ea enim hepatis læditur, & rectificari debet vng. emplastrisq; calidis stypticis, ita stomachus in ventosa. Insuper hernia aquosa valde magna & excedens cum urina pauca, rubea, vel diuersos colores habente, secundum regionem infimam & supremam, mortalis est, iuxta Bertrutium. Gordonius hæc præfagia commemorat: *Omnes rupturæ, facile curantur in principio, maxime vero in pueris. Varicosa difficilis curationis est. De intestinali dico tantum; a qua, ubi adeo fuerit diuturna & antiqua, ut labia vulneris interius indurata fuerint ne conglutinatio fieri possit, nunquam, vidi aliquem curari, nisi chirurgia; & tamen frequenter feci multa. Et licet multa promittamus pauca tamen attendimus. Ideo ubi fuerint labia indurata & callosa, non possunt amplius vere uniri: Cum fuerim ego sedulus inquisitor, & nunquam tamen potui aliquam herniam curare, si ruptura multum processerat, & passio non erat in principio, sed manu chirurgica bene id vidi: multos interea etiam periclitari in manibus Restauratorum; quia perforabant intestina, unde excrementa egrediebantur, & agri moriebantur. A falsis igitur promissionibus cauamus.* Hæc Gord. Crepatura frequentius accidit pueris quo ad relaxationem, iuuenibus frequentius ex violenta tensione; senibus ex humorum superfluitate. Hoc & ego addam, ut experientia hætenus didici, quod potissimum contingat nautis, præcipue piscatoribus, & illis qui in mari, seu Oceano piscantur, eo quod perpetuo sint madidi, & maxime laborent commouendo corpus: quod quidē sciētes Restauratores, pagos maritimos accedunt, cum ibi multos herniosos esse cognoscant. Valefcus idē refert quod & alii, scilicet rupturam atq; relaxationem valde antiquam incurabilem esse, nisi chirurgi experti opere curetur. Recenti vero tam relaxationi quam rupturæ, & in principio facile succurritur. In relaxationis initio apparet in inguine ad modum nucis quædam eminentia: at quia tunc nulla infert noxam, aut aggrauationem, fit, ut fere nullus hoc malum Medico ostendat, vel, si ostendat, velit monita ipsius exsequi, aut tempus curationis expectare, & sic quasi insensibiliter & pederentim augmentatur, donec in veram herniam, aut rupturam, trāseat. Præterea omnis ruptus, aut relaxatus, perfecte consistit semper in periculo, si in tempore sibi non provideat; eo quod intestinum monoculum descendat in oscheum per foramen relaxationis, vel rupturæ; in quo si feces reuoluantur, nunquam, vel raro, retrocedet; & sic moritur æger. Ruptura, seu relaxatio, in tenella ætate, cum cinctura apta, & requie in lecto, cum desiccantibus, facilius curatur, quam in alia ætate; cum adhuc caro augeatur, & membra ætate procedente magis

roborentur. Ramex intestinalis & zirbalis, ex mente Auic. difficulter curantur, licet exigui; aquosus facile, quamuis magnus. At ruptura supra umbilicum mala infert accidentia, licet sit exigua, ac sine dolore in principio: quia illud quod in ea propellitur sunt intestina gracilia, quæ ibidē sunt compressa & coarctata; ideo semper retinetur, & quandoque excrementa euomunt, uti accidit in ileo: hinc symptomata grauissima, uti de exomphalo & ileo diximus. Qui quoq; cacochymum, imbecilemque; vel senem aut gulosum, aut intemperantem, præsumserit per incisionem curare, manifestissime desiderat homicida nūcupari. Interea hernia zirbalis non est tanti periculi sicuti intestinalis, quia non contingit zirbum sicuti intestina fecibus induratis impleri. Iam quoque licet incisione multicurentur, quamplures etiam periclitantur: ideo est dubia & affirmatoria curatio: quia aliquando superuenit spasmus & conuulsio (ut istis diebus, adolescenti Antuerpiano, cui fiebat incisio;) aliquando febris, subinde & fluxus sanguinis: quare plurimi in manibus cursorum (inquit Valefcus) moriuntur. Quamobrem boni, probi, sapientesq; ac pii, & verecundi, timentes infantiam, talem curationem cursoribus relinquent. Id quoq; considerandum, quod scissi vel incisi, a quibus vnus aufertur testiculus, licet in iuuentute generent; in senectute vis eorum generatiua deficit: quia senes cum duobus testiculis modicum habent seminis, multo minus cum vno. Neque hoc omittendum, rupturam cuius descensus est inter pellē & didymum, nisi succurratur a principio intra 15. & 20. dies, post non curari. Et si in hernia aquosa testiculi diu remanent in aqua citrina malæ qualitatis acquisitæ, timendum est de corruptione, vel putrefactione eorum, vel vnus. Et quamuis melioratio cito appareat post oschei apertionem, & aquæ extractionem cum ferro; tamen, nisi aliter provideatur cum correctione malæ intemperiei, & remotione cacochymiae, & frequentibus purgationibus, & debito regimine, cito alia post aqua priorem expullam reuertetur. Atque ipsa, quæ nunc diximus, per exempla sequentia multo lucidiora euadent.

OBSERVATIO XVII.

De Enterocœle admodum periculosa & tandem curata.

Christianus Ioannis Bieselingius, pictor insignis anno 1590. mense Iunio enterocœle grauissima ad desperationem laborabat: intestinum enim in serotum collapsum ad magnitudinem capitis, in locum reduci non poterat, neq; fotu conueniente, nec manu chirurgi, præsentis & collega meo. Æger frigidum sudabat, morte tanquam propinquante, cum vomitu quasi stercoris, ileo succedente. Glans indita dum clyster parabatur, (altero Medico non redeunte) nihil effecit. Clyster autem ita habebat: ℞. rad. alibæmund. rad. liliorum alborum, ana ℥ ij. foliorum mal. uol. mercurialis parietaria, meliloti, chamomilla, ana m. ij. seminis lini ℥ ij. seminis anisi, fœniculi, carui, ana ℥ ij. summi. anethi p. j. fiat decoctio in aqua communi pro ℔ ij. huius colatur. accipe ℔ j. addendo cassi. mund. Zacchari

zaccchari rub. ana ℥ j. benedicta lax. ℥ ℔. elect. hierapi-
 cra ℥ ij. olei amygd. dulc. anethini, chamomill. ana ℥ j.
 vitellum unius oui, salis contriti ℥ j. salis gemma ℥ ℔.
 olei anisi ℥ j. misc. fiat clyster. Cum altera parte de-
 cocti fiebat fotus: & cum secessum haberet post
 clysterem iniectū, hoc cataplasma emolliens im-
 positum fuit: ℞. rad. althæe mund. capitum lilio-
 rum alb. ana ℥ ij. foliorum malua, viol. parietaria, a-
 nam. iij. florum meliloti p. j. coquantur in aqua ad
 mollitudinem. pistentur, addendo farine lini, faba-
 rum, hordei, ana ℥ ℔. olei amygd. dul. & butyri recen-
 tissima q. s. fiat cataplasma molle. Hæc ita profue-
 runt, vt tandem intestinum repositum fuerit per
 chirurgum. Ileo tamen, quo simul laborabat, non
 cessante, & febre satis continua, quæ eundem ap-
 prehenderat, nullo modo mitigata, & cum nisi se-
 mel per clysterem superscriptum, ventrem deie-
 cisset, hunc syrupū propinauimus: ℞. syr. ros. pal-
 lid. ex infus. ℥ j. ℔. aqua acetosa ℥ ij. misc. Tunc venter
 valde cœpit fluere, eratq; materia admodum bi-
 liosa, & simul pituitosa, ac varii coloris, subinde
 nigra, tandē & sanguinolēta, & nō diu post subse-
 quutus est singultus, & de stomacho valde cōque-
 rebatur. At hic nodulus in ceruicia tenui appēsus,
 & expressus dum ceruiciam illam biberet, singultū
 paulo post ademit, & egregie profuit: ℞. seminis
 portulacæ, papauer. albi, ana ℥ j. ℔. seminis lactuca ℥
 ℔. seminis anisi ℔. contusa nodulo includantur. Pro-
 liti & fluxu, qui perseuerabat, capiebat rob. de ribes
 & syrup. cotoneorum, menthaecum, modo de vno, mo-
 do de altero; stomacho quoque inuncto linimen-
 to sequenti: ℞. olei myrtini cotoneorum, ana ℥ ℔. pul-
 corall. rub. ros. rub. ana ℔ j. hypocyf. ℔. cere parum,
 fiat linimentum seu ung. molle. Et fuit istis remediis
 ab Orco quasi in lucem reuocatus.

S C H O L I A.

Curatio. Diximus enterocelen, præsertim si reduci ne-
 queat intestinum, omnium aliarum specie-
 rum esse periculosissimam. Vidi tamen multos
 morti proximos, Dei gratia, per me cum emolli-
 entibus, manu paulatim reducto intestino, resti-
 tutos ac sanatos. Similiter & alios, in quib. reme-
 dia non iuuabant, neque remollientibus intesti-
 num retrocedebat; vt tandem peremti sint, recre-
 mentis induratis per tres, quatuor, vel plures dies:
 quorum exempla etiam antea posita sunt. Ideo
 bonum est, vt præseruentur ægri a tali periculo,
 cum aliqua cautione, seu curatione, vel cum pal-
 liatiuis (vt ita dicam) continuo gestando cinctu-
 ram ex ferro, vel argento pro diuitibus: qualis
 cinctura ex ferro egregie a quodam artifice Ha-
 gano admodum commoda, & huic rei apta para-
 tur. Verum absolutis causis signisque ramicum,
 nunc ad maiore enucleationem accedamus, præ-
 missis tamen quibusdam canonibus vniuersali-
 bus, qui ad communem curationem faciunt, cum
 ordine naturali semper generalia præcedere de-
 beant particularibus, vt recte docuit Galen. 3. apho-
 ris. Commento 6. In primis omnes causæ primi-
 tiuæ, vel antecedentes, vel etiam coniunctæ, a
 quibus ruptura peritonæi, vel didymi relaxatio
 fieri possent, in curatione semper sunt euitandæ

& amouendæ. Deinde omnium ciborum ac potuum
 repletio, satietas præcipue ventosa, & coitus post
 repletionē, aliaq; exercitia enormia, ruptis & re-
 laxatis cū diligētia & terrore sunt euitanda. Simili-
 ter ab omnibus cibis emollientib. oportet, vt re-
 laxati abstineant. Illud q̄ foras exit, vel propellitur,
 intromitti debet leniter & nō violenter, & ne ite-
 rum exeat conseruandum & consolidandū. Dein-
 de nemo p̄sumat ruptum aliquem vel relaxatum
 incidi permittere, nisi per expertum chirurgum,
 illum scilicet quē sæpius viderit dextre id munus
 implere. Hernia quoque nisi antiqua fuerit, sem-
 per prius tentandum, vt commoda victus ratione
 & medicamentis curetur, antequā ferro vtamur.
 Præterea ante incisionem corpus laxante phar-
 maco vel clysteribus perpurgandum. Et maxime
 ver eligendum, vt ad hanc curationem tempus
 magis aptum: tunc enim corpora, teste Aristote-
 le, vires resumunt, & sunt robustiora, vigetque
 bonus sanguis, & boni humores tunc in corpore
 generantur. Chirurgus quoque antequam se ad
 opus præparet, omnia habeat parata ad operatio-
 nem recte perficiendam, vel scamna, manutergia,
 rasaria, vncinum, & alia, quæ ad discarnandum di-
 dymum faciant, setones, acus, cauteria, spongiam,
 aquam calidam, ne fluxus sanguinis operationem
 impediatur, fascias, pannos, oua, puluerem restricti-
 uum, & alia quæcunque. Quod vero ad particula-
 rem curationem attinet, constringenda erit pars
 laxa frigidis & constringentibus, quibus etiam v-
 timur in intestinorum ramice. In vtraque specie
 imperanda est inedia, ne multitudo recremento-
 rum impediatur, quo minus reponi possit aut omē-
 tum aut intestinum. Quod si vacuanda sint recre-
 menta in ramice omēti, iniiciatur clyster. In inte-
 stinorum ramice alius blande sollicitetur. Si vero
 flatus & tormina adsint, inunctiones ex oleo ruta-
 ceo circa vmbilicum erunt ex vsu; & harum loco
 apponendus est sacculus ex milio, cumino, & sale
 paratus. Quod si ob flatus reductioni minime ob-
 temperet intestinum, fotu magis relaxante vten-
 dū erit. Si stercora dura intestino impacta, emol-
 lienda ac educenda cum clysteri emolliente. Cru-
 ribus itaque elatis & diductis intestinum sensim
 reducatur, atq; reductum statim idoneis ligamē-
 tis vel subligaculo retineatur: & super subligacu-
 lum, deterfa prius parte a fomentatione relaxan-
 te, foueatur pars decocto sequenti cum spongia
 noua calidissime & frequenter, potissimum post
 intestini reductionem, donec pars quodammodo
 contrahi videatur. Huic autem decoctioni, si fla-
 tus ventrē & alias partes distendant, addantur fla-
 tus discutientia sine relaxatione. Paretur decoctio
 sic: ℞. rad. bistorta, rad. pentaphyllonis, rubæ maio-
 ris, chelidonia maioris, ana q. s. rad. narcissi q. s. her-
 niaria, polygni, & hippuris, ana m. j. cumini, nastur-
 ti torrefacti, ana ℥ j. florum stæchad. anthos, ana p.
 j. florum rosi, cœnauri minoris, ana p. ij. fiat decoctio
 in aqua & vino astringenti, vel liximo. Post eius au-
 tem vsu admouenda sunt emplastra contra ru-
 pturam, siue de pelle arietina. Sed hæc minime ad-
 ministranda antequam sint reducta intestina. Re-

Particularis
 curatio.

media itaque adhibenda vacuato ventre a stercore & flatu blando clystere & medicamento, inunctiones, sacculi, ligamenta, subligaculū, decocta, emplastra. At hec omnia multo lucidiora fiēt per exempla; tum & curatio particularis vniuscuiusq; speciei multo felicius succedet, iterum sumto initio a bubonocle.

OBSERVATIO X.

De Bubonocle.

1 PVella pulcerrima in leuem bubonoclem inciderat. Cum res adhuc recens esset, & in inguine sinistro eminētia appareret ad modum nucis maioris, cumque aluum non redderet, bolum cassiæ, vt fumeret mandauī, ad vnciam vnam, pauco puluere seminis anisi insperso: deinde, quia intestinum in suum locum facile resiliebat, post alui lenitionē, vt relupina iaceret præcepi, zona zincta bifurcata, vt fieri solet, transeunte per coxam cum scuto bombace repleto, comprimēte eminentiā ne extra prorumperet, prius imposito emplastro de pelle arietina, vel contra rupturam. Interea se quietam contineret mandauī, & in lecto maneret, si posset: sin minus, cū exigua esset eminentia, vt seipsam a cantu, clamore, tripudiis, choreis que custodiret, donec integre curata foret: optima interim victus ratione obseruata, abstinēdo a leguminibus, rapis, castaneis, musto, ceruisia feculenta, & nimis recentis; portans subligaculum ad eiusmodi eminentiā deprimendā aptum. Breui, & sine magno negotio hæc ipsa curata fuit.

S C H O L I A.

2 AD bubonocles curationē ea conferunt, quæ *Curatio bubonocles, seu ramiciis inguinalis.* Aetius scripsit, lib. 14. cap. 23. De inguinali ramice, ita inquit: *Inguinalis ramex ob interioris membranae extensionem factus, in principio adstringentibus epithematibus interdum sanari potest, modo sit exiguus, alioqui magnus & diuturnus, vt postea dicemus, vitione curatur.* Sed illa ad Chirurgiam pertinent: de qua suo loco. Neoterici vero præscribunt, vt Benedictus Veronensis etiam annotauit, dum curatur hernia cauenda esse primū, quæ inflant, qualia sunt legumina, lactaria, acetariaq; poma, fici præsertim & vix recētes. Alii addunt & rapas, ac alia in Obferuatione dicta. Vide de his ad longum Valescum, & Montagnanam in suis Consultationibus, vbi de victus genere & regimine in omnibus herniis fusius tractatur. Maxime vero quies, silentiumq; imperandū, aliudq; tenera esse debet, & fascia eius rei causa sit, cui imo loco pila affuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum inguini subiicitur, deinde reliqua fasciæ pars arcte sub lumbis circumdatur sub sumine, sub qua sæpe & intus compellitur intestinum, donec inter se tunicæ ora agglutinentur. Imponi etiam nūm solent emplastra, cerata, quibus iunctura solidefcit. Constant enim *ex galla immatura, cupressi pilula, ana p. ij. myrrha, cypri, acacia, buris, gummi Arabici, singulorū p. j. vino erita prius coguntur.* Similium copiam inuenies apud omnes auctores: quale illud est emplastrum de pelle arietina, vel contra rupturam; de quibus postea latius. Paulus Aegineta lib. 3. cap. 53. De ra-

*micum generibus, multa componit emplastra conglutinantia, & varia glutinatoria describit, quibus indifferēter vtitur, reductis intestinis, tam ad bubonoclem, quam enteroclem; refertque, pueros, vtpote humidiores, facilioris curationis; tum alios multos, citra manus operam, medicaminibus impositis, & conuenienti ligatura, persanatos esse (vt & hæc nostra puella:) decimo die soluit ligacula, & 30. dies ægros in lecto continet, & exhibet cupressi decoctum cū vino vel eius globulorū tres obolos ex diluta vini potione, & glutinatoria apponit. Ceterum ramicem intestinorum & inguinum ita curamus. Egro resupinato diductis cruribus, intestina sensim reducere, atq; reducta deinceps idoneis ligamentis retinere oportet. At si loca scroto aut inguini adiacētia vehementissimis doloribus cum inflammatione affligantur, torminaq; & flatus superuenerint, atq; adeo intestina minus reductioni obtemperent, emollientia, ac inflammationem doloremque leuantia, & flatus, dissoluentia, *fomenta, linimenta, balnea* adhibeantur: qualia sunt, *quæ ex malua, chamamelo, anetho, seminibus lini, fenugrati, carei, anisi, cumini, & similibus* componuntur. Lana quoque succida, vino & oleo madefacta, loca doloribus exagitata foueantur. Reductis intestinis (*sive extra in inguine propendent, sive in scrotum descenderint*) conandum, vt eadem idoneis vinculis retineantur, impositis primum ceratis aut emplastris constringentibus, ac glutinantibus: quale est hoc, quod habet picis naualis, *masticis, ana ʒij. thuris ʒij. hy-* *5 Ceratum.* *pocist. sarcocolla, cassiæ ana ʒj. ʒ. lapid. hematitis san-* *draconis. aloes ana ʒij. boli Armeni, rad. symphyti, gallarum, malicorū ana ʒij. visci quercini ʒj. ʒ. resina terebinthina & cera quod satis est, gummi prius in aceto aut vino dissolutis, formetur ceratum quod in pelle arietis impositum allgetur, nec ante diem septimum (vt alii, ante decimum) soluatur. Vide alia apud Rondelium. Cum hoc igitur vel aliud emplastrum contra rupturam, vel quod de pelle arietina dicitur, imponuntur. Idoneis vinculis desuper intestina retineantur, & non nisi post septimum diem soluantur. Interea æger in lecto per triginta dies maneat, a cibis flatuosis abstinēs vinoque copiosiore, motuque vehementi, cursu, saltu, clamore & cantu. Bibet quoque decocta, glutinantia, ex *sanicula utraque, solidagine Sarraceni-* *ca, ophioglossa, nummularia prunellæ, plantagin. lanceolata, rad. symphyti maioris, & rad. sigilli Salomonis, aliisque, quæ in vino rubro & aqua decoquenda sunt, & transfusa colo, z accharo condienda, & huius decocti ʒij. vel v. in aurora præbenda.* Hoc toto tempore curationis, si nimio conatu stercora excernantur, simul etiam intestina iterum prolabantur, vtendum iterum; fecibus prius educis, (vt supra,) & intestinis reductis, conuenienti de ligatura, idque tum præcipue, vbi occasio aut necessitas motum exigit. Sed illud & hic meminisse oportet, quod in relaxatione constringentia; in fractura vero, seu ruptura, desiccantia, constringentia, & nervos consolidantia vsurpanda. Verum quia peritonæum est in proprio motu, ob epiga-**

4
Ramiciis in-
testinorū &
inguinum
curatio.

5
Ceratum.

6

*Quæ in ge-
nere relaxa-
tioni, & qua
ruptura con-
ueniant.*

epigastri & musculorum motionem, & adeo tenuis est, ut ruptum adduci non possit; vulneris autem labra nisi adducantur, nunquam id coalescere potest; valde hæc curatio videtur difficilis. Si quis tamen hanc tentare velit, utatur scq. etibus: *℞. rad. bistorta, narcissi ana ℥ j. rad. consolida maioris & minoris, quinquifolii, rubee maioris, ana ℥ ss. hippurid. polygoni, ana m j ss. sebesten num. x. dactylorum paria iij. myrobal. chebul. Indor. curinorum ana ℥ j. seminis anisi, nasturtii. ana ℥ ij. florum rosa. anthos, cypri, ana p. j. fiat decoctio in vino & aqua, & in ℔ ij. dissolue mellis rosa. & zaccchar. ana partes æquales, fiat syrupus. aromatizetur cum ℥ ij. diagalang. Capiat mane reiectis excrementis quinq; horis ante pastum ℥ iij. Ad idem pilulæ illæ de bdellio valent, & ex conchiliis Veneris. Vel fiat opiata sequens, iuxta Rondeletium: *℞. conserve rosa. anti-qua, & symphyti, ana ℥ j. confer. florum salvia, & aco-ri vulgaris colata ana ℥ ss. trochis. de carabe, vel de spodio, vel de bolo ℥ iij. blatta Byzantia usta & lota in aq. cauda equina ℥ ij. cum syr. cydon. Fiat opiata. Capiat ad quantitatem nucis, superbibendo parū vini rubri. Pulveres resiccantes ex corallo rub. usto, vel priapo tauri, vel cerui, præscripti cap. De paralyti apud Rondeletium, sunt efficacissimi. Interea ad maiorem exsiccationem glutinationem, & consolidationem, æger utatur alimentis crassis, viscosis, & constringentibus.**

OBSERVATIO XIX.

De Enterocoele cum ileo gravissimo.

IOachimus, senex septuagenarius, monachus laicus (ut vocant) apud Minoritas Delphenses, herniosus & longo tempore enterocoele laborans, ferreum gestabat instrumentum ad hoc deputatum, intestinum ne in scrotum delaberetur continens, eoque cinctus incedebat. Tamē, tempestate oborta, ex nimio dolore in gravissimum ileon incidit, ut coactus fuerit me vocare. Verum iniecto clystere emolliente (cum & feces duræ essent) & ventositates carminante, aluo soluta, ab omni dolore, & ileo mox liberatus fuit.

SCHOLIA.

AD enterocoelem & epiplocelem multa remedia sunt, tum, quæ per os sumuntur, tum quæ apponuntur. Sed in primis habenda ratio (ut nunc sæpe diximus) ut quod decidit reponatur; quod & in bubonocoele etiam prius obseruandum proposuimus: ubi enim ramex inguinalis esset, si intestinum in inguine foras prodiret leniter imponatur. Ita & in enterocoele, ubi intestinum in scrotum prolapsum est flexuosis torminibus infestantibus protinus enitemur (ut Aetius admonerat lib. 14. c. 23.) declivi iacente ægro intestina sensim ad inguen deducere ac reducta idoneis ligamentis retinere. Si stercora obsint, aliud emollienda erit clysteri, ut iam sæpe recensuimus; & si reduci ob ventositatem vel dolorē non possent, fomentis utemur. Vbi intestina introducta sint, ne rursus æger in pristina incommoda delabatur, præseruandi gratia perpetuis ligamentis utemur. Vide apud eundē egregia emplastra quæ amici intestinali conueniunt, loco iā citato, quale illud est apud ipsum Senioris

emplastrum vocatum; & illud linimentum cuidam adolescenti intestinale ramicem patienti appositum; & alia quamplurima, ex Oribasio & aliis autoribus, eod. cap. descripta. Eodem modo in epiplocele omentum si excidat, quemadmodum intestinum, in scrotum, omnibus modis & ingeniis iam dictis in locum proprium reducendum est. Accidit enim aliquando tanta apertura, quod intestina, vel omentum, ita inferius prolabantur, ut neq; æger, neq; assistens, diligenti conatu in proprium situm repellere possint, dolore ingenti superueniente, per 12. horas, modo per diē naturalem, aliquando per duos dies, & plures, ut in mortē quasi ruat: quemadmodum sæpe vidi in principio rupturæ, intestino, vel omento, in scrotum reuoluto; imo etiam aliquando in processu. Tunc conueniunt sacculi ex semine lini, maluæ, bull. in aqua calida appositi, ut in locum reuertantur; ac æger resupinetur, ut dictum est, ut ita intestina in locum suū reponantur, coxis subleuando, capite depresso, cruribusque eleuatis; iisq; impositis, subligacula adhibeantur, insuper ceratum, seu emplastrum de pelle arietina, descriptum a Ioanne Matthæo de Gradi, Consilio de ruptura siphach; & consolidantibus, de quibus iam sæpe dictum est, epotis. Quæ equidem duabus subsequenti. Observationibus multo clariora euadent.

OBSERVATIO XX.

De Enterocoele curata.

VERILIS apud nos ludus est, quo Bacchanalibus aliquot pueri, cupæ singuli insidentes, dependentibus utrinq; pedibus, cupaque ab aliis fune longiore protracta, inter se decertant, quæ eorum incitato illo tractu cupæ impetu galli inuicem pedali caput detrahat. Qui id præstiterit, Rex inter eos dicitur. Verum hoc modo teneriores in rupturam seu enterocoelem facile incidunt. Sic fratri meo carissimo Ioan. Foresto, tredecim annos nato, anno 1556. Alemariæ ludenti, intestinum in scrotum descendit. Hic tamen, ne a patre meo carissimo obiurgaretur, illi persuadebat, hoc malum contractum ex cantu in Choro, in quo pueri cantare solebant. Cum autem hæc ruptura recens esset, & eum curare instituissemus, patrem in primis rogauimus, ne amplius Chorum accederet, aut alta voce caneret, quod cum pater libenter illi concessisset, plurimum lætabatur, ab hoc iugo se liberatum. Curam igitur aggrediendo tres mihi præcipuas curandi intentiones ob oculos posui: primam, ut reduceremus intestinum in locum suum: secundam, ut intestinum reductum in situ suo conuenienti retineremus: tertiam, ut consolidaremus id, quod ruptum erat. Primo itaque, cum recens malum esset, intestinum collapsum in scrotum facile, eo ipso resupinato, diductis cruribus, sensim cum manu, absque villo medicamento, in locum suum reclusum est: ut neq; opus fuerit fomentis aut emplastris emollientibus, & ventositatem, quæ id aliquando impedire solent resoluentibus. Reposito intestino, ad secundam intentionem progressi, illud retinuimus cum ligatura debita, cum subligaculis, braccalibus, ut ita dicam, iniectis, pila etiam adiecta & insuta, locum

comprimente, ne intestinum iterum descenderet. Sæpius enim ad retinendū & consolidandum sola ligatura profuit & satisfecit, maxime in infantibus, qui habent vim restauratiuam vigentem, & in eis nō difficulter fit talis consolidatio. Loculamenta, seu subligacula, non amouimus ante nonū diem, fratre perpetuo in dorsum iacēte, & quiete in lecto per totum tempus curationis permanente. Tunc illud Auenzariis lib. 24. *Thesis*, de iuvene quodam scriptum, mihi in mētem venit, qui hoc malo laborabat, decubuitq; duobus mensibus in dorso suo, & cum bono regimine, sine medicinarum applicatione liberatus est. Vide *Consilium Joannis Matthæi de Gradi, De ruptura siphach*. in quo ponuntur singularissima remedia. Nos tamē ad tertiam intentionem, nēpe consolidandi, peruenimus, vsuali emplastro imposito cōtra rupturam, loculamēto etiam iniecto; præscriptis etiam potionibus consolidantibus, post debitam tamen ventris solutionē; *cassia scilicet recenter tracta uncia una, cum pulueris seminis anisi ℥ j. deuoratis*. Hoc vero decoctum consolidans, constringens, & incarnans, bis aut ter in die ad ℥ iiii. sumebat: *℥ rad consolidæ maioris, rad. sigilli Salomonis, ana ℥ ℔. sancicula utriusque, nepita, valeriana, plantaginis maioris, absinthii Romani, consolidæ minoris, ana m. j. sanguinaria* (scilicet illius herbæ, quæ sanguinis instar emittit, si teratur) *m. ℔ seminis anisi ℥ j. ℔. fiat decoctio in ceruisia communi q. s. pro ℔ j. ℔. & dulcoretur zacib.* Eadem aliquando decoquebam in vino rubro Gallico, styptico, tenui, cum aqua communi. Atque hæc decocta per aliquod tempus continuando, vtens bona victus ratione, vitans omnia infantia, legumina, rapas, tum alia, de quibus in præcedentibus diximus, egregie, Dei benignitate, qui regnat in perpetuum, sanus euasit, neque vnquam hoc malo reuerso, postea vxorem ducens, ætate progressa numerosam prolem ex ea se stulit. Multos & ego alios his vel similibus remediis perfecte curauī.

S C H O L I A.

D Vobis scopis, iuxta Leonellum præcipuis, seu intentionibus *Hernia intestinalis & zirbosa* curantur. Primo cum medicaminibus pharmaceuticis; secūdo cū operatione manuali. Prima vero intentio rursus trib. absoluitur scopis: principaliter cū euacuatione; secundo, introductione intestini, vel zirbi, in ventrē; tertio cum claudentib. foramen per quod exit intestinum vel zirbus. Quātum ad primum, perficitur euacuatione humorum aliquando pituitosorum, si adsint, vel etiam excrementorum in intestinis existentium & ventositarum, antequam intestina, vel zirbus, in locum suum reducātur. Atq; hæc euacuatio fit, vel per superiora sumēdo per os; vel per inferiora clysteri leniente, cui addatur aliquid quod pituitam in intestinis hærentem educat; vt hoc modo: *℥ decoct. communis ℔ j. in qua bullierint rad. althææ m. j. in ea dissolue Zacchari rubei ℥ j. ℔. mellis ros. colati, cassia ana ℥ j. herapicra ℥ vj. olei chamom. vel communis, ℥ ij. salis communis ℥ ij. fiat. clyster euacuans*. Si in intestinis sint feces, hoc leniente vten-

dum: *℥ malua, beta, foliorum malua, rad. althææ ana m. j. bulliant in s. q. aquæ ad consumpt. medietatis, coletur, colat. accipe ℔ j. vel ℔ j. ℔. in qua dissol. Zaccharo rub. ℥ ij. cassia ℥ j. olei communis ℥ ij. salis communis ℥ ij. fiat clyster leniens*. Quod ad secundam intentionem medicamentalem, videndum an intestinum fecibus sit repletum, aut ventositate, vt intestina, vel zirbus, immitti non possint: feces hic emolliendæ, vt oleo communi cum peciis calefactis, vel aliis iam dictis, tam diu impositis, donec feces mollescentur: iisque remollitis, tentandum per chirurgum, vt leniter impellatur intestinum, & non simul, sed pederentim, & per intervalia. Si ventositas sit impedimento, fatus fiant hoc modo: *℥. florum chamomill. meliori, anethi, parietaria, ana m. j. semin. lini scænuigr. ana ℥ ℔. bulliant in s. q. aquæ: fiat fatus cum spongia; & post fomentationem, oleo chamom. & liliaceo fiat inunctio, & intromittatur quantum fieri potest*. Tertium restat, formam claudere post introductionem. Præstabit hoc consolidantia & restringentia per fatus hoc modo: *℥. florum ros. rub. myrtill. sumachii, hy pocist. gallarum, nucum cupressi & foliorum eius, ana m. j. vel ℔. rad. consolidæ maioris & minoris, herba hyperici, arithritica, ana m. ℔. contundantur crasso modo, & bulliant in aqua plantaginis & vino rub. styptico aqualib. par. cum quarta parte aceti, ad consumptionem medietatis; & spongia quater quinquies vefoueat, & locus postea exsiccatus inungatur hoc vnguento: *℥ olei hyperici, abietini, olei omphacini, myrtini ana ℥ ℔. corticum thuris, mastichis, masticorii, mumia, bou arm. sang. drac. sarcocolla ana ℔ j. puluerisanda pulueriscentur; & cum prædictis oleis & exiguo cera fiat unctio, qua inungatur locus*. Vel hoc emplastrum applicetur consolidans: *℥. thuris masculi, sarcocolla, aloes succotrina, mumia, aristoloch. rotunda, longa, consolidæ maioris, nucum cypressi, psidia, verumum terrest. ana ℥ ij. alias ℥ j. litharg. opopanacis, bdellii ammoniaci, galbani, mastichis, cerebinth. ana ℥ j. sang. humani ℥ j. glutinis piscium, visci quercini ℥ vj. alias ℥ ij. pellis arietina ℥ ℔. depilate in aceto; & in aqua pluuia decoct. vsq; ad liquefactionem; dissoluantur gummi in aceto; puluerisanda pulueriscentur; & in glutinibus liquefactis fiat emplastrum proruptura*. Eadem fere habent Ioannes Arculanus supra Rhafem, & Valescus, & Montagnana in suis Consiliis. Qui vnum videt, videt omnes. Si hæc non iuuant, perueniunt ad chirurgiam, quæ erat secunda intentio principalis; de qua postea.*

OBSERVATIO XXI.

In qua agitur de Enterocoele, per modum Consultationis.

T Heodorus Teylingius, sororius meus, quæstor Domini de Egmont, vir quinquagenarius, cum stagnum illud Bergense prope Alcmariam, vt fundus fieret, aggere cingeretur, ocreis licet indutus terram illam, limosam & aquosam transiens frequenter, pedibus in luto ita hærentibus, vt eos vix attrahere posset, inde in herniam intestinale incidit. Ruptura prius in inguine ad oui magnitudinē apparebat; at postea intestinum in scro-

Clyster leniens & euacuans.

Intestini zirbi intromissio.

Consolidatio.

Potus consolidans.

Unctio consolidans.

Emplastrum consolidans.

in scrotum delapsum, incrementū, suscipit. Cum litteris, quāquam lingua Germanica scriptis, a me consultationem peteret, ego Consultationē lingua Latina hanc ipsam scripsi. Ramex huicerat intestinalis & oschealis, peritonæo perrupto, intestinoque in scrotum dilapso: sed in homine quinquagenario, debili & delicato, ferrum adhiberi non debebat. Primo igitur consulo, ubi forte exciderit, doctum chirurgum vocabis, ut suauissime, quantum fieri possit, & commodissime manu in locum reponat, subligaculis semper iniectis retinendo. Ad hoc enim fiani fascia, seu loculamenta scroti, ex panniculis ita compacte, ut solida sint. Possunt quoque fieri ex ligno, ferro, aut aliqua solidiore materia: sed ita, ut interiori parte, qua scrotum contingant & inguina, molliori corpore inducantur (scribit Gatunaria, suo tempore Ferrariensem fuisse quendam in Italia, in sancto Joanne in Castro, qui eiusmodi subligacula ferrea componebat optimi & magni iuuamenti, nunc apud Haganos est quidam artifex, qui eiusmodi ferreas cincturas parat, quæ ita clauduntur, ut sine molestia continuo portentur, ne intestina exeant aut relabantur, vidimus nos istas cincturas polite fabricatas: suntque iam apud D. Iphenses, tum apud Haganos in v. s.) Interea in egerendo manum apprimas pubi & scroto, ne quid recidat. Cum igitur hoc malum tuum diu durauerit, ut scribis, ideo perfectam curam: qua fit manu chirurgica, seu ferro, hic in te tentare non audeam: & ideo tutius ad alia me conferrem remedia: qua si forte non tollant malum, eo quod ruptura sit satis antiqua, licet in primo senio te adhuc existente, silem augeri prohibebunt, eritque cura palliativa, imo talis præseruatio, ut & consueta negotia transigere possis, & non in deterius malum procedat. Interim postquam intestinum in locum fuerit repositum, & per fascias aut alias cincturas, in loco suo retentum: omnium primo curabis, ut perpetuo te abdicēs, quantum potes ab aere frigido, & quavis frigiditate circa partes illas affectas, & quavis alias corporis, potissimum a frigore pedum. Propterea cuitabis nives & pluias tempestuosas, imbres & quavis tempestates, ac ventos enormiter spirantes, & quæcunque vel caput, vel alias corporis partes humectare & refrigerare possent. Cauebis quoque a quouis valido motu, & ab exercitiis validioribus, maxime repleto corpore, a veltatione equorum duriter gradientium, & ab ephippio angustiore ac duriore, a stapedis longius productis. Quin omnibus modis non equitabis, nisi necessitate coactus: idque non nisi equo paulatim prodiente, & molliter incedente: nec hoc post cibum aut potum præsertim affluentius sumta. Si fieri possit, nauigio aut curru iter instituire præstiterit. Abstinebis a coitu vehementiore, aut intenso: neque ullo modo fiat post crapulam satietatem, aut repletionem, ventre pleno aut distinto. Sobrietas hic plurimum potest. Cauebis similiter a retentione anhelitus, a celeri cursa: montes arenosos subito ascendere vel descendere, aut venatione intus esse noli. Neque stando scribas, sed sedendo; omnibusque modis quietem amplectare. Caueas quoque, a nimia ventris compressione, sitque alius mollior: si resistat, glā de soluat, prunisq; ac malis coctis vitior, tum ut, quæ alium lubricam reddant. Absit clamor,

cantus, vociferatio, & quavis occasio tussis inferenda & sternutationis magna Effugies autem, tanquam pestem, computationes & comestationes: nam taliter affecti (ut omnes auctores referunt) debent esse parci victus. Bis ergo tantum de die comedas, in prandio & cæna, & tantum eo tempore bibas, minime vero post prandium aut cænam. Cibaria quoque, sint simplicia, unius generis, minime flatuosa, sed boni nutrimenti, & concoctus facilia, & tenuium partium. Pessima sunt omnia lacticia, pisces, legumina, & oleum usus frequens allia cape, rapa, pastinaca, & quavis in sartagine frixa, castanea, vina dulcia crassa, noua, quale mustum est. Abstinebis similiter a fructibus horariis præcipue autem uuis & pomis cuiuscunque generis crudis. Coctis quidem vel assatis licebit viti, si venter non respondeat, adiecto fœniculi semine. Interea operam dabis ut saltem semel in die aluum deponas: sin minus glande laxes ut dictum est, vel cum ℞. pilul. aloes hora una ante cænam: vel cum terebinthina ℞. j. sumta tribus horis ante prandium. Vel pilulas de hiera ter quaterve in mense, si alius paulo strictior sit, adponas ℞. j. hora una ante cænam sumito Descriptio autem pilularum talis sit: ℞. cinamomi croci cub. bar. mastichis asari spica, ana ℞. ij. aloes optima ℞. j. pulueris entur per se, &c. Quod ad localia medicamenta attinet, intestino reducto hoc modo, ut diximus, emplastroque contra rupturam, vel de pelle arietina, imposito fascia aut subligaculis iniectis diligenter custodiendum, ne iterum in scrotum relabatur, & non mutetur emplastrum, nisi intra decem vel plures dies. Quod si rursum contingat intestinum ad scrotum descendere, videndum nunquid adsit quod reductionem impediat, hoc ipsum statim & primo auferendum: siue quod in scroto refrigeratum fuerit, aut excrementa in eo indurata, vel flatibus distentum sit: ex quibus hillico non succuratur, dolor subsequi solet, deinde febris, postea & inflammatio, colicus item, vel potius iliacus affectus, tandem & mors. Quæ vero refrigerata sunt, anodinis moderate calfacienda: stercora indurata emollienda clysteribus lenibus, & educenda: flatus dissipandi: febris, tum alia symptomata, mitiganda: & dolori fotibus ac anodinis resistendum & occurrendum. Ubi itaq; manu vel leui compressione sedatis symptomatis, intestinum retrocesserit, hoc sequenti linimento locus ruptus inungi poterit: ℞. olei onorum, myrtini, ana ℞. j. olei hyperici mastichis spica ana ℞. j. misce. Ante inunctionem licebit uti hoc fomento: ℞. rad. sigilli Maria, bistorta, cauda equina, consolida maioris, pentaphyllonis tormentilla ana ℞. j. folior. verbasci, bistorta, cauda equina pilosella centaurii minoris tacea nigra, ana m. j. florum, ros. anthos, stæchad. anap. j. cumini, nasturtii seminis torrefacti, ana ℞. j. semin. nigella ℞. j. coquantur in aqua & vino rubeo astringente, & cum spongia foveatur locus ruptus calidissime: deinde ungatur oleis iam dictis, & hoc emplastrum apponatur: ℞. mastichis, sarcocolla sang. draconis, blatta byzantina, cort. thuris, aloes, boli Armen. gypsi gallar. psid. ana ℞. ij. ichthyocolla & tanrocolla dissolut. in aceto ℞. ij. malaxentur, & fiat amplastrum. Vel addendo picis derafa a nauibus ℞. y. colophonæ ℞. j. malaxentur cum oleo cydon. & reuocantur ad formam cerati. Vel

excipiantur decocto pellis arietina, vel bullata. Vel fiat decoctio ex fragmentis pellium pradietarum, vel pergameni. Colae enim satis faciunt, & eorum decoctum pradieto magis siccatur. Sunt qui magnetem his ceratis admiscunt, ut limaturam chalybis denotandam dant, ut sic a magnete chalybs trahatur, & per consequens intestina. Verum illa Rondeletio parum prodesse videtur, nisi quid inuenit siccando, si assumantur, vel premendo partem, ob pondus. Sic enim parte depressa intestinum descendens, nec in altum nec foras prorumpere potest. Vel apponatur ceratum de pelle arietina vulgare, a pharmacopaeis confectum. Mox supponatur ligatura iam dicta, ab artifice composita, ut firmissime adstringat; ita tamen ut nullum excitet dolorem, sique leuissima & mollissima tactu, quantum fieri potest; eamque die ac nocte affixam loco tenetis, neque solues subligacula ante nonem dies. Quidam (ut doctissimus Montanus) in bent singulis quibusque quindecim diebus, aut saltem tribus septimanis, ceratum innovare. Haec sunt, quae ad praecutionem & possibilem curam mihi prestare videntur. Quibus & alia addunt potiones consolidantes; quae potius in vere conveniunt, quam nunc in hyeme: potius etiam in adolescentibus, & magis in pueris, prosunt, quam in senibus. Attamen si libet eisdem uti ineunte vere, poterunt parari ex rad. symphyti, sigilli Mariae Salomonis, bruci tormentilla, foliis bursae pastoris, polygoni, & pyrolae, saniculae perfoliatae, consolidae sarracenicae, decoctis in vino rubeo & aqua, & colatura saccharo adiecto ad saporem. Egregie hic valet radix hirundinaria seu vincetoxici, cuius sola fomentatione emplastratione, & balneatione puer undevigenerius curatus fuit. Idem remedium valet contra proidentiam hysterae omphali, & etiam ani. Vale carissime frater. Delphis 5. Decemb. an. 1565.

Petrus Forestus Medicus, tuusque sororius ita sentiebat.

SCHOLIA.

Quomodo bubonocoele, ac enterocoele, & epiplocele, curentur, iam satis dictum est. Verum si istis remediis herniae non curentur, vacuato scilicet ventre a stercore & flatu. Blandis clysteribus, aut medicamentis, inunctionibus, sacculis, ligamentis, subligaculis, decoctionibus potionibusque consolidantibus, emplastris ac ceratis: tunc ad extremum remedium perueniendum erit, quod ferro fit; atque hoc diuersis modis. Alii aperiunt ventrem ad intestina, ut dissito retrahatur intestinum. Id fit supra ilia, via ad vasa spermatica, quae proinde separantur, & peritonaei locus constringitur, non colligatur, ne impediatur generatio. Periculosum certe remedium & saepe frustra tentatum; ex quo gangraena oritur, & mors, ut saepe comperitum est. Alii sectionem faciunt ad ilia, ubi alligant productionem illam peritonaei simul cum vasis spermaticis; deinde curant vulnus, callo illic obducto. Alii id faciunt puncto vocato aureo in ilibus, quae permeant vasa spermatica, ac ducta, & exceptis vinculo vasis illis & vicinis corporibus. Experimentum fit contrectato & deorsum tracto testiculo, ut intelligas an sit vas spermaticum. Et certe si quis vasis illis non ligatis constringere pos-

set peritonaeum, neque testiculus excidendus esset, neque impediretur generatio. De his vide Celsum lib. 7. cap. 19. de testiculorum curationibus communibus, & primo de incisione & curatione inguinis, vel scroti. Et si omnes veteres intestinorum ramicis incisio inguine (ut etiam notat Ronsaus vir doctissimus, & noster amicus, in eundem locum Celsi) curationem moliti sint: Paulus tamen suo auctore, magis probatam dicit eam, quae per vstionem fit; quam & ipse Aetius commendat, uti videre licet libro 14. cap. 23. Nam tutissima, inquit, curatio herniarum, chirurgia & vstione perficitur, si peritus artifex contingat: tutior tamen ipsa chirurgia est vstio. Quomodo vero intestinorum ramex curetur, vide ad longum Paulum Aeginetam lib. 6. cap. 65. & cap. 20. lib. 7. apud Celsum, De intestini curatione. Aegineta eum tantum, qui ex intensione oritur intestinorum ramicem chirurgia curandum dicit. Alexander Benedictus Veronensis lib. 24. cap. 36. a se primum proditum curandi citra ferramentum alium modum describit: qui etsi manum chirurgicam omnino desiderare videatur, vnica tamen punctione constat, & nec sanguinis profluvium, neque ullam inflammationem comitem habet: eam curationem non solum in intestini, sed & in omenti ramice vtilissimam dicit. Alii Medici (ut Hernia fecatur non sine periculo. 10) idem inquit Benedictus Veronensis) magna plaga nouacula aperiunt, nec id sine summo periculo fieri potest; nam dolores ingentes mouet, ac inflammationes, non sine venarum profluvio. Quomodo autem inguinum ramex, seu bubonocoele curetur chirurgia, vide Aeginetam lib. 6. capit. 66. At Celsus lib. citato, cap. 24. non solum a testiculis temperandum vult, sed & a peritonaeo, quod id incisum magnum ad modum periculum adferat. Sed de omenti curatione chirurgica, vide eundem Celsum lib. citato, cap. 21. Amatus centur. 2. curat. 71. De enterocoele curatione pueros aliquot, sectione inguinis facta, & per eam testiculo didymo dicto extracto, & forcipibus in epididymo perciso, & candentibus ferramentis optime exusto meatu, & porcina pinguedine obtretrato, lineo filo tamē primo infima in parte ligato, sanitati se restitutos affirmat. Benedicti tamen Veronensis operatio magis placet, quam ad longum loco citato lector perlegere poterit. Nam & doctissimus ille Jacobus Sylvius Medicus in suo Gatinaria, quae libellum publice praelegit, maxime timet castrationem; additque: Exactum huius curandi modum describere minime grauarer, ni putarem id superfluum esse: quum nullus eum, ut in opus mittat, ex libris solis assequi poterit. Quod si quis ex lectione tantum opus hoc aggredi conabitur, is certe non minus quam ex commentariolo nauta dicendus esset. Oportet igitur ut Medicus, iuxta Galeni praecepta, post methodum vniuersalem curatoriam, in particularibus se exercent. Quicquid sit, tamen iste modus, qui fit sine castratione, merito praefendus est. Sed quia auctores tam veteres quam recetiores innumeri diuersos modos describunt, sat est, nos loca ostendisse; quamuis haec ipsa ex visu potius, ac longo usu, & certa experientia, quam ex libris, discenda sint.

OBSERVATIO XXII.

De Epiplocele, seu Ramice omenti.

Quidam omenti ramice laborans me consilii causa accessit: Iussi ut spiritum retineret; eo-que retento, non magnopere increfcebat, tactu vero inæqualis erat, mollis ac lubricus. Ex quibus signis cognoui, quod erat epiplocele, seu hernia zirbosa, *ut barbari vocant*. Quemadmodum enim dicebat Celsus, si descendit omentum, nunquam in scroto tumor tollitur, siue inedia adsit, siue corpus huc illucve conuersum, aut aliquo modo collocatum. Hæc cum adessent, difficilem curationem dixi, quod maximam partem scroti occupasset. Difficilime enim curatur: nam vix reperiri potest, ob tenuitatem, & molliem, omentum (*ut alias diximus*) & cedit impellenti, si reducat. Hic ante me consilio chirurgi usus fuerat, qui non poterat omentum in locum suum deponere. Iam quia eodem modo curatur, ut ramex intestinorum, *Leonello teste*, cum aluum semper strictiorem haberet, consului, ut aliis quotidie blande sollicitaretur cum lenituo medicamento nostræ descriptionis, quo uti soleo in iis, quibus excrementa facile indurantur. Quare huic consulimus temperantiam, & inediam, quantum fieri posset, ne multitudo recrementorum impediret, quo minus reponi posset omentum. Et ideo si vacuanda aliquando forent recrementa, id clysteribus fieret, cum clysteres præcipue in ramice omenti conueniant. Quibus peractis, consului, ut peritum chirurgum rursus adiret, ut sic in locum deponeretur, mox subligaculis & aliis remediis aptis vteretur. Obseru. præced. descriptis. Iis si non curaretur, ad chirurgiam procederet.

SCHOLIA.

A Vicenna, eiusque sequaces, sub vno capite tractant de curatione herniæ intestinalis, & zirbi, seu omenti; *ut videre licet lib. 3. sen. 22. cap. 5.* Rondeletius quoque eadem remedia scribit valere ramici omenti ac intestinorum, *cap. 78. De herniis*. Idem quoque facit Leonellus, cum scribat, curam herniæ zirbosæ & intestinalis perfici, primo cum medicinis pharmaceuticis, secundo cum operatione manuali: & quomodo istæ intentiones curandi perficiantur, *Scholio Observationum 20. ad longum recensimus*, ut non opus sit eadem repetere. Quomodo vero ramex omenti curetur per chirurgiam, docet Cornelius Celsus *lib. 7. cap. 21. De omenti curatione*. Nunc ad alia exempla progrediamur, & ad reliquas hernias, oscheales dictas. Barbari ita appellant, quod in Græce dicto, id est, in scroto fiant. Cum enim scrotum tumet (*inquit Alexander Benedictus Veronesis*) quod a Græcis vocari diximus in Anatomia, communi nomine *Herniam* vocant, ac indecorum.

OBSERVATIO XXIII.

De Hernia carnosâ, Græcis Sarcocèle dictâ.

Theodorus chirurgus Egmondanus, anno 1557. quinquagenarius, hernia carnosâ laborans, me accessit consilii causa, ut ab ea curaretur. Huic cum chirurgus esset, triplicem curandi viam,

ab auctoribus peritis & chirurgis descriptam, proposuimus, iuxta communem modum. Primo videntur percussiuus medicamentis; secundo emollientibus: quibus si non curaretur, tertiam addunt, operationem manualementem. Ceterum cum ipsi adesset insignis durities, & malum diu durasset, principium proinde iam dudum præterisset, solis repercutientibus vti non ausi fuimus, quin adderemus aliqua emollientia, ut hoc emplastrum, quod calide scroto applicaret: *℞ rad. althæe mundat. ʒ ij. flor. meliloti, absinthii, ros. rub. flor. chamomillæ, ana m. j. ℞. coquantur in vino rubeo styptico ad maiorem roborationem*: istis decoctis & contusis adde farina fabarum p. j. farina sænugraci ʒ iij. pul. cumini preparati ʒ ij. baccarum lauri contusarum ʒ j. ℞. seminis coriandri preparati & contusi in puluerem ʒ ℞. cum oleo myrtino, ros. liliorum, ana q. s. adiecto aceti modico, fiat emplastrum, & apponatur, prius corpore repurgato. Hic autem, ut quinquagenarius, timebat ferrum. Quamuis ego libere dicebam cum hæc hernia carnosâ diu durasset, & ad statum magno incremento peruenisset, difficulter esse curandam. Ideo fausi, ut chirurgum in hac re peritum accederet, neque volui me huic curationi intromittere; *iuxta illud Montagnana Consilium 227. De hernia carnosâ, rubr. 4. qui ita scribit*: Cum autem hac agritudo pertransierit tempus primæ partis augmenti vniuersalis, valde difficilis redditur eius curatio; & proprie quando peruenit usque ad medium status inclusiue: tunc ergo propter mirabile eius augmentum tantum debilitata est virtus, & non potest regere medicinas locales sufficienter exsiccatiuas. Etiam percussiuæ medicina hoc tempore non sunt necessaria: eo, quod materia tota fluxit, & agritudo iam transierit ad augmentum, imo plurimum aucta. Huic etiam malo parum aut nihil conferunt medicina digestiua & euacuatiua, propter prædictas causas: quare localibus medicinis non oportet insistere; quia non conferunt etiam solum calefaciendo, resoluendo, & exsiccando: imo oportet eas esse causticas, raro & paulatim applicatas, ut successiue disponant magnificatas partes, oschei. Ego ita legendum existimarem, *ut successiue, seu, pederentim, diminuat partes auctas oschei*. Mox ait: Ego enim diu laborauimus alternatiuis prædictis in hac agritudine in Ioanne fratre Antonii apothecarii ab Angelo: secundo in nobili viro Fantino Bragandino: tertio in Paulo de Rustica. Cuiuslibet horum herniam carnosâ transcenderat: quasi quantitatem humani capitis. Vana itaque fuerunt instrumenta omnia, nihilque vtrisque horum usque ad hanc diem curam perfecit, secundum hunc modum. Igitur præmissis vniuersalibus euacuationibus & particularibus materiæ, quæ poterant fluere ad particulam affectam, applicui hoc percussiuum in inguinibus, & circumstantibus partibus superioribus oschei: *℞ boli armenæ ʒ ij. terræ sigillat. amydi, ana ʒ j. farina volatilis molendini ʒ j. ℞. sandarachæ, mastichis, ana ʒ ij. cum succo rosaceo fiat linimentum in mortario plumbeo, cum pistello plumbeo, & apponatur omni die bis*. Post hoc sequens adhibui: *℞ saponis nigri ʒ ij. auripigmenti ʒ j. ℞. sulphuris viui ʒ ℞. calchanthi combusti ʒ j. ℞. Incorporentur omnia in mortario*

4 cum aqua salis ammoniaci. Hoc igitur cauterium applicetur inferiori parti oschei, ut escheram faciat amplitudinis unius ducati, & non dimittatur ultra horam, ne fiat eschara profunda pertingens ad vasa inuoluta, vel ad venas & arterias ibidem existentes: periculum enim essent spasmi, aut immoderata hemorrhagia superuenientium. Cum autem facta fuerit eschara, procedatur ad mollificationem cum axungia & butyro recentibus, usque ad casum eius. Postquam deposita fuerit eschara, procedatur ad curationem cum applicatione unguenti Veneris, dicti Apostolici, descripti ab Auicenna. s. cano. summa 1. tract. De unguent. Hoc enim eliquat & consumit carnes convenienter. Deinde applicetur causticum predictum superioribus, intermediis, & lateralibus partibus oschei; in tantum, quod in oscheo fiant sex vel octo rupturae in diuersis locis, ut convenienter possint applicari medicamina consumitua secundum omnem differentiam positionis loci; omni tamen tertia aut quarta die semel liniendo partes ulceratas cum aqua secundi capitelli. Vbi per hac videris consumitam esse carnositatem, quod apparet ex reductione oschei ad pristinam magnitudinem (quod non sit in spatio breviori unius aut modici anni) tunc procede cum consolidantibus: quorum magna copia ab auctoribus hinc inde perlegitur. Sis tamen in hac dispositione curanda solers & attentus. Ego enim, propter multitudinem & fortitudinem accidentium concomitantium hanc dispositionem, disposui deinceps hanc aegritudinem non pertractare; unde multos, qui peruenierant ad me renuntiavi, & laborem fugiens, & praeiudicium paruitatem. Haec tamen Montagnana, cuius, quamuis barbare scripta, non puduit neque piguit eadem hic inferere verba; non ita curiosus sum, ut quidam, qui dedignantur practicos barbaros & indoctos (quanquam in re ipsa insignes, & egregie in artis operibus exercitati sint) perlegere. Non equidem eloquentia, ut Celsus ille, alioqui eloquentissimus, dicebat: sed peritia curantur aegri. Qui equidem eadem sentit lib. 7. cap. 22. de carne, quae inter tunicas testicularum concreuit, & de nervo indurato. Caro quoque (inquit) si quando inter tunicas concreuit, nihil dubii est, quin eximenda sit; sed id ipso in scroto inciso fieri commodius est. At si nervus induruit, curari res neque manu, neque medicamento potest. Urgent enim febres ardentes, & aut virides aut nigri vomitus: praeter hac ingens sitis, & lingua asperitudo, fereque a die tertio spumans bilis alio cum rosione redditur. Atque neque assumi facile cibus, neque contineri potest: neque multo post extremae partes frigescent, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur; deinde in fronte frigidus sudor, eumque mors sequitur. Propterea Ronsaeus, noster amicus, hunc locum interpretatus ait: Suadent propterea alii, ut ramicem hunc ceu deploratum, ac desperatam salutis, omnino relinquamus prognosticis, ac repudiemus.

S C H O L I A.

6
Causa hernia
carnosa.

Quamquam causas & signa sarcocèles, seu herniae carnosae aliquo modo attingimus Scholio Observat. 12. huius libri, sciendum tamen praeter fluxionem ad oscheum, aliquando ex sanguine vinctuoso fieri in homine temperata complexio-

ne & sanguinea existente, virtute nutritiva magnam partem sanguinis transmutante, & coagulante in carnositatem. Nam & caliditas testium, attrahendo, apponendo, & uniendo sanguinem, est causa augmenti huius carnosae molis: quae quidem aucta membrum debilitans, per consequens generat carnositatem illaudabilem & superfluum, quae licet ab initio generationis fuerat commoda & utilis. Ad hoc tanquam causae externae iuvant omnes cibi sanguinem procreantes, uti vitella ovorum, iura pinguis, vinum dulce, dactyli, zacharum, & omnia, quae valde nutriunt, & quaecunque ex his condiuntur. Fiunt quoque, ut iam diximus antea, ex fluxione, aut ictu, compressione, & imperita post ramicis succisionem curatione. Sic Doctor ille Hugho Nieuenius, Medicus Haghanus, cum antea in Burgundia habitans, Medicinamque ibidem faciens, frequenter equitaret, ad nobiles evocatus, ex ephippii duritie & crebra equitatione, ut postea nobis retulit, in herniam carnosam incidit; a qua, ubi per multos annos, dum etiam per aliquot annos in Hagha Comitum Medicinam faceret, durasset, tandem senex per incisionem egregie liberatus fuit, opera Guilelmi de Dalen lithotomi Delphensis, qui mecum una in diuersis curationibus fidus Achates fuit, quantum ad chirurgiam attinebat, prout & saepius ante eius meminimus. Signa iam ex parte quoque recensuimus Scholio Observat. 15. huius libri. Praeter illa signa, carnositas cognoscitur per absentiam doloris in loco, per caliditatem, licet tamen remissam, respectu eius, quae percipitur in carnositate laudabili, per ruborem partis extensae, & soliditatem quasi consimilem soliditati carnis laudabilis, per quae eius augmentum velox, ut incre-scat aliquando ad capitis humani quantitatem, ut frequenter conspeximus. Deprehenditur quidem a tumore rotundo, oblongo, duro, in primis formam testiculi referente, & qui longo tempore pedetentim incre-scat. Difficile etiam in principio, & potissimum magis in incremento, ut in Observat. praecedente diximus, curatur. At carnositas insignis non curatur, sed testiculus extrahendus. Quomodo causticis curetur, iam ex Montagnana in Observat. praecedente diximus; & quomodo chirurgia, vide Cornel. Cels. lib. 7. ca. 21. De vementi curatione. Cognita vero, ubi recens malum est, hac dispositione ipsa, a principio usque ad primam partem augmenti, facile curari potest. Primo per sectionem venae basilicae, & venae communis; & haec ipsa, si opus est, erit reireranda. Secundo distrahendo & diuertendo sanguinem, haemorrhoides aperiendo cum fellis tauri frictione, aut lacte ficus, vel cum aqua decoctionis sulphuris vivi. Tertio applicando cucurbitulas natibus, & carnosae partibus inferioribus coxarum & crurum. Quarto regimine cibi potusque; frigiditate & siccitate sua contraria generationi & sanguinis augmento. Quinto cum applicatione linimentorum & emplastrorum repercutientium cum exsiccatione notabili & stypticitate; quale hoc est: *℞ granorum lentis, solani ros, folior. plantag. ana*

Signa.

8

Prognostica.

Curatio.

9

10.

11.

ana lb j. & farina hordei lb j. albumina ouorum nu. tria, coquantur omnia in aqua cum quarta parte aceti; adiecta farina, fiat emplastrum, & tepidum applicetur toto osculo, seu scroto, per quinque aut sex dies. Hæc infra scripta a tribus Medicis, Ioanne Tiengio, Martino, & Gerardo quondam Medico Delphensi (cuius ades ego emi, aliter tamen exstructas ante incendium famosum illud Delphense) descripta fuisse anno 1529. in Septembri pro D. Ioanne Heutero seniore, qui patiebatur herniam carnosam, cum magna inflatione & duritie didymi: ℞ maluarum, parietaria, florum chamomill. melilori, ana m. j. extremitatum absinthii p. j. fiat decoctio in aqua ad teneritatem; exprimatur perfecte, & contusis adde farina fabarum, orobi, ana ℥ iij. farina seminis lini, pulueris cumini, ana ℥ j. vini Rhenani, succi caulium, mellis ana q. s. decoquantur simul ad formam cataplasmati. Item: ℞ ros. cum capitibus, myrtill. sumach, balanstorum, corticum granatorum, nucum cupressi, ana ℥ ij. acacia, aluminu, ana ℥ j. fiat decoctio in aqua fabrorum, adde aceti ℥ ij. pro lb j. ℞. prassii, ruta, florum chamomilla, melilori, ana m. j. maluar. parietaria, ana m. ℞. vsnea, extremitatum absinthii, ana p. j. decoquantur in aqua vsque ad teneritatem, postea fiat expressio fortis, incidantur, contundantur optime; quibus addantur farina fabarum, orobi, ana ℥ ij. puluer. cumini, nucum cupressi, ana ℥ j. mumia ℥ ℞. stercoris ouini lb ℞. lixiuii communis, succi caulium, & mellis q. s. bulliant simul ad formam cataplasmati. His subsequenter quidam Hispanus septuagenarius dicitur curatus ab hernia quadam carnosa magnitudine capitis infantis. Primo adhibitum regimen debitum, & purgata materia antecedens, cum multo tempore durauisset. Deinde hæc subsequenter fuere applicata, modo vnum, modo reliquum; ℞ lumini ℥ ij. seminis feniculi, ammeos, ana ℥ j. baccarum lauri p. j. seminis lini, fenugrec. ana p. ij. dauci m. ij. folio. calamenti, ros. rub. ana m. ℞. flor. chamomill. melilori, ana m. j. misce; contundantur crasso modo; & fiebat sacculus, qui ebulliebat in aqua & vino: ℞ farina fabarum lb ℞. surfur. macri m. j. flor. chamomill. sem. anisi, fenic. ana ℥ ij. cumini qr. j. ros. rub. ℥ j. pulueriscentur subtilissime. Deinde: ℞ mellis pintam ℞. cum vino & aqua fabrorum fiat cataplasma ad modum puleis, incorporando ad ignem. Aliud: ℞ nucis cupressi, gallarum, balaustr. ros. ana ℥ ℞. gummi arab. tragac. myrrha, sarcocolla, thuris, ana ℥ ij. boli armen. litharg. ana ℥ iij. olei chamomill ros. ana ℥ iij. terebinthina ℥ ij. pulueriscentur puluerisanda, & cum modica cera fiat massa extensibilis. Aliud: ℞ sepi arietini, ceræ cæritina, ana qr. j. pul. ros. rub. mastichis, rad. ireos, ana ℥ ij. vnguent. popul. ℥ j. liquefiant, & addantur pulueres, pistati, & intringantur pannilinei, & fiat sparadrapum. Et nota quod emplastrum contra rupturam fecerit principalem operationem, quod ita erat paratum: ℞ picis nautalis, cera, resina, ana ℥ ℞. galbani, ammoniaci, therebinth. bdellii, serapini, ana ℥ iij. aloes, mastichis, olibani, mumia, myrrha, sanguis draconis, vtriusque consolida, aristoloch. hypocistid. visci quercini, gallarum, acacia, spodii, balaustr. corticum spinæ nigrae, sumach, hematiid. sem. arnoglossæ, sem. nasturtii, lumb. terrest. ana ℥ ℞. pilorum leporis ℥ ij. sanguinis humani

lb ℞. confice sic pellem arietinam recentem, pilis rasis vel extractis, tam diu coque donec dissoluatur, & cola fortiter cum sepi arietini qr. j. sanguinis humani, aceti, & succi plantag. ana lb ℞. & cum reliquis secundum artem misceantur addendo vtriusque consolida ana ℥ ℞. brusci m. ℞. fiat emplastrum.

OBSERVATIO XXIII.

De Ramice varicoso, seu Hernia varicosa.

Qui varicoso ramice laborabat, consilii causa me quoque accessit. Facile enim nobis hæc hernia innotuit ex signis superius descriptis, potissimum cum in superficie scroti appareret multitudo venarum & arteriarum, cum extensione magna totum scrotum inuolvente, sicut vitis arbori inuoluitur; & ideo ab Italis quoque vocatur Vitis. Materia huius, melancholicus sanguis existit, a superioribus partibus effusus, & ad scrotum per defluxum delapsus, vel critica transmutatione materierum melancholicarum, aut earundem ægritudinum terminatione. Aut fit ob splenem debilem in attrahendo feces melancholicas ab hepate; vel hepate minus expellente sanguinem melancholicum ad lienem: nam eo melius propellente, sanguis efficitur purior; alioqui crassior euadit. Hanc causam internam etiam mouent, ac iuuant externæ sanguinem melancholicum multiplicantes; qualia sunt animi passionnes contristantes, mœror, ac tristitia excedens, exercitia vehementiora, cibique melancholici, caro antiqua salsa, fumo indurata, vsus fabarum, leguminum, & similia. Quamobrem, ut recte curaretur, imperavi, ut ab eiusmodi cibis, crassis & melancholicis, tum aliis rebus melancholicam producentibus, aut generantibus, abstineret, potissimum a cibis crassis & melancholicis. Inde præcepi, ut omnium primo fecibus communibus eductis, sanguis eidem satis copiose deimeretur ex vena lienari: nam & hic in liene obstructionem patiebatur, & dolorem in hypochondrio sinistro subinde experiebatur (splen enim huius mali magna ex parte fomes existit.) Deinde videntes decoctis sanguinem depurantibus, & obstructionem lienis tollentibus, atram mox bilem purgauimus; & ut hæmorrhoides prouocarentur, vel aperirentur, præcepimus, cum eidem aliquando fluxissent & nunc retentæ essent. Scroto vero, cui aderat etiam insignis durities, emplastrum nostrum de ammoniaco apponi iussimus. Quemadmodum nuper puero duorum annorum tophacea hernia laboranti commode emplastrum, de mucilaginis imposuimus. Illud enim emplastrum, & proprie vigoratum cum quatuor gummis (cum simul durities adsit) videlicet opopanace, serapino, bdellio, & ammoniaco. Quidam in hac hernia, commendant applicationem aquæ sulphuræ, asphaltinæ, ex quibus sæpe fiant encathismata. Intentio enim in hac dispositione est complicata ex applicatione resoluentium, exsiccantium, & lenientium medicinarum. Sed thermæ iam dictæ omnia hæc in se habent virtute naturali & conueniente, Auicenn. lib. 3. fen. 22. tract. 1. cap. 8. de cura herniarum carnea & varicosa sic in-

quit: *Curatio earum est curatio apostematum durorum: & multoties quidem sufficit in ramice varicoso inunctio cum adipibus lenibus & medullis.* Vt itaque istis vel similibus remediis vteretur, consului; vel iis, ut alii iubent, quæ ad herniam carnosam valent: de quibus diximus Observat. præcedente & Scholio. Excepta id tamen sexta intentione de causticis remediis, quæ hic nullo modo conveniunt. Quod si hæc non iuarent, remisimus eum ad chirurgos, qui & hanc incisione curant; ut docetur a Paulo libr. 6. cap. 63. *De varicoso ramice & ventoso.*

S C H O L I A.

4 Vasa in scroto, aut dartis membranis, dilatata, Varices simplici vocabulo nominant. Alia vero, quæ testiculum nutriunt, si varicum more dilatentur, Varicosum Ramicem Latini, Græcis Cirrocelen (ut antea diximus) vitium hoc nuncupant. Notæ horum evidentes sunt; quippe pars affecta tumidior, obliqua modice, vix in modum, & testiculi relaxatio apparet, tum alia adfunt nonnullæ difficultates, maxime in cursu, exercitio, & itinere. Quod ad remedia attinet, imprimis victus ratio describenda, quæ melancholiæ sit contraria, & quæ leni pro sit, cum sit fomes melancholiæ. Si opus, venæ adhibeatur sectio, tum alia Obser. præcedente dicta, præcedente purgatione ex confect. hamech, syrupis de epithymo, de pomis, de fumo terræ, de borag. & similibus, cum decoct. lupul. fumarie, ceterach. Purgantur etiam cum decoct. senæ, epithymi, adiecta cassia, vel confect. hamech; deinde ad localia veniendum, quæ & herniæ carnosæ convenire diximus, præter caustica. Est & altera quadam species herniæ apud Montagnanam, quæ dicitur Buris ab Auicenna. Fieri eam scribit ex sanguine melancholico, non solum multiplicato in oscheo, 5 verum etiam in testiculo, partibus iisdem ita intumescantibus, ut mensuram aliquando capitis excedant, quales in pauperibus, qui circa templum sedentes eleemosynam ab intrantibus petunt, herniæ conspiciuntur, cum duritie, tensione, nigredine, cum frigidityate vehemente, absque pustulis & corruptionibus: quæ tamen si adsint, a quibusdam vocatur dispositio proxime accedens ad lepram. At vero hæc ipsa proxime ad carneam accedit, vel ad herniam varicosam potius, cum fiat ex melancholico humore. Vidi ego in Ioanne Cantharopolitano, Priore in cœnobio Abbatiæ Egmodanæ, talem herniam, caput humanum magnitudine excedentem, ut maiorem nunquam viderim. Contraxerat is hoc malum ex continuo cantu in Choro, cum præcentor esset; & nihilominus ultra viginti annos hoc onus gestans superfixit. Montagnana idem vidit in quodam viro, qui talem herniam gestavit plusquam triginta annis. Quidquid sit, hic refertur vel ad varicosum, vel ad scirrhum ramicem, vel herniam tophaceam; & tunc non adest sensus, aut dolor vehemens, sæpe nullus. Verum si maligni aut cancrofi naturam referat, dolor urgetur punctorius. Ac si hæc dispositio ad statum & confir-

mationem pervenerit, tunc curanda est cura apostematum, subtrahendo materiam melancholicam, si quæ fuerit in venis, vel in splene, sectione venæ basilicæ cubiti sinistri, vel in manu sinistra. Mox materia paranda cum decoctis & syrupis de epithymo, & aliis iam dictis, & purg. eradicativa ex sena & confect. hamech, deinde materia coniuncta auferenda cum resoluventibus & emollientibus, ut patet 14. Method. De tumoribus scirrhis. Montagnana utitur mane & ante cœnam semicupio ex aqua decoct. rad. althææ, granorum sesami, fœnugræci, seminis lini; & post exsiccationem inungit cum oleo sesamino, amygdal. dulc. bdellio, inuicem dissolutis, & calidis scroto appositis, cum lana succida diligenter calfacta. Et ita, inquit, procedatur per septimanam. Deinde fiat semicupium, vel encathisma in aqua cineris, in qua modicum bullierint chamomilla, fœnugræc. mox membro apponatur hoc emplastrum: *Rad. scrophularie, vel herba Mauri, secundum Neapolitanos, rad. bryonia, ana lb. B. melilori, chamomilla, sem. anethi assati, ana 3 lb. farina orobi 3 ij. furfuris macri 3 iij. croci 3 lb. coquantur in aqua radices usque ad mollietudinem, reliqua terantur subtilissime, & adiectis oleis amygdal. dulc. & lilior. fiat emplastrum, quo actu calido totum oscheum, seu scrotum, inuoluatur usque ad inguina, & ligetur apte, ut adhæreat.* Deinde alia septimana sequente fiat ex magis resoluventibus, denuo ad applicationem emollientium deveniendo, usque ad complementum curationis: singulis interea septimanis ventrem lenientibus medicamentis soluendo, si necesse sit cum diasene ex aqua lactis caprilli calida: reliqua semper observanda, quæ ad dura apostemata præcipiuntur ab auctoribus, iuxta & canones ab iisdem observatos.

OBSERVATIO XXV.

De Pneumatocèle, seu Hernia ventosa.

6 Quid tympantem patiebatur, in herniam ventosam incidit. Soler autem aliquando hernia ventosa, seu ramex ventosus, cum hydrope accidere, aliquando sine ea, ut Rondelerius ait. Sed non solum in ascite hoc contingit, uti aquosa hernia, sed magis ex tympante, propter flatum. Inter ea & ventosus, inquam, ramex fit quoque sine hydrope, ut sæpe vidimus, & frequenter in pueris, seu infantibus, qui facile curantur sæpe emplastris tantum ventositatem depellentibus, quibus utimur in colicis doloribus & in ventriculi inflatione. Quicquid enim flatum gignit, ut omnes cibi flatuosi, ut legumina, hoc malum producit; lac quoque, & piscium usus frequens, fructuumque frigidorum, cucurbitæ, olerum frigidorum & humidorum, & aquæ usus, & potissimum immoderata repletio. Ceterum cognovimus, herniam ventosam esse; eo, quod ventositas quasi ab una parte ad aliam movebatur, cum rugitu & dilatatione, cum flatulento spiritu, cum & aliquando tactu sonu edat. Cum autem huic tympantem adesset, curavimus eum, ut de tympante scripsimus, & purgavimus cum diacarthamo solutivum; & utebamur iisdem remediis, quæ ad colicam ventosam valere recensuimus, & ad

& ad ventriculi inflationem. Scrotum, ut hoc fortu foueretur imperauimus: *℞ cumini, baccarum lauri, seseli, rut. ana ℥j. fiat decoctio in vino leuiter astringente, & lixiuio foueatur pars; deinde & hoc sequens cataplasma imponatur, quo & Rondeletius utitur: ℞ stercoris vaccae ℔ij. sulphuris & cumini, ana ℥ij. misc. & addito pauco melle, fiat cataplasma; applicetur scroto. Vel fiat ex farinis hunc in modum: ℞ farina fabarum ℔j. decoquito in vino addendo cumini, apii, petros. ana ℥ij. fiat cataplasma; applicetur parti affectæ. In altero eodem malo laborante sine hydrope, primo pituitam, quæ cruditatis causa est & inflationis, ita purgauimus: ℞ foliorum senæ ℥vj. agarici feminae albi leuis ℥j. ℔. seminis anisi, fœniculi, ammeos, carui, dauci, ana ℥j. ℔. coquantur in decoct. communi q. s. & huius expressionis cum per noctem steterit accipe ℥vj. addendo syrup. e starchade, mellis rosac. colati, oxymellæ simplicis, ana ℥℔. misc. pro duabus dosibus: dabam deinde diacuminum. Parti affectæ fatus hic adhibebatur: ℞ florum chamomilla, ruta, meliloti, origani, absinthii, artemisia, calamintha, salvia, ana m. j. seminis anisi, fœniculi, cumini, carui, ammeos, ana ℥ij. coquantur in aqua & vino, pro situ adiecto pauco aceto; fiat fatus cum spongia; ac locus deinde exsiccatus inungatur oleis sequentibus: ℞ olei rutacei, costini, chamomill. anethini, ana ℥℔. misc. Alii commendant, ut Catenaria, oleum de carui, sambucinum: quidam ad oleum euphorbii procedunt. At nos superioribus contenti, emplastrum de baccis lauri apposuius, & æger a ramice ventoso curatus fuit.*

SCHOLIA.

C Vratio herniæ ventosæ a Neotericis duabus potissimum intentionibus, seu scopis, perficitur. Primo causam antecedentem amouent fere cum iisdem, quibus hernia aquosa curatur, nempe euacuando materiam ex qua fit ventositas; ea materia magna ex parte phlegmatica est; quæ digerenda erit & purganda cum iisdem, quæ ad aquosam herniam valent, & describuntur ab auctoribus. Sicut enim in aquosa dominatur aqua super ventum (ut dicebat Bertrutius Medicus de hernia ventosa:) ita in ventosa dominatur ventus super aquam. Neque æstimandum est in corpore hominis alterum sine altero reperiri; cum eorum sit eadem efficiens causa, scilicet calor diminutus, eademque materia, scilicet humor frigidus, unde etiam facile ventositates causantur: ideo pituita purganda adiectis carminantibus ventositatem. Quare hic, ut & Rondeletius annotauit, euacuato corpore a pituitosis humoribus, utendum corroborantibus facultatem concoctricem ventriculi: ea nimirum remedia sunt utilia, quæ ad ventriculi inflationem, tum ad ascitem, sunt descripta; etiam illa, ubi ventositas magis abundat, quæ ad tympanitem valere diximus. Quæcunque igitur ventositates minuunt ac expellunt in superioribus membris congregatas, a quibus huius ægritudinis colligantia dependet, conferunt, quæ & stomachum tum hepar corrigunt, ne humores flatuosi generentur; adhibita commoda victus ratione, ne ventositates genitæ hoc vitium causent, vel

augeant. Secundus scopus est, ad amouendam causam coniunctam, consumendo & resoluendo ventositatem in scroto perceptam. Repurgato igitur corpore, ut iam diximus, hæc trita subsequencia remedia apte adhiberi poterunt; in primis hic sequens clyster: flor. chamomilla, meliloti, summitatum anethi, ana m. j. sem. cumini, anisi, carui, fœniculi, ammeos, ana ℥j. sem. ruta ℥℔. sem. lini ℥ij. coquantur in aqua communi pro ℔j. colatura adde (si aliis quoque restricta est.) benedicta laxat. ℥j. olei rutacei, anethini, ana ℥j. ℔. sacchari rub. j. salis gemma, salis Indi, ana ℥℔. fiat clyster. Secundo glandis confecta ex trochisc. albandal. ℔ij. sem. ruta, semin. cumini, ana ℥℔. baccarum lauri ℔ij. mellis bene cocti q. s. adiecto sale Indo, vel gemma, fiant supposit. duo vel tria. Tertio paretur sacculus ex milio, surfure, floribus chamomill. & semin. ruta, cumini, fœniculi, anisi, & similibus, sacis magnus, quadratus, ut totum ventrem ambiat; calefiat in patella, & calide ter quaterve in die applicetur. Membra vero flatum gignentia corrigantur, sumendo in diluculo ℥j. theriacæ veteris, vel confectiois mithridaticæ, cum ℥ij. aquæ flor. chamomilla, vel semin. ruta: vel, quod vehementius, ℞ electuarii de baccis lauri, nempe spec. ℔ij. cum succo ruta fiant pilula iij. vel v. & dentur per tres horas ante cibum. Interea victus ratio diligenter obseruanda, cauendumque ab omnibus causis primitiuis, cibisque multiplicantibus ventositatem; a lacticiiniis, pastillis, pane azymo, fungis, leguminibus, rapis, cerebris animalium & medullis, castaneis, vino dulci, fabis, ab aere frigido, ventoso, tempestuoso, caliginoso, locis subterraneis, paludibus; ab omni animi motu, & corporeo; a somno prolixo & meridiano. Secundus scopus, qui pertinebat ad causam coniunctam, fit topicis remediis scroto admotis; ventositatem resoluentibus, ut fomentis ac oleis, & cataplasmate, descriptis in Observatione. Vel fiat tale, vel simile, fomentum: ℞ origani, calamintha, absinthii, ruta, chamomill. meliloti, summitatum anethi, ana m. j. seminis anisi, fœniculi, carui, ammeos, ana ℥j. ℔. vel ℥ij. contundantur crasso modo, & bulliant in vino & aqua p. e. ad consumptionem tertia partis, & cum spongia infusa in prædicta decoct. fiat fomentum; & loco exsiccato inungantur testiculi; seu scrotum, cum oleo costino, sambucino, & euphorbii. In fotu addere poterimus aliquid olei anisi, ad maiorem penetrationem, & resolutionem ventositatum; & applicetur emplastrum de meliloti, vel de baccis lauri, vel quod in Observatione descriptum est. Ceterum hæc hernia non curatur incisione manuali, sicut curatur hernia aquosa, (de qua mox dicemus) aliis conferentibus remediis, licet aliqui velint, quod hæc hernia ventosa etiam possit incidendo curari, quemadmodum Guilelmus Placentinus asserit. At in infantibus, (ut antea quoque admonuimus) facillime tantum topicis remediis resoluentibus ventositatem curatur.

OBSERVATIO XXVI.

De Hydrocele, seu Ramice aquoso.

FFF 3

1. **Q**ui ex hydrope Alcmariæ decumberebat, anno 1556. in hydrocelem incidit, cum ingenti ac incredibili scroti, testium, ac pudendi magnitudine, vir annorum triginta. Cum diu decubisset, aquositas descenderat per didymum ad oscheon, seu scrotum: est enim hydrocele vel aquæ inter cutis symptoma, vel affectus scroti. Si autem sit cum ventris tumore, ut hic erat, danda est opera, ut aqua quæ in peritonæo continetur, frequentibus euacuationibus absorberi possit. Frustra enim aquam in scroto contentam topicis remediis absorbere tentamus, non euacuato prius peritonæo. Hinc etiam asciticus ille, de quo egimus *libr. 19.* *Observat. 38.* qui & hernia simul aquosa laborabat, aqua in scroto collecta, cum totius scroti tumore ultra magnitudinem capitis, corpore sæpius repurgato, tandem, nostro consilio, topicis remediis ab hernia aquosa curatus fuit. Quanquam idem postea hydrope recidiva obierit. At huic ægro, de quo nunc loquimur, totum scrotum ex aqua adeo tumidum erat, ut capitis magnitudinem æquaret: leucophlegmatia nempe laborabat. Casum huic similem habemus apud *Victorem Trincauellum sub finem Consilii xxxij.* De hydrope. Sic ille scribit: occurrit mihi hoc anno vir, ætatis quadraginta quinque annorum, hernia aquosa laborans, & leucophlegmatia. Cumque ad remedia exteriora, puta, ad cauteria scarificationesque, difficilem se praberet, talem ei dabam potum, quo alius quater aut quinquies mota est; vrina autem plus quam centies & vicies, paulatim tamen & per intervalla: & ex eo tempore sanatus est, & brassica marina puluerisata subtiliter 3 ij. B. cicadarum puluerisatarum 3 j. misce, & in iure pulli salis experte, in quo bullierit absinthii & adianthi coma, exhibeatur. Aliud experimentum bis hoc anno mihi occurrit. Primum quidem in *Xenodochio De la vita*, in puero decem annorum diu tympanite laborante, qui, tanquam derelictus a Medicis, in lecto se continebat. Cumque ad ea, quæ per os dantur, propter ætatem, & longum morbum, & virium imbecillitatem, non admodum aptus esset; tale iussi apponi emplastrum, quotidie affixis sine scarificatu cucurbitulis in abdomine: miraculoseque conualuit intra octo vel decem dies. & radic. cucumeris asinini optime contusarum, & in aceto scyllitico per 24. horas maceratarum lb j. mellis despumati lb ij. misce. bulliant ad confectio-nem cerati, & in fine adde cumini subtiliter puluerisati 3 ij. singulis diebus amovebantur emplastra, abdomine optime terso, cucurbitula affigebantur, deinde rursus emplastrum apponebatur. Quumque non sincerus esset tympanites, sed vna cum flatu aqua adesset, in modica tamen quantitate, paulatim vna discussus est flatu, & in habitum digesta aqua, sanatusque est. Alium in *hospitio De la vita*, eodem modo curavi, & brassica marina subtiliter puluerisata 3 lb. rhabarb. mundi, & electi, & subtiliter puluerisati 3 ij. spec. dialacce, specier. diacurcume, ana 3 j. hepatis lupi preparati, limatura chalybis cum aceto scyllitico sæpius lota, ana 3 lb. mellis despumati quantum sufficit, misc. fiat electuarium, cuius cochlear vnum per horas duas ante prandium sumat, & similiter ante cenam. Inde alius semel atque iterum moveba-

tur quotidie, quodque excernebatur, aqueum erat. Abdomen vnguento sequenti ungebatur: & vnguent. Agrippæ, martiati, Aregon. ana 3 j. olei de elaterio, anethini, ana 3 j. semin. sinapi subtiliter puluerisati, absinthii, aridi, origani, farina lupinorum, ana 3 ij. irrorentur pulueres aceto scyllitico; post omnia simul misce, & fiat linimentum secundum artem. Hæc *Trincauellus*. At noster æger, hernia aquosa ingenti laborans, duplici curatione indigebat; vna pertinet ad causam antecedentem, altera ad causam coniunctam. Cum enim causa antecedens esset materia pituitosa & aquosa, originem habens prius ab hepate per viam indigestionis, vel, ut quidam autumant, per viam defluxus a capite ad spinam dorsii per nucham; pro minoratione materiæ has pilulas, ut sumeret, mihi utile videbatur: & pilular. de hiera simpli, aggreg. ana 3 j. pulu. rhabarb. optimi, soldanella, ana 3 lb. cum syr. de eupatorio fiant pilula v. vel vij. dedi quoque decocta ex rad. ireos, ebuli, agrimonie, soldanella, tum aliis, quibus in hydrope frequenter vsi sumus, (ut *lib. 19.* cum de hydrope ageremus constat;) adiecto syr. de eupatorio; ut ibidem ad longum videre licet. Postea hoc modo, vel simili, eundem purgauimus: & pilul. aggregat. Mes. pilul. de rhabarb. Mesue, ana 3 j. elaterii gran. j. formentur pilula v. vel vij. cum syru. de endiuia. Post aliquot dies hoc modo, ad validiorem operationem: & pilul. aggregat. 3 ij. pilular. de rhabarb. 3 j. elaterii gr. j. & si non satis mouerent, elaterii gr. ij. Interea vitæ regimine descripto contra hydro-pem, cumq; per intervalla decoctis hydragogicis eundem purgassimus, peruenimus ad secundam intentionem, ut causam coniunctam amoueremus: quæ, inquam, resoluitur sensibilibiter, vel insensibilibiter, aut perforatione extrahitur. At satis fecerunt emplastra scroto admota ex flor. chamomillæ, meliloti, stercore bubulo exsiccat, farina fabacea, lini & fœnug. (cum aliqua durities admixta esset) puluere cumini, cum oleis chamomillino & liliaceo simul mixtis: postea & ex farina fabar. puluere libi lini, fœnug. flor. chamomillæ, ros. meliloti, cum oleo chamæmelino. Verum, quod pelliculo scroti excoriaretur, & quasi exulceraretur, chirurgum inungi fecimus cum vnguento exsiccante ex cerusa & lithargyrio, & ex aliis exsiccantibus composito. Et loco inuncto admovebatur emplastrum per aliquot dies. Ultimo fiebat emplastrum ex floribus ros. chamomillæ, meliloti, & puluere libi lini, & farina fabacea, ad spissitudinē coctis in vino Pictaviensi, absq; oleis aut pinguedinibus. Et sic fuit curatus, sine perforatione.

S C H O L I A.

Quibus modis hernia aquosa cognoscatur diximus *Scholio Obseru. 15.* & causas huius adduximus *Scholio Obseru. 12.* huius libri. Fit interea hæc aliquando cum hydrope, aliquando sine ea. Quod si aqua in scroto collecta sit, facile ex totius scroti tumore & magnitudine dignosci poterit. Si ab humore inter darton & erythroidem collecto alter testium, aut ambo tumeant, *Valescus* aquositatē hanc dicit modo totā oschei concavitatem occupare, & totum scrotum inflari, uti aliquando accidit

accidit hydropicis, modo in folliculo illi adherenti contineri. Causa huius præcipua est error virtutis sanguinem generantis, & similis sero casei humiditas in scrotum delabens, maxime in hypofarca, vt nostro iam dicto agro contigit. Vnde etiam frequenter cachexia, vel hac hydrope laborantibus euenit: qui egregie iuuantur a potus & cibi paucitate, & ab euacuatione superfluitatum euentium ex mala hepatis & frigida intemperie. Si totum oscheum seu scrotum occupauerit, ex omni parte tumidum & inflatum euadit, cum quadam mollitie, & si ibidem sit multa aqua, luciditas adest, & in ingressu grauitas dolorq; exiguus, nec hernia per compressionem recedit, vti omenti vel intestinalis. Cum autem hæc hernia potissimum contingat humidis a natura existentibus, ideo illa intemperies præcipue corrigenda, si in tali ætate existat, quæ corrigi possit. Si lactentibus pueris eueniat, vt sæpe conspeximus, regimen nutritiis cottigatur, siccis cibis vtatur, a fructibus & cibis humidis cauendo. Si sit in ætate adulta, idem regimen corrigatur, & vtatur medicamentis descriptis in catochymia, & quibus cachexia laborantes cum hypofarca, curantur, ac ea adhibeantur, quæ vtriam prouocent, & egregie siccent. Deinde aqua illa, quæ scrotum vel testiculos occupauit, per emplastra, exsiccantia consumenda, in hunc vel similem modum: ℞. *baccarum lauri* ℥ ij. *chamomill.* ℥ j. *℞. piperis longi, baurac. ana* ℥ j. *℞. fiat pulvis, & cum vni ademptis acinis incorporando fiat emplastrum.* Vel hic fons a Rondeletio descriptus adhibeatur: ℞. *lixiii barbitonsensis* lb. iij. in quibus decoque cumini ℥ ij. *ceterach, vel petros. apii ana* ℥ ss. *salis* lb. j. *fouetur pars.* Si imbecilliora videantur, adde *sulphuris* ℥ ss. foueatur mane & sero. Postea admoueat sequens cataplasma: ℞. *stercoris caprae* ℥ ij. *cochlearum contusarum cum testis* ℥ ij. *sulphuris* ℥ j. *misce, fiat cataplasma. applicetur, & sæpe remoueatur.* Interea, vt iam diximus, vti poteris remediis ad alsciten præscriptis, ad hepatis corroborationem, & aquarum consumptionem. Proderit etiam vsus pulueris confecti ex cineribus, descripti ab eodem Rondeletio capite de paralyti. Porro, si hæc parum prodesse videantur, pungatur tumor, & curetur chirurgia, quam describit Paulus Aegineta lib. 6. cap. 62. de aquoso ramice, seu hydrocele. Benedictus Veronensis lib. 24. cap. 38. sic ait de hoc ramice: *Hydrocele ista, quæ hydropicis imponi diximus sanatur: verum cum aqua in immum scrotum descenderit, candenti ferro extrahenda est, vel alio medicamento erodente.* Mox id cataplasma imponitur: *mastichis* ℥ ij. *cupressi contus.* 4. *tragacanthi, gummi Arabici, omnium* ℥ ij. *ex rosaceo, verruculoque calfacto coguntur, imponunturque.* Valescus in parte inferiori prope latus testiculi aperit scalpello, & paulatim finit aquam effluere, non vnicā vice, & emplastrum desuper ponit deficcans aquam, & ad defensionem loci, ex bolo Armeno, psidiis, & balaustis, & cumino, torrefactis, & semin. nasturtii. Alii vtuntur cauterio, vt ibidem docetur. Veteres punctione vel vitione utebantur.

NEoterici vltimo hic addunt adhuc herniam humoralem: quam fieri volunt ex omnibus humoribus, excepta bile, vt Montagnana refert *Consilio 227. rubrica 3. De hernia humorosa.* Nos potius (vt diximus *scholio Obseruat. ii. huius libri*) reuocandam censemus ad apostema scroti vel testiculorum, cuius causas signaque recensuimus *scholiis Obseruat. 6. & 15. huius libri.* Hic nihilominus vnum atq; alterum exemplum adiciemus, ad totius tractatus de herniis complementum. Adolescens quidam patiebatür herniam humoralem, ex defluxu materiæ sanguineæ, ex coitu vehementiore post repletionem; cui aderat tensio satis manifesta in scroto, & humiditas quædam tactu sentiebatur, & earundem partium aderat rubedo, & pulsatio in locis prædictis. Quare huic statim præcepimus, vt vena basilica brachii dextri aperiretur, sanguine vtcunque, vt in adolescente sanguineo, satis extracto. Deinde ventrem fouimus cum *infus. rhab.* ℥ j. *℞. in aqua endiu. exiguo sibiænantho adiecto, & syrup. ex infus. ros. pallid. ad* ℥ j. Mox scrotum inunximus oleo ros. & vnguent. ros. simul mixtis, & emplastrum commodè admouimus ex farina hordeacea, & rosis siccis, & puluere florum chamomillæ, oleoque rosaceo debite concinnatum. Demum paucis adiectis resoluentibus, vt floribus meliloti, materia resoluta est. Nauta ex percussione ligni, quo malum in altum tollitur, intra crura scrotum ipsum attingente, ex nimio dolore incidit in herniam humoralem, scrotique tumorem valde magnum, cum inflammatione, & tandem in febrem acutam: cui, cum non satis tempori succurreretur, scrotum tandem cum testiculis ad gangrænam peruenit & corruptionem. Ad hunc in fine actus, cum Guilhelmo de Dalen lithotomo, inuenimus eundem morti proximum, medicamentis nihil iuuantibus, ita vt paucis deinde horis, facto progr. ostico idem misere ex hac vita decesserit. Alius vir nobilis, cum ex febre diu decubisset ad hæcticam declinante, cumque mense Octobri a me curatus foret, sub finem mensis Nouembris iterum in febrem incidit, & postea in herniam humoralem; atque vnus testiculus fuit inflatus & inflammatus. Cum autem neque dormire posset, & febre conficeretur, in homine extenuato febre præcedente, & nunc denuo facta recidiva, venam secare ausi non fuimus. Verum vbi ex cassia, diapruno simplici, & electuario lenitio, alius adstricta mollior non fieret; hic clyster iniectus plurimum illi profuit: ℞. *rad. althæe mundatæ* ℥ j. *mercurial. parietaria, malua, foliorum althæe, violar. ana* m. j. *florum chamomill. meliloti ana* p. j. *summitatum anethi* m. ss. *seminis malua* ℥ ij. *coquantur in aqua communi pro* lb. j. *Colatura adde cassia mundata pro clysteribus* ℥ j. *benedictæ laxat. diacatholici ana* ℥ j. *℞. olei amygdalar. dulcium* ℥ ij. *olei anethini, chamamelini ana* ℥ ss. *vitellum vnius oui, salis communis* ℥ j. *℞. fiat clyster: quo ter aluum excreuit, cum magna vtilitate, febre etiam valde sedata.*

Testiculo autem inflato, cataplasmata ex malua & farina hordei, ac similibus, admota, & fomenta. Fomenta tamen potius oberant, ideo denuo ad cataplasmata redibam. Demum Guilhelmus de Dalen lithotomus, noster amicus, applicuit sequens cataplasma, ex utriusque præscriptione, fasciis debite, ut fieri solet, iniectis: *℞. foliorum malua m. vj. rad. hyoscyami, cum folia exaruisse, propter dolorem ℥ iij. florum ros. rub. m. ij. farina hordei ℥ iij. semini hyoscyami ℥ j. herbis decoctis, floribus, ac radicibus, ut erat artu, simulq, confusis, mox seminibus adiunctu, & tritis, addendo, olei ros. ℥ iij. fiat cataplasma, ut artu est.* Decoctum vero herbarum & semin. reseruabatur, & simul cum oleis coquebatur in patella supra ignem, oleo adiecto, & ita applicabatur. Post aliquot dies idem cataplasma reiteratum fuit, addendo *rad. althææ ℥ iij. olei hyoscyami, vidl. ana ℥ iij. farina fabarum ℥ iij.* & applicabatur aliquot diebus, ut supra dictum est. Postea & illud emplastrum appositum fuit: *℞. emplastri de mucilag. ℥ iij. gummi ammoniaci, galbani dissoluti in vino ana ℥ ℔. misce.* Non diu post emplastro supradicto, adiunctum est emplastrum de meliloto ana ℥ iij. olei hyoscyami, ros. meliloti, chamomilla ana ℥ j. misce. Verum cum illud ultimum emplastrum maiorem inflationem, & inflammationem, ac duritiem causaret; quia plus iusto resolvebat, coacti fuimus, denuo reiterare, quod ante præscriptum erat, donec inflammatio rursus esset sedata. Ultimo admotum est emplastrum de muc. capiend. ℥ iij. & adiiciendo gum. ammon. galb. dissol. in vino ana ℥ j. misce. Et ita fuit etiam hic ab hernia humoralis admodum difficili cum duritie curatus. Munifice se hic nobilis erga me, pro curatione, liberalem exhibuit: nec ego post, erga eundem ingratus existi.

S C H O L I A.

5 **H**ernia hæc, iuxta Neotericos, si a sanguine fiat, aut aliis humoribus, plerumque fit per viam defluxus in scrotum, rarius per viam congestionis. Interea fit in percussis (ut Nauta, de quo Obser. precedente) verberatis, vel iis, qui ab alto cadunt, & præcipue ex compressione facta supra nates, similiter ob concussionem, vel fortem spinæ compressionem, vel in portantibus onera graviora, vel ob distentionem in lumbis factam, quemadmodum in iis, qui balistas tendunt, unde sanguis ex vena caua descendit in scrotum: Rarius tamen contingit per congestionem a materia sanguinea, frequentius vero a materia frigida, uti apostema frigidum. Si fiat a calida materia, potissimum a sanguine, adest tensio, ut diximus, rubedo, & pulsatio, & caliditas, quæ tactu percipitur. Curatur venæ sectione ex cubito, venæ basilicæ, aut mediæ, iis respondentibus, quæ ad sectionem requiruntur. Purgetur æger cum infuso rhabar. in decocto communi cum thamarindis, vel diapruno simplici: & hoc vel simile emplastrum applicetur: *℞. solani recentis, si sit astas, sicci in hyeme ℔ ℔. flor. ros. rub. folior. plantag. ana ℥ ij. lentium coctarum in aceto ℔ j. farina hordei ℥ v. olei ros. q. s. fiat emplastrum, applicetur bis in die. Cucurbit. natibus cum scarificat.*

tione applicentur, sanguine ad ℥ iij. vel plures extra-cto. Regimen vitæ sit infrigidans & exsiccans, a vino vehementiore absteineat: oligophoro & leniter adstringente utatur, vel ceruisia communi. Curatur hæc hernia facile in principio, sæpe in septem, vel paulo pluribus diebus, si medicus non sit negligens aut imperitus. Hæc autem curatio, ut breuiter dicamus, constat iisdem remediis, quibus apostema calidum, scrotum vel testiculos occupans curatur. Ideo ad eum locum recurrendum. Si vero (quod sapius fit) contingat a materia frigida, pituita prædominante, catissis hanc generantibus prægressis; sicuti magna ex parte euenit hydropicis, cachecticisque, tum aliis, qui cibis frigidis ac pituitosis, coituque frequentiore utuntur, & qui inertia vitam consumunt; frigiditas tum in scroto sentitur, & fouea remanet diu in loco affecto, a digito comprimente, quod non contingit in aquosa vel ventosa. Hanc curationem quidam absoluunt quatuor intentionibus: Primam per euacuationem materiæ pituitosæ antecedentis, quæ mucilaginosæ plerumque est cum turpetho, hoc modo: *℞. turbit. elect. ℥ ij. zinc. ℥ j. zaccchar. albiss. ad pondus omnium, & fiat puluis, & detur cum aqua absinth calide.* Secunda intentio est illa, quæ digerit materiam, quæ & medicinam iam dictam præcedere debet, ut: *℞. aqua meliss. bethonic. absinthii ana ℥ j. ℔. mellis ros. colati ℥ j. ℔. misce.* Et si fortius desideres, adde oxymel. scyllit. vel acetum scylliticum cum zacccharo. Et si sit in æstate, & virides herbarum reperiantur, ex iisdem fiat decoctum, & colatis addantur syrupi prædicti. Tertia intentio apud eosdem, est rectificatio membrorum naturalium, ne pituita generetur, vel ad scrotum aut testiculos defluat: atque hanc absoluunt, exhibendo in diluculo ℥ j. theriacæ Andromachi ad minus 10. annorum: recens nequaquam conuenit: quod vetustior, eo melior. Quarta intentio est materiæ coniunctæ consumptio cum resoluentibus: vel iisdem uti licebit, puta topicis, medicamentis, quæ valere scripsimus ad herniam aquosam. Hoc autem remedium tanquam infallibile commendatur: *℞. sandarach. ℥ ij. sarcocoll. rubea ℥ j. cineris stipitum fabar. vel sarmentorum vitis ℔ j. pul. di. ℔. ℔. aceri scyllitici ℔ ij. bulliant, omnia cum aqua capitelli 3°. vsque ad spissitudinem, & ex iisdem emplastretrur calide scrotum, & videbis mirabilia.* Eadem præterea topica & localia remedia conferunt, quæ prius recensuimus, de apostemate frigido scroti vel testiculorum, & ramicum, ad hunc librum 27. pertinentes, absoluimus. Hic tamen quidam addunt, quo pacto impuberes imberbesq, diu maneat, & particulæ naturales testesq, conseruentur. Cimolix illi cretæ & cerussæ æquales partes alterci succo excipiunt, ut sordium spissitudo fiat, deinde oleo lentiscino q. s. adiecto, contundunt & utuntur. Vide Paulum Aeginetam lib. 3. cap. 52. ubi & psilothra reperies. Eum sequitur Benedictus Veronensis lib. 24. cap. 32. Sed iis omissis, sat est loca indicasse. Cum autem Neoterici nonnulli inter ramicum genera umbilici proidentiam, seu eminentiam, recenseant; atque adeo

6

7

8

puberta-
tem custodiant

adeo herniam vmbilicalem nominent, ac de eo affectu statim post ruptiones pertractent; haud incongruum sit, de eo malo hic etiam agere; atque ita hunc librum finiemus. Non omittemus interea historiam hanc Fernelii: Neque, inquit, prater institutum sit, cum virum producere, cui ex accepto ventris vulnere, praecisum tenue intestinum prodit, e quo alui excrementum nondum solidum aut coherens, continenter emanat annos iam quindecim, ea via intercepta, quam animi ducebat. Nunc ad exomphalon progrediamur.

OBSERVATIO XXVIII.

De Exomphalo.

Pueris & nuper natis puerulis vmbilici inflammationem contingere, Hippocrat. aphorism. 3. Apho. 24. adnuit. Cuius verba Galenus interpretatus corroborat, vmbilicorum, inquiens, inflammationes, non multo antea praecisorum, non sine ratione nouiter natis puerulis accidere, non secus, ac si alia pars foret ulcerata. Ob quam etiam item (vt annotauit Sebastianus Astruc, in libello suo de puerorum morbis, Morbo 43. vbi agit de inflammatione vmbilici, vel eius augmento, iuxta Auicennam, nempe de exomphalo apud Graecos dicto, vmbilico prominente a Celso appellato, & prociuo a Plinio) Auicenna lib. 1. fen. 3. doct. 1. cap. 3. asserit infanti accidere, propriissime tamen, quando vmbilicus incidat: itidem Rhazes in libro de puerorum affectibus, cap. 2. vmbilici prominentiam pueris, quando plangunt, vel vociferantur, aut tussi concitantur magna, accidere adprobat. Hic vero obseruandum, vmbilici interdum augmentum, auctoritate Auicennae, provenire; quod Celsus vocet prominentem vmbilicum; Plinius vero prociuum; adfectum scilicet non sub inflammationis, siue apostematis genere contentum, sed in ramis siue herniae, aut rupturae, specie comprehensum: de quibus nunc singulis sermo faciendus. Ego vero pro vmbilico existente, vel exomphalo, in puerulis nuper natis, quatuor rotulas ad formam stufi rotundas in corio rubro conficio, oxycroceo obductas; & sindone rubro coopertas, vel sine sindonis cooperitura. Hoc autem expertissimum est remedium, vt expertus sum etiam in adultis. Vna autem rotula maneat affixa per quatuor pluresue dies, antequam amoueat, deinde altera apponatur. M. Iohannes Tiengius, medicus percelebris Amstelrodamenis, accipiebat pecias tres rotundas ex panno lineo; primam magnitudinis denarii, secundam ad magnitudinem quadrantis; & tertiam ad magnitudinem medii stufi; inungendo primo cum oleo ouorum, & ita rotulam vnā ponendo supra aliam, & vltimo emplastrum glutinans quale sequitur, ducendo supra alutam; & inungebatur omnibus tribus diebus semel, postea omnibus sex diebus; ac diligenter ligabatur, supra ponendo plumaceolum aptum supra ventrem, ita vt vmbilicus nullo modo eminere aut exire posset, vsque ad perfectam curationem: & ita puerum duorum vel trium annorum, affectum magna eminentia vmbilici, curauit. Nicolus cap. pro-

prio de eminentia vmbilici, posuit aliqua emplastra huic malo propria, quae partes relaxatas constringunt, & solutas conglutinant. Ex duobus vnum hoc modo Tiengius parare iussit: Gummi Arabici, drag. mastich. boli Arm. sanguinis dracon. glutinis pisc. glutinis ex corio boum ana 3 ij. thuris 3 ij. picis Graecae 3 j. picis naualis 3 ij. mumiae 3 ij. glutin. carpentariorum 3 l. Item, contere semen psyllii, infunde ipsum in aquam pluuialem, decoctionis cauda equina & consolida, & dimittatur in ea, donec incrassetur & pinguescat, cui deinde superadde puluerem squinanthi, gallar. balauft. psidiae, & nucum cupressi. Item, liquefiant pix naualis & Græca ad ignem, & cum liquefacta fuerint, addantur glutina; & eis calfactis, postea adde aquam psyllii cum pulueribus; quibus incorporatis, deponatur ab igne, & cum infrigidari ceperint, fiant ex eis magdaleones, manibus prius oleo ros. inunctis, vel ceratarium. Et cum necesse fuerit, extendatur ex eo in aluta talis quantitas, vt totum locum affectum contineat, & vltra circuitum comprehendat.

SCHOLIA.

Ceterum vmbilici apostema, vel inflammatio, si pueris contingat, non sub genere rancidis continetur, nisi fiat relaxatio vel ruptura. Constat idcirco ex Galeni verbis; istiusmodi inflammationis causam nonnullam obuenire ex praecisionis vmbilici incommodo; aut ex eiusdem aliquo dolore, aut ligatura perperam facta, ex quibus deinde humores facillime ad locum affectum confluant. Rhazes hic planctus, ululatusque, & vociferationes, aut russiculas immoderatas, item casus, percussionesque pro causarum origine ponit. Sunt, qui vmbilicum tumere nonnunquam velint, propter otiosum aliquem humorem, siue materiam aquosam, delapsam ex ligatura & praecisione istic retentam. Natura enim, quae priusdem lotii materiam huc deferbat, foetu adhuc in utero existente, istiusmodi operis nondum oblita; nunc vero ob impedimenta modo dicta, id praestare non potest; quare locum illum nonnihil tumescere, in confesso esse omnium fertur. Idcirco mali huiusmodi notae nulli non sunt obuia, exactius etiam rem ipsam perpendenti, tum eius procatarticas res consideranti. Contra malum hoc Auicenna vnum singulare excogitauit remedium, quo communiter vtiliceat: recipitur enim nardi Celtica semiuncia, quae contrita, & cum terebinthina resina 3 ij. commista, deinde cum oleo sesamino, siue amygdalarum dulcium, aut in forma epithematis aut vnguenti administratur. Nos possemus stuppiam eiusmodi rebus infusam vmbilico dolenti apponere. Sunt, qui in priori forma applicari doceant, aut emplastri vel epithematum vice composita, cerussam lotam, & lithargyrum, cum oleo sesam. & terebinth. resina. Rhazes lupinos amaro, & pecias panni linei, comburi docet, deinde vero cum vino profundi, atque stuppa injecta vmbilico imponi. Vult praeterea, flexilem vmbilicum iuxta oras eius cauterio curandum esse; minime tamen hoc in loco flexili attendandum esse; ob nimiam cutis eius tenebritatem. Haec libuit, hic

Vmbilici
tumor.

6
Umbilicus in-
decere promi-
nent.

Signa.

7
Curatio ex
Paulo.

interferere ex Sebastiano Aulrio de apostemate, inflammatione, & tumore umbilici, qui tamen diuersus est affectus ab exomphalo, vel exomphalocoele, de quo malo nunc agimus. Umbilicus (teste Paulo Aegineta lib. 6. cap. 51.) indecore prominere solet, quod vitium Græce exomphalon dicitur; interim membrana, qua abdomē finit (peritonæum appellauit,) illic dirupta, ac procedente, aut omento, aut intestino; interim colluuiē otiosi humoris sub umbilico contracta; interim vero carne subnata; aliquando vero sanguine irrumpente, propter venæ, aut arteriæ rupturam, ut in aneurismatis; interdum non sanguine, verum spiritu solum irruente. Si igitur omentum prociderit, circa umbilicum tumor concolor, mollis tactu, indolens & inæqualis apparet. Si intestinum prolapsum est, præter commemorata, etiam inæqualis magis tumor est, & digitis impressis cedit, euanesceitque: nonnunquam strepitum elidens, balneis & distentionibus magis increfcit. At si humor collectus est, mollis similiter tumor apparet; pressus autem non cedit, neq; decrefcit, neque tamen augetur. Quod si autem accedat superiorib. signis, ut tumor sit liuidior, carneque subnata durior, etiam tactui renitetur, & eadem in magnitudine manet. Si ex inflatione eminet, tumor mollis ad tactum subsequetur, qui digitorum impulsu sonum quendam reddit, & pressus aboletur. Quomodo chirurgia curetur, postea docebimus. Quoniam vero nonnulli etiam medicamentis in naturalem statum redierunt, ipsa hoc loco dicemus. *Aluminis scissilis ℥ v. flocium vini, seu fecis vini ℥ viij. rosacei x. galle immature ℥ ij. vino diluta, & in mellis spissitudinem redacta, loco affecto inducuntur. Extrinsecus spōgia posca madens superiniicitur, & fasciola deligatur. Aliud. Lomenti galle, balaustii pares portiones coquantur in aqua: ubi dissoluta fuerint, tritaq; diligenter spongia, ut prædictum est, imponuntur. Aliud. Plumbi scobis, ℥ xvj. cicuta, manna, cerussa, hypocistid. succi ana ℥ j. vino dissolutis, in modum prædictum utitur.*

OBSERVATIO XXIX.

De umbilico eminente ex multitudine ventositatum.

1 **E**Minet aliquando umbilicus ex multitudine ventositatum, quæ congregantur inter superficiem conuexam intestinorum, & concavam ipsius umbilici, quæ ibidem multiplicatæ vniuersæ atque coarctatæ in partibus umbilicum integran-
tibus, propellunt eundem exterius, & vocatur a Neotericis Hernia umbilicalis, quæ aliquando in tympanite fieri solet, vel ex alia causa, in colico ventoso. Ita istis diebus quidam ventrem tumidum habens, ut ad tympanitem inclinaretur, umbilicum valde prominentem habebat, & extuberantem, cui aderat mollis tumor ad tactum, quique digitorum impulsu sonum quendam reddebat, & pressu abolebatur. Eius enim aduentus, ut alii referunt, facilis est & festinus, ob ventositatis mobilitatem; cum & in partibus umbilici sonitus & gurgulatio quædam percipiatur: facile enim fugit a comprimente, & facile redit vento-

2 sitas in locum, unde propulsa est. Remedia statim adhibui, qualia in tympanite scripsimus conuenire, quæ ventositatem resoluunt; corpore repurgato prius, cum diaphœnico soluto in decoct. florū chamomillæ; etiam appositis sacculis carminantibus ventositatem, quales retulimus de hernia ventosa. Sæpe infantes & pueri hoc malo tentantur, & facile curantur. Nam ex solo sacculo, parato ex fursure, milio, floribus chamomillæ, cumino, & ruta ac calamentha, adiectis sem. fœnicul. petroselin. ammeos, curauimus.

SCHOLIA.

QVinque species herniæ umbilicalis ab aucto-
ribus ponuntur, etiam a Paulo, ut iam diximus. Aut enim descendit intestinum, aut omentum, aut repletur umbilicus aquositate, aut spiritu, aut caro innascitur. Possunt & simul commisceri, ut intestinum & omentum simul descendat, & spiritu & simul aqua impleri, ut dictum est. Aqua vero & spiritu, ut in ascitæ & tympanite. Vidimus nos in duabus mulieribus hydropicis, quibus venter ex aquæ pondere prominebat, ut rupto umbilico, inde aqua efflueret; vna superstitē manente, altera non diu post occumbente. Causæ, quas vna cum aliis herniis participat, ex supradictis patent. Accidit enim eminentia, vel tumor notabilis, propter humiditatem multam, remollientem ligamēta umbilici; hinc relaxatio potius, quam ruptura; quæ tamen sua ponderositate & copia, ut in hydropicis, rupturam inferre possit. Ab aqua eadem signa sunt, quæ de hernia aquosa diximus: fovea non remanet ab œdemate; & ubi sola aqua est, manet fixa, curatur uti alia hernia aquosa, digestionē, euacuationē, diuersionē, & consumptionē aquositate, & rectificationē hepatis, & stomachi, & prohibentibus aquæ regenerationem; & recurrendum ad curationem ascitis. De hernia ventosa umbilici iam diximus Observatione præcedente; in qua curanda, ad Observationem tympanitis accedendum. Tertia sequitur species eminentiæ, seu herniæ umbilicalis, quæ contingit vel ob rupturam ligamentorum umbilici, vel ob omenti, aut intestini, aut vtriusque in umbilicum prolapsum. Signa iam diximus. Inter ea cognoscitur primo per dolorem euenientem tempore eruptionis ipsius, & quasi semper inseparabilem: secundo per tensionem & duritiem, in partibus perceptam: tertio per augmentum eius, ex retentione anhelitus, ad quam sequitur intumescencia intestinorum. Similiter etiam dignoscitur per difficilem impulsionem, ab extra ad intus: & hoc, quia intestina & omentum non ita facile retrocedunt, cum premuntur, sed redeunt statim, cum dimittitur compressio. Quarto remanet hæc dispositio, quasi semper fixa, in omni figura corporis, & reuolutione ad omnium differentiam positionum. Et hæc quidem dispositio, quandoq; apostemosa est; & proprie quando in nouiter natis, in quibus necesse est, abrumpi ligamentum sustentans fœtus in matrice. Cum ergo obstetrices imperitæ sunt, velut in plurib. contingit, nescientes bene nodare, collocare, rectificare ligamētum, ex con-

3
Quing. spec.
hernia umbi-
calis.

4
Causa & signa
herniæ umbi-
calis euenient
ex ruptura li-
gamentorum
umbilici.

5
Sic modo in
ruptura umbi-
lici sæpe infla-
matio, aut apo-
stema conueni-
atur.

ex consensu materierum ad locum illum, ob dolorem inflammatur vel apostematur locus; & est eminentia umbilicalis, a quibusdam apostemosa nominata, quartæ speciei. Quam quidem clare cognoscere poteris, per tumoris magnitudinem, per loci duritiem, per ruborem; quarto per pulsum in loco affecto perceptum; quinto per absentiam signorum arguentium aquositate & ventositatis. Et huius quidem ægritudinis dispositio difficilima est curatu. Primum tamen ingenium curationis pendet ex sedantibus dolorem: secundo ex diuerentibus materiam: tertio ex digerentibus & resoluentibus materiam antecedentem: quarto ex his, quæ apostema procurant, resoluendo, digerendo, & consumendo. De hac hernia & Avicenna mentionem facit, 22. 2. 3. cap. proprio De eminentia & rupturæ umbilici.

OBSERVATIO XXX.

De Exomphalo in Ileum hernia in transmutato.

I Dux mulieres de quibus diximus Obs. 21. & 22. lib. 21. nostræ. Observationem exomphalo laborantes multis annis tandem in ileon lethalem inciderunt. Prima mulier, si quæ alia, pinguis, septuagenaria, ultro 20. annos rupturæ umbilici affecta, omphalocelæ duo capita fere humana excedentem, cuius magnitudinis non vidi hactenus, gestaret misera. Tandem ter in ileon gravissimum incidit stercora per octo dies vomitu reiiciens; deum ex ileo mortua est. Altera vero item, ut prior, mulier crassissima, ab umbilici quoque rupturæ, quæ etiam multis annis portauerat, in ileon incidens ter quaterque, atque ab eodem ileo curata, ut præcedēs, vomitu quoque excrementa per os reiiciens, similiter ex foetido illo malo obiit.

SCHOLIA.

2 **Q**uanquam diu gestare possunt rupturam umbilici, quantumvis magnam, & mole excedentem, sicuti intestina prolapsa in scrotum, qui enterocelæ afficiuntur; plerumque tamen ex illis incidentes in ileum adeo grauem, ut stercora vomitu per os reiiciant, tandem moriuntur, ut longa experientia sæpe obseruauimus. Ceterum ubi rupturæ umbilici adeo excesserit, & multis annis medicamentis non cesserit, chirurgica manus adhibenda est. Vbi vero non sit adeo magna, neque antiqua, medicamenta admittit, & tunc curatur iisdem, quibus ramex inguinum; quanquam non usque adeo vehementia requirat. Hoc modo Cornelius Celsus lib. 6. cap. 12. umbilicum prominentem curat. Ad umbilicos, inquit, prominentes, ne manu ferroque utendum sit, ante tentandum est, ut abstineant; alius his ducatur: imponatur super umbilicum id, quod ex his constat: Cicuta & fuliginis, singulorum p. j. cerusæ elotæ p. iij. plumbi eloti p. viij. oleis duobus, quibus etiam solani succus additur. Hoc dilutius impositum esse oportet, & interim conquiescere hominem, cibo modico uti, sic, ut vitentur omnia inflantia. Quomodo Neoterici hunc affectum curent, scholio Obseruat. xxix. præcedentis diximus. Si enim tantum sit relaxatio, constringentibus, ut reliquæ relaxationes, curentur: rupturæ vero etiam consolidantibus, ut de herniis antea

copiose scriptum est, prius reductis intestinis, & omento, appositisque emplastris aptis, & subligaculis probe iniectis. Aliquando adeo sunt magnæ & antiquæ, ut sectionem requirant, & chirurgiam, modo eam ferre possint: at in decrepitis & senibus, eiusmodi curatio periculosa existit. Paulus Aeginet. lib. 6. cap. 51. chirurgiæ hanc formam præscribit: Hunc, ait, in modum curabitur. Erecto homini iubemus, ut spiritum contineat, quo in omnem partem distendatur: deinde omnem umbilici excrecentiam orbiculatim atramento scriptorio notabimus, resupinatoque homine, scalpello tumorem, qua nota atramenti est, exasperabimus: deinde medium hamo eleuatum, lino aut neruo, qua exasperatio est, circumadstringemus (hoc enim pacto continebitur, ne deuoluatur) ansula supra nodum ponentes, postea tumore constricto iuxta verticem ad apertum, digitum indicem demitteamus, tentabimusque diligenter, num intestini implexus, aut pars omenti simul fuerit constricta. Ac si quidem intestinum fuerit constrictum, laxata funiculi ansula, id introsum pellemus: si vero omentum sit, eo retracto, quod superuacuum est, & amputabimus vase, quod (ut verisimile est) coincidit, deligato: mox duplici acu simplex linum ducentes, hiantia per incisionem cutis factam traicetamus, & ansulis linorum præcis, quemadmodum in aneurysmate dictum est, ex quatuor initis constrictionem moliemur. Vbi corpora lino demicta computruerint exciderintque, medicamentis in linoleo illitis curatio absoluetur, si cauam magis cicatricem fieri semper cupiamus. Hæc quidem ad omenti, & intestini affectum pertinent. At si caro, aut humor, aut sanguis vitium crearit, tumoris medio circulatim præciso; deinde eo, quod incumbit extra peritonæum sublato, curationem in umbilico carni generandæ dicam tentabimus. Porro si umbilicus emineat, aut ex venæ adapertione, aut spiritus interpositu, attingi non debet, quemadmodum etiam aneurysmata. His addemus historiam Beniuenii, medici expertissimi, de hernia carnosa umbilicali curata, in libello suo de abditis morborum causis, capite 6. Commune, inquit, omnibus umbilicum ad decorem prominere: monstruosum, si promineat ultra quam decens sit. Iohannes Binius filium habuit octimestrum, cuius umbilicus digitis quatuor excreuerat ad penis similitudinem, coles enim testiculorum tunica iunctus videbatur, a quo etiam spiritus erumperebat interdum. Hunc cum plures Medici intuisissent, & ex his alii intestinum eo erupisse indicarent, alii omentum, alii humorem, nos in carnem in illo loco increuisse dicebamus. Cui sententiæ pater cum inhaesisset, puerum curare cepi. Sed quod austeritate eorum mouebat, qui propter spiritum, quem inde erumpere interdum diximus, intestinum illud esse dicebant, rescanda ne mihi esset caro illa, & id ipsum ferrone, an igne potius faciendum, plurimum adhibebam. Verum certa tandem ratione subnixus, vinciri carnem decreui: singulisque diebus arctius deligans, non prius desisto, quam ea ipsa premortua penitus exciderit; ac puer subinde integram validitudinem

Exomphalo
pud. Aeginet.
quomodo chi-
rurgicatur

Historia qua-
tuor ex Beniue-
nio.

5

nem

nam recuperaverit. Idem cap. 5. Mulierem vidimus sexagenariam, cuius intestina ex vena umbilicali subito prolapsa sunt, nullo presidio conferente tertio die vitam finisse. Vidimus & aliam, de cuius vulva pariter disrupta intestina omnia profluxerunt, paucis item diebus occubuisse. Insuper & tertiam novimus, cuius intestina perfracta eorum tunica, a summa umbilici cute, tanquam in sacculo, dependebant in vulvam. Hac autem miseram quidem, sed tamen longiorem, vitam ducens, vna cum hoc malo consenuit. Nunc tempestivum est, ut huic libro finem imponamus, transeuntes ad librum Gynæciorum, hoc est, de affectibus, tum morbis mulierum, gravidarum, parientium, & puerperarum; atque hinc ad uteri affectus generandi, rationem, & quæ conceptus iuvant, ad morbos mulierum peculiares progrediendo.

FINIS LIBRI XXVII.

LIBER VIGESIMVS OCTAVVS, DE MVLIERV

MORBIS ET AFFECTIBVS.

OBSERVATIO I.

De mensibus, seu menstruis purgationibus retentis.



MATRONÆ nobili annorū 25. cum longo tempore menstruæ purgationes essent retentæ, corporis gravitas superuenit, ac nausea & cibi fastidium: quæ cum somnolenta euaderet, & ad omnem modum segnis, a pituita copiosa & venarum ora obstruente conieci, menses tam dudum constitisse. Nam colore candida apparebat; subinde & plumbei coloris; pituitam assidue exscreabat; & ut ac eadem intellexi, etiam eandem aliquando euomebat; vrina insuper erat aquosa. Hæc cum in ea animaduertirem, & consilium a me peteret, ut consueto more fluere possent, cum iam tribus annis eas ipsas non experta esset; & ad cachexiam inclinata esset, temperamento naturali etiam pituitosa, curationem hoc modo institui a pharmaco materiam pituitosam minuente: ℞. pilul. de hiera simplici, pilul. mastichinar. de agarico, ana ℥ j. excipiantur aqua artemisia, & fiant pilule viij. quæ circa noctis dimidium sumebantur. Deinde bis in die capiebat ex hoc clareto: ℞. rad. petros. feniculi, apii macerat. in vino albo (acetum nocet vtero) ana ℥ j. rad. rubia tinctorum, seu erythrodani, valeriana, ana ℥ ℔. rad. pæonia ℥ iij. artemisia, pulegii, chamad. chamapit. melissa, calamintha, ana m. j. thymi m. ℔. florum rorismarini p. j. anisi, dauci, feniculi, ana ℥ j. ℔. seminis carthami ℥ ℔. polypodii querc. ℥ j. coquantur in aqua communi pro ℔. j. ℔. colatura adde syrupi de artemisia, de byzantiis sine aceto, de eupatorio, ana ℥ j. adiecto saccharo albis. pro sapore delectabiliore, aromatizetur ℥ iij. cinnamomi selecti, & fiat clareti instar. Cuius ægrotus bis in die capiebat cyathos duos, vnum mane, & meridie hora quarta alterum. Deinde illam purgavi cum pharmaco sequenti, quo magis se dele-

ctari dicebat, quam pilulis: ℞. benedicta laxat. elect. hiera picra, diaphœnici, ana ℥ ij. agerici trochis. ℥ ℔. dissolue cum decocto artemisia, pulegii, ad ℥ iij. addendo syr. de artemisia ℥ j. misce. Sumit summo diluculo, & septies aluum excreuit. Die sequenti in diluculo exhibita fuit ℥ j. theriaca veteris cum ℥ ij. vini albi. mane, inquam, sex horis ante cibum. Cum humor ille vnica purgatione expurgari non posset, rursus mense proximo sequenti clareto repetiimus, ac eandem purgavi hoc medicamento sequenti: ℞. diacatholici ℥ vj. elect. indi maioris ℥ iij. syr. capill. ven. de artemisia, ana ℥ ℔. cum ℥ iij. decocti melissa, pulegii, artemisia, fiat potio sumenda mane hora 4. matutina: qua & aluum copiose deposuit. Post geminam purgationem, consului, ut altero die sequenti balneo se lauaret: ℞. artemisia, folior. lauri, conyza, origani, maiorana, melissa, nepita, chamad. chamapit. thymi, pseudonardi, seu laundula, rorismarini, ana ij. flor. chamameli, meliloti, flor. rorismarini, sambuci ana p. ij. baccarum uniperi, latri, ana p. j. sem. lini fenugraci, ana ℥ j. coquantur in aqua q. s. pro balneo; in quo sedeat, & aliquam portionem herbarum, tum reliquiarum dictarum, ponat in sacculum, quem supra ventrem intra umbilicum & pectinem detineat. Illudq; balneū continuetur mane per quatuor aut quinque dies; & in eo moretur optime calfacto, si potest, per horam vnā. Et cum ex eo egredietur, vngantur venter infra umbilicum, inguina & pecten, parsque posterior ei opposita, & renes, calido hoc vnguento: ℞. olei lilior. amygd. dul. butyri recentis, medulla cruris vituli, ana ℥ j. olei irini, amygd. amar. muceag. albae, sem. lini, fenugraci, ana ℥ ij. succi ruta, artemisia, ana ℥ ℔. cera q. s. fiat vng. melle. quo vngantur partes dictæ, sequē mox in lecto componat; acumat rursus tunc theriacæ veteris ℥ j. cum iure cicerum. At cum illa se a lorione in balneo excusaret, imperavi, ut saltem dicti decocti fumum per infundibulum reciperet. His peractis, appetente tempore eruptionis, nempe primo quadrato lunæ, consului, ut venam in talo incideret. Observatum enim est, ex quadrato lunæ motu fœminas pro ætate purgari: primas purgationes quadrato primo ex adolescentia; ultimas ex quadrato ultimo, desinentibus mensibus; reliqua media ætate pari modo ex secundo & tertio expediri menstruas purgationes. Ex quib. naturalis collectio excipitur, iuuenibus novilunio missio sanguinis utilis est; senibus vero senescente luna conuenit. At cum hæc mulier albidior ac carnosior esset, venæ non apparebant. Ideo, ut infra femora adhiberentur cucurbitulæ cum scarificatione iussi. Vbi frigidi abundat succi, & frigida sit corporis intemperies, cum crassis & frigidis humoribus; post præparationem & purgationem, etiam hic sanguinem emittere ex malleolis cōuenit. Nō tamen in multa copia, vena incisa, vel adhibitis malleolorum scarificationibus; potissimū si mulieres albidiores ac carnosiores fuerint. Eæ enim paruas in cruribus venas habent, & sanguinem asseruare tenuem solent; iuxta Gal. sent. lib. De curat. per vena sect. Post adhibitas illas cucurbitulas, alias iam dictis remediis præcedentibus, menses aperti

aperti fuere. Ego in his, quæ albæ sunt, & pauci sanguinis, quoties inciderunt in eam obstructio- nem, vt suppressi vel imminuti sint menses, vtor sac- rificatione crurum, & corniculis trahentibus: nec parum conferre vidi. Si hic non iuisset, deue- nissem ad decoctum ligni Indici, admiscendo di- ctamnium. Sic alias Iacchinus doctissimus lignum Indicum coxit, & dictamnium adiunxit; vnde mu- lieri toto quinquennio non purgatæ, ac sterili, pur- gationem euocauit; vt & deinde conceperit.

S C H O L I A.

H Actenus de membris genitalib. maris dictum est, & de eorum symptomatis & affectibus: nunc vero de membris generationis in fœminis differendum est, deq; vteri symptomatis & mor- bis. Habet enim & sortitur vterus varia sympto- mata, quæ eidem propria sunt. Vt, mensium sup- pressio, profluuium, stillicidium; albus fluor vteri- nus; gonorrhœa duplex; vteri strangulatus, ascen- sus, descensus, prolapsio, & conuulsio; hinc furor, dolor: adhuc quoq; sterilitas, abortus, aliaq; vterû gestantis incommoda. Iam quoq; varii alii morbi vterû obsident; mola, inflatio, hydrops, calculus: & in ceruice rhagades, condylomata, & hæmor- rhoides. Frequentissimum malum est, cum men- strua subsidunt, aut intempestiue abundant. Al- bum quoq; profluuium crebro eas consumit, aut saltem odiosas reddit. Omnium periculosissima sunt vuluæ dolores, inflammationes, vlcera, car- cinomata, vomicæ, atq; epiphoræ: conuersiones letiferæ sunt, quas strangulationes vocant, & quo- tidiana tormenta. Vulua interdum contrahitur, vel concitata misere procidit. Vulneratur eadem interdum. Quæ omnia ex mala fere membri habitudine contingunt. De iis omnibus in hoc libro dicemus; & omnium primo de mensium suppressione. Ceterum vterus, idem *mater* ab Ae- tio dicitur, & *hystera*. Mater quidem, quod omnia animalia inde tanquam a matre oriantur: hystera autem, quod omnibus visceribus hystera, *id est*, posterior sita sit. Iacet enim vterus inter membra- nam peritonæum vocatam & vesicam, rectumq; intestinum. Sed hæc ad anatomen pertinent, tum situs eius ac figura, tum reliqua, quæ ad totum v- terem pertinent. Vide Gal. *de vsu partium*, & quæ Aetius breuiter recenset. Vterus ad concipiendû, ad vsum Venereorum, ad semen recipiendum re- tinendumq; fœtus incretum, atq; perfecti eni- xum, opportune ventri subiectus fuit: vt ad lōgum legere possumus apud Gal. *14. de vsu partium*. Et quia mulier viro frigidior, ideo easdem partes ad generis instaurationem intus habet, quæ in viris extra sunt fabricatæ. At excrementa, quæ in ipsis mulieribus redundant, seu redundans sanguis, ad omnium infirmissimas partes (*quæ genitales sunt*) feruntur. Mittuntur namq; menses in venas, quæ vtero committuntur, & non attrahuntur: nimi- rum cum vterus ad delationem eorum nihil con- ferat, vt *5. de simpl. medic. facult. testatur Galen*. Qui quidem sanguis fœminis ipsis, antequam conci- piant, singulis mensibus purgatione salubri eiici- tur: vbi vero iam concepere, alimentum fœtibus

accommodatum euadit. Diximus paulo ante, quod mulierum natura frigida & humida præ vi- rorum esse debuit: hoc certe ad generationem conducebat; vt vnde alterum principium, quod maxime pro materia est, deciditur. Sed & in socie- tate maris & fœminæ alterum foris, hoc est, ma- rem negotiari oportuit; alterû domi, hoc est, fœ- minam, liberos alere, & rem familiarem seruare. Ob has igitur causas, facile fœminæ copiam crudi sanguinis & excrementosi acervat; vt, qui per exer- citationes non absumatur, & per naturam ob ca- loris infirmitatem, plurimus gignatur. Hinc pro- uida natura viam quâdam inuenit, qua corpus se- se exoneraret, statis quibusdam temporibus, id est, lunaris cursus spatio: sæpius vero ipsa decrescente, vt annotauit *Aristoteles*. Sed vt solet natura, cum excrementa purgat, etiam iis in aliquam utilita- tem interim abuti; sic & vterus interim eo sangui- ne nutritur, quicquid in eo alimenti est hauriendo, reliquum vero pellendo. Rursus & ad conceptio- nem vitur. Hinc enim alterum principium ha- betur, vnde concipitur fœtus, augetur & alitur, dum est in vtero. Ex quibus fit, vt si hæc purgatio præter naturam sistatur, mulieri multa mala eue- niant; testante Hipp. *5. aphor. 57.* cum scribit: *Mu- lieri si menstrua defecerint, mala insequuntur*. Sunt autem hæc, primum vtero propria, mox & com- munia vniuerso corpori. Eueniunt autem non modo, si supprimantur, sed etiam si minuantur plurimum. Ac primum destituitur conceptione: hæc enim vna est e causis sterilitatis maxima. Vn- de quibus per ætatem, aut non adhuc accedunt, aut desiere non concipiunt. Dum autem fluunt, quantum ex hac parte, semper possunt concipere. Aristoteles tamen voluit, mulieres quasdam esse, quæ concipiant, etiam si non fluant menses; vt quibus non plus sit sanguis, quam aliis, restet a purgatione. Sed haud scio, an id ex principiis Ga- leni admitti queat. Constat tamen, multas conce- pisse, antequam passæ essent menstrua. Præterea vteri strangulatione vexantur, vt de causis eius dicemus; & scirrhuso tumore, & cancro, & erysi- pelatis; & aquositate replentur; & flatibus, & vlce- ribus prauis gracilescent; & quædam præter mo- dum; vt mulier illa, de qua Gal. scribit *6. Ep. 3. 29.* mutantur in viros fœminæ. Adde partes, quæ in consensum veniunt: caput primum *6. Epid. 1. aphor.* & oculi, & ventriculus male affectus; demum & iecur; vnde & hydrops aliquando consequitur. Sed de his suo loco latius. Fluere autem incipiunt mulierum plurimis menses circa *14. annum*, iuxta Aetii & Pauli sententiam: paucis vero ante decimum tertium, aut duodecimum: plerisque autem post decimum quartum erumpunt, & e- iusdem Pauli testimonio. Quo etiam tempore & pubescunt mulieres, & mammæ ipsis intume- scunt. Et sic mensis purgatio est naturalis: (*nisi vel quantitate excedat, vel præter statas periodos ef- fluat*) & statim tempore incipiunt & desinunt, se- cundum naturam. In aliis, vt dixi, citius erum- punt duodecimo, decimo tertio, vel decimo quar- to anno; aliis rursus non ante vigesimum, ob

Quando menses
fluere incipiunt,
& quando desi-
nunt.

ri sympto-
ta, & vari-
etatis ac mor-

Quare vterus
matrix vel ma-
ter dicatur.
Vide Aetium
lib. 16 cap. 1. de
situs, magnitu-
dine, ac reliqua
vteri forma-
tione.

Vnde menses

6 pituitam & sanguinis paucitatem. Aliquibus nunquam, *vt Aristoteles meminit*. Desinunt vero 40. aut paulo post; idque in aliquibus. In aliis non ante 60. & hoc pro copia vel defectu sanguinis. Quæ enim multo sanguine & calido abundant, citius frequentiusque purgantur. Quæ vero crassum, vel lentum, vel paucum habent sanguinem, tardius & partius purgantur. Iam quoque maiorem copiam efficiunt ratio vitæ plenior, otium, temperamentum frigidius, tenuitas sanguinis, vel acrimonia; amplitudo vasorum, quæ plurima & maxima ad vterum perueniunt. Aliis singulis mensibus, nonnullis vno aut plurimis mensibus intermissis, quibusdam sæpius vno mense redit purgatio. Non tamen cunctis eodem tempore, eademque mensura, & per totidem dies prodeunt. Nam multis ad duos tresve dies, non paucis vsque ad quintum profluunt: aliis etiam vsque ad septimum: raræ vero ad duodecimum purgatæ sunt. Quæ plus habent sanguinis, ad quinque vel septem dies purgantur. Plerisque etiam minus duarum heminarum mensura quatuor dierum spatio, interpositis duobus viginti diebus, aut ad summum triginta, singulis mensibus deferuntur. Sanæ igitur mulieri (*inquit Hippoc. de morb. mulierum*) sanguis menstruus exit victimæ iugulæ sanguini similis, rubens. Effluit autem duarum heminarum Atticarum mensura. Quæ non, *vt Fuchsius Aphor. 30. lib. 5.* olei mensura æstimanda est, sed sanguini; vt redeat circiter ad tres semisextariolos Lutatianos; *vt refert Hollerii interpres*: natura tamen, ætate, & similibus perpenfis, idq; diebus iam dictis. Initio vero & fine pauciores & tenuiores sunt purgationes; intermedia purgatione, plures & crassiores, præsertim vbi multæ fluunt. *Aristot. cap. 2. 7. Histor. animalium*, moueri scribit, decremento lunæ; & hac crescente colligi: vnde cauillo sexum fœmineum lunæ tribuunt. Aliter tamen sæpe experimur. Iunioribus vero, vt alii volunt, ad lunæ pleniluniam; aliis vero decrecente. Hinc versus:

Luna vetus veteres, iuuenes noua luna requirit.

8 Solent autem erumpere plurimis, cum vbera ad duos digitos prominent, & vox in grauiorem mutatur; quo tempore ad vsum Veneris maxime incitantur: sunt enim per id ætatis nobiles; nempe 14. anno, aut 11. vel 12. vt diximus: Sed hæ sunt vitæ breuioris; vt quibus erumpunt tardius, viuunt diutius. Testatur tamen Syluius, se ex Iohanne Capella, seniore medico Francisci Regis, vnde quaque doctissimo, intellexisse, visam ab illo puellam annorum nouem vterum gestasse. Simile etiam affirmat Sauonarola. At iuxta Paulum & Aetium 14. anno primum fluere, antea dictum est. Porro, inquam, desinunt menses plerisque anno quinquagesimo: paucis vero vsque ad sexagesimum durant: nonnullis, præsertim obesis, a trigesimo quinto anno menses cessare incipiunt; *vt eisdem auctoribus visum est*. Ceterum sanguinis qui profluit copia paulatim vsque ad vigorem ætatis augefcit: deinde aliquandiu æqualitatem seruans, paululum penitus crescit, aut minuitur. At

Quando incipit primo occurrere purgatio menstrua.

Quando desinit.

vbi ad finem tendit, paulatim rursus minuitur, donec in totum desinat; *eodem Aetio teste*. Dicimus itaque, præter naturam sisti, aut imminui, quoties primum extra statuta tempora hoc accidit: quæ tamen terminos certos non habent; sed pro naturarum varietate euariant. Sed postremus terminus cessationis est, annus quinquagesimus: vnde & in eo aliquæ etiam nostra ætate pepere-runt. Breuiter, aliis aliter naturalis purgatio cessat, 40. 45. 50. aut 60. ætatis anno; pro copia videlicet, *vt dictum est*, vel defectu sanguinis. Quod si vel post decimum quartum incipiant, vel ante annum quadragesimum quintum cessent, ex aliqua causa præter naturam id fieri, censendum est. Fit vero etiam varietas multa, non in celeritate apparendi solum & duratione; sed & in copia effluuii maiore, vel minore: idque ex naturarum diuersitate. Dicebat enim Hippoc. 6. Epid. 1. aph. 7. aquosis mulieribus diu menses durare; & ni crebro fluant, intumescere: per aquosas mulieres intelligens præhumida præter naturam corpora; quæ sæpenumero frigidiora etiam sunt. His igitur, inquit, diu purgationem hanc durare; seu intelligas, per multam ætatem fluere, seu quod singulæ periodi multum temporis occupant. His ergo, cum secundum naturam fiant abundantiore, colligendum est, quod contrario modo affectis, id est, calidis & siccis, partiores sunt. Horum vero ratio est, ex his, quæ ab initio posuimus, quod illæ plurimum sanguinis acervant, & cum eo plurimas cruditates; hæ vero minimum. Et quidem ita fieri videtur, vt viragines & calidæ mulieres quam minimum purgentur, præsertim si multo vtantur exercitio: contra vero humidæ, siquidem omnia secundum naturam se habeant. Quod addo, quoniam calidæ siccæ, vt etiam Iacchinus doctissimus dicebat, si bili multa abundant, & ita cacochymia teneantur, ob sanguinis acuitatem & tenuitatem, plurimum purgantur: quoniam non absumitur in corporis alimentum: contra vero humidis sæpe venæ obstruuntur; itaque aut non, aut ægre purgantur. Subdit Hippocrates: *Et nisi crebro profluant, intumescunt*. Sic clarius legitur, Iacchino teste, *quam celerrime*: volens significare, vnum ex morbis, qui his naturis succedunt, esse hydropem, *vt supra explicauimus*. Tum & pinguibus per naturam exigua purgatio fit, quia angustas habent venas, & pauci sanguinis, vnde & non concipiunt. Sed cur, *dices*, ante 14. non fiunt? an quia magna copia in augmentum absumitur? vnde & aliquibus, quæ diu augentur, plurimum etiam tardant; & illis forte tarditas non erit præter naturam. Hoc nosse oportet, vt sciamus, & quæ sint corpora, quibus noceat tarditas, & quibus prouocationem tentare debeamus, ne imprudenter tentemus id, quod fieri non possit. Cur vero post quinquagesimum annum, vt plurimum non fiant, causa est caloris diminutio, ob quam & sanguis non adeo abundat in venis; & si abundet, non est ea vis naturæ, vt per longinquas partes possit expurgare, & per venas angustiores trudere, earumque ora aperire. Vnde quibusdā ad sedem effluit quibusdam

10

Quare ante 14. annum purgatio menstrua non fiat.

Cur non post 50. annum.

quibusdam ad aliam partem, si forte per naturam redundet: & sunt eæ viæ faciliores. Cum itaque mulieres menstrua purgatione omnino carent, vel naturale est, vel præter naturam Naturale quidem, quantum ad ætatem attinet (*vt diximus*) si vel infra 14. vel ultra 50. annum. Tum & aliis modis: nam prægnantibus secundum naturam menses supprimuntur, quoniam absumitur in fœtus alimentum omnis sanguis, qui abundat. Quamobrem & menses tunc effluere præter naturam est, & debilitas fœtus significatur, & abortus, *vt Hippocrates 5. aphor. testatur.* Quamvis quibusdam sæpe sanguis sine noxa effluat, vt si abundet: nec obstat, os vterico tempore prorsus esse occlusum. Id memini euenisse vxori Domini Præsidis Hollandiæ Cornelii Susii, quæ tamen non est passa abortum: potest enim ex vteri cervice effluere. Aliud tempus cessationis est a partu. Multæ enim duas vel tres periodos intermittunt: quod accidit ex multa purgatione in partu facta, vnde corpus est copia inanitum. Nam & mulieribus lactantibus supprimuntur menses, citra noxam aliquam. Similiter & cantatrices & saltatrices, quoniam quicquid in eis superfluum est, nimia exercitii vehementia consumit, non purgantur: & in summa (*vt inquit Aetius*) mulieres calidioris naturæ & temperaturæ, & fortibus exercitiis vtentes, & agrestes, parum purgatur. Supprimuntur etiam secundum rationem, vt extenuatis, longam inediam passis, longosque morbos. His ergo non est, quod tentemus prouocationem. Atque facile cognoscimus: an secundum naturam menses supprimantur; quoniam mulier nulla inde molestia, vel totius corporis, vel vteri, afficitur, *vt inquit Aetius.* Atqui non de hac, sed de ea mensium suppressione nos proprie loqui intendimus, quæ præter naturam existit in quapiam præternaturali causa orta, vel totius corporis vitio, vel vteri & partium eius proprio; vt exemplis etiam subsequenter ostendemus.

OBSERVATIO II.

De menstrua purgatione subito retenta.

1 ANNO 1581. Margareta Godefridi, Delphis, cum sororis eius filius, quatuor aut quinque annorum, in aquam incidisset, & viri adstantes statim puerum non extraherent, ipsa in aquam saltauit, & fere cum puero aqua obruta ac suffocata fuit, nisi duo viri tam illam, quam puerum extraxissent. Ad hanc euocatus sub noctem 14. Maii, cum ipsa circa præcordia valde afficeretur; (nam & menses ei profluebant dum in aquam saltaret; arque illi tunc subito restricti præcordia valde infestabant) statim, vt sudor prouocaretur, decoctum sequens propinaui: *℞ decoctionis aqua florum chamemeli ℥ ij. oxymellis simplicis ℥ j. misce.* calide cum ebibisset, in lecto vestibus bene cooperta egregie per rotam fere noctem sudauit, & vna menses suppressi statim debite fluxerunt; ita vt deinde aliis remediis opus non fuerit. At famula cuiusdam zythepæ, seu ceruisiarii, paulo plus quam annos viginti nata, cum consuetas purga-

2 tiones mensuris haberet, & nudis pedibus pauiummentum aqua detergeret, tum scopis purgaret (*vt hic sæpe fieri assolet, quia nostræ Batavæ mulierculæ valde munditiei intentæ sunt, & curiosæ, vt omnia niteant*) subito menses eidem retracti fuere, & longo deinde tempore consuetis periodis non fluxere: vnde & nauseabunda cibos fastidiebat; & circa lumbos tandem, tam scapularum capitique & totius corporis dolore, tum gravitate corripiebatur. Hæc cum lotio consulandi causa me accessit, quod crudum erat: & ideo de inappetentia, & nausea, ac cibi fastidio, tum dolore circa ventriculum iudicaui. Sed causa ab eadem intellecta, quod menstrua purgatio hoc modo retenta esset, neque aliquot periodis fluxisset; cum viderem, famulam hanc nequaquam opulentam esse, vt sumtus ferre posset, atque Galenus nos docuerit 6. *De medic. compos.* quod secundum agrotantis possessionem, opulentiam, aut pauperiem, medicamenta pretiosa, vel parui valoris a Medico sint præscribenda; ideo potius decoctum mihi præscribendum proposui longum, quod simul digereret, præpararet materiam pituitosam (cum talis ex obstructione in illa coaceruata esset; atque adeo pituitosa ipsa erat) & expurgaret, in quo omnes scopi curandi continerentur, & subtiliandi, & digerendi ac euacuandi simul: nam hoc modo fere aperiuntur menses. Tale itaque decoctum præscripsi: *℞ rad. apii, petros. valeriana, feniculi, ana ℥ j. melissa, artemisia, calamintha, pulegii, matricaria, ana m. j. sabina m. ℞. florum chamemeli, rorismarini, ana p. j. sem. anisi, carui, dauci, ana ℥ j. ℞. sem. nigella* (egregie menses educit, vt & eius farina in panno ligata, & supposita; vt & Gradus ac Gatenaria testantur) *℥ j. folior. senæ ℥ vj. agarici feminini albi levis ℥ ij. zinzib. albi ℥ ℞. glycyrr. ras. ℥ ℞. ruar. pass. ab arillis repurg. ℥ j. fiat omnium decoctio in aqua communi pro ℥ viij. stent infusa per noctem: mane fortiss. expressioni adde, syrup. de artemisia, de quinque rad. ana ℥ j. misce pro 2. dosibus.* Deinde impetraui, vt hoc modo purgaretur: *℞ pilul. fetidar. aggreg. ana ℞ j. agarici trochisc. pilul. mastich. ana ℞ ℞. cum syrup. de artemis. fiant pilule vj. dentur post mediam noctem.* Egregie enim conferunt semel in hebdomada eiusmodi pilulæ mastichinæ cū agar. vel de hiera simpl. cum agaric. Istis enim diuertitur materia ad intestina, ne amplius ad vterum confluant, aut in eo coaceruentur. Deinde paulo ante tempus mensium iussi, vt sanguis extraheretur ad uncias tres quatuorve, vel paulo plus, ex saphena seu talo, cum in poplite nostri chirurgi non soliti sint venam secare. Sumta etiam *℥ j. pul. dominarum, adiecto ℞ j. pul. sabinae cum vino Rhenano, mensibusq; ita apertis, recte se habuit.* Pulueris dominarum hæc erat descriptio, qua tunc utebamur; & in officina nostra Delphis apud Theodorum Clutium, qui cognatam vxoris meæ duxerat, parata habebatur: *℞ seselios, cumini, marastri, ana ℥ ij. ℞. curcuma ℥ ij. nucis muscata, calami aromatici, ana ℥ ℞. galanga, zedoaria, cassia lignea, macis, caryophyll. anthos, ana ℥ ij. cinnamomi ℥ ℞. croci ℥ j. misce.* Sed & hoc modo ab aliis paratur. *℞ cin-*

namomi electi, curcume, zacchari ana ℥ ij. zinziberis, caryophyl. macis, nuci muscata ana ℥ ℔. baccar. iuniperi, lauri, galanga ana ℥ ij. sem. zedoaria, croci ana ℥ j. misc. fiat pul. Alius pul. dominarum: ℥. rhab. ℥ ij. ℔. galangia ℥ j. rad. zedoaria, sem. fileris montan. cinnamomi, nuci muscata ana ℥ vj. macis ℥ ℔. caryophyl. ℥ ij. cumini, fœniculi, calam. arom. granor. iuniperi, baccarū lauri, anisi ana ℥ ℔. zacchari candi ℥ ij. fiat pul. Amstelrodami apud quosdam in usu erat hic vltimus. Sed primus mihi magis placet, quo commode frequenter usus sum.

S C H O L I A.

Qua pars affi-
ciatur in men-
strum suppressio-
ne.

Quia affectus
præter naturam
fit mensium
suppressio.

Causa.

Ex parte uteri.

Ex parte uteri.

Ex vitio san-
guinis.

Semper sane ipsi vtero tribuenda affectio vide-
tur, eo vel primarie, vel secundarie, & per con-
sensum affecto; etiam si totius corporis vitio fiat:
recte enim dicemus, vterum ipsum affici, cum non
perueniant ad eum ea, quæ antea, cum secundum
naturam se haberet, venire solebant. Quod ve-
ro hoc vitium sit symptoma, in genere retento-
rum immodice, liquet apud Galen. lib. de differ. & 3.
de causis symptom. Cum igitur inutiles suppressio-
nes curare volumus, a quibus de malo metus
est, inuestigabimus causas omnes, quibus sup-
primantur vel minuantur. Porro minutio est, vt
vel periodi raræ sint; vel si in tempore, vt exi-
guum sit, quod profluit. Causæ igitur aliæ sunt
ex ipso vtero, aliæ ex totius affectu. Ex ipso qui-
dem vtero, vel quia sanguinem non suscipit; vel si
suscipiat, non expellit. Ex toto vero, quoniam san-
guis ad vterum non pellitur. Quod vero non pel-
latur, aut penuria est, aut crassities eius, aut auersio
in alias partes; adde & retractoris naturam opus de-
stituere, quoniam occupatur animi vel corporis
morbo. Sic multis ob mœrorem ingentem, & ti-
morem, suppressi sunt menses: sic ob dolorem
aliquem corporis obortum. Ex parte autem uteri,
quod sanguinem non suscipiat, venarum affectio
est, vt siue frigido densentur, siue sicco squalcant
& conniueant. Quod vero non pellat vterus, ob-
structio in causa est, siue a crassis & viscidis fiat,
siue tumore præter naturam, siue cicatrice obdu-
cta post vlus, siue sua debilitate, ex intemperie
frigida oborta, aut pinguetudine. Fit & obtura-
tio contorsione oris uteri. Vnus quoque & præ-
cipuus uteri affectus retentionis mensium causa,
eius densitas atque duritia existit; siue a natura
corpus eius tale conditum fuerit; siue certo tem-
pore vterum occupauerit: angustia item vena-
rum uteri statim a principio congenita; vbi scili-
cet hac parte fœmina male est formata, aut eo-
rundem vasorum compressio, ex his, quæ circum-
iacent, facta est, cum videlicet corpus immodice
pinguescit. Nec non & eiusdem uteri intempe-
ries, vt paulo ante diximus, quædam tum natura,
tum sub quibusdam affectibus orta, suppressionis
mensium causa existit. Interdum quoque men-
ses retinentur ipsius sanguinis occasione, quo-
riens, quod vacuatur, vel crassum est, vel glutino-
sum. Quin etiam si ipse sanguis menstruus sine vi-
tio sit, sed ipsius potius inopia fiat retentio, & men-
strua supprimantur, aut quia alio auersa copia va-
cuatur, nihil inde mali suspicandum est euenire:

Proinde, neque hac ratione curam ciendorum
mensium suscipimus. Nisi quia concipere ne-
queunt, ideo tanquam sterilitatis causam tollen-
tes, menses euocamus. Ceterum in vasis, quæ ad v-
terum pertinent, si obstructio quædam, vel ob-
structio prius facta sit, sic quoque menstruum re-
tinebitur; vt Galenus testatur 3. de causis symptom. &
Comment. aphorism. 28. lib. 5. Vitio itaque, vel pro-
pria substantiæ ipsius vteri, vel vasorum, quæ ad
ipsum pertingunt, aut eiusdemmer sanguinis, qui
ad ipsum deuenit, contingit menses supprimi.
Nos autem cum Donato ab Altomari, cunctas
has causas vteri vitio provenire, fatemur: quem-
admodum etiam, si ob robur vasorum eiusdem
vteri sanguine ipso ad alias particulas delato, con-
tingat menstruum detineri, eidem vtero vitium
tribuimus. Sic si ob inflammationes, seu eius cer-
uicis distorsiones, aut peruersiones, seu callos, aut
carnis excrescentias istic exortas, aut pinguedinis
copiam, mensium purgatio prohibeatur, ad vteri
vitium referendum erit: nec minus, si pellicula
aut circa collum, aut osculum vteri fuerit adnata:
quemadmodum his accidit, quæ imperforatæ
appellantur. Siue etiam vlcera cicatrices, quæ
vasorum oscula in vtero excœcarunt, (vt cicatrix
obducta post abortum, ob quem vteri os fuerit exul-
ceratum) menses detinebunt, etiam vteri occasio-
ne id fiet. At totius etiam corporis culpa aliquan-
do prorsus, vt diximus, non purgabitur fœmina,
tum propter plura exercitia, tum propter tenuem
victus rationem, tum propter succorum ad alias
particulas inclinationem: & cum hæc ipsa medio-
cra sunt, minus, quam pro naturæ debito purga-
bitur, vt eodem 3. de causis sympt. a Galen. scriptum
est. Nos vero cunctas, tum externas, tum inter-
nas suppressionis mensium causas totius corpo-
ris culpa dinumerabimus, ab externis orien-
tes. Assiduæ igitur curæ, immodicus timor, ac
mœror ingens, menses supprimunt (teste Aetio)
item alimenta, vel infra, vel supra modum inge-
sta: nam modicum alimentum statim transpirat;
multum vero meatus obrurat, & excretionem in-
tercipit. Cibi quoque frigidi & crassi, & potus a-
quæ frigida, incrassant sanguinem, & calorem na-
turalem hebetiorem reddunt. Et sicuti nimius
calor exterior exsiccat menses, ita & frigus con-
stringit. Nimia quoque exercitii vehementia
(quoniam quicquid superfluum est, consumit) menses
supprimere valet. Item, quemadmodum ma-
gnus labor, & exercitium continuum; ita & plu-
rima euacuatio, præcipue sanguinis narium, &
hæmorrhoidum menses supprimit, hinc mulie-
res agricolarum & laboratorum partius purgan-
tur. Contra rursus nimia tranquillitas, & vita
supra modum otiosa, & exercitii omnino demis-
sio, sanguinem incrassant, & calorem naturalem
extinguunt: hinc minus per venas vteri san-
guis fluit. Internæ vero causæ sunt, calidiores aut
frigidiores totius corporis temperaturæ: calidio-
res siquidem hoc excrementum discutiunt ac con-
sumunt, frigidiores vero crassiorem ac tenacio-
rem sanguinem gignunt, vasa vteri obstruunt.

Habitus

10 **H**abitus quoque graciles, aut obesi nimium: graciles, *inquam*, quoniam nihil penitus superflui sanguinis habent: obesi vero, seu pingues, propterea, quod reliquis magis exsanguis sunt, minimasque venulas habent. Nam sanguis, qui in ipsis est paucissimus, fere in pinguedinem transit: & propterea tales minime omnium concipiunt, *inquit Aetius, auctoritate Ruffi & Aspasie*. Ob diuturnum etiam aliquem morbum (*ut & prius dictum est*) foeminae extenuatae non purgantur; vel propter praecedentem per nares aut sedem, aut quampiam aliam partem, sanguinis euacuationem: etiam per venae sectionem immodice factam, potissimum ex eubiti venis, ut quodam exemplo post ostendemus. Haec enim sanguinem ad superiores corporis partes retrahens, menstruas purgationes comprimit; *Galeno auctore de cur. ratione per venae sectionem*: Nec minus & reliqua excretionum genera; velut est multus dolor, assiduus vomitus, alui profluvia, pustularum omne genus per cutem erumpens, morbi acuti & magni; menses suppressere possunt, *ut liquet ex eodem Aetio*. Quaedam etiam (*ut ipse inquit*) ob plenitudinem non purgantur. Hactenus de causis: iam de signis, hoc prius interpolito exemplo, agemus.

OBSERVATIO III.

De Mensum suppressione, sanguine ad alias partes delato.

1 **P**vella rustica tonsorem adiuit, mense Maio, ut ex consuetudine quadam, sed peruersa (*ut apud nostros fieri solet*) sanguis ex brachii dextri venae ipsi extraheretur, cum flores suos haberet, vel tempora. Vulgares enim, suo idiomate, menstruas purgationes vocant, tempora, quod statis quidem temporibus prodeant, ita & flores appellant: quoniam, *inquunt*, ut flos fructum antecedit, sic mulieres non concipiunt, antequam menses fluxerint. Copioso itaque sanguine ex vena detracto, menses ilico retracti fuere, & substituerunt: & semper, cum periodus rediret, neque menstrua purgatio subsequeretur, in brachio eodem tempore palpitationem quandam, eamque satis molestatam sentiebat: cumque id ter quaterue contigisset, eo tempore, cum menses redire solebant, tandem consilii causa me accessit, & quomodo menses ex venae sectione illi restricti essent, narrauit, symptomate illo, nempe saltus & palpitationis, singulis mensibus eam infestante. Imperavi, ut mense sequenti, cum illam palpitationem persentiret, venam in talo (*saphenam vocant*) incidere iuberet, & sanguinem ad uncias quinque, vel plures effluere sineret; cum rustica, & satis robusta esset. Ea sectione peracta, menses statim fluere coeperunt, symptomate illo ablato; singulisque periodis exinde redierunt more solito, & recte curata fuit. Eodem modo & monacha illa seu sororcula apud diuam Vrsulam, de qua egimus *De vomitu sanguineo*, cum singulis mensibus & statutis periodis sanguinem, seu menstruas purgationes sanguineas euomeret, sanguine ex talo seu saphena detracto, a foedo hoc malo liberata est, & singulis periodis optime menstruae euacuationes

redierunt, quae quidem, cum haec rursus colligo, anno 1589. adhuc viuit, & libertate hic orta, virum deinde duxit, prolesque ex eo, numero quinque excepit. At alteri puellae, quae Delphis apud sactorem habitabat, & per nares statuto tempore, menstruis purgationibus restrictis, sanguis effundebatur. Verum & huic, cum nostro consilio saphena secta esset, menses deinde debito suo tempore fluxere, & probe sanitati restituta fuit.

S C H O L I A.

3 **C**ausae cum sint variae, variantur curationes; ut postea aliis exemplis quoque docebimus. Verum cum causas iam omnes dinumerauimus, signa hic quoque prius explicabimus, antequam ad methodum curationis deueniamus. Signa vero aegritudinis sunt per se manifesta; cum matronae vel puellae plangent, & conquerantur, se flores non habere. Nuptae quoque mulieres, cum purgationes ordinarias aliquando habuerint, si restrictae sint, id quoque aperiunt, & quod non possint concipere. Quibusdam interea, cum instat periodus, exiguum valde signum menstrui albi vel rubei exeuntis quandoque apparet: tamen post tres vel duos dies aegrotant, plangent ac conqueruntur de ventre, capite, pectore, & sequuntur symptomata a Galeno *de loc. affect.* enarrata. Iam & haec signa occurrunt, ut habetur de harmonia gynaeciorum, grauedo cum tensione lumborum & dolore, & supra pectinem & inguen, capitis etiam & ceruicis, cui & bases oculorum consentiunt: frequentius & anorexia eis succurrit, sonitus aurium, feruor, cum rubore vultus, mammillarum etiam inflatio, partiumque muliebrium siccitas: quae omnia occurrunt diebus purgationis. Et si diu suppressi sunt menses, si a medico non purgentur, tumor aliquibus in ilibus, & phyma in extrema illum parte exoritur, qui tumor suppuratus longo tempore vix sanatur. Indicium autem est ex internis partibus, quampiam esse inflammata. Nonnullis etiam in extrema illum parte panus excitatur, *ut loquitur ex Galeno lib. 6. de locis affectis*. Quod igitur praeter naturam menses detenti sunt, ex pluribus indicibus dignoscere valebis: primum autem ac maximum est Hippocrat. 34. *Aphorism. 5. lib.* cum dixit: *Si mulier, quae neque grauida est, neque peperit, lac habet, huius menstrua defecerunt*. At nullo apparente in mammis lacte, *ut refert Galen. 6. de locis affectis*. haec indicia ad erunt: grauitas totum corpus molestat; fastidia cibi incidunt; horror inaequalis cum febre quandoque: & si vteri os claudatur, cum quadam id erit duritie; propter quod differunt ab his, quae conceperunt: quibusdam dolor cum grauitate in vteri regione accidit, modo in vna, quandoque in altera parte. Quin etiam in coxam dolor transit, ac crus ipsum, quod e regione est, per incessum claudicat: praeterea lumborum; colli, &incipitis dolor (*ut paulo ante diximus*) qui etiam oculorum fundamenta infestat, sequi solet, item febres ardentes, & urinae nigricantes cum rubra quadam sanie, perinde ac si aquae, ex qua nuper macinatae carnes ablutae fuerint, fuliginem quis miscuisset;

5 quemadmodum refert Donatus ab Altomari, ſæpius ſe in illuſtriſſima domina Maria Sanſeuerina, comitiſſa Nolæ, talem vrinam inſpexiſſe. Quibusdam etiam vrina aut difficulter redditur, aut omnino ſupprimitur. Signa vero ſpecterum & cauſarum, tam totius, quam ipſius vteri propria, ex propriis earundem indiſciis, ægrotantium ſermonibus, corporum habitibus, ac ex præcedenti victus ratione, haud ægre dignoſci queunt. Primum ex mittentibus etiam ſigna, quibus cauſæ diſtinguuntur, capiemus, & debilitatem eorum coniciemus: eo, quod excrementis ſcatent, & morbus aliquis toti communis adest, vt intemperies: & priuatione aliorum, vt quia ſanguis adhuc mediocris eſt quantitate & qualitate, neque obſtructionis nota adſunt, aut alterius mali vtero proprii. Auerſio vero & penuria ſanguinis ſigna habent euidentia, tum ex præſentibus, tum his, quæ præceſſerunt circa ægram. Ita facile cognouiſmus in iſtis tribus puellis, quod retenti eſſent menſes, cum alio ſanguis fluere; vti ſcilicet per nares, alteri per vomitum, & priori ex venæ ſectiōe ſurſum purgatione raptâ. Sanguinis vero qualitas, id eſt, craſſities & lentor, coniecturatur, primum victu præeunte, qui contrarius extenuanti fuit, tum in cibo & potu, tum in exercitationibus, vel animi, vel corporis. Sic puella quædam anno 1589. cum ætus ingens eſſet dum menſtruas purgationes experiebatur, in maxima copia bibit aquam frigidiffimam. Vnde non ſolum menſes reſtricti fuere, ſed mox ſymptomatis grauioribus eandem apprehendentibus, lotium plane reſtrictum fuit; & incidit in ſyncopen tantquam ex ſanguine concreto; ita, vt nulla remedia, quamuis apta, a me adhibita, profuerint, ac ipſa, vix quatuor aut quinque diebus ſuperuiuens, exſtincta fuerit. Hæc decumbebat apud ceruiſiariam viduam, in cuius cupis malleus pro inſigni erat. Alia coniectura ex his, quæ in corpore apparent, & ſunt pituitoſi ſanguinis ſoboles: de colore albo, vel plumbeo, de tactu frigido, de mole corporis ſubtumida, ſomnis profundis, pigritia, ſaſtidio cibi. Rurſus quod & ſerius incipit purgatio, & cum multo labore vix quicquam proficit. Sed hæc communia magna ex parte ſunt affectui proprio vteri, id eſt, obſtructioni, quæ a craſſis & viſcidis: & ſæpius hi affectus coincidunt; vt ſcilicet & totius ſanguis talis ſit: vt & ſi grauitas & tenſio circa dorfum & pubem ſentiat, & ſi quid excernitur, pituitæ potius attinet colore & conſiſtentia. Quibusdam harum & perpetuo aliquid pituitoſum educitur: appellant album fluorem. Sed de eo proprio capite agemus.

6 Ex ſanguine. Ex multo aque potu gelidiſſima menſes reſtricti & inde mori ſubſequuta. Ex iis quæ in corpore apparent.

7 Sicigitur frigidiores temperaturas dignoſcemus, iuxta Aetium libro 16. capite 55. ſomnolentiores ſunt, ad omnemque motum ſegniore; colore candidiores, ſeu plumbeæ; venulis ſubnigreſcentibus, lotio aquoſo; pituitam iugiter exſcreant; interdum & pituitoſos humores euomunt. Si corpora ob immenſum calorem exareſcunt, calida temperatura, tales mulieres, eodem Aetio teſte, libro citato cap. 52 ſunt omnino vires, colore fulcæ,

Ex temperatu- ra frigida. Ex calida.

compactæ neruis, robuſtæ, venoſæ, lumbos & nates ampliores habent, pectore & humeris latioribus, & piloſis: talis vt virago nihil priuſus, vel pauciſſime expurgatur. Pinguiores autem facile cognoscuntur ex habitudine. Alii vero affectus obſtruentes noti eſſe debent ex propriis ſignis, vt pinguedo vteri ex totius pinguedine: durities ſentitur tactu, & œdema, & phlegmone: eryſipelas vehementem inferit calorem: conuerſio ad latus, obſterricis digitis ſentitur, & propria ſigna habet. Signa a cauſis primitiuis vel externis per inquisitionem facile habentur, ſiue in aere, vel aqua verſata fuerit mulier: ita quoque ſi percuſſa fuerit, vel vulnusei ſit inſiſtendum, aut vlcus in vtero, ipſamet enarrabit. Refert Tharantanus, Dominam quandam, cum ſepem tranſiret, palo ſeu ſtipite peripſam vuluam in matrice vulneratam fuiſſe, plurimumque inde ſanguinis promanſſe: ſed, vulnere curato, ob relictam indidem cicatricem menſes reſtrictos, vt vix poſtea quid ſuis temporibus egeſſerit, neque deinde imprægnata fuerit. Et ſic de aliis caſibus poteſt fieri interrogatio, nunquid ſuſtinuerit multos labores, vel tenui victu uſa fuerit, vel morbi præceſſerint, aut alia euacuationes: quæ omnia ex relatione ægræ, tum diligentis medici inquisitione cognoscuntur. Ita & cauſæ internæ. Si humores calidi, bilioli abundant, vrina eſt inrenſa, pauca quantitate, pulſusque velox, mulier macilenta, biliola, iracunda, velox in motu, coitus appetens, ſitibunda, & agilis in ſuiſ actionibus: apparent labia ſiſſa, magis ſi comitatur ſiccitas, eſtque colorata. In frigidis omnia contraria, diſcolorata, ſomnolenta, vrina remiſſa, ſitis nulla, cruditas & grauitas in ſtomacho, egeſtiones & ſuperfluitates pituitoſæ, mulier phlegmatica, pinguis, non appetens coitum. Quæ ratione vteri ſiunt, vel ſanguinis, vel vaſorum, aut totius corporis, iam diximus. Quod ad prognostica attinet, etiam hæc adiungemus. Quod igitur mulieribus, quæ non purgantur conſueti more, ſanguinis reiectionis ac ſiderationis periculum imminet, ſeu apoplexiæ, teſtatur Aetius cap. 52. lib. 16. Et quædam in melancholicum atræ bilis morbum aut inſaniam delabuntur. Talem aliquando nos puellam præ manibus habuimus, quæ in inſaniam incidit ex menſibus ſuppreſſis; quæ tamen a nobis fuit curata, venæ ſectiōe ex talo: eius hiftoriam poſuimus, cum de cerebri & capitis affectibus ageremus. Quapropter proroganda euacuatio eis non eſt. Quippe cum menſtruorum oppreſſio offendat, maxime ſi a partu ſupprimantur, nam non abundantiam modo, ſed inſignem etiam humorum pariunt prauitatem; vt 3. De morbis vulgar. teſtatur Galenus. Quibus autem vlcera cicatrices oſcula vaſorum in vtero excœcarunt, & propterea menſes fuerint detenti, penitus incurabiles ſunt: quemadmodum curari quoque non poſſunt, vbi pellicula quædam circa collum ſtatim a principio, aut oſculum vteri, fuerit adnata; niſi illa perforetur, aut reſecetur; vt liquet in eodem Aetio. Graue malum eſt, ſi diu retineantur, & hæc

8 Affectus obſtruentes alii quomodo cognoscantur.

Cauſæ externæ, quomodo cognoscantur.

9 Cauſæ internæ, quomodo cognoscantur.

Signa prognostica.

10

hæc symptomata subsequuntur: priuatio prolis, mania, epilepsia, vteri suffocatio ex materia coacervata & corrupta, tensio, vteri tortuositas, vteri inflammationes, apostemata, dolores intolerabiles in vteri regione, grauitas totius corporis, mala coctio, appetitus deiectio, nausea, ructus, tussis, difficultas anhelitus, hydrops, vrinæ & fecum retentio, anxietas ac tristitia, cephalalgia, dolor oculorum ob colligantiam, & febres ob oppilationem, podagra, color fœdus, impetigines; furunculi, vertigo, tum alia antedicta Scholio primæ Obser. huius libri, tandem mors. Muliere vero sanguinem ouementi menstruis erumpentibus solatium fit. Menstruis deficientibus, sanguis ex naribus fluens bonum. Mulieri mentes decolores, nec per idem tempus semper venientes, purgationem indicant esse necessariam. Si menstrua plura fiunt, accidunt morbi; & si non fiant, ex vtero morbi contingunt. Vrina lactis modo alba & densa, aut obscura linaesq; mensium suppressorum, aut locellorum affectorum, argumentum est. Vrina albescentis rufescentisq; cum squamosis resolutionibus nigricantibus, eadem arguit, modo mensium suppressorum reliquæ ad hinc notæ. Quibusdam ex mensibus diu suppressis, accedit syncope, tremor cordis, & subita mors. Si coitu assuetæ, eo non vtantur, suffocata aliquando miseræ mulierculæ pereunt. Virginitas quoq; barba innascitur, formæ corrumpuntur: & si curationem non admittant, vel recipiunt, moriuntur. Ideo his omnibus tempestiue succurrendum est.

OBSERVATIO IV.

De Suppressione mensium, plenitudinis ratione.

Gerrudi Bartholdi, mulieri Alemariæ, si quæ altera boni habitus, viduæ, sed valde formosæ, facie admodum honesta cum rubore decenti, temperatura sanguineæ, tempore quo menses fluere consueo more, foras profectæ, cum tempestas valida oborta esset, & tempus admodum ventosum ac pluuiosum, subito menstrua purgatio restricta fuit. Ab eo tempore melancholia hypochondriaca laborauit, & sæpe capitis dolore, cum faciei rubore, alioqui bonæ habitudinis; nec postea plenitudinis causa purgabatur. Congruo autem menstruorum tempore (vt talibus fieri assollet, ex Aetio lib. 16. cap. 59. De curatione earum, quæ plenitudinis ratione non purgantur) magis grauabatur, doloresque circa lumbos & lumen percipiebat, flatuque replebatur; quem & saltus, distensiones, horroresq; totius corporis necessario subsequerebantur; plethora vero hoc malum augebat, & huius causa potissimum exsistebat: quod præcipue cognoui ex insigni venarum tumore. Hæc cum mea cognata esset, & me vocasset, vt hoc malo liberari posset, & iterum debito tempore purgari; cumque aluum non redderet, ventre prius subducto ex bolo sequenti: *℞ castæ recens extracta ʒj. elect. hierapicræ ʒj. fiat bolus*: altero die secta fuit vena basilica in brachio dextro, vsq; ad vncias octo. Eiusmodi enim copiosa sanguinis missione sanantur, iuxta Aetium, (cubiti, inquit,

ac malleoli venas secare oportet;) tum ipsa optime ferebat, & consueta erat venæ sectioni: de qua latius in Scholio. Postea & hoc decocto loco syrup. præparantis & incidentis, & ad melancholiam hypochondriacam & menses facientis, vt vteretur consului: *℞ radic. petrosel. fœniculi, apii, valerianæ, ana ʒj. radicis buglossæ* (ob melancholiam hypochond.) *ʒj. B. pulegi, calaminthæ, melissæ, sumariæ, artemisiæ, verbena, summitatum lupul. matricariæ, betonica,* (quia sæpe dolebat capite) *ana m. j. florum chamameli, roris marini, ana p. j. seminis anisi, ammi, apii, fœseli, ana ʒj. B. polypodii quercini ʒj. fiat decoctio in aqua communi pro ʒssj. B. colatura adde syrup. de quinque rad. de artemisiæ, syrup. de epithymo, ana ʒj. syrup. de fumar. ʒj. B. clarificetur & arom. cum ʒij. cinnamomi selecti, & fiat ad modum clareti, quo bis in die vtebatur.* Postea huic decocto addidi foliorum senæ ʒj. agarici fœminini electi albi ʒj. B. epithymi ʒj. rhab. selectissimi ʒj. schœnanthi ʒj. & fiebat decoctio pro ʒix. & imperaui, vt per noctem relinqueretur in infusione, & mane expressioni forti adderent syrup. ex infus. ros. & de epithymo. ana ʒj. pro tribus dosibus matutinis. Capiebat omni mane, vel secundo quoque die, prout alius mouebatur. Deinde redibam ad decoctum præparans primo præscriptum; eoque finito illam rursus purgaui, in ʒv. eiusdem decocti infundendo folior. senæ ʒij. sem. anisi ʒj. epithymi ʒij. semel ebulliendo mane, forti expressioni addendo confectiōis hamech, diacatholici, ana ʒij. agarici trochisc. ʒj. syrup. de epithymo ʒj. B. misce. Et detur in diluculo: quo plusquam septies aluum deposuit. Deinde cum tempus instaret mensium, imperaui, vt rursus ex talo vena aperiretur, extrahendo circiter vncias quatuor. Tempus autem secandi venam non erit multum ante statum mensium tempus, sed tribus quatuorve diebus consuetos mulieri circuitus anteuertens; vt Galen. inquit. Deinde dedi ʒj. pulueris dominarum cum vino Rhenano: & aperti sunt menses. Hoc modo hic pul. in officina paratus Alemariæ habebatur: *℞ sem. fœselios, ammeos, cinnamomi, ana ʒij. B. cumini ʒij. sem. fœniculi, apii, carui, nucis muscatæ, calami aromatici, galangæ, ana ʒj. B. zinz. macis, caryophyl. ana ʒj. croci ʒij. B. fiat pulu.* Hæc sequentia magna cum laude quondam exhibita fuere Dominæ Bredenrodianæ, post vniuersalia medicamenta ad menstruas purgationes prouocandas, in dolore splenis & vteri ex obstructione: *℞ corticum tamarisci ʒj. B. rad. petros. apii, fœniculi, an. ʒij. agrimon. end. cichorii, betonica, artemisiæ, matricariæ, mercurialis, costi vulgaris, absinthii, abrotani, saluæ, mentha hyssopi, an. m. j. capill. ven. reien. m. j. polytrichi m. j. baccarum lauri, iuniperi, an. ʒij. sem. petros. anisi fœniculi, an. ʒj. B. ammi. os. carui, fœselios, an. ʒij. aristolochiæ longæ ʒij. rad. ireos ʒj. sauiæ m. j. B. cum vini pintis quatuor, mellis de summari ʒvj. sacchari ʒviij. fiat potio.* Erit delicatior si addatur cinnamomum, & in modum clareti componatur.

SCHOLIA.

Cum suppressorum mensium causa tot sint, pro earum diuersitate curationem quoque variari contingit. Et ita cum hæc mulier ob plenitu-

Non plenitudi-
nem mensis
supprimatur;
curatio.

Vena scissa.

6.

Conciliatur
Aetius cum
Gal. De vena
sectione.

7.

Quibus sola in-
cisa tali vena
sufficit.

Quibus sangui-
nis euacuatio a-
lio itinere auer-
titur; quomodo
succurratur.

dinem non purgaretur, licet subito prius fuerint menstrua purgationes restricta, iamque quatuor periodi praeterissent, quod menses non fluxissent, & tunc prius consilium peteret; tamen cum viderem plenitudinem in causa esse (erat enim boni habitus) ideo, aliis consentientibus, iuxta Aetium, tum cubiti primo, deinde tali venam secundo aperire iussi. Hanc eandem sanguinis de tractionem Amatus quoque approbat *cent. 1. curat. 41.* ex Matthæo de Grado & Nicolo Florentino; ut qui in muliere, cui prius secta fuerat vena basilica, cum hyeme ad eam accitus esset, sanguinem ex saphena misit. At *centur. 1. curat. 15.* in virgine illa decem annorum, & octo misit sanguinem in brachio ex vena communi: neq; Galeno ita adstrictus fuit, (qui venas in cubito, *lib. de curat.* per venæ sectionem, hic non admittit, sed in poplitibus aut malleolis, cum reuelleret purgationem assolent) quin Pauli sententiam & Aetii sequutus sit, qui in plethoricis primo ex cubito, deinde ex talo sanguinem mittunt: quos postea Auicenna imitatus est, & deinde ceteri practici. Nec enim necessarium est in verba Galeni iurare, vel ipsius exemplo, qui in libello De libris propriis, seruos eos vocat, quicumque se vel Hippocraticos, vel Praxagoricos, vel alios alterius sectæ appellari volunt. Quicumque igitur siue Romanus, siue Græcus, vel Arabs, aut Indæus optime loquutus fuerit, illi quoque fides adhibenda est. Et ideo nos quoque, ratione Practicorum excellentium moti, in hac nostra cognata, plethora laborante, prius sanguinem in cubito, deinde ex talo demissimus. Possunt tamen conciliari iuxta Donatum ab Alto mari. Nam Aetius magnam supposuit plenitudinem, quæ cum copiosa euacuatione indigeret, vires, aut reliqua haud quam permetterent: quapropter cubiti venas primo, deinceps eas, quæ in talo secari iussit, ut ex utrisque simul tanta possit sanguinis copia euacuari, quantam vnica sectione plenitudo requirebat. Galenus vero non adeo magnam plenitudinem inspiciens, & ex aduerso vires robustas in mulieribus plenitudine laborantibus supponens, eandem in poplitibus, seu tali venis venæ sectionem fieri, decretum reliquit. Et cum dixit, quod sectæ in cubito venæ mulierum reuelleret purgationem assolent, ac purgationes menstruas comprimunt, ad superiores corporis partes sanguinem retrahentes, tanquam verum admittendum, ubi post eas poplitis seu tali venæ non incidantur. At ubi non ex plenitudine laborant, tunc sufficit sola incisio ex tali vena, quemadmodum fecimus Obser. 2. præcedente in famula zythepæ. Sic etiam fecimus Obs. 3. in aliis tribus puellis, quæ ex mensium suppressione laborabant, sanguine ad alias partes delato. In his etenim, a quacumq; parte fluxerit, sanguis est reprimendus, & ad vuluæ iter congruis præfidiis reuocandus, ne forte inde repulsus ad aliquod nobile membrum (*teste Aetio lib. 10. c. 42.*) vertatur. Ideo venæ sectio in talo profuit puellæ tempore mensium restrictorum sanguinem euomente; & illi, quæ ex naribus san-

guinem profundeabat, ac alteri puellæ, cui per venæ sectionem in cubito menses retracti erant. Iubet idem Aetius in his & sudoribus, vomitu, reliquisq; huiusmodi excretionibus corpore euacuati. At vomitus minus conuenisset Sororculæ, quæ vltro sanguinem tempore menstruorum euomebat. Sic igitur si auersione (si quidem ad superna) suppressi sunt menses, erit vtendum eisdem frictionibus, cucurbitula pubi affixa, & coxis, vena tali secta, quo ad vterum materia retrahatur. Et hæc est cura earum, quæ sanguinem vomunt, vel excreant. Sed si per sedem auertitur, difficilimum erit; ut si per hæmorrhoides. Siue enim trahentibus vtaris, ea & ad sedem trahunt: siue ad sedem astringentibus cohibeas, ea vicinitate cohibent, & quæ feruntur per vterum. Quamobrem ubi illis, quæ trahunt vsus fueris, localibus ad vterum erit vtendum; de quibus priuatim paulo post dicitur. Sed in iis, quæ ob sanguinis copiam id patiuntur, qui non transfluit, sed ad alia loca vertitur, copia minuetur ex vena tali, & fiet auersio ad vterum. Hæc menses cient, superiores vero potius cohibent. Illud vero noscendum (*ut dicebat Aetius*) haud multo affici nocumento, quæ ob tales causas non purgantur; sicut nec ob alimenti penuriam, vel ob laborum excessum. Concipere tamen nequeunt, cum vteri purgationes defecerint. Sic Sororculæ cum graue esset malum, quod singulis periodis sanguinem quasi menstruum per superiora emoueret, secta vena tali, menstrua purgatio retracta ad vterum, eaq; postea suis periodis fluente & purgata, deinde ubi viro nupsit, non semel, sed pluries concepit, ut antea dictum est. Verum uti & prius admonuimus, non perpetuo venam scindere mulieribus necesse est; sed quibusdam malleolorum scarificationes, vel crurū satis esse queunt euacuandæ superfluitati; ut mulieribus albidioribus, ac carnosius, quibus parua sunt venæ, & quæ sanguinem tenuem acerare solent. Sic ego in Obferuatione prima, & nuper in puella carnosissima pingui, in qua venæ non apparebant, circa talum, & alteri inter femora commode cucurbitulas cum scarificatione apposui: & pariter in aliis quoq; albidioribus. Recte autem illi (*ut retulimus*) qui tali venam malunt, quam poplitis secare. Paucis enim mulieribus sub poplite apparet, nostriq; chirurgi raro eam incidunt. Ideo circa talum eligenda erit, quæ maior, quæq; pedem perreptat, & facile tunditur. Debent autem euitari loca tendinum; & optime vtetur in hoc casu (*monente Iacchino*) phlebotomo, non lanceola. De tempore secandi venam diximus Obseruat. præcedenti. Quantitatem autem nedum plenitudinis quantitas, sed virium robur metietur: Et, ubi quippiam non virgeat, eandem sectionem venæ iterare tutius erit, quam semel vniuersim vacuare; aut in eodem crure, vel in altero, ut videbitur. Conducit etiam nedum istis diebus, in quibus sanguinem vacuas, verum & ante eos quatuor aut quinque, ut extenuantem victum procures; eodem Galeno teste, tenuis, inquam, victus eisdem exhibeatur, veluti est prisanæ succus cum aceto præparatus, & olera

8

9

Non semper
vena secanda.

10.

De quantitate
sanguinis edu-
cendi.

ad

N ad hunc etiam vsum idonea. Erit enim exercitiorum, victus, reliquorumque ratio omnis ad copiae diminutionem faciens. Sanguine vero euacuato, medicamenta, quæ menses prouocare possunt, adhiberi debent: de quibus postea: etiam iuxta Aetium potiones & fomenta (*de quibus suo loco dicturi sumus*) adhibendo: & cucurbitæ pubi & inguinibus affigendæ sunt: siquidem menses euocant; *vt liquet 13. Meth. medendi. Vbi vero menses effluere inceperint, mulieri, inquit Aetius, omnimoda quies imperanda est, & in lectulo continenda: ac primo quidem die a balneis & cibis arcenda; proximo autem pitana cremor cum anetho paratus pro cibo exhibendus; deinde olerum, quæ huic vsui idonea videbantur portiuncula. Tertio die lauanda, ac consuetæ victus ratione regenda erit.* Hæc Aetius: quamvis præstabit a balneo abstinere cum menses fluint, nisi forte calido uti velit ad promotionem. Et ita curatio eorum, quæ plenitudinis ratione non purgantur, abunde ex his industriis lectori constare poterit.

OBSERVATIO V.

De Medico imperito, qui menses nitebatur euocare in puella plane extenuata.

E Mpiricus quidam in puella extenuata, ex longo morbo, cum valetudinaria permaneret, mensesque deficerent, nitebatur frustra consuetas ante morbum purgationes, nunc in extenuata retentas, prouocare cum calidioribus, etiam venam pertundendo in talo, licet sanguis non efflueret. Hæc cum ad nos consultandi causa accessit, atque ubi illam plane aridam & exsanguem vidi, venit mihi in mentem historia illa, quam refert Galenartha, quam hic referre libet: *Quando, inquit, in corpore mulieris non est sanguis superfluous, tunc si per menstrua non emittatur, non est mirandum: quia natura intendit corpus restaurare, vt multoties accidit in mulieribus cum patiuntur diuturnas egritudines, vel febres diu perdurantes: quia tunc natura intendit sanguinem retinere pro corporis conseruatione & restoratione: & ita tunc sanguis non superfluit, nec per menstrua emittitur: vnde tunc prouocari non potest; sicut accidit (idem inquit) cuidam scholari nouiter practicanti; cum veller menstrua prouocare in quadam muliere extenuata ex quartana, quam longo tempore passa fuerat; vnde nunquam potuit: quare misit ad me mulierem, qui eam videns, dixi, nunquam posse prouocari, donec mulier esset bene restaurata. Quare & ego huic nostra puella consului, vt vberioribus cibis reficeretur. Nam quæcunque (vt ait Aetius lib. 16. cap. 40. De curatione earum) ob innutritionem non purgantur, vel gracilitatem, siue id morbo, siue id alia ratione contigerit, eas primo reficere oportet, & corpori carnem congruo exercitio moderatoque labore, ac vberioribus cibis restituere. Si enim carnosæ eualerint, maxima inde spes erit, menses sponte erupturos. Quod si non euenierit, tunc eos commodius potionibus & pessulis prouocabimus. Ideo huic puellæ extenuatæ consulimus, vt cibis restaurantibus vteretur, & vbi magis carnosa euasisset, si tunc debito more*

menses non fluerent, rursus me accederet, vt tunc commoda remedia adhiberemus.

SCHOLIA.

Cum autem varias causas esse suppressionis prius dixerimus, licet curatio earundem suppressionum mensium in remotione causarum easdem inferentium constet cum contrarietate; tamen in hoc sæpe contingit error, tam in regimine vitæ (*vt vocant*) quam in ipsis medicamentis menstruas purgationes cohibentibus vel restringentibus: nam calefacientia, & subtiliantia, & aperientia, causam aliquando augent; & ita victus ratio calida exsiccans & extenuans. His igitur cognitis, videndum quomodo menses suppressos moueas. Cauendum imprimis, ne his tentes euocare, quibus non debes, vel quibus est impossibile. Nam constat, in vanum laborari in his, quæ omnino extenuatæ sunt. Et ita frustra eas mulieres cruciant, quæ post longam sanguinis euacuationem factam per nares aut alias regiones, qui menses prouocare volunt; aut post diuturnum longumque morbum, ad quem sequuta etiam sit atrophica, vel extrema extenuatio. Et ita non omnis retentio statim indicat sui ablationem & prouocationem: nam a causa naturali, (*vt diximus*) in prægnante, in anicula, in puella nondum ad ætatem iustam deuenta, in saltatricibus, viragine, (quæ omnes molestia non afficiuntur) neque extenuatis a longis morbis, menses prouocandi sunt. Ex quibus quoque sequitur, in vanum laborare, qui ante vel post tempus purgationis, menses volunt prouocare. Sicut etiam in his, quæ parum habent sanguinis ob cachexiam, quæ veram & perfectam sanguinis generationem impedit. Et ideo neque quibusdam etiam, licet fiant a causa non naturali, vt ab extenuatione humorum, paucitate cibi, & sanguinis in toto vel in vtero, quæcunque causa fuerit, in his, inquam, non debent irritari, sed solum regimen resumtuum præscribi, vt apud probatos auctores videre licet. In cachexia videlicet malum illum habitum corrigendo, vt multus ac bonus sanguis generetur. Sic & in atrophica, & sanguinis penuria, alimenta, quæ multum sanguinis generant, danda sunt. Interea quæ ob penuriam sanguinis fit, si ex formatione euenit, vt in frigidis siccisque, curam non habet. Si vero ex temperamento calido & sicco, curam habet per contraria, refrigerantia scilicet & humectantia: semper in memoria habendo, quomodo temperamenta sensim mutantur, idque victus ratione maxime in omnibus sex generibus: quod sane fieri ob conceptionem requirimus. Rectius, inquit Aetius auctoritate Ruffi, *quidem foret ad integram sanitatis tutelam, victus rationem excogitare, a qua ita mulieris corpus deficcaretur, vt menstrua purgationis non indigeret: sed hoc conceptioni prorsus aduersaretur.* Causa ergo concipiendi, & quoniam omnes fere mulieres inconsulto victitant; purgationes sunt necessariae: propterea congruit curationem quoque subscribere, qua menses intercepti euocantur. Calidiores itaque & plurimum exerci-

Error multorum.

Quando frustra prouocantur menses.

4

Si ob cachexiam vel atrophiam ueniat, quomodo curanda.

Ex sanguinis penuria Causa.

5

Si ob nimiam
caliditatem
mensis
supprimatur
curatio.

tatas mulieres, quam maxime humectare oportet, dulcium aquarum balneis, vberiori humidiorq; cibo ac potu; quales ptisanæ & chondri sorbitiones sunt, & quæ ex lacte præparantur, & ex ole-ribus, lactuca, cucurbita; & huiusmodi. E carnib. agni, hædi, ac nouelli sues, præsertim cicures, & fœminæ: e piscibus quicunque teneras carnes habent: ex auib. altilis: e fructib. ficus recentes, vnae maturæ, pepones, cucumeres: e potionibus. vinū tenue, candidum, non adeo antiquum, & dilutū.

6. Tales itaq; maxime humectabimus, quacunq; ratione calidiores fuerint, siue ex naturali temperamento siue ab exercitiorum excessu; aeremq; humidum eligemus, ac paulo ad frigidū vergentem, somnoq; longiori vtetur: quietem imperabimus, & iubebimus vt exercitium vitent: & immodicos affectus, iram, mœsticiam, timorem; & vt supradictis vtantur; cremore ptisanæ, ex lacte parato: & præter iam dicta, carnibus gallinarum, caponum, & pullorum, & iure carniū, lacte, & recentib. ouis gallinarum, & vt summam dicam, reuolutoria victus ratione. Talia & extenuatis conueniunt.

Si ob frigidam
corporis in-tem-
periem menses
supprimantur,
curatio.

Si ob frigidam corporis intemperiem menses nō profluāt oppositam curationem instituemus. Nā calidiorib. cum cibis, tum medicamentis vtetur, & fortioribus exercitiis, ac plurib. laboribus, iuxta eundem Aetium; vino item fuluo, odorato, veteri, ac minime dulci. Inter medicamenta vero ea eligemus, eodem Aetio auctore, quæ calore suo sanguinem dissoluunt; veluti est thymum, pulegium, calamintha, dictamnium, abrotanum, & alia huiusmodi multa apud eundem descripta. Ita & curabimus illas, quæ nimio otio non purgantur, iuxta eundem, quas laboribus addicemus: labores vero, qui mulieribus maxime congruunt, deambulationes sunt, & a iumentis gestationes aliquanto vehementiores. In ceteris vero tanquam frigida & pituitosa curabuntur, atq; omnino, vt Hippocrates ait, opposita dabimus iis, quæ sanguinis delationem impediunt. At si eueniat, vt aqua frigida & cruda bibita offendat, aliam optimam perquiremus, quam cum vino albo & tenui commiscebimus; cibariaq; pro frigidis, calida; pro crassis, attenuantia offeremus. Pinguiores autem mulieres victus ratione regemus; quæ summas (inquit Aetius) attenuandi vires habet; atq; ea adhibebimus, quæ idem lib. 3. De alimentorum facultatibus scripsit, & De macie corpori reddenda. Neq; tamen interim fomenta & potiones prætermittemus. Si enim materia inferius declinabit, haud egre euacuabuntur, & corpus gracilius euadet: & quamuis per inferiorem aluum purgatio non admodum tuta sit, cum inde corpus labefiat, mulieri tamen ita se habenti hæc quoq; adhibenda est. Sæpe enim sola purgantis medicamenti potio mensuris euocandis sufficit. Cataractica acerrima, qualia ab Aetio referuntur, pinguib. idonea fuerint, & suppositoria, tum fomenta & epithemata, qualia scripsit ad temperaturas frigidiores conferre. Contra

Lib. 16. c. 43.
& 55.

7.

Aetius lib. 16.
cap. 53.

Curatio earum,
quæ ob nimiam
pinguedinem
non purgantur.

In gracilib.
& extenuatis
curatio.

in gracilib. & extenuatis (vt etiam antea diximus) contrario modo instituenda curatio, siue ex fortibus exercitiis, vel morbo præcedente, vel ex fa-

me aut ieiunio, aut aliis euacuationibus magnis originem habeat: vtendum enim cibis multum nutrientibus & humectantibus, tum iis, quæ auctores præscribunt ad corpus gracile restaurandum. Et ita quoq; ex paucitate sanguinis, vt paulo ante admonuimus, præcipua curatio consistit in victu resumptiuo, humectante, & sanguinem multiplicante. Si vero ex copia sanguinis, hæc ipsa copia minuenda erit venæ sectione, vt Scholio præcedente docuimus; exercitiis & cibis tenuibus, & reliqua victus ratione omni ad copiam diminutionem faciente. Quæ vero ob qualitatem sanguinis frigidam, crassam, viscidam; hæc corrigenda erit contrariis. Sed quia communis est curatio his, quæ ex obstructione venarum matricis id patiuntur, ideo simul hæc tractanda. Quæ igitur obstructiones in venis his patiuntur, quas etiam solas docet curare Galenus, in lib. De venæ sect. sic tractantur ab eo. Incipit antea per dies decem corpus totum parare, & obstructiones tum eius tum vteri tollere. Hoc autem est (teste Iacchino) corpus fluxile reddere. Id primum victus ratione extenuante facit, id est, quæ tenues succos, fluxilesq; efficiat: id qualitate ciborum, & potionum fit: & præterea condimentis, quæ sale, aromatis & herbis acris parantur, cuiusmodi est origanum, sativela, thymum, cuminum, anethum: tum exercitationibus fortioribus, & vigilia. Hoc posito, medicamentis rem aggreditur, & primum quæ humorum copiam crudorum extenuant per totum corpus, & parant, vt purgari possint: vt oxymel & simplex & scilliticum cum decocto betonicæ, vel thymi, vel alterius incidentis, & extenuantis, & incidentis. A qua potione, picræ potum propinat. Inest autem picræ vis primum purgandi venas a pituita, extenuando & extergendo: inest & vis tollendi obstructiones, per incidentia medicamenta, quæ longe penetrare possunt. Eligat autem maxime purgantem, vt est hiera plurimum aloes recipiens: nam variis modis paratur. Hoc ergo medicamento vteris decem diebus illis bis aut ter. Interim medicamenta exhibenda, quæ menses ducunt, vt sabina, dictamnium, pulegium, &c. Modus exhibendi, in melicrato a balneo statim cum adhuc calent. Intentio igitur est obstructiones tollere: idque primo facit humores respiciendo, parando, purgando, vacuando. Præparatio per extenuantia, calida, sicca, acria, amara, fit, modo fortiora, modo debiliora. Tempus præfigit decem dierum; quod accipit Paulus. Sed hoc ridiculum, cum pro varietate humorum, variari vim medicamentorum oporteat: quibusdam ergo vix quindecim, aut viginti saterunt. Purgationem per hieram facit: non negat tamen, quin & aliis, maxime agarico: quoniam vis inest illi extenuans, & admiscetur aromatis. Sed & diaphœnicon ad hoc facit, & hiera ex colocynthide, & Archigenis. Vltimo adhibet venæ sectionem in poplite, vel potius in talo, idque per duos dies, parum trahendo quotidie, quò a supernis ad inferna maior attractio fiat; vel vt sanguis obstruens, iteratis tractionibus melius

8

Ex paucitate
sanguinis.

Ex copia.

Ex qualitate
sanguinis frigi-
da, crassa, &
viscida.

Ex obstructione
venarum matri-
cis.

9

10.

lius deriuetur a parte. Vult fieri vtrunque ob cathexin, si forte in vno magis obstructio sit. Sed cur postponit venæ sectionem? An quia non potest vacuari sanguis obstruens e venis vteri, nisi dissectus & paratus sit, & imminuta ex parte obstructio? Hoc igitur facit postremo: quoniam venæ sectio paratiorem sanguinem exigit, vt possit educere a loco: quoniam non fortiter, sed solum vacui ratione. Verum de venæ sectione, de cucurbitulis, & scarificatione, satis prius dictum est. De remediis vero, quæ bibuntur, quæ Galenus scribit, experta sunt eo modo quo scribit. Rhasis trochisc. de myrrha multam vim habet: potio item ex herbis in vino insolatis: recte vtimur & aqua porretana. Omnia methodo inuenta remedia, experientia comprobata. Expedit autem & localibus vti, quam partem Galenus omisit: vt sunt sessiones in balneis, quibus vis insit dissoluere & extenuare crassa, ac venas dilatare; qualia sunt sulphurea, & quæ arte parantur ex stœchade, chamæmelo, anetho. De his superius quoque egimus. Mox & pessus & suffitus. Nam iuxta Hippoc. lib. 5. aph. 28. muliebria educunt, id est, menses. Causam ponit Galen. extenuationem, quæ fit ab eo fumo. Vtus est, per sellulam perforatam obducta omni perspiratione per vestes. Non trochiscis ex gallia vtimur. Similiter conueniunt pessi ex ladanis & aliis, vt postea dicemus: pro diuitibus moschum & zibettum adiungimus. Hæc autem exemplis subsequenter clariora euadent.

OBSERVATIO VI.

De puella ex sola refrigeratione, vel nuda intemperie frigida, menses restrictos habente, & de altera muliere, mensium suppressione laborante, a succo pituitoso venarum vteriora obstruente.

Puellæ annos octodecim natæ, cum in hyeme, aere frigido, linteamina lota extra urbem in pascuis (vt fieri solet) exposita acri, rursus inde ablueret, menses restricti fuere ex frigidityte & nuda tantum intemperie, absque humore. Urina inspecta, quæ alba erat, & cum ipsa in vteri fundo manifestam frigiditatem sine pondere aut grauitate sentiret: statim imperavi, vt vinum generosum biberet, & vt hoc decocto vteretur eo tempore quo menses solebant fluere: & dictamni cretici, matricaria, artemisia, sabina, ana m. j. florum chamæmeli. p. j. cicerum rub. ʒ j. melissa m. ʒ. coquantur in vino Rhenano pro ʒ j. dulcoretur parum saccharo, arom. cum ʒ ʒ. cinnamomi selecti, & fiat claretum. Et menses optime fluxere. Accessit ad me, consultandi causa, & altera mulier pituitosa, quæ ex pituita copiosa, & succo crudo ac frigido, menstruas purgationes ultra dimidium annum non viderat. Imperavi, vt victu extenuante vteretur, & humores incidente, eo modo, quo paulo ante diximus Scholio præcedente. Deinde cum scopus huius curationis esset subtilitate digerere, & demum euacuare, & tandem menses euocare; omnium primo ad materiæ minorationem præscripti id, quod sequitur: & elect. lenitiui ʒ j. diaphœnici ʒ ij. cum ʒ ij. decoct. pulegii, artemisia, betonica, fiat

potio, capiat in aurora, & dormiat per horam; postea surgat & ambulet. Die sequenti sumet hunc syrup. & syrup. de artemisia, de duabus rad. oxymelitidis simplicis, ana ʒ j. aqua decoct. betonica, artemisia, pulegii, ʒ vj. misce, pro duabus vicibus: capiet mane hora vna ante auroram dimidium calide; & super id dormiat ad libitum. Hora quarta pomeridiana sumat alteram dosin. Diebus sequentibus capiat hunc syrupum: & syrup. de eupatorio, de duabus radic. syrup. de artemisia, ana ʒ j. ʒ. aqua decoctionis hyssopi, pulegii, calamintha, origani, artemisia, ʒ ix. fiat syrup. pro tribus dosibus. Istis syrupis finitis, denuo purgetur: & electuarii lenitiui ʒ ʒ. diaphœnici ʒ ij. electuarii ind. maioris ʒ iij. dissolue cum decoct. artemisia, capill. ven. seminis anisi, feniculi & passul. ʒ ij. mellis rosac. colati ʒ j. detur calide hora ante diem: tamen cum incipiet operari, non amplius dormiat. Post quatuor horas a sumto pharmaco capiat hoc lauatiuum: & iuris cicerum rub. ʒ vj. sacchar. rub. ʒ j. ʒ. Deinde vno atque altero die intermisso, cum pilulis delectaretur, etiam has pilulas præscripsimus: & pilul. fatid. aggregat. agarici trochisc. ana ʒ j. cum syrup. artemisia fiant pilule vij. habuit inde vij. sedes copiosas. Deinde accessi ad illa, quæ menses prouocarent. Ideo iussi, vt tempore congruo cum menses fluere solebant, sanguinis missio fieret ex vena in dextro pede, vel sinistro, secundum quod magis vena appareret, & tumentior in vno pede, quam in alio esset. Et si vena in nullo pede appareret, vt poneret super ipsam duas vel tres sanguisugas, ʒ iij. extrahendo. Hoc enim tempore iuuant illa, quæ sanguinem circa vterum trahunt; vt sunt dolorifica ligaturæ in coxis factæ, vel frictiones sanguinem ad partem trahentes. Vtile quoque est partes illas prius fouere aqua tepida, vel decocto maluarum vel liliorum, vt partes illæ relaxentur; ob quod sanguis ille facilius descendit. Ista etiam conueniunt, si multus sanguis sit in corpore, aut lentus, aut ob venarum obstructionem vteriue densationem suppressus; adhibitis nihilominus remediis, quæ obstructionem tollunt. Interim, inquam, & illa apponenda, quæ sanguinem ad vterum trahunt: qualia etiam conuenire diximus in iis, quibus multus sanguis ad partes superiores fluit, & per nares vel per sputum; aut vomitum reicitur. Nam vbi præcesserint remedia iam dicta, etiam hoc tempore vtile erit frequenti cucurbitularum appositione supra emunctoria sanguinem circa vterum trahere. Apponuntur sine scarificatione his, quibus non est nimius sanguis: in quibus autem est multus, scarificatio facienda est. Nam cum sanguini pater exitus, facilius ad illam partem fluit; sed multus non est trahendus. Euacuatio enim sanguinis copioso aliam euacuationem impedit. Aufertur copia propter quam expultrix illum sanguinem expellit, vt supra monstratum est. Verum in hac muliere consulimus, vt sanguis paulatim deduceretur ad vterum cum ligaturis & frictionibus, & sectione malleoli seu tali. Sed hæc non facienda (vt etiam antea admonuimus) nisi quo tempore solebāt menses fluere

4 aut quibus nunquam fluxerunt ad finem mensis; vel in principio quibusdam iunioribus. In qua parte humores liquefacti aut rarefacti videntur aucti, linimenta ex modice calfacientibus & relaxantibus sunt adhibenda. Ideo etiam imperavi, ut vngerentur partes inferiores ventris, inguinum, & renum, post fotum: *℞ exungia gallinae, anseris, & anatis, ana ℥j olei amygdal. dulc. chamaemel. lilior. ana ℥j. β. aristol. veriusque, iridis, asari ana ℥j. cera noua q. s. fiat vnguentum.* Infessus non parauimus, cum in hyeme essemus, sed ℥j. huius pulueris dominarum exhibuimus cum vino Rhénano albo: *℞ cumini ℥j. curcumae ℥ij. cinnamomi, nucis moschatae, granorum paradisi, calami arom. galanga, zedoariae, semin. fœniculi, leuistici, apii, carui, aristol. rotunda, baccarum lauri, sem. nigella, ana ℥j. fiat pul.* Parantur diuerso modo isti pulueres, cum magistrales sint; qualis & hic est: *℞ cinnamomi ℥vj. cumini, anisi, leuistici, carui, ana ℥β. myrrhae, rad. dictamni, curcumae, ana ℥β. lupinor. apii & nigella, ana ℥ij. calami aromatici, pulegii, aristol. longa, ana ℥ij. croci ℥j. asari ℥ij. sabinae ℥β. misce. fiat puluis.* Si menses non fuissent aperti, dedissem ℥j. trochif. de myrrha; quib. in robustiorib. feliciter sæpe vsus sū.

S C H O L I A.

5 Ubi frigidi redundant su-
et curatio.

6 Vbi cum frigida corporis intemperie, crassorum ac frigidorum adsit redundantia succorum, qui sanguini admixti mensium purgationem impediunt; ut in hac muliere secunda contingebat; ipsas prius decenti medicamento purgare conuenit, donec concocti & præparati fuerint: deinde, quæ menses prouocare possunt, adhibenda sunt. Parentur autem (ut antea quoque diximus) tum extenuanti victus ratione, cibis semper ac potibus aliquid odoratum admiscendo; tum etiam extenuantibus ac incidentibus medicamentis; ut melle ros. & oxymelite; modo vterus, aut quæpiam alia neruosa pars affecta non sint, propter acetum. Valent syrupi de tribus, aut duabus rad. de hyssopo, cum decoctis hyssopi, pulegii, calaminthæ, orig. abrotani, & similium. Concoctis iam humoribus ac præparatis, purgatio adhibenda cum hiera, agar. in pilulis. Quando multa pituita in corpore collecta est, ubi partes inferiores quoque cum vnguentis sint præparatae ut in Obser. precedente ostendimus, tunc dabimus pilul. de hiera, & aromaticas. Ventriculū & intestina purgant, humores attenuant, & præparant corpus ad assumptionem syruporum aperientium, aut acrium medicamentorum. Duabus aut tribus horis dandæ sunt ante pastum, ut in exitu lecto. Deinde syrupi incidentes & attenuantes sanguinem, aut humores mixtos cum sanguine, dandi sunt; ut syr. de rad. de artemisia, & alii antedicti. Dantur cum decoct. herbarum rem paulo ante dictarum, vel iringiorum, aut quicūq; rad. aperientium, vel cum decocto sabinae, aut artemisiae, aut leuconi. Si multa pituita in corpore collecta fuerit, euacuanda est multum ante tempus purgationis mensium, & id leniter, ne redundantia humorum auferatur. Sed sufficit dare pilulas supradictas, addito agarico, vel asaro, aut carthamo: vel pilulis benedictæ; vel

bolum dabimus cum hiera vel diaphœnicone. In robustioribus pilulas fœtidas, de sagapeno, aggregatiuas, aut de agarico. A purgatione sanguinem ex malleolis mittere conuenit, ut diximus; aut scarificationes adhibendæ, si venæ non appareant. Deinde medicamenta, quæ detentos menses euocant conscribenda sunt: & primo facilibus, postea mediocribus, vltimo fortibus vtendum. Verum cum plures circa medicamenta menses prouocantia hæsitent, sæpeq; audiamus ab auctoribus, & sæpissime a Galeno, mentionem fieri medicamentorum menses educentium, ideo querendum est, quæ ea sint, & quomodo id operentur. Igitur quinto De simp. 21. scribit, ea quæ menses mouent, in hoc ab vrinatiuis distare, quod cum vtrumque genus calidum sit, quæ tamen vrinas mouent longe sint sicciora, id est, quæ priuatim nomen diureticorum meruere. Nam menses ducentia calida sunt, sed modice siccant. Causa est, quoniam quæ siccant, crassiorem sanguinem reddunt, vnde & purgationem non facilem. Dubitabatur circa hæc. Nam non videtur hæc esse differentia: siquidem ea, quæ valentissime vrinam cient, vim etiā habent menses ducendi, ut exemplo particularis materiae patere potest: Sabina, pulegium, asarum, cinnamomum, calamintha. Ea sunt Gal. exempla. Rursus certum est, hæc sicca tertio ordine esse: ergo non hoc distabunt, quod magis siccant, quæ vrinas ducunt. Dubitatur iterum: *Hæc vrinam cient, ergo menses non mouent.* Nam quæ ad vias vrinae deducunt, deriuant ab vtero: *quare & profluuium per vterum immittunt.* Sic in profluuiis, ut dicemus, ad sistendum vtimus vrinatiuis. Arguitur etiam eo loco Galenus (teste Iacchino) de insufficientia. Quomodo enim vult, calida hæc & sicca menses mouere, quasi semper ex vna causa supprimantur, ut ex crassitie? Hic enim solum conferre possunt. At scimus aliis nocere; ut si ex penuria: item si ex phlegmone, vel scirrho, vel ex plurimo calore naturalis temperamenti. Respondetur primum ad id, quod postremo est obiectum, *non esse mentem Galeni illam solum esse causam; sed illam respicit maxime, quoniam & maxime euenit.* Est enim frequentissima ex obstructione, quæ ex humoribus. Vnde & ab huius curatione menses ducentia nominauit. Ad id vero, quod prius quærebatur, dicimus, menses cientia, etiam quæ proprie dicuntur, respectu scilicet huius generis causarum, esse in duplici differentia. Vel enim solum sanguinem crassiorem & frigidiorē liquant, & fundunt, & erunt modice calida & sicca; vel præterea obstructions tollere possunt, quæ impediunt. Primum genus diminutos iuuat, augendo sanguinis motum non nihil: secundum genus oblaesos, & prorsus defectos. Ea igitur, quæ sanguinem fundunt solum, proprie menses ducentia dicuntur: quia per se naturam in opere mittendi iuuant ea ratione. (Facilius enim pellitur, quod tenuius.) At reliqua, quodammodo ex accidenti magis, quatenus iuuant potius obstructions tollendo, propter quas detinebatur sanguis. Dices, *Nonne ipsa quoque fundunt & liquant?*

Respon-

Menses educi-
ria quomodo
differant a diu-
resen & vri-
natiuis.

Dubium.

Aliud dubium.

8

Arguitur Gal-
len. de insuf-
ficientia.

Responsio.

Proprie menses
ducentia qua
dicuntur.

9

Obiectio.

Respondeo: Quæ vehementer talia siccando cogunt, non liquant; ideo quod ad hanc rationem attinet, essent incommoda, sed iuuant propter obstructions. Sic igitur ad obiecta responderetur, non dici ea, quæ vehementer cient vrinam, menses ducentia; propter ea quod siccant & cogunt, nisi forte ex accidenti hoc faciant. Quod si Galenus exempla eorum posuit, transiit a menses ducentibus vere dictis, ad ea quæ obstructions tollunt. Quod vero dicitur, vrinam ducentia auertere ab utero ad vesicam, concedimus, si proprie talia sunt, id est, vehementer calida & sicca: sed si moderata, tunc vtrumque faciunt præparando sanguinem, natura vero eo beneficio pro exigentia in vtraque parte vteretur: ad vrinam renum attractione, ad vterum pulsione, quam procurat & commodi gratia in hoc corpore, & propagationis ratione. Alia vero immodica iuuabunt modico vsu, aperiendo & extenuando. Sed hæc cogunt sanguinem, inquit Gal. Responderetur, si quis multis vtatur, non si modice. Eadem fere habet Montanus, cum dicat, quædam per accidens prouocare menses: vt si paucitas sanguinis in causa sit, alere corpus, quæ sanguinem generant: si humores crassi ratione caliditatis adurentis, frigida & humida, qua ratione Diosc. lactucam menses prouocare dixit, plurimam ambiguitatem legentibus asserens, cum id improprie dixerit. Iam si sanguis crassus, viscidus, cum multa pituita, eget incidentibus & calefacientibus, quæ potius sunt diuretica, tamen in hoc casu iuuant ad prouocationem mensium. At si ob meatus & orificia obstructa, tunc vere menstrua prouocari dicuntur. Arabes tres ordines horum medicamentorum ponunt. Primum faciliorem, vt decoct. phaseolorum, cicerum rub. fœnic. apil. caulium, anethi, chamæmel. asparag. melissæ. Mediocrum secundum mentastrum aquaticum, cuminum, stœchas, ammi, satureia, flores schœnanti, spica, absinth. petros. amomum, leuisticum. Tertium denique fortius, vt rubia tinctorum, iuniperus, sabina, nigella, myrrha, pœonia, castorium, cassia lignea, euphorbium, & similia. Quædam insuper sunt simplicia, alia composita: (vide Plinium, Paulum, Aetium atq; Galen. & Neotericos) vt sunt trochis. de myrrha, aliiq; pastilli & pulueres dominarum præter alia localia remedia, vt exemplum sequens latius docebit.

OBSERVATIO VII.

De vidua longo tempore menses suppressos habente ex pituitosiore sanguine.

Maria Gerardi, vidua Alcmariana, annorum 36. minus quidem pituitosa, cum purgationes menstruas longo tempore non habuisset, in inguine tum coxa valde afficiebatur: cumq; muliercularum tentasset remedia, sed frustra, & dolor in coxa & inguine accresceret, ac metueret apostema, anno 1557. mense Decembri, cum ingenti ex suppressa menstrua purgatione dolore affecta, de nocte me vocauit. Cum feces non deponeret, clysterem libenter iniecissem, sed non admittebat. Balneo igitur aluus soluta ex pul. hier. *℞. & diag. colocynth. an. gr. iij. mellis crud. 3j. & sa-*

lis parum. Bis excreuit, ventositatibus emissis, cum iuuamento aliquo, vt referebat. Ad materiam præparationem hoc apozema descriptum est. *℞ cort. rad. fœniculi, apii, petros. rad. dictamni albi, valeriana, an. 3j. agrimonia, cassuta, capill. ven. artemisia, florum chamæmeli. an. m. j. sem. anisi, fileris montani, ammi, fœniculi, an. 3j. B. cicerum rub. p. j. coquantur in aqua communi, pro 1b j. B. col. adde syrup. de artemisia. 3j. syrup. de scolopend. de cichor. cum rhab. (aderat enim obstructio quædam in hepate & liene) an. 3j. misc. Sumebat mane hora 7. cyathum vnum, & hora 4. pomeridiana. Hæc quarto Decemb. die præscripta fuere. Sexto vero, quod sequitur. *℞ cassia mundata 3vj. diaphœnici, conf. elionis hamech. an. 3j. aqua artemisia 3ij. syr. de artemisia 3 B. misce.* Quinquies aluum deposuit, & cœpit dolor mitigari. Deinde & hoc apozema descriptum est. *℞ rad. fœniculi, ireos, asparagi, an. 3 B. rad. cappar. tamarisc. an. 3j. sabina, artemisia, mentha, nepita, calamintha, florum chamæmeli, centaurii minoris, pulegii, satureia, prassii, melissæ, verbenæ, an. m. j. sem. anisi 3j. tumini præparati 3j. fiat omnium decoct. in duplici vase in aqua artemis. lilior. albor. & vino Rhenensi. pro 1b j. B. arom. cum 3 B. cinnamomi, & dulcoretur cum saccharo. ℞ sabina exsiccata 3j. B. caryophyll. nucis moschata, ana 3j. ligentur in nodulo, & pendeant in dicta decoctione, & exprimatur dum potio sumatur. Deinde 13. Decemb. ita illam purgaui. *℞ pilul. de hermod. 3 B. pilul. mastich. 3j. agar. trochis. 3 B. pulu. rhab. gr. iij. diag. gr. j. fiant pilule 7j. cum aqua artemisia, dentur in diluculo.* Septem sedes inde habuit: deinde extractus est sanguis ad 3 iij. in pede dextro ex saphena. Et 17. Decemb. hoc decoctum rursus præscriptum est. *℞ rad. fœniculi, ireos, rubia tinct. an. 3 B. melissæ, verbenæ, absinth. florum chamæmeli, chamæpit. sabina, malua, prassii, an. m. j. sem. fœnugr. anisi. an. 3ij. folior. fœnæ 3j. B. prun. damasc. num. ix. ficuum ping. num. iij. coquantur in duplici vase in aqua artemis. & vino Rhenensi, pro 1b j. saccharo dulcoretur, & cinnamomo condiatur nodulo sequenti in eadem decoct. pendente. ℞ trochisc. de myrrha 3j. Bis in die sumebat, aut semel, iuxta medicamenti operationem. Pro dolore inguinis, mane & vesperi inungebatur calide vnguento sequenti. *℞ olei cheirini, chamæmel. anethini, lilior. alb. an. 3 B. misce.* Deinde statim instante mensium tempore accepit pul. sequentis 3j. cum cyatho vno decoctionis sabinae & artemisiae. *℞ pul. dominarum, descripti Obser. 6. præcedente. 3j. trochis. de myrrha. 3j. misce.* Sumsit calide, & aperti sunt menses, ac dolor coxæ etiam cessauit, remanente tamen duritie quadam in inguine dextro, & illa parte vteri duritiem adhuc sentiebat. Iussi itaq; vt inungeret sequenti vng. *℞ olei lilior. alb. cheirini, an. 3 B. butyri recentis, olei amygd. dulc. axungia gallina, pinguedinis vituli, emplastri de meliloto, dialthæ, an. 3j. mucilag. althæ, fœnugr. an. 3ij. ammoniaci in aceto dissoluti 3j. vng. alabastr. olei anethini, chamæmel. an. 3ij. alipta moschata 3j. pul. sem. dauci, cinnamomi, an. 3j. B. cera. q. s. fiat vng. molle.* Et cum menses tardius ac parcius fluerent, præcepi quoq; vt ex hoc clareto biberet. *℞ rad. galangæ, rubia tinctorum, pœonia. an. 3ij. ca-****

pill. ven. sabina, iua arthetica. an. m. s. sem. peonia, iuniperi, ammeos, anisi, leuistici, cumini. an. ʒ. rad. dictamni albi, blatta bizanzie, cubeb. castia lignea, rasura lapidis dactylorum, an. ʒ. croci orientalis ʒ. s. sem. althae, lini, fœnugr. an. ʒ. j. trochis. de myrrha ʒ. j. seminis dauci, iuniperi, an. ʒ. s. bulliant in vini Rhenensis lb. ij. & saccharo optimo q. s. dulcoretur, & arom. cum ʒ. j. cinnamomi select. Capiebat omni mane cyathum vnum, & intensius more consueto, ac largius fluxere: & belle fuit curata. Post hoc tempus reliqui Alcmarium, & Delphensium stipendio decoratus, praxim ibidem exercui, & cum hæc rursus recolligerem, 38. annis reipublice Delphensium Medicus ac Physicus fueram.

S C H O L I A.

Materia pituitosa præparata, & deum expurgata, ut iam diximus, exemplisque iam superscriptis ostendimus, & vena in talo secta, vel cucurbitulis adhibitis, ea exhibenda sunt medicamenta, quæ menses euocant. Eiusmodi autem sunt, quæ excalfaciunt, non tamen valenter desiccant, ut testatur Galen. 5. de simpl. medic. facult. Cuius farinae sunt (ut ipse inquit) pulegium, calamintha, sabina, anethum, dictamnium, asarum, costus, castia, cinnamomum, aristolochia, iris, & eius generis reliqua. Hæc enim (ut refert) absolutas vteri purgationum retentiones sanant. At lib. de curandi ratione per vena sectionem, menses abunde prouocare asserit nepitam & pulegium, si in melicrato cocto exhibeantur, aut confusa arida, cribroque subtili discretata, ac rursus trita vsque dum pollinem tenuitate referant, & inde in melicrato inspersa. Conuenientissimum autem tempus sumendi est a balneo inuolutis adhuc linteis. Verum hæc eiusdem auctoritate, mitia sunt. His autem violentiora existunt sabina & dictamnium, quorum vltus sit antedictis similis, quo etiam tempore medicamentum datur, quod proprie amarum appellatur. Confert namque mulieribus quæ non probe purgantur, si ʒ. j. exhibeatur cum aqua calida cyathis tribus, ut eidem Gal. visum est 2. de compos. med. secundum loc. & lib. de cur. per vena sectionem. Duo autem tempora commoda sunt ad talia medicamenta accipienda, ut refert Aetius: alterum appropinquante purgationis tempore, alterum, ut post vntionem fomentaque, ac balneum, statim bibant comedantque cuncta supra a nobis commemorata. Ac insuper conueniunt decoctiones thymi, rad. asphodeli, corticum rad. mori, mercurialis, carpesia, floris iunci odorati, spica nardi, ac celtica, similiter acori in vino albo veteri, quod excolatum calidum exhibeatur, & quæ supra pro his quæ frigidam temperaturam habent. Probe item facit opopanicum, sagapeni, myrrha, aut castoreum, ʒ. j. si exhibeatur. Idem quoque profunt, cumini, fœniculi, oreoselini, dauci, ammeos & cicerum decocta, ut idem auctor refert. Paulus præter hæc helenii rad. decoctum, artemisia, saluia, absinthii, sem. apii, seseli, approbat, quæ omnia non solum in vino (ut inquit Aetius) aut aqua mulsa, ex Gal. auctoritate, verum etiam in aqua decoqui possunt, prout magis vel minus mulieres fuerint natura frigidiores. Qua

etiam ratione habita, magis vel minus calefacientia medicamenta eligi possunt, tum eorum quæ hic conscripsimus, tum aliorum, quæ ab aliis commemorantur, quorum copia magna est, adeo ut si quis omnia auxilia in hunc vsum commoda recensere velit, ei multo otio opus fuerit, ut Aetius inquit. Commendantur pastilli de myrrha ad ʒ. j. cum aqua mulsa, & puluere dominarum de quibus supra egimus. His adiungenda topica, ut in seffus balnea mineralia, quale in Italia Putcolis repertum, Syluianæ balneum appellatum. Nos artificiale conficiemus, vel hunc in seffum, quo Bettus olim in Italia Bononiæ utebatur. ʒ. saturia, sabina, artemisia, pulegii, rad. aristoloch. rotunda, ireos, cucumeris asinini, cyclaminis, ruta, lauri, an. m. ij. coquantur in aqua pro balneo. Fiunt quoque suffitus, ut paulo ante dictum est, ex aromatibus, quæ & muliebria ducunt, auctore Hippoc. lib. 5. aph. 28. ex castia lignea, cinnamomo, rubia tinctorum, & gallia moschata, in puluerem reductis & carbonibus inspersis, & fumum per embotum (ut medice loquar) suscipientes. Sic fiunt & sacculi ex herbis iam dictis, qui calefacti in latere irrorati, ex paucis vino applicentur, partesque iis circa vterum foueantur. De vntionibus iam quoque dictum est. Pessis quoque vtendum vbi opus est, primo mitioribus, ex anserino seu gallinaceo adipe, saccharo rubeo, & paucis croco, adiectis herbis confusis, mercuriali, ruta, artemisia, vel sabina & pulegio. Si validioribus vtendum, ex succi mercurial. ʒ. iij. adiect. puluere gentiana, nigelle, & calocynthide, vel sumendo myrrham, galbanum, styracem, aristolochiam, rubiam tinctorum, abrotanum, calomintham, sabinam, pulegium, resinam terebinthinam: ac reliqua eiusmodi adiicienda sunt: eisdem prius confusis, ac linteis serico, aut lineo tenui ad formam digiti humani inuolutis, oleoq. irino aut liliaceo prius infusis, mulieris pudendo immittantur, adeo ut os vteri attingant, ligentur tamen ad crura ut promptius, vbi opus fuerit, auferri valeant. Plures formulas vide apud Rondeletium cap. 61. de mensibus retentis.

O B S E R V A T I O V I I I.

De muliere vtrumque biliosa, ex bilioso sanguine menses detentos habente.

Mulier annos 28 habenti, vtrumque biliosa, menstrua purgatio restricta erat, sentiebat circa vterum duritiem quandam cum siccitate ac calore, & dolorem pungentem: coitum valde appetebat, & eo plurimum delectabatur, quamuis non conciperet, ob menses restrictos: erat autem rubra. Hæc quidem signa menstruam purgationem retentam ex sanguine bilioso, seu materia biliosa, notabant. Quare consilium petendi consiluiimus, ut victus ratione vteretur, qualem Scholio Obser. 5. præcedentis conferre diximus. Nā quia non concipiebat eo quod non purgaretur, ideo cibo ac potu humidior & vberior humectanda erat. Deinde venam cubiti dextræ internam, ut incideret mādauimus ad vncias tres vel quatuor tantum. Postea hunc syrupum pro materie præparatione præscripsimus. ʒ. acetosa simplicis ʒ. ij. oxymel. simpl. ʒ. j. s. syr. capill. ven. ʒ. j. aquar. cichorii, artemisia, buglossi, ana ʒ. ij. misce. Per tri-

duum

Medicamenta
qua menses
euocant.

Topica.

duum ieiuna in diluculo bibebat, vna sumendo, *℥ij. diarod. abb. in tabul.* Deinde præscripti ut hoc leniente medicamento vteretur. *℥. cassia recens extracta ℥j. aqua artemisia ℥ij. syrup. viol. ℥ss. misce.* Mox & hoc vel simile apozema. *℥. rad. cichorii, dentis leonis, graminis, fœniculi, petroselin. macerat. in aceto. ana ℥ss. rad. valeriana, ℥j. artemisia, chamæd. chamæpit. capill. ven. folior. salicis, cichorii, acetosa, melissa, summitatum lupull. ana m. j. sem. petroselin. apii, dauci, ana ℥ij. semin. quar. frig. maior. ana ℥j. ss. flor. sambuci, trium florum cordial. ana p. j. hordei mundati p. j. vuar. ab arill. repurg. ℥j. coquantur in aqua communipro ℥j. ss. collat. adde syrup. viol. ex succo cichorii, de hyzantiis. ana ℥j. sacchari, ad dulcedinem inducendam, q. s. depuretur, & cum ℥ij. cinnamomi selecti, & ℥j. pulu. specierum diarod. abb. iucundiore odore & sapore reddatur. Rursus & hanc purgationem ehibendam proposuimus. *℥. diacathol. ℥vj. elect. de succo ros. ℥ij. confect. hamech. ℥j. syrup. viol. ℥ss. cum ℥ij. decocti superscripti fiat potio in diluculo sumenda.* Deinde consuluimus, ut omni mane acciperet cochlear vnum atq; alterum ex syrupo sequenti. *℥. syrup. de artemisia ℥ij. syrup. viol. syrup. capill. ven. ana ℥j. misce.* Denuo ut ad has pilulas deueniret, præcepi. *℥. pilul. aggreg. ℥j. cum aqua cichor. fiant pilula v. & circa noctem dimidium sumantur.* Et post tres dies hoc balneo vel simili, si vellent, lauaretur finali. *℥. artemisia, matricaria, nepita, pseudonardi, foliorum lauri, rhyini, ana m. vj. folior. cichorii, folior. salicis ana m. ij. folior. malua, mercurialis, melissa, ana m. j. rad. valeriana ℥ij. rad. apii, petroselin. fœniculi, ana ℥ij. flor. sambuci pani. pug. iij. flor. chamamel. p. j. coquantur in s. q. aqua, & fiat balneum, seu infusum, atque bis sese lauet, mane & vespere ante pastum, & ponat super pectinem sacculum artemisia repletum: sedeatque in dicto balneo super sacculum in omnibus, quæ decocta sunt plenum.* Præcepi autem, ut per tres vel quatuor dies continuaret, & cum ex balneo egredieretur, ut venter inter umbilicum & pectinem, & pars posterior ex aduerso, tum renum regio sequenti vng. ien. inungeretur. *℥. muccaginis althææ, sem. malua lini, fœnugrac. extracta cum aqua malua, ana ℥ij. olei amygdal. dulc. medulla cruris viridi, butyri recentis, axungia, gallina, anseris, ana ℥j. ss. adiecta cera fiat vnguent. partesque dictæ calide eo inungantur.**

4 Consului quoque, ut eodem tempore sumeret tryphæ magnæ sine opio. *℥ij. conferva flor. cichorii & capill. ven. veri, an. ℥j. ss. commista cum iure cicurum rubror. ex balneo egressa exhibeantur.* Et quidem cum tempus adesset, quo menses habere solebat, hæc agerentur præcepi, & ut mox die sequenti ex saphenis ambabus incisus altera post alteram, vno die interposito, tantum ℥ij. sanguinis, vel ad summum tres dimitteret. Quibus præsidis menstrua purgatio, si non subsequeretur, commendabam pessum ex descriptione *Artii lib. 16. cap. 58.* quem ad biliosas mulieres valere scripsit, ex elaterio cum carica pingui, aut cyclamine cum vino puratum.

SCHOLIA.

5 Si ex temperie calida menses supprimantur, aut etiam ex bile, cum non ea ratione lædantur, ut

dictum est prius, conceptionis tantum gratia prouocantur. Qualia autem his, quæ ex nuda temperie laborant, conferant, & qualis victus ratio, superius quoque diximus. Eadem etiam conferunt, si bilis in causa fuerit, vna cum intemperie biliosa. Interea tamen humor biliosus abundans commodis medicamentis purgandus, ut manna, rhab. infuso, syr. ex pluribus infus. ros. viol. & similibus, præcedentibus tamen syrupis etiam quibuldam digerentibus, & decoctis, ut in *Observat. præcedente ostendimus*, quales etiam sunt, viol. ros. e succo cichorii, & boraginis, atque vbi talis quis pluries fuerit exhibitus, purgatio adhibenda, eo humore expurgato; pubi & inguibus etiam quidam cucurbitulas affigunt, vincula infernis partibus, tum cruribus ac tibiis, adhibent, quæque sanguinem ac vterum alterare possunt medicamenta tum intus suscipiunt, tum foris imponunt. Actio etiam iubente, balneum etiam laudant aquæ dulcis, & infusum ex herbis iam dictis, malua, viol. althææ foliis, hordeo, chamæmeli floribus, pubem ac inguina vnguentis inungunt, qualia in *Observat. præcedente* diximus, vel hoc aut simili. *℥. olei amygd. dulc. & amar. ana ℥j. olei viol. de cucurbita. ana ℥ss. adipis anseris, butyri recentis. an. ℥ss. ladani ℥ij. fiat vng.* Pess. quoq; conficiuntur ex contusis malua & althææ rad. mercuriali, hordeo decocto, saccharo rubeo, adipe anseris, gallina, & similibus omnibus contusis, ac simul permixtis, & serico linteo veteri inuolutis: prius tamen antequam immittantur, oleis iam dictis intingunt. Eodem tempore & cremorem sem. 4. frig. ma. or. cum hordei aqua vna cum corticibus parata, aut aqua capill. ven. vel glycyrr. exhibent, tum & pastillos ex iisdem sem. adiectis aliis parum calidioribus. Ista si non sufficiunt, ad ea progrediendum, quæ menses euocant: de quibus, tum etiam aliis topicis medicamentis, superius plusquam satis dictum est.

OBSERVATIO IX.

De menstrua purgatione retenta ex melancholia.

1 Vidua quædam ex mariti obitu ita tota mœssa & melancholica euaserat, ut in maniam fere inciderit, adeoque ut sanguis crassus multus melancholicus, ob crassitiem humoris eiusdem, non solum vteri vasa obstruxerit, quo minus menses fluerent, verum etiam in toto corpore abundare cœperit, lienis obstructione accedente: quod & dolor in hypochondrio sinistro perceptus indicabat, maxime quod tempore autumnali ad me consultum veniret, quo videlicet tempore humor ille magis abundare consuevit. Ideo ut recte illam curaremus, præcipimus ut totius vitæ institutio ac victus ratio ad calidum & humidum inclinaret, magis tamen ad humidum: cum & hic humor magis cum sicco, quam frigido participaret. Deinde hanc potionem minoratiuam, ad feces communes expellendas, quæ & vterum quoq; respiceret, præscripsi. *℥. cassia recens tracta ℥j. confectio hamech ℥ij. cum ℥ij. aqua artemisia. syr. de pomis ℥ss. fiat potio.* Deinde cum animaduertirem sanguinem melancholicum illum in toto abundare, etiam splene obstructo, in cubito sinistro ex vena

Si bilis in causa sit, eiusdem curatio.

lienari iussi, ut vnciæ quinque sanguinis, vel paulo plus, extraherentur: qui sanguis valde crassus & niger erat. Deinde materiam ipsam præparavi decocto sequenti. *℞ fumarie, summitatum lupulorum, melisse, artemisie, borag. bugloss. ceterach. chamapit. chamad. capill. ven. polytrichi, ana m. j. radic. rappar. tamarisci, ana ℥ ss. vuar. passul. ab arill. repurg. ℥ j. florum cordial. p. j. polipodii quercini ℥ j. epithymi ℥ ss. glycyrr. ras. ℥ iij. sem. fœnic. petros. ana ℥ j. semin. citri ℥ ss. fiat omnium decoct. in aqua commun. pro ℥ j. ss. colat. adde syrup. de pomis, de epithymo, de pugloss. ana ℥ j. syrup. de byzantiis cum aceto ℥ ss. misce.* Bis in die ex eo sumat, mane in diluculo, & hora quarta pomeridiana. *℞ diamoschi dul. ℥ j. capiat ℥ ij. cum decoct. iam dicto.* Si mulieres simul laborant morbo vterino, a diamoscho abstinendum. Deinde ut hanc purgationem sumeret iussi. *℞ diacatholici ℥ vi. confectiois hamech ℥ ij. ss. syrup. de bugloss. ℥ ss. dissolue cum ℥ iij. decocti communis adiectis epithymi ℥ j. ss. folliculis, senæ ℥ ij. fiat potio, sumatur hora matutina.* De subsequenti a purgatione dedi ℥ j. theriaca cum vino Rhenano exiguo. Mox descriptis iisdem balneis, biliosis convenientibus, & vnguentis iam supradictis, etiam adhibitis prius frictionibus, vinculis, ligaturis dolorificis in extremitatibus inferioribus, ut tali quoque venam in pede sinistro aperiret præcepimus, at paucò extracto sanguine adhibitis præterea etiam potionibus menses cientibus, cum puluere aliquo dominarum: de quibus in præcedentibus Scholiis tum Observationibus egimus: Istis si nondum menses fluere, consulimus, ut & cucurbitulas quoque fœminibus & poplitibus cum scarificatu affigeret, & metenchryta vteretur ex decocto balnei suprascripti in vterum iniecta, hoc etiam pessò. *℞ tryphera magna sine opio. ℥ j. myrrha ℥ ij. galbani, ammoniaci, ana ℥ j. excipiantur succo parietarie vel mercuriali, aut artemisia, singaturq. pessus ex panno lineo raro, qui filo coxa alligatus demittatur in vterum.* Talis enim utilis est non solum retentis mensibus a melancholia, sed & a bile.

S C H O L I A.

4 *Si melancholia aut atra bilis redundavit ex vasis.* Si menstrua purgatio ex melancholico succo retineatur, prout melancholia naturalis, vel magis adusta sit, ea erit purganda. Præparato itaque prius humore peccante pluries assumto syrup. de pomis de succo borag. aut fumarie, aut etiam de epithymo, deueniendum demum ad epithymi ac senæ decoctum, in quo misceatur ℥ j. castiæ fistula, vel ℥ vi. vel plures electuarii leuissimi, vel ℥ viij. diacatholici, aut ℥ iij. confect. hamech. Nec etiam iuxta quosdam, inconuenit ℥ j. agarici in prædicto decocto adicere. Vel prius dentur oxymelitis simplicis ℥ ij. syrup. acetos. de rad. ana ℥ j. aqua aspargi florum sambuci, pimpinell. an. ℥ ij. pro ij. vicibus, cinnamomo adiecto, pro sapore delectabiliore: repetatur donec materia digesta sit. Purgetur deinde ut supra. Quidam in purgationibus infundunt myrabolanos: sed quia stypticitatem relinquunt, præstat mea sententia superioribus uti, veletiam syrup. ex infus. ros. cum foliis senæ, quo & ego vtor. Humor expurgato possemus & congruo tempore venam in malleolis incidere: potissi-

mum ubi graciliores ac nigriores mulieres fuerint, ac magis si magnas habere venas appareat. Hæ enim crassiores sanguinem, ac magis melancholicum colligunt, ut liquet apud Galen. de curat. per vena sectionem. Post hæc medicamenta, quæ detentos menses euocant, topica adhibenda erunt, de quibus in præcedentibus plus satis, ut non opus sit ea rursus repetere. Quod si diminute fluant, easdem causas habent cum retentione, sed imbecilliores aut pauciores. Proin eadem postulant, sed remissiora, remedia, & clementiora: de quibus quoq. supra dictum est. Sic Iusta Teylingia, cognata mea, apud me habitans, valde venusta, cum in minuta quantitate purgationes consuetas haberet, & circa præcordia doleret, appetitu deiecto, tanquam hypochondriaco malo affecta, præsumtis pilulis mastichinis, eo tempore cum menses fluere hoc decocto largius fluxere, quo factum est, ut bene deinde haberet. *℞ artemisia, melisse, flor. chamamel. an. m. j. infundantur per noctem in ℥ j. vini Rhenani, facta prius leui ebull. addendo cinnamomi & sacchari q. s. pro sapore, claretum fiebat.* Altera luatione addidi aliquid pulegii, & belle deinde habuit. At filia Gertrudis, in caruo nigro Delphis 18. annorū, cum motus epilepticos aliquando pateretur ex mēstruis suppressis, quauis eidē nunquā fluxerant, aperta vena circa malleolū, & purgatione debite adhibita, aliisq. remediis aptis, licet melius habere videretur, nōdū tamen menstruæ purgationes procedebant. Quare consului, ut ex hoc decocto quinq. cochlearia omni vespere sumeret, etiam mane. *℞ sabina, cardui benedicti, borag. buglossa, ruta, abrotani, absinthii communis. an. m. j. fiat decoctio in vino Rhenensi.* Hoc remedio tandem menses aperti sunt, nec amplius passa motus epilepticos, probe conualuit. Vtebatur vero quotidie hoc solo remedio ad 3. menses vel 4. Verū cū sæpe tonsillas inflāmatas haberet, impetraui, ne cōtinuo, sed potius per interualla, hoc remedio supradicto satis calido vteretur, & ut idem apozema decoqueret non in vino, sed in ceruisia communi. Quæ deinde bona valetudine vsa, post aliquot annos nupta, nunc mater multarū proliū est. Verū his absolutis, nunc tempestinū erit, ut ad immodicas vteri purgationes curādas accedam⁹, ab obseruatione, more solito, initium sumentes.

O B S E R V A T I O X.

De muliere ex longo mensium profluvio laborante.

1 Cū ex Italia reuersus, Parisiis aliquot mensibus medicinam facerē, antequam Pithureas accederem, mulier quædam quatuor mensibus in lecto detenta, continuo menstruo profluvio ad Pontem diui Michaelis laborabat. Sicuti Clinicus Medicus, qui curat medicamentis, dictus a lætis ægrotantium, quos frequenter frequentare solet, quasi lectularius: (sic filiam Clinici, id est, Medici Martialis appellat.) Ita & Clinici dicuntur, qui tantopere morbo affecti sunt, ut surgere e lecto non possint. Sic Petronella Clinica apud diuum Petrum dicta, cum probato decumberet, quem Græci καλῶν vocant. Hoc modo & hæc mulier ex lecto

lecto ſurgere nō potuit. Ad hanc ab hoſpita mea, cuius affinis erat, deductus præſcripti victus rationem conuenientem, quæ reſtauraret, & ſimul alia, quæ ad menſes ſiſtendos facerent. Turturē quoque accepi moderare pinguem, ab inteſtinis & fe- cibus repurgatum, eum de plumatum lauari iuſſi in vino rubro conſtringente & aqua roſ. Deinde vnciam vnam maſtiches in vêtre ponebam ac aſuebam ne elabi poſſet, atq; ita veru ad ignem ro- tabam, & inter aſſandum, loco butyri, aceto roſa- ceo aſpergebam, pinguedinemq; ex eo deſluentē colligebam, & vſui reſeruabam. Poſt perfectā aſſa- tionem, turturē ab igne ac veru de poſitum, in ollam nouam vitreatam conſiciebam, luto philo- ſophico obthuratam, & in furnū calidum demit- tendo, vt turtur perfecte exſiccari poſſet, vna cū oſſib & carne in pollinē tenuiſſimum redigebam. Huius pulueris magno cōmodo dabam omni ma- ne cochleat vnum, modo cum aqua plantaginis, modo cum alio decocto conſtringente: & pin- guedine reſeruata inter totādum exſtillata, imum ventrem, tum peſtinem, inguina, & regionem re- num quotidie vt inungerent, mandauit. Erat hoc vnum ex arcaſis præceptoris mei Elidei, apud Bo- tionenſes præctici clariſſimi. Pulvere hoc cum v- ti vidi ſeſſeſſime in multis matronis nobilibus, o- mnem enim diarrhæam ſanat, ventris diuturna profluua, omnemq; humiditatem conſumit, al- bum tum rubrum fluxum menſium reſtringit, ſe- dat matricis dolorem. Venit & tunc mihi in men- tem illius mulieris Romanæ, quæ in Noſocomio Matæ conſolationis longo tempore ex eodem malo decubuerat: nec ſanari potuerat, donec tan- dem, conſilio vetulæ, nouem vicibus ʒj. pul. oſſium huiusmodi ex vino rubro aſſumpta, ſanata eſt. Id me- dicamentum a Cornelio Rotetodamo Medico habui, qui ante me Romæ huic Noſocomio, quod apud Capitolium ſitum, inſeruierat. Poſt hunc enim ipſe Romam veni, & eodem præce- ptore, nempe Gilberto Horſtio, huius Noſoco- mii protomedico, familiariter vſus ſum.

S C H O L I A.

Nunc de immodico fluxu menſtruorū dictu- ri ſumus. Proprius hic quoque vteri affectus eſt, ſicut recentio, de qua paulo ante egimus: quæ quidem affectiones, cauſæ etiam multarum alla- rum affectionum exiſtunt. Moderati ſunt men- ſes in omni muliere ſi ſana ſit, vt duarum hemina- rum Atticarum menſura (vt antea quoq; diximus) ſecedant, aut paulo plures, vel pauciores, atq; hoc ad duos aut tres dies, Hipp. auctore lib. de morbis ma- liebribus: longius autem tempus, vel breuius mor- boſum & ſterile eſt. Albis & mollibus mulieribus, quod multus tenuiſque ſanguis in eis colligatur, diutius permanent (quod ad ætatem & dies ætinet) nigris vero, duris, ac gracilibus contrarium eue- nit, ex Gal. ſenten. 6. de morbis vulg. Cum itaque ſoli- to ſunt menſes plures ac copioſiores, tunc nimi- am eorum purgationem appellamus, Græci πρὸς- κάθαρσιν αἱμορραγίαν ὀνέειν vocant. Profluunt vero immoderate menſes, modo quidem v- no impetu plurimo ſanguine euacuato: nunc ve-

ro ſenſim profluente, ſed diutius quam oportet, nec tempore menſtruo obſeruato. Vtrumque e- nim fieri videtur. Sed & in partu modum aliquā- do purgatio excedit, quæ ſecundum naturam fie- bat. Tunc vero menſes immodice profluere dici- mus, quando ſanguis profluit. Si enim alii ſint hu- mores a ſanguine, alias habent appellationes, vt vteri fluores: qui quidem etiam colorum diuerſi- tate euariant, vt modo albi ſint, modo virides, modo tenuem ſaniem ſeroſam referentes, nunc pituitam: de quibus poſtea, nunc de immodera- to ſanguinis profluuium per vterum agimus. Id tri- fariam fieri volunt, vel collatione habita ad prio- res circuitus, ita vt ſanguis copioſior, quam con- ſueuerit, & per plures dies prodeat, vel a partu, vel etiam abortu, ad quos plurimus ſanguis inſequa- tur: quanquam in hoc veluti & in reliquis natu- ralib. excretionibus non quantitas duntaxat pro ſcopo proponenda eſt, vel qualitas, aut genus ſub- ſtantia, vt lib. de differ. ſympt. ca. vlt. ſcriptum eſt. ſed ſi tempeſtiue, vel intempeſtiue ſiant, ad animalis commodum, vel incommodum. Quapropter tunc nimia vel immodicā dicemus (vt & Donatus annotauit) proprie menſū purgationē, cū ea am- plius non tempeſtiue, neq; ad animalis commo- dum fiat, ſed potius intempeſtiue, & noxa ac no- cumentum ex ea mulieribus conſequatur. Nam quandoq; plus iuſto purgabuntur abſq; earū læ- ſione, propter longā deſidiam, & victū liberalio- rē. Tamen ſi vltra modum fluat in partu, abortu, vel ſine his, collatione habita ad priores circuitus, vt diximus, etiam lædit. Et ſic menſes dicuntur quoq; redundantes, quando purgatio naturalem modum excedit, & euacuatur multus & optimus ſanguis, vel poſt abortum, vel poſt partum natu- rale, vel poſt vſum medicamentorū aperientium oriſicia venarum, & poſt peſſaria acria & corrode- ria, & alias cauſas, (de quibus poſtea) quæ ſanguinē mouere poſſunt. Ita & Fernellius: Immoderate autem, inquit, menſium purgatio vltra naturæ vi- tæq; modū eſt, quæ aut copioſior ſanguis, quā pro multitudine, aut diutius profluit, aut crebrior, aut non ſtato circuitu redit. Quod vero in hac affe- ctione vterus oblatus ſit, nemini in dubium ve- nit. Nam mittuntur in venas, quæ vtero commi- tuntur menſes, (vt prius de retentione menſium dictū eſt) tanquam ad omnium infirmiſſimas partes, qui eiſdem mulieribus valentibus exiſtentibus, antequam concipiant, ſalubres ſūt purgationes. Quæ de re ſi immodice profluant, ipſum vterum affectum eſſe indicabunt, aut per ſe ſolum, vel ſi- mul cum toto corpore, vel aliquibus partib. eiſ. Affectus vero ſymptoma eſt in genere excretorū immodice, non tamen toto genere præter natu- ram, veluti reliqua ſanguinis profluua. Nam præ- ter eam quæ mulieribus per vterum erumpit, ce- teræ ſanguinis pluſculæ vacuationes toto genere præter naturam ſunt: illæ vero ſola multitudine ſeu quantitate, vt liquet ex Gal. 3. de cauſ. ſympt. Fer- nellius duas differentias conſtituit, immoderatam, vel crebriorem purgationem, illam ἀμετρεῖν ἀνωσιν τῶν κατὰ μὲν τὴν, hanc ἀλάντων καὶ συχνότερον καὶ διαρροῖν. Alii

Quid per im-
modicam men-
ſium purgatio-
nem intelligen-
dum ſit.

Partem affe-
ctum.

Qui præter
naturam affe-
ctum ſi menſis
profluunt.

Profluuium
menſium duob.
modis euenire
poſſe.

Differentia.

8

aliam constituunt naturalem commodam & utilem, etiam si consueta purgatione sit maior, ob cibum & potum largiorem, sed quia non lædit, ideo neque restringendam: Aliam vero superfluam & lædentem. Atque hæc rursus iis diuturna, aut recens, ante periodum veniens, vel diutius durans, vires deiciens, vel post euacuationes, sanguinis narium fluxum, aut hæmorrhoides, superueniens, magisq; debilitans, vel sine vlla harum ægritudinem præcedente. Alia quoq; differentia ex parte sanguinis: qui vel purus laudabilis, niger, feculentus, fuscus, albus, aut citrinus existit: & ex parte substantiæ crassus, viscosus, subtilis, liquidus, mediocris, aut coagulatus. Hæc sane atq; alia ad curationem profunt, vti & causæ ipsæ, quæ licet variæ esse possint, sunt tamen eiudem generis cum sanguinis mictu & reliquis sanguis profluuiis. Erit enim Anastomosis dicta, cum maiora vasa aperiuntur, vel Diapedesis, cum minora: vel Diæresis, cum soluitur continuum. Ita & Galen.

Causa.

Anastomosis.

9

Fluit sanguis e venis (inquit) *ob earum corrosionem, vel propter osculorum apertionem, aut resudationem: diapedesin vocant.* Anastomosis eadem habet causas, quas & per naturam habet: nempe expultricem vim proritatam. At proritatur molestia quanti, vel qualis. Sed in eo, quod præter naturam, non solet sola quantitas urgere, vt Iacchinus quoque dicebat, at maxime qualitas, falsa, nitrosa, acris. Huiusmodi enim sanguinem vitiosum aliquæ naturæ congregant, vt in libro de atra bile, Galenus scribit, & experientia monstratur, cum sanguis venæ sectione extrahitur. Sic ergo gracilibus & biliosis mulieribus fieri aliquando istas fluxiones videmus, sic & in partu eueniunt. Quod si dicas, *Si vitio vel quantitate irritatur natura, debuit igitur cum primum purgatum est vitium, aut imminuta quantitas, sponte sua sisti: quod si fieret, nihil haberet præter naturam, vel morbosum, sed utile: purgante scilicet natura excrementa, vnde cacochymum corpus reddi posset, & tollente multitudinem, vnde mala multa eueniunt: Cur est ergo vt superfluat?* Respondet Iacchinus:

Obiectio.

Solutio Iacchini.

10.

Vt in superpurgatione vel superpurgantibus contingit, vt irritata natura non pellat modo excrementa propriorum humorum, quæ a medicamento trahuntur, sed præterea & vtilia simul: sic & hic euenit, vt incipiat quidem expurgare inutile, sed ex proritatione quasi furibunda opere expellendi excedat. Sic igitur naturale opus symptoma euadit. Quod si Anastomosis a causâ procatactica fiat, vt a medicamento venarum ora telerante, non veniet hic fluxus ad immoderationem talem. Poterit tamen & hæc causâ addi, quasi profluuium præter naturam faciat, id est, extra tempus & ordinem naturæ, & medicamenti egebit apertionem corrigentibus. Diapedesis vero fit ex apertis minoribus vasis, vnde resudare sanguis dicitur, id est, sensim stillare, non, vt in anastomosi, confertim. Accidit & incontinentia, vnde facile ex venæ onerantur, & repleti respuunt: sed sensim remittunt, nec continent. Accidit & ipsius sanguinis tenuitate, ob quam resudat ab venarum osculis. In diæresi, vel in solutione continui, causâ est pri-

Diapedesis.

Diæresis.

ma procatactica, vt venas disrumpens, seu dilacerans, quod in partu difficile solet euenire. Fit & ex corporea causâ excedente, vt ex vlcere, & erosionem vel arrosione. Arrosio venæ fit nonnunquam per pessaria acia, vel alia medicamenta caustica & acia, quæ ulcerationem aut excoriationem excitauerant: non deprehendetur, si antea vix fuerint acerrimis medicamentis. Fit aliquando & arrosio a causâ interna, a bile quoque aut sanguine acri, aut pituita falsa. Eroduntur denique a succo vitioso & mordaci, sanguine corrupto, aut aliis humoribus misto. Rumpuntur sanguinis copia, aut onere aliquo leuato, a foetu grandiore, partu difficili, aut abortu. Vasa vulnerantur imperita manu obstetricis, aut chirurgi foetum mortuum extrahentis. Contunduntur sæpe percussione & casu. Referuntur hæc ipsa ad causas externas quoq; aut internas. Externæ vero sunt, seu primitiue, dictæ, vt percussio casus, obuiatio rei dura, vulnus, cursus, saltus, chorea longa ac violenta. Ita Dominæ cuidam apud Valescum, ex pedestri itinere, venæ ruptæ fuere, nec potuit restringi fluxus menstruum, vt inde mortua fuerit. Huc referuntur vltus diuturnior ciborum acrium, aromatum, vini albi, & medicamentorum, ac omnium eorum, quæ sanguinem tenuiorem gignunt. Causæ internæ seu antecedentes, vt *locorum calor exuberans, sanguinis redundantia, facultas expultrix valens, recenter imbecilla, vteri intemperies sanguinea, humores acres, subtiles, falsi, biliosi, sanguisque subtilis, humorum abundantia, partus ineptus, multitudo aut foetus magnitudo, exitus inconueniens, vteri apostema, vlcus.* Gordonius ad tres causas eas refert, ad virtutem, membra, humores. Vt virtus expulsiua fortis, contentiua debilis, membrum rarum, molle, laxum, latum, apertum: humores quantitate vel qualitate, calidus, subtilis, acutus, falsus, mordax, putridus, venenosus, aqueus, frigidus. Hæc & similia exemplis subsequenter illustriora fient: cum causæ variæ varias curationes quoque postulent.

11.

Arrosio.

Ruptio.

12.

Causa externa.

Causa interna.

OBSERVATIO XI.

De superfluo mensium profluio, cum insigni virtutis debilitate.

Cornelia Ioannis mulier. si quæ altera, pulcherrima, cum duobus mensibus integris continuo superflua mensium purgatione laborasset, admodum debilis euasit: ita vt ex virtutis debilitate hunc fluxum fieri coniectarem. Hæc erat prius rubicunda facie, nunc ob fluxum pallidi & mali erat coloris hepate quoq; debili existente, pigra erat, & parum aut nihil remittebatur fluxus: nam etsi ex debilitate contentiue virtutis guttatim quidē & paulatim inordinate fluere, tamen quod id incessanter fieret, macilenta plurimū euasit, verum inter exeundum ardorem nullum vel puncturam, aut dolorem, aut aliquam adustionem percipiebat. Hæc cum animaduertissem, & cum ad eam, annum 39. agentem, Alcmariæ in via Pratoria dicta, anno 1549. mense Octobris accessissem, quod ex virtute debili contentiua hunc fluxum pateretur, omnibus modis studui hunc fluxum constringere,

1

stringere, præscribendo confectiorem hanc in rotulis: *℞. trochisc. de carabe* ℥ ij. *flor. ros. rub. exsiccat. balaust. seminis myrtill. plantag. sm. sanguinaria nostra vulgaris, ana* ℥ ss. *pulu. marg. perforat. & non perfor. fragmentorum omnium lapidum preciosor. ana* gr. ij. *redigantur omnia in pollinem, & dissoluantur cum aqua mentha, ros. q. s. adiecto sacch. fiat confectio in rotulis ponderantibus* ℥ ij. *his utebatur bis aut ter in die, superforbendo cochlear vnum ex syrup infrascriptis. ℞. syrup. myrtini, cotoneorum, rob. de ribes, ana* ℥ ij. *syrup. menthacei* ℥ j. *misce. pectine, inguinibus & regione renum inunctis cum oleis mox sequentibus. Aliquo modo restringebatur fluxus. Verum cum aliquando quasi sanguis congelatus & thrombosus exiret, has tabulas denuo præscripsimus. ℞. sem. agni casti, sem. coriandri preparati, ana* ℥ j. *trochisc. de carabe, cinnamomi optimi (ob sanguinem thrombosum) nucis muschata, an.* ℥ ss. *in pollinem redacta, & in decoct. aqua plant. & melissa soluta q. s. adiecto saccharo fiat confectio in tabulis, ut artis est, qua ad libitum utebatur. Verum cum profluvium magis vrgeret, hoc sequens conditum præscripsimus: ℞. confer. ros. antiquæ* ℥ ij. *pul. ros. rub. carabes* (dicitur enim sanguinem dissolvere & constringere) *trochisc. de spodio cum sem. acetosa, ana* ℥ j. *cum syrup. myrtino q. s. fiat conditum. Capiebat ad magnitudinem castaneæ ter quaterve, vel pluries in die. Si aluum non redderet, glande sola irritabamus, & hoc ceratum supra ventrem inferiorem applicuimus. ℞. vnguent. comitissa* ℥ ss. *vel* ℥ j. *mastiche ros. rubrar. exsic. acac. balaust. coralli rub. cornu cerui vsti, ana* ℥ j. *in puluerem redacta cum oleo ros. q. s. & cera, ac parum ladani, simul uniantur, & fiat ceratum secundum artem supra corium, seu alutam, ut vocant: & supra ventrem inferiorem, tum dorso, applicetur, iis prius inunctis cum vnguent. comitissa. Fiat in duplici forma, vna pro ventre inferiore, altera pro dorso, ac renibus. Verum omnibus istis supradictis menses non sunt restricti, & quia plus æquo fluere, & metus esset de syncope ac morte. id quod sequitur, dedi vnica vice & vnico haustu cum vino rubro styptico. ℞. boli armen. vera* ℥ ij. *trochisc. de terra sigillata* ℥ ss. *pul. carabes lapid. hamatitid. fragmentorum omnium lapidum preciosor. ana. gran. ij. redigantur in pollinem: & cum sumfisser menstrua purgatio cessauit. At paucis diebus aluius restricta manebat; vnde etiam dolor capitis aliquantulum cum vigilia eandem infestabat. Sed sumto diapruno simplici in bolo ad* ℥ vj. *tantum, pauco saccharo adiecto, aluum bis deposuit. Fronti epithema admouit ex aqua plantag. ℥ ij. aqua flor. chamamel. ros. ana* ℥ j. *aceti parum & olei ros. deinde inunxit vnguento alabastrino: & pro vigiliis & siti cepit ex mixtura sequenti. ℞. syr. viol. pap. ana* ℥ ij. *syr. de succo acetosa* ℥ j. *rob. de ribes, & ex manu Christi perlata (ut vocant) pro virium roboratione. Ita hæc accidentia omnia cessarunt, & mensibus non amplius fluentibus, hæc, Dei optimi nutu, sanata est.*

S C H O L I A.

4 **N**on solum causæ diligenter sunt perscrutandæ, sed & signa ipsa, antequam curationem

recte incipiamus. Ita exemplo præcedente ostendimus, cum fluxus hic esset sine dolore ex virtute contentrice imbecilla, vnde, cum diu durasset hæc purgatio menstrua, statim illam restringere oportebat. Sed quod ad signa attinet, cum illa varia quoque sint, prælagientia in primis perlustranda, quæ ad præuisionem & imminetentem affectum quoque vtilia sunt: atq; hoc generale & proprium habent, quod causæ primitiua, seu procatactica dictæ, plures, vel saltem aliquæ præcedant: ita mulieribus choreas ducentibus tempore mensiū, prædicere poterimus superfluam purgationem subsequuturam. Sic iuueniculis imprægnatis vix 14. annum excedentibus, ex partu difficili, aut foetu maiore, vel abortu, ruptis cotylidonibus, fluxus maior subsequi solet: & his quibus vrina nigrior apparet in multa quantitate, cum sedimine nigro, menses mox fluxuri sunt. Sic istis diebus in vxore ceruicarii, cum talis vrina appareret, & circa pectinem valde doleret, abortum futurum prædixi, & quod magnus fluxus consequeretur: vti euenit: quamuis hæc ipsa a nobis curata fuit. Quantum ad signa demonstratiua, licet hæc ex relatu mulieris cognoscantur; statim etiam laboranti, ex 1. lib. Cleopatra & Mosch. sequitur lassitudo corporis, & tenuitas, fœdus pallidusq; color & fastidium, & iuxta Sylium, pedum mollis tumor, virium corporis prostratio, coctio vitata, & ciborum cupiditas; atque in totum omnia quotquot immoderatam sanguinis euacuationem, siue ex hæmorrhoides, siue alio quopiam sanguinis fluore eueniente, sequi cōsueuerunt; ut hydrops & conuulsio, qualia & Galenus ait fœminas infestare accidentia. lib. 6. de loc. affect. cap. 5. & 2. de facultat. natur. Alii addunt, adesse & dolorem pectinis, vel subsequi, ancharum quoque, & grauedinem crurum & coxarum. Vt autem rite (quod præscriptum est) diuersæ causæ huius immodicæ excretionis inuestigentur, primum consideranda est erumpentis sanguinis multitudo, & delationis modus. Ex his namque perdisces, num ex vasorum ruptura, refectione, aut erosione fiat. Nam amplioribus vasis ruptis aut apertis, magna sanguinis copia cōfertim profluit: minoribus vero, vice versa, ut inquit Aetius. Ita anastomosis copia exitus confertim facti: & eo magis, si in corpore affectus præcellerint, cacochymia soboles. Idem coniiciendum, si signa cacochymia sanguinis adsunt, vel morbus præcellerit, qui per crisin sic finiatur: quamquam de profluvio dictum est de febr. sæpius. Si enim critica illa purgatio fuerit, modo non sit superflua, ut ibidem sæpius diximus, non est inutilis, nec constringenda. Ex his iam dictis scimus, si cum copia & confertim fertur, certo anastomosis esse. In diapedesi vero sentim excretur sine dolore, & sanguis tenuis ac dilutus est. Ab erosione factus fluxus dolorem habet adiunctum, virusque & sanies vna emittuntur. Fit hoc vel circa ceruicem, vel in ipsa vteri cavitare. Iam quoque si ea, quæ præcellerunt, consideres, num ex ruptura, vel apertione vasorum sanguis profluat? promte perdisces. Nam eis disruptis, aut

Signa prælagientia.

Signa demonstratiua.

6
Quæ animaduertenda sunt pro causarum cognitione.

Signa, si sit ex anastomosi.

Si ex diapedesi. Ab erosione.

A disruptione vel apertione signa.

vehemens frigus, aut vehemens motus, vel sanguinis abundantia præcessit; ut nunc diximus: aderitque interim aliquis dolor. Apertionem autem eorum non frigida, sed e contrario calida dispositiones præcedunt; veluti si multis, eisdemque calidis balneis mulier vasa fuerit, atque terram seu regionem inhabitet calidam, fueritque antecedens tempus eiusmodi; similiter quoque alimenta, & poriones; nullusque dolor aderit. Ab erosione si sanguinis profluvium prodeat, dignoscet ex supradictis; quod non cōfertim quoque, sed modicus ac paulatim, & cum maximo dolore defertur, *Aetio quoque teste lib. 16. cap. 64.* Quod si erosione causa redundantes in toto corpore vitiosi succi fuerint, biliosi, inquam, aut pituitosi salsi; tum ex reliquis eorundem humorum propriis indiciis, tum etiam ex colore eiusdem, qui profluit sanguinis mēstrui percipies, iuxta Hippoc. sententiam lib. de morbis muliebribus. Ita ex parte materiae: nam si sit fluxus sanguineus, vel sanguis in toto corpore prædominetur, totius habitus erit carnosus, eritque mulier rubicunda, nequaquam male colorata; nec ita debilitabitur; vrina erit quoque rubra & crassa: præcessit otium, vita quies, vsusque ciborum sanguinem multiplicantium. Talis non est restringendus, nisi abundet. Si a putrefactione, sanguis fluēs erit corruptus, mali coloris, foetidus, & subinde exiens cum punctione & dolore. Ex sanguine bilioso maiorem ardorem, dum exit, sentiet mulier in labiis vulvae, eritque ea ipsa macilentata, citrina, & plurimum debilitatur; vrina vero est subtilis, citrina: vsus aromatum præcessit, *synapsis, allii, piperis, cibi quoque ac medicamenta acris*, labor quoque tum exercitia vehementia præcesserunt: in exitu sentitur caliditas, ardor; & velociter emanat, at in parua quantitate: sitibunda erit, & labia ob calorem quandoque findentur. Si sit sanguis pituitosus, mulier quoque pituitosa erit, & humidæ habitudinis, mollis, pallida, male digerit, & ventriculus humiditate superflua abundat, & omnia illa adsunt, quæ pituitam notant & eam adaugent.

Ex colore sanguinis, ut ex Hippoc. paulo ante diximus, etiam notæ habentur. Sic panni linei intincti sanguine, & demum exsiccati in umbra, ex quo humore fiat, nobis declarant, *etiam teste Rhase ac aliis Medicis.* Albus pituitosus, citrinus biliosus, liuidus melancholicus, purus sanguineus. Ex parte membri: Si a ruptura venarum vteri, multus est & subito eueniens: ex profundo niger. Quod quidem verum si a materia adusta: tunc enim denigratur: minus niger magis profundatur in matrice, idque ob corrosionem: ubi corrosio diuturna, etiam foetet. At si arteriæ corrodantur, subtilior est, & clarior, & calidior, exiens cum maiori impetu, & minore intervallo, quam ex venis. Fit autem magis trumbosus ob calorem, perueniens ad partes frigidiores. Si corrosio sit in collo, tactu percipitur sæpe. Si sit ex corrosione venarum vteri, paulatim cum dolore exit. Causæ vero externæ & primitivæ facile habentur ex relatu ægri, si casus, saltus, & alia præcesserint. Internæ vero, ut iam constat ex his quæ diximus, diligen-

tiori animadversione egent. Si sit ex virtute forti in toto repletionis signa aderunt, totiusque corporis aggrauatio: talis fere criticus est. Si vero ex debilitate virtutis, ea aderunt, quæ in *Observat. præcedente diximus.* At qualis sit materia & humor ex prædominio, diligentiore examine, tum ex colore, ut nunc paulo ante recensuimus inuenietur. Siue autem in collo, siue in profundo vteri hæreat malum, ex dolore etiam percipietur. Hæc omnia ad curationem faciunt. Quod & exempla adhuc dicenda manifestabunt. Sed antequam ad prognostica signa serio veniamus, exemplum hic de muliere interferemus, quæ ex abortu purgatione nimia subito syncopen incurrens, non diu post mortua est.

OBSERVATIO XII.

De ingenti ac lethali menstrua purgatione ex abortu.

Quod ex abortu mulieres maxime periclitentur hoc nimio profluvio, in causa est, quod abortus violenter separat chorion membranam a venarum osculis, & abrupit. Itaque eadem causa, quæ violenter agit, etiam impetum facit in pellendo sanguinem: quia vero violenter separat, ora aperit vatorum, unde sanguis cum tanto impetu fluit, ut statim vires dissolvat. Ita euenit mulieri in parte septentrionali prope ædem diui Georgii Delphis, cui ex abortu adeo subsequebatur sanguinis menstrui purgatio, ut in syncopen incidere: a qua licet nostra industria euaserit; subsequente tamen febre, remediis, & ad fluxum aptis, nullo modo inhiberi aut sanari potuit, ut tandem, viribus deficientibus, occubuerit. Aliæ nihilominus non paucæ, simili malo laborantes, a nobis curatæ fuerunt.

SCHOLIA.

Tales quidem fere omnes cum difficultate curantur: quamvis multas etiam post obortum curatas vidimus. Ideo qualiscunque fuerit menstrua purgationis immodica vacuatio, haudquam spernenda est. Nam etiam si subito non moriantur, tamen nonnullæ, cum vteri nimio sanguinis profluvio laborant, hydropem accersuerunt, ut antea quoque diximus, *Galeno auctore 2. De naturali facult.* Id quod etiam timendum diximus in omni menstrua purgationis cessatione, ut idem inquit, cum utrumque ad extremam frigiditatem mulierem ducat. Quæ vero mensium profluvia gradiores partus consequuntur, haud ita periculum minantur; quinimo etiam plerumque sua sponte cessant, ut inquit *Paulus, cap. 62. lib. 3.* At si abortivi foetus causa fiant, repentinum plerumque periculum inducunt, ut liquet tam ex *Aetio quam Paulo.* Vti & in hac euenit. Verum ex quacunque tandem causa fiat mensium profluvium, ubi fuerit immodicum, animi deliquium minatur & syncopen, ut patet 1. de art. ad Glau. Quare etiam quamvis naturalem partum consequatur, mortem infert nonnunquam, velut in reliquis accidit immoderatis sanguinis profusionibus. Magna quoque cum difficultate curatur; præsertim si ab ulcere, & si diuturnum sit proflu-

Signa erosione
quomodo cognoscantur.

Signa ex materia
desumpta.

Signa ex parte
coloris.

Ex parte membri.

Causa externa
facile cognoscitur.

16

Causa inter
difficilis
cognoscitur.

2

Signa pro
gnostica.

profluuium: quamuis & nos tales aliquando etiam curatas vidimus. Sed & illud quoque aduertendum, quod Hippocrates ait: *Si pręgnanti fluunt menses, non posse futurum sanum esse*: hoc enim Galenus *6. de loc. affect.* verificat: *si multus effluat ex venis pteri.* Solutis enim acetabulis id fieri necesse est. Sed euenit aliquando ex venis cernicis, idque exiguum; vnde nihil nocet: quemadmodum contigit nobilissimę Matronę Schoonhouię vxori Domini Cornelii Zuzii Pręsidis Hollandię. Interea tamen menses immoderati non solum dierum numero, vt si continenter fluant vltra dies quatuor, quinque, sex, septemue consuetos mulieri, sunt æstimandi; sed potius vacuati sanguinis quantitas tibi (*inquit Sylius*) obseruanda ex mulieris plenitudine, habitu, viribus tolerantia, colore. Nam si talia & tanta euacuentur, qualia & quanta vacuari oportet, confert, & leuiter ferunt mulieres, nec ante est cohibendus hic fluor, quam vires collabi incipiant, & color viuus perdat, symptomataque eius alia leuiora impendant: grauiora enim ne expectes. Si namque menstrua (*teste Hippoc. aphor. 38. lib. 5.*) plura sunt, accidunt morbi (scilicet appetentia prostrata, coctio omnis imbecilla, virium omnium deiectio, totius refrigeratio, decoloratio, emacratio, ex morbo festium, sterilitas, pedum inflatio, hydrops, bilis feruor, febres biliosę, hecticę, cachexia, lipothymia, syncope, mors senibus repentina: iunioribus tandem superueniens. *Vide Rochem.* Mulieri quoque (*iuxta Hippocrat. aphorism. 39. lib. 5.*) menses decolores, per idem semper tempus venientes, purgationem indicant esse necessariam. Mensium fluor redundans iuuenibus molestissimus, senibus autem, vt plurimum lethalis. Si longo tempore durant, tandem aquas cutem subeuntes inducunt, & animam subinde agere cogunt. In fluxu enim muliebri si cõuulsio & animi defectus aduenerit, malum. Non confessim sanguinis impetum localibus remediis reprimere cõadum (hęc etiam ad curationem faciunt:) nam multa sequerentur incommoda, nempe hydrops, nervorum aut oris ventriculi, aut capitis, pathemata. Si per eclipsin solis aut lunę fluant menses, sisti non possunt, vt vilius Apoleio Platónico, neque si iam diu fluxerunt, quia vasorum ora occalluerunt: id quod sæpe accidit propter mulierum verecundiam; maxime si cacoehymia; aut potius cachecticę fuerint, ac etiam vetulę & excrementosę, nisi sæpe purgentur, & vi uenchymo succi malignitatem emendent. Fluor mensium criticus, aut corpus plethoricum expurgans, nõ sistendus, donec sit quantitate præter naturam. Si magis exuberat in fine veris & æstatis tempore, nempe in principio æstatis, ob sanguinem sit prædominantem: in fine æstatis & autumnii principio, ratione bilis: in fine æstatis & autumnii principio, ob melancholiam adustam in fine hyemis & principio veris, ob pituitam, quamuis tamen quouis tempore euenire possunt. In corpore sanguineo, iuxta quosdam subito restringendus, ob plethoram: liberat enim ægram a suffocatione vteri, lepra, phthisi, feb. pu-

trida & apostematibus perniciosis. At mulieri sanguinem euimenti, *iuxta Hippoc.* mensibus erumpentibus, solutio: & post hæmorrhoides in sana muliere euenientes, virtute constante, bonum. In die critico non perdurantes, vtilis, & in iis, quę synochum patiuntur aut febr. sanguineam putridam; *vt in nostris obseruationibus de feb. multa exemplis ostensum est.* Signa mala sunt, si symptomata superius enumerata succedant. Nunc ad curationem accedamus, prius hoc sequenti exemplo in medium producto.

OBSERVATIO XIII.

De superflua menstrua purgatione ex anastomosi.

Mulieri cuidam cum impetu sanguis menstruus copiose & confertim emanabat, ventis magnis apertis, ex anastomosi. Ad hanc cum venissemus, victum ei instituiamus, qui nihil commoueret, sed quietem faceret: & primum cum satis robusta esset, in ediam quandam ipsa ferre posset imperauimus; sed quia hæ non ita ieiunium ferre consuetę sunt, iussimus, vt actu frigidum ac potestate esset quodsumeret, & vt cibus eligeretur quantitate moderatus, & qualitate astringens, bonique succi, similisque potus. Sic enim Aetius circa initia micas panis ex posca exhibebat, vbi præsertim ieiunium tolerare nequirent, aut oryzam ex posca, aut ouum sorbile, molle, frigidum, in quem vsum etiam similagine, amylo cum posca, vt vteretur concessimus, atq; omnia actu frigida & potestate. Frigida enim densant & immobile faciunt. Vt vino omnino abstineret præcepit. Nam, vt *Paulus admonet*, vinum omnino pro potu vitandum est. Sed aqua pluuiali secundum eundem vtendum, in qua etiam ignitum ferrum fuerit extinctum; aut aqua in qua oxandis polygoni, seu plantaginis folia fuerint decocta, aut myrti fructus, seu cydonia: ipsa iterum posca pro potu vti conuenit, non quidem frigida, sed tepida, vt *Aetio visum est.* Ego iuleb rosatum cum aqua pluuiā commodè admisi: & pro cibo etiam postea carnes syluestres potius, quam domesticas; quibus, vbi opus esset, magis assis vteretur, quam elixis; vt phasianorum, sternarum, perdicum, merularum, turdorum, aliarumque paruarum auium montanarum; e quadrupedum genere, leporum, cuniculorum, seu capreolorum, si reperirentur. Cum eisdem assis vteretur, in eadem iure polygoni, plantaginis, aut oxalidis folia decoqueret, aut etiā fructus astringentes, vt myrti, seu cydonia. Præterea imperavi, vt aerem eligeret temperatum, aut parum ad siccum frigidumque vergentem, & vt somno, temperato vteretur vel etiam longiore, cum omnibus modis prouocandus sit, si quæ minus dormire posset. Præterea consuluimus, vt omnibus modis caueret a motu atq; exercitio & vt animi affectus immodicos vitaret, præsertim iram; & quietem amplecteretur. Nam si motus vitandus, ne humorum imperus augeatur; quanto magis dolor, qui valde humores commouet in eas partes, quæ laborant? Quod ad reliqua præsidia attinet, cum adhuc satis valida foret, statim ex

vena basilica dextri brachii, ut sanguis euacuaretur, nobis utile visum fuit. Altero die sequenti eadem quoque fuit sectio iterata, at paucum tamen sanguine extracto. De qua venæ sectione in Scholio latius. Pro purgatione exhibui, quod sequitur. *℞. myrob. citrinarum ℥ ij. infunde per noctem, facta levi ebullitione in aqua plantag. mane ubi tepuerit, manibus confricetur, & sumantur huius express. ℥ ij. adde rhabarb. optimi parum rosti ℥ j. pulpa tamarind. diaprunis lenitiui, ana ℥ ij. syrup. de ribes ℥ ss. misce.* Bene excreuit, quia facilis solutionis erat. Altero die dedi syrup. sequentem: *℞. syrup. de ribes, syr. gran. syrup. coton. ana ℥ j. aqua acetosa, plantag. bursa pastoris, ana ℥ ij. misce pro ij. dosibus.* Præterea ad auersionem, cum adhuc cum impetu flueret, & magis debilitaretur, adhibuimus frictiones partium superiorum, & brachii vincula recte inieciimus. Paulatim venimus ad astringentia, & dedimus *terra lemnia vera ℥ j. cum decocti plantag. & polygoni ℥ ij.* egregie iuuabat. Quicquid enim citra mordacitatem resiccat, & glutinosum quid habet, veluti est terra lemnia, Iphragis appellata, & samius aster, (Galen. auctore 7. de compos. medic. secundum locos) quæ veluti ad sanguinis spuitiones vndeunque natas conferunt, eadem vi sanguinis ex utero profluvia, & vocatum fluxum mulierem iuuant: ut liquet ex eodem auctore 9. de simpl. medic. facult. Postea adhibui *℥ j. trochisc. de carabe cum ℥ ij. aqua plantag. & syrup. myrtini: lumbos ac ventrem inferiorem, pectinem, inguina, & dorsum inungendo cum vng. comitisse, adiecto pauculo vng. ros. sine opio.* Et cum videretur postea paulo debilior, concessi vinum rubrum stypticum cum aqua plantaginis destillata in balneo, & non in plumbo. Atque ita cum menses ultra tres fere septimanas fluxissent, commode hæc curata fuit, utens subinde & condito concinnato ex cons. ros. antiqua, diacotoneo, pulu. trochisc. de carabe & spodio, cum semine acetosæ, adiecto etiam syrup. myrtino.

S C H O L I A.

Hæc curatio pertinebat ad anastomosin, in qua, sicuti & in aliis menstruis superfluis curandis, semper causa ipsa consideranda est, num hic fluxus statim sit reprimendus, nec ne: nam is, qui criticus est, corpusque plethoricum expurgat, non est sistendus, nisi vires plane deiciantur, nec mulier ultra tolerare possit: tunc enim sicuti omnis fluxus superfluus (ut & paulo ante meminimus) restringendus est. Neque is constringendus statim, qui ex repletionem abundante, & sanguine in toto existente, nisi metuatur vitium deiectionis, & sensibilis debilitas; & qui venit per viam mundificationis, ut vocant, ob repletionem nimiam, cum bona tolerantia, constringi non debet. Aliquando enim causam respicimus, quæ prius abscindenda est. Et ita si fiat ex repletionem vel abundantia sanguinis, eandem venæ sectione & renui victu remouemus, inhibendo vinum, ova, carnes, & similia quæcunque sanguinem augent. Alias respicimus fluxum, ut eundem, ubi vires deicit, & reprimamus, & constringamus. Etiam ad symptomata, quæ obruere possunt, ut est syncope, tum

alia, quæ fluxum excedentem sequi solent. In anastomosi itaque, cuius nunc exemplum protulimus, ubi reliqua non prohibuerint, venæ sectio, reuulsionis gratia in cubito facta confert, præsertim internæ: exiguaque sanguinis quantitas auferatur, & si opus sit reiteretur. Auersio enim impetum humorum retardat, & fluxuros in aliam partem conuertit. Sed dices: de venæ sectione non meminerunt, nec Paulus nec Aetius. At in lib. de venæ sectione, utitur ea Galen. sed in narium profluvio. At eadem est ratio, inquit Iacchynus doctissimus: consuluit autem ibi, ut non expectetur usque quo vires multum debilitatæ sint; sed dum adhuc perstant, & impetus profluentis sanguinis adhuc persistit. Quamobrem venam secare opus erit superiorem, sicut ad hæmorrhoidas plus iusto fluentes Galen. facit in lib. de ven. sect. Sic Benedict. Fauentinus, præceptor meus, etiam in vena petrupta, in principio secat venam basilicam lateris dextri. Alii parum, & secundo die iterum exiguum, ut nos fecimus. Præceptor in sua Empirica tribus continuis diebus, sed parum mitti vult. Sicut nos in quodam Consiliario sanguinem exspuente, vna cum Nieuenio Medico Hagano, & Cornelio Ericio, meo collega, egimus. Verum licet Aetius non faciat mentionem lib. 16. cap. 66. attamen cap. 68. meminit. Mulierem (inquit) rubro fluore vexatam curaturi, primo ad sanguinis missionem vertemur, quæ non tantum materia ad vterum confluenti aduersatur, sed detentionem, constrictionemque tutam efficit: nam multa sequerentur incommoda, si repente sanguinis vel cuiusque defluxum impetum localibus presidis reprimeremus: ita ut quidam inde in hydropem, alii in nervorum morbos, aut oris ventriculi, vel capitis improbos affectus inciderint. Igitur si nihil obstitit, id est, si quæ obstant non valde fuerint insignia, sanguis mittendus est: præcipue si ætas venæ sectionem non prohibeat. Sed paulo supra docuimus iuniores fere rubro fluore vexari: ablationem vero sicut in illis, qui sanguinem exscreant, partiri oportebit, ut paulatim prolixiore tempore reuulsio perseueret: dilataque vena cubiti sectione, a fronte, vel a nariibus, vel a scapulis sanguinem trahimus. Hæc Aetius. Idem præceptor meus Benedictus Victorinus, quod venæ narium incisæ menses retrahunt & diuertunt, dicebat. Iam quoque auertuntur, si supernas partes ligemus; quas & fricare non inconuenit. Nam, ut habetur 5. method. frictio contra oppositæ partis, iuuat. Quamobrem etiam consulit Hippoc. ad retentionem, sub mammis cucurbitulam affigere 5. aphor. 50. Sunt enim pectori ad genitalia venæ communes. Habent nimirum magnam colligantiam cum utero, perque eas demandantur mentes in mammillas prægnatium, ut conuertantur in lac, & per ventosas illdem applicatas ab utero fit diuersio. Verum oportet sint magnæ, & diu debent adfixæ esse cum multo igne, ut vehementior fiat attractio: nam, ut referebat Auicenna, retinent sanguinem in hora vna. Ponuntur autem ad radices mammillarum, vel in pectore, eleuatis mammillis. Hinc & Grædus. Mammillis appone, vel sub illdem, eas eleuando an-

Vena fictio.

Vincula, ligatura, frictio.

Cucurbitula sub mamma.

Ventosa.

do, antequam apponantur ventose. Alii scapulis vel spatulis apponunt; nonnulli & hepaticis: sed non diu retinendæ, ne phlegmonem pariant. Quod vero suadet Paulus inguina vinciri, id est, crura ea parte (ut interpretatur Iacchius) quem in omnibus sectatur Aetius, dubium habet; nam hoc menses euocat. Sed potius vincula superius artubus iniicienda, donec dolorem cient, idque saepe renouando. Inguina igitur vinciri tutum non esse arbitratur, cum est magnus impetus, sed in diapedesi, vbi sensim fluat, & longo tempore, non ita inconuenire putat. Attamen præceptor meus iubebat sanguinem deriuare ad partem vteri propinquam; nempe hæmorrhoides prouocando apposisis sanguifugis: hoc enim menstruam purgationem restringere affirmabat. Ita & hic alii laudant vomitum, sed leuem, in paratis & facile vomentibus, ad diuersionem quoque: sed talis adhibendus, iuxta eosdem, qui violentia sua humores non commoueat. At fluxus sanguinis narium si irritetur, vel sponte veniat, utilis habetur. Auicenna commendat vrinæ quoque & sudoris prouocationem in tenui & aquoso sanguine. Id tamen aliis non placet, etiam materia licet imminuta, cum subtiliando humores magis moueant. Secta itaque vena, etiam aliis auersionibus adhibitis, prout res postulabit, utilis est. Deinde vero etiam si ob vasorum apertionem sanguis profluat, per ea quæ obturant, curare oportet: quemadmodum si ex eorum vasorum ruptura contingat, quæ conglutinant adhibenda sunt. Atqui obrurator osculum dilatatum per astringentia: conglutinatur autem ruptum per eadem, & quæcunque ipsis (ut dictum quoque est prius) in compositione miscentur citra mordacitatem resiccantia, & glutinosum quoddam habentia, ut de terra lemmia diximus. Inter medicamentasistentia Rhases vitur trochisc. de carabe. Fiunt & hinc opio. Aliqui vtuntur cum opio: nam somnus maxime has excretiones sistit, quoniam pruritum & molestiam omnem tollit, & velut immobilizat: quare in magno metu illis vtuntur cum decocto astringente. Ante hæc vero medicamenta in potu etiam illa exhiberi possunt, quæ in mixto sanguinis sunt dicta, id est, plantag. & polygoni succus. Reliqua omnis curatio partem affectam respicit. Sed primo Paulus & Aetius in potu dant balaustum ex posca, aut hypocisthida vel acacia succum, siue lycium, vel etiam vix acerba succum siccum. Sesamum quoque posca maceratum & mollesactum edendum præbent, aut lotiamenta, & eorundem decoctum, & corallorum 3 j. (ut Aetius refert) & succum polygoni, aut plantaginis, etiam ex posca, & 3 j. cornu cerui vsti, vel tantundem corall. rub. lapidisque hamatitidis 3 j. cum posca, vel 3 j. vel ʒ. radicis symphyti, cum eadem posca, quæ semper tepida exhibenda, & vbi hæc non suffecerint, 3 j. trochisc. de spodio, aut de succino vel carabe, vel terra lemmia non posca. Curatio partem affectam respiciens topicis medicamentis perficitur: primum medicamentis sistentibus lumbis apposis & pubi: cuiusmodi est, quod excysinis,

ex galla, hypocisthida, ex colla, quæ ex pelle bouis posca dissoluta: secundo in fessioibus, quas etiam in dysenteria diximus conferre, quibus & in hoc casu multa vtilitate vtuntur ex folior. myrti, ros. plantag. polygoni, symphyti, virgultorum rubi, ac lentisci, decocto: etiam prius inguinibus, & pectine, & regione renū, inunctis vnguento comitissæ, aut alio adstringente. Vtuntur & pessis astringentibus confectis, ut ex punici putamine, & galla, & thure, liquore styptico exceptis. Etiam succos supradictos clystere infundunt, sicuti Galenus docuit s. Method. & se liberasse casum difficilem ea ratione dicit. Interea antequam illa adhibeantur, causæ ratio adhibenda est, etiam si malum pausat, ne paulo post reuertatur. Et sic vbi cacochymia causæ est, ea ipsa erit prius tollenda: si fero acris, vel falso, plenus sit sanguis, vnde tenuis & acris appareat in corpore abundare, tum medicamentis bilem ducentibus vtendum erit, quæ etiam aquosos humores purgent, ut est electuar. de psyllio cum turbit: tamen cum cautione: vel rhabarb. & agaricum, vel myrobalani genera contrita, & infusa. si exusta sanies, confect. hamech cum myrobal. indiæ & fumaris, victusque ratio adhibenda, quæ dulces succos efficiat & temperet: quod etiam potionibus medicis fiet, ut decoctio cichorii, lupul. acetosa, tum aliis, ut subsequenter exempla docebunt. Hæc de anastomosi.

OBSERVATIO XIV.

De menstrui superflue fluentibus ex apertione vasorum.

VXori meæ Euæ Teylingiæ, mihi admodum caræ, ex nobilissima & antiquissima familia Teylingiorum ortæ, ora vasorum vteri aperta fuisse, anno 1553. mense Septembri, cum sese in horro. amicis colludentibus & inuicem aqua aspergentibus, nonnihil fatigasset. Cum impetu quoque mensibus apertis, subsequuta est fluxio, non tamen adeo vehemens, ut mulieri de qua mox diximus Observatione præcedenti. Tamen ipsa fluxio tribus mensibus perdurauit, antequam magna nostra diligentia sisteretur. Et conualuit istis præsidis subsequentibus, victusque conuenienti. Venam in valde meticulosa non secuinus; cum & sanguis biliosus esset, & postea etiam cum minori impetu fluens: in fine nigrior effluebat, & quasi thrombosus: nam hæc subinde tristis melancholiam aliquam ex longo fluxu perdurante contrahebat. Primo exhibuimus hunc syrup. ʒ. syr. ros. ex ros. sic. myrtin. ana ʒ. j. aqua lupul. plant. acetos. ana ʒ. ʒ. misce. fiat iuleb. pro ʒ. dosib. Purgauimus autem leuiter cum infuso rhab. myrob. citrin. cum decoct. folior. acetosa, lupul. plantag. Deinde vt ex sequenti condito vteretur mandauimus. ʒ. conf. ros. antiqua ʒ. ʒ. diacydonii, sine speciebus ʒ. ʒ. myrob. citrinarum parum costarum & puluerisatarum, & indurum, ana ʒ. j. addendo rob. de ribes, syrup. menthacei, an. q. s. fiat conditum. Capiebat ad magnitudinem castaneæ. Renes autem inunximus hoc vng. vel simili. ʒ. vng. ros. olei myrtini, cotoneor. ana ʒ. j. succi plantag. ʒ. ʒ. coquantur ad consumptionem succorum.

12

Causa consideranda antequam topica adhibeantur, ut etiam menses colligantur.

Medicamenta, nulla adhibenda sunt.

in potu abunde sunt.

Topica.

adde coralli rubei, semin. plantag. myrtill. ana ℥j. hypocythid. boli armen. an. ℥ij. cera q.s. fiat vnguent. quo inungebatur, adiecto aceto ros. subinde etiam adiecto vng. comitissæ. Cum autem quotidie debiliior euaderet, etiam hoc clareto utebatur, ℥. flor. ros. rubear. p. ij. santali rubri pulueris. ℥ij. spec. arom. ros. sine moscho (nam debilem stomachum habebat) spec. diarod. abb. ana ℥ss. cinnamomi electi ℥iij. ss. (vt etiam thrombi aliquo modo dissoluerentur) cum aqua plantag. fiat claretum ad circiter ℔j. ss. adiecto pauco saccharo ad saporem. Postea idem claretum ad libram vnā cum vino rubro stiptico conficiebatur, tribus tantum drachmis cinnamomi adiectis, eo delectabatur. Interea etiam sumebat subinde ex mixtura sequenti. ℥. confer. ros. antiquæ ℥ij. boli armenæ vera, mastiches, eboris, sanguinis draconis, omnium subtilissime puluerisatorum, ana ℥j. trochisc. de spodio cum semine acetosa, trochisc. de carabe, puluerisatorum, ana ℥ss. fragmentorum lapidum preciosorum omnium in pollinem redacti. ℥ij. cum syr. menthaceo & myrtino fiat conditum, fuitq; hoc conditum adhuc semel reiteratum. Et cum nondum fluxus constringeretur, istis pilulis assumptis tandem menses restituti sunt. ℥. mastiches, trochisc. de carabe, ana ℥ss. trochisc. de spodio cum sem. acetos. ℥ij. scobis eboris, myrobal. indarum pulueris. ana gran. vj. coralli rub. flor. ros. rub. ana gr. v. in pollinem redigantur, & cum syrup. menthaceo fiant pilule ix. Sub noctem tres capiebat; & his præsidis belle curata fuit.

S C H O L I A.

Hic quoque oscula vasorum vteri aperta erant per anastomosin, quamuis non tanto impetu, vt in alia muliere, de qua Obseruat. 13. diximus. In principio licet venam non secuimus, eo quod vxor mea meticulosa esset: vinculis tamen statim ab initio brachiis iniectis cum frictionibus vsi fuimus. Et post infusum rhabarb. & myrobalan. ad astringentia deuenimus, quæ & sanguinem in craffarent, & eiusdem acrimoniam obtunderent. Talia etiam intus exhibita profunt; vt album oui fortiter agitatum, & calfactum, & per se tantum assumptum, vel cum puluere gummi tragac. aut arabici, mucilago cotoneorum, dissoluta in aqua pecuh. ros. vel plantag. Valet & syrup. de pap. iuiubinus, & de ros. siccis. Hæc enim sanguinis acrimoniam extinguunt, & fluxum retinent a quacunque causa. Supra partem emplastica frigida cum astringentibus posita iuuant, vt bolus armen. rubrica fabrilis, terra sigillata, ac albumine oui excipiuntur & apponuntur. Vel succi herbarum astringentium & refrigerantium excepti farina tritici, vel amylo, inspissatique, & parti appositi, fluxum sanguinis retinent: quibus si adiungantur adstringentia, fortius repellunt, & sanguinis impetum sistunt. Hæc si non prosunt, Rondeletius stercus porcinum capit, reductum ad formam cataplasmati, addendo pul. ros. vt fætor minuatur. Præter vnguenta, e quibus exemplum posuimus. Obseruation. præcedente, etiam extrinsecus loca vteri perfunduntur seu fouentur tepida posca, aut oleo rosaceo, melino, seu myrtheo, pauco vino admixto. Item profunt

cataplasmata ex hordei fabarumq; farina, symphytiradice, polygoni, ac plantaginis foliis, acacia, alumine, & hypocythide ex posca composita: aut ex palmulis, malis, cydoniis, malicorio, balaustis, alumine, gallis, acacia & hypocythide, teneris rubi seu lentisci virgultis, cum eadem posca cataplasma fiat. Vel ceratum ex vnguent. comitissæ, pauco adiecto aceto. Efficaciter quoq; prodest taurocolla aceto macerata, donec dissoluatur, deinde valido linteolo inducta lumbis, agglutinetur, ex decreto Pauli & Aetii. Huc pertinent infessus, de quibus diximus Scholio præcedente, & pessuli: nam pessulorum vsus haudquaquam contemnendus est, qui ex foliis plantaginis, seu polygoni succo, aut myrtillorum symphytique rad. contusis pauca addita manna, thure, hypocythide, ac balaustis, cum eiusdem plantaginis, seu polygoni succo conficiuntur. Interim gallarum puluis, ac aluminis scissi, nec non acaciæ succus cum ouorum tostorum luteis adici poterunt; & quandoque cupressi folia, aut rubi, pariterque & cytrini. Cum vero vsus exigit (vt etiam Donatus admonet) linteo serico, aut linteo tenui excipiantur; & ad formam humani digiti redacti in rosaceum intingantur ac subdantur. Infunduntur quoque (vt paulo ante diximus) per instrumenta ad hunc vsum parata in vterum, quæ Μαλὴ γύστα Græci vocant, plantaginis, polygoni, seu solani succi. Similiter acaciæ, vel hypocythidos, vel decoctum in aqua pluuiali malicorii, gallarum, balaustiorum, hypocythidis, ac foliorum lentisci, cum polygoni seu plantag. succo, aut etiam acacia. Sic Galenus ex vtero sanguinis profluium; quaternis iam diebus profluens, cum nullo alio potuisset sisti remedio, plantaginis succo vtens profus sanauit.

O B S E R V A T I O XV.

De purgatione mensura ultra 9. menses perdurante ac lethali ex reseratione vasorum vteri.

Vxor doctissimi illius viri Magistri Adriani Leonini, Pensionarii Delphensis, incidit in mensium profluium ex reseratione vasorum vteri, eo tempore cum maritus hectica febre laboraret, a qua etiam mortuus est, cuius mentionem fecimus lib. 4. Obser. nostrarum de febre hectica. Nam ipsa sæpe noctu surgens, fatigata stillatim mensibus fluentibus in continuo seruitio mariti ægroantis, mulier admodum curiosa, satisq; biliosa, & viro admodum obsequiosa, fluxum hinc parui faciebat. Admonita insuper sapius per Henricum Vergerium, Medicum doctissimum, vt remedia apta adhiberentur, & victu constringente uteretur, suæ sanitatis negligens; per me quoque postea admonita, nulla adhibuit medicamenta: tandem post multos menses hoc profluium laborans extreme debilitata, marcore quasi confecta, etiam in hecticam incidit. Tunc demum acciuit Cornelium Medicum seniore quendam Delphensem, cum eodem tempore ipse ægrotarem. Hic senex apud templum nouum habitabat, & huic nobilissimæ matronæ cōmendatus erat, quod felicissime menstrua fluentia curaret, & belle cohibere sciret. Verum

Verum cum hic nihil proficeret, eius pertasa tonsorem quendam Haganum seniore, ad se vocat, qui eidem pollicebatur quadam quinta essentia, se illam perfecte sanaturum. At aliter euenit: nam hectica febris mox & putrida ac acuta febris accessit, simulq; aphthæ obortæ sunt fauces, quasi præoccludentes, vt iam suffocari videretur. Accitus tunc est Cornelius Ericius collega meus, cum iam vltra nouem vel plures menses hoc fædo affectu ad extremam maciem euasisset. Postea cum ego a morbo conualuissem, vna fui vocatus: atque vna ingressi inuenimus illam extreme debilitatam, vt nulla spes salutis superesset, neque vlla restaurantia, aut medicamenta commoda illam inuarent. Atque ita ab hectica, tum fluxu illo menstruo exstillante, plane consumpta, & quasi cadauerosa, etiam ante maritum proba admodum matrona & pia obiit.

S C H O L I A.

Hæc erat diapedesis, quia sensim stillabat sanguis, vasis minoribus apertis. Quamuis autem vna fronte non ita hæc superflua purgatio menstrua videbatur periculosa, tamen cum nulla remedia adhiberentur, in muliere biliosa continuo per multos menses stillante, ob tenuitatem sanguinis, vires sunt deiectæ. Deinde in hecticam incidit: & quod eiusmodi calidis vteretur, nec vitium obseruaret, tandem & quintam essentiam illam calidissimam sumeret; putrida febris, eaque satis acuta hectica superuenit, ac non diu post ipsa e vira discessit. Si enim hæc in principio remedia adhibuisset, proculdubio (nec enim erat anastomosis, in qua cum impetu sanguis fluit copiosus; neque sane tam diu sustinuisset illum fluxum) facile sanitatem consequuta fuisset; cum a diapedesi subitus timor non sit, & ideo leuiora remedia exigat. Et quia hæc erat biliosa, & sic etiam ex vitio sanguinis biliosi tenuis affecta; si corpus prius per purgationem fuisset euacuatum, mox astringentibus malum facilius cessasset, additis etiam iis quæ acrimoniam sanguinis obtundunt, incrassant, & constringunt: qualia Scholio præcedente valere diximus. Sic enim humores illi biliosi erant cõtemperandi & purgandi leniter rhabarb. & myrob. vel tamarindis & aliis; prius quoq; sanguinis fluxionem inhibendo, si paulo magis fluat. Si vero sanguis per diapedesin fluat, ob eius tenuitatem, & feri copiam; oportet (*inquit Rondeletius*) eisdem medicamentis euacuare, quibus si ob bilem euenierit; quibusdam additis aquas vacuantibus. vt brassica marina, sena orientali, decocto fumariæ, succo ros. & aliis purgantibus sine magna calfactione. Victus ratio incrassans & inspissans hic quoque iuuat, vt vtendum pedibus animalium, alica, vel amylo, iusculis coctis, omnia, quæ ex farina non fermentata parantur, sunt in hoc casu ex usu. Medicamenta etiam hic conferunt astringentia superius dicta, tum topica ipsa. Ita quoque si ob venarum raritatem fiat, tunc adstringentia & condensantia conuenient: qualia sunt, quæ ex aquis myrtill. peculi ros. parantur, & aliis adstringentibus, vt bolo armen. terra lemnia,

vt diximus, rad. bistortæ, spongiæ bedeg. & similibus. Infusiones facimus, cum vena intus latitat. Si commode remedia possent extra adhiberi, pulueres inspissati albumine, supra partem affectam ponantur. Eadem etiam curant anastomosin: tum iis quæ ad anastomosin recensuimus, etiam hic vtī possumus. Puluis ossis sepiæ cum vino datus fluxum sanguinis retinet. Item carabe, trochisci eorum, de spod. sang. draconis appositus aut assumptus sanguinem erumpentem a quacunque parte retinet. Confer. ros. symphyti, cydon. caro, & aliorum fructuum astringentium conditorum ad id vsurpantur. Fiuntque ex his opiata vel condita. vt hoc modo. ℞. confer. ros. antiq. ℥ ss. confer. symphyti ℥ j. trochisc. de carabe, aut terra sigill. ℥ j. boli arm. ℥ ij. sang. drac. ℥ ss. syr. de ros. sicca vel myrtill. q. s. fiat opiata. Vel: ℞. symphyti, & carni cydon. condit. saccharo, an. ℥ j. confer. ros. antiq. ℥ ss. pul. ossis sepiæ ℥ ij. trochisc. de spodio, & de terra sigill. an. ℥ j. pul. diamar. frig. & diapap. an. ℥ j. syrup. cydon. q. s. fiat opiata. Capiat ad quantitatem auellanæ, superbibendo aquam bursæ pastoris. Si his non addantur syrupi, sed ex confer. & saccharo parentur, tunc condita esse volunt, vt Rondeletius.

OBSERVATIO XVI.

De mensium profluvio venis vteris perruptis ex graui pondere subleuato.

Mulier ex graui pondere subleuato, venis vteri perruptis, menses largiter fluxerunt, ad quam accitus, cum ingentem dolorem in lumbis haberet, & nunc tribus quatuorve diebus durasset, vt vena basilica in brachio tunderetur, nempe dextro, iussu: (nam in dextra quoq; parte vteri dolorem tū in lumbis sentiebat) ad vncias quatuor. Deinde imperavi, vt dorsum ac pubem inungeret oleo myrtino, puluere quoq; myrti & ros. rub. insperso. Deinde hunc puluisculum quoque propinaui. ℞. rhab. pul. ℥ ij. ss. mumia ℥ ss. & exhibui cum ℥ ij. aque plant. Deinde aliis constringentibus & glutinantibus per os assumptis, & intra vterum injectis per obstetricem, curata fuit. Quod si non iuuisset, adhibuissem illud experimentum, quo matrona quædam a Guainerio fuit curata, quæ ob eleuationem grauis oneris diu talem fluxum pariebatur. Dabat enim ℥ j. tribus vicibus stomacho vacuo, ac ieiuno cineris stercoris caprarum cum aqua pluuiali, & fuit curata, etiam vetula quinquaginta annorū, atque sanata permansit. Alteram etiam curauit asininio stercore, quod a proprietate sanguinem stringere scribit. Succum ex eo recens excreto exprimebat, & dabat cum syr. myrtino & aqua plantaginis aliquot vicibus.

S C H O L I A.

In solutione continui, si ex casu vel leuato pondere, statim viribus adhuc valentibus venæ sectio conuenit, & vincula brachiis iniecta, & frictions, & cucurbitæ in spatulis. Et si non restringatur, etiam mammæ dextræ vel sinistræ, prout dolor magis in vna parte quā altera infestet. Postea vtimur remediis iam dictis anastomosi, quod ad conglutinantia & astringentia attinet. Vel si in causa fuerit ruptura venarum, procedimus cum

Peritio diapede-
desis.

Si ob tenuem
sanguinem, cu-
ratur.

Ob venarum
raritatem si fiat
curatio.

Qua valent in
fluxu enormi
post partum
vel abortum.

iisdem, quæ valent in fluxu ab acuitate sanguinis, in frigidando sanguinem, & inspissando, & constringendo meatus. Sic etiam in solutione contrinui, quæ fit a partu, vel abortu, iisdem remediis utemur, ubi rem virgere videamus: nam tempore cohiberi non expedit. Vbi tamen vires deiecit, & syncope subsequatur, tunc cohibendus est. Sic anno 1588. 6. Iulii die ad puerperam ex violēto profluvio sanguinis ab utero laborātem de nocte accitus, cum in syncope valde diuturnam prolapsa esset, & pro mortua haberetur, adhibitis frictionibus brachiorum & vinculis iniectis, ubi ad se rediisset, ut continuo ex sequenti mixtura sumeret ad libitum, præcepi. *℞. conser. ros. veteris ℥ j. diacydonii sine speciebus ℥ ij. rob. deribes ℥ ℔. pul. fragmentorum lapidum pretiosorum ℥ j. manus Christi cum perlis ℥ ij. syrup. de ribes, fiat mixtura:* qua quidem viribus recreatis fluxus quoque enormis substitit. Vulgares mulierculæ experimentum habent ad hoc sanguinis profluvium & nimiam euacuationem in puerperis, nempe nucem iuglandem exsiccatam in pulverem redigunt, & tribus vicibus cum ceruisia aut vino rubro exhibent, quo remedio fluxum enormem restringunt. Hoc modo Matrona Rotallera nobilis in Haga comitis dicitur curata. Phoca Iohannis (*sic enim mulieri Alcmariana nomen erat*) 36. annum agens, anno 1549. mense Nouembri post abortum incidit in fluxum copiosum menstruorum, ut astantes de vita desperarent, adhibita vltima inunctione per sacerdotem, ut in moribundis fieri solet. Ad quam cum accederem, dolorem quoque uteri patiebatur, ac inflationem quandam. Sed cyathum vnum capiens ex hoc decocto, inflatio cessavit & dolor. *℞. flor. chamemeli p. j. sem. coriand. preparati, seminis myrtill. ana ℥ j. sem. anisi, ani casti, an. ℥ ij. coquantur in pinta dimidia ceruise communis.* Huius acceptis subinde tribus cochlearibus, dolor sedatus est & inflatio, fluxus etiam nonnihil diminuto. Sed cum perseveraret, linimento circa pubem, & confectio in tabulis assumpta, mēstrua illa vehementerque purgatio simul cessavit. *℞. olei mastichini, myrtill. ana ℥ ℔. olei chamemeli (ob dolorem in utero) ℥ ij. pul. corall. rub. ros. ana ℥ ℔. cera parum: fiat linimentum.* *℞. trochisc. de carabe ℥ j. spec. triumf. diazod. abb. ana ℥ ℔. pul. margar. perforat. & non perforat. ana ℥ j. cornu cerui vsti, coriandri prepar. ana ℥ ℔. redigantur in pollinem, & solvantur cum aqua ros. & mentha, adiecto saccharo q. s. fiat confectio in tabulis.* Nostræ mulierculæ in fluxu post abortum hoc pro arcano habent: carnem fumo indurata ad minus verustate annum excedentem, quam minutissime concisam in patella terrea supra ignem torrent & exsiccant, ut in pulverem redigatur; dant cum vino rubro styptico, vel alio liquore constringente; feruntque hoc remedio deploratas mulieres ex fluxu enormi post abortum restitui. Hoc remedio Domina de Roon pro deplorata habita dicitur conualuisse. Bononiæ post partum & abortum a Medicis hæc præscripta in fluxu enormi belle profuere. *℞. pilul. de bdellio, trochisc. de terra sigill. de carabe, ana ℥ j. cum syr. myrt.*

fiant pilule: exhibitæ sunt mane, & superdormiunt ægra. *℞. margar. non perforat. spodii, ana ℥ j. ℔. coriand. prepar. cornu cerui vsti, an. ℥ ij. cortic. medianor. castanea ℥ ij. sem. ros. ℥ ij. lapid. hamatid. pilorum leporis combustorum. an. ℥ j. sacch. ros. ad pondus omnium, cinnamom. quantum placet pro sapore.* Sumatur bis in die cochlear vnum.

OBSERVATIO XVII.

De menstrua superflua euacuatione ab arrosione.

Mulier biliosa, ex acris humoribus ad uterum confluentibus, superflua menstrua purgatione laborabat; quod & dolor indicabat, & subinde etiam sanies cum sanguine menstruo effluens. Diximus enim, arrosionem aliquando fieri a causa interna, a bile, aut sanguine acris, aut pituita salsa. Cum hic ex sanguine bilioso fieret in muliere admodum biliosa, quoque bilem & humores acres redundantes hæc affectio contineret, habitum ego corporis respiciens, & recrementa reiecta, omnium primo symptomati occurrendum esse duxi, deinde ad erosionem & eius causam veniendum. Ideo ante omnia consului, cum a me curationem postularer, ut parum sanguinis detrahere in brachio dextro ad reuulsionem, ad uncias tres tantum vel quatuor; & iubebam, ut apertio fieret exigua ipsius venæ, ut ita longiori tempore & minori quantitate sanguis expurgaretur, & vires ex larga apertione minus conciderent; id nimirum tantum ad sanguinis deflationem faciebam: nam copiosa sanguinis missio hic nullo modo confert. Interea etiam præcepi, ut fierent frictiones fortes brachiorum & ligaturæ. Postea ad biliosorum humorum, tum acrim purgationem perreximus, ut qui erosionem augebāt. Vbi enim succi vitiosi in toto corpore redundant, & erosionem augent, nulli dubium est, quin illi prius sint purgandi, antequam ad medicamenta veniamus, quæ sarcotica appellantur, & carnem gignentia, ut 7. de compos. medic. secundum locos constat. Verum ut illi humores etiam contemperentur, possumus etiam aliquos syr. p. convenientes adhibere (ubi detur occasio) antequam ad purgationem veniamus. Quare ut prius hunc syr. sumeret mandavi. *℞. syrup. ex infus. ros. ex succo myrtino, & succo acetosa, ana ℥ j. aqua plantag. polygoni. acetosa, ana ℥ ij. misce pro duab. dosib.* Dedi etiam oxyfacc. cum aqua plantag. deinde, ut talis vel similis purgatio exhiberetur consului. *℞. tamarind. ℥ ℔. cort. myrobal. citrin. ℥ ij. fiat decoct. in aqua plantag. & acetosa, & huius accipe ℥ ij. syrup. ex infus. ros. ℥ j. rhab. optimi pulueris. sine spica ℥ ij. ℔. vel ℥ j. misce, fiat potio.* Deinde iussi, ut perueniret ad topica medicamenta: & prius tamen, cum fluxio paulo vehementior esset, quamuis subinde sine sanie & virulentia; ut applicaret duas ventosas sub mammillis, ad maiorem restrictionem, & auersionem: & mandavi, ut bonis cibis & boni succi, qui erosionem contemperarent, præcipue vteretur, alica, amylo cum lacte, & amygdalato, & emuls. seminis quatuor frigid. maior. mundat. & hordeato; & ut succum plantaginis iniici per obstetricem curaret;

3 raret: huiusmodi enim profluuium supprime-
re valet, si cyathi mensura iniiciatur, ut Aetius in-
quit. Verum etiam aliquando forrius aliquod ad-
miscendum erit, alias aliud, pro affectionis respec-
tu. Nam si vas illud quod corroditur, unde pro-
fluit sanguis, magnum & amplum fuerit, austeris
medicamentis opus fuerit, ut balaustio, acacia, hy-
pocisthid. gallis, malicorio, & similibus. Si vero
paruum, conferrent aloe, manna thuris, cortex
pinus, terra lemnia, lapis hæmatites, & reliqua
huiusmodi; quæ nedum cum succo plantaginis,
verum etiam vino austero nigro, aut senecionis
succo subdita, & iniecta conferunt, ex sententia
eiusdem Aetii. Et (ut summam dicam) quæ medio-
criter, & sine morfu detergunt atq; exsiccant, com-
moda sunt, ut quæ carnem generent; ut liquet tum
3. method. medend. tum 2. de composit. medic. se-
cundum genera. Vbi igitur sordes vna cum san-
guine emanarent, tunc obstetrici iussimus, ut et-
iam aquam hordei iniiceret cum succo apii, melle
etiam pauco adiecto, & ad restrictionem & refri-
gerationem addendo succum plantaginis. Postea
succum plantaginis vna cum lacte cocto iniici
4 præcepimus. Et ubi solus sanguis, magis tamen
cum ardore, efflueret, solummodo succum plan-
taginis iniiciebat, aliquando adiecta exigua por-
tione trochisc. de terra sigillata; quos etiam fume-
bat per os cum aqua plantag. addito syr. myrt. In-
terea, ut & ventri apponeret ceratum comitissæ,
cōsuluimus. Ex his bene habuit, cum corrosio ad
maiores ulcerationem non peruenisset. Verum
mulier illa Alcmariana, quæ extra portam, in qua
facinorosi incarcerati detinebantur, habitabat, ex
erosione & ulcere diuturno, longa menstrua pur-
gatione laborabat: & cum Empiricorum actonfo-
rum opera vteretur, neq; in principio bonos Me-
dicos consulisset, licet languida diu superuixerit,
facie admodum fœda, pallida, & cadauerosa, tan-
dem cum vix corpus protrahere posset, diuturna
cachexia affecta obiit.

SCHOLIA.

5 DICTUM est prius, quod si fiat erosione cum vl-
cere, & si diu perseveret, talis superflua men-
struorum purgatio, plerumque esse lethalem:
quemadmodum in secunda muliere euenit; mul-
toque magis si quando ab imperitis tractetur. Si
vero sit erosio circa os ceruicis, melius curatur:
quod non solum per saniam, sed etiam per tactum
cognosci poterit, ut Galenus docuit 6. de loc. affect.
Si vero sit profunda, quod quasi per æruginem
exeuntem (ut dicebat Valeſcus) cognoscitur, diffi-
cilius curatur. Interea tamen adhibenda sunt re-
media apta. Si itaque sit ex erosione, tunc pur-
gato corpore, remediis localibus utemur, opti-
ma tamen instituta victus ratione. Primum re-
medium est succus plantaginis iniectus, præsertim
si valde sordidum vlcus non fuerit. (nam si sordes
adsint, extergentibus erit utendum: exempli gra-
tia, succo apii melle admisto, vel prassii, vel brassi-
cæ) secundum remedium aqua hordei: tertium
lac: & demum omnia, quibus ad dysenteriam ute-
bamur. Quod si dolor vehemens sit, & ardor, etiam

decoctum hyoscyami, & papau. cum astringenti-
bus iungemus, (fere enim in ulcere crueto est ma-
ior) & tandem optatorum medicamentorum ali-
quid immittemus cum suprapositis succis. Iuuant
& adstringentia balnea in cruento ulcere. Vale-
ſcus vero inquit: Si fluxus menstruum fiat a corro-
sione, vel ulcere: id quod scitur per exeuntem virulen-
tiam cum sanie, aliquando sanguine mixtam, & ex do-
lore in loco, exitque illa virulentia & sanies cum fœto-
re, & aliquando ad modum fecis vini, tunc vero facta
ab initio parua phlebotomia, & mundificatione corru-
ptorum humorum, & supposito bono regimine, admi-
nistrentur hæc medicamenta per partes inferiores cum
traiectorio, ut sunt aloe, thus, & cortex eius, & sanguis
draconis, corallus, carabe, myrrha, crocus, lycium, meru-
tha, amyllum, plumbum vstum, terra sigillata, bolus ar-
men. & similia. Et aliquando melicrato mundificentur,
cum iis, quæ stringunt & mundificant vlcus. Vt: ℞. gal-
la adusta exstincta in aceto, charta bombacina combu-
sta, conchlearum vstarum & cornu cerui adusti q. s. in-
de fiat pulu. Vel hic apud eundem magni est iuua-
menti. ℞. lapid. hæmatitid. sang. dracon. carabes, co-
rall. aluminis iameni, balaust. boli armen. terra sigillat.
sem. portul. ana p. a. fiat pul. & cribro excipiat. den-
tur ℥ ij. cum aqua myrtyll. aut arnoglossæ, & si vis
excusari, inquit, a laboribus, accipe trochisc. de terra si-
gill. qui describuntur cap. de hæmoptoica pass. & da cum
succo arnoglossæ, ut ibidem docetur, vel cum succo ar-
noglossæ cum traiectorio iniiciantur. Iuuant enim post
mundificationem vteri cum hydromelite, & sunt admo-
dum viles.

OBSERVATIO XVIII.

De immodico mensum fluore ob sanguinis te-
nuitatem, caliditatem & acri-
moniam.

FLUOR autem immodicus mensum magna ex
parte contingere solet a sanguinis caliditate,
tenuitate, & acrimonia: quemadmodum istis die-
bus contigit mulieri iuueniculæ supra modum bi-
liosæ. Quæ cum ad me consultandi causa venis-
set, ut hæc ordine fierent mandauimus. Primo ut
alius clystere sequenti leniretur. ℞. folior. malua,
violarum, parietarie, mercurial. ana m. j. prunor. da-
masc. num. xij. coquantur in aqua communi pro ℔ j.
colatura, adde olei viol. ℥ ij. cassia pro clysteribus
℥ j. sacchar. rub. ℥ ss. vitellum vnius oui, salu parum,
fiat clyster. Quod si bolo magis delectaretur, hoc
vti suadebam. ℞. cassia recens tracta ℥ j. sem. ber-
ber. puluerisati ℥ ij. fiat bolus. Deinde: ℞. syr. ex ros.
siccis, agrestis, de succo acetos. ana ℥ j. ss. aquar. acetos.
portulacæ, ana ℥ ij. misce. ieiuna per triduum in di-
luculo lumat. ℞. elect. triumfant. ℥ ss. vtatur cum sy-
rupis, purgetur autem hoc modo. ℞. folior. acetosæ,
portulacæ, ana m. ss. prun. damasc. iuiubar. sebesten re-
cent. ana ℥ ss. flor. nymphaeæ, vio. bugloss. ana p. j. coquan-
tur in aqua communi, & huius colatur. accipe ℥ ij. adde
syrup. ex infus. ros. pallid. ℥ j. ss. pul. rhab. selecti ℥ ij. mi-
sce. detur in diluculo. ℞. pilosellæ, bursæ pastoris, ros.
rub. cum capitibus, cauda equina, plantag. ana m. j.
rad. consolida maioris, rad. sigilli beatae Mariae, len-
tium excortic. ana ℥ j. cupul. glandium, balaustii,
sumach, granorum myrti, nucum cupressi, ana ℥ j.

Gummi arabic. acac. hypocisth. ana ℥ ℔. contundantur,
 fiat decoct. in aqua plantag. pro ℔ ij. dulceretur fre-
 quenter cum saccharo. Hoc aliquando exhibitum
 fuit Dominæ de Cruningen laboranti ardore v-
 rinæ, & copioso fluxu menstruum. Item istud.
 ℥ farina glandium ℥ ℔. osium cap. caponum, far-
 cium lucii combustorum, osium dactylorum, ana ℥ j.
 coriandr. prepar. ros. siccarum, anisi torrefacti, rad. ne-
 nuph. citrina, ana ℥ ij. rasura eboris ℥ j. sem. plan-
 tag. acetosa, ana ℥ ℔. pulueriscentur. Vel capiat se-
 quens: ℥. conferua ros. antiqua, conferu. rad. sym. hy-
 ti, ana ℥ j. coralli rub. lapid. hematitid. cornu cerui vsti,
 acacia, hypocisth. ana ℥ j. diacydonii sine spec. ℥ j. ℔.
 corticis ouor. ℥ j. cum syrup. myrtini excipiantur; &
 fiat ad modum elect. mollis. capiat ad magni-
 tudinem castaneæ parvæ duabus horis ante ci-
 bum, mane & vespere. Hoc deglutito, parum vi-
 ni rubri chalybeati bibat. Quod si neque iis con-
 stringatur fluxus, tunc consulerem, ut sequens
 acciperetur. ℥. syrup. myrtini, cotoneorum, ana ℥ ij.
 succi stercoris asini recens ℥ ij. aqua plant. ℥ vj.
 misceantur, & ieiuna per triduum in diluculo bi-
 bat. Interea extrinsecus inungat ventrem ab um-
 bilico ad pectinem, & regionem renum mane &
 vespere. ℥. olei myrtini, ros. cotoneorum, ana ℥ ℔. bo-
 li armen. lapid. hematitid. acacia, hypocist. coralli rub.
 mummiæ, ana ℔ ℔. cera modicum; fiat vnguentum.
 Detur ℥ j. pul. putaminis ouorum, vel testarum, ex
 qua pulli gallinacei exclusi sunt, vel cornu cerui, vel
 rad. nymphæ, vel rad. eius, ad ℥ j. cum decocto vel
 aqua aliqua astringente, ut bursa pastoris, vel plan-
 tag. Si his non restringatur, cucurbitulæ magnæ
 subter mammæ affigantur, ante pastum, & per
 horam dimidiam hæreant: fricentur brachia, &
 pectus indatur; ut: ℥. micheletæ, tryphera, ana ℥ j.
 ℔. equiseti, acacia, ana ℥ j. spica nardi ℥ ℔. (sistit e-
 nim menses) commista hæc linteo raro involuan-
 tur, singaturque pectus, qui filo coxæ alligatus, in mu-
 lieris pudenda immittatur. Vel loco pessulorum
 (quoniam mulieres non facile admittunt pes-
 sulos) lanam accipito, & cum succo plantaginis
 imposito. Inseculus quoque fiat in hunc vel si-
 milem modum. ℥. polygeni, ros. rub. plantaginis,
 bursa pastoris, pilosella, ana m. ij. folior. symphyti, ba-
 laustiorum, equiseti, ana m. j. gallarum, sumach, mali-
 corii, cupul. glandium, gallarum, foliorum cypressi, vel
 nucum eiusdem, ana m. ℔. florum & foliorum ver-
 basci, ana m. j. decoquantur in aqua chalybeata, aut
 aqua pluvia, in qua ad umbilicum vsque se irriget.
 Balneum egressa inungat se vnguent. supradicto,
 vel vngu. comitissæ, & renes, & ventrem, ab um-
 bilico vsque ad pectinem, partemque postero-
 rem ei oppositam; & utatur elect. iam dicto. Aut
 loco balnei, ex iisdem fiat fons; aut ipsius decocti
 fumum per infundibulum in vterum recipiat. Et
 quoties alius sua sponte excrementa, ut conue-
 nit, non deiciat, sumat ℥ j. pilul. de bdellio circiter
 xj. noctis horam: id quod commode facere licebit
 semel aut bis in hebdomada. Ut autem hæc om-
 nia ordine fierent, consului præsentis domestico
 Medico, cum apud nos manere non posset, ut ri-
 te perageret.

S C H O L I A.

Accidit aliquando huiusmodi fluxus super-
 fluus propter nimiam debilitatem, aut & ca-
 liditatem sanguinis (ut diximus) quæ sit a bile mi-
 xta sanguini; unde hæc bilis acris sanguinem ex-
 cuit & subtiliorem reddit, & orificia venarum a-
 perit, ob mordicationem, quam tunc facit. Id-
 circo remouendo causam eius, oportet bilem i-
 psam euacuare, & incrassare sanguinem, ut hoc
 modo. ℥. syrup. de end. myrt. ana ℥ j. ℔. aqua plan-
 tag. portulac. end. ana ℥ ij. misce. vel detur syrup. quo
 nos vsi sumus; deinde eodem purgetur. Postea
 ea, quæ intus exhibentur per os & per vterum, &
 reliqua topica adhibeantur; ut iam satis dictum
 est. Si plura de his desideres, vide Leonellum
 cap. proprio: Ita quoque si falsa pituita fuerit
 causa huius superflui fluxus, vel per apertionem,
 vel erosionem, syrupus e corticibus citri conue-
 nient, vel mel rosaceum cum syr. myrtino, vel ex
 absinthio, & purgabimus hoc vel simili modo. ℥.
 cor. myrob. ch. bul. ℥ iij. agarici trochisc. ℥ j. fiat de-
 coct. in aqua plantag. in quo ℥ j. ℔. syrup. ex infus. ros.
 pallidarum dissoluas, & fiat potio. Postea constri-
 ngatur cum iis, quæ nunc dicta sunt. Quale & hoc
 decoctum est, quo puerpera cum enormem flu-
 xum mensium pateretur vsq; ad syncopen, com-
 mode vsa est. ℥. sigilli beatae Mariae, millifolii, bursa
 pastoris, rosar. cum toto, pilosella, ana m. j. sem. acetosa,
 plantag. gran. myrti, sumach, ana ℥ j. lentium excor-
 tic. gummi arab. ana ℥ ij. radic. nenuph. citrin. ℥ ij. nu-
 cis moschata, schænanthi, ana ℥ ℔. rad. consolida maior.
 exsic. ℥ ij. decoquantur in ℔ ij. vini rub. & ℔ j. a-
 qua plantag. exprimatur & dulcoretur decenter sac-
 charo. Sumebat autem cum paruo cochleari i-
 stum puluerem. ℥. ros. rub. been albi & rub. spo-
 dii, ana ℔ j. osium capitis caponis, farina glandium,
 coriandr. prepar. ana ℥ ℔. margar. corall. rub. osu de cor-
 de cerui, hyacinthorum, sem. antheræ, ana ℔ ℔. cinna-
 momi electi, ℥ j. pul. & misce cum saccharo ad pondus
 omnium. Inungebatur ter quaterque lumbi hoc
 vnguent. ℥. olei ros. myrtin. cydon. ana ℥ ij. decoct.
 bursa pastoris, sem. plantag. sem. acetosa ℥ j. vnguent.
 comitissæ ℥ ℔. bulliant simul ad consumptionem aquæ de-
 coctionis, & cum modico cera fiat vnguentum. Qui-
 bus hæc curata fuit. Ceterum hic meminisse o-
 portet, quod plerumque, ut de signis prognos-
 ticiis diximus, in diuturnis mensibus fluxionibus
 sublequi solet hydrops: quemadmodum euenit
 vxori M. Theodorici, quæ prope Templum no-
 uum Delphis habitabat. Hæc enim cum per tres
 annos mensium profluvio laborasset fere conti-
 nuo, licet diuersis remediis, ut germine ouorum,
 modo albumine ouorum cum aqua plantag. ad
 cōstrictionem, tum aliis infinitis, iisq; variis; etiam
 a me exhibitis, interdum constringeretur; sæpius
 tamen eodem fluxu redeunte, ad extremam debi-
 litatem deuenit, inde ad cachexiam; mox ad hy-
 dropem fluxu tandem restricto: ita ut pro deplo-
 rata haberetur, cum & pedes valde intumescerent,
 & tandem incedere non posset. Ut illud symptoma,
 post tam diuturnum fluxum relictum, curare-
 mus, multis adhibitis remediis ad hydropem &
 leuco-

Si fiat ex si-
 pituita, quæ
 ciendum.

7 leucophlegmatiam, qua ad extremum laborabat, facientibus, post vniuersalia remedia, quæ aquam educerent per vias yrinales vtebatur modo dialacca, modo diacurcuma. Et tandem per lotiam multam materiam aquosam continuo effudit. Demum ad pedes tumidos, in magnam molem auctos & cedematosos, balneo sequenti vltus sum. *℞. foliorum sambuci, samfuchi, fl. rum chamameli Romani, foliorum rorismarini vna cum floribus, salvia, foliorum lauri, ana m. vj. cumini, salis, ana p. ij. fiat decoctio in aqua & aceto acerrimo adiecto.* aqua hæc in magnam cupam reponatur, vimine intertexto & cancellato superimposito & pedes nudi super eodem ponantur, vestibus vndique circumcincti, fumum ex ea aqua calida recipiat, atque sudor omni mane ita prouocetur. Postea & in eodem balneo pedes imponantur; idque omni mane per plures dies, ventriculo ieiuno. Hoc præsidio tandem incipiebant detumescere crura; tum fasciis circumligabantur: idque continuando per plures dies, a leucophlegmatia, tum hydrope miraculi instar, curata fuit. At Marronæ cuidam. Quæ fluxum muliebrem & menses copiosos ita habebat, vt in synicopen quasi incideret, nec vllis modis restringi possent, mulier quædam exhibuit tria cochlearia aquæ plantag. cum tribus cochlearibus vini rubei, adiciendo vitellum vnius oui, leuiter tandem ebulliendo. Singulis diebus omni mane totum sumebat, super dormiendo. Vix duobus diebus, aut tribus, cum sumisset, fluxus ille enormis cessauit, & sanitati restituta fuit. Hoc eodem remedio postea & plures a sædo illo malo liberatæ sunt per me, Deo adiuuante. Hæc satis sint dicta de menstrua purgatione rubra. Nunc ad fluxum muliebrem accedamus, quem alii menstrua alba appellant.

OBSERVATIO XIX.

De fluxu muliebri, aut menstruis albis.

1 Vxor illius Cornelii Alemariani, in platea frumentaria habitantis qui vascula conficiebat, ultra decem annos cachexia affecta, facie admodum pallida & cadauerosa, per vndecim annos fluxu muliebri, vel menstruis albis, detinebatur. Cum autem in patriam essem reuersus, & apud patrem tunc agerem, hæc quidem vicina nostra me consulendi causa accessit: cui in primis adhibuimus medicamentum, quod aluum & simul aquam duceret: deinde diuretica propinauimus: mox ad illa confugimus, quæ ad hydropem valere scripsimus; quibus etiam melius habere visa est. Verum cum tenuioris fortunæ esset, paulo post curationem reliquit, ac suo more viuens ad hydropem deuenit, & cum tunc pro deplorata haberetur, in maxima copia ebibit ceruisiam Gedanam, qua quidem casu & bona sua fortuna alius supra modum soluta est: & tota aqua cum maximo impetu per aluum effusa, præter mentem curata fuit. Cum autem hæc illi contigissent, hortabar, vt nunc aliquibus medicamentis vteretur, quæ hepar roborarent, ne rursus eiusmodi superfluitates aquosæ regenerarentur. At mulier sui negligens, suo more vixit; quamquam ei ea-

dem medicamenta proposuissem, quibus Galen. in Boethi vxore (de quibus suo loco) vltus fuerat. Proin post duos tresue menses iterum in consuetum muliebrem fluxum incidit, neque tunc nostro consilio, aut aliorum medicorum celebrium vii volens, paucos post annos denuo in hydropem lapsa est; nec vllis præsidis vtens, ex eadem hydrope mortua est.

SCHOLIA.

2 FOEmina aliquando totius corporis culpa non purgatur (vt in precedentibus, cum de retentione menstruum ageremus, diximus) aliquando parcius aut liberalius, vt iam mox ostendemus. Ita quoque interdum malum quippiam per vterum excernitur, vt liquet ex Galen. 3. de causis symptom. Quæ quidem affectio vocatur a Græcis *πύς γυναικεία* vt patet ex Galen. citato loco, & lib. de diff. sympt. & 6. de locis affectis. quem sectari sunt Paulus lib. 3. cap. 73. & Aetius cap. 65. lib. 16. A Latinis vero *Muliebri fluxio*, seu *Profluuium muliebri* appellatur; ab aliis *Superfluitas alba*. Is fluxus maxime mulieribus laxis carnibus & pituitosis accidit; vnde albos flores vulgus vocat, alii *Menstrua alba*. Est vero totius corporis recrementi destillatio, vt inquit Paulus. Vel vteri destillatio diuturna, vt Actio visum est. Vel vniuersi corporis per vterum expurgatio, ipso haudquaquam affecto: vt ex Galeno colligitur locis citatis: ita vt nec alicuius determinatæ corporis partis affectio hæc dici possit. Iuxta alios modo est ab vtero solo, modo per consensum aliorum membrorum: interim ea ipsa est symptoma in genere excretorum immodice, præsertim in qualitate: nam vitiosum est quod expurgatur, vt eodem lib. De diff. & 3. de causis. scriptum est. Fluunt enim ex vtero alia humiditates a sanguine, modo permixtæ, nunc sinceriores: atque vario colore, aliis albæ, aliis virides, aliis fuliginem imitantes, aliis flauæ. Sed inter albas differentia est substantiæ. Aliquando enim pituitam lentam imitatur, aliquando tenuem & aquosam. Ex qualitate etiam quoniam alias acris est & mordax, quod plurimum euenit; alias mitior. Corpus enim per hanc partem, vt diximus, sese expurgare tentat; idque per excrementa varia, pro natura humoris qui abundat. Sic itaque mulieres reddunt per vterum quædam excrementa serosa, quam purgationem muliebrem appellant, quod illis sit peculiaris & propria. In quibusdam quotidie, in aliis post mensium purgationes, nonnullis euenit inter duas purgationem tantum. Aliquibus hoc vitium a toto corpore dependet; in reliquis ab affectibus vteri, vt Rindelertius quoque censebat. Generatur autem hic fluxus muliebri, vel ex complectendi functione imbecilla, vel expultrice immodice concitata, vel ambabus simul læsis, aut quod totus sanguis tenuis, serosusque est redditus, vt lib. de diff. sympt. a Gal. scriptum est. Atqui sanguis talis fieri potest, vel ex sanguificæ facultatis operis frustratione; vel ex eius, quæ tenue & serosum separat, seu idem excernit. Incidere etiam aliquando potest ex retentricæ ipsa immodice opus suum virgente, & cute inspissata & renib. occlusis;

Muliebri profluuii, quid sit.

Quæ pars affecta.

Quis affectus præter naturam sit.

3 Differentia.

Causa.

ex eiusdem Galeni decreto. Vel ambabus simul læsis ob copiam & sanguinis qualitatem. Et ita secundum quosdam a tribus quoque causis potissimum procedit. Primo a toto sanguine aquoso transmissio ad vterum, quo fluxu subinde sequitur totius alleviatio, modo non superfluat & diu adhæreat; idque etiam ab hepate: quando nimirum a toto provenit. & hepar debilitatur in significando, ut non possit probum ac bonum sanguinem generare. Secundo a capite, humiditatibus in cerebro per viam indigestionis collectis, vel ex vaporibus eleuatis ad caput seu cerebrum, ubi conuertuntur in aquosam materiam, quæ descendit per nucham usque ad vterum, & euacuatur ab eodem. Tertio ab utero ipso, quando vterus proprium suum nutrimentum non digerit, & id in humiditates multas mutatur, quas natura propellat foras. Ita & Syluius dicebat: *Albus hic fluxus fit ab imbecilla coctione ventriculi, & corporis totius, ex morore, vel vusu ciborum pituitosorum.* Sic & Fernelius: *Causa autem, inquit, quæ corruptum humorem assiduo gignit, alias in utero, alias in principibus partibus consistit.* Grauius proinde hallucinantur, qui omnium ex utero prodeuntium, quemadmodum & omnis suppressionis mensium, causam ab vno requirunt utero. Etenim quibus mulieribus viscera refrigerata, vel obstructa, vel scirrhus dura, cruditates, malum habitum aut leucophlegmaticam inuenerunt, corruptus humor in varias partes effusus, sæpe in vterum procumbit, & illac decurrens, corpus expurgat; quod quibusdam per renes aut per aluum fieri diximus. Sic mulier, apud eundem Fernelium, *hydropem mensibus singulis per vterum expurgabat.* Altera causa ex utero quidem rarior existit: eaque vel intemperies est, fereque frigida; vel imbecillitas ab uteri gestatione, a partu, contusione, aut ab alia externarum causarum vi contracta, vel erosio; vel exulceratio ex inflammatione, aut ex abscessu derelicta. His quippe causis oblatus vterus, & proprium alimentum male conficiens, excrementa multa progignit, quæ foras elabuntur & excidunt. Hæc illustrabuntur exemplis viuus subsequentibus.

OBSERVATIO XX.

De menstruis albis, per modum consultationis.

Generosæ cuidam & nobili matronæ ab utero continuo humiditates effluebant, ita ut hanc ob causam sterilis permaneret, & si conciperet, ad felicem partum non veniret. Erat enim muliere profluuium, quod menstruum album vocant: plurimum pallebat, cibos fastidiebat, ægre deambulabat, tumebant genæ & totum corpus flaccidum erat, quasi ad leucophlegmaticam inclinata esset. Et quantum ex iis notis, quas etiam enarrabat vuluæ rheumatismus, erat id ex vniuersi corporis humore defluente ad vterum, fluxioque erat alba, pituitosa, & serosa; nam & fasciæ siue panniculi in umbra exsiccati, album colorem præferebant. Non concipiebat propter humiditatem uteri, qui ob continuam defluxionem semen non retinebat; & si concepisset, partus facile ante tem-

pus excidebat: uti etiā eueniebat mulieri cuidam crassæ ceruicariæ apud Delphes, quæ plusquam octies abortum ex leui causa passa fuerat. Raro enim vuluæ habitudo humida sine rheumatismi vitio euenit, & superabundantis humoris capax est: veluti enim naui carina, corruantium humorum locus est. In hac nobili muliere contingebat tam ex debili concoctione ventriculi, quam hepatis mala sanguificatione, totius corporis humore ad vterum profluente. Quamobrem ut huic recte consuleremus, animaduerso iam profluuii modo, intelleximus similem fere casum esse cum vxoris Boethi, cuius historiam Galenus posuit in libro de præcognitione: & hic casus difficilis quidem est, & ideo particulatim recte proponitur a Iacchino, viro doctissimo, & diligentissime examinatur. *Medici, inquit, ante Galenum cogitabant de curatione, atque eam in duobus scopis ponebant.* Primus erat *siccare totum corpus, & partes, quæ circa vterum:* secundus, *astringere & roborare eas partes, quæ a toto suscipiunt.* Hæc enim sunt communes intentiones in morbis e fluxione, ut respiciamus mandantes partes & recipientes. *Sed hac via, inquit Galenus, cum processissem, nihil est profectum: sed res in deterius labebatur.* Attamen meliorem curationem hac nemo inuenire audebat, cum neque Rationales per methodum, neque Empirici per experientiam meliorum inuenissent. Cum ergo sic dubii essent, tumor circa ventrem apparuit, ita ut grauida crederetur. *At Medici hoc non suspicabantur, inquit, quoniam causam tumoris cernebamur, id est, aquosum humorem, qui ex parte quidem excernebatur, sed maiori sua parte retentus, tumorem fecit.* Hic ergo videtur Iacchino erratum fuisse, scilicet astringentibus intempestiue adhibitis, id est, non bene antea siccato corporis habitu. Erratum post ab obstetricibus, cum lauarent, & victum prægnantium instituerent: id est, non respicientes humidum affectum. Rogabat igitur Boet. rursus, ut mulieris cura haberetur: sed persequi tutum non videbatur, inquit Galen. nemo tamen hunc modum reprehendere audebat, inde omnes hæsitabant. Tandem ipse cogitans super ea re noctu, in mentem reuocauit symptoma quoddam, quod est molities musculorum, qui circa hypochondria sunt sit: appellat autem molitiem, talem carnis tactum, qualem in hyposarca affectu sentimus: tumor scilicet laxis & mollis, qui digitis adeo cedat ut carnem ipsam dissoluere te posse videaris. Hic est tumor œdematodes, soboles pituitosi sanguinis, qui per vniuersam carnem est dispersus. Tale quid sensit circa hypochondria, vnde coniecit, affectum hunc esse intemperiem frigidam & humidam, cum humore pituitoso plurimo aggenitum ex viscerum intemperie, quibus debetur concoctio, peruenientem vero ad vterum pellente natura: qua expurgatione prohibita, vterus intumuerat, & viscera ipsa eo humore plena, vicinas partes & sibi incumbentes affecerant: inde mollis tumor. Iam igitur nosse poterat in quo prior curatio defecisset: nempe quod respexerat solum superfluam humiditatem siccando: (nam de siccatione

solum meminit) oportuit autem adficere, & calefacientia. Sed alia ratione reprehendendus modus ille veniebat; quoniam astringentibus utebantur intempestive; unde retentis excrementis, tum venter, tum hypochondria frigida & humida intempestie magis affecta erant, atque aquoso humore intumuerant; ac proinde de hydropse mulier periclitabatur: ut nostra quoque hæc matrona, quæ neque grauida erat. Huius secundi erroris non meminit Galenus: sed innuit, inquit Iacchinus. Postquam secundo loco curam instituunt, nihil astringentium meminit: non quod prorsus damnanda essent, ut videbimus; sed quia intempestius usus eorum damnandus est: hoc est, priusquam corpus egregie sit expurgatum. Instituit igitur calfacere, ut & siccare: & hoc per arenam marinam excalfactam, in qua ægram volutari iussit, & operiri, ac victum potumque instituit perexiguum, ad siccandum, & frictionibus usus est ad luccationem & extersionem eorum, quæ circa cutem, & ut excrementa plurima ad cutem auertendi gratia ferrentur. Confert enim in his affectibus fluxione, vacuatio, quæ auersione fit. Sed & potiones, quæ deriuent adhibet, tum per aluum, tum per vrinas. Pro exemplo facit mel coctum probe, mox refrigeratum ita, ut speciem præbeat aquæ fontanæ per æstatem, id est, tunc cum æstas viget tali temperie, melle uteremur. Nam frigidum prorsus noceret affectui, & non posset fucatio ex eo fieri, quod densatum hæreat, neque extendatur. Hæc ad corpus vniuersum fieri præcepit. Nam si vellet referre frigido fontanam aquam, quali frigiditate est per æstatem, esset usus incommodus. Hæc diebus septem peracta: quæ cum conferre visa sunt, ausus est Galenus solus petere curam mulieris. Primum ergo aquam ducente per aluum medicamento est usus; qualia sunt, quæ supra de hydropse posita sunt: secundo propinauit aquam, in qua asarum & apium erant incocta; ac postridie medicamentum rursus aquâ ducens propinauit, ut ita assuesceret natura ad vrinas, & per aluum excrementa deducere, quæ antea in vterum confluebant. Usus quoque est quotidie frictionibus ex linteis; primum mollioribus, mox asperis, demum ex melle iam dicto. Itaque, inquit, post dies 15. nihil affectus restabat. Hæc, si aquosus & frigidus humor sit collectus, profunt. Hæc muliere curata, Boethus quadringentos aureos ad Galenum misit. Consului ego itaque cum Medici domestici præsentis consilio, ut hæc ipsa matrona nobilis, præter victum exsiccantem & excalfacientem, etiam medicamentis aquâ & humores aquosos per aluum educantibus, ut diacarthamo & similibus, uteretur: deinde iis, quæ per vrinam tales humores educere valent: & tertio etiam iis uteretur, quæ per cutem eos humores euocare possent. Suasi insuper ut ea ipsa crebrius repeteret, quo corpore toto ita probe repurgato, & humiditas vteri cum exsiccantibus caloreque eiusdem vigorantibus cortigeretur, ac retentiu vis matriæ simul roboraretur & constringeretur; ut non solum fluxus ille diminuere-

tur & cessaret, verum etiam, ut semen recipere posset, ac receptum retinere. Imitabar scilicet consilium illud 207. Montagnanæ pro Domina cuiusdam strenuissimi militis, ad fluxum vteri ab immoderata humiditate, cuius causa sterilis esset. Tandem ad ea deueni, quæ fluxum illum album simul constringunt, & humiditates albas tollunt; qualia etiam apud eundem Bartholomæum de Montagnana referuntur ad longum consilio 204. 211. 214. 215. 216. 217. in quibus consiliis multa & apta remedia inuenies ad menstrua alba: quæ nunc breuitatis causa omittimus, eadem etiam tunc domestico Medico perlegenda dedimus, quibus etiam immutatis pro suo iudicio uti posset.

S C H O L I A.

Signa vero profluii muliebris demonstratiua facile innotescunt, ægram interrogando & inspicendo ea ipsa, quæ ab vtero prodeunt, præsertim si mulier sentiat tales humiditates ab vtero emanare. Sed antequam ad curationem procedatur, diligentiore examine opus est, non solum ex qua causa & humore ortum habeat, verum etiam quomodo causæ distinguantur, & quibus modis ab aliis affectibus & inter se differant. Nam fluxus muliebris, ut Aetius refert lib. 16. cap. 67. ex Archigene, licet diuturna sit vteri destillatio, ab eruptione tamen sanguinis differt, ut in qua sincerus sanguis emanet: hic vero fluxus corruptus apparet; diuersorum tamen colorum, pro diuersitate redundantis succi, ut dicemus, qui etiam citra dolorem prodit. Quapropter loci (teste Paulo) continuo madent humoribus colore variantibus: laborans decolor est, cibum non sentit, eumque fastidit, in obambulatione difficulter spirat, oculos habet prætumidos, nunc cum dolore, nunc citra dolorem. Fluor muliebris inquit Fernelius, differt a mensium proflutio, quod non sincerus sanguis, sed corruptum quiddam prodeat, idque continenter, aut nullo ordine, nullaque circuitu. Est autem id modo liquidum & albicans, lactis sero, aut prisana cremori persimile, modo citrinum; modo pallidum, adeo acre fere & adurens, ut quasunque partes attigerit, erodat haud leuiter: atque id rursum modo tetrum est & graucolens, modo odore nullo molestum. Ita & Aetius loco citato: Hic fluxus corruptus apparet, atque interdum ruber, estque ipsius sanguinis sanies: interdum albus. cremori prisana similis, a sanguine videlicet pituitoso excolatus, interdum pallescit, ubi bilis amara redundauerit, saepe aqua modo liquefit, quod a seroso excremento fit. Inferre quoque solet hic fluor inenarrabilem tristitiam, & pedum tumorem: & in aliquibus perpetua destillatio perseverat, in aliquibus per interualla quædam redit, ut ex eodem constat. Paulus lib. 3. cap. 63. dicebat, fieri nunc cum dolore, nunc citra illum, aut cum exulceratione, aut sine illa, aut inflammata, aut sordida, aut pura. Verum aliquibus hoc vitium a toto corpore aliquando dependet, ut nunc ostendimus; in reliquis vero ab affectibus vteri. Hæc cum vlcere vteri conuenit fere, ob id distinguenda est. Distinguuntur autem ex consistentia recrementorum redditorum. Nam

7.
Signa demonstratiua.

Signa profluii muliebris.

8
Fluor muliebris quibus modis differat a mensium proflutio.

Quomodo ab vlcere vteri distinguatur.

quas vlcus infestat, pus reddunt crassis, fœtidius, albius: purgatio autem muliebris est velut ichor, aut serum. Differt etiam, quod mulieres, quæ vlcus in vtero habent, maxime si in collo fuerit, congressum viri non patiuntur, aut si patiuntur, irritatur vlcus. Quæ vero menses tales patiuntur, nullam sentiunt in coitu molestiam. Quantitate etiam differunt. Maior enim copia serosæ substantiæ emittitur, quam puris. At si purus sanguis, qualis ex dissecta vena, profluit & cum dolore, vteri erosionem indicabit, de qua antea sermonem habuimus: nectale profluuium muliebre appellari debet: nam in eo vterus nequaquam affectus est, in hoc proprio morbo laborat; qui erosio seu exulceratio existit: item hic corruptus fluxus qui in muliebri profluuiio ruber apparet, ceu sanies sanguinis fit, vt paulo ante diximus. Differt quoque, *iuxta Benedictum Veronensem, lib. 26. cap. 11.* a gonorrhœa, seu seminali spontanea excretionem, cum hæc non sine titillatione & voluptate aliquando fluat, vel ex debilitate vuluæ contingat, *vt de incontinentia seminis refertur*, seminalibus vasibus imbecillibus: quodenim tunc fluit, album & limpidum est, substantiæ mediocris, sine graueolentia: ac minus abundat, quam rheumatismus hic vteri; magisque membra consumit, ac ozyus exterminat. At ex rheumatismo, seu fluore muliebri, *vt paulo ante dictum est ex Paulo*, genitale ipsum semper humore madidum est: ex feminis incontinentia non semper humescit. In eiusmodi rheumatismis vteri, turbulenta quoque & graueolens vrina demittitur, crasso humore permixto. Purgatio itaque hæc muliebris serosa est, quandoque bilis serum aut ichor, quandoque pituitæ, & id frequentius quam sanguis. Raro fit a melancholia, aut si fiat, tandem cancer excitatur in vtero, vt aliquando in praxi vidimus in muliere Bononiæ, cum eam vna cum præceptoribus inuiseremus. *Prodeuntium odor* (inquit Fernelius) *color, atque substantia floris speciem commonstrat.* Nam perpetuo id, quod euacuatur, tale specie est, quale est, quod in animali redundat, *vt liquet 3. de caus. symptomat.* potissimum autem id, si mulier laxis sit carnibus, & pituitosa, *ex eiusdem Galen. sententia 6. lib. De locis affectis.* Qui itaque exquisite colorem præ se fert aliquem, is redundantem humorem facile indicat. Et ita cognoscitur, cuius sit humoris ichor, aut serum, a colore, qualitate, & totius corporis cacoehymia. Nam si a bile fit, color est subflauus, & pallidus, humor acris, quam acrimoniam mulieres potissimum sentiunt in parte proximâ externæ, & in pterygiis. Et color quidem totus bile redundare videtur; maxime, quando per consensum totius corporis fit: quod etiam ex moribus & victus ratione deprehenditur. Quæ enim acris vescuntur alimentis, & quæ natura sunt negotiosæ, hanc affectionem patiuntur. Sin a pituita, color totius corporis albidus est, & magna quantitas defluit, sed minus acris; vt in hac matrona, de qua nunc diximus Observatione præcedente, eueniebat. Sunt autem & tales otiosæ & desides, quæ hunc affectum pa-

tiuntur. A sanguine fiunt tales purgationes plerumque, *vt Rondeletius sentiebat*, tantum cum mulieres vterum gerunt, vel quando suppressi sunt menses, tunc aliquando natura loco mensium serosum excretum reddit, quod virumque rubescit, & tale est, quasi esset aqua pauco sanguine tincta. Tamen & aliis contingit, vt animaduertimus, quibus nec menses restricti essent, nec quæ vterum gerebant. Si corpus sit plenum sanguine atro, erit purgatio fusca; vel si cancer iam factus sit, purgatio illa non multum differt a sanguinea, nisi quod magis fusca est. Si vero obscurum colorem habeant, causam horum ita perscrutabimur: linteum eo inquinatum arefactum, simplici aqua eluimus, & inde a maculæ colore redundantis humoris notionem capiemus, inquit Aetius. Si autem fiat sanguificæ virtutis vitio, vel eius, quæ tenue & serosum separat seu excernit, id cognoscet ex iis, quæ de hepatica affectione, aut de renum affectibus conscripsimus. Inspissatam autem cutem probe ex te ipso percipies; neque magno labore retentricis, aut expultricis, facultatis læsionem, seu vtrarumque reperies. Rarius autem diximus ex vteri vitio fieri: si ita sit, cognoscetur si reliquæ partes bene habeant, & præcessit retentio mensium vel immodica purgatio, vel alia vteri affectio. Internoscuntur autem causæ, ex solo vteri affectu venire, *iuxta Fernelium*, si fluor sit parciore, & eius affecti adsint indicia. At si ex viscerum totiusque corporis affectu fluor sit, erit copiosus, nec male affectorum viscerum notæ desunt. Ceterum, quod ad prognostica, ætate virgines mulieres rubra fluxio fere comitatur, *ex auctoritate Archigenis apud Aetium*: declinantes autem candida, quarum vtraque si suis ætatibus contigerit facile curatur; sin alienis, difficulter. In omni vero defluxu os vteri aperitur, & veluti relaxatur. Quibusdam etiam vterus ipse decedit, vt vsq; ad muliebre pudendum progrediatur; vt vetulæ cuidam Delphensi longo tempore albo fluxu laboranti. Quamobrem magna cum diligentia curanda est affectio hæc, neque localibus auxiliis fluxus confestim reprimendus erit. Nam aliquæ inde in hydropem, aliquæ in neruorum affectiones, aut oris ventris, aut capitis, vexationes collapsæ sunt: *vt liquet ex eodem Aetio.* Corpora equidem inuadit, quibus plurimo partu & coitu partes illæ laxiores factæ sunt; quamobrem rarissime virginibus. Nihilominus tamen hic affectus non ætate maturas tantum, verum etiam virgines, quas pallor decolorat inuadit; quo & puellam octauo ætatis anno Fernelius obsessam vidit, ac diu postea grauiterque afflictam. His quoque accidit, quæ praua viuendi ratione vtuntur, luxuria quidem, sed minime exercitata. Vnde & nunquam visæ agrestes mulieres id pati, sed urbanae: & inter eas, quæ sunt magis muliebri habitu, & quæ sedentariam vitam perpetuo degunt. Diligentes in hac curatione esse debemus, cum sæpe mulieres etiam ditissimæ consilium a nobis petunt, ob multa incommoda, quæ inde sequuntur. Nam & coitu lædunt virile pudendum, & steriles sunt: quoniam

Quibus modis differat a mulierum seminali spontanea excretionem.

10.

Signa causarum, & quales succi dominantur.

11.

12.

Si vitio sanguificæ virtutis fiat, signa.

Signa ex vitio vteri.

Ex viscerum aut totius corporis affectu.

Prognost.

13.

Muliebre profluuium rarissime virginibus accidit.

Quibus autem potissimum.

quoniam per humiditas partes (vt de muliere precedente diximus) semen defluit, & laxius redditur os vteri continuo affluxu, & minime validum ad trahendum semen, aut etiam continendum. Sed vlcera periculum est, & sceditatis. Sepe etiam & pulcræ mulieres hoc solo scedantur. Adde quod faciem dehonestat, & corpus vniuersum: intumescit, facies, & oculi præsertim: pallet mulier, gracilis euadit, mæsta, sine appetentia; pigritia adest immensa, lumborum grauitas & dolor: maritis nullo sunt oblectamento. Atq; hæ affectiones difficilime curantur, quia pars illi promp- te recipit aliarum partium excrementa, tum ob situm inferiorem, tum ob multum linem venarum eo pertingentium, tum etiam propter consuetam illam naturalem purgationem. Post tales purgationes solent fieri vlcera in vtero, & ab vteribus fluxus immodicus sanguinis. Si vlcera fiant atrodentia vel virulenta, a biliosa materia; si putrida & sordida, a pituitosa; carcinomata a melancholica magis eneniunt. Nulla frequen- uor mulieri molestia affluit, nisi quod uiris & sibi hoc pudendorum madore perpetuo displicet. Non raro tamen ex putredine in corpore, aut vtero, vel ex mista bile flaua, aut seroso excremento, acrimoni- am acquirit, & partes vteri viit & vlcera, & tandem doloris impatientia & atrophia enecat, & ob aliquem vteri affectum, alium ex vtero depra- uatum infert. Vtrumq; autem conceptum impedit: quia semen vel corrumpit, vel lubricando elabi compellit.

OBSERVATIO XXI.

De fluore muliebri post naturalem mensum purgationem.

VXori meæ carissimæ, post mensum natura- lem purgationem, contigit aliquando vt flu- orem muliebrem modo tendentem ad naturam sanguinis, modo ad bilem, experiretur: & quia sæpe facies rubore inficiebatur, & venæ turgidæ essent, sanguinem bis aut salte semel, in vere de- traximus; & egregie iuuabat. Et hoc est, quod dicebat Aetius lib. 16. cap. 64. Mulierem rubro fluo- re vexatam curaturi, primo ad sanguinis missio- nem vertemur, quæ non tantum ad vterum con- fluenti aduersatur, sed detentionem constrictio- nemque tutam efficit: nam multa sequentur in- comoda, si repente sanguinis vel cuiuscunque fluxus impetum localibus præsiidiis reprimere- mus, quemadmodum etiam de mensibus proflu- entibus diximus: nam ita quædam in hydropem vel neruorum morbos, aut oris ventriculi, vel ca- pitis, inciderunt, eodem Aetio teste. Et sic item in hoc casu, si nihil obstiterit, id est, si quæ obstant non valde fuerint insignia, sanguis mittendus, æ- tate consentiente. Et ita vena basilica secta, pau- co extracto sanguine, aliquando etiam partita non solum in mea vxore, verum in aliis egregie profuit. Purgauimus deinde eandem cum decoct. myrobal. citrinar. & puluere rhabarb. adiecto syrup. ros. ex infus. ros. rubrarum apertarum. Et quia in lumbis sæpe dolebat, loca renum frequenter inungi iussi- mus vnguent. ros. sed non ante purgationem totius

corporis: nam vbi habitus vitiosus est, omnium primo castigandus est, & in suam naturalem con- stitutionem reducendus. Curato corpore, ad v- terum veniendum: nam quemadmodum oculo- rum affectus non perfecte curantur, nisi corpus vniuersum curatum fuerit, sic neque vterus. Ideo bilem purgauimus cum medicamentis ad bilem facientibus, aliquo modo astringentibus, vt est rhab. myrobal. succus ros. & earum syrup. & quæ bilis acrimoniæ frangunt. Dedi etiam aliquando pilulas ex rhab. & myrob. frequenter maceratas in succo ros. nam pilulis magis delectabatur. Con- fieciẽbam autem hoc modo. ℞ rhabarb. electi, fre- quentissime irrorati succo ros. ℥ij. myrob. citrin. chebul. induram infusarum in succo ros. an. ℥j. mastiches ℥j. spica ℥j. cum syrup. ros. laxat. de quibus sumebat semel in hebdomada, in lecti exitu, duas vel tres, vel quatuor ad summum. Postea cum modice distillaret, succida lana vino & rosaceo madente fouimus, lummitatesque superiores, nempe bra- chia, vinculis deligauimus. Quæ præsiidia non so- lum in principio post venæ sectionem adhibet Aetius, verum etiam post aliquot periodos ante accessionem; in ipsa adeo accessione adhiberi possunt. Constat autem, mulierem coxis accli- uibus collocandum esse, cruraque ad partes vteri colligendas extendenda & inuicem complican- da. Quod si sanguis copiose deferatur, coxas, pe- ctinem, & lumbos spongiis posca madefactis, in- quit idem Aetius, cooperiemus, si modice, iam di- ctis fouebimus. Sed & leuiter vrinam prouocan- tia, & simul bilem contemperantia propinaui- mus, vt hoc vel simile decoctum: ℞ rad. cichorii cum toto, end. summitat. lupul. borag. fumariæ, an. m. j. lactuca m. B. iuiubar. sebesten recent. an. nu. xij. capill. venter. polytrichi, an. p. j. sem. anisi ℥ij. sem. 4. frigid. ma- ior. an. ℥j. B. flor. ros. rub. p. j. sem. pap. albi ℥j. fiat de- coctio pro ℥ij. coletur & sacch. dulcoretur, & arom. spec. trium sant. ℥j. B. misce. Deinde bibebat vinum ru- brum stypticum Gallicum; & recte habebat. De- di quoque ex hac mixtura, vel simili, ad magis re- stringendum: ℞ conferu. ros. antiq. ℥j. B. diacydon. sine spec. ℥j. B. conferuæ florum cichorii ℥j. pul. trium san. corall. rub. vsti & loti, an. ℥j. B. cum syr. coronor. fiat mixtura. Vtero etiam abluto decocto hordei & lentium, cum paucis saccharo, postea etiam adie- ctis ros. siccis, adhibito in super in fine fotu magis adstringente, tandem recte habuit, optimo victu vtens. Maxime iuuabat in fine collutio adstrin- gens, moderate refrigerans; quale illud est ab Ae- tio commendatum: succus plantaginis, polygani strati- otæ, cydoniorum & mespilorum. Eiusmodi, inquit, collationes non sunt omittenda. Vnumquodq; isto- rum, iuxta eundem, rosaceo aut myrtino oleo perfundatur, fiatq; in sessus in myrti, radicum ru- bi, malicorii, & similium decoctis. Sed quia alia iuuabant, in sessionibus opus non fuit; neq; etiam pessis, tum aliis præsiidiis, quæ ab eodem cap. iam citato lib. 16. recensentur.

SCHOLIA.

Quomodo autem aquosus & frigidus humor collectus (si causa huius mali sit) curetur,

iam ex parte diximus Obser. 20. præcedente, ex mente Galeni. Sed si alterius generis excrementum in causa sit, quomodo erit curandum? Respondet idem Iacchinus: Erit abstinendum a calfacientibus, & purgandum corpus vniuersum, & ea, quæ vrinas ducunt propinanda, & frictions totius cutis adhibendæ, & victus instituendus, qui maxime ei humori repugnet. Semper tamen multa aquositas cum his admiscetur, & plerumq; frigida, quæ tamen vel mistione, vel putredine acquirit acrimoniam. Ideo in vxore, cum etiam bilis abundaret, vti sumus rhabarb. & myrob. nam & hic conueniunt, quæ bilis acrimoniam frangant, quæq; aquam illam biliosam purgent: atq; etiam hic ex parte conueniunt illa, quæ scripsimus superius conuenire immodicæ purgationi mensium ex bile corrodente, aut venarum arrosione. Sic bile flaua redundante, hiera cum rhabarb myrobal. citrin. decocto, ac syrup. ex pluribus infusionibus ros. purganda erit ægra. Sed hic abstinendum vult Rondeletius diureticis, vel aperientibus, nisi in declinatione, aut curato corpore, & cum volumus ad vrinas eos humores deriuaret: tale apozema nobis commendat idem Rondeletius. *℞ cichorea, end. scariola, lupul. fumarie, cicla, mercurialis, lactuc. borag. an. m. j. folior. brassicæ marina, m. ss. passul. prun. sebesten, anapav. xx. sena orientalis & medullæ carthami, ana ʒ ij. (sufficiet ʒ j. vniuscuiusque) flor. cord. p. j. anisi ʒ j. quat. sem. frigid. maior. ʒ ij. tamarind. ʒ j. fiat decoctio in sero caprino, vel in aqua in ʒ j. ss. dissolue succi ros. syr. end. simpl. an. ʒ iiij. (sufficiet ʒ ij. vniuscuiusque) sacchari parum, fiat apozema mediæ decoctionis, capiat in quatuor matutinis, vel iuxta quod alium moueat. Purgat enim aquosam materiam biliosam, & simul per renes. Si mulier sit delicata, aromat. cum sant. rub. Finitis syrupis, potest hæc potio sequens sumi. *℞ decoct. glycyrrh. ponendo ʒ ss. & polypodii ʒ j. myrobal. ʒ ij. coquantur leuiter in vna parte apozematis, in quartario vno colatura dissol. cathol. ʒ j. vel ʒ vj. syrup. ros. laxat. ʒ j. misce. In ditioribus loco cathol. accipe rhab. ʒ j. ss. Vel sumantur pilulæ in obseru. præcedente descriptæ. Conuenit & tryphera persica diasebesten. Et reiterari possunt syrup. vel apozemata, & purgatio. Sed in processu purgationis, quæ purgant & simul adstringunt magis conueniunt, quia minus deducunt recrementa ad partem affectam, & eandem corroborant & siccant. A purgatione, ea medicamenta exhibeantur, quæ proprie *venlina id est*, vrinam cientia dicuntur, quorum sylua a Galeno scripta est lib. 5. de simpl. medic. facult. calida, inquam, ac sicca existentia. Sed hic quæritur, quomodo faciant ad vsum, quæ vrinas cient? Siquidem omnia cient menses. Mouebunt ergo hoc profluuium, non sistent. Respondebimus: Ea quæ proprie vrinaria dicuntur, non mouent menses, vt ex Galeno accepimus; sed potius cohibent, dum sanguinem siccant & crassant. Quod si ad ducendos menses aliquando vtamur, hoc est ex accidenti, quatenus obstructions, quibus detinebantur, tollunt. Contra, (inquit etiam Iacchinus) si vri-**

nas ducunt liquando vel separando aquosum, vt Galenus vult, ita ergo sanguis liquatus, & aquosus humor, feretur ad vterum, sicut ad vesicam: quare augebitur affectus. Respondendum, Non fertur ad renes, humor ille, sed trahitur, prout liquidior sit: ad vterum autem, neq; sponte fertur, nec trahitur, sed truditur a natura, facile ergo auerti potest in partes alias. Et sic ab his (vt etiam dicebat Donatus) sanguis non extenuatur duntaxat: sed & funditur, ac secernitur; non secus atq; lac, quod coagulatur; seroso videlicet, & tenui seorsum segregato, crasso vero in sese coeunte; siquidem quo facillime ad se attrahant renes, quod in sanguine aqueum, tenueq; ac serosum est. Vtraq; hæc conferunt, nempe totius sanguinis primum fusio, deinde segregatio; quorum neutrum absq; valido calore peragi queat. Hæc itaque peculiariter ab eodem Galeno ibidem Vretica, siue vrinam mouentia appellantur, non quia solum moueant vrinas, sed quia solas absq; vi, etiã menses, aut lac, inter quæ apium, atq; asarum eligens, mulieri, de qua antea dictum est, eorundem decoctum in aqua exhibuit. Hæc namq; per vrinam humorem, qui per vterum expurgabatur, deriuando etiam euacuant, vt ipse testatur, cum hoc quod neq; menses ciunt, vt quibusdam Arabicis falso vilum est, & renes occlusos liberant; si id quoq; talis affectio, vel muliebris profluuii causa fuerit: nec minus & per totius corporis frictiones humor quoque euacuandus est. Et si ex cute spissata adhuc talis affectio fuerit orta, iisdem frictionibus rarefiet; quæ primo mollibus lintheis, demum asperis faciendæ sint, vt ex Galeni mente antea ex lib. de præcogn. ad Posthumum, diximus. His quippe medicamentis vniuerso corpori adhibitis, intacto quidem vtero, huiusmodi muliebres fluores Galenus sanauit, vt d. de loc. affect. scriptum est. At in biliosis minus calidis vreticis vtendum est, vt iã ex Rondeletio quoq; ostendimus, nisi in fine, aut corpore saltem repurgato, & humoribus acerbis ac biliosis contemperatis & eductis. Quæritur etiam hic, num astringentibus vtendum? Respondetur quod sic; dum tempestiue vtatis, postquam corpus vacuatum fuerit, & per ea quæ reuellunt, & deriuant. Tunc enim assuescit natura per conuenientes regiones quotidiana excrementa mittere: quare non lædent retenta. At inter initia vti, incommodum: neque vehementer iis vtendum. Nam via est naturalis purgandi, ne forte supprimantur menses. Et ideo vbi hæc non suffecerint iam supradicta, & muliebre profluuium perseuerauerit, ea exhibenda sunt, quæ de mensium profluuiio scripsimus ad retentionem conferre, quorum latissimum campum habes etiam apud Aetium lib. 16. cap. 68. Potissimum tamen ea eligantur, quæ non admodum efficacia existunt; item portulaca commanducata, succusque ipsius porus præsidio est: balauitium, rubi fructus, vt inquit Paulus, nec minus & equisetum sistit rubrum fluorem (qualis hic subinde erat in vxore mea) potum ex aqua aut vino vel hypocisthid. aut lentisci fructus torrefactus

Bile redundante, quid facientium.

Vretica.

Qua medicamenta a purgatione compellunt.

Num vrinaria cientia hic conueniunt.

Refectus cum vino. Samius aster, terra lemnia, Iphragis appellata, coagulum leporis aut hœdi, aut ouis, aut vituli, aut cerui, confert: vna immatura sicca, piceæ cortex & myrti, & peoniæ grana pallida quindecim assidue pota, aut coral. ʒj. e vino nigro, aut vinacea trita cum vino, aut corticis loti arboris decoctum, *Aetio teste*, præcipue ad fluxorem album aut ferolum; & iuxta Galen. 10. de simpl. med. facult. leporis coagulum, si cum aceto ebibatur sanat profluuium muliebre. Quod si cū dolore fluxus deferatur, asininum lac, præsertim asinæ per pascua pratorum nutritæ, quicunq; fuerit succus, præstat. Confert etiam (vt antea quoq; retulimus) stercoris eiusdē asinæ succus; similiter & alicæ aut ptisanæ succus, & rosaceum quoq; vel per se, vel cum lacte infusum. Ne vero ab humore transeunte vlcus excitetur, sanies profluens assidue calida aqua eleuatur, & in his locis moderate astringentia adhibeantur quæ simul abstergerendi vires habeant: deinceps rosaceum aut myrteum aut melinum oleum illinatur, & aqua etiam pura, nihil adstringens habens admixtum, principio præsertim, adhibeatur, ob influentis humoris acrimoniam: nec non, & ob eandem causam & alicæ, & orycæ succus infundatur, vt eiusdem *Aetii consilio*. Ceterum vbi fluxus cessauit, a veloci ambulatione, a multis pectinis ac lûborum frictionibus, ab acrimonia esu, a calefacientibus, flatuosis, & ab his, quæ urinam prolestant, diu abstinendum est; & balneis raro vtendum; neque venter mouendus est, neque spiritus retinendus. Hæc enim omnia malum reuocant, vt idem inquit *Aetius*. Quæ forte præcepta (inquit *Donatus*) *Boethi* uxori *Galenus* instituit, postquam ab eodem affectu ipsam vindicauit, ne in posterum amplius eo morbo ægrotaret, ab eodem *Boetho* rogatus, prohibens, ne illi simile, quod vacuauerat, in futurum aliud gigneretur. Nunc vero tempus est, vt ad alia exempla earum, quæ a nobis curatæ sunt, porro progrediamur.

OBSE RVATIO XXII.

De proflatio muliebri in muliere admodum biliosa,

Matrona admodum biliosa, bile prædominante magis, quam in mea vxore, menstrua alba patiebatur, quæ calore flauo etiam linteolum inficiebant. Primo igitur materiam communem aggrauantem hoc medicamento leniente eduxi: ʒj. cassia recens extracta ʒj. pulpa tamarindorum ʒj. ʒ. myrobal. citrinæ. subtiliss. puluerisatarum ʒj. saccharo asperso fiat bolus. coepit in diluculo. Deinde hunc syrupum quinque diebus continu- is propinauimus. ʒj. syrup. de succo acetosæ ʒj. ʒ. syrup. ex ros. sicci, syrup. myrtini, mellis ros. colati, ana ʒj. ʒ. aqua plantag. acetos. end. ana ʒj. ʒ. misce pro duabus dosibus. In istis syrup. tria complectebamur, alterando videlicet intemperiem calidam totius, ac hepatis præcipue generandis bilem; etiam corrigendo materiam aquosam, & quasi pituitosam per mel rosaceum, quæ semper non nihil peccat, etsi a subdominio in his superfluitatibus biliosis,

tertio, vt quædam stypticas in membris & humoribus relinqueretur, propter fluxum biliosum; nam eiusmodi tres intentiones hic erant spectandæ, vt recte etiam *Benedictus Fauentinus* præceptor meus in sua *Empirica* cap. proprio annotauit. Deinde illam ita purgauimus: ʒj. diacatholici ʒvj. elect. de succo ros. ʒj. ʒ. rhab. elect. ʒj. sine spica (nam magis aperit) myrob. citrin. ʒj. cum ʒij. decoct. commun. florum & fructuum, addendo syrup. ex infus. ros. pallid. ʒj. ʒ. misce, fiat potio. Deinde ablata iam causâ antecedente, syrupis adhuc semel reiteratis, & sumtis pilulis in præcedente Obseruatione dictis, insectoque cremore hordei cum succo plantag. & mucilag. contoneor. (nam ex acrimonia bilis sentiebat ardorem in collo vteri) & exhibita emulsione semin. 4. frig. maior. & pap. propinaui & illud quod erat secretum præceptoris mei, quo multas curauit mulieres. Præcepi nimirum, vt ieiua hunc prius bolum per sex horas ad minus ante cibum sumeret: deinde potum per 15. dies. ʒj. albuminis oui recentis, & non cocti nu. ʒ. thur. masculi, boli armen. terra sigillata, ana. ʒj. ʒ. pulueris entur puluerisanda, & misce. ac patienti exhibeatur. ʒj. vini rub. styptici extinctionis chalybis pluries in eo ʒij. gummi arab. tragacant. ana. ʒj. ʒ. misce, & fiat potus. detur in diluculo. Hæc erant præcipua ex suis arcanis & secretis: & egregie sæpe iuuabant.

SCHOLIA.

Cum ex bile, & præcipue ex biliosis mulieribus hæc superfluitates contingunt; his quidem omnia sicca magis quam humida conueniunt: frictiones loco exercitii, antequam surgant, vtilis sunt. Biliosus humor contemperandus est, tum expellendus ac euacuandus remediis iam sepe dictis. Conueniunt syr. de ribes. myrtill. cotoneorum cum aqua end. portul. & plantag. conuenit & ʒj. ʒ. rhab. infusi in aqua hordei, & expressi. Intus vero panni linei infusi in aqua decoct. aluminis lame- ni; tum alia in Scholio præcedente dicta. Inueni in arcanis M. Ioannis Tiengii, quondam Medicum Amstelamensem anno 1538. suam vxorem curasse in fine mensis Maii, cum laboraret fluxu menstruum alborum in tanta copia, vt vires deficerent, cum multa inflammatione ac sudore copioso, hunc in modum: Primo descripsit pul- lum decoctum cum herba acetosa & sem. eius, & cum ʒj. sumach ligatis in nodulo. Quod ius paratum cum vino rubro & vitellis ouorum sumebat pro virium restauratione. Vtebatur etiam vitellis ouorum frixis in patella cum mentha, gallitrico, nepita, & costo vulgari, herba acetosa, tam in prandio quam cœna: diu prius sumendo vitella ouorum. Mane capiebat vinum rubrum & ceruissiam Hamburgensem vel Collibegensem, cum duobus vitellis ouorum simul cocta, pane modico intrito. Quod ad medicamenta attinebat, in primis sumsit hanc infusionem. ʒj. rhabar. selecti ʒj. agarici optimi ʒj. ʒ. zinzib. parum, minutim incidantur, & infundantur in aqua end. & lupul. & post horas xij. fiat expressio: cui addantur medulla cassia recens extracta ʒj. ʒ. oxymellis simplicis ʒj. ʒ. misce, fiat potio. Eduxit quinquies. Omni quoq;

Historia profla-
tio menstrua
alborum curati.

mane & vesperi per horam vel duas ante cenam
 sumebat cochlear vnum istius pulueris permixti
 cum saccharo. *℞* farina glandium \mathfrak{z} ss. osium capi-
 ti caponum, & faucium luti combustorum, osium da-
 ctylor. ana \mathfrak{z} j. sem. coriand. prap̄r. ros. siccat. anisi tor-
 refacti, radic. nenuph. citrina exsic. ana \mathfrak{z} ij. rasura e-
 boris \mathfrak{z} j. pulueriscentur subtiliter. Detur cum cyatho v-
 no istius potionis. *℞* pilosella, rorismarini, lentium ex-
 cortis, cauda equina, rosar. cum capitib. melissa, men-
 tha, bursa, pastoris plantag. ana m. j. radice consolid.
 maioris, radic. nenuph. citrina, radic. sigilli beata Ma-
 ria, ana \mathfrak{z} ij. sem. agni casti, carpobalsami, schoenan-
 thi, gran. myrti, radic. cyperi, sem. acetosa, sumach, ana
 \mathfrak{z} j. contundantur crasso modo, decoquantur in vino ru-
 bro & aqua acetosa pro \mathfrak{t} j. pro quatuor vicibus. Post-
 ea exhibuit hanc infusionem: *℞* corticum myrob.
 chebul. \mathfrak{z} ij. citrinor. \mathfrak{z} j. tragac. gummi arab. ana \mathfrak{z} ss.
 infundantur in aqua plantag. & acetosa per horas 18.
 postea fiat expressio, cui addatur diacathol. \mathfrak{z} ss. & edu-
 xit bis satis copiose. Deinde iterum utebatur 6. vel
 7. diebus potione & puluere. Et denuo sumit
 infus. myroba. & spina dorsi tota inungebatur
 mane & vesperi hoc vnguent. *℞* ros. cum capitib.
 sumach. semin. acetosa, plantag. bursa pastoris, gra-
 nor. myrti, ana \mathfrak{z} j. contundantur crasso modo, bulli-
 ant in aqua plantag. & acetosa pro \mathfrak{z} ij. exprimatur,
 cui addantur oleor. ros. myrtini, ana \mathfrak{z} j. bulliant simul
 ad consumptionem aquae, & cum modico cera fiat
 vnguent. moll. Postea iterum dedit hanc infusio-
 nem. *℞* rhabarb. electi \mathfrak{z} j. corticum myrobal. che-
 bul. \mathfrak{z} ss. infundantur in aqua plantag. acetosa, post
 18. horas, fiat expressio. Et re vigente hoc catapla-
 sma vmbilico appositum est, vndique ad latitudi-
 nem manus, quo maximum sensit lenamen, & sa-
 nari coepit. *℞* gyfi \mathfrak{z} j. boli armen. \mathfrak{z} ss. puluerisen-
 tur subtiliss. & cum albumine ouis & aceto, fiat catapla-
 sma. quod ponatur supra stuppam cum mediocri
 spissitudine, & applicetur, & cum exsiccatum fu-
 erit, iterum humectetur. Est Bartholomaei de
 Montagnana.

OBSERVATIO XXIII

De fluore muliebri aquoso & pituitoso.

Mulier pituitosa, alba & pallida, menstruis al-
 bis supra modum inficiebatur ex materia pi-
 tuitosa & aquosa: in qua & metus erat de leuco-
 phlegmatia: nam & illud quod emanabat, a pitui-
 ta originem habebat. Hæc cum consultandi
 causa ad me accederet, ut hoc ordine medica-
 mentis vteretur, consului. Primum ut materia hoc
 modo concoqueretur post leuem euacuationem
 seu minorationem materię. *℞* diasebesten lenitiui
 \mathfrak{z} vj. diaphœnici \mathfrak{z} ij. aqua artemisia \mathfrak{z} ij. mellis ros. co-
 laris \mathfrak{z} j. misce. Syrupus talis sit: *℞* syrup. de eupa-
 torio, de artemisia, de radic. ana \mathfrak{z} j. ss. aque artemisia,
 agrimonie, nepite, ana \mathfrak{z} ij. misce pro duabus dosibus,
 adiecto cinnamomo ad \mathfrak{z} j. & pulu. spec. diamoschi dulc.
 \mathfrak{d} j. ori suauius reddatur. Eoque finito: *℞* pilul. de
 biera, agari trochisc. ana \mathfrak{z} ss. cum melle ros. fiant pi-
 lula vij. dentur in exitu lecti. Fiat & tale apozema:
℞ radic. petrosel. feniculi, cyperi, valeriana, rubia tin-
 ctorum ana \mathfrak{z} ss. absinthii, hyssopi, artemisia, melisse,
 nepite, mentha, ana m. j. pulegi, cassia, valeriana.

ana m. ss. semin. anisi, carui, feniculi, dauci: ana m.
 ss. brassica marina m. ss. spica nardi (exsiccat enim
 humiditatem) \mathfrak{z} j. ss. cicerum rub. m. ss. stachados.
 florum chamemeli, roris mari, ana p. j. coquantur in a-
 qua communi pro \mathfrak{t} j. ss. colatura, adde syrup. de ab-
 sinthio, de eupatorio, de artemisia, ana \mathfrak{z} j. sacchari pa-
 rum ad saporem, de puretur, additis \mathfrak{z} ij. cinnamomi se-
 lecti, & \mathfrak{z} j. spec. diambra, iucundiore & odore & sa-
 pore reddatur. Utatur diebus quinque appetente
 diluculo. Postea purgetur cum \mathfrak{z} ss. diacarthami
 in tabulis. Vel si pilulis delectetur. *℞* pilul. ag-
 gregat. coctiar. de agarico, ana \mathfrak{d} j. cum aqua betoni-
 ca fiant pilula vij. altero die sumat mithridatica conse-
 ctione, theriaca, ana \mathfrak{z} ss. scob. eboris, \mathfrak{d} ss. misce: tur,
 & postridie post purgationem mane sumantur sex ho-
 ris ante pastum. Potest etiam sumere decoctum
 apii & asari, ut Galenus faciebat. Utatur deinde
 condito seu electuario sequenti. *℞* conserua roris-
 marini \mathfrak{z} j. ss. conserua florum betonica, stachad. si ha-
 beri possint, ana \mathfrak{z} ss. puluer. diarod. abba. arom. ros.
 sine moscho, dialacca, diacucurma, ana \mathfrak{z} cornu cerui, co-
 galli rubri, vsti, ana \mathfrak{d} i. ij. conchar. marinar. vstarum
 & lotarum in vino \mathfrak{z} j. cum syrup. conser. corticum ci-
 tri q. s. fiat elect. moll. capiat ad magnitudinem paruæ
 castaneæ. Conuenit hic etiam uti balneo natura-
 li, ut sulphureo aut aluminoso, mane & vesperi
 ante pastum per dies decem. Verum ubi non
 sunt, tale parari potest. *℞* folior. lauri, origani, ca-
 lamini ha, pulegi. men. hastri, sabina, ana m. ij. artemi-
 sia, melisse, nepite, betonica, sampsuchi, ana m. iij.
 radic. rubia tinctorum, cyperi, ana \mathfrak{z} ij. radic. rusti, a-
 sparagi, ana \mathfrak{z} ij. spica nardi, iunci, odorati, ana \mathfrak{z} ij. se-
 min. ruta, dauci, anisi, feniculi, seselios, ana \mathfrak{z} ss. radic.
 valeriana \mathfrak{z} ij. coquantur in aqua pro balneo, quo ir-
 rigetur & se lauet. Videndum tamen, quod si val-
 de fluant humiditates albæ, ne concitior fiat
 fluxus, ut styptica magis addantur. Aliquæ lo-
 tionem reculant: & si hæc matrona idem faciat,
 calentis decocti prædicti fumum per infundibu-
 lum in vterum recipiat. Quod si his remediis
 fluor non vincatur, rursus semel in hebdomada
 accipiat has pilulas. *℞* pilul. mastich. agari tro-
 chisc. ana \mathfrak{z} ij. cortic. myrob. chebul. \mathfrak{d} ij. excipiantur
 melle ros. &c. \mathfrak{z} j. fiant pilula vij. dentur ij. pro vice.
 Fiat & pessus ad vteri repurgationem. *℞* artemis.
 sampsuchi, dictamni, absinth. ana \mathfrak{z} ss. corticis olibani
 \mathfrak{d} j. pulueriscentur & exceptis cum succo mercuriali, fiat
 pessus demittatur in vterum. Quod si forte magis
 fluat, tunc astringentibus utendum tam per os,
 quam etiam intus muliebribus impositis, vel in-
 fusis. Et ubi hæc affectio inclinauerit, quod ex
 humore perquam paucò effluente cognoscetur,
 ut prorsus exsiccentur, sequenti pessò utetur. *℞*
 acacie, balaustiorum, cucullarum glanthum, mentha,
 olibani, spica nardi, ana \mathfrak{z} j. ss. excipiantur succo poly-
 goni, aut millefolii, aut plantag. vel sanguinaria: his-
 que omnibus, linteo raro inuolutis, fingatur pes-
 sus, qui filo coxæ alligatus in laborantis pudenda
 immittatur; muteturque quotidie. recenti alio
 imposito. Succini farina cum sorbili ouo detur.
 Hæc sunt, quæ ad album fluorem profunt, & præ-
 cipue hic puluis, quo multæ matronæ nobiles, post
 vniuer-

vniversalia remedia, sanatae sunt: \mathcal{L} faucium licii, capitis caponis exsiccat. in furno ana \mathcal{Z} ss. osium dactylor. \mathcal{Z} ij. coriand. prepar. semin. anisi correct. ana \mathcal{Z} j. rad. nenuph. \mathcal{Z} ss. zaccbar. ros. \mathcal{Z} ij. datur \mathcal{Z} j. cum vino rubro. Hæc nobili viro, pro eius vxore curanda, pro consultatione dedimus, vt iis vteretur cum medici sui domestici consilio.

SCHOLIA.

His vero vniversa victus ratio ad caliditatem, & siccitatem, & potus paucitatem, inclinare debet, abstinendo ab humidis, vt iusculis, & multo potu, & ab his, quæ humorem aut serum generent. Præterea illdem curantur, quibus vxor illa Boethi, de qua prius dictum est. Et sic si sit a toto, deponendo, secundum alios, seu minorando materiam noxiam, secundo digerendo & eradicando illam: tertio hepar confortando, vt possit bonum sanguinem generare. Minoratur hoc modo: \mathcal{L} pilul. aggreg. \mathcal{D} ij. agarici trochisc. \mathcal{D} j. fiant pilul. v. dentur ante diem per horam. Digeratur hoc modo: \mathcal{L} syrup. de eupatorio, mellis rosacei colati ana \mathcal{Z} vj. syr. de end. \mathcal{Z} y. aqua absinthii, capill. Ven. cucurbit. ana \mathcal{Z} j. Purgetur hoc modo: \mathcal{L} diacarb. \mathcal{Z} v. diaphenic. \mathcal{Z} j. ss. elect. indi maioris \mathcal{Z} y. dissolue in \mathcal{Z} ij. decoct. flor. & fructuum melisse, absinth. passul. ab arilla repurg. liquir. ras. sebesten iuiub. adiect. \mathcal{Z} ss. mell. ros. colati. Vel: \mathcal{L} pilul. indar. \mathcal{Z} ss. aggregat. \mathcal{D} ij. fiant pilul. v. vel vij. Si a capite, minoretur materia hoc modo: \mathcal{L} pilul. foetid. cochiar. ana \mathcal{D} j. hieraparrum fiant pilul. v. dentur hora secunda post coenam. \mathcal{L} syrup. estechade, mellis ros. colati, oxymell. simplic. ana \mathcal{Z} ss. aqua betonica, melissa, bugloss. ana \mathcal{Z} j. misce. Eradicetur hoc modo: \mathcal{L} pilul. foetid. cochiar. agar. trochisc. ana \mathcal{D} j. cum syrupo estechade, fiant pilul. v. Vngatur nucha oleo costino, cum lectum sero intrabit, & hic pulu. capiti inspergatur: \mathcal{L} corticum thuris, mastich. sandaraca, stœchad. arab. cubeb. ros. rub. ana \mathcal{Z} ss. fiat pulu. subtilissimus. Si ab vtero: \mathcal{L} pilul. foetid. \mathcal{Z} ss. pulu. bened. \mathcal{D} j. fiant pilul. quinque; dentur mane. \mathcal{L} syrup. de artemisia, mell. ros. colati, oxymel. simplic. ana \mathcal{Z} ss. aquar. artemis. melissa, adianth. ana \mathcal{Z} j. misce. \mathcal{L} pilul. foetid. aggreg. pilul. de benedict. ana \mathcal{D} j. trag. gr. j. fiant pilul. vij. Istis intentionibus peractis, mundificetur vterus, & roboretur p. ss. ex herba mercuriali, adiecto melle; vel solo melle cum bombace, vel ablucendo hydromell. \mathcal{Z} vj. mell. ros. colat. \mathcal{Z} y. & sumen & pectinem inungendo oleo lilaceo, picato, & costino, simul mixtis. Alii hoc modo fluxum muliebrem aquosum ex pituita curant, primo purgando, medicamentis pituitam purgantibus, vt agar. carth. elect. de cit. sol. diac. & concoquunt materiam, & modice calidis, vt mell. ros. syrup. de artemisia. Post primam euacuationem, syrup. de absinthio, & aliis quibusdam leuiter astringentibus, vt in hunc modum: \mathcal{L} pilul. de hiera, vel de arom. ana \mathcal{Z} j. agar. trochisc. \mathcal{Z} j. ss. cum melle ex \mathcal{Z} j. fiant pilula vj. vel vij. in exitu lecti capiat. Postea tantum iij. vel iij. Deinde: \mathcal{L} mell. ros. colati \mathcal{Z} y. syrup. de stœchade, de artemis. ana \mathcal{Z} j. aquar. beton. b. ssop. absinth. ana q. j. misce, arom. cum \mathcal{Z} j. diarod. abb. vel arom. ros. usque finiti, \mathcal{L} pilul. aggreg. foetid. cochiar. ana \mathcal{D} j. cum aqua artemis. fiant pilu-

la. \mathcal{L} decoct. hord. \mathcal{Z} ij. mellis ros. colati \mathcal{Z} j. pro absterf. medicamenti, & altero die capiat \mathcal{Z} j. thiriacamedia atatis vel mithrid. v. hora ante prandium. Si serosus humor abundet, purgetur pilulis ex hiera, & agarico, vel potione myrobal. chebul. syr. multipli. infus. ros. rub. vel persicarum. Quod si neque vna purgatio satis sit, iteranda quoque eadem erit, in minoritamen quantitate; quemadmodum Galenus in vxore Boethi fecit, primo (vt diximus) medicamento vtens, aluum educente, secundo eis, quæ vrinam educerent, tertio, quæ per cutem humores aquosos euocabant; quibus remediis (vt paulo ante diximus) quindecim diebus cum vsus fuisset, prorsus prædictam mulierem a morbo vindicauit, & proinde Boethus quadraginta aureos ad illum misit. Rursus si pituitosus fuerit sanguis, nedum hiera, agar. & myrobal. purgare conuenit, verum etiam reliquis insignioribus medicamentis, pituitam per aluum educentibus, vt catapotis foetidis, ex sagapeno aut agarico compositis, vel etiam iis, quæ ad hydropem facere conscripsimus: prius tamen ea sunt adhibenda medicamenta, quæ iam dictam pituitam concoquere ac præparare valeant. A purgatione ad vretica deueniendum, de quibus satis dictum est, & ad topica remedia, etiam in fine adiectis astringentibus, si fluxus perseveret, vt iam satis docuimus scholiis præcedentibus. Quidam & hic post purgationem laudant stuphas, sudorem euocando humiditatem trahendo ad cutem, vt Rondelcius, qui & vomitum ante cibum vel a cibo commendat, multo que magis, quam euacuantia; cum fiat auersio in contrariam partem. Si sit ex materia melancholica, & habeat aliquam acrimoniam, velut biliosa curanda est; nisi quod in euacuationibus vti oportet purgantibus melancholiam, vt epith. cuscuta, thymo, folliculis senæ, decoct. mercurial. & aliis, vt etiam syrup. fumar. cum syr. de end. qui magis conueniunt: nam syr. alii melancholicam concoquentes, calidiores sunt, quam vt hic conueniant. Supra partem addi possunt metallica, quibus in carcinomate paliando vti possimus vt vnguent. ex pomphol. cerissa, turhia, antimonio, lythar. nutrito, & similibus; ex his conficiendo vng. empl. cum oleo myrr. & aceto. Si nulla sentiatur acrimonia, vsurpari possunt remedia ad pituitam præscripta, id est, quæ calfaciunt & exsiccant. In omnibus causis pilulæ de bdellio conueniunt: sed quia multæ sunt descriptiones, accipienda est ea, secundum Rondeler. quæ conchas Venereas recipit. Hæc pilulæ exsiccant omnia vlcera interna, neque laxant, sed potius constringunt. Vincæ peruinæ decoctum ad fouendas partes multum conuenit, & in pituitoso, lixiuium in principio; in processu lixiuium cum pauco alumine magis prodest. Balnea omnia naturalia ad id sunt utilia, vel quæ arte parantur ex alumine, sale, vel chalcitide, vel ex lixiuio, & decoct. herbar. rad. & flor. resiccantium. Vt: \mathcal{L} lixiuii parati ex cineribus ilicis, vel quercus, vel ficus, vel cannar. q. s. ad encathisma conficiendum, in quo decoque radic. bistorta & lapathi acuti ana lb. ij. corticis

7.

Purgatio, si serosus humor vel succus serosus abundauerit.

Si pituita absterget, purgatio.

8

Si ex materia melancholica.

9.

Qua in omnibus causis prosunt.

Curatio mulieris profluuii pituita.

Ab toto.

Ab capite.

Ab vtero.

Alia curatio pituitosa, fluxus a muliebri aquosi.

maligranati, gallarum, suberis ana lb j. ros. rub. p. ij. fiat decoctio, in qua dissolue salis communis lb ij. aluminis lb j. chalcit. lb ss. fiat encathisma: quod & valebit ad procidentiam ani & vteri. Utantur potius encath. quam balneo, quando constringendum est: balneo autem, quando sudor prouocandus. Et post omnia alia remedia, vtatur hoc encath. longe a mensium purgatione, ne retineantur. Idem encathif. valet in fluxu sanguinis seroso, vel immoderato fluore a raritate venarum per diapedesin. Sit tepidum tantum, & diutius sedeat in eo, reiectis excrementis alui & vesicæ. Potest etiam fieri lixiuium ex cineribus concharum vstarum, vel sarmentis, vel pyro syluestri, vel aliis arboribus astringentibus, vt sorbo, corno, & similibus. Ad menstrua alba hæc commendantur a Rondeletio: ℞ folior. clemat. daphnoidis ana m. j. herbarum vatipicri, & hedera ana m. ss. fabar. integrarum num. x. hordei integri leuiter torrefacti. p. j. ros. rub. p. ss. fiat decoctio in aqua artemisia, vino rubro, & aqua cisternæ, ad lb ij. misce. foueatur locus, vel fiat iniectio in vuluam, & hoc remedio sistentur menstrua alba. Proderit tamen vti suffumigio sequenti, post fotum vel iniectionem: ℞ galliæ moschatae, & aliptæ moschatae, ana ℥ ij. ladani, hypocisthid. ana ℥ j. styracis, beniouini, ligni aloes, santal. omnium ana ℥ j. nucis moschatae, macis, caryoph. ana ℥ j. mucag. gummi tragac. q. s. fiant trochisci, addendo modicum carbonis salicis: & post exsiccationem inungantur oleo muschatelino, vel nardino, & recipiat fumum per embotum, post tractam purgationem menstruam. Deinde apponatur emplastrum sequens: ℞ emplastrum pro matrice ℥ iij. rad. bistortæ, musci quercus ana ℥ iij. fiat emplastrum rotundum, applicetur regioni vteri, post exactam purgationem menstruorum, vsq; ad tempus purgationis, quod tunc auferatur. Oboritur autem ob virosam hunc humorem circa pudenda sætor quidam, propter quem vxor a viro plerumque fastiditur, vulua quoque lubrica fit, & dilatatur, quo fit, vt genitale profluuium retineri non possit. Vtrique autem affectioni in hunc modum succurrendum: ℞ symphyti, balaustiorum, rhois obsoniorum, seu sumach. baccarum myrti, aluminis, boli armen. ana q. v. horum pars vna in puluerem redigatur, pars altera decoquatur in vino adstringente, & pauco aceto. Decocto calido vulua sæpe foueatur, puluere vero post fotum insperso: deinde linteam madefactum in vino, quo dicenda proxime excepta sint, admoueatur: ℞ galliæ moschatae, nucis moschatae ana ℥ iij. caryophyl. ℥ j. ss. moschi ℥ ss. excipiantur vino, in quo calfacto linteo madefiat, fiatque vt dictum est. Præterea gossypii lanugo, aut linteam in prædicto vino madefactum, in vterum, in modum pessi, demittatur per noctem, mane auellatur. Hæc dicta sufficiunt de superfluitatibus albis matricis & corrigendis, & sanandis.

OBSERVATIO XXIV.

De muliere laborante gonorrhœa.

Mulier valde formosa, cum ab aliis existimaretur, fluore muliebri laborare, a me iudicata fuit, gonorr. hanc affici: nam semen album, lim-

pidum, mediocris substantiæ, sine graueolentia emanabat, subinde, non continuo; & membra citius ac ocyus consumeantur, quam in vteri fluore. Ideo præscriptis iis remediis, quæ vasa seminaria roborarent, & simul materiam spermaticam infrigidarent, exsiccarent, & incrassarent; non certe cum iis procedendo, quæ sperma multiplicarent, sed potius ea propinando, quæ semen manifesta qualitate imminuerent. Et quia vterque biliosa erat, hoc inprimis minoratiuum exhibui: ℞ cassiæ recens extractæ ℥ j. elect. de succo ros. ℥ j. ss. pulpa tamarind. ℥ j. fiat bolus. Deinde syrup. incrassantibus his utebar: ℞ syrup. myrt. cotoneor. de portulaca ana ℥ ss. aqua plantag. portulacæ, acetosæ ana ℥ j. misce. Iis ter quaterue repetitis, hanc purgationem exhibui: ℞ seminis plantag. sem. acetosæ, agni casti, coriand. preparati ana ℥ y. myrobal. citrinor. ℥ iij. bulliant in aqua chalybeata, & in ℥ iij. adde syrup. ex infus. rub. ℥ j. rhabarb. selecti ℥ j. misce, detur in aurora. Ter excreuit. Postea quia ardorem sentiebat, aliquot diebus intermissis, cepit ℥ iij. lactis ouilli, & succi plantaginis ℥ ss. prius bulliti, ac chalybeat. addendo ℥ j. boli armen. veræ. Vtebatur & hoc electuario, vel hac mixtura, capiendo mane ℥ ij. ℞ conseru. ros. ℥ j. cornu cerui vsti, farina glandium, gallarum, lapid. hamatidis. seminis agni casti. ment. exsiccatæ, sem. lactuc. ana ℥ j. puluerisent. subtiliss. & cum mell. adiect. pauco sacch. ros. fiat mixtur. Lumbis prius inunctis vnguent. ros. apponebat laminam plumbeam. Quibus optime habuit. Sed non diu lamina plumbea utebatur; & non, nisi prius repurgato corpore.

SCHOLIA.

Quod mulieribus etiam contingat gonorrhœa, id in obseru. 15. lib. 26. ostendimus, agentes de pastillificis cuiusdam vxore, idque ex Aetio & Galeno. Ita & Fernelius gonorrhœam dicebat affinem esse muliebri profluuium, sed ab eo differre (vt diximus scholio obseru. 20. huius libri) quod nec assidue, neq; quotidie, vt in vterino fluore, sed quibusdam interuallis album, nec graueolens fluat. Atq; eandem causam cum virili gonorrhœa habens. Et ita gonorrhœa commune vitium est, viris & mulieribus, iisdemq; de causis eueniens. Semen enim, vt antea diximus lib. 26. excernitur, sine coeundi desiderio. Vbi enim non est excernendi desiderium, ibi neq; voluptas: siquidem voluptas fit excretionis eius, quod vehementer angebat. Causasiam diximus, cum li. 26. de penis ac virga vitis ageremus. Est tamen huic affectui similis quodammodo exulceratio pudendorum, adeo vt medici hoc non distinguentes, confundant omnia, & gonorrhœam dicant. Similitudo vero est ex defluxu colore, scilicet albicante, cuiusmodi est pus effluens. Vtrūq; vero sensim stillat. Sed manifesta distinctio est odoris. Sanies enim nō sine sætore est: at illud caret sætore. Sanies præterea colore rufescit, aut liuescit necessario ex transmutatione, aut crenitū quid admixtum habet: at semen candicat prorsus. Sed & ex his, quæ consequuntur, scilicet dolore & inflammatione, quæ circa partem exulceratam fiunt; quib. caret gonorrhœa.

gonorrhœa. Quæ etiam sequuntur, gonorrhœam evidentem faciunt, ut contabefactio corporis vniuersi: quoniam illud excrementum est vitile; quod natura ob generationem resarcire properat, & semper eo sanguinem transmittit; adeo, ut multi sanguinem seminis vice coeundo excreuerint. Sed & lassitudo, & alia, quæ debilitatem facultatum sequuntur. Putat Iacchinus, quod Paulus & Aetius confundant hunc affectum cum Veneris insomniis, & male, ut ipse existimat. *Hic enim, inquit, frigiditatis vel humiditatis nimie germen est: illud caloris & acrimonia. Rursus ibi ducendum vasorum est: hic vero in seminis qualitate.* Quamobrem curæ scopus ibi est refrigerare lumbos, & pectinem, ut docet Galen. 6. de loc. aff. & qualitatem seminis temperare: hic vero siccare cum modice calidis, vel omnino temperatis. Verum hic frigidis opus fuit in muliere biliosa: sed ut magis temperata essent cauius, & quæ proprietate ad semen minuendum conferunt quædam frigida selegimus; iisq; ipsis adiecimus mentham exsiccatam in puluerem. Habet tamen gonorrhœa diuersas causas, atq; inter eas a lue Venerea, ut docuimus li. 26. & iuxta easdem modo frigidis, modo siccis, modo calidis, vel omnino temperatis curari debet: ut non sit opus denuo curationem longiore sermone prolequi, cum in variis ibidem locis, libro iam citato, hæc ipsa ad vnguem explicata sit.

OBSERVATIO XXV.

De vteri suffocatione in vidua ex semine retento.

Vidua annum 44. agens, soror Laurentii Ahenarii, Pastoris in pago Soecht wouda dicto, præceptoris mei in iuuentute, quæ quidem Almaria habitabat prope gruem, anno 1546. mense Maio, grauissima vteri suffocatione laborabat. Cumq; pro mortua haberetur, & quasi syncope afficeretur, subito ad eam vocatus fui. Erat autem suffocatio ex semine retento. Mulierculæ præsentem faciem vino aspergebant, naresq; ad tempora oblinebant, putantes hoc modo illam posse a syncope excitari; sed hoc modo malum magis augebant. Excitantur quidē hac ratione a paroxysmo syncopis, aut etiam epilepsiæ, ut spiritus conuertantur ad exteriora. Verum in hoc casu nullo modo conueniunt, neq; aromatica superius adhibita aut naribus admota. Quare & Gradus supra textum Rhafi, ea proprio de suffocatione vteri, hūc errorem vulgarium his verbis taxat: *Contra hunc textum, inquit, sæpe committitur error ab indoctis: nā in paroxysmo mulieri suffocata succurritur communiter per astantes cum aspersione & irroratione vini aromatici supra faciem infirmæ: ita ut odor ille suavis naribus communicetur, & tandematrici, qua talibus ad ornamentis delectatur, & per consequentiam vterum disponit ad maiorem ascensum: & sic non tollitur paroxysmus, sed aggrauatur (ut huic viduæ eueniebat.)* Sed e contra oportet naribus ad mouere male olentia, ut est castorium, sulphur, assa fœtida, ac plumæ perdicum combusta, & similia; eo, quod vterus fœtidis contristet, & ea fugiat, ut olentibus delectatur, iisque magis

sursum rapitur. Ita Plato vim olfaciendi vtero, tanquam animali attribuit. Sed potius illi est hæc vis propria, quemadmodum spleni ac hepatis proprietates est, dulcia appetere. Quamobrem ego hic, ut ab irroratione, tum aspersione, ac frictione vini abstinere, iussi; & ut proprios pilos combustos olfaceret, (*cum plumæ perdicis ad manum non essent*) eosque pro odoratu continuo naribus admovebam; tum frictiones dolorosas pedum adhibebam, præcipue sub volis cum sale & aceto fortiter fricando: sua enim acuitate & punctione (*eodem Grado teste*) conuertunt superfluitates ad inferiora, & excitant a paroxysmo. Adhibeamus quoque ligaturas fortes circa coxas, modo relaxando, modo constringendo. Nam hæc omnia, cum dolorem inferunt, etiam deturbant materiam ad inferiora, & inhibent ascensum vaporum ad superiora. Dum hæc fiunt, necessitate cogente, obstetricem accersui iussimus, ut intus fricando cum digito muliebria sequenti oleo inungeret: *℞ olei liliorum ℥ j. moschi, croci, ana gran. iij. vel quinque.* Atque hoc modo præter spem a paroxysmo excitata est. Talis autem titillatio cum digito ab omnibus medicis, ut Galeno ac Auicenna, tum aliis, commendatur; præcipue in viduis, & caste viuentibus, ac monialibus, ut asserit Gradus: minus tamen iunioribus, & elocandis, vel maritum habentibus; cum excellentius remedium sit, ut viro copulentur. Id tamen non, nisi re valde urgente, aliis præfidiis non iuantibus, faciendum duco; & multo minus illud sordidum exemplum (*quamuis a Gal no 6. de locis affectu laudatum*) ipsius Diogenis cynici, cuius manus hymenæum præuenerat, cum Campegio, viro pio, probare possum, cum id molliem sapiat. Impudicum quoq; consilium illud est, cuiusdam mulierculæ, ut pili pudendi vellicentur, quo suffocata ad se redeant. Id quidem factum a chirurgo nimis impudenter, dum famula quædam subito suffocata solo prostrata iaceret, multis præterea in cubiculo existentibus, vidimus; & illa mox cum verecundia excitata, ridentibus aliis, discessit sanata. Ceterum nostræ viduæ iam belle habenti, ne in idem malum incideret, præcepimus, ut ab omnibus dulcibus rebus quoque abstinere: nam, præter vteri suffocationem, solebat etiam ictero malo esse obnoxia. Ideo ut & decocto centaurii, & marrubii, ac absinthii sæpe vteretur, præcepi. At, suffocatione vteri non amplius redeunte, sana permansit.

SCHOLIA.

Matrix, seu vterus, cum supernis eisque principibus partibus communicat, cordi siquidem per arterias, cerebro per spinæ membranas, & iocinori per venas. Non mirum igitur, si, cum in eo affectus quidam oritur, omnes vel quædam prædictarum partium consentiant. Affectus hic a Græcis *ὀστέας ἢ ὀστέων πνίξις*, a quibusdam *ἀπνοία ὀστέων* dicitur. Latini autem vteri strangulatum, seu vterinam suffocationem, vel spirationis ob vterum priuationem vocant: volentibus tamen ipsis vtræque appellatione vnum quemdam affectum

explicare, nomen assumendo, tum a parte ipsa læsa vel affecta, tum a superueniente symptomate. Alii & *præfocationem*, vocant, *uteri*. Galenus *Vterina symptomata* appellauit, volens generaliori vocabulo omnia comprehendere. Ceterum affectus hic, Paulo auctore *cap. 71. lib. 3* est *uteri* recursus ad superiora, modo sursum, modo in latus; *etiam Galen. teste 6. de locis affect.* quamuis Aetius quoque fateatur, quod in hac affectione *uterus* velut ad supernas partes ascendisse videtur. Nec ob id, quod ubi ita per corpus *uterus* errauerit, ad septum transuersum perueniens, respirationem impedit, idcirco strangulatio fit. Sic & falsa est eorum opinio, qui asserunt, *uterum* exsiccari, ubi suppressi sunt menses, deinde humectari, cupientem usque ad viscera ascendere; cum vero ascendendo nonnunquam septum transuersum contingat, idcirco animal spiratione priuari. Etenim tanquam erroneæ prædictæ opiniones a Galeno *eodem 6. de locis affectis*, impugnantur & refelluntur. Causa igitur alia huius retractionis, seu recursus, inuestiganda erit, prius tamen parte affecta explicata, & affectu ipso. Quod vero *uterus* primo, ac præcipue in hoc vitio afficiatur, omnium Medicorum consensu liquet. Sed non ita liquet, qualis sit affectus. Interim tamen, si cum eius retractione seu peruersione fiat, nulli dubium est, morbum esse in situ, seu figura ipsius *uteri*. prout Hippoc. & Galen. 3. de articulis scripserunt. Citra eiusdem peruersionem, tum immodice intemperie frigida quidam *uterum* laborare dicunt: licet oriri haud quaquam possit, quomodolibet generationem habeat, nisi intemperies hæc principibus partibus impertiatur; cordi, *inquam*, aut cerebro, seu utrisque primum, & deinceps ab eis vniuerso corpori. Præsertim in prima ac præcipua eius specie, seu differentia. Perpetuo itaque (vt Donatus quoque sentiebat) intemperie, eaque nimium frigida, in hac affectione *uterus* laborabit. Quade re morbum hunc non inflammationem, sed flatuosam perfrigerationem esse, Soranus dicebat. Interim autem simul cum ea male situatus, seu figuratus erit, pro diuersitate, seu magnitudine causarum, ex quibus originem duxerit. Causæ autem referuntur in semen retentum, vel in menstrua cohibita. Neoterici addunt fumos vaporesque corruptos a materia corrupta in *utero* existente eleuatos, cor & pulmonem petentes, & anhelitum coangustantes, ita vt mulieres strangulari videantur. Vapores illi inflant corpus matricis, & propter talem inflationem putant, eos attingere diaphragma, vnde & officina spirandi coarctatur: & volunt, quod isti humores ascendant ad pulmonem, cor coangustando, tum meatus illos ac vias efflationis, vnde & præfocatio oritur.

8. Modo ascendunt ad cerebrum, & inducunt quasi vertiginem, & sæpe numero epilepsiam. Modo perunt stomachum (vt Leonellus dicebat) & inferunt nauseam, & inclinationem ad vomitum; & tamen non fit vomitus: sed vt plurimum subsequuntur ructus, propter quem vapores illi exhalant. Aliquando iidem vapores ad gulam ascen-

dunt; & videtur tunc, mulier strangulata interitura. Et quandoque inflatur guttur; (vt nuper in puella nobili vidimus) & dicunt tunc vulgo mulieres, *uterum* ad guttur ascendisse. Sed hoc fieri nequit, quicquid garriant *vetulæ*, & anatomix ignoræ blaterent. Quin potius vapores in causa sunt, eleuati ab *utero* stomachum & modo dicta membra impetentes. Conuenit igitur inter omnes medicos, vt idem asserit Gal. 6. de loc. aff. hunc affectum magna ex parte viduis euenire; hisque maxime, quæ cum antea probe purgarentur, ac parerent, atque virorum concubitu gauderent, iis omnibus priuantur, ex quibus conicere possumus quod ob retenta menstrua, vel ob semen cohibitum, mulieres *uteri* suffocatione seu strangulatione cruciantur, idque fortasse magis (vt idem Gal. inquit) a semine retento contingere potest, vtpote magnam vim obtinente, vt est enim in mulieribus humidius, ita & frigidius. Semen etenim in *utero* paulatim coaceruat, aut etiam sanguis menstruus, vitiosa redduntur, ac perfrigerantur; quibus perfrigeratis, *uterus* quoque taliter afficitur; a quo demum ad cerebrum ac cor frigiditas transmittitur, paulatim tractu temporis; a quibus deinceps vniuersum corpus celeriter alteratur, ac refrigeratur, (ob eam causam corpus hysteriarum mulierum refrigeretur) & symptomata iam dicta inferunt, vel tenui quadam substantia, veluti aura, ab iisdem incrementis ad iam dictas partes principes ascendente, vel continuitate partium traducta alteratione, per quandam veluti qualitatis diffusionem mediis corporibus, cum quibus *uterus* ipse prædictis principibus partibus communicat. Neque mirum videri debet, si vel ex minima humorum mole tanta consequantur symptomata (de quibus latius de signis dicturi sumus) etenim a phalangii quoque ictu totum corpus affici videtur, exiguo veneno per minimum foramen iniecto: & longe maiori admirationi est scorpionis ictus, quod breui admodum tempore grauissima inferit symptomata, quanquam exiguum sit id, quod iniiciatur, aut nihil omnino, nullo apparente foramine in ipsius aculeo: nec non quod canis rabie capti solum sputum (vt antea de morfu canis rabidi diximus) si corpus humanum tengerit, rabiem excitare possit, ex eiusdem sputi qualitate aucta quadam corporis dispositione, ita, vt post 6. menses, quando ad magnitudinem notatu dignam peruenerit, discerni possit (vt de hydrophobia viuis exemplis aliquando ostendimus) item similibus quoque affectibus infestari possumus iis, qui pernicioso epoto veneno eueniunt, corruptis in nobis ipsis adeo humoribus, vt veneni, tum qualitates, tum vires æquent. Vitiatum itaque semen aut menstruum cum retinentur corporibus, potissimum vt afficiantur idoneis, paulatim tractu temporis principalium partium aliqua consentiente, a qua deinceps vniuersum corpus celeriter alteratur, cum totum corpus refrigerare valeant, prædicta grauia symptomata inferre possunt: & alias alia quoque accidentium species oriri salent, pro multitudinis qualitatisue ratione, tum menstruorum, tum seminis. Et ita recte Gal. dispu-

Quid sit strangulatio uteri.

Vetulum n. gamentum adhaerentur.

Tars affecta.

Quis affectus præter naturam.

Causa.

9.

10.

Gal. dispu-

Gale. disputat transmutari posse in veneni naturam. Quod suppositum monstrat aliis experientis, quod in corpore nostro possit gigni venenosus humor, qui æquet vim externi veneni. Proinde in phrenetico illo descripto 3. par. Epid. admiratur, nō adeo quod gigni is humor venenosus possit ex transmutationibus quæ putredine fiunt, vel corruptione; sed quod latere diu possit (*non enim subita est generatio, ut nunc diximus*) & postea tamē adoriri ac occidere. Causa videlicet latet, quousque a natura dimoueri incipiat: & tunc, causa mota, vel inde plus imprimit; vel partem aliquam attingit, quam antea non attingebat; vel vaporem ex se mittit, quem antea non mittebat, vnde subito accidentia infert. Vterus igitur primus est, qui per se sentit malum, & pellere nititur; vnde violenter per corpus mouetur, quod veteres errare dixerunt: vel refugit noxam eam, vnde sursum retrahitur. At hæc multo dilucidiora cernuntur in viuis exemplis sequentibus.

OBSERVATIO XXVI.

De vteri præfocatione partim ex menstruis retentis, partim ex semine intus remanente.

Nouimus puellam, alioqui pulcherrimam, sed obesam, & parua staturæ, vtcunque pituitosam, cui nomen Aleida Theodorici, quæ ad pontem lapideum Alcmariæ habitabat, quæ cum in grauissimam vteri præfocationem incidisset anno 1553. mense Iul. adeo grauiter laborabat per diem integrum & noctem, vt a paroxysmo nullo modo a mulierculis, multis tentatis remediis excitari posset. Ad quā accitus, ex matre intellexi, quod, incerto ordine, a mensibus non purgaretur. Erat & iuencula salax, nubilis, & vnica filia, ita vt non solum ex mensibus retentis, sed & semine intus recluso hoc malum oriri existimarem, ob grauissima symptomata, quibus apprehendebatur. Videbatur semimortua; audiebat quidem, sed non poterat loqui. Quia videlicet materia non trahitur, aut extra mittitur sufficiens ad vocem, aer qui trahitur inspiratione, idem & reicitur expiratione, ob dilatationem & compressionem thoracis. Ob id enim non loquuntur, quia aer is satis non attrahitur, aut extra propellitur. Alii referunt ad frigiditatem humidi & frigidi seminis totum corpus refrigerantis, vt sic transpiratio illis vix sufficiat: *de qua re latius in Scholio.* Videbatur igitur hæc tam ex menstruo suppresso, quam semine retento, laborare ex terro vapore sursum elato per spinæ membranas & nervos cerebrum. Modo enim sine sensu mortua iacebat, modo haud dissimile morbo comitiali, quid patiebatur, modo cū stupida permaneret, crura tantum videbantur conuelli, sed non diu. Et licet non loqueretur, subinde plorabat, rursus ridebat. Venit mihi tunc in mentem illud exemplum ipsius Benedicti Veronenfis Medici doctissimi lib. 26. cap. 16. de suffocatione matricis, ex Galeno, cum ita scribat: *Vidimus uxorem fratris in præfocationis cuiusdam motu in delirio videntem atq; collacrymantem, cum pluma perdis sub naribus cum carbonibus admota essent, incaute pruna ingens ex utero in pectus excidit: at illa tam diu*

stetit, donec omnino exstinctus carbo videretur: eoq; die sine dolore fuit: sequenti die de iusto tantum pectore conquesta est, vt ingens adhuc cicatrix videatur. Hoc est quod etiam interpretes Hollerii refert: *Quibusdam risus*, inquit: *aliis lacrymæ, aliis vtrumq;*, vt Domina de Rochepot, quæ cum varicosa esset, eo affectu corripiebatur cum delirio, risu, lacrymis, contractione oculorum. Alteri risus, deinde perturbatio mentis, hinc lacrymæ, a quibus etiam monitæ non cessant. Sed nihil admirabilius, quam quod duabus filiabus Præsidis Rhomagensis contingere solebat in motu sursum vteri, quo ex interuallis laborabant. Risu enim longo ad horam, & horas duas, imminente paroxysmo, capiebantur, quem neque meru iniecto, neque hortatu, neque aliis artibus poterant compescere. Parentibus interrogatæ & obiurgatæ respondebant, se non posse continere risum. Aliis prius lacrymæ, deinde risus mouetur in eodem affectu, vt sæpe vidimus. Quibusdam lacrymæ tantum, aut risus. At hæc puella diu lacrymabatur, aut ridebat. Sed postea taciturna tanquam mortua permanebat. Astantes mulierculæ varia adhibuerant remedia, sed frustra. Cum vero pro deplorata habebatur, vt fieri solet, ad eam accitus fui. Vt igitur vapores illos venenosos ad inferiores partes retraherem, membra extrema inferiora continuo fricari imperabam; tum coxas & crura ligari, iis modo solutis, rursus fortiter constrictis. Naribus admovebam plumas caponis, cum perdicis ad manum non essent, quæ tamen valde expertæ sunt: nam postea memini cum Nordwici ad nobilem essem vocatus, famulam quandam in iisdem ædibus consuetam malo vterino grauiter detineri, adeo vt etiam pro mortua haberetur, cum nullis præfidiis excitari posset a paroxysmo. plumis perdicis combustis naribus admotis ad viram, quasi a nobis redactam. Præterea & huic nostræ, de qua nunc agimus, globulum assæ fœtidæ sindone obuolutum naribus ad adorandum obieciimus. Gatenaria commendat fumum corii combusti ex calceis detracti, & refert mirabilem historiam, hoc modo viperam in stomachum per os delapsam, cum nec lacte ad os attraheretur, eius fœtido odore per anum egressam & expulsam. Quod vix credere possumus, ob venenum viperæ, talem non fuisse ex eius intus latentis morfu exstinctum. Sed cum hæc omnia non iuuarent, coacti fuimus suadere, vt aliqua mulier digito in hoc liquore immerso vuluam intus confricaret. *℞ olei lilior. ʒj. moschi optimi, gran. v. ambre gr. ij. croci orientalis gr. ij. cauendone odor ad superiora tenderet.* Hæc enim, vti alia odorata, valent; sicut zibet, seu cineta, bombax moschatus, aut cotton. moscho conspersum, oleum moscho perfusum, gallia moschata, alypta moschata, caryophylli, & similia. At oleo supradicto imposito, excitata fuit. Cum ad se rediisset, exhibui parum castorii cum ceruisia vel aqua chamæmeli, & purgavi cum pilulis sequentibus. *℞ agarici trochisc. pilul. de hiera. ana ʒ ss. agni casti, castorii, ana gr. ij. fiant pilul. vij. saphenæ venam secassem, & ex*

solis mensibus suppressis malum ortum fuisset. Sed quia in puella salaci, licet pituitosa, semen abundaret, consului matri, ut viro collocaret.

S C H O L I A.

6 *Signa præsagientia.* Signa præsagientia vteri suffocationem diligenter examinanda, ut mulieres ex huic malo obnoxiae præservari possint, antequam proximus inuadat. Sic mulieres viuidæ, si ipsis menses retineantur, facile incurrunt in hoc vitium: quamvis & aliis vacuato vtero fieri solet, ut per immodicam mensium fluxionem (*quemadmodum & sæpe vidimus*) aere tunc vterum implente, atque ita inflante conuiiente collo. Sic de puellis valde salacibus, quæ non purgantur per menses, quamvis ea purgatione egeant, præsertim cum viri appetentes ex natura sint, & bene habitæ, de talibus, inquam, possumus prædicere, quod facile in tale malum incident. Id quotidie experientia monstrat in his, quæ ex voto monastico violenter castæ detinentur, & inter crates ferreos cohibentur, ne furore vterino percitæ viros adorianur. In quibusque enim ditioribus monasteriis, & in puellis nobilioribus, otiosis, delicate viventibus vterum id crebro evenit, ut, dum choreæ iuuenum nobilium agantur, & obiecta potentiam moueant, & semen copiose generetur, neque expellatur, huic malo sæpius obnoxiae sint. Ita & possumus prædicere in muliere viro orbatâ, quæ consueta erat coitu vti, & nunc ab actu venereo abstinet: quæ licet in continentia viuat, interim non mutat vitæ institutum consuetum, sed in quiete ac deliciis agens, opipare apparata conuiuia sequitur, quæ quoque libenter & sæpe fabulatur de coitu. Idem contingit quibusdam mulieribus potentibus, & magnificis relictis a suis viris, etiam nobilioribus, quorum mariti in bello versantur; ita ut a complexu cogantur abstinere. In talibus certe expectare ac prædicere possemus vteri præfocationem; multoque magis in iunioribus, & aliis consuetis incurrere paroxysmos certis periodis: quos & tempore autumnii, *teste Rhase*, magis quam aliis temporibus expectabimus; cum tunc magis corrumpantur humores, simul concurrente aliqua restrictione pororum cutis. Ita quoque si præcesserit apostema in vtero, & male curatum ad carcinoma deductum; nam id cum ulceratur, tetros vapores emittit, a quibus talia expectantur. Cum iam instat strangulatus (*teste Paulo libr. 3. cap. 71.*) grauis sopor premit, quæ cataphora dicitur, mens desipit, sensuum instrumenta deprehenduntur, impediunturque, vox obmutescit, crura contrahuntur, deinde maxillæ rubere incipiunt, faciesque repletur. Comitatur, inquam, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallida facies, aspectus oleosus. Alii & hæc addunt. Cum magis instat paroxysmus, sentiunt quid in gula tanquam glandulosum hæreret, aiuntque tunc mulierculæ, vterum eo ascendere, nocumento diaphragmati communicato, inobedienti iam facto in dilatione, unde principium præfocationis. Impendentem ab vtero suffocationem ostendunt symptomata eadem, quæ præsentem, sed leniora, ut

respiratio & pulsus difficilis; cordis palpitatio, dolor capitis, sæpe cum rubore labiorum, faciei & oculorum; qui etiam interdum clauduntur, ut aperiri nequeant; interdum tristis est aspectus, modo vertigo scotodinos, a vapore putri ad cerebrum elato, spiritum visorium & sæpe animale reliquum perturbante; ut etiam delirium leue accedat, nunc apprehensionis, nunc ratiocinationis, nunc vtriusque, per quod affecta secum dicenda, tacenda loquitur; interdum veluti attonita stupet. Ex his plura antecedere solent paroxysmus; & præter perturbationem mentis ac intellectus, & anhelitus difficultatem, etiam in toto & in cruribus potissimum debilitas, & dolor ab umbilico ad muliebria usque, subinde & aphonia. At signa demonstratiua cum alia genus ipsum ac morbum præsentem indicant, alia vero specierum & causarum differentias ab affectibus similibus. Si *Signa detentiva.* gna igitur generis & paroxysmi præsentis sunt hæc: casus subitus, sicut euenit epilepticis & syncope laborantibus; & fit cum eo defectus saltem sensus exterioris, & anhelitus quasi ablatio, tenerque manus compressas supra ventrem, tanquam prohibitura ne adscendat, & genua reflexa habet, hypochondria inflantur, tanquam quid pectus & gulam occluderet; etsi nomine proprio vocetur, licet intelligat, respondere tamen non potest, quamvis quoque post paroxysmum omnia recorderetur; sensu denique & motu priuata ut mortua sæpenumero iacet. Varii enim sunt, inquit Galenus, præfocationis in mulieribus affectus: quarum quædam sine voce, sine sensu, & sublato venarum pulsu, iacent, mortuis similes: alia quidem sentiunt, & mouentur, ac memorantur, quibusdam & sensus intercipitur, non sine anhelandi difficultate: quibusdam crura, & brachia distentione comitialiter torquentur: nonnullis modo pulsus parui, ac debiles fiunt, aliis penitus intercipiuntur; quibusdam autem neque respiratio sensibilis permanet: aliqua vero, aliis actionibus integris manentibus, magnam respirationem ex hac affectione habent; stomachi etiam dolore vexantur, & saliuam vomunt, si in stomacho aut capite humiditas sita sit. Interdum etiam sic examinatur, ut tamquam comitiali morbo prosteratur. Inclinate vero accessione, corpus firmari incipit, maxillæ rubescunt, ac oculi post multam grauitatem attolluntur; & ubi iam malum ægram relictum est, humiditas quædam ex locis muliebribus excurrent, tactu percipitur; intestina murrant, ac ipse vterus paulatim laxatur, atque sic exurgens ægra intellectum & sensum recipit, ut *liquet ex Aetio, & Paulo.* Obstetrices quoque seu Medicae, quæ ipsas exquisitè retigerunt, fatentur circa vterum notas quasdam apparere. Nam ceruix eius inclinata videtur, interdum veluti sursum retractus sit totus vterus, interdum veluti si ad latus. Nam simul cum vtero, ceruicem quoque ipsius retrahi necesse est, *Galen. auctor. 26. de Symptomata loc. affect.* Sunt autem hæc symptomata varia multa & graua. Non tamen iisse debemus interrim, ut mulieribus adulantes, quicquid affectus illis con-

9.

*Signa detentiva.**Varij affectus in præfocatione.**Signa inclinantis accessione.*

11

Varia malum in præfocatione.

illis contigerit, in vterum causam referamus, seu caput doleat seu ventriculus flatuosus sit, seu venter doleat, seu respiratio difficilis fiat, cum possint hæc aliis de causis fieri. Primum igitur omnium est circa respirationem symptoma, quando sæpe adeo vitatur, ut nihil maius excogitari possit de infrequentia, de tarditate, de paruitate. Verum nunquam adeo exigua sit, ut prorsus tollatur, vel exigua linquatur, & prorsus insensibilis reddatur. Læditur hinc vox adeo, ut nihil eloqui possint, et si velint. Alia ad cerebrum attinent, cum sensus & motus aufertur, vel cum furore capiuntur, vel cum conuelluntur toto corpore, quando aut cerebrum aut spina laborat. Alia ad cor pertinent, ut animi deliquia, syncope: alia ad ventriculum, ut morsus ventris, eructatio plurima. Quæ omnia cum ex propriis affectibus earum partium fiant, quarum sunt symptomata, non temere, ut dixi, in vterum referenda sunt: sed inquirendum cui parti adscribi debeant quod fiet, si consideratis illis partibus, laborare eas priuatim aliqua ratione cognoscemus: vel contra noxa esse vacuas. Tunc enim fieri per consensum credendum erit, atque in vterum auctorem referentur. Quomodo vterus hæc faciat, sæpe difficile fuit intelligere. Plato enim fursus ferri ait, & spiritus meatum obstruere. Sed quamuis verum sit, retrahi vterum modo ad superiora, modo ad latera, ex hoc tamen censenda hæc causa eorum symptomatum non est. Quid enim tale eius retractio & vitatus situs potest efficere? ut Galenus disputat. Sed neque vno modo semper situm mutat: quod Rhases & Paulus censere videntur, sed varie. Contingat autem, ut hæc situs mutatio fiat ab eisdem causis, a quibus & cetera accidentia, ita ut simul cum illis eueniat, sed eorum causa non sit. Causam ergo, ut prius diximus, Galenus inuenit, quem & alii sectati sunt, vel ex suppressa purgatione, aut retenta genitura, ita ut nunc castæ fere nisi detinerentur (ut Iacchinus dicebat) intra crates ferreos, viros adorirentur. Sed tamen simulationem mulierum cauere oportet. Sæpe enim talia mala simulant, quo cogant ad coitum viros: hinc in illam caliditatem ludit auctor vulgati versiculi:

Hystericam vitulo se simulat esse marito.

13 Causa autem varietatis accidentium, est ex qualitate, vel quantitate eius, quod detinetur veneni. Qualitas autem sit primum ex materie, ex qua est genitum, transmutatione. Vidit igitur Galenus, quod ex seminis retenti transmutatione deteriora fiunt symptomata, quam ex mensuris retentis: & hoc est verum. Quod si contingat aliquando retentis mensuris talia fieri, hoc est rarius, & vna euenient ob coitus diminutionem. Veniunt quidem ex illis dolores capitis grauitates, vertigines, & cetera quæ diximus. At apnœæ, conuulsiones, potius ex retento semine, ut syncope & subitæ mortes. Neque Iacchino placet in reddenda huiusmodi ratione Galenus, cum omnia in frigiditatem referre vult: cuius ratione animal non egeat respiratione, & pulsu, proinde his priuetur. Hæc enim causa facit, ut non lædantur ita, si ca-

reant respiratione. Sed respirationis causa esse non videtur, quoniam sæpe crebram facit, velut præfocati, & paruum. Porius ergo voluntarium motum tollere dicemus, neruorum origine affecta: idque ex natura veneni, cuius est modo vnam principem partem, modo aliam afficere: ut patet per venena discurrendo, e quibus alia cor lædunt, alia cerebrum, alia alias partes nobiles. Sic igitur spina affecta, conuulsiones, & apnœæ eueniunt: cerebro vero affecto, furores, sopores graues, epilepsiæ, sensus & motus priuatio: corde vero affecto, pulsus mutantur, & omnino eius robur concidit, adeo ut syncope premantur, & aliquando subito mox pereant.

OBSERVATIO XXVII.

De muliere præfocata, & pro mortua habita, tandem in vitam reuocata.

PLuribus diebus strangulationis deliquio aliquando iacent mulieres, ut pro mortuis habeantur. Huc pertinet, inquit Plinius, nobile illud apud Græcos volumen Heraclidis septem diebus femina exanimis ad vitam reuocata, feminarum, inquit, sexus huic malo maxime videtur oportunus: conuersione vuluæ, quasi corrigatur, spiritus restituitur. Ad tertiam vsque diem feminam ab eo malo non efferrî, clamat omnis schola. Ego memini, mulierem, cum Pithueris in Gallia praxin exercerem, hoc malo detentam 24. horis in paroxysmo permansisse, frigidamque exstitisse, ut pro mortua haberetur. Ad quam & nos acciti, id quod Hollerius etiam annotauit, in primis cum mulier viueret, diligenter cognoscendum rati sumus, nam sæpe fit, ut idem ait, ut grauiore accessione intereant, aut non aliter iaceant quam mortuæ. Pulsus huic adeo parvus & obscurus erat, ut non sentiretur: & cum respiratio nulla appareret, ori & naribus speculam tersum bene ac perpolitum admoimus, quod expirationis vapor crassus in respirante velut obnubit, & maculat (ut & Sylvius ex Gainerio ponit) nota vitæ certissima: vel ori aut naribus subdito carptæ & pexæ lanæ flocculos, aut pennam molliissimâ, quæ motum ac respirationem eius testentur, modo assidentium exspiratio hæc mouens tibi non imponat: item cyathum aqua plenum ori ventriculi imposito. Vult tamen Hollerius, infidele signum esse, quod floccis naribus admotis, vel vase pleno aqua imposito regioni stomachi, colligetur. Sternutatoriis potius, inquit, cognoscendum. Ceterum admoto hic speculo, certo viuere cognouimus. Adhibuimus itaque frictiones infernas cum peplis calidis, & ligacula cruribus iniicimus, & odorifera intus per mulieres imponi iussimus, quale est thymus instar pessi in vuluam positus: nam hoc modo noui aliquas etiam puellas, huic malo frequenter obnoxias, esse excitatas. Conducunt etiam zibettum & alia. Naribus male olentia obiecimus, & adhibito sternutatorio, hæc tandem ad vitam reuocata a paroxysmo excitata fuit. Vbi iam aliquid sumere potuit, exiguum castorii dedimus cum aqua chamæmeli. Pessaria vero, qualia & hic potissimum conue-

niunt, postquam incipiunt loqui, & melius respirare, imponi mandauimus ex attrahentibus, ut si semen aliquod corruptum esset, ut hic erat, ex parte traheretur & euacuaretur. Conueniunt vero maxime ea, quæ ex discutientibus flatus parantur, ut ex benedicta, hiera, cumino, semine rutæ, & similibus, ut & Rondeletius quoque docuit. Atque his, vel similibus remediis miraculi instar hæc mulier curata fuit.

S C H O L I A.

3 **C**um vteri strangulationis differentias, pro efficientis causæ magnitudine, vel pro specierum quarundam varietate inter se differētes, plures esse dixerimus, quia in earum aliqua omnino spiratio perditur, ut huic mulier euenit, non ab re quæretur quispiam, quomodo viuere tales possint, quæ nihil omnino spirant? Cum in confesso sit, spirationem a vita, & vitam a spiratione superare non posse: adeo ut viuentem non spirare, & spirantem non viuere sit impossibile: quinimo ubi cor respiratione priuetur, ilico hominem perire necesse est, ut liquet 5. & 6. De loc. affect. & lib. De vitalitate respirationis. Quare Heraclidæ posteriores (ut Donatus quoque refert) his experimentis iam dictis explorabant num egrotans viueret, cum tamen aliquando sublata penitus otis ac narium respiratione animal viuere posse constet, modo ea supersit, quæ in toto corpore ab arteriis & corde perficitur: id quod in latentibus animalibus manifesto apparet, nulla apparente in ipsis spirationis nota: hæc enim per totam hyemem mortuis similima in cauernis latitant, per arterias tantum totius corporis transpirantia. Pariter ratione in vteri strangulatione fieri potest, ut toto corpore frigefacto, (id enim manifestum videtur) nulla prorsus prodeat ab ore spiratio, supersit autem ea, quæ a corde & arteriis fit. Est enim maximus & præcipuus respirationis usus (ut sexcentis locis a Gal. decretum est) ut intimus calor & refrigeratione & ventilatione seruetur. Quia de re exiguus ille calor in hysteriis mulieribus derelictis, arteriarum cordisque officio conseruari poterit, quæ actio a quibusdam Medicis transpiratio dicitur, quamuis (ut diximus) quæ fit ab ore & naribus respiratione omnino fuerit abolita, licet etiam adeo parua esse possit, ut sensum lateat nedum respiratione, sed etiam transpiratio ipsa illudque clare constet, non solum in Gal. sed etiam Aristotelis doctrina, qui lib. 1. de natura animalium cap. 11. talia protulit verba: sed datur viuendi facultas, etiam si desit spiratio. Quanquam itaque perfecta animalia, quæ temperate calida sunt, præsertim dum sanitate fruuntur, citra spirationem haudquaquam viuere possint, ut liquet ex modo citatis Galen. locis: attamen quæ frigida suapte natura sunt, ut latentia, aut ex accidenti vniuersum eorum corpus tale redditum est, ut in hysteriis conspiciamus, citra respirationem non inconuenit, ut in vita seruentur, modo arteriarum cordisque officium eis conseruetur, nec propterea his, quæ de apoplexia scripta sunt, contradicimus. Vel dicendum quod refrigeretur corpus ob frigidum semen in venenum transmutatum, & in scorpionis & pha-

langii ictibus præcedente Scholio contingere diximus. Ceterum cum symptomata huius mali enarrauimus, quæ & aliis affectibus quasi similia contingere diximus: sæpe enim vteri suffocatio similis esse videtur leichargo, apoplexiæ, epilepsiæ, syncope, catalapsi & lumbricis: differunt tamen ab iisdem. Habet autem maximam affinitatem præcipue cum syncope, catalapsi, apoplexiæ & epilepsiæ, ita ut quandoque epilepsiam faciat. Conuenit cum his affectibus, quod repente obmutescant, & cadant, aut non possint consistere. Dissidet tamen a syncope, pulsu. Nam in syncope & animi defectu pulsus cessat, in suffocatione vteri pulsus remanet, sed exiguus, rarus, & languidus. In syncope sudor apparet frigidus, & color pallidus admodum est, similis color mortui: in suffocatione pallidæ quidem redduntur, sed minus. Differunt etiam propter causas antegressas seu antecedentes. Soler enim suffocatio vteri prouenire, post largam mensium euacuationem, quia aere repletur vterus, vel ob seminis putrefactionem, & retentionem in vtero, quia cum putrescit, eleuatur multi fumi, qui postea distendunt vterum. Decimus cum Rondeletio, in vtero semen putrescere. Nam in vasis spermaticis non putrescit, sed conseruatur, vel absumitur ad nutritionem vaporum, vel quando est in maiori quantitate, facultas expultrix in vterum reiecit inter somnium. Neque valet eorum ratio, qui ducunt sanguinem putrescere in venis, ergo & semen putrescere posse in vasis spermaticis. Non enim similia sunt, Sanguis enim putret, quia minus coctus est, & plus habet humiditatis excrementosæ ac aliorum recrementorum. Semen autem coctum est perfecte & assimilatum, & ab excrementis repurgatum ac redundans, benignumque dicitur, ob quantitatem, non qualitatem. Quod autem non permisceatur semine virili, & a vulua non alteretur ad conceptum, putrescit, tum etiam ob alia recrementa in vtero collecta. Ergo quibus semen defluxit in vteri cavitatem, & in ea retinetur, ut viduis, quæ defectu coitus os interius vteri clausum habent, frequenter fit suffocatio vteri. Argumento est, quod viduæ difficulter currentur ab accessione, & iis recurrit frequenter, nisi pello, aut alia ratione, aut medicamento alio reiciatur semen putrefactum. Fit etiam suffocatio ob gratos odores naribus attractos, ad quod vterus natura mouetur. Et in hoc differt a syncope, quod odores grati syncopen potius sedent, recreando spiritus: his suffocantur mulieres, nisi parte inferiore adhibeantur. Rhases vero comparabat suffocationem fortem & pessimam ad syncopen non fortem. Id quidem Auicenna intelligit ad pluralitatem accidentium, quæ sunt in suffocatione: tamen in syncope per essentiam cordis sunt difficiliora accidentibus præfocationis, licet non tantum dureret paroxysmus syncopis. Ab apoplexia distinguitur stertore, qui hic non sentitur, deinde quod partes resolutas non habeant, neque sensum amiserint, quamuis obrusum habeant. Nam cum pilæ extrahuntur, vel punguntur, sentiunt, & manu adhibita circa collum indicant se suffocari, quod in apoplexia non fit, & apoplectica stertunt cum runcatio-

Quomodo viue
re possint, quæ
vteri suffoca-
tione laborant,
etiam si nihil o-
mnino spirent.

8
Signa quibus
differat suffoca-
tio vteri ab aliis
affectibus.

Differentia a
syncope.

7
Ab apoplexia.

epilepsia. runcatione. Cum epilepsia conuenit, sed etiam differt, quod non conuellantur partes, nisi quando suffocatio vteri epilepsiam facit. Tunc enim conuelluntur. Ab epilepsia quoque distinguitur spuma circa os; quæ si adsit, lignum est utrumque iungi symptoma & sæpe difficilis est distinctio, ob similitudinem: sed vultus declarat, qui tumet & rubet in præfocatis, pallet in his: & hoc etiam a syncope frigidisq; humorib. vteri distinguitur, ut diximus: Adde semper generale signum retractionis vteri ad superiora, & quod præcessit in vtero affectus suppressorum mensium, vel retenti seminis. Differunt quoq; a lethargicis, cū lethargicæ semper cum febribus sint, hystericæ ea non laborant. A catalepsi vero, quod qui catalepsin siue cōprehensionem pariuntur, quasi rigidi & refrigerari remaneant, oculis apertis, non audiunt neq; vident. A lumbricis, secundum Moschionem, & Cleopatram: nam illæ quæ lumbricis laborant, & in intestinis punctiones sentiunt, & matricem sanam habent. Et quamuis propter silentium similes sunt caducis & apoplecticis, & quæ lumbricos habent, lethargicis quoque & catalepticis. in hoc separantur, quod apud caducas & epilepticas, & quæ lumbricos habent, matricis nullæ querelæ præcesserint, & ipsa matrix suo loco reperiatur. A catō, q̄ in eo non vterus sed cerebrum afficitur, nec excitari possunt a somno. Quandoq; post accessionem insaniunt & aliena loquuntur, nec ad interrogata respondent: & tūc videtur potius mania per consensum vteri, aut melancholia. Nam melancholia fit epilepsia, & contra: & melancholia fieri potest per consensum, ut mesenterii, splenis, & aliarum partium: unde hypochondrica est dicta. Differt etiam suffocatio a furore vterino, ut Aetius ex Sorano, lib. 16. cap. 76. hunc in modum scripsit: Vterinus furor est vteri intemperies ad passionis consensum cerebrum trahens, quem rabidum delirium consequitur, ab vteri suffocatione differens primo causa: neque enim hic retractus vterus aliquod membrum nobile ad affectionis consensum ducit, vel compressione, vel punctione, vel vapore, sed eodem ipso loco persistens per spinalem medullam, aut alias sibi insertas propagines, deprauatam qualitatem, quæcunque fuerit, ad cerebrum mittit, deinde etiam signo ab vteri suffocatione distat: quoniam ægrota minime in hoc sicut in illo affectu mutæ ac sine sensu decumbunt, quin potius garrulæ, iracundæ, & inquietæ redduntur. Differetiam a furore non per consensum, sed primarie cerebrum impetente: nam istarum amentia tota in Venere est, nihilque aliud vel imaginantur, vel loquuntur, quam de concubitu, pruriuntque frequenter loca pudoris, quorum attractu mirum in modum gaudent. Accidit id morbi genus temperatūra calidis ætate vigentibus, ac castitatem seruantibus, quæ optimis cibis vescuntur, atque in delitiis & animi iucunditate versantur, præcipue si alias libidini, Veneriq; assueuerint: tunc enim maxime infestantur; nam nihil aliud huiusmodi ægritudo est, quam ardor & incēsiō vteri, cerebro, ac toti corpori earum com-

municata. Ita nouimus nobilem puellam, succulentam, carnosam, & in delitiis viuentem, quæ nobilis cuiusdam iuuenis amore capta, deinde nihil quam de rebus Veneris somnians, loquens, hoc vteri furore affecta fuit, & cum delirio mox maniam incurrens, ut a duobus viris contineri non posset, frustra ab Æmilio Medico ante me Alcmariæ agente, curatione tērata, breui admodum extincta est. Verum nos quoq; paucis ab hinc annis iuenculam virginem formosam & honestissimam præmanib. habuimus eodem malo laborantem. Impudice admodum de Venere loquebatur, tãquam si in prostibulo enutrita foret, sed paulatim insana facta est, cum nulla remedia admitteret, quæ ad intemperiem calidam vteri faciunt, & insanie congrua, quæ huc transferenda e loco De mania: ut sunt irrigationes capitis, & alia præsidia furori accommoda, de quibus egimus lib. 10. nostrarum Observationum. Sed peculiaris est pastillus trygonis apud Aetium & alios, & potus hydrosati. Diacodium aceto aut solani succo admixtum & impositum ardorem extinguit. Quod si ob deprauati seminis abundantiam affectus contigerit, nitrum & cardamomum cerato assumito, & pudendis subucito: quiddam enim saliuę simile elicitur & morbus sedatur. Ruta vero & castorium cum myrrino cerato supposita, genituram contrahunt, & furorem leniunt. Hæc satis de signis distinguētib. vteri suffocationem ab aliis affectibus.

OBSERVATIO XXVIII.

De muliere, quæ ex ira frequenter præfocationem vteri patiebatur.

Montanus, Medicus doctissimus, refert Consult. 89. De præfocatione matricis, quod hæc ipsa aliquando veniat ex ipso animi affectu: ut si aliqua mulier præ zelotypia viri irascatur, & animus valde afficiatur, quod tunc aliquando fiat eiusmodi præfocatio. Addit se nouisse tales mulieres, quæ ita irascebantur, & afficiebantur a zelotypia, ut statim caderent in hunc morbum, & perpeßæ sint grauissima accidentia. Ita & ego nuper habui præmanibus mulierem, alioqui diuitem, quæ ex lenissima ira, huius mali paroxysmum incurrebat cum grauissimis symptomatis, præsertim quoque si dulcibus vteretur syrupis vel aliis iulebis. Quod vltimum quidem multis contingere vidi, tam puellis quam nuptis. Ita eueniebat vxori cuiusdam ceruisiarii Delphensis, quæ adeo dulcibus offendebar, ut si vel ea gustaret tantum ilico iterum paroxysmum incurreret: quare & ante paroxysmum, & post paroxysmum, & in ipso paroxysmo, amaris semper vti cogebatur. Et ideo hoc notatu dignum, quod raro admodum sint præfocata, quæ dulcia ferre possunt: quemadmodum enim odore suauis, ita & sapore dulci facile vterus sursum rapitur. Decoctum absinthii his conueniebat, & pilulæ ex castorio, & assa fœtida, dando ʒj. & post paroxysmum eas euacuando cum hiera picra, fœtida naribus admouendo, & odorifera inferius supponendo. Primum enim videndum, quid in accessione agendum sit, seu conuulsionibus ægra tentetur,

3 seu strangulationem patitur, seu animo defecerit. Hæc enim tria sunt symptomata, quæ maxime urgent, & opem Medici exigunt. Sunt autem remedia communia, quoniam & causa communis est, unde & communis scopus. Si igitur ex re-
 tentis mensibus, seu aliter, seu semine fiet, unus est scopus, vacuatio eius, quod in utero præter naturam continetur. Sed id commode non fiet, nisi uterus in naturalem suum situm reuertatur, ita ut ceruix recta inclinet ad externa, itaque & facile profluant. Unde succedit his secundus scopus: ob ea peragenda in primis male olida naribus admovebimus, cuius contrarium in reliquis syncopis fiebat. Et quandoquidē hic ex ira vapores in utero existentes paroxysmum forte mouebant, ut uterus ascenderet, ideo olida recte naribus obiecimur. Ita & utero bene odorata offeremus. Hæc Galenus 1. ad Glau. Eius rei mira est proprietas, causam autem postea dicemus. Facile igitur parabilia accepimus, ut pennas combustas, corium vetus, capillos vstos, cornua animalium cremata, & castorium. Odorata subtus admovebam, ut hoc, vel simile. *℞. alipta moschata ℥ ij. ligni aloes, saryophyl. ana ℥ ss. moschi, ambræ. ana gran. ij. excipiantur oleo de spica, & cum cotone, imponatur aut cotton. per se moscho conspersus, aut oleo moscho, persusum.* Cum autem excitata esset a paroxysmo, quia videbatur humore crasso & pituitoso laborare, exhibui *℞. pulu. bieræ p. a.* Dum autem in paroxysmo esset, etiam frictiones adhibuimus, & vincula cruribus iniecimur: & hypochondria fascia ligauimus, eaque moderate constricta, ut uterus minus ascenderet. Extra paroxysmum, quod dulcia abhorreret, imperavi ut ceruisiam absinthii biberet, qua delectabatur, & a paroxysmo præseruabatur.

S C H O L I A.

4 Signa autem specierum & causarum diligenter sunt examinanda, antequam ad curationem accedamus, non minus quam prognostica ipsa. Hæc enim mulier (ut & alia) ex ira in hoc malum incidebat, ex commotione videlicet vaporum vel humorum, qui in utero existerant & ascensum inferebant. Fernelius, Galeni auctoritate motus, nonnunquam putauit uterum nihil aut perexiguū e sua sede dimoueri: at ægrotarum mulierum modo querimonia, modo precib. adductus, hunc sæpe tactu deprehendit instar globi cuiusdam in ventriculum efferri, eūq; grauiter opprimere. Hinc & sæpe manu depressus est, manifesteq; in propriam sedem propulsus. Id quoq; sæpe vidimus a mulierculis in hac re exercitatis fieri. Aliquādo ex ascensu duntaxat premitur mulier quodam præcordiorum dolore, spirandi difficultate, aut animi defectione, at sine metu, sine delirio, aut alio symptomate grauiore, ut etiam vidimus. Interea, si strangulatus accedat, etiā grauiissima symptomata succedunt. Licet enim aliquādo primum exigua mali sit causa, ex utero sublatus vapor viscera ventriculumq; feriens, mox tamen sublatus in diaphragma thoracisq; partes, respirationem crebram & breuem infert: inde cor obsidens defectionem a-

nimi inducit, & ad arcem cerebri conscendens soporem, veterum, desipientiam, & alia iam supradicta. *Hæc tamen symptomata, ut Fernelius etiam putat, non semper a menstruo, vel semine retento suscitantur: quum & eas, quæ bene purgantur, & uterum gestant, & viri consuetudine fruuntur, plerumq; fatigent: quumq; contra supra quingentas eorum cœnobio (inquit Fernelius) degere videamus, quæ diu consuetum Veneris usum intermiserunt, nullo hysterico symptomate oppressas.* Et ita quicuis humor (etiam præter semen aut menstruum retentum) hoc modo in utero corruptus, eius generis vaporem ex loci natura venenatum expirat, & unde vita illinc & summa veneni perniciēs exoritur. Hinc fit ut tametsi viris diu hæmorrhoides suppressæ sint, aut Veneris usus sit intermissus, nulla tamen hysterice similia symptomata contingant. Hæc quoties grauiā incidunt, noscuntur quidem facile, leuiā difficile, quod melancholicis aut cardiacis non admodum sint dissimilia. Sed quomodo ab iisdem distinguantur, dictum est. Si itaque fiat suffocatio uteri ab aliis humoribus corruptis, hæc aderunt signa: Mulier certis periodis habet suas purgationes, insuper virum aliquando habet ac coitu utitur. Item, an tales humores maligniores facti una cum sanguine peccent, vel crassi pituitosique, aut melancholici sint, id etiam ex propriis signis sæpe dictis innotescet: biliosi equidem fortiora produciunt symptomata, sæpe mentis perturbationem & rationis permixtionem, syncopen, ob cerebri tum cordis consensum. Declarabunt autem & vitæ institutum, victus præcedens, anni tempus vinarum dispositiones, tum reliqua, num adsit plethora vel cacoehymia. Si autem vapores maligni ex apostemate uteri, vlcere, vel cæcro ulcerato, aut non ulcerato, præfocationem inferunt, aut humores, putridi ab iis exhalantes, ex propriis locis indicia lumentur. At si ex mensium suppressione uteri strangulatio excitetur, perueniente quidem ad uterum ipso sanguine menstruo, sed ad interna ipsius ingredi non potente, aut quia crassior est, quam ut per ora vasorum possit penetrare, aut quia clausa sunt ora, propter quod multiplicatus in venis, eas extendit, atq; vicina ipsis vincula madefacit, id citra eius peruersionem non erit, quoniam plenitudo repletorum corpora & in latum, & in profundum extendit, sed longitudinem abbreviat continuo, propterea uterum retrahi necesse est: ob quam causam vel sursum, vel ad latus retrahatur oportet. Quo fit, ut si æqualiter vndiq; trahatur, recta erit & sine inclinatione ipsius transmutatio: si vero inæqualiter, ad partem vehementius trahentem: vasorum itaque ad ipsum uterum peruenientium & plenitudo & suspensio, causa est, ob quam uterus in ipsius stranguatione vel sursum, vel ad latus trahatur: id quod semper euenit, quando eadem affectio ex mēstruorum retentione originem habet, & præter id quod purgationes eisdem supprimuntur. Spiratione tamen non priuantur, neque animi defectu, nec aliis modo dictis symptomatis valde laborare videntur. Id igitur cognosceimus an symptomata sint leuiora, & menses

Signa a vapore
vel quomodo
more corrupta.

5

6

Et aliis causis

Si ex mensium
suppressione fiat
uteri suffocatio
signa.

Signa ascensus
uteri & strangulationis.

7

menfes præter confuetudinem fuppreffi fuerint, perleuerante victus ratione eadem, mammae tumentes lacte ex fanguine in ipfas regurgitare, corpus totum graue, oculorum, colli & partium aliarum dolores. Quod mammae intumefcant, fit ob fanguinem, confuetum fluere per menfes, ad eas refluentem: fensus iis funt debiliores, & fubinde in febrem incidunt. Sed in fignia fymptomata raro a menfibus retentis & fuppreffis contingunt: Interea affecta fentit pondus circa pectinem, & hora qua folebat menibus laborare, percipit tortiones doloresq; circa partes vteri. Si vna cum menftruorum retentione adit dominium alicuius humoris, illud ex eiuſdem malignitate apparebit: nam fi fanguis apparet plenitudo & pondus grauians circa pectinem. Sin bilis, erunt fymptomata paulo vehementiora, & motus promtiores: nam & atra bilis, fert alienationes, ob fumos cerebro communicatos, vt in melancholia maior & timor exaggerantur. Si pituita, corporis pigrity, albedo, & laxitas, & fputi copia aderunt: ficuti in bile & contra minus funt quietæ. At vitiatum femini maior quidem quam menftruis vis adest ad noxam vniuerſo corpori inferendam, ex eiuſdem Gal. ſententia. & proinde magis ſpirationis ac pulſus abolitiones eo redundante apparebunt, conuulſiones, animi defectiones, ac alia paulo ante dicta fymptomata: & ſæpius viduis (vt primæ quoque reſoluitæ) mortaliſibus, atque aliis ſimilibus, ex tali cauſa proueniet vteri ſtrangulatio, etiam vel ſi optime purgentur, præſertim ſi naturaliter multo ſemine abundauerint, aut aſſatim a cõcubitu, quo antea creberrime fuerant viæ, abſtinuerint. Sæpe numero citra vteri peruerſionem tales funt ſtrangulationes, cum videlicet tenue, ac non multum fuerit ſemen retentum: quandoque enim cum eiuſdem peruerſione, ſeu retractione, cum videlicet ſemen ipſum plurimum fuerit (vt etiam Donatus annotauit) ac craſſum, eodem modo, quo fanguis menſtruis, tum vaſa, tum vincula implens, extendens ac madefaciens. Quemadmodum accidit in muliere vidua longo iam tempore, quæ præter cetera mala, neruorum quoq; diſtentione vexabatur, cui cum manibus tractarentur partes muliebres, adhibitisq; calidis medicamentis, oborta titillatione eſſi labore ac voluptate, veluti per coitum uſu venire ſolet, craſſum plurimumque ſemen excreuit, atq; ita a moleſtia ſua liberata eſt, vt idem Gal. teſtatur lib. 6. de loc. affect. Huic etenim vterus retractus erat, ſic obſterice dicente. Hiſitaq; & fymptomata grauiora & magis repentina eueniſſi, & mox apertè prehendiſſi, & crura ſurſum contrahuntur & aliquid ab vtero ad os ventriculi attolli præſentiunt. Minusque dubitandum, ſi mulier ſit viroſa, & iam diu continens, aut virgo, ſed Venerem appetens, corpulenta, multo fanguinis, victu calido, humido, flatulento vtens in otio viuens cum Veneris irritamentis & ſi menſes illi non ſint ſuppreſſi, vino generoſo vtens, multisque delicatis ferculis Venerem incitantibus & ſperma generantibus. Verum, teſte Aetio, cum hæc affectio etiam oriatur, vel vtero perfrigerato dum menſes

prodeunt, vel propter abortum, vel fanguinis eruptionem ab vtero ab aliquo repente tuſſi preſſato, id promte ex aſtantis loquela percipiemus. Nunc adhuc reſtant ſigna prognoflica, de quibus mox dicemus, hoc ruſus interpoſito exemplo.

OBSERVATIO XXIX.

De præfocatione vteri lethali ex ſemine retento.

Recte dixit Aetius lib. 16. cap. 70. de vteri ſuffocatione: Si paroxyſmus inuadere aſſueſcat, epilepſie more chronicus efficitur, omnino quidem tutus apparet, ſingulis tamen acceſſionibus præceps periculum aſſerens, vt non eodem tantum die, ſed intra paucas horas interimat, tuncq; pulſus ab ordine ſuo primo ad frequentiam permutantur, deinde inordinate trepidant: poſtremo ſubfrigida quadam humiditas cutis ſuperficiem irrorat. Sic & Paulus lib. 3. cap. 71. Nonnullæ in ipſis acceſſionibus perierunt ſubito, quibus pulſus quidem crebriores & inordinati collabuntur, id eſt, intercidunt. Idque multis contingit in acceſſione vehementi & longa, quemadmodum nuper pulcentimæ mulieri, quæ Delphis in delphine habitabat, quæ crebræ præfocationi obnoxia, nullis remediis iuantibus, cum acceſſio etiam diuturna ac vehemens eſſet, ſubito vitam in mortem commutauit, quod breui fore, ſpuma ad os ſublata indicauerat. De ea præcipue timendum eſt, iuxta Guainerium, cum adſit inſenſio cum paroxyſmi longitudine, ſi ſpuma ad os deſluat, maxime, inquit ſi ſpermatia corruptio prouenire cognouerit. Ideo & nos mortem mox aſſuturam prædiximus.

S C H O L I A.

Vbi igitur reſpiratio tollitur & pulſus, ſunt grauiffimæ præfocationes, vt huius mulieris eſſe ſignum prognof-
rat. Nam ab his de vita periculum eſt, idq; ob affectum cordis iunctum. Suffocatio quoque vterina ſeminalis eſt tanto acutior & periculoſior, quam menſtrua, quanto ſemine prolificum tenuius, ac in generatione actuoſius eſt & efficacius ipſo fanguine menſtruo. Dixerunt aliqui: ſi remedia optime adhibita ſecundum artem, poſt diem primum non contulerint, egras eſſe derelinquendas: quod tamen minime faciendum eſt. Nam & tandem plurimas curatas vidimus, & poſt curatiorem primum eſſe ducimus, vt quouis modo ſuccurramus etiam ſi res deplorata nobis videatur. Non ignoramus interea, quanto magis retentione menſtruorum vel ſeminis diuturnior fuerit & diutius ceſſerit quod tanto periculoſior fiat hæc aſſiſtiſſio. Quod vero grauior & moleſtior ſit vteri ſuffocatio ex retento ſemine orta, quam ex ſuppreſſis menſibus, maiorem noxam, ac maiora fymptomata inferens, ex Galeno liquet 6. de loc. affect. Quemadmodum etiam quod periculoſior ſit ea, in qua tum ſpiratio, tum pulſus abolentur: quæ primam eius ſpeciem, ſive differentiam nominauimus, etenim nonnullæ ex talibus pereunt licet quædam etiam ſeruata videantur. Accidit hæc affectio omni quidem tempore, ſed hyeme præcipue ac autumno, præcipue autem iunioribus, ſalacibus, ac ſterilibus, maxime ſi tales per medicamenta fuerint. Fit quoque magis corporibus delicatis,

otiosis, & strictas venas habentibus, quam laborantibus, & quibus est amplitudo venarum. Magis etiam mulieribus sanguineis, aut pituitosis, ex multitudine materiae. Ita memini, me saepius in curatione habuisse puellam admodum crassam & obesam, bene habitam, quae Delphis habitabat ad pontem Auenarium, quae multis annis huic malo obnoxia fuit, & saepius a me curata: cuius parentibus consului ut viro eam copularent. Melancholicis autem accidit ex debilitate, magis tamen in hyeme quam in aestate, etiam praecipue in autumno. Suffocatae iuenculae, vel aliae, a semine, si coeant, paratissimae sunt ad impugnationem, & prompte concipiunt. Ita cognata mea Eua Teylingia in Haga Comitum habitans, cum nuperrime virum duxisset, statim a suffocatione ilico post coitum concepit: de qua etiam postea agemus. Memini me in curatione habuisse pulcerrimam iuenculam, quae saepe pro mortua habebatur. Consului ut parentes eam viro locarent, quod postquam contigit statim impragnata fuit & admodum fecunda copiosam prolem, deinde ex marito sustulit, ac nunquam eo malo fuit in posterum detenta. Cum vero deficiunt menstrua, & semen superabundat, tanto molestior & prolixior est aegritudo, maxime quando partes occupat altiores: Grauidae tamen, iuxta Galenum 6. de loc. affect. cap. 5. licet iis diu menses supprimantur, tamen in symptomata haec nunquam aut raro delabuntur: quod horum parte puriore foetus in utero nutritur, reliquum crassius in vasis ad uterum pertinentibus, ad secundarum in partu expulsionem, servatur integrum, aut non ita corruptum, nisi aliunde, ut ex febre magna, putredinis occasio accesserit. Grauidas nihilominus vidi hoc malo tentari, ut postea exemplo docebimus. Suffocatio a pituita putri grandaevis, & mensium ac seminis annos egressis, ut sexagenariis & septuagenariis est familiaris: & iuvenibus victu pravo utentibus, & potu largo, & intempestivae aquae potu aut vini, aut esu fructuum crudorum. In his vel in capitis dolorem duorum trium quatuorve dierum, vel cynanchen, vel peripneumoniam, vel spinae, vel g. nu tumorem, ut quidam sentiunt, magna ex parte degenerat. Accidentia levia paroxysmi brevitatem significant: vehementia & diuturna periculum notant, & saepe mortem cum gravissimis symptomatis. Fortis enim non est vilipendenda, cum multae perfocatae in paroxysmo suffocentur. Quaedam ut mortuae iacent etiam per duos dies, quos si excedunt raro resurgunt: & ideo non est festinandum ad sepulturam: imo ne post tertium quidem diem, ut quidam volunt, cum calor naturalis tanto tempore in interioribus corporis occultari possit. Sed post hoc tempus nulla visa est suscitari. Praefocatio uteri cessatione mensium naturali, 43 anno, vel 50. vel cessat, vel ingraevens interficit. Si menses vel humiditas seminis effluant ad os matricis in suffocata, mitigatur inde passio statim. Mulieri, quae uterinis molestat, aut difficulter parit, superneniens sternutatio, bonum est, ut liquet ex Hippocrate aph. 35. libr. 5. quo

loco per uterina, suffocationes uteri intellexit Galenus, & bonum tum signum, tum causam esse sternutationem, fateretur.

OBSERVATIO XXX.

De praefocatione uteri in praegnanter, & de altera in ipso partu eveniente.

Paulo ante dictum est, grauidas nunquam pati uteri praefocationem, vel admodum raro. Atamen cum haec recolligerem anno 589. mense Octobri, vxor nostri pharmacopoei, secundo a conceptu mense uteri praefocationem incurtebat, cum motu quasi epileptico modo sub noctem, modo in nocte, non sine febre, tanquam certa periodo, idque per quatuor aut quinque vices, sed paroxysmi non diu durabant, male olentia naribus admota parum iuuabant. Infernis non ausi fuimus odorata subicere, ne abortus sequeretur. Syrupus ex absinthio adhibitus, propter amaritudinem, ut existimo, valde iuuabat. Secunda vero vxor Petri Opmeri, quae annum 41. agebat cum illam duceret (nam virgo annosa ea erat antequam matrimonium iniret) anno sequenti, mense Augusto primipara, cum noctu pateret, atque obstetrix infantem suscepisset, & valde intenta esset in puero mundando, ipsa interea in uteri suffocationem incidens mox exanimis reperta est, & pro mortua habita. Ad quam & ipse accitus in nocte, assam foetidam pro odoratu naribus applicabam, & emplastrum contra matricem supra alutam seu corium rotandum, paulo amplius daleto, extensum, & in circuitu galbano obductum, umbilico apponi iussi: quibus duob. tantum praesidiis ad se rediit, & ilico a paroxysmo excitata est, atque ab illa molestia etiam mox liberata cum magna astantium admiratione. Cum iam a paroxysmo excitata foret, imperavimus ut emplastrum amoveret: & cum bene purgaretur in partu, postea belle se habuit.

SCHOLIA.

Scilicet Avicenna, quod uteri praefocatio non contingat in partu, seu tempore partus, cum motus ille sit laboriosus, & ad inferiora expellat superfluitatem deorsum: & quia est operatio naturae, ideo in ipso non praecedat vapor venenosus ad membra superiora. Et verum est, inquit Gradus, in pluribus, non tamen semper. Vidi enim, ait, quod in actu pariendi, vel post partum, de proximo eveniret ex evaporatione etiam ad superiora de materiis, quae moventur in partu, etsi earum materiarum fluxus sua corpulentia moueatur ad inferiora. Idem contigit huic secundae mulieri. Primae quoque grauidae existenti: licet hoc etiam raro contingat. Ambae istae mulieres erant facie rubicundiores, & calidioris temperaturae, quales magis hac aegritudine laeduntur, & in maiori periculo versantur, quam in pituitosa aut melancholica temperatura, quae ceteris paribus, est minoris malitiae. Ratio per se manifesta est quia diminutio vel quasi prohibitio anhelitus citius fit ad mortem, vel periculo non vacat, ceteris paribus, in muliere calidae temperaturae, ubi est indigentia maioris evaporationis, quam in opposito modo disposita.

OBSERVATIO XXXI.

De uteri suffocatione post menses fluentes orta.

1 **E**Va Teylingia, cognata vxoris meæ, in Haga Comitishabitas, nuper nupta, post mensium purgationem, anno 1561. sub finē anni morbum vterinum seu præfocationem passa est, ex frigore, vt opinor, & ventositatibus: vt aliquando etiam aliis contigisse animaduertimus: erat enim tunc asperissima hyems: quo tempore magis (vt antea diximus) fieri id solet. Theodorus Hoogherbētius Hornanus Medicus, tunc temporis agens in vicinia apud sororem, noctu ad eam vocatus, assam foetidā naribus applicuit, & exhibuit tres pilulas paruas ex assa foetida & puluere dauci compositas: quibus nōnihil sese remisit paroxysmus. Altero die aduocatur Hugo Nieuuenius Medicus Haganus: is naribus castorium adhibet, & subtus vuluam cottonem ex moscho seu globulū imponere iubet; quibus modo leuabatur paroxysmus, modo denuo redibat. Paulo post cum se remitteret paroxysmus, pro purgatione propinauit diaphœnicum, & hieram picram, sed in exigua dosi. Tercio die ego vocatus sum, cum magis augeretur, & medicamentum non operaretur, & glande indita vtcunque acuta, copiose aluum deiecit; & paulo post cessauit paroxysmus. At noctu rediit vehementior. Tum vna præscripsimus emplastrum ex galbano, q̄ supra corium leuigatum ad palmæ manus magnitudinem supra vmbilicū ponebatur. Illud ceratum de galbano, est secretum Montagnanæ in morbo vterino. Vide apud eundem alia cerata in suo Antidotario, quæ idem applicat vmbilico. Galbanum dissoluimus cum modico aceto, & in corio rotundo extendimus, ac vmbilico mulieris apponimus. Quo remedio infinitas præfocatas curauimus, & a paroxysmo excitauimus. At verò etiam nostram hanc cognatam prima fronte iuuare videbatur: postea tamē, vt assererat, ferre non potuit. Quare sacculos duos quadratos intersutos, ex ruta, artemisia, calamintha, origano & matricaria cōcinnatos, circa ventrem inferiorem paululū calefactos apposuimus, modo vnū, modo alterum, & tandem bene se habuit. Interea tamen altero die rursus glandē ex hiera, cumino, ruta, melle & sale paratam, imponi iussimus, qua & aluum probe reddidit, multis ventositatibus simul emissis. Verum, q̄ pene omiseram, cum in paroxysmo validiore esset, & quasi paraphrenesi incurreret, fronti pannum lineum aceto & oleo ros. inculcatū, apposuimus, ad malignos vapores reprimēdos; & egregie contulit: tum præcipue ligationes & frictiones crurū, ad inferiora materiā & vapores malignos diuertendo. Atque istis præsidii restituta fuit, bene habita, & ad Venerem inclinata. Cum autē haud ita pridē nuplisset, viro a me tacite inquirente, num coitus utilis esset cum apud eam lecto incumbere, annuebam, id vnicū & optimū remedium esse, vt omnis schola Medicorum testatur. Me itaque abeunte Venerē cum egregie exercuisset, statim quoque ab eo tempore imprægnata est, & non amplius vteri præfocationem passa est. Nam

suffocata ab vterino malo, si coeant, (vt Scholio obs. 29. diximus) promte concipiunt.

S C H O L I A.

QVoniam vero hæc affectio duplicem curationis modū requirit (vt paulo ante dicere cœperamus, & obseruationes præcedentes idē ostendunt) vnū accessionis tempore, reliquum vero eadē non urgente; propterea ea, quæ accessionis tempora adhibenda sunt, primo cōscribunt auctores, victus ratione derelicta. Nam accessionis tēpore, ac etiā vbi eadem conquieuerit, cibum nullum, aut paucum, præbere oportet, vt liquet ex Paulo. Iubent itaq; agram ceruice, ac scapulis accliuis collocari, ac inguinib' decliuis: extremas partes deligari, ac fricari; crura præsertim & pedes: & quē admodum in multo effluxu cucurbitas mammillis imponunt, sic quib. sursum, aut in latus tractus est vterus, inguinib' & coxis adhibent. Communibus n. remediis est vtendum, cum iis, quibus ad excitandam sopitam naturā, vti solemus: cucurbitulis, inquam, ad pubem & inguina, & ad coxas, & vinculis ad summas coxas, & erurū frictionib. ex acribus factis, vt ex sinapi cum aceto. Scopus n. est ad inferna reuellere humores & vapores, qui sursum tendunt. Sunt mox clamoribus excitandæ, compellādo proprio nomine, pilos vellicandos, ac nares trahēdo. Et sic communis ratio curandæ suffocationis est, vt ad id q̄ magis vrget, nempe ad suffocationem nos totos cōuertamus, neglecta ad tempus causā, vt miseras præfocatas sulcitemus: naribus quidem ea admoventes, quæ fecidissimum odorem habent; vtero autem odorata, & ea etiam, quæ laxare ac calfacere possint, medicamenta adferemus; iuxta Gal. de ar. cur. ad Glauconem. Sed nemo, inquit Iacchinus, causam dixit, nisi forte & illi sensum odorum inesse dicas, vt refugia tetros, & ita recurrat deorsum; & ut sectetur gratos. Hæc quæstio duas habet partes. Prima est, cur tetris odoribus narium recedat? Quod sane malum inde mutet vterus, forte vndiquaque verum non est. Sed quod a paroxysmo excitantur, idq; vehementi facta concussione in cerebro, vnde & in toto corpore, id sane fit ex tristitia obiecti. Hoc esse verum patet, quia non fœda modo offeruntur, sed & acuti odores euigilātes, vt apud Aetium, ruta, & thymus cum aceto, & acetū acerrimum in quo pulegium, calamintha, origanum, conyza tenuis, & reliqua eiusmodi acria decocta sint. Hæc enim crassos vapores in cerebro detētos incidere & attenuare possunt, ac simul frigiditatē depellere, thoracemq; pulmonem, & quæ stomacho attinent expurgare. Eiusmodi v. acetum (inquit idem) naribus admouendum est. Hæc enim facile parabilia sunt, vt ruta ex aceto & thymus, vti & pennæ combustæ, capilli, corium vetus: post hæc castorium, assa foetida: hæc enim cū ad sopores & epilepsiam faciant, nil mirū si etiam ad hoc malū, vtpote simile. Thymo tamen sine aceto, & pulegio, tum odoriferis solis, nō libenter ego vti soleo. Memini enim q̄ illustrissima vxor D. Principis Auraici, cum primipara Delphis in partu esset, ex odore florū redolentium in hoc malum

3
Curatio accessionis.Quæ narium admo-
uenda.4
Cur vterus
tetros odores
refugiat.

incurrerit: cui naribus admotis male olentibus, & amotis floribus e cubiculo, cautoq; e meo consilio, ut pediss: quæ vestib. ex moscho redolentibus nō vterentur, facile ab hoc malo liberabatur. Nā omnia foetida sunt efficacissima olfacta, aut naribus admota, ut galbanum, assa foetida, opopanax, bitumē petroleum, oleum ex gagate (q; nō multum differt a petroleo: nam & petroleum & gagate bituminis cōcreti species sunt: quare stultum est emere quod nō magis efficax est viliores) odor lucernarum extinctarum: nam & Paulus lib. 3. c. 17. linamentum ex lucerna extinctum, lanaq; laciniasque combustas naribus admovent. Valet & fumus foetidus, qualis eleuatur ex plumis vstis, aut corio, herbarum foetidarum, ut rutæ; quæ omnia suo ingrato odore, vterum deorsum pellunt. Et ita, inquam, nares suffiendæ, castorio, galbano, sagapeno, sulphure, aut funiculo lucernario recens extincto, aut pennis vstis, seu soleis antiquis, aut ceparum aliorumve corticibus, aut capillis ipsius propriis exustis. Quidam etiam matulam vrinariam inueteratam, & pannos sulphureos incensos naribus admovent: sinapi item tritum cum aceto naribus adhibeatur: aut rutam viridem manibus contritam suffico: aut eadem cum melle lana excepta in anum indatur, ex Gal. auctoritate q. de compos. medic. sec. locos, qui etiam, quæ iam diximus adfert, addens picem liquidam, & cedrinam, item e cornu cerui. Hoc etiam tempore, iuxta Aetium, sternutationes excitabimus, castorium, piper, struthium, specilli nucleo naribus admovent: osque patientis aperiemus, ac medium digitum ad vomitum prouocandum intromitemus: & super hæc omnia (ut paulo ante diximus) mulier magnis vociferationibus excitetur, aut vocetur.

Cur inferius inuent bene odorata.

Vterum vero seu pudendum ipsum aromaticis & odoratis suffiemus. Quemadmodum enim foetida sursum apposita, vterum deorsum propellant, sic odorata vtero vel coxis alligata, deorsum trahunt. Ista & secunda pars quæstionis erat, cur inuent bene odorata? Galenus inquit, odorata & quæ calfacere ac laxare possunt, hæc ipsa ratione iuuant, q; calfaciunt: quæ vero calfaciunt, extenuant & laxant: vnde fit, ut quod retinetur præter naturam crassum, & difficile mobile, extenuatum mox per apertos meatus facile expurgetur. Habent etiam id, ut flatus discutiant, quibus sæpe infestantur. Hinc suffitus aromatum educit muliebria, s. aphorism. Sed quæstio adhuc est, cur ad hæc, si aperiant solum. Sunt enim & alia, quæ laxare, & calfacere possunt, ut ipsa, quæ diximus male odorata: quibus tamen auctores non vtuntur in hoc casu, quasi ab his refugiat vterus, & adstringatur. Forte quæ pessime odoratu sunt, vim quandam deleteriam, & inimicam visceribus habent; vnde laxantur, non quia sic odorata, sed proprii temperamenti ratione. Exemplum vero eorum quæ immittuntur, primum sunt pess. ex gallia moschata cum oleo moschato, aut isimino, aut benzoino, aut de nuce moschata, aut zibetro compositi, & impositi. Vel vterū inferne perpendendū odoratis suffias, styrace, cinnamomo, cal-

sia, costeo, amomo, ligno aloes, ac similibus. Suffiendus, inquit Aetius, vterus aromaticis, quæ simul remittendi, calfaciendi, flatumq; educendi vires habent: quale est quod encepharmacum apud illum appellatur, & cetera huiusmodi a veteribus ad vteri durities descripta, amaracino, glaucino, irino, ligustrino vnguento diluta, ac adiecta etiā rutæ acuminis portunculæ: quæ quidem obstetrix digitis capiens vsq; ad os vteri immittet, leuiterq; ac multum defricabit, ut eo irritamento crassus humor, qui seminariis vasibus adhæserit, prouocatus ac quadantenus calefactus excernatur: inque ipsum vterum clysteri vterario amaracinū, gleucinum aut foliatum vnguentū calidum inuicet. Sic Paulus vnguenta odoratissima in vuluam infundi iubet, ut est amaricinum iam dictum, vel malabathrinum. Et sic intra pudendum per obstetricem ea illinantur, quæ laxant, calfaciunt, & flatus dissolunt, veluti est oleum irinum, nardinum, rutaceum, aut in quo cuminum, aut anisum fuerit decoctum. P. si item parentur ex his, quæ eandem vim habent calfaciendi, laxandi, & flatus discutiendi; quorum formulas loco, De mensium suppressione inuenies, nisi quod odorata quædam iniicere poteris, lignum aloes videlicet, cassiam, cinnamomum, costum, moschum, & interim ea, quæ a vulgo arabra canis, & zibet appellantur: testudinis item terrestis hepar tritum in pesto subditum ad 3j. namque ad vteri strangulatus ac dolores confert. Vel in hunc modum: ℞. gallie moschatae ʒij. cinnamomi, folii macis, carryophyl. ana ʒj. ambra, moschi, ana gr. iij. ladanii, styracis, ana q. s. cum aqua rosata, moschata, fiat veluti suppositorium, quod indatur genitalibus. Pulueres eiusmodi aliquando inspergimus oleo costino, de spica, de lilio, ut inde intinctis digitis obstetrix affricet os vteri in virginibus: in aliis etiam interiora. Postquam autem incipiunt loqui, & melius respirare, nonnulli tunc quoque in vterū pessaria trahentia immittunt; ut si semen aliquod corruptum sit, ex ea parte trahatur & euacuetur: aut si aer, vel spiritus quidam in ea parte conceptus, aut conclusus, is absorbatur. Potissimum autem ex discutientibus parantur, ut ex benedicta, hiera, cumino, semine rutæ, & similibus. Hoc etiam tempore in sedem glandes indantur ex ruta, cumino, agarico, sale gemma, hiera, ac melle præparata: aut ex cumino, ruta & caricis eadem parentur. Sæpe enim per hæc sensibilibus crassus humor effluit. Propterea etiam proderit, ubi hæc non suffecerint clysteribus sterco subducere, ut inquit Paulus, quorum copiam apud eum capit. De colico dolore reperies. Et ideo, cum magna ex parte plenæ sint ventorum, glandulis, clysteribusque iam dictis, tum vunctionibus, quæ flatus discutunt, vtendum erit ex capite, De colico dolore. Præcordia item fasciis vinciantur, & distensis manibus os vteri comprimatur; illinanturque imus venter ac inguina: & sacculi in eisdem locis adhibeantur; prout eodem capite, De mensium suppressione docetur. Aliqui hic (ut Rondeletius) eodem tempore cucur-

Vtero quo immittetur.

Pess.

Qua per sedem iniicienda.

Suffitum.

cucurbitulam ponunt supra regionem vteri, id est, inter os pubis & vmbilicum, magnam, & cum multo igne: postea emplastrum ceroneum supra eandem partem ex lacrymis: id digerit, calfacit & materiam absumit. Conficiendum est illud emplastrum ad formam scuti, & in parte illa acuta, dum apponitur parti inferiori, gratum odorem inspirat intra ipsum vterum, & vterum retrahit, aut retractū retinet. Non vult, vt apponatur emplastrum de matrice, cum in id aliqua astringentia intrent. Nos tamen sapissime, & collega meus Cornelius Heydius, magna cum vtilitate emplastra contra matricem (*ut exemplis subsequen- tibus adhuc dicetur*) commodè vli sumus; supra alutam ducendo ad rotunditatem, & in circuitu galbano obducendo, ac vmbilico imponendo. Compo-
nuntur etiam emplastra ex solo galbano & assa foetida, iuxta *Rondeletium*. Sic etiam Iacchinus: *Quod si, inquit, non praefocatione, sed conuulsionibus, aut torminibus & inflationibus capiatur, praeter hoc optimum est emplastrum e galbano appositum imo ventri: nec solum sic iuuat, sed & praeservat a morbo inuasu. Hæc inquit idem Iacchinus in accessione: Ea si dolorem facit, colicis remediis utemur omnibus: præcipue vero iuueni expedit semen imperatoriae & radicem bibere ex mulsâ; & pilulas sumere, quæ ex assa & castorio & ruta componuntur. Terebinthina potius utilis, & aquarum sulphurearum, & castorii cum decocto artemisiae, & infusio chamaemeli. Et ubi facultas deest, infusiones quoque parentur in decoctis baccarum, & foliorum lauri, pulegii, calaminthæ, marrubii, artemisiae, conyzæ, sabinae, centaurii, dictamni, samfuchi, fœnugraci, althææ, chamameli, aristolochiæ, iridis & serpilli, ex eiusdem Aetii sententia. Verum infussionum tempore cerebri cura non relinquatur; sed rosaceo & aceto caput irrigetur; & in aceto etiam spondylium, serpillum, ruta & interdum castorium decoquatur; ac naribus quoque prædicta odoramenta assidue adhibeantur; præsertim castorium cum aceto, ut ipse inquit. Post hæc ad castorii potionem transibimus: quod assidue potum sæpe penitus ab hoc malo liberat, dandumq; est quotidie ℥j. pondere, aliquando cum aqua mulsâ, aliquando cum artemisiae decocto, Aetio & Paulo testibus. In accessionibus tamen infussionibus difficulter vti possumus. Sacculi melius applicari possunt, quibus nos commodè in muliere præcedente vli fuimus. Hæc autem iam dicta in accessione conueniunt: qualia autem præsidia adhiberi debent, ubi accessio conquieuerit, postea dicturi sumus. Nunc rursus aliud exemplum curationis proferamus.*

OBSERVATIO XXXII.

De vteri suffocatione ex semine retento.

ANno 1565. mense Ian. famula Henrici Moermersterii pharmacopœi nostri Delphensis, in grauiissima symptomata praefocationis incidit, idque ex semine retento: nam quatuor integris horis perdurabat paroxysmus admodum vehemens, idque de nocte. Cornelius Ericius, collega noster, Medicus doctissimus, emplastrum contra

matricem (quo & nos quoq; vti solebamus, forma rotunda, ad magnitudinem fere palmæ manus supra alutā extensum, & in circuitu galbano, obductum) sub sinistro hypochondrio ponebat, in quam partem vterus extollebatur & sursum ascendebat. Famula vero exclamabat, vt altera iu-uencula astans manibus depelleret vterum ad inferiora, cum se suffocari sentiret. Forte fortuna eadem nocte officinam ingressus sum, vt pro alia etiam eodem malo laborante nonnulla remedia præscriberem, collega dudum domum reuerso: Cumque viderem virginem misere torqueri, imperavi, vt emplastrum dictum a lo-tillo amouerent, & pudendo muliebri apponerent; cum fecissent, ilico ad miraculū cessauit vteri suffocatio. Vbi ad se rediit, dixi vxori pharmacopœi, vt rogaret num menses tempore debito fluere: quod cum ita se habere dixisset, procul dubio hoc malum ex semine retento esse conieci. Nam appposito emplastro statim relaxabatur vterus humiditate quadam seminali ex locis muliebribus excurrente: atque vtero mox relaxato, agra exurgens bene se habuit. Non diu post hæc ipsa marito copulata, belle deinde ac sane vixit: erat enim boni habitus, & satis salax, vt videbatur. Hæc est eiusdē emplastri descriptio: ℥ galbani moschatae, alptæ moschatae styracis calamitæ, ladanii purissimi, mastiches, ana ℥j. xyloaloes, xylobalsami, carpobalsami, galangæ, cyperi, ana ℥ij. ros. rub. ℥j. B. cera ro. lb. B. puluerisanda puluerisuntur, & c. s. q. terebinthina fiat emplastrum, vt artis est. Huius accipio ℥j & obduco in circuitu galbano, in forma rotundâ, atq; appono vmbilico, vt alias diximus. Et inuenimus sæpe magnam vtilitatem quotidiana experientia. Est & alia descriptio emplastri p matrice in Merhodo miscendorum medicamentoꝝ u. Ioan. de B. ys, pharmacopœi Parisiensis, c. 22. ita descripta: ℥ rad. b. storac. ℥ij. ligni aloes sancti moschatae, nucis moschatae, berberis anthracis, ana ℥ij. cinnamomi, caryophyllorum, schœnanthi florum chamameli ana ℥j. thuris masculi seu olivani, mastiches alptæ moschatae descript. Præpositi, galbani moschatae styracis calamitæ styracis rub. angr. xv. moschi gr. ij. (alii legunt. ℥j. g. v.) cera citrina ℥ij. B. ladanii puri lb. j. puluerisanda fiat emplastrum. At nos superiori descriptione semper vtiliter vli sumus. Eodē fere tempore, mense Februario, alia quoq; in vico Nosocomii Delphensis grauius ex eodē malo decumbebat, postridie a nuptiis, adeo vehementi, vt per tres horas pro mortua haberetur. Ad quā vocatus, licet in cubiculo calido & lucido esset, quod quidem probatur, statim imperavi, vt stramenta altiora fierent ad caput, vt quasi erecta sederet, & spina recta collocaretur, vt ita facilius spiraret; & vt statim laquei pectoris & ventris soluerentur: nam vestibus constrictis iacebat: & voce alta, vt nomen eius ad aures inelamaretur, iussi, ac vti temporum conuellerentur: (auctores quidam, sed satis impudenter, iubent vt obstetrices pilos pudendorum vellicent) deinde vt pedes primum iursam, postea in medio & imo vinculis dolorificis vincirent, & simul panis asperis fricarent, &

3 sub volis pedum frequentius ac asperius, etiam cum sale & aceto acerrimo: alii & plantas pedum oleo nardi non inungunt. Hoc enim modo, tum calore valentius reuellebam⁹. Coxas igitur super genu strictissimeligauimus, modo & tibiis vinculis iniectis. Nodulum vero infra scriptum naribus obieci-
mus: *℞ assa fœtida ℥j. castorii ℥j. in sindone fiat nodulus.* Tum emplastrum matricis, forma circulari & in circuitu galbano obducta, vmbilico applicari iussimus. Quibus & hæc incantamenti instar a paroxysmo, præter omnium mentem statim liberata est. Aliquando tamen, propter odorem, galbanum omittendum; potissimum si pudendo apponendum sit emplastrum. Obseruandum nihilominus, ut instar scuti sub vmbilico applicetur, &, quod ante quoque monuimus, in parte illa acuta, quæ tangit vuluam, imponenda sunt aliquot grana moschi: ob causas Scholio præcedentis obseruationis dictas, ex Rondeletio, qui ceroneum emplastrum præfert, ut & ibi videre est.

S C H O L I A.

4 Non desunt qui emplastrum sequens ponunt inter vmbilicum & pectinem: *℞ emplastrum ceronei, emplastrum pro matrice, ana ℥j. gallia moschata, alipta moschata, ladani, ana ℥j. subigantur cum oleo nardini & fingatur emplastrum rotundum, quod inter vmbilicum & pectinem applicetur.* Solum emplastrum ex galbano vmbilico appositum nobis sæpe suffecit ad excitationem. Aliquando etiam non omnia ista, sed sola linimenta odorata vel alia pessimo modo in vulua imposita profuerunt. Quædam solo odoratu assa fœtidæ per nos excitatæ sunt: ut Maria Gerardi, Delphis in foro frumentario habitans: quæ cum ultimo mense imprægnationis valide morbo vterino correpta, anno 1561. sub finem Decembr. ex præfocatione corruisset, olfacta solūmodo assa fœtida sindone obligata, præter spem multorum hoc solo remedio excitata fuit. Similiter euenit aliis quamplurimis. Interea tamen, præter communia remedia iam superius dicta, aliquando propria quædā requirunt, quibus a paroxysmo excitentur: nil iuuantibus assa fœtida, castorio, & eiuscemodi aliis. Sic contingit in illa virgine, quæ Delphis circa aqueam fossam vterino symptomate detinebatur: quæ neque emplastro contra matricem, neque male olentibus naribus admotis, licet aliquādo eodem malo ante laborans, iisdem fuisset a paroxysmo liberata, excitari potuit. At Cornel. Ericius collega meus, egoque simul vocati, cum tandem plumas perdicis vstas naribus admouissemus, mox ad se rediit: deinde postea, eodem malo subinde recurrente, semper iisdem remediis fuit restituta. Idem alteri puellæ cum Noordwici ad curationem cuiusdam Bronchorstii vocatus essem, euenit. Tales igitur plumæ a quadam proprietate iuuant. Quare cum aliarum plumarum combustæ idem tam efficaciter non præstent, ideo has semper deinceps paratas habere voluimus. Memini nihilominus, matronam nobilem, cui ex vteri præfocatione subito syncope superuenerat, adhibitis fortibus ligaturis & dolorosis in coxis

tibiisque; tum pedum plantis fortiter fricatis cum sale & aceto acerrimo, mox plumis caponis combustis ad nares admotis, subito reuixisse. Sed cum postea sentiret tumorem vteri cum dolore, hoc vnguento mox cessauit: *℞. vng. de ammoniaco ℥j. olei lilior. de cappar. ana ℥j. B. misce.* Memini & uxorem Theodori Teylingii, ad finis mei, ab vterino malo excitatā (ut antea quoque narrauimus) solo pessulo subdito ex florib. roris marini cum panno lineo ad digiti formam. Sic aliarum puellarum nobiles, pessulo ex thymo eodem modo subdito, a paroxysmis ilico restitutæ sunt: quamuis rursus aliis id vidimus non profuisse. Nouimus alias sola masticatione seminis leuistici & semen paulatim deglutendo, a paroxysmo fuisse liberatas. Sed & illud pro mirabili secreto & experimento accepimus, valens & ad secundinam extrahendā, ad menses suppressos, ad vteri suffocationem, tam ex semine retento, quam ex mensibus suppressis, ad molam quoque & foetum mortuum extrahendum vel educendum; atque expertum dicitur in iis, quæ per 14. dies vel plures secundinā a partu retentam habuere, quæ neque ullis modis ab ea exonerari poterant, ut extrema inunctione inunctæ animam exhalaturæ viderentur, donec hoc secreto ab obstetrice, quæ id a Iudæo Medico, cui pro famula inseruierat, se accepisse referebat, curarentur. Sumebat folia leuistici viridia, contundebat, & succum exprimebat cum vino optimo Rhenensi: eius cyathum vnum propinabat. In hyeme vero contundebat semina eiusdem & modice in vino ebulliebat, de mum colabat cum expressione; vel in aqua artemisæ bullita atque expressa exhibebat quam felicissime. Ego tamen sæpe obseruaui dum eiusmodi, seu pulueres, exhiberentur cum vino, quod vterus magis ascenderet: & ideo potius talia exhibeo vel cum aqua artemisæ, vel cum ceruisia & non cum vino. Noui mulierem admodum exigua staturæ, valde prolificam, Delphis habitantem, in vna pensili in foro, satis obesulam, quæ vel leui occasione abortum patiebatur. Huic familiare malum erat vteri suffocatio, ad quam etiam sæpe nocte, cum quasi pro mortua haberetur, euocati fuimus. Hæc autem primo & secundo mense imprægnationis hoc malo detinebatur. Præsentiens paroxysmum, sola radice ostrutii in ore retenta, & parum masticata, a suffocatione liberabatur: nec alio remedio quam hoc ipso solita erat hoc malum a se depellere. Superbibebat tamen vel absorbebat parum aceti vini optimi; unde ructibus emissis, semper restituebatur; quamuis etiam stomacho imbecilliori esse videretur. Scribunt tamen Medici, acetum neruis, membrisque neruosis, tum vtero, minime conuenire. Recte igitur dictum puto a Galeno, cuiusque naturam propriam Medicum nouisse debere. Sed cum vniuscuiusque (ut idem Galen. 3. Meth. med. recte dicebat) naturæ proprietas ineffabilis sit, nec vel exactissima scientia comprehensibilis, ac præterea cuiusque hominis propria curatio habeatur: is erit optimus cuiusque particularis ægritudinis Medicus, qui iam etiam methodum comparauit, ex qua & digno-

6

Secretum.

7

Historia
prægnantis,
quomodo ab
vteri suffo-
catione libe-
rata.

Mulier in
ultimo men-
se imprægnationis, solo odoratu assa fœtidæ curata.

5
Pluma perdicis vstæ excitant a proprietate a paroxysmo.

8 & dignoscere naturas possit, & coniectura consequi, quæ sint cuiusque propria remedia. Et licet quidam dicant acetum non conuenire, scilliticum nihilominus ab aliis commendatur; quare non est mirum, hic acetum cum radice ostrutii conuenisse. Interea ratio imprægnationis habenda, ne subtus aromata supponantur, aut alii pessi, ne abortus subsequatur. Mulierculæ Delphenses sequenti puluere vtuntur ad vteri suffocationem: *℞. granorum iuniperi, calami aroma. rad. gentiana, sem. pastinace ana ℥j. fiat pul. subtiliss. a ℥ij. ad ℥j. dabant cum vino.* Sed vinum cum boni sit saporis, vterum per se ascendere facit. Præstat vti cum ceruisia, aut alio liquore conueniente. Idem pul. valet ad ventositates expellendas, & ad ventriculi roborationem, eoq; sæpe vsus sum, & multas restitui, exhibendo cum ceruisia.

OBSERVATIO XXXIII.

De vteri vehementissima præfocatione ex semine retento.

1 PVella annos 20. nata, filia illius, qui in Speculo in foro frumentario habitabat, 15. Septemb. die, anno 1579. sub vesperam grauissimam præfocationem vteri incurrit, cum tussi valida, vt mox suffocari videretur. Cum globulum ex assa foetida & castorio odoratu naribus admouissemus, & hunc puluerem sequentem sumisisset cum ceruisia exigua, eodẽ vesperi accessio illa, licet grauior, cessauit: *℞. rad. gentiana, sem. dauci, ostrutii, ana ℥ss. fiat puluis subtilissimus.* Sequenti die vtcunq; habebat. Pro tussi tunc pectus inunximus, & capiebat frustum vnum aliquando ex rad. inulæ saccharo conditæ. Habebat enim aliquid amaritudinis, ideo minus nocebat præfocationi. Dulcia autem plane ferre non poterat. Et quia macilenta erat, tanquam tabida, fusca, citrina, & quasi ictero affecta, cõtinuo sumebat ceruisiam, in qua decoctum erat marrubium. 17. die Septemb. melius habuit, ita, vt vltiorem curationem relinqueret, ac parentes mihi soluerent. At 18. die sub vesperam reuersa est vteri suffocatio, durans per quatuor horas adeo violenta, vt pro mortua haberetur: anhelitum trahere non poterat, frigidum exsudabat, totumq; corpus quasi conuellebatur, vterum ad superiora retracto; mulieribus tamen non sentientibus ascensionem eiusdẽ, vt aliquando fieri assolet: sed putridus vapor ascendens guttur & pectus occludebat adeo, vt astantes illam in agone esse existimarent. Dedi ℥j. pulu. matricalis, qui ita describitur a Leonello: *℞. rad. dictamni, sem. daucia, ana ℥j. cinnam. electi, cass. lignea, melisse ana ℥ij. croci orientalis ℥ss. castorii pinguis & recentis ℥j. misce: fiat pul. dosis est a ℥ss. ad ℥j. cum aqua vrtica vel chamameli.* Dedimus ℥j. cum ceruisia. Semper sub noctem redierat quasi febricula adiuncta fuisset. At nunc adeo violenta, vt neq; puluis iuuaret, nec odor assæ foetida & castorii, nec plumæ perdicum vltæ, quæ omnia tamen sæpe iuuare solebant. Sororius eodem tempore accessit cum tonsore iactabundo empirico, qui sanitatem pollicebatur. At huius consilium adhibere non fuit, nec nos admittere volumus; nec e-

nim originem ex semine retento cognoscebat. Adeo a. violentus erat paroxysmus, vt in vita talem non viderim, duab. horis infestans. Imperaui, vt mater sequens emplastrum vmbilico apponeret, & in oleo sequenti digitum intinctum clam in vuluam imponeret: *℞. emplastri contra matricem ℥ss. ducatur supra alutam rotundam paulo ampliore daleo, & in circuitu obducatur galbano. ℞. olei lilior. ℥j. moschi gr. v. sibetti gr. ij. misce.* Vix digito imposito in vuluam cum confricatione, ad miraculũ, ad se rediit, & ab orci faucibus quasi reuocata est. Sed ne amplius redirent paroxysmi, imperaui, vt emplastrum per duos dies retineret. Interea dedimus postea ℥j. rhab. cum decoct. marrubii; atq; etiam globulũ ex iisdem, nempe rhab. & marrub. exsiccato, adiectis croco exiguo & speciebus diarod. abb. propter icterum, & febriculã quã habere videbatur. Hæc igitur astantium admiratione euasit. Ceterum ne morbus rediret, quoniam tales præseruari debent, cum hic morbus periodos habeat, quia ex semine originẽ trahebat, consului vt potius nuberet. Interea, si hoc integrum non esset, consulimus vt iis vteretur, quæ nonnihil semen exsiccare possunt, idque victu & medicamentis; vt cannabis semine, aut viticis, & radice nymphææ. Iniunximus autem victum extenuantem, & maxime siccantem, cum exiguo potu, multum exercitationem atq; inambulationem. Sed de his latius in Scholio.

SCHOLIA.

QVomodo accessio curetur, iam diximus. Verum vbi ea conquieuerit, ac si ab eadem præseruari velit egra, aut diuturnus factus fuerit affectus; videndũ nunquid ex semine retento fiat, vt hic erat. Quamobrem singulis medicamentis admiscenda sunt, quæ semẽ minuunt ac abolent; de quib; antea diximus, cum de iis ageremus, qui in venerem procliues essent, & ex seminis profluvio laborarent. Talia sunt viticis, rutæ, cannabis semina. Castorii quoq; ℥j. assiduo potet, modico aniso adiecto, vt Aetius suadet ex Philagrii auctoritate. Interim quoq; diambra, diamoicho, ac antidoto mythridatica vti poteris. Celsus castorium, vel gith, vel anethũ potui dandũ præcipit. Patet etiã cauendas esse contrectationes, fabulas, aspectus, lectiones impudicas, cantiones, ceteraque, quæ Venerem excitant: quamuis alii ea commendent. Interea quoque supra relata infusiones ac pessi conducent. Postremo vero ad naturalia balnea, eaq; calida, confugiendũ, quæ etiam ab Aegineta commendantur: post quæ vnctiones quoq; approximentur pectini, inguini, ac lumbis, ex oleo liliaceo, irino, rutaceo, & nardino, viticis ac rutæ semine, costo, ac cassia, cum pauxillo ceræ paratæ. Interim quoque saluæ, aut calaminthæ contusa, seu seminis cannabis quidpiam admisceto. Multum etiam conferunt deambulationes matutine, gitationes, quæ in curru, vel naui, vel iumento adhibentur. A motu vero gitationis, prod. st. vociferatio, & lectio clara, modulata, ac concinna. Item vnctio, frictio & exercitatio, per cot. grau. interualla repetita, vt Aetius admonet. In vniuerũ,

4
Vbi accessio non urgeat, curatio.

Topica.

5

vbi ex redundante potissimum semine generatur hæc affectio (ut etiam Donatus ex Aetio, Paulo, Galeno annotavit) tum victus, tum medicamenta cōferunt, quæ resiccandi vim habent, siue calida, siue frigida fuerint: similiter & his vtendum (de quibus mox diximus) quæ rotis substantiis semen extinguunt. Ad vteri strangulatus convenire inquit Gal. 9. De compos. medic. sec. locos. agarici ℥j. in potu acceptum ex vino: item plantaginis semen, & succum cum vino. Nec minus confert onyx ex conchylio potatus, & acetum scillicet ab sorptum, ut ipse inquit. At frequens coitus hic magis iuvat. At cum prægnantibus semper clementer agendum, ut iam antea quoque dictum est. Quod ad phlebotomiam attinet, suspectum remedium est, nisi cū suppressi sint menses, ut exemplo sequenti docebimus: tunc enim convenit, si ex mensibus retentis malum oriatur.

OBSERVATIO XXXIV.

De vteri præfocatione ex menstruis retentis.

Matrona nobilis de Bombergen Antwerpi-
na, vxor Iacobi Persinii, ad Montē Piscinæ,
in Haga Comitatus habitans, ex menstrua purgatione
retēta, symptomate vterino cū correpta esset,
ad eam vocatus fui, anno 1566. 16. Martii die. Sta-
tim pro accessione curanda, narib. obieci globu-
lum ex assa foetida, ut odoraretur. Emplastro con-
tra matricem, circulari forma, & in circuitu gal-
bano obducto etiam vmbilico imposito, & oleo
liliaceo cum granis aliquot zibetti in vulvam per
obstetricem digito indito, cum ad se parum re-
diisset, semen leuistici cū ceruisia exhibui, ex quo
belle habere visa est. Deinde cum a suffocationis
accessione libera esset, 18. Martii die, ita illam
purgaui: ℥. diacatholici ℥. ℔. diaphœnici ℥. j. ℔.
pulu. hiera picra ℥. j. cum decoct. artemis. & melissa ℥.
iij. fiat haustus. Septies aluum deposuit cum mul-
tis ventositatibus. 19. Martii ad menses euocan-
dos: ℥. florum chamameli, foliorum sabina, ana
m. ℔. semin. dauci ℥. j. bulliant in aqua communi, &
huius decocti accipe ℥. iij. Adde spec. diaca'amintha,
diacumini, ana ℥. j. castorii, ℥. ℔. pul. dominarum gr.
iij. calide vnica vice sumebat: ℥. olei rutacei, ane-
thini, chamamel. ana ℥. ℔. misce. inungatur venter
inferior. Fiebant etiam frictiones & ligaturæ cru-
rum in principio, ad diuersionem. Redibat ad-
huc semel paroxysmus, sed leuior. 21. Martii se-
quens dedi: ℥. Decoct. florum chamameli ℥. iij. in
ceruisia decocti, pulu. cumini ℥. j. sumsi vnica vice.
Bis fuit reiteratum, & profuit. Sacculus quoque
paratus ex floribus chamameli, absinthii, arte-
misie cumini, ventri inferiori calide apponeba-
tur. Sed non potuit ferre. Rediitque denuo paro-
xysmus, qui tamen suffitu plumarum perdicum
combustarum cessauit. 23. Martii propinaui hanc
purgationem: ℥. elect. lenit. ℥. ℔. elect. de dactylis
℥. j. elect. hiera picra ℥. j. cum ℥. iij. aqua artemisie, ad-
dendo syrup. de byzantiis sine aceto ℥. j. misce. & ex eo
habuit quatuor sedes. Interea & hoc condito v-
tebatur: ℥. conser. absinth. com. flor. borag. ana ℥.
j. confect. muhradatica, theriaca diatefferon, ana ℥. j.
diacumini ℥. ℔. misce. capiebat ad magnitudinem

paruæ castaneæ, & optime deinde se habuit. A-
peruissim eo tempore libēter venam tali, ut men-
ses melius fluere: sed noluit admittere. Tamen
continuando conditum, bene se habuit. Reliquā
curationem commendaui viro, cum Venus hic
valde conueniat. Postea & menses debite fluxere,
& curata permansit. At puellæ illi pituitosæ, val-
de crassæ, ad quam vocatus fui 21. Nouembr. an-
no 1588. quæ circa pontem Auenarium Delphis
habitabat, emplastro matricis etiam vmbilico
imposito, & oleo liliaceo cum zibetto subtus in-
dito per mulierem, cum ad se rediisset parū, hunc
puluerem exhibuimus: ℥. rad. gentiana, sem-
ostruti, dauci, ana ℥. j. fiat pul. detur cum pauxillo
ceruisiæ, non autem cum vino. Memini cum in
Hagam Comitatus accitus essem ad filiam præfoca-
ram insignis illius Aduocati Cocci dicti quod alius
Medicus propinasset theriacæ ℥. j. cum vino, ma-
iorem eam incurrisse accessionem vterinam. At
cum puluerem supradictū dedissem cum cerui-
siæ, ad motus etiam castorio & assa foetida ad nares,
statim restituta fuit a paroxysmo. Ceterum huic
puellæ crassæ postea exhibui hanc purgationem:
℥. syrup. ex infus. ros. pallid. cum foliis sene ℥. j. ℔. elect.
hiera picra, diaphœnici, ana ℥. ℔. aqua carambenedi-
cti ℥. j. ℔. misce. Egrege excreuit. Postea, cum ali-
quo modo fabricitaret, adhuc semel eam hoc
modo purgaui: ℥. syr. ex infus. ros. pallid. cum
foliis sene ℥. j. ℔. elect. hiera picra ℥. j. diacatholici ℥. ℔.
aque eichorn ℥. iij. ℔. misce. Deinde venâ tali lecta
fuit, & mensibus erumpentibus, hæc fuit curata.
Ita etiā sanata fuit filia pulcherrima Valkensleniæ
cognatæ nostræ, castorio & assa foetida naribus
admotis, & emplastro matricis vmbilico imposi-
to & puluere suprascripto exhibito, ac subtus im-
posito olei an. ygd. dulc. ℥. ℔. cum moschi optimi
gr. ii. j. & zibetti gr. ij. &c.

S C H O L I A.

Lectum est paulo ante, vbi accessio conquieue-
rit, & non amplius vrgeat, ne æg. a rursus in
eandem incidat, præseruari debere; & tunc cura-
tionē aggredimur pro ratione causæ. Nam si ex
mensū suppressione, iuducendi sunt modis quos
supra diximus: & sic pleriq; initium sumunt a ve-
næ sectione: ex talo enim venam secant; quæ ta-
men minus cōuenit: si ex semine retento, ut pau-
lo ante retulimus. Deinde ad alui purgationem
seu euacuationē progrediemur. Sic etiam Aetius
in eo affectu, qui iam chronicus euasit, a sangui-
nis missione incoat, præcipue si menstruæ purga-
tiones detentæ fuerint. Secatur autem, ut dixi,
tali vena. Purgatio vero fit ex hiera, ex aloë con-
fecta, picra dicta, quam & Aetius valde commen-
dat. Verum si cum mensium suppressione crassi
etiam ac frigidi succi redundabunt, iidem prius
concoqui ac præparari debent, & deinde purgari
ex eadem hiera cum agarico: seu pilulis foetidis,
aut sagapeno cum eadem hiera & agarico, & (ut
summatim dicamus) eisdē medicamentis vtitur,
quæ antea ad menses suppressos conscripsimus: a
quibus diaspolitico pharmaco assidue vti debet,
& eo quod ex tribus piperis generibus constat, ac
etiam

Vena sectio

Purgatio.

Si cum men-
sū suppres-
sione etiam
succo crassi
abundant,
quid facien-
dum.

A purgatio-
ne qua tri-
buenda.

Historia epi-
leptia cum
suffocatione
uteri.

6

etiam eo quod ex calamintha appellationem ha-
bet. Si autem humores corrupti in vtero sunt, e-
uacuentur, minorando, deinde digerendo, post
eradicando, postremo roborando matricem, vt:
℞. pilul. biera ʒ ss. fœtia. ʒ j. fiant pilule v. ℞. syr. de
artemis. ʒ j. ss. decoct. matricaria, melisse, artemisia,
ana ʒ j. misce, & in ʒ ij. decoct. eiusdem diss. diacath.
ʒ v. elect. indi maior. ʒ ij. diaphœnici ʒ ij. misc. detur
deinde lauatium ex iure pulli cum saccharo rub.
roboretur cum aroma. rosa, & diamos. in tabu-
lis. Iungit aliquando suffocatio uteri cū epilepsia
per cōsensum: vti euenit Barbaræ Brunonis Del-
phensi, annos 24. natæ, anno 1568. 27. Nouembr.
Erat leuis cū palpitatione in malis ac facie; post-
ea concidebat fere, sed non semper. Hoc decocto
epoto, per integrum annum, malum deinde non
rediit: ℞. maiorana artemisia, pulegiū, salvia, melis-
sa. ana m. j. betonica m. ss. flor. stœchad. p. j. folio. sena ʒ
ss. agarici fœminini ʒ ss. sem. an. si ʒ ij. hab. selecti ʒ j.
schœnanthi, ʒinziber ana ʒ ss. vuar. pass. abarill. re-
purg. ʒ ss. glycyrr. ras ʒ ij. coquatur in aqua comuni
pro ʒ ij. fori ss. express. adde syr. de artemis. e stœcha-
de, ana ʒ j. misce pro duabus dosib. matutinis. Aluum
egregie deposuit. cum multis ventositatibus: &
intra annum postea non rediit malum, nisi ann.
1569. die 16. Septemb. tunc iterum exhibita fuit
eodem potio adiectis aliquot seminibus pæoniæ:
& malum non reuertebatur. Sed, quod fere omi-
seram, menses consuetos semper habebat. At ex
vtero videbatur vapor ascendere ad superiora,
tandem in genis & facie palpitationem inferen-
do, mox calum, sed non semper. Plura de veteri
strangulatu vide apud Alexandrum Benedictum
Veronensem, lib. 26. a cap. 16. vsq. ad cap. 23.

OBSERVATIO XXXV.

De uteri procidentia, per modum consul-
tationis.

1 **P**ROcidere vterum dixit Aetius libr. 16. cap. 78.

quando ita euertitur, vt exterius emineat: ne-
que enim vterus, vt imperiti suspicantur, a suis
solutus propaginibus totus decumbit: nam si ita
procideret, restitui minime posset. Ita & Paulus
lib. 3. 72. Quidam, inquit, & totam vuluam prola-
bi memoria produnt: quod a vero longe abest. Uterus
enim ligatur parte inferiore duobus fortissimis liga-
mentis, quæ illum retinent, ne superiores partes com-
primat, & neque in dextram aut sinistram contor-
queatur, & meatum vel cornu, vel os interius dila-
tans. Quod si alterum ligamentorum relaxetur, aut
contrahatur, trahitur ad partem dextram vel sini-
stram. Parte superiore vterus firmatur, & ligatur
vasis spermaticis, & venis in superiorem uteri partem
peruenientibus. Et quia vena & arteria facile rum-
perentur, nisi firmarentur firmissimo aliquo vinculo;
natura peritoneo munit & venas, & arterias, &
totum vterum. Si peritoneum relaxetur, deuoluitur,
& decedit in partem inferiorem, aliquibus magis, ali-
quibus minus. Nam quibusdam extra apparet, a-
liis in collo sentitur. Alii vero (vt Fernelius) distin-
guunt descensum uteri a prolapsu. Descensus
uteri apud eos appellatur, quum in inferas partes
pronoluitur. Percepit obstetrix hunc pudendo

2

obuium; laborans vero ipsa, si erecta steterit,
grauitatis pondus in pudendum incumbere; sin
autem vel sedeat; vel supina iaceat, vel aluum ex-
oneret quasi onere rectum intestinum premi; sin
prona iaceat, vrinæ difficultatem nasci, vt etiam
viri congressum pertimescat. Prolapsus vero de-
scensu grauior est, quod euersus vterus procidat
eiusque fundus promineat, & manu attrahatur,
anserini saltem oui magnitudine. Hinc Aetius
loco citato: Quod vero procidit, quo struthioname-
li simile est, maioris tantum, aut minoris ratione dif-
ferens, prout euersionis violentia coegerit. Fernel. ad
huius differentiam addit etiam conuulsionem.
Conuulsio, inquit, est, cum vterus in alterutrum in-
guen. contorquetur. Inguinalis, ac sæpe coxendicis,
vehemens tam dolor exercet, qui si atrocius ex-
candescat. vteri furor appellatur; de quo ante e-
gimus ex Aetio: crus totū maximeq; f. mur tor-
pescit ac friget. Tam variū, inquit, motus & errores
iis duntaxat obtingunt, quibus uteri appendices laxio-
res idq; ex graui uteri gestatione, vel ex casu, atq; con-
tusione, vel ex copiosi humoris perfusione, euaserunt.
& prolapsus non ex leuioribus hysce causis, sed ex
vehementiore solum pariendi conatu, quo vterus fœ-
tum secundas ve cum impetu excludit, seq; inuertens
precipitat, consequitur. Interdum & imprudentis
obstetricis temeritas vterum cum fœtu aut cum se-
cundis inuertit detrahitque, vt non aliquando fieri
cognouimus. Sunt & alia causa vehementiores,
iuxta Aetium & Paulum locis citatis. Ab alto enim
mulier si in coxarum vertebra decidit, disruptis
membris quibusdam, quæ vuluam cum vicinis
membris conneclunt, eo morbo corripitur. Nec mi-
nus corripitur ob violentam loculi expulsionem,
quod præcipue in abortibus accidit. Nimia præterea
spiritus detentio, aut immensi ponderis eleuatio, aut
perussio uteri procidentiam inferre solent. Sape &
ob humoris plurimi ac tenacis defluxum, partiumq;
frequentias, laxantur soluanturque appendices pro-
fundo vtero superius inherentes. Ob vehementes et-
iam animi affectus; vt si filiorum interitus, vel ho-
stum incursum nuntietur, vel in maximam pelagi
tempestatem inciderint; toto corpore mulieres ex-
solui solent; ita, vt vulua quoque elabatur & proci-
dat. Nonnunquam & sine ulla istarum causarum
debilitantur corpora, vt, membranis musculisq; vul-
uam sustentantibus exsolatis, affectus contingat, quod
decidit ante fieri solet. Hac Aetius. Eadem
fere causas ponit & Paulus. Ideo quærendæ sunt
causæ antequam ad curationem veniamus. Sic
rustica mulier, cui vterus relaxatus propendebat,
cum Alemaria adhuc praxin exercebam, me con-
sultandi causa accessit. Cum autem hæc mulier
valde alba & pituitosa esset, perpetuo circa aquam
versari solita, (nam ex Waterlandia ad nos vene-
rat; & nudis pedibus in campis versabatur fre-
quenti aut vacas emulgeret, & aliquando per aquam
ad illas cogebatur accedere) cumq; adeo vterus sepe
procidat ob relaxationem factam ex sequenti &
diuturna mora in aquis: sane quod ex humidita-
tibus mucaginosi laxantibus appendices matri-
cis, hoc malum ortum suum haberet, illico co-

3

4

gnoui; testate & id mulieris habitu, tum copioso humoris fluore. Nā similiter cōfitebat, se quoq; longo muliebri profluvio laborasse; & tota cōstitutio eius erat pituitosa: ideo & resiccantib. & restringentib. curanda erat. Licet igitur hic materia pituitosa prius concoqui deberet, & deinde euacuari, atq; id multis remediis, ut nos antea longiore sermone docuimus; tamē cū apud me manere non vellet, ne sine præsidiis a me discederet, (etiā præhabita prædictione, q̄ non tam facile curaretur, nec vnico remedio) imperavi, ut septimo quoq; die tres pilulas hora vna ante cenā caperet: *℞. pil. de hiera simplici, agarici trochis. ana ℥j. β. corticū myrebal. chebul. ℥j. cum melle ros. fiant pilula vj. & ℥j.* Postero die ut caperet ℥j. theriacæ optimæ cum vino ad minus quinq; horis ante cibū; idq; semel in hebdomada, post pilulas assumtas. Cū bene esset repurgata, iussi ut ℥ij. vel iij. aliquot diebus caperet ex rotulis spec. diamoschi dulcis, idq; ter quaterve in hebdomada. Deinde partem vteri exterius eminentem lauaret simili decocto: *℞. foliorū lauri, & baccarū, menthastrī, mentha, artemisia, sampsuchi, roris marini, ana m. j. coquantur in vino adstringente.* Vngatur post lotionē mucagine sem. cotoneorum & inspergatur pul. sequens: *℞. acacia ℥ij. baccar. myrt. ros. rub. ana ℥ij. cornu cerui vsti ℥ij. β.* redigantur in tenuem puluerem, quo post fotum & vñtionem inspergatur vterus per obstetricē, ut dictū est. Interea, priusquā in suum locū vterus per obstetricē imponatur, si in recto intestino durum stercus fuerit, illud educendum erit. Aetius clystere vtitur: nos poterimus in hac rustica vti balano, nam clysterem nō admitteret. Hoc autē tempore, ut etiam admonet Rondeletius, abstinendum erit a iusculis, nisi cum alius proritanda erit, quæ sæpe & propter decubitū, & vsum astringentium constringit. Quare huic symptomati occurrendū erit cassia vel prunis, vel clystere detergēte, & proritante leuiter facultatē. Neq; imponēdæ malux, aut aliæ emollientes herbæ, ne pars relaxetur. Sufficit herbam mercurialē & ciclam in decoctione ponere, betonicam, artemisiam, vel absinthium. Neq; oleum ponendū est. Nam si astringat, actionem clysteris impedit: si emolliat, partem lædet. Quamobrē satis erit citra oleum parare. Dum hæc quoque peraguntur, decumbendum est, & sobrie edendū. Simili modo, si in vesica lotium collectum fuerit, studendum, ut prius reiciatur: sin minus, fistula vesicaria euocandum, iuxta Aetium. Euenit enim plerumque, ut idem testatur, ut eorū detentione vterus, qui inter vtrumque, rectum, inquam, intestinū & vesicam medius statuitur, compressus, & intra locorum angustias coactus, in prolapsu suo impediatur, ne repelli & in proprium situm reduci queat. His autem rite peractis, ægram supinam obstetrix collocabit, coxis accliuibus seu altioribus, reflexis poplitibus, & cruribus disparatis seu inuicem dilatatis: deinde prolapsam vteri partem, oleo tepido, vel butyro, vel betæ, malux, althææ, scenugræci, seminum lini, aut similium decocto affatim fouebit, hastulamq; lanceā præ-

parabit, vel lanam conuolutam, crassitudine & figura muliebri pudendo conformē, cui tenuissimum purissimumq; linteolum exterius circumuoluet, ac deinceps acacia aut hypocisthide vino dilutis intinget, tum vteri partem sensim reprimens in propriū locum statuet: postea hastulam laneam in sinum pudoris subiiciet, atq; inde lanā vino adstringenti madefactam superponet, & totum pectinem lana aut spongiis e posca, expressis operiet, & alligabit: cruraq; mulieris extensa insertim collocabit, ut alterum alteri inequitet aut incumbat: tutius tamen erit pedes simul vinciri, fasciam vsq; ad genua deducendo. Nonnulli vterum qui nuper deciderit, cucurbitæ domesticæ & betæ decocto cum vrina foetida, aut aceto acri, vel aliqua re foetenti colluunt. At si prolapsus vterus temporis diuturnitate intumuerit, plurimoque humore infarctus fuerit, ita, ut tumor reductionē impediāt, betarum decocto ipsum irrigamus, deinde acetū circumfundimus, salque tenuissimum inspergimus: postea, vbi detumuerit, eodē decocto colluentes, sicut prædiximus, repellimus; deinde cucurbitulas vmbilico & vtrisq; ilibus cum plurima flamma affigemus, & odorata naribus iugiter admouebimus. Tertia vero die, lana adhuc in pudendo persistente, mulier in vino nigro austero quadantenus tepesfacto, aut in myrti, lentiseci, rubi, malicorii decocto insidebit. Ac peracta infusione, rursus supina accliuib. coxis locabitur, sublataq; e pudendo priori lana, noua iterum eodem medicamento madefacta imponetur. Suminque imponant, cataplasmatibus modo, palmulæ, polenta, malicorium, lenticula cum oxymelite: & alternis diebus, vsque ad exactam curationē, permuetur. Atque hæc, tribus diebus interpositis, rursus fient, quoad perfecte vitium discusseris: enimvero vbi vteri crebro prolabantur, posca abluantur, in eademq; mulier diutius insideat, & deinceps omnia relata fiant. Hæc autē, ut per obstetricem fierent mandauī. Vbi iam in locum vterus reductus esset modo dicto, cucurbitulas duas iam dictas in ilibus figeret, & vnam magnā supra vmbilicum, suasi: & ut sequēs emplastrum inter vmbilicum & pectinem applicaret: *℞. emplastri ceronei* (confert frigiditati matri) *emplastri pro matrice, ana ℥j. galbani, ammoniaci, ana ℥j. β. gummi dissoluantur in vino, singaturq; emplastrū rotundum, quod ventri inter vmbilicū & pectinem admoueat.* Interea odorifera iugiter narib. admoueantur, foetida vero inferius. Obstetrix quoque uti poterit tali pello: *℞. assæ foetida ℥j. picis colophonie, mastiches, ana ℥ij. inuoluatur linteo raro, singaturq; pessus, qui filo coxæ alligatus in uterū dimittatur.* Cunnus deinde decocto sequenti foueatur: *℞. balaust. gallar. rhois opsoniorū, ros. rub. ana q. v. decoquantur in aqua chalybeata vel cisterna, & in vino adstringente: fiatq; ut dictū est.* Ei quoq; puluis paulo ante dictus inspergatur, quo vterus exterius eminens inspergendus dicebatur. Interea oportet, ut ipsa a vociferationibus, sternutationē mouentib. ac tuissim, aliisq; immodicis motib. abstineat, ita, ut quiete ac tranquille viuat: & viatur tenui victu,

Victu, ne multacrementa in intestinis colligan-
tur: vtatur itaq; cibis boni succi, & odorato vino
ac tenui, sed quia rustica, etiam ceruisia absinthi-
te. Post curationem abstineat a coitu nimio, sal-
tatione, ira, clamore. Quod si his remediis nō cu-
rabitur, erit incurabilis. Plura vide Consultatione
222. apud Montagnanam, De exitu matricis.

SCHOLIA.

7 Vicquid sit, siue vterus decidat, prolabatur,
Pars affecta. exeat, aut in partem aliam moueatur, semper
vterus afficitur & laborat morbo in situ. Et sic affe-
ctus præter naturam pertinet ad morbum in situ.
Causa ex-terna. Causas a. multas etiam in Obs. præced. esse dixi-
mus. Externæ videlicet sunt, si ab alto delapsa sit
mulier, vel ex violenta secundinæ extractione, ex
abortu, vel fœtus inartificiose extractione, ex spi-
ritu detento, oneris leuatione, vel vteri plaga, of-
fensione, vulnere; ob vehementes animi affectus,
liberorū amissionem, hostium incursum, pericu-
losam navigationem; ex frigore, mora in aqua, &
similes. Internæ, humoris plurimi ac lentī deflu-
xus, partuum frequentia, membranīs aut muscūlis
vterū sustinentib. resolutis. Signa demonstratiua
satis patent, quia vterus extra ppendet, vel a loco
suo motus est; vt in Obs. præcedente ostendimus.
Nam & illud q̄ procedit struthiocameli ouo si-
mile est. iuxta maioris aut minoris differentiam,
put violenta enerfio contingit. Iuxta Aetium, in
principio plurimus sanguis erumpit: deinde cō-
sequitur dolor præcordiorū, lumborū, imi ven-
tris, ac pudendorū, & periculū est, ne, per frigera-
tis locis, conuulsio inferatur: quamuis progressu
temporis, vbi affectio inualefcit, & loci callosi fa-
cti sunt, neq; cōuulsionis periculū imminet, neq;
dolor infestat, eod. Aetio teste. At causarum di-
gnotio hand ægre quoq; haberi poterit, partim
ex te ipso, partim ex ægre vel astantium sermone;
præsertim causæ externæ. Internæ quoq; vt si ex
humore putri vberim ex locellis defluit humor.
Iam quoque mulier pituitosa est, desidiosa; prius
quoq; sæpe vsa fructibus, piscib. Verum ex qua-
cunq; causa fiat: cū adhuc recens est affectio, co-
nari oportet, vt vterus ipse contrahatur: in princi-
pio n. facile dirigitur, & recte locatus permanet,
præcipue in vigore ætatis. In ætate prouectiorib.
contrahitur quidem, sed ex leui occasione rursus
prolabitur: ex eiusd. Aetij testimonio. Si ad latera ten-
dat, facile curatur. Si extra os vuluæ exit, vix cura-
tur, secundū quosdam. Si longo tempore proci-
derit, nūquam. Si ex succis corruptis, putrefactis,
& præcipue ipsa matrice putrefacta, vel ligamen-
tis putrefactis, frustra curatur. At si processu tem-
poris id q̄ prolapsū est, computruerit, id ipsum
auferetur nullius metu periculi. Etenim vniuerso
vtero ablato, vbi putrefactus fuisset, mulierē ni-
hilominus superuixisse narrant Aetius & Paulus,
quorūdam auctoritate. Refert Gradus, se mulie-
rem Papiæ ex nobili prosapia, a qua tota matrix
putrefacta frustratim deciderat diuersis tēpori-
bus, cognouisse, & eandem aliquot annis super-
uixisse. Idem refert Beniuenius de muliere perni-
cioso vlcere vexata ipsius vuluæ, ita, vt corrupta

vuluæ, & scutulis cōminuta descendens, nō ante
fluere destiterit, q̄ tota putrescens deciderit & ta-
men ipsam 10. ann. sine vulua superuixisse. At ob
causā externā, vt occursum aeris frigidi, vel aquæ
frigida, si in variū pellatur sitū vterus in corpore
sano, remediis calfacientib. vtero admotis, & vē-
tositates carminatibus, facile in locū reduceret: ita
quoq; ab h. humiditate curari poterit. At ex diffici-
li partu, aut fœtu extracto, vel secundina ab obste-
trice ignara, aut quacunq; ex causa violēta ruptis
ligamētis, nō speratur curatio. Si cancro similiter,
cū non speretur remotio causæ. Quomodo cu-
retur, iam ex parte diximus ex Aetio: quib. videli-
cet modis impellatur, fœcib. prius eductis, & vrina
euacuata. Attamen causā prius inquirendā. Nam
vbi ob relaxationē, quæ ab humiditate fit, curatur
resiccantib. & astringentibus: ita quoq; si ex diu-
turna mora in aquis tales ob humiditatē non cō-
cipiunt. Nouit tamē Rondeletius pag. m in Pro-
uincia, in quo omnes fere mulieres vteri proci-
dentia laborant, & tamen cōcipiunt. Erunt igitur
curandæ eo fere modo, quo & ani procidentia. Si
ob humiditatē, inquam, nimiam relaxatio fiat, ex-
siccandus est habitus corporis pilulis & medica-
mentis, quæ facile aluū deiciunt & sine nixu. Nā
dum magna intentione reddunt alui excrementa,
perdit etiā vterus. Quare vomitio frequēs multo
esset utilior, quia nō solū pituita euacuaret, sed
& vterū suū attraheret: nam siccat. Quemad-
modū vterus in coitu deorsum mouetur, vt semē
tanq̄ manu recipiat: sic pars ventriculi inferior ad
superiorem contrahitur, & mouetur, vt id, q̄ in
fundo est, expellat. Et dū ventriculus sese contra-
hit, & peritonæū distenditur, vterus, & quæcunq;
illi alligata sunt, quadā consecutione retrahuntur,
sed ante quā retrahatur, oportet intestina vacua
esse excrementis, vt diximus, irem vesicā: deinde
partē extra ppendentē hac vel simili decoctione
fouere: ℞. cort. pini ꝑj. cort. thur ꝑj. cort. querc. ꝑj.
ij. betæ hederæ absinth. an. m. j. ros. rub. balast. flor.
steech. anap. j. fiat decoctio in aqua ferrata, & vino a-
stringente. Cum decoctione foueatur pars, si appa-
reat: vel immittatur syringa, vel alio instrumento
in partem interiorem vteri. Deinde passario vel
baculo pannis inuoluto leuiter & suauiter suo lo-
co reponatur. Quod si odores fœtidos in summi-
tate pessi aut baculi inuoluti posueris, & odorata
narib. exhibueris, mouebitur facilius, & retrahe-
tur in partē interiorē. Retractione facta, vtendū
est fumigio, q̄ partē resiccat & ad superiora ele-
uabit sic: ℞. musci arbor. siue vsnea in clibano exsic-
cata, & collecta in quercu vel ilice, m. ij. absinth. ꝑij.
ros. rub. ꝑj. cort. thuris. pini, ana ꝑj. s. caryoph. ladani
pur. & hypocist. ana ꝑj. auripigmenti rub. & galba-
ni, aff. fœtida, ana ꝑij. excipiantur terebinthina, &
siant trochisci magni, & per embolū magnū fumum
recipiat, vel canali in uterum deducatur, ipsa in lo-
cū decumbente. Nam postquam vterus reposi-
tus est suo loco, quiescendum est: in dorsumque
recumbendum, partibus pudendi altius colloca-
tis. Emplastra cataplasmataque constringentia &
resiccantia multum supra regionem vteri & renēs

De abditis
causis mor-
borum.

Curatio.

10

it

ponenda; vt *℥ usnea m. ij. foliorum myrti, vel lentisci, vel summitatum rubi, vel quercus, vel pyri agrestis m. j. corticum querc. maligni, ana ℥ iij. gallarum, spongia bedegaris, bistorta. & quinquefolii, ana ℥ ij. centaurii minoris ros. rub. florum anth. stæchad. saluæ, ana p. j. fiat decoctio in aqua cisternæ & aceto: qua foueatur pars cum spongiis nouis sero & mane, addendo die quinto vel sexto fomentationis salis aluminis, & vitrioli, ana ℥ j. Cum cessabis a fotu, accipe residuum decocti. & pone in sacco, & applica supra renes & ventrem: quibus addere oportet polygoni & herniariæ, ana m. ij. Hunc fotum, iuxta Rondeletium, continuare oportet ad quadraginta dies: postea emplastra adstringentia continue gestare; qualia sunt, pro matrice, de pelle arietina, & de mastiche, addendo spongiæ bedegaris, & radic. bistortæ, & pul. herniariæ, ana ℥ j. in ℥ iij. emplastri. Et frequenter pars est fouenda vteri interior fotu prædicto. Aliquando pars vna vteri relaxatur, quæ dicitur mitra vulgo, apud Gallos, *la landie*, & extra vterum procidit; quod semel vidit idem Rondeletius: & sic curatum fuit malum: *℥ rad. bistortæ & narcisci, ana ℥ j. foliorum hederæ m. iij. summitatum myrti, consolid. absinth. plantag. costi, ladani, polygoni, herniariæ, ana m. ij. ros. siccarum, florum anthos & stæchad. ana p. ij. matric. & artemis. ana m. j. fiat decoct. pro balneo. in ultimo adde aluminis ℥ j. salis communis ℥ ss.* Radices contundantur; postea ad formam cataplasmatidis reducantur; & applicetur parti affectæ. Quod si ob tensionem ligamentorum inferiorum decidat vterus, non erit inutile, inguinibus apponere vnguenta relaxantia, quale est vnguentum de adipibus, vel resuma vel dialth. dissoluta portiuncula galbani in his & assæ foetidæ, vt partes relaxentur, & foetore vnguenti vterus (vt dicebat idem quem supra citauit Rondeletius) sursum retineatur, neque ultra procidat.*

OBSERVATIO XXXVI.

De quibusdam vteri præcipatione laborantibus.

PAUPERULÆ mulieri, cui vterus procidebat, vt galbani cerato vteretur, mandauit. Quibusdam enim, inquit Benedictus Veronensis, multos per annos vulua procidit, ac per urbem, vt nominus, ambulante, nec alio vtuntur remedio, quam galbani cerotario. Sed & alteri cui aduersa vulua erat, iussi vt digito obstetricis corrigeretur: facile n. cognoscitur: nam nec ori nec ceruici locorum situs respondet, dolorque ac grauitas in altero sentitur latere; quam cucurbitula cōtrario latere corrigit, imposita a balneis duntaxat. Et ita iussi vt cucurbitulā in cōtrario latere poneret: hoc enim modo reducatur ad suum situm. Verū mulieri, cui vterus deorsum tendebat, quamuis nondū exitum manifestum fecerat, consului vt male olentibus subtus suffumigaretur, quo sic sursum traheretur; & vt superius ad olfaciendum odorifera narib⁹ obicerentur: & iubebam fieri ligaturas dolorosas in brachiis, & supra vmbilicum ponebam ventosam sine scarificatione. Guainerius vero in mam-

millarum radicibus ponere iubet, & versus quodlibet latus alteram, & in medio aliam, ita, vt supra ventrē tres ventosæ simul sint: & tam diu ista fieri iubet, donec vterus in proprium locum reducatur; q̄ ex accidentium remissione cognoscitur. At alteri mulieri vterus magis solutus, ex materia mucosa, plus extra pendebat: quod cum plurimum accidit, vt antea quoque dictum est. Quare, vt humor pituitosus hoc modo digereretur, præcepi: *℥ syr. & stæchadæ, de matricaria, oxymelitis simpl. ana ℥ j. ss. decoct. saluæ, maioranæ, chamæpit. artemis. calaminthæ, menthastri, ana ℥ vj. fiat syrup. pro ij. dosibus.* adhuc semel reiteretur: deinde ita venter soluatur: *℥ pil. foetid. cochlear. ana ℥ ss. fiant pilula vij.* vel si potione delectetur: *℥ florum stæchados, borag. anthos, matricaria, melissa, ana m. ss. passul. enucleat. ℥ ss. semin. anisi ℥ ij. fiat decoct. in aqua communi, & in ℥ iij. dissolue diacathol. ℥ ss. electuarii indi maior. ℥ ij. diaphœnici ℥ j. elect. elescoph. ℥ ss. mellis ros. colari ℥ ss. misce. fiat potus.* Postea exhibeatur *theriaca vel mithridati ℥ j.* Deinde abluatur vterus: *cum decocto puleg. calaminthæ, origani, matricar. meliss. nucum cupressi & fol. r. hois opson. malicorii.* Potest etiam postea venter spongia immersa super regionem vteri fomentari. Inde, prius cum oleo mastichino & ros. inunctus, in locum naturalem reponatur. Si inditus fuerit, subdatur pessus ligneus, aut candela molli vellere inuoluta, oleo liliorum, irino, vel cyprino, intincta, quatuor digitorum mensura, pro longitudine ceruicis. Alii hunc puluerem inspergunt: *℥ thuris, mastich. bol. arm. myrtill. sumach. gallar. omphacitid. cupulorum, ros. acaciæ, ana ℥ ss. fiat pul. subtilissimus, quo vterus aspergatur.* Deinde obstetrix inungat manum suam, & suauiter impellat eundē, muliere ita situata, vt prius dictum est ex Aetio. Postea ventosa magna sumini apponatur per quartam partē horæ. Qua remota, ceratū si quens apponatur, pilis tamen pubetenus prius derasis actionis: *℥ boli arm. sang. dracon. hypocist. sumach. ana ℥ ss. corall. rub. glandium, ros. rub. myrril. ana ℥ ss. pulueris sentur, & cum pice & resina pini q. s. fiat ceratum in forma quadrata in corio vel aluta, & vteri regioni applicetur.* Moretur in lecto, & cum non amplius profuerit vulua, femora arctius ligaturis contineat. Et si alius constingatur, vtatur clysteri vel balano. Et vbi iam curata fuerit, vitabit deambulationes, equo aut curru vehi, aut iactari: hæc n. plurimum obsunt; vti & balneorū vsus, ac coitus. Quidam tamen balnea sulphurea commendat, vel ferrosa, qualia nunc celebrantur in agro Veronensi Caldariana dicta. Abstineat a cibariis frigidis & humectis, vëtosus, quales pisces sunt, olera, rapæ, & similia. Vinum nigrū seu rubrum bibat ex pluvia aqua. Et sicuti Venus illis importuna est, ita & sternutamenta, vociferationes, tussis, ac magno conatu aluum comprimere obest. Atq; his optime habuit: tum alæ plures.

S C H O L I A.

Dictum est prius quod descensus vteri sit vel cum exitu, vel sine. Si igitur in latus declinet, ^{Curatio, si in latus descendat.} cognoscitur ex dolore: id etiā ob causam in suffocatione

focatione ab utero dictam contingit interdum:
 nonnunquam vero ob flatus impellentes. Si a
 flatibus fiat, cucurbitula magna primū lateri op-
 posito affligatur, in ipsumq; laborans mulier cu-
 bet. Sequens deinde clyster iniciatur: ℞. parie-
 taria, althea, mercurialis ana m. j. origani, calamintha,
 an. m. s. sem. dauci, carui, anisi, fœniculi ana ℥ ij. sem.
 lini, fœnug. ana ℥ ij. flor. chamemel, rorisma. meliloti,
 ana p. j. coquantur in s. q. aqua ad tertias: eius accipe
 ℥ j. cass. sacch. rub. an. ℥ j. bened. ℥ s. mellis anthosati
 ℥ j. s. olei chamemel. ℥ ij. fiat clyster ante pastum.
 Deinde vtatur rhombis sequentibus: ℞. pul. dia-
 cumini, diacalamintha, an. ℥ j. s. sacch. soluti in aqua
 melissa q. s. fiat elect. solidum, in rhombis ponde-
 rantibus ℥ ij. detur vnus mane ante pastum, qua-
 ter in hebdomada. Vbi nō dum extra descendat,
 naribus quoque, vt dixi, apponunt aromatica, vt
 moschum, ambram, spicam, styracem, & similia:
 inferius fumigia e reb. male olentibus. Uibus vero
 cucurbitulas imponunt, etiamsi excidat, aut um-
 bilico. Experimento constat gallinaceum ouum
 vetustum mire conferre, quo nihil grauius olet.
 Rupto cortice lana colligitur molli, & ita vuluæ
 apposita mire corrigit procidentem vuluam, vel
 in veteri vitio: sed cauendum est, ne odor ille gra-
 uissimus corripit nares mulieris. Id tamen alii cū
 cautione faciendū esse volunt in mulieribus deli-
 catis, & in quibus viæ ac meatus sunt satis ampli,
 & quorum virtus sensitiua matricis est multum
 acuta & sensibilis. Quibus & ob eam causam su-
 bita concidunt vires, & syncopen incurrunt, vel
 dolores tales incurrunt: in talibus ab iisdē absti-
 nebimus. & semper incipiemus a fœtidis debilib.
 paulatim ad fortiora: & primo potius imponen-
 do, quam suffumigando. Sed vbi cōtenta est ma-
 teria in locis angustis & inter panniculos, tunc
 præstat vti suffumigiis q̄ magis penetrant: primo
 ex therebinthina iniecta, vel plumis perdicis cō-
 bustis. Fortius est assa fœtida: & fortissimū omniū
 iam dictum de ouo. Postea tale, vel simile, cera-
 tum optimum & expertum a Bayro apponatur
 super umbilicum, diu tenendo: ℞. mastiches, ada-
 man. an. ij. galbani ℥ j. gummi styracis ℥ ij. confice in
 mortario cum pitul. o calido, extende super cori-
 um subtile & rotundum. Si matrix descendat, &
 foras exeat, idem B. yrus applicat auenam calc fa-
 ctam in faculo. Deinde iubet fieri pessarium ex
 therebinthina abietis, medullæ cruris viruli recēs
 liquefactæ & colatæ, opii, croci, rosa. ana pauxilio;
 imponendum discrete ab obstetrice. Si non pro-
 pter partum, sed ex alia causa, spongiam in aceto
 infusam applica, & statim restringet egressam.
 Folia vrticæ viridia loco, emplastri apposita, ma-
 tricem exeuntem coh. bēt. Ita & suffumigium ex
 foliis & ramis boxi per inferius valet. Sed & bu-
 bulum finem appositum laudant, ac aiunt etiam
 esse procidentia luo peculiare remedium. Vteri ve-
 ro procidentia si a casu, aut saltu, aut percussione,
 aut ob diff. item partum fuerit, prædicta omnia
 sunt, quæ antea Obseruat. 35. ex Actio tum aliis
 diximus, purgatione excepta. Id vitium tamen, vt
 dictum est antea, in senectute nunquam f. re. e.

stituitur, si malum præsertim vetus est: in iuueni-
 bus restituitur, si recens fuerit. Sic cum Maria
 Theodori, vxor cuiusdam ceruisiarii Brasserii di-
 cti, valde annosa, & quæ iam multas proles ex ma-
 rito susceperat, quæq; d. fficulter parere solebat,
 plurimis annis vteri prolapsu l. horasset, cumque
 ex me consilium peteret, hanc ego curationem in
 vetula, vt impossibilem aggredi non ausus fui.
 Nonnulla tamē præsidia proposuimus, vt saltem
 mitius malum ferret, si nō integre restitui. Quod
 si in principio accitus fuisset, eadem tentassem,
 quibus Amatus in vteri procidentia ex pondere
 leuato aliquando vsus fuit, quæ hic pro egregio
 exemplo adferre libet. Pudicissima (inquit) & ho-
 nesti vxor vicini, nata annos vigintiquatuor magnū
 imprudenter attollens pondus, in vteri procidentiam
 incidit dolor lumbos innadit grauiorem circa n. t. g. id
 est, pubem vel pectinem, magnum per sentiebat, adeo
 vt deambulare non posset, lotium continuo mittebat:
 sed primo die multo sanguine mixtum, secundo minus
 sanguinolentum: tertio vero sanguine alienum, tan-
 quam pus in eo misceretur, in quo tunc eam feb. is cor-
 ripere cepit: quarto in eo multum puris apparuit.
 Semper situit, multam fuit anxia, & grauius omnia
 ferebat, vt vix in cubili. perquiescere posset. Ad
 quam quum primum perueni. obstetricem accersien-
 dam curau: quam doceo, vt leuiter matricem, quo-
 ad fieri posset, ad locum reducat, deinde ilico locellos
 hos dicendo lauacro proluit, quod habet: ℞. ros. rub.
 foliorum plant. corrigiola sanguinaria diste, ana m. j.
 in aqua fiat decoct. quousque aqua subrubea fiat, facta
 colatura, adde mell. ros. colati parum misce. & fiat la-
 uacrum, quod calidum per insectarium ei aculabatur.
 Non minus caput decline, & crura maxime elevata
 habeat semper, suauio. Sed & moschum & Zibetum
 galliamve moschatam, ac res bene olentes naribus, ve-
 luti graueolentes pudendo ad mouendas mando. Gra-
 uelentia siue fœtida medicamenta sunt galba-
 num, pennarum vistarum fumus. Iis tantum duo-
 bus primis diebus peractis, & fœcibus per clyste-
 rem depositis, tertio die sequenti mel rosaceum
 colatium prædicto decocto in maiori quanti-
 tate addo: nec enim potentioribus medicamen-
 tis astrictioris opus erat, ob apparetis pus: timor
 enim erat ne obclusum vlcus malignius inde red-
 deretur, ob incarceratam materiam. Quarto vero
 die multū puris in vrina exiuit: sed quinto minui
 cepit. Proinde tunc fomentū ex balauistiis, myr-
 to hypocist. ros. rub. & sem. sumach, in vino ru-
 bro austero parare feci, quo vterus optime laua-
 batur, & spongia eo imbuta pecten & pudendum
 fouebantur. Et intus quoq; in sinu lana vino illo
 imbuta adaptabatur. Octauo vero cucurbitulas
 magnas duas umbilico multa flamma ignitas affi-
 gendas iussi: post quas ilico ceratum hoc descri-
 ptum subuentri, id est, pubi, apponendū curauī,
 quod habet: ℞. mastiches thuris ladani sanguin.
 ana m. ana ℥ ij. galliamoschata, ℥ j. terebinth. cera.
 res. a. ana parum, & ad ignem fiat ceratū, & super
 eorum alutam dictam extendatur, vel melius su-
 per pannum cocco intinctum, & calidum admo-
 ueatur. Quibus recte habuit. Ceterum a motu:

& rebus sternutamentum irritantibus, illi per quind. cim dies interdiximus: veluti a vino, & rebus calidis: nam victus rationem subtilem præscripsimus. Porro ab aquæ potu, quantum possibile erat Hippocrat. consilio, eam arcebamur: sed primis diebus halycacabi (alkekengi, Officinæ, Mauritanica voce appellant) aquam bibendam propinauimus.

OBSERVATIO XXXVII.

De vteri stillicidio cum imbecillitate ac intemperie frigida & humida eiusdem.

Mulier Alcmariana, extra portam qua Harlemum itur habitans, valde pallida & cachectica, multo tempore vteri stillicidio laborabat, cum eiusdem imbecillitate & intemperie frigida atque humida. Cui cum vtilissima remedia præscriberem & non statim ab eo malo liberaretur, ad varia etiam tonsorum remedia confugit, & illius itidē Iudæi Empirici, qui ob facinora deinde Leydis flagellatus fuit. Ceterum hæc tandem, remediis ad malum non facientibus, ad vteri vlcationē devenit, qua multis annis adhærente, tandem misere vitam finiit.

S C H O L I A.

² *Menstruorum stillicidium.* Sanguis in hac muliere stiriati exercebatur: ab Actio id dicitur etiam menstruorum stillicidium; quando videlicet cum grauissimo dolore intimas partes opprimēte, sanguis ita stiriati excernitur. Pubi apponit lanam vino & rosaceo madefactam, vel vesicam oleo calido plenam, sæpe & fomenta ex lentibus confecta, & in principio, si dolor perstiterit, & vires ferant, cubiti venā secatur: cataplasma, si perseverat, e sem. lini, pane & aqua mulla paratum applicat. In sessiones ex alth. sem. lini, scenug. anethi, rutæ, artemis. adhibet. Si inueterauerit, pectini atq; inguinibus cucurbitulas cum scar. if. imponit, & balneis naturalibus vitur, *et apud eum videre licet, lib. 16. cap. 65.* Habet enim aliquam similitudinem cum stranguria & dysuria. Iam quoque ut aliæ partes, ita & vterus debilitatur, *ut ex eodem constat, lib. citato, cap. 75.* Accidunt iis, *Sorano attestante,* Veneris fastidium, flatuosi spiritus excretio, menses exuberantes, bis aut ter singulis mensibus inordinate delati nigri & aquosi; neque semen viri iniectum diutius detinetur, sed a concubitu defluit, aliis confestim, aliis post aliquot dies; quædam trimestrem foetum abortiuntur: quæ vero non abortiuntur, gracilem imbecillumq; foetum generant. Hæc ipsa certe cum & humidam & frigidam intemperiem haberet, nunquā concepit: quod etiam contingit illis, quæ vterum resolutum habent; quamvis ob multas causas; sed præcipue, *ut idem Aetius refert ca. 77.* ob frequentius repetitos abortus: cuius curationem similem etiam ait cum menstruorum stillicidii; & præcipue cōfert castoril assidua potatio. At de intemperie frigida & humida postea agemus, cum de conceptione dicturi sumus. Sed cum hæc naëta esset Medicos imperitos, vteri subsequente vlcatione, ex remediis minus aptis, ut arbitror, tandem misere periit. Nō mirum, cum grania essent accidentia, quæ Medicum peritum, ut recte

curari posset exigebant. De vteri vlcationibus postea dicturi sumus.

OBSERVATIO XXXVIII.

De spiritu in utero collecto cum grauissimo dolore.

VXor mea carissima, Eua Teylingia, post consuetam mensium purgationem, cum se non bene tueretur, vterus eidem spiritu impletus est cum intolerabili cruciatu & dolore; qui a pectine, ob vteri inflationem, imoq; vtre ad septū transversum & inguina excurrebat, ut pene dolore enecaretur, nec posset vel crus, vel seipsam in vllā partem mouere. Eo dolore mense Iunio, an. 1560 suborta, & adeo increcente, ut fere pro mortua haberetur, sanguineum, licet Paulus & Aetius hoc suadeant, ausus non fui detrahere, ob debilitatem. De positis vero excrementis per glandem, quod ægre admisit, decoctum florum chamameli, pulegii, & sem. dauci, anisi, carui, fœniculi, artemisia, pauco iniecto oxymel. propinaui & sacculum vteri apposi concinnatum ex floribus chamameli, meliloti furs. cumino, ruta, paratum. Clysterem iniicere non potui: nam si leuiter se moueret, in syncopen cadebat, a qua cum excitata esset, ac proba matrona Heutera, eius cognata, de nocte ad eam venisset, chirothecas habes perfumatas moscho; mox præfocata pro mortua habebatur. Sed ilico remotis chirothecis (*matrona enim me hercle proba statim eas reiecit*) plumisq; cōbustis ad nares apposis, & cerato ex galbano vmbilico appposito reuixit. Dolor tamen in imo ventre, neq; vng. emplast. ex baccis lauri, nec fomentis sedari potuit. At quia alium non deponebat, dedi ꝑ. j. s. manna selectiss. cum iure pulli, & optime excreuit; & quod mirabile erat, uti & in aliis animaduerti, ex pudendo spiritus erumpebat. Tandem, miraculi instar, sacculis denuo admotis, & sæpius diacumino & diacalaminta deuoratis, præter omnium opinionem vxor mea dulcissima sanitati restituta fuit.

S C H O L I A.

Vlva, inquit Aetius lib. 16. cap. 80. interdum a partu refrigerata, spiritu impleri solet, siue os eius claudatur, siue grumescēte sanguine obstruatur. Idem & Paulus refert lib. 3. c. 70. Alii addunt, & post vsum balnei aut stuphæ, aut mensium purgationem, posse fieri; ut vxori meæ contigit; aut quia flatus in toto corpore collecti sunt ob calorem imbecillum. Post partum vero, si emissio partu, ventrem non comprimant, nec ab aere se tueantur: ita & post purgationem. Ob id mulieres nostræ fasciis se constringunt, ut vterus in sese cōcidat: nec recipiat aerem. Post balneum, si sese aeri exponant: ita & post stupham. Alias spiritibus, inquit Paulus, in concano ipsius spatii conceptis, alias vteri corpore rarefacto, tumor pubis & imi ventris committatur, cum dolore pulsati, qui ad septum transversum usque ad stomachum, inguinaque pertingit, ac sonitus digitorum impulsu tympani modo redditur. Idem fere habet Aetius. Spiritus, inquit, sæpe in vteri cavitare colligitur: sæpe in sinu, qui sensui patet, nec raro inter cæcos meatus coercetur. Aff. elum sequitur pectinis totiusque seminis tanquam tympanice

² *Vteri imbecillitas.*

² *Vteri resolutio.*

³ *Causa inflammationis.*

⁴ *Signa.*

panite hydropis, tumefactio sequitur; doloresque punctationis sensum inferentes, qui usque ad stomachum & septum transversum perveniunt, ac nihilominus utrinque in lateribus extenduntur: saepeque alteri inguini, interdum utrique, interdum & umbilico, lumbisq; ac pectini dolor communicatur, cui caput quoque assensitur: nonnunquam spiritus efflatio per muliebrem pudendum erumpit, ut ab agris percipitur. Si ergo spiritus in vteri cavitae collectus fuerit, gurgulationes ac sonitus quidam in corporis flexu audiuntur; quales intestinis accidunt, quæ torminibus vexantur; impulsuq; digitorum sonus tympaniticus redditur. At ubi flatus intra cæcos totius vteri meatus aggregabitur, dolores vehementiores, ac curatu difficiliore infestant. Flatus enim in cauo locellorum sinu contentus facilius discuti digeriq; potest, quam ille, qui in angulis ipsorum consistit. At qui locellorum villis & substantiæ hæret, difficilime curatur. Quod si a partu fit, & cito succurratur, facile sanatur. Alioqui si non statim succurratur, difficile. Scribit Valescus, multas se vidisse mulieres, quæ adeo magnos ventres ob flatus in vtero collectos habebant, ut hydropicæ viderentur. Auxiliatur ergo primum, *iuxta Paulum*, sanguis demissus, si nihil obstat, ac nisi ætas & anni tempus *secundum Aetium*, obstiterint. Mox in accessionibus inedia vteris, & olei dulcis calidi irrigatione, in quo rutam & anethum decoxeris, vel oleo rutaceo, infusioneq; ex rutæ, pulegii, artemisii, cassiæ decocto, vel calaminthæ, prassii, thymi, artemisii, althææ, & caryocari, *iuxta Aetium*. Iuvant & cataplasmata ex semine apii, cumini, sceniculi, anisi, ammeos, farina lolii. Ad hæc cucurbitulæ tum leues, tum cute incisa affixæ. Ac si diutius vitium se prorogaverit, purgatio ex hiera picra utilis est, vel Ruffi, Archigenis; etiam ex Aetio: dropaces, synapismi, & aquæ naturales. Obstetrix autem prius digito peruncto inserto grumum incumbentem, si contingat, auferet, leuiter ipsum dissipans, rursusque admouebit cataplasma ex ficu, nitro, & absinthio. Reliqua vide apud Aetium & Paulum locis citatis, & quales pessi sint adhibendi. Interea & alimenta attenuantia & flatum discutientia exhibebimus, & diospoliticon, & diacalaminthum. Sed clarius ex exemplo sequenti innotescunt.

OBSERVATIO XXXIX.

De vteri inflatione cum insigni dolore post abortum aborta.

Mulier Alcmarianæ, cum abortum passa esset, purgatione subito restricta, cum se citius vento exposuisset, venter inferior ita in tumorem eleuatus est, ut de hydrope, aut tympanite metus esset, cum tanta torsione & dolore acerbissimo, qui inguina & totum ventrem occupabat, ut ipsa colicum dolorem esse putaret. Sed ego omnibus animaduersis, spiritum flatulentum in vtero existentem, horum symptomatum causam esse percepi. Quare cum alius etiam restricta esset, clysterem statim iniicere iubeo: ℞ florum chamæmeli, meliloti, summitatum anethi, artemisii, parietaria, ana m. j. malua, m. j. ℞. seminis fenugr.

anethi, anisi, ana ℞ ij. seminis dauci, cari, ana ℞ j. ℞. rad. althææ ℞ j. fiat decoct. in aqua communi pro ℞ j. colatura adde benedicta laxat, hiera picra, ana ℞ j. olei anethini, chamæmel. rutacei, ana ℞ j. salis ℞ j. ℞. fiat clyster. Quo egregie cum ventolitantibus emissis aluum deposuit. Cum residuo decoct. fottus cum spongia fiebat circa pectinem & inguina, etiam loco inuictio oleo rutaceo, hiliaceo, & anethino, postea etiam cheyrino: deinde exhibui diacuminum. Etiam purgata ex hiera, adhibui, quæ menses euocarent, & simul flatus discuterent. Sacculis quoque ventri imo apposis ex pulegio, artemisia, matricaria, meliloto, & floribus chamæmeli. Etiam per os accepit diacurcuma: & tandem bene habuit. Alioqui dedissem, uti præceptor meus Elideus mulieri exhibuit, tryphæa magna ℞ j. aquæ matricaria ℞ viij. Dedit autem duabus vicibus, & dolor ac inflatio cessauit, quæ eidem euenerant post quartum mensem a partu mortuo, cum non esset bene purgata. Venam tamen tali incidit: primo tamen duabus cucurbitulis in tibiis positis cum scarificatione, quod cum non satis efficax esset præsidium, saphenam aperuit, & dolor cessauit, mox fluentibus menstruis.

SCHOLIA.

PRO causa, quæ hanc inflationem vteri gignat, præsidia adhuc addenda. Quibus enim flatus ob cruditatem sensim in vtero generantur, vel in toto corpore, licet ii minus molestare solent, tamen statim expedit in hac specie pituitam euacuare, aut crudos succos frigidus, a quibus eleuantur flatus, & corroborando calorem naturalem ventriculi, & omnium partium naturalium; discutiendo deinde flatus genitos & collectos in hunc modum: ℞ mellis ros. colati, syr. e stæchad. ana ℞ j. syr. de artemisia ℞ ij. aquæ absinthii, artemis. apii, petros. ana q. j. fiat syr. arom. cum ℞ j. diagalangæ. His pilulis vel similibus purgetur: ℞ pilul. aggr. cochiar. ana ℞ j. agar. troch. ℞ j. fiat pilula cum syrup. de bryantiis. dentur post mediam noctem cum custodia. Altero die capiat ℞ j. theriacæ vel mithridati, & inungat ventrem & inguina cum oleo nard. rutaceo, anethino, & apponatur emplastr. de baccis lauri, quo Galenus utebatur: & fiant sacculi ex milio & sale torrefacto. Flatus assumunt & discutiunt, adiect. sem calidis maioribus & minoribus. Si autem a partu fiat, non opus est purgatione per pilulas, aut alia medicamenta; quia sufficit illa purgatio naturalis, quæ fit per vterum: quæ si non fuerit, est prouocanda, & iuvanda pessariis attrahentibus; & cucurbitulis apposis in coxis, aut aliis remediis præscriptis ad menses retentos. Et si veniat ex retentione menstruum, etiam ii prouocandierunt. Pessaria ex benedicta & aliis flatus discutientibus sunt valde ex usu, & constrictio ventris per fascias. Cataplasmata conducunt ex stercore ouis vel vaccæ, vel capræ, additis quibusdam flatus discutientibus. Sic, ℞ stercoris vaccæ ℞ j. cumini ℞ ij. seminis apii, petros. ana ℞ ij. mellis cocti parum, vini maluatici q. s. misce, fiat cataplasma. Iam si post bal-

Si suffocatio
accidat.

neum aut stupham fiat ex aere frigido, aliquando morus adest, aliquando quies. Et cum mouetur huc & illuc, potissimum sursum, suffocationem vteri facit: tunc succurrendum erit remediis præscriptis ad praefocationem, ut in vxore mea fecimus. Aliquando quoque, si a balneo vel stupha id accidat, sterilitatem adfert. propterea, quod partes relaxatas (ut *Rondeletius* dicebat) aer frigidus condensat, & internam vteri regionem, & ora claudit, per quæ semen a testiculis descendit in vterum, per eius cornua. Etiam a partu, absoluta mensium purgatione, optimum erit iniectiones clysteres, qui fiebant ad sedationem doloris colici, & ex oleis discutientibus flatus, & ex decoct. sem. calid. maior. & erit utilissimum parum exhibere ex confect. arom. ros. & tabul. vnam diagalanga & decoquere piper in eius iusculis, & alia, quæ dicta sunt loco De colico dolore & flatibus. Si fiat a balneo, eodem modo curari oportet, discutiendo flatus topicis remediis descriptis. Quod si opus esset aliqua euacuatione, ob cacochymiam, vel cruditatem ventriculi, dentur pilul. de arom. vel hieræ simpl. In omnibus his causis maxime conferant pulueres flatus discutientes & resiccantes, si post eorum assumptionem, parum vini maluatici bibatur. Sumendi autem ante prandium potius, quam post. Item cucurbitula magna cum multo igne (facta prius euacuatione recrementorum alui per clysterem aut pilul. aut aliter) si non adsit suffocatio vteri, supra umbilicum adhibita, plurimum prodest. Quod si suffocatio adesset, admoueatur iunguinibus cum multo igne, ut & renocetur, & flatus absumentur.

Si fiat a
balneo.

In omnibus
causis.

OBSERVATIO XL.

De intenso vteri dolore.

- 1 **C**um intenso vteri dolore ex frigore contracto mulier laboraret, nihil quicquam huic magis profuit, quam castorei *3j. cum vini Rhenani exiguo sumti*. Sed & alteri puellæ, cui cum dolore ventositatis admixta erat, pulueris rad. gentianæ ad *3j. cum vino generoso*. Nihil enim æque dolori subuenit, ut recte dixit Benedictus Veronensis *libr. 27. cap. 2.* quam castorium, si ex frigida fuerit causa, siue potum, siue illitum: ita & gentiana trita mire prodest ex vino calfacto pota, si ex vento fuerit: nam & imminet arcet dolorem. Præceptor meus Benedictus Fauentinus in sua Empirica, ubi dolor vehementior infestaret mulierem, & timor esset de debilitate virtutis futura, si quæ remedium sedare dicebat dolorem matricis: *℞. philonii Romani 3j. diacumini, diagalanga, ana 3℔. misce. & fiat bolus*, qui detur patienti, qualibet hora doloris. Sed oportet habere rationem causæ, ut in Scholio latius. Plura vide apud eundem loco citato.

SCHOLIA.

2
Variis vteri
dolor.

Dolet foeminarum vterus aut ex mala habitudine, aut vento, vel inflatione maxime, (ut iam dictum est) vel spiritu incluso, aut humore extendente, aut erodente, vel si ex eo vapor intus progeneretur, eo modo, quo in colicis fieri solet.

Id vitium vetulis, ac præpinguibus sæpe evenit; vel contra ad maciem nimiam tendentibus. Tum inguina, & ilia, & crura, cum spina dolent, & præcordia, imo quoque venter, male habent ac sinecput ipsum dolet. Vidit aliquando in eo affectu Benedictus Veronensis nigredine dimidiam linguam tinctam diu perseverasse: ischiadicos item dolores haud dubie excitasse affirmat. Curabitur hic dolor iuxta causam: si cum ventositate, uti in flario. Si adsunt humores, illi quoque parandi & educendi: si erodentes contemperandi, & mox leuibus educendi, iam quoque ex vtero per decocta infusa conuenientia iucunde extrahendi, prout frigidi vel calidi sint. Id quidam cum tripolii, zinz. cassia, cinnamomi, ana *3j.* cum artemisia decocto epota faciunt. Vel lana apposta illi decocto intincta, vel ellebero (sed forte est) aquas indutrahunt. Si ex caliditate procedat, muliebri lacte ex lana imponunt & mitigant. Vel, si opus est fortioris medicamine, cum hyoscyami decocto, vel succo, iniectione sedantur: vel papauerino, vel malua decocto. Iuuant & infusiones. Utiliter supponitur onum ex lacte equino, exiguo croco addito. Ladanum quoque Galeni emollit & dissoluit, & suauiter astringit. Oleum lentiscinum, lilinum, violaceum, luteum, probantur. In frigidis castoreum, ut dictum est, & bacca iuniperi matura in posui, cinnamomi galanga, zedoaria ex vino *3j.* Salutares infusiones fiunt ad locorum cruciatus, quæ habent ma. orana, ocymni, artemisia, abrotani, fœnug. brassica sem. lina, malilora, chamamelis, omnium partes portiones: eas ex aqua feruifacito, Sed. & nepiti, pulegium, lauri, bacca & folia maiora. artemisia, fœnug. semen vel herba, lini semen, sed lauri folia per se imbrice calefacta sacculo subdita valent. Aliqui prioribus fomentis addunt anethum & altheam, sesami semen. Dolores vero a partu sedantur schœnantho ex aqua decocto, donec dimidium superfit, ita ut loci foueantur, & decoctum bibatur ternis cyathis. Addi iubet Dios. siens præpingues, vel carycas cum fœnug. nam & alia vuluæ vitia sanant. Dolores ex vento discutit semen cumini aceto maceratum, deinde torrefactum cum ammeos sem. ac zinz. & castorio, sumuntur singulis diebus obolorum duum pondere. Reliqua vide apud præceptorem meum Benedictum Fauentinum in sua Empirica cap. proprio. Quibus addas supradicta de vteri inflatione. At vteri vulnera, quæ etiam dolorem inferunt, ad Chirurgiam pertinent. De his vide harmoniam Gynæcorum, cap. 31. quæ ex Moschione & Cleopatra decerpta sunt.

OBSERVATIO XLI.

De vteri inflammatione.

Mulier quædam ex infima plebe, cum a viro calcitrone supra imum ventrem circa vteri regionem egregie percussa esset, paulo post valde doluit, ita ut lenium difficulter redderet, febrisque ingens mox suborta est. Sanguinem tamen per vuluam non demittebat: dolebat autem capite; ceruicis nerui, digiti, collumque pariter distendebantur; & dolor ad ventriculum usque eleuabatur,

batur, pulsusque parvus ac frequēs aderat, & plurimum vniuersus vterus dolebat. Ad quam aduocatus, hæc animaduertens, dum excrementa alui etiam detraherentur, inflammationem vteri esse percepi: ideo ilico venam axillarem in cubito incidere iussi, iuxta Arabum & etiā Græcorum decreta, (de qua re latius suo loco) cum ægra satis robusta & sanguine repleta foret. Cumque aluum non deponeret, mox clysterem mollem præscripsi ex decoct. maluz, viol. lactucz, prunis, cū cassia & oleo violaceo. Interea vterum & locum dolentem & pubem cum oleo ros. myrteo, & modico aceti fovebam. Altero die, cū difficulter mēteret, & lotium tinctum esset, dolore incremente, sanguinem quoque ex saphena, vt chirurgus me præsentē detraheret imperavi. Interim tenuissimo victu cōtenti, solo hordeato, & potu ptisanæ vulgaris, iulebo sequenti utebatur: ℞ syr. de end. ex infus. ros. rub. ana ℥ j. ℞ syr. viol. nymphae. ana ℥ ℞. aquar. borag. cichor. end. lapul. ana ℥ iij. misce pro 4. dosib. Interea primis diebus, dum in principio essemus, ad repellentia accedebamus; etiam ad iniectiones, quæ citius parantur, quam cataplasmata, ex oleo ros. myrteo, (vt diximus) cum aceto, adiecto pauco succo plantaginis. Postea & cataplasma tale imponendum duximus quo & Gal. utebatur 2. ad Glauz. ex succo semperui, sapa, vino austero farina hordei, & balaustris, vel ex cortice mali granati. Et ita in partem internam inieciimus, præter iam dicta, etiam aquam plantaginis, vel solatri. Deinde quia aliquid resudat a parte inflammata, his admiscuimus decoctum hordei, vel parum sacchari ros. & infundere iussimus per metrenchytram per obstetricem. Sic & serum lactis ad deterfionem, & lac recens mulsum ad doloris sedationem facit. Cum in augmento essemus, cataplasma digerens & repellens & dolorem sedans apposuiimus, prius quidem ex mica panis cum lacte cocti & oleo chamæmel. paratum; deinde sequens, quod dolorem sedaret & digereret: ℞ rad. althæe, folior. malua, viol. ana m. j. florum viol. chamæmel. meliloti, ana p. j. fiat decoctio. contundantur herba & rad. & per orbem transmittantur, his aliquid decoctionis addendo & farina hordei q. j. seminis lini q. ℞. olei ros. q. j. misce. fiat cataplasma. Postquam constitisset defluxio, & dolor utcunq; remissus esset; quæ potentius digererent supra partē apposui, cataplasmati superscripto addendo farinam fabarum, vel has herbas vtero destinatas: ℞ rad. liliorum & bisulma ana q. j. malua m. j. artemisia vel matricaria m. ℞. florum meliloti, anethi ana p. j. fiat decoctio, vt supra dictum est. contundantur; quibus postea adde farina fabarum & hordei, ana q. j. pingued. porci ℥ iij. butyri recentis ℥ ij. olei chamæmel & liliorum ana ℥ j. ℞. misceantur; & fiat cataplasma. Tunc enim magis detergentia admiscemus, quia id, quod resudat a parte affecta, si retineatur, maiorem inflammationem excitat. Et quia hæc pars facile scirrhum patitur (quod caro eius densa sit, & defluxiones acceptas pertinacissime seruet) diutius non est vtendum (vt Rondeletius quoq; recte admonebat) repellentibus, ne ob congelationem scirrhus fiat. Proin-

de in declinatione malactica addenda sunt; vt emolliatur, & crassum discutiatur & euacuetur. Supradictis igitur adieciimus farinam seminis lini & fœnugræci. Actius farinam hordeaceam cum fœnugr. & lini semine in aqua multa coctam imponit, aut carycarum decoctum adhibet, ac pessos subdit, si calorem ferre possint, ex cæsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, oleo anethino, chamæmelino, seu irino, & cera, compositos. Ceterum butyrum, medulla & adeps, omnia recentia ad pessos deligenda: etenim antiqua dū liquantur, nidorosa sunt, ac calidiora euadunt, & inflammationes exacuunt, vt liquet ex eodem Actio. Post hæc remedia, emplastra digerentia ex lacrymis multum laudantur, vt quicquid est in parte discutiant & euacuent. Nos emplastra de meliloto, de mucilag. & ammoniaco in sine apposuiimus; & facta est resolutio, nulla duritie permansente. Sed, quod fere omiseram, post quartum diem cum febris atq; dolores mitigarentur, pro purgatione dedi ℥ j. cassie recens extracta dissoluta in aqua viol. borag. artemisia, ana ℥ j. syr. viol. ex multipl. infus. ros. ana ℥ ℞. quibus probe aliud reddi batur. Nam hic nullo modo medicamēta laxantia, quæ attrahūt, danda sunt, vt quæ ad partem affectam magis trahant. Sufficit enim his (non tamen in principio, sed postquam dolor aliquo modo mitigetur) syr. viol. ex multis infus. ros. cassia, vel manna, & lenientia tantum sine attractione. Atq; his sanitatem recuperavit.

SCHOLI A.

VELut reliquæ corporis partes, ita quoque vterus inflammatione laborat; idq; pluribus ex causis, vt referunt, Paul. Ægineta lib. 3. cap. 64. & Actius lib. 16. 85. De vteri inflammatione ex Philomeno: nempe ex ictu seu percussione, mēlium retentione, frigore, & inflatione; adeoque ex abortu; item ex fœtu sinistro edito; vlceratione, cōcubitu metas rationis excedenti, sellæ nimis duræ in sessione, lōgissima intensissimaq; deambulatione; sæpe & transpiratione ob frigus prohibita, vteri inflammatio contingit. Est enim multum vterus inflammationibus obnoxius, cum eo multus sanguis fluat ad mēlium purgationes, vel post partum, qui retentus parit inflammationem. Retinetur autem propter aeris circumstantis frigus, aut propter frequentem cucurbitularum appositionem supra vterū. Fernellius phlegmonem fieri ait tenui feruidoque sanguine e vena caua per tenues venas, non in vteri capacitatē, sed in illius substantiam effuso: qui collectus accensus ac putrescens phlegmonem parit. Causæ itaque sunt, vel externæ vel internæ. Externæ, velut ictus, siue percussio, multitudo coitus, vel laboriosus ex mēbro inepto, pessus acutus, abortus, partus violentus, aut ionaturalis, vel sinistro editus fœtus, obstetrix inepta, ventosa posita supra inguina vel regionem vteri, corpore impuro existente, nullaq; diuersione prægressa, durioris sellæ in sessus, longa intentaq; ambulatio, flatus frigidi atq; astingēs. Internæ vero, vt mēlium suppressio, totiusq; corporis plenitudo, vt dictū est, & vteri exulceratio.

4
Causa inflammationis vteri.

5
Externa causa.

Interna.

Signa.

Neoterici volunt, ex omnibus humoribus fieri posse, modo per collectionem, modo per defluxionem ad vterum. Verum ad partis affectu dignotionem ut accedamus; comes huius inflammationis est, iuxta Paulū loco citato, febris acuta, dolor capitis, tendinum, basis oculorum, brachialis, digitorū, & colli conuulsio, inclinatio in aduersum, stomachi ex consortio dolor, oris vuluæ conuientia, pulsus exigui crebrique. Febris autem hanc inflammationem sequitur, ut in aliis inflammationibus internis, propter maximum consensum cum corde per arterias. Hanc etiam indicabunt, inquit Aetius, muliebrium locorum, pubis, suminis, lumborumq; ardentes dolores; & si digitus in os vteri imponatur, occurrit tangenti durum, clausum, feruidum, retractū; præsertim si in ipso, aut in collo fuerit inflammatio. Nam licet oris vteri compressio commune signū conceptionis, & tumoris præter naturam sit; id tamen ex duritie distinguitur, ut patet apud Hippoc. & Gal. aph. 51. & 54. 5. lib. Molle siquidem est grauidis & secundum naturam, durum vero, in quibus præter naturam est tumor. Cum itaq; os vteri inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitoq; immisso, os occurrit durum ac rigidum. Plerumque etiam vterus in eam partem declinat ac retrahit, qua inflammatus est, & ob eam causam os & collum eius auertitur. Et vbi cavitā, seu fundum vteri fuerit inflammatum, in vmbilico potissimum dolor cum tumore infestabit, ut ne cōtactum quidem foris admittat. Differt autem ab ea, quam superius vteri retractionem proprie appellari diximus, quoniam cum inflammatione vehemens est febris, & ardor intensus. At si non vniuersus vterus, sed pars eiusdem aliqua inflammatione fuerit obfessa, in ea magis dolor intenditur & sentitur. Nam si posteriora eius, iuxta eundem Aetiū, inflammatione laborant, dolor lumbos affligit, ac spinam magis, & stercus recto intestino (compressio eo) retinebitur. Anteriore autem parte inflammata, dolor pubem occupabit, & sit licidium, aut vrinæ difficultas (pressa vesica) excitabitur. Lateribus vero vteri inflammationem expertis, inguina tenduntur, & crura grauantur, ac ægre mouentur, & quibusdam crus ipsum, quod e regione est, per incessum claudicat: quin etiam in coxam dolor transit; eiusdem quoque partis dolor cum grauitate non nihil significare potest, Galen. teste De locis affect. Comitantur autem vteri inflammationem, præter iam dicta, tumor ac dolor eiusdem haud validus, si languida fuerit inflammatio; vehemens vero, vbi valida fuerit, eritque is dolor, ut diximus, quem percipiunt ægotantes, pulsatilis, Paulo teste; secundum vniuersam, vbi vterus totus fuerit inflammatus; aut secundum partem, si pars ipsa fuerit affecta, tum illa, quæ paulo ante diximus. Iam vbi magis augatur cōsequuntur, animi deliquium, exolutio, singultus, pedum torpor, genuum perfrigeratio & extremarum partium exsudatio, vrinæque ac stercoreum recrementa supprimuntur, & dentibus fiendentes ægotantes, & febres magis

augentur, præsertim sincipitis dolor, ut ab Hippoc. & Galen. 6. De morb. vulgaribus scriptum est. Eadē quoque habet & Aetius. Cum nimirum inter omnes corporis partis, plurimas grandissimasque venas vteri habeant, phlegmone vtcunque ipsis orta, calidas vehementesque febres accendi opus est; adeo, ut inter synochorum species connumerandæ sint: cum ex putrido sanguine excitentur, ex quibus calentium vaporum copia ad caput subuolat (ut recte etiam Donatus censebat) quod dictorum vaporum plene, grauitates, & maxime in sincipite, agram vexant, tum quoniam recta in sinciput per infundibulum arteriæ deducuntur, per quas calidi illi vapores ascendunt, tum quod etiam sanitatis tempore tenuia, & halitiosa excremēta cerebri maxime per sinciput diffili solent, cum in ipso futura laxissima sint, caluaria subtilissima, plurimisque meatibus peruia. Ad hæc & multa sensibilia corpora per futuras euadunt, tum membranulæ, quæ crassum inuolucrum pericranio connectunt, tum etiam multitudo tenuium conceptaculorum per futuras exsiliunt; & propterea cum sensibilibus sit locus, hinc ab inferentibus dolorē causis magis cruciatur. His itaq; de causis in sincipite magis dolores fiunt, ex Gal. sententia eodem 6. De morb. vulg. Causæ autem externæ facile ex sermonibus ægræ dignoscuntur, aut astantium. Internæ vero ex prægressis causis, ex corporis plenitudine, vel si menses suppressi fuerint. Signa quoque prædominantis humoris, ut iam sæpe diximus eam ostendent; vel si vlcera ad sit, vel præcesserit, vel abortus, aut partus difficilis, & similia. Verum exemplis subsequētib; hæc iam dicta manifestius apparebunt.

OBSERVATIO XLII.

De inflammatione seu apostemate vteri calido.

Mulier Delphensi plenitudine laboranti ex prædominio sanguinis inflammatio vteri oborta fuit, quod istis signis percepimus apostema calidum esse: nam oculorum subsequēbatur dolor, & matrix intus palpitabat, & in ventre sub vmbilico sentiebatur calor, tumor quoq; ac grauitas, eratque dolor magis acutus arguens materiam calidā, occupans spinam, inguina, & ad præcordia ascendens, modo etiā in utroq; coxendice dolebat. Cum enim sanguinea esset, magis ex sanguine, quā bile ad vterum defluxo hoc malum originem cepisse animaduertimus. Cum scilicet rubedo faciem & oculos occuparet, lotiū quoq; rubrum & crassum esset, non erat ex mer. sib. suppressis, neq; ob partum, aut abortum, atq; ictum, sed ex humore calido sanguineo ad vterū defluxo. Ideo cum plethora adesset, uti in præcedente muliere, venā in brachio dextro ex basilica secari iussimus: nam & in vteri parte magis dextra dolebat. Emolliente quoque clystere hunc ectante & refrigerante prius iniecto, cum aluum non deponeret, & hunc syr. propinavi: ℞. syr. ex infus. ros. rub. de end. acetos. simpl. ana ℥j. aqua acetos. portulacæ, end. ana ℥ij. misce. fiat syrup. pro duabus dosibus. Interca cum in principio essemus, hoc vnguento locum

Cur febris
vehementior
hic fiat, &
dolor capitis
in sincipite.Causa quo
modo digno
scantur.6
Signa si os v-
teri inflam-
metur.Si vteri ca-
uitas fuerit
inflammata,
signa.Posterioris
vteri partis
inflammata
signa.
Anterioris
signa.Signa si late-
ra fuerint
inflammata.7
Signa in lan-
guida vel
valida in-
flammatio-
ne.Augescentis
inflamma-
tionis signa.

locum dolentem inunximus: ℞. ros. rubear. myr-
till. sumach. hypocist. boli armena, ana ℥j. olei ros.
myrici, ana ℥vj. cera parum, fiat ung. Fiebat & hic
vel similis fons: ℞. ros. rub. balaust. sumach. hypo-
cistid. chamæmeli ana m. j. contundantur crasso modo,
bulliant in ℔ ij. aqua ad consumt. mediet. Deinde
spongiam infunde in dicta decoct. & expressam
pectini superpone, & ubi coeperit tepesceri vel
calfieri, inde remoueat. Postea in augmento re-
percussiva cum resolutiuis apposuius, repercus-
siuis tamen vincentibus. Nempe in principio au-
gmenti hoc sequenti vel huic simili utebamur: ℞.
florum chamæmel. meliloti, summitatum anethi, ros.
rub. balaust. sumach, ana m. j. conquassentur crassim-
scule. & bulliant in s. q. aqua secundum artem, & fiat
fomentum. Deinde inungatur cum oleo ros. & o-
leo chamæmel. In statu apposuius resolutiua
temperata. Vt: ℞. florum chamæmeli, summitatum
anethi, meliloti, sem. lini, fœnugraci, artemisia, matri-
caria, melissa, ana m. j. bulliant in aqua, ut supra, &
fiat fons; mox vtero quoque inuncto, vnguento
hoc vel simili resolutiuo: ℞. olei lilacei, chama-
mel. ana ℥℔. pulueris matricaria ℥j. adipis anserini,
medulla ceruina. ana ℥ij. cera exiguum, fiat unguen-
tum: postea etiam adiecto oleo cheyrino; quibus
materia resoluta fuit. Interim post duos dies a se-
ctione venæ basilicę exhibui hanc potionem mi-
noratiuam & lenientem: ℞. cassia recens extracta
℥vj. elect. lenitum ℥ij. dissolue cum ℥ij. aqua artemi-
sia, syr. viol. ℥℔. misce. Deinde adhuc iuleb fuit
reiteratum. Post quartum diem, dolore utcunq;
sedato, ita eandem purgavi: ℞. diacatholici, cassia
recens extracta, electuarij lenitum, ana ℥ij. electuarij
de succo ros. ℥j. ℔. cum ℥ij. decoct. flor. & fruct. cord.
addendo syr. viol. ℥℔. misce. fiat potio. Quibus egre-
gie excreuit. Capiebat deinde ad roborationem,
diama. g. frig. & triumfant. in tabulis. Quibus
materia resoluta, ut iam diximus, sanitatem con-
seguuta est.

SCHOLIA.

4 Signa prædominantis humoris diligenter per-
scrutanda in vteri apostemate vel inflamma-
tione, antequam curationem ineamus, ut hoc ex-
emplum calidi apostematis ostendit: nam hic fe-
bris acuta & continua aderat vehementior, capi-
tis dolor, tremor, ac spasmus quasi membrorum
digitorumque & ceruicis; oculorum radices do-
lebant & interior vulua, vnde & vniuersum cor-
pus languescibat. Refert Benedictus Veronensis
lib. 27. cap. 5. se Iudæam quandam in eo affectu se-
casse. Supra enim inguinem, inquit, plurimum
intumuit, imo ventre: nam diu locorum vitio la-
borauerat. Miro modo tumor ille dimota vulua
interdū latefcebat, interdum in mucronem con-
spicius cernebatur, iamiam me & chirurgum sæ-
pe delasit ferramentum & medicamina apparan-
tem. Ad maturitatem emplastris perduximus,
mox manum deniq; non effugit: & sanata est, ac
exinde concepit. Altera pariter Iudæa (addit idem
Veronensis) ex eodem vitio sanata est, quam secari
ex improviso iussimus tāta odoris grauissimi fœ-
ditate, ut Medicos & necessarios omnes domo

propelleret: istumor immobilis erat, annexo pe-
ritonæo. Sicuti & Permarenæ nobili filia. Si a
sanguine fit, iam diximus Obseru. preced. Si a bile, A bile.
febris est magis acuta, dolorq; acrior, sitis, lingua
sicca, vigiliæ, tum alia omnia intēstiora. In frigido
apostemate genua torpere sentiuntur, tum pul-
sus tenuis est ac exilis. In vniuersum stomachus
languet, ac singultū patitur: tum & sub occipitio
dolor insidet: in maxillis & supra frontē dolent.
Sine dolore aliquando tumor est, qui grauis est,
& extenditur. Iam & extrema molliora redduntur
ac tumentia, & ægra minus infomniculosa est, ac
minus sitit, sine linguæ nigredine, pulsusq; minus
frequenti, & vrina minus rubens, genæ tument.
A pituita etenim febris est mitior, dolorq; magis
grauans, non tamen multū intensus, vrina minus
colorata, pulsus mollis, inordinatus. Melancho-
lici vero apostematis notæ sunt, tumoris durities;
nec dolet durities, inquit Galen. nisi in carcinoma
mutatum fuerit. At cum venter supra modū tur-
get, hydropis similitudinem gerit, tum pedes tu-
ment, crura extenuantur communicatione ieco-
ris vitati; sic aluus sistitur, ac vrina impo-
tune supprimitur, ac menses cessant. Ita a melancholia,
secundum alios, febris lenta, dolor mitis, pondus
in vtero grande, luescentes venæ omnes, maxi-
me autem saphenæ; vrina interdum subtilis, ad
plumbeitatem declinans, nonnunquā, tamen te-
nuis atq; alba; pulsus inordinatus, durus, paruus,
& tardus. Ex atra bile id vitium sæpe oritur, aut
phlegmone cum induruit, subito materia euane-
scit: id communi vocabulo Sephyros vocitat, Sephyros.
& cum plurimum in orificio contingit; atque ut
cancer lapideum inuenitur sine vilo dolore. Si
calidi apostematis dolor paucis diebus non quie-
uerit, sed grauitas ac magnitudo perseuerat, tum
inuidia sequitur durities, quæ medicaminibus
vinci nequit: facile enim, si vincere conamur, in
exulcerationem interdū mutatur. Et sic, in sum-
ma, inflammatio aut apostema ipsum, aut ex toto
dissoluitur, aut maturatur, aut indurefcit carci-
nomatis modo. Si maturetur, inflammatione in
abscessum transeunte, dictæ quidē notæ inflam-
mationis superius descriptæ intēstiores erunt; do-
lores etiam circa puris generationem ipsis a-
gē-
tur, ac febres, quæ cum humore, plerumq; ad ve-
speram ingruunt; ac inordinatæ accessiones ipsis
obueniunt, primis quidem temporibus intensæ,
cum doloribus ad vltimum: vbi suppurauerit, a-
liquantulum remittunt, ut inquit Paulus capit. 65.
lib. 3. tumor attollitur, dolor punctorius adest, a-
liquando vrina, aliquando stercoreiscrementa
supprimuntur, aut vtraq; simul. Aetio teste: alias
tumor in pube eminet, & veluti exudationis,
cum abscessus maior fuerit, ut liquet ex eodem
Paulo. Dum vero neque ipsa inflammatio solu-
ta est, neq; in abscessum transmutata, adhuc per-
seuerant, in scirrhi naturam transmutabitur, id-
que inde percipies. Febris, ac dolor, & reliqua le-
uiora symptomata remittuntur, tumore tamen &
renitentia permanentibus cum grauitate, & æ-
gro motu non solum crurū, sed totius corporis;

Signa temporum.

Imperatorii Medicorum error.

Signa praesagientia.

Prognostica.

7

8

ac segnitie ad omnes vitae functiones: *ut liquet ex eisdem Actio & Paulo*. Signa etiam temporum, propter curationem dignoscenda. Sic principium est ubi incipit. Mulo augescere augmentum. In vigore existente, status. Dum inclinatur malum, declinatio. Differt quoque a pleuritide: quod imperiti Medici agere distinguunt, ob septi transversae compressionem. Si enim magna est inflammatio, sequitur vteri suffocatio: si minor, magna difficultas spirandi, & ad latera & costas premitur dolor. Hinc existimant pleuritidem esse, ignorantes consensum vteri cum septo transverso, & cum clavicula. Integitur enim peritonaeo, & eo solo firmatur, ac retinetur a parte superiore. Quare si distendatur affatim, & in maiorem molem accrescat, distenditur peritonaeum, & hyposicota, ob illam unionem, quae fit in septo transverso, ex peritonaeo & hyposicota. Restant adhuc signa praesagientia, tum mere prognostica. Si causae externae plures in muliere fuerint & effatu dignae, inflammationem vel apostema in vtero expectare possumus. At mere haec subsequenter signa prognostica sunt: scilicet, quod deterior inflammatio ea est, quae plures vteri partes occupat, quam, quae pauciores: similiter quae os, aut cervicem fatigat, minus periculosa existit quam ea, quae fundum, seu cavitatem, quoniam promptius curationem admittit. Si vero vterum gerenti erysipelas in vtero fiat, lethale est, *inquit Hippocrates, aphor. 43. 5. lib.* Quamquam de vera inflammatione proprii dicta dubitet Galenus, num foetus possit aliquando vivere: id quod negari haudquaquam debet, eadem exigua existente, ex qua nedum maligna, verum etiam nec acuta febris gignitur: necessario etiam si in iocinore, ventriculo aut septo transverso orta sit; *ut liquet ex Galen. 2. Prophet.* Ex erysipellate autem semper acuta febris generatur, & saepenumero maligna. In hoc vitio urina alba & tenuis malum minatur. Et quam reliqua accidentia incalescunt, & sudor affuerit malignus, cum ventris inflatione ac animi defectu frequenti, ita ut non loquantur, spei locus nullus est. Inflammatio apostema, abscessus, vel suppurationis in vtero, *iuxta Avicennam & Arabes*, si in ore vteri, inquit, possibile est, ut sanentur; at si in profundo, minime; Gradus addit, valde difficile. Si induretur, lethale: si in pus mutetur, difficile. Id tamen cum fluit, sine odoris gravitate nimia erumpit: nam & in colore album est uniuersum pus, & salutem pronuntiat: uti in muliere illa, quae Delphis habitabat in insigni capitis aurei, vxore pistoris: cui subito ruptum est intus apostema, & copiose effluxit sanies alba, & minime foetida: ac nostra industria haec euasit, Dei benignitate. Eius historiam Obseru. 44. ponemus. Quod si illud pus quod effluit, teterrimi sit odoris ac virulentum, perniciem minatur. Si excrementa in vteri inflammatione, seu apostemate, & urinae retineantur, atque dolor ad vltimum extendatur, neque per se, neque per artem subito minoretur: lethale: quemadmodum fuit in Adriana Gerardi Alcmariana vicina nostra, muliere quidam pulcerri-

ma. Cui cum secundo difficilime pareret, & foetus mortuum cum violentia quadam peperisset, neque bene tractaretur post partum, nec diligenter custodiretur, ingens deinde in vtero abortus est dolor, febre continua accedente, cum vteri inflammatione ac apostemate calido; ita ut lotium primo difficulter redderet, postea & in toto suppressum fuerit, ut in grauiore inflammatione fieri assolet. Hic obstetrix plane imperita, & mulierculae astantes nasuta, ut huic pessimo symptomati occurrerent, multa calida pectus admouere; etiam filum coctum in lixiuio, ut lotium prouocarent: & ita apostema augentes, tum febrem ipsam, aptis non adhibitis remediis, nec me quidem licet vicinum vocarunt, aut consilium petierunt, & agram in mortem precipitarunt. In fine quidam Gallum Medicum Harlemensem vocarunt: sed & is nihil profecit, ac ipsa paucis deinde horis exstincta est. Recte dixit Bertrutius in suo *Collectorio tract. 9. sect. 3. capite 10. De apostema & cancro matricis*, *Consuevit hic*, inquit, *superuenire accidens timorofum scilicet retentio stercore & urinae, cui succurrimus: agram ponendo in balneo aquae dulcis, vel in aqua decoctae viol. althae, chamemeli, fenugr. seminis lini, cum ventrem leniat, vias elarget, & dolorem sedet.* Difficulter quidem talia in puerpera adhiberi poterant: fons tamen vel cataplasma ex iisdem parari potuisset, ut aliquando in puerperis, quibus urina detinebatur, commode fecimus. Haec enim inflammationem aut apostema non augent. Iam quoque frigiditas extremorum, vel sudor frigidus circa frontem & tempora, lethale: arguit enim magnitudinem apostematis seu inflammationis, & virtutis naturalis angustiam. Alienatio quoque fortis & instantia vigiliarum, quae per artem remoueri non possunt, infra diem quartum, ut quidam volunt, lethale. Apostema tempore impraegnationis eueniens in vtero, interficit matrem, vel foetum, vel vtrumque; & proprie si fuerit confirmatum, uti euenit cuidam mulieri iuenculae, ad quam accitus sum, iam per sex septimanas quasi hectica febre consumptam. Dolore in regione vteri semper torquebatur, & agere lotium reddebat, cum stranguaria videlicet, ob crassam residentiam, quasi purulentam, ita ut ab ulcere vteri ac renum: nam in renibus etiam dolebat. Sed praecipue ex apostemate praecedente videbatur abscessus esse in vtero. Erat iam in septimo mense praegrans, vel in principio octauo mensis (*si bene memineris*) cum ad ipsam accersitus fui. Ante meum aduentum haecenus alii Medici praesentes illam tractauerant, licet agere remedia admitteret. Cum ad illam venissem, accersita obstetrice, cum conamina partus adessent & insignes dolores, de abortu metuebam; & animaduerti ex certis signis infantem per tres dies ad minus mortuum fuisse, nam ab illo tempore foetus non sentiebat. Et cum valde angeretur, neque alium deponeret, ut a foetu mortuo liberari posset, cum leniens clyster & emolliens iniectus esset, multis precibus agra inducta, mox peperit filium omnibus membris perfectum, & satis magnum

magnum, sed mortuum, qui etiam ante tres dies saltē mortuus fuisse videbatur. Post tres dies cū rursus in regione vteri valde doleret, & purgatio non bene subsequeretur, exhibito puluere ad illā promouendam apto, peperit molam carneam. Et postea melius habere videbatur. Post duos vel tres menses dolore iterum ingrauescente, cū dysuria & vrina crassa, ex eodē apostemate in vlcus transmutato, mortua est. Apostema igitur vteri in pręgnantib. semper est periculolum. Et quaecunq; etiam illud fuerit in aliis mulieribus, etsi non sint grauidę. Quemadmodum hoc anno 1596. contigit in muliere Alemariana pulcherrima, quę per annum prius apostemate vteri laborans, postea eo in vlcus malignum transeunte, mortua est magna cum miseria. Alii eam calculo laborare putabant: ego autem vlcus esse in vtero semper iudicaui. Et facta incisione post mortem, marito iubente, vlcus, vti prędixeram, in vtero repertum est. Quaecunq; igitur apostema sit in vtero, non est contemnendum: imo diligenter curandum, cum ex eo facile abscessus fiant, sępe & scirrhus, cancer rimę vteri & rhagades ac condylomata. De quibus etiam suo loco dicturi sumus. Atque hęc de signis dicta sufficiant. Curatio erit ex subsequen-
tibus exemplis luculenta.

OBSERVATIO XLIII.

De oris vteri inflammatione.

1 **M**ulier, cum in abdomine valde doleret, atq; etiam febricitaret, os vteri inflammatū indicabam: quamobrem Adrianam Biezelingiam, quę mulieres curabat, vocari iussi, vt immisso digito experiretur, num os occurreret durum ac rigidum; quod & clausum dicebat, ac feruēs, ac retractum. Id signum erat (vt antea quoq; diximus) in ipso ore vteri & collo inflammationem esse. Quare vt recte curationem aggredieremur, agrā in domicilio obscuro collocauimus & moderate tepido, & somnum moderatum pręcepimus, cum vigilię etiam conferant in principio magis quam somnus: prohibent enim phlegmonem augeri, cum in visceribus generatur, vt patet 6. De morb. vulg. & Comment. aph. 1. lib. 2. Interea imperauimus, vt quietem amplecteretur, etiam omnem crurum motum interdicentes. Cum autem agre aluum deponeret, molli clystere infuso excrementa euacuauimus. Et sic, clysteri injecto, mox venam secari iussimus ex vena basilica in brachio dextro; quod fortis esset, ac in morbi principio adhuc essemus. Iussimus quoque vt immodicos animi motus vitaret. In principio parum cibi dedimus, nisi hordeatum, aut hordei cremorem. Paulus iubet lib. 3. cap. 64. per triduum cibo abstinere, & curationem, post venę sectionem, absoluit chondro ex aqua mulla, vel pane, vel ouis forbilibus, vno die interposito. Sic & Aetius li. 16. ca. 25. Chondro e mulla, aut pane abluto, aut ouis forbilibus patiens alenda, esseq; oportebit, quicquid cibo exhibetur, quantitate moderatum. Et sic nostram alebamus pane loto, aut ptisana, seu eius cremore, aut etiam alternis diebus ouis for-

bilibus. Pro potu aquam hordei dabamus, si se in qua & hordeum mundatum & glycyrr. in cocta erant. Alii sem. coriandrorum pręparatorum decoctum, seu ipsammet aquam modice calidam dant, nos & ceruiciam tenuem concessimus, a vino abstinentes, & iussimus, vt artus & extremitates corporis partes, manuum pręsertim, auersionis gratia, perfricarentur. Quod ad medicamenta attinet, fotum ex œnelao vel vino rosaceo, iuxta Paulum, super pubem adhiberi iussi, hapsis ex lana puriore atra deligaturā. Interea exhibui quoque, iulebos ex syr. viol. nimphee, cum aquis lactuce, end. cishor. acetosę, & similibus. Tertio die purgaui cum manna & cassia, quia delicata erat. Interea quoque cataplasma apposui ex farina hordei, sem. lini, fœnug. vitellis œuorum, assatis cum rosaceo & decocto caput papaueris & meliloti, ac exiguo vino seu aceto, composita. Sic & Aetius feruescente inflammatione, lanam succidam, vino & oleo, aut oxyrhodino madefactam, summi ac pubi applicat, aut palmulas in vino decoctas, aut malacynoniam simili modo in vino decoctas. Post quintum diem applicui id, quod a Paulo etiam commendatur; nempe cataplasma ex polline farinaceo, semine lini, fœnugrac. ex mulla, in qua papauerum capita decocta prouiciantur, & ex oleo, paratum. Et quia calor erat magnus, aquam rosaceam cum succo plantag. & portulacę per modica intervalla pudendo affundi iussimus. Vbi dolor magis ex cruciaret, iuxta Paulum, lacrymarum papaueris valde exiguum, (tria videlicet aut quinque grana) cum lacte muliebri & succo fœnugrac. apponendum consulebam. Et si dolor non cessasset, infusus adhibuissim, quos & Paulus per totum morbi decursum vtilis esse dixit, ex decocto fœnugraci, seminum lini, maluar. artemisia, & olei, pręcipue post principium. In iis autem, quę calorem non sustinent, & maxime circa initia, ex aqua modice calida rosaceo superfuso infusus fiant. At mitigata inflammatione, lana oleo calido & ros. chamemelino & vino imbuta pubem fouimus: & magis declinante, cataplasma iunini & pubi apposuimus ex farina hordeacea confectum, fœnugrac. & lini semine, cum decocto althęe, carycis etiam, adiectis. Aetius agrotam in fœnugrac. althęe, semin. lini, interdum, pulegii, marrubii, saluie, artemisia decoctis, sedere iubebat: & cataplasma simile iam dictum in aqua mulla coctum apponebat. Sed, si grauitatem cataplasmatum & colorem ferre non possent, in aqua tepida sedere iubebat, & loca rosaceo inungebat, pessosque imponebat, qui moderate refrigerarent, ex adipe gallinę, rosaceo & vino confectos. Iis quę calorem ferunt, ceratum nardinum illinetur, collutionesque & pessi adhibebuntur, ex cęsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anseris, vnguento susino, & cera. Sed, quod pene omiseram, quarto die, cum nondum dolor cessaret, iussimus quoque, vt in muliere robusta, vt vena tali secaretur, sed in exigua quantitate, quia prius vena secta fuerat ex basilica. Huius rationem explicabimus Scholio sequenti. Deinde utebamur topicis iam supradictis,

Verum do'o eiam mitigato, & curatione procedente, tunc, *iuxta eiusdem Aetii sententiam*, tenuē viuendi rationem, tum cibi paucitatem auferebamus. Et, cum iam manifesta declinatio facta esset, vinum concessimus, & cibos reficientes. Atq; his remediis iam dictis inflammatio probe resoluta fuit.

S C H O L I A.

5
De vena sectione.

Dubium de vena sectione.
Solutio.

Aliorum medicamentorum ratio.

Purgatio.

6

7

Quod venam hic ex basilica primo secari iussimus, id auctoritate tum Pauli tum Aetii egimus. Vbi enim, *inquunt*, vehementior inflammatio infestauerit; si neque ætas, neque habitus, neque anni tempus obstitit, neque inflammatio post abortum, aut immensam sanguinis euacuationem superuenerit, cubiti vena secanda est, ac sanguis pro virium ratione educendus; licebitque in secunda quidem, venam incidere, in tertia vero, sanguinis missionem repetere. Sed hic dubitatur (*ut etiam Donatus longiori sermone refert*) cum Galenus *De vena sectione. lib. poplitis & malleoli venam secare iubcat, vtero, renibus vel vesica affectis, etiam 13. method. meden.* Sed hoc facit, sumta indicatione a parte affecta, pro euacuatione, cum deriuatione eius, quod in parte inflammata continetur, & non pro auersione eius, quod influit. Si enim in generatione est, per contrarias partes & longissimas facit; *13. method.* & sic initio venas superiores etiam Arabes mittunt. Deinde, vbi opus est, pro deriuatione & euacuatione, a tallo. Exigua vero existente inflammatione, valentibus viribus, potissimum vbi corpus totum plenum non fuerit, & inflammatio iam facta sit, tali vena incidatur, & si opus est, eadem iteretur, re-titudinem perpetuo seruantes. A vena sectione, si eadem inflammatio cum erysipelate præsertim participet, vbi quodammodo mitior fuerit reddita (*non autem circa initia*) leui quadam purgatione uti conuenit, etiam pro deriuatione facienda; *ut cassia fistula, manna, & accharo viol. syr. ex infus. ros. pallid. diacatholico.* Deinde imo ventri ac pubi & lumbis foras, irrigationes, seu epithemata, ex iam dictis in Obseru. adhibemus. Et si erysipelatis naturam participauerit (*quod ex igneo calore percipies*) iutubum, & umbilicum Veneris, sedum, polygonum, portulacam, plantaginem, ac vitis pampinos cataplasmati cum polenta apponito: vel quopiam earundem herbarum succo, cum rosaceo, aut melino oleo, lana madefacta in sinum pudoris, *iuxta Aetium*, mittenda est: Pesssi quoque ex succis herbarum dictarum subdendi. Quod si cataplasma a locis non toleretur, aquam rosaceo admixtam, ex modicis interuallis iugiter infundimus. In exacerbationis declinatione ægra in aqua tepida vsque ad lumbos insideat. Deinde pessi imponendi ex aliquo vnguereto leuiter astringente; sicut rosaceo, melino, lentiscino, cœnanthino, adiectis ouorum vitellis crudis aut assatis, & croco; interdum ex memoratis succis addendo. Mitigata inflammatione, præter pessos in Obseruatione dictos, cucurbitulas idem Aetius affigit in lumbis; magnoque existente tumore, etiam cum scarificatione. Idem compo-

nit & pessos ad sedandos dolores inflammationum vteri, scenugræc. madefaciens, primam ac secundam aquam abiiciens, deinde vbi in tertia, quæ dulcis, puraque sit decoctio, per colum traiecit, & decocto admiscet adipem anserinum recentem, vel gallinaceum, ac permittit simul super ignitis carbonibus colliquari; postea, vbi refrigerit, concretum adipem aufert, & seruat; quem vsus tempore spatula specilli in manu subactum, pesso excipit, & supponit. Alius dolorem sedans: Papaueris capitula in passo decoquito, donec flaccescant, deinde exprimito, & decocto trāscolato medullam ceruinam liquatam admisceto; & vtere; & si medulla ceruina defuerit, vitulinam sumito. Habes apud eundem innumeros pessos valde conuenientes. Sed hic cauendum, ne in extensionibus & inflammationibus vteri menses eliciamus: magis enim loca extenduntur, & cum ob inflammationem oclusa sint, sanguinis transitum intercipiunt. Sed & tetrapharmacum ad inflammationes vtiliter imponitur, aut infunditur. Quod si inflammationi vlcus adiunctum fuerit, cerato rosaceo, ex cera alba, cum tertia anserini adipis parte confecto, albumen oui. Quantum capere poterit, instillato; & vtere. Idem & in declinatione balneum admittit. Neoterici hæc addunt, vbi calidum apostema est: Ægrotam in cubiculo frigidiusculo collocant, quietem imperant, & ut famem sustineat, parum bibat hordeaceam aquam pro siti. Inclinate morbo, vires recolligunt sensim, pullus detur in cibo, ouum forbile, atriplex, spinachium, malua. Ptisanâ iuuat, nam totam curationem complet. Imbecillioribus far hordei, aut alica dari potest, *ut diximus*; panis aqua elotus, aut subinde coctus. Interdum auiculæ conceduntur, aut pulli lactuca præparati, vel perdices cum cucurbita, vel cum seminibus frigidis, vinum cauendo; singulis diebus aluum emolliendo clystere, vel manna, vel cassia, vel zaccharo viol. si opus est purgatione. Initio quidem calidi apostematis, discutientia & refrigerantia apponuntur; etiam leuiter astringentia: talia sunt, rosa, lens demto cortice, balauitia, plantago, vitis pampini vel folia, strychnum, seris sauia, portulaca, virga pastoralis, temperuium, cucurbitæ ramenta, ac hordei farina. Insidere in aqua, cum oleo rosaceo, plurimum iuuat, & hoc emplastrum, in materia sanguinea: *In sanguineo.* Farinæ lentis excorticatæ, hordeaceæ ana ℥ij. succi plantaginis, semperuiui, strychni, virgæ pastoralis, olei rosacei, vel omphacini q. s. linteolis tam imo ventri, quam in spina imponatur. Bilioso apostemati magis frigida conueniunt; syr. viol. de endiuia, acetos. simplic. cum aqua endiuia, foliatri, acetos. & lenis purgatio ex cassia, pauco adiecto electuario de succo ros. Roborentur cum diamarg. frig. zaccharo viol. diatriumfantal. Topica sunt, qualia superius diximus conuenire erysipelati. Probatum & hoc in bilioso: Farinæ hord. ℥iiij. rament. encurbitæ. succum lactu. nymphæ, hyoscyami, pap. alb. plantaginisq; rosaceo infuso, *Phlegmatici cura.* feruifacito, & apponito. Vbi vero phlegmaticum fuerit

Cautio.

8

Calidi apostematis cura.

Astringentia topica.

Biliosi apostematis remedia.

9

Phlegmatici cura.

fuerit apostema, cubile calidiori loco constituen-
dum est priori contrario, & vigilandum est; cali-
diuscula & exsiccantia offeruntur. Materia dige-
renda cum syr. matricariae, de duabus rad. oxy-
mel. simplic. & aquis artemis. fœniculi, & simili-
bus, vel decoct. artemis. puleg. melissæ, aliisque:
prius quoque minorata materia, secundum ali-
quos, cum ðij. pil. fœtid. deinde leuiter purganda
cum elect. indo, agar. & diacathol. Et cum pri-
mum ortum fuerit, componatur cataplasma; vt
farinæ lentium, & f. baceæ, ac ciceris ana ʒij. ma-
stich. aloes, mannæ thuris farinæ fœnugræc. flor.
chamæmeli ana ʒß. cum oleo chamæmel. absin-
thino, rosac. componantur. Si sit melancholicum
durum, in humecto loco locanda est ægra: som-
nus hic iuuare creditur. Humor melâcholicus &
atra bilis, digerenda cū boragin. meliss. chamæd.
chamæpit. & bugloss. decoct. & syrup. de epith. be-
ragin. viol. & purganda cum sena, epithymo, dia-
cathol. Cui & emollientia ac pariter dissoluen-
tia quam cito sit possibile, imponenda sunt, nec
differenda: vt ex farina hordeacea, lini, ex meli-
loti decocto, addita supa, & oui luteo tosto, & per
interualla iuuant infusiones in meliloti decocto,
cum lini semine, ac althæa vel malux floribus vel
semine. Prod. st. & per se cœsypum subdere, vel cū
anatio adipe, cum croco, & meliloti seminis fa-
rina. At cum sanguineum increscit apostema, su-
periori emplastro, quod initio apponitur, fœnu-
gæcum, melilotum, & chamæmelum adicito: ac
frequentius in eo decocto insidere, iuuat, in quo
plantago, lens demto co. tice, ac rosa cum malua,
& althæa decocta sint. In bilioso vero eadem mal-
ua, & althæa, semperuiuum, lactuca, nymphæa,
viola, cum meliloti imponi debent. Infunditur
subinde violaceum, ac gallinaceus ad ps. In phle-
gmatico item calamum arom. adici opus est, ac
myrrham. Ex atra bile, galbanum addi potest. In
statu pariter sanguinei abscessus, artemisia ac ca-
laminus arom. admiscetur: in bilioso lini semen: in
phlegmatico, palmulæ medenur, cayca, men-
thastrum, & calamintha. In melancholico demū
quæ valde emolliunt ac dissolunt, imponenda
sunt. Inclinate apostemate, & mitigato dolore, e
chamæmelo, meliloti, althæa, & semine lini, cum
oleo violaceo, ac cera, cataplasmata conficies, &
in vterum violaceum luteum infundito, ac lili-
num: tum enim quæ maxime dissolunt, impe-
ni debent, sicuti si symbrii succus, ac maiorana, &
foliorum tenerrimorum lauri. Aliqui ea dam-
nauere, veluti nimium excafacientia, sed bury-
rum, adipem anatinum, cerui namque me. ul-
lam commisceri volunt, ne qua apostematis pars
lapidescat. Inclinate bilioso, althæam, maluam,
melilotum, lini semen, ac chamæmelinum ad-
diciunt. In phlegmatico, decocto menthastr. &
calaminthæ insidere, iuuat addita ruta, roremari-
no, maiorana, & lauri foliis. Sed & limum per
se valere, creditur. Imponitur & emplastrum ex
erui, lupinorumque farina. cum oleo nardino,
rutaceo: imponunt aliqui linteolum aqua arden-
tim dens. At illud cum cautione faciendum, pe-

to. Inclinate melancholico, oportet magis e-
mollire, quam dissoluere, donec ex toto tumor
discutiat. Ego commode in iis vtor emplastro
de mucilagibus, & nostro de ammoniaco di-
cto.

OBSERVATIO XLIV.

De apostemate vteri frigido in abscessum trans-
mutato.

A Gatha Petri, filia illius Petri Aromatarii Ha-
gani, istis diebus nuper nupta pistori cuidam
Delphis, in insigni capitis aurei commoranti, an-
no 1569. 26. die Octobris, incidit primo in vteri
suffocationem grauem, cum conuulsione & mo-
to epileptico, vt & caput simul conuelleretur,
adco vehementer, vti ad sellam, in qua sedebat, id-
ipsum illideret: Erat enim adeo fortis paro-
xysmus, vt vix humerum & caput magna violen-
tia continere cogeretur. Aderant & duæ mulie-
res, quæ manus detinebant: nam & digitos atque
pollicem in manum contrahebat, vt vix in re-
ctum deduci possent. Tertia quoque mulier asta-
bat, quæ ventrem vi comprimebat: adeo enim
vterus sursum rapiebatur, vt pene suffocaretur.
Durabat autem hic paroxysmus adeo atrox circi-
ter quinque aut plures horas, quibus per remedia
abstantibus & mulierib. adhibita, a paroxysmo
excitari aut subleuari non potuit. Tandem sub
noctem ad eam accitus sum. Eo tempore, ad di-
uersionem, crura fricabam fortiter, & ligaturas
adhibui circa coxas vehementiores, & simul em-
plastrum sequens vmbilico apponi, iussi: ʒ. em-
plastrum contra matricem ʒß. ducatur supra alutam
rotundam, paulo ampliorem daleo, & in circui-
tu obducatur galbano. Nodulum in se comple-
ctentem assam fœtidam naribus pro odoratu ob-
iiciebam. Sed nondum in toto a paroxysmo ex-
citabatur, quamuis leuius ferebat, subinde scili-
cet per internalla redeunte, non tamen ita acri-
ter, vt prius. Tandem rutam manibus confrica-
tam, naribus, vt continuo olfaceret. obieci, & a
paroxysmo plane liberata est. Verum altero die,
cum tempus ventosum esset, nimium cito sese
acri committens, domo exeundo, in maximum
dolorem vteri incidit; atq; 28. die merurus reuo-
carunt. Mulieres astantes inculabant, emplastrum
nimis di. fuisse retentum supra vmbilicum: cum
potius ex aere frigido spiritum flatulentum con-
cepisset. Dolore magis increscēte, per totum ven-
trem inferiorem, & potissimum circa pectinem
& pubem, cum tumore apparente, cepi ego me-
tuere de apostemate vteroso, vel potius phlegma-
tico & frigido in muliere admodum pituitosa, al-
ba, & pingui. Sed cum aluum non deponeret, vt
glans sequens subderetur, mando: ʒ. pul. hiera pi-
cræ ʒj. salis parum, pulu. cumini ʒß. mellis q. s. fiat
glans sensu ppositum. Antequam imponeretur,
emplastrum ab vmbilico detraximus: nihilomi-
nus dolor, quem ex emplastro male originem ha-
buisse dixerant, æque persistebat, neque villo mo-
do mitigabatur: nec imo ventre etiam inun-
cto hoc oleo: ʒ. olei lini, de meliloti, chamæmel.

Melancholi-
co apostema-
ti quæ con-
ueniunt.

In augmento
quæ conue-
niunt in apo-
stemate san-
guineo.

In augmento
apostematis
biliosi, phle-
gmatici, &
atrabilis.

In declinati-
one.
In sangui-
neo.

Bilioso.

Phlegmatico.

anethini ana \mathfrak{z} β . miſce. Ex ſuppoſitorio ſquibalaſ
tantum duras reiecit. Clyſterem libenter inieciſſe
ſem (quod melius fuſſet) ſed non admittens potio
nem ſequentem ebibit: \mathfrak{L} *artemiſia*, flor. *chama*
meli, ana \mathfrak{p} j. ſeminis *ſonicali*, carui, ana \mathfrak{z} j. β . folior.
ſena a ſt. *pruhis* reping. \mathfrak{z} ij. *unar. paſſil.* ab acinis re
purgatarum \mathfrak{z} β . fiat decoct. in aqua communi q. ſ. cu
ius expreſſionis accipe \mathfrak{z} ij. in aqua diſſolue elect. leni
tini \mathfrak{z} vj. *diacatholici* \mathfrak{z} ij. miſce. qua ter alium de
poſuit, nec dolor tamē ſedatus eſt. Adhibui hunc
ſacculum: \mathfrak{L} *herbar. ſicc. matricaria*, *artemiſia* ana
 \mathfrak{m} j. *pulegi* ſi. ci, *abſinthij*, *calaminth. ruta*, *meliffa*. o
mnium *herbarum exſiccac.* ana \mathfrak{m} . β . ſeminis *anifi*,
carui, ana \mathfrak{z} j. *florum chamameli*, *meliloti*, ana \mathfrak{m} . j.
incidenda incidantur, & contundenda cōiundantur,
& miſceantur in lintecolo puro quadrato, & fiat ſaccu
lus interſuſus ſecundum artem; & calide venter ap
ponebatur. Dicebat, ſimili ſacculo ſe aliquando
curatam fuiſſe, cum ſimilem dolorem paſſa eſſet.
Sed dolor ex ſacculo mitior factus non eſt. Die
ſequenti, qui erat 29. Octobris, Haganus Medi
cus, me iunior accitus fuit, qui eandem alias præ
manibus habuerat: is ſolam inflationem vteri eſſe
putabat ex præfocatione præcedente. Ego tamen
verebar, ſimul cum ventofitate apoſtema ad eſſe
ex frigida materia pituitoſa, & quod facile abſceſ
ſus fieret, cum tumor appareret cum quadam du
ritie circa vnā partem vteri magis, & e regione
illius partis etiam coxa doleret, præcipue cum illa
non iuiſſent, quæ ad vteri inflationem valent,
magis de abſceſſu timebam: & ideo potius ad ma
iora emollientia, (cum durities cum tumore ma
gis ad eſſet, non ſine febre, licet exigua & lenta)
deueniendum eſſe propoſui. Ille vero vrgebat, vt
emplaftrum de baccis lauri toto venter appone
retur, ad flatuſ diſcutiendos: ego autem eius cali
ditatem metuebam, ob febrem, licet lentam. Ve
rum ægra illud emplaftrum eſſe apponendum an
nuebat cum & ipſa ventofitates eſſe diceret. Hæc
igitur præſcripta ſunt: \mathfrak{L} *pul. Leonelli contra ma*
tricem deſcripti Oſeru. 33. huius libri, \mathfrak{d} iij. *pul. rad.*
paonia. (ob motus epilepticos, qui præceſſerant)
& *ſeminis paonia*, ana \mathfrak{d} β . miſce. fiat *pul.* pro duobus
doſibus; & vna ſtatim fuit exhibitus cum aqua flor.
chamameli & *artemiſia* ana \mathfrak{z} j. β . & emplaftrum de
baccis lauri ſupra alutam toti venter appoſitum fuit.
Trigeſimo Octobris, cum hic Medicus non am
plius rediret, ac dolor ſemper in peius vergeret,
magis timebam adhuc abſceſſum, cum perfecte
ſentirem duritiem quandam vteri, eoque magis
cum difficulter tandem lotium redderet: & cum
ſuffocatione vteri prius laboraſſet, matri clam
conſilium dederam, vt marito diceret, vt cum
illa concumberet, ne vteri ſuffocatio rediret. Ve
rum cum ipſa coitum ferre non poſſet, vti mater
poſtea mihi narrauit, maiorem ſuſpicionem ha
bui de vteri apoſtemate frigido; at, dolore ita
perſeuerante, quod facile ad abſceſſum tende
rer. Quare, emplafthro de baccis lauri admoto,
vt talis inunctio fieret, præcepi: \mathfrak{L} *muccilagin.*
althææ extraclæ cum aqua *malua* \mathfrak{z} j. *pingued. anatis*,
gallina, *viſuli*, ana \mathfrak{z} β . *ammoniaci* in aceto diſſolu

ti \mathfrak{z} ij. adiectis oleis ſupraſcriptis, adie. & atq; cera
exigua, fiat linimentum. Et, poſt inunctionem,
hoc ſequens cataplaſma infimo venter applice
tur: \mathfrak{L} *rad. althææ mundata* \mathfrak{z} ij. *foliorum malua*,
parietaria, *florum chamameli*, *meliloti*, *artemiſia*, ana
 \mathfrak{m} j. *cheruſilij* (vt & melius lotium redderet) \mathfrak{m} . j.
coquantur in aqua ad mollitudinem. piſtentur; adde
farina ſeminis lini, fabarum, ana \mathfrak{z} β *ſurfuris ſubti*
liſſime triti & cribrati \mathfrak{z} β . cum butyro recenti, oleo
amygdal. dulc. liliaceo, *chamamel.* ana q. ſ. fiat cata
plaſma; quo & dolor nonnihil mitigabatur. In
terea cum ventrem non deponeret, hoc decocto
utebatur: \mathfrak{L} *artemiſia*, *matricaria*, *meliffa*, ana
 \mathfrak{m} . j. *florum hyperic. chamameli*, ana \mathfrak{m} . β . *parietar.*
malua, *viol.* ana \mathfrak{m} . j. *ſeminis dauci*, *carui*, *cumini*,
ana \mathfrak{z} j. β . *ſeminis paſtinaca*, *agni caſti*, (quia ade
rant ſimul ventofitates) ana \mathfrak{z} β . *foliorum ſena* \mathfrak{z}
vij. agarici ſeminini albi lenis \mathfrak{z} ij. *zenzib. albi* \mathfrak{d} j. co
quantur in aqua *artemiſia*, *chamameli*, q. ſ. pro \mathfrak{z} xij.
fortiſſ. expreſſ. adde ſyrup. de *artemiſ.* \mathfrak{z} ij. ſyr. de *cala*
mintha \mathfrak{z} j. miſce pro tribus doſibus matutinis. quo
decocto modo quinquies, modo ſexies aliū de
iiciebat. Hoc tamen apozema non conuenit in
apoſtemate calido, nec in principio in frigido: ſed
quia minus dolebat, & venter valde ſtrictus eſſet
cum ventofitate, & cum clyſteres nō admitteret,
id præſcripti. Multas inde ventofitates ſimul cum
ſtercore reiciebat: & quia iam malū proceſſerat,
minus hæc purgatio nocumēti inferebat. Imo
ex ea ſe leuari quoq; dicebat. Cataplaſma autem
continuo apponebatur: & quia tumor mollior
fiebat, paulatim fiebat maturatio apoſtematis,
adiectis adhuc ficubus, & vno atque altero capite
liliorum cum oleo liliaceo. Id vero percepimus
ex ſedatione doloris. Tandem itaq; nono die ab
ſceſſus intus ruptus eſt, & effluxit ſanies copioſa
alba, & ab omni dolore liberata eſt. Eo tempore,
emplafthro amoto, oleo amygd. dul. inunximus; &
antequam rumperetur, lanam ſuccidā cum me
dulla ceruina & butyro recenti, vt in vuluam im
ponerent, iuiſſimus. Verum poſt eruptionem, ſa
nie copioſe effluente, iuiſſimus, vt decoctum hor
dei communis & cicerum rub. & glycyrr. biberet,
ad vlceris repurgationem, etiam adiecto melle
roſ. collumq; vteri, vt eo lauaret. Mox vlcere per
ſe consolidato conualuit.

S C H O L I A.

PRæter veterum remedia ad emolliendam vteri
duritiem facientia, Recentiores emplaftrum
laudant, quo abſceſſus maturantur: habet *farina*
tritici ariſt. *althææ* ana \mathfrak{z} ij. *farina ſcænuigr. ſeminis li*
ni ana \mathfrak{z} j. *palmularum caryearum*, *rad. liliorum ac*
paſſularum q. ſ. decocto ferueſiant: addatur item o
leum *lilinum*, *carthaminum* cum *gallinaceo* ac *anatis*
adipe. Decoctum *althææ* ac *malua*, *meliloti*, *ſcænuigr.*
cum *acantho*, inſidentibus medetur. Vbi igitur in
flammatio non poteſt diſcuti, ſed ad ſuppurationem
vergat, ſuppurationi auxilium prædictis
emplaftris ac inſeſſionibus ferendum eſt; cata
plaſmati imo venter, ac lumbis impoſitis ex lini
ſemine, ſcænuigræ. *farina hordei*, *carycis* deco
ctis, *althææ rad.* ac *tere binthina*: quo etiam tem
pore

Quomodo
apoſtemata
vulua ma
turantur.

pore pudendi sinus per spongiā affidue fouea-
tur, & vapores per arundinem operculo ollæ per-
forato, inserta intra pudendum recipantur.
Demum infusiones frequentes fiant decoctis in
aqua his, quæ vim attractoriam habent; velut est
pulegium, marrubium, laurus, salua, artemisia,
dictamnium, centaureum. Maturant caryæ, lili
radix, cum fimo columbino. Item, pessuli indan-
tur ex terebinthina, myrrha, cæylo, asferis pin-
guedine, & butyro compositi: aliquando etiam
columbinum stercus, cum oleo & melle. pro ca-
taplasmate, adhibebimus, vt ruptio fiat. Interca
ad ruptionem facit gressus aduersus scalas, aut
rheda vehi, vel equo, vel saltus, vel manu compri-
mere: eo enim modo sæpe pus erumpit. Si vero
abscessus in conspectu fuerit, ficu, sinapi, ac co-
lumbino fimo facile rumpitur, nec ferramento
opus est: si versus vesicam vulua suppurare vide-
tur, quæ modice vrinam cient, danda sunt, vt est
semen melopeponis, cucurbitæ, & cucumeris.
Disrupto autem abscessu, quibus medicamentis
deinceps vtendum sit, mox de vlcerebus vteri cu-
randis dicemus. Si versus vesicam erumpit, lau-
dant decocta melopeponis, & psillii cum tragac.
& zaccar. & succum glycyrrhizæ. Si versus al-
uum, ius lenti decorticate decoctæ, cum ros. ac
balauistiis, oryza, & similibus infusum. Si sanies
exeat, carnis recentis loturæ similis, & grauis o-
doris, infundunt decocta astringentia. Quidam
proinus rupto pure, mulla colluunt frequenter.
Mox vomitum persanamus trochisc. qui ex suc-
cino fiunt, si in potu sumantur. Colluere iuuat
sero caprino, ac melle despumato. Repurgato
vomitæ sinu, infundenda sunt, quæ vlcera persan-
ant; de quibus mox dicemus. At si non in abs-
cessum ac suppurationem inflammatio aut apo-
stema transeat, sed ad duritiem vergat, emollien-
tibus pugnandum medicamentis, tum intus, tum
extra adhibitis; quorum syluam reperies locis de
scirrho cum lienis, tum iocinoris, & quæ nunc
adferemus, de vteri scirrho.

OBSERVATIO XLV.

De vteri scirrho.

VTerus, inquit Aetius l. 16. cap. 86. ex Sorano,
interdum quidem nullo prius indicante signo, re-
pente induratur. Ita & Paulus lib. 3. cap. 68. Scirrhum
contrahit vulua, alias repente, vt nulla causa euident
præcesserit. Id euenit mulieri Delphensi, de qua
nunc agemus. Plerumque tamen, iuxta eosdem,
præcedente inflammatione, quæ neque discussa
fuerit, nec in abscessum mutata. Ita aliquando
& male curatas inflammationes sequitur, vel in-
tempestiuum repellentium vsus, vel constri-
gentium in principio, vel in fine fortioribus re-
mediis discutiendo quod tenue est, & quod cras-
sum, siccando. In hac itaque muliere durus tu-
mor aderat sine febre, & tactui renitebatur; nul-
lus, aut obscurus aderat dolor; si stare, graue pō-
dus (quod in aliis tumoribus obtingit) quasi prola-
psurum incumbere in pudenda: vbi vero sede-
ret, aut decumberet, sua grauitate intestinum re-
ctum premebat: incessus aliquo modo difficilis

erat, & segnities totius corporis aderat, non ta-
men eius magnitudinis deuenerat, vt totum vte-
rum deprehenderet. Erat hæc mulier melanco-
lica & subfusca; ita, vt ex humore crasso & terre-
no, paulatim vteri substantiam occupante, sine
inflammatione præcedente initium sumferat. Cum
hæc robusta esset, & subnigriuscula, & venas satis
latas haberet, cumq; non ita diu hoc malo labo-
rasset, ex vena lienari (nam in sinistra parte vteri
tumor durior erat) sanguis vt extraheretur, man-
daui, iuxta Aetium, qui in principio, si nihil pro-
hibeat, neq; ætas, aut vires repugnauerint, medio-
crem sanguinis copiam a cubiti vena auferre iu-
bet. Idem & Paulus facit: atq; vterq; purget ma-
teriam crassiorem cum hiera Archigenis. Ego prius
exhibui syr. ex infus. ros. pallid. cum foliis senæ, ad electo
pau. illo elect. de hiera. Deinde apposui emplastrum
de mucilagin. & de meliloto, postea & emplastrum
nostrum de ammoniac. prius inuncto hoc vel si-
mili linimento: *℞ mucilagin. semin. lini, fenugrac. altheæ, malua ana ʒ v. succi cireos ʒ ij. pinguedin. anatis, gallinae, asferis ana ʒ vj. olei cheirini ʒ j. ʒ. bulliant ad confumationem succorum deinde adde croci ʒ ʒ. cum cera fiat unguent.* Commendatur a
Nicolo. his remediis hæc optime habuit. Hoc
quoque emplastrum sequens pro nobili Abba-
tissa de Toorn, pro vteri duritie descriptum est:
*℞ galbani electi in aceto dissoluti ʒ j. bellia mollis ʒ j. subalbi ʒ ij. pulueris masticaræ ʒ j. ʒ. myrrhe ʒ ʒ. Vbi dissolacendum dissolutum fuerit & colatum, addantur reliqua puluerisata, & fiat emplastrum, seu ceratum, formæ sphaericæ, latitudine sex digitorum. Valet & infusus ex scœnugræco, ficibus coctis in aqua hordei: deinde eadem quoq; ap-
posita profuit.*

SCHOLIA.

Quamuis Benedictus Veronensis, Medicus do-
ctissimus, de callo & duritie vuluæ ex Ægine-
ta, sub vno nomine tractet; callus tamen a duri-
tie, seu scirrho, differt, ex Moschione, quod cal-
lus in totum nihil sentiat; in duritie exiguus est
sensus: & ita scirrhus vix sentiens, est durities.

Scirrhum enim ex Galeno nominamus, tum o-
rem durum, qui sine dolore est, non tamē omni-
no sine sensu. Scirrhus exquisitus est tumor præ-
ternaturam, sensu priuatus, durusque: non ex-
quisitus, qui non sit omnino insensibilis, quamuis
valde difficulter sentiat. At callus maiorem duri-
tiem habet, quam scirrhus. Fiant certe diuersi
tumores in vtero. Tumet quidam inflatione, de
quæ ante dictum est: sed impulsu digitorum so-
nitus tympani modo redditur, tumorque pubis
& imi ventris comitatur cum dolore pulsati; a-
liter quoque hic tumor curatur, quam scirrhus.
Tumet etiam vterus hydropelaborans. vt capite
octagesimo primo, libri decimi sexti apud Aetium
constat: quem affectum sequuntur, tumor am-
plus, laxis, flatuosus, gurgulationes, tanquam
intestinatorum, in ambulando grauitas, & anbeli-
tus difficultas, alui foetida excretio, mensuo-
rum & conceptuum detentio, & quæ deferun-
tur, nullo seruato ordine exsereta: vbi vero

Callus dif-
fert a scir-
rho.

Libr. 14. de
morb. cur. 6.
2. Ad Glau-
con.

Tumores di-
uersi quomo-
do a scirrho
vteri distin-
guantur.

Inflatio
vteri.

Vteri hy-
drops.

4 violenter excernuntur, fractis interdum parvis corpusculis, quæ vesicæ assimilantur, v. scida quædam aquosaque erumpunt. Ita & Fernellius: *Tumet & nonnunquam, uterius aquarum copia; quæ cerie hydrops est vterinus.* Inflationis signa adsunt; sed grauitas maior, & sonus quasi fluctuantis aquæ. Huius, quemadmodum & ascitæ efficiens causa est, iecoris aut lienis vitium: aqua tamen ex abdominis capacitatem, cæcam & inusitatam viam sibi parat in vterum. Interdum etiam vena cava solum sanguinis serum eodem instillat. *Mulier quædam, hoc hydropo correpta, quoties appetebat, menstrua purgatio omnem aquarum colluuiem, ex utero per cernicem profundeabat, peluesque 6. aut 8. implebat aqua citrina feruentissima, dum venter totus subideret. Mox deinde menses insequerantur ex natura præscripto. Collecta proximo mense par colluuii os, etate dein tempore profluebat. Hac tandem persanata uterum gestauit, peperitq; bene vitalem foetum.*

5 Tales autem Aet. curat, decubitu, quiete, vomitu, & validis collutionibus ac pessis; *ut apud eundem ad longum videre licet.* Post aquarum educationem, exercitiis, sudoris prouocantibus validisq; frictionib; totius corporis, sed præcipue suminis vtendum iubet. Sed & vteri oedema tumor quoq; consequitur in pallido candidus, subluxus, tactu mollis; digitorum pressioni cedens, seq; rursus paulatim attrollens, cutisq; alui manu apprehensa, facile attrahitur. Loca igitur oleo communi calido, aut irino, aut lignostrino irriganda, Aetius iubet; pessisq; vtendū ait, ac reliquis præsiidiis, *quæ superius diximus de spiritu in utero collecto, seu vteri inflatione.* Huius curationem etiam vide apud Fontanonum *De morb. interiorib; cap. 27. De oedematis vteri curatione.* Ab omnibus his tumoribus iam dictis differt scirrhus. At scirrhorū genere comprehenditur, *iuxta Paulum*, etiam durities, quam

Saleroma. οκλήρωμα Græci vocant, circa vuluæ ceruicem portissimum obueniens. Aetius appellat scirrhomā. Habet autem similem tumorem, sed tactui renitentem, & moderate affligentem. Plurimumque, *inquit*, in vteri ceruice scirrhomata eueniunt, quæ immixtis digitis percipi possunt, ac plerumq; vuluæ collum versus scirrhomā auertitur. Vbi vero scirrhus vteri fundum inuaserit, tumor vehemens, & tactui renitens occurrit, grauitatem, motionesque difficiles non tantum crurum (*ut diximus*) sed totius corporis, & segnitiam ad omnes vitæ functiones afferens. Causas iam diximus. Fit enim ex humore lento, crasso vteris infixio, & statim in principio congregatus paulatim, & augetur: crebrius vero medicorum imperitia paratur, quum vehementer erysipelata & inflammationes adstringunt, & infrigidant, & si quis medicamenta vehementer dissolutiua adhibeat: in summa, in vtero repente fit ex humoribus iam dictis, vel inflammatione præcedente, & male curata.

6 *Causa.* Cum autem duplicem esse diximus scirrhum, verus & exquisitus, sine sensu, incurabilis est: at alter, cum aliquo sensu, curari potest, sed ægre. In vtero vero diutius si perseveret, deprauat corporis habitus, & decoloratio subsequuntur, interdum &

moles aquosa. Iuxta Auicennam, in interiore spatio vteri, incurabilis est; in vteri ore, aut ceruice nec omnino sensus expers, curari potest. Ita & Aetius: *Quacumq; scirrhomata circa os & collum vuluæ constiterint, facile curantur: quæ vero circa fundum, difficiliter.* Accidit insuper & non recte tractatis habitus aquosus. Nam Rhaf. 9. Continent. Apostema durum & non cancerosum (*hoc dixit, quia facile scirrhus in cancerum transit*) si diutius prolongetur, inflantur pedes, & extenuantur tibie, & cessabunt menstrua. Et Add. Auic. Magnificatur venter, & subsequitur aliquando verus hydrops: ideo scirrhus vteri cum magna diligentia curandus est. Curatur autem in principio, si vires admittunt, *iuxta Paulum & Aetium*, vena secta, vt diximus Observatione præcedenti, & purgatione ex hiera Archig. Valente ea, quæ de apostemate melancholico diximus; purgatio ex epithymo, lena, conf. ct. hamech. Habes apud Aetium inleffus plurimos, pessos varios emollientes, & cerata, fofus, emplasta. Vtitur inleffionibus e foenugrac. sem. lini, pulegii, artemis. & foliorum cucumeris agrestis, decoctis. Vterum colluit fusino oleo, narcissino, irino, gleuciano, adipe anserino, gallinaceo, porcino recenti, alicui vnguento admixto lacte bubulo aut caprino, cum anserino adipe. Cataplasma sumini illinit e carycis, hyssopo, nitro, absinthio; cucurbitulasque cum scarificatione affigit; & postea vtitur medicamento polyarchio, emplastro diachylo, cum oleo fusino, pessisque mollitoriis. Atque horum copiam apud eundem inuenies lib. 10. cap. 86. *De scirrho ac scirrhomate, ex Sorano.* Verum licet scirrhus etiam præscriptis medicamentis, pro declinatione inflammationis, curari possit; tamen cum sine febre fit, possumus & vti fortioribus ad partem emolliendam; quale illud est a Rondeletio descriptum: *℞. radic. lilii. bis malu. cucumer. agrestis ana gr. j. artemisia. vel nepeta tertiam partem m. j. ficuum paria xx. semin. lini, foenugrac. ana ʒ ij. florum chamemeli, viol. meliloti ana p. j. fiat decoct. in aqua & oleo dulci.* Ex decocto foueatur regio vteri. Ex residua pista & transmissa fiat cataplasma, quod applicetur supra partem post fotum. Deinde vtatur sequenti vnguento: *℞. butyri recentis, axung. porc. ana ʒ ij. pingued. gallinae, anatis, anseris ana ʒ j. ℞. olei amygdal. dulc. & olei liliorum ana ʒ ij. mucilag. sem. foenugrac. extract. cum vino albo ʒ j. terebinth. cera q. s. quo vtatur post usum fotus.* Et post vsum istius vng. rursus redeat ad fotum, & iterum ad vnguentum. Similibus præsiidiis aliquando vsus sum commode, in vidua quadam Alcmariana, in qua durities maior erat, quam in muliere præcedenti, ita, quod totum fere vterum occupauerat. Sequens quoque valde vtile est: *℞. oppopan. bdellii. ammon. ana ʒ j. styracis, myrrha ana ʒ ℞. propoloes vera ʒ j. radic. iridis ʒ j. croci ʒ ℞. dissoluantur lacryma in oleo lilior. & amygdal. & vino malaatico, & depurentur: quibus adde parum terebinth. & cera fiat vnguentum.* Emplastra, diachylon, vt diximus, ex gummis & ireatum, partem illam indurata molliunt.

Huius

7
Curatio.

8

Huius partis emolliationem plurimum iuuat *fusus ex eadem decoct. vel oleorum de lilio, amygdal. de myrrha, de styrace.* Hæc enim partem contingunt. Vtilissimum etiam est illis, encathismate vti ex decocto fofus præscripti, & diutius in illo sedere. Iniectio etiam clysterum emollientium, & relaxantium ex ole. plurimum conferet. In declinatione herbæ digerentes poni debent in encathismate maiore quantitate; quales sunt, *nepita, pulegium verumque, artemis. calaminth. flor. anthos stæchad. sambuci*: quia hæc herbæ decoctæ in multa aqua minus siccant, & digerunt sufficienter. Radices cucumeris agrest. & bryon. in eodem encathis. addi possunt. Scirrhus enim fita materia congelata; quam ob causam medicamenta calida, & dissoluentia sunt ex vsu, permixtis quibusdam humidis, malacticis, ne id quod tenue est, discutatur, & crassum remaneat. Radix mandragoræ in vino & oleo amygd. & axung. porci decocta & contrusa partes induratas emollit; maxime si pauca quantitas oppopan. cum ea misceatur.

OBSERVATIO XLVI.

De vteri cancro vlcerato & lethali.

Mulier Alemariana vuluam carcinomate adeo corrosam habebat, vt particulatim excideret: quam cum Chirurgus tractaret, & nos ad eam acciti essemus, licet longo tempore palliatione vsa fuisset, malum lethale esse pronuntiaui-
mus: quæ quidem cum magna fœditate & dolore aliquandiu vitam protrahens, tandem misere obiit. Venit mihi tunc in mentem casus ille, quem aliquando, Bononiæ in Italia existens, vna cum præceptoribus ægotantes inuisendo, vidi in muliere, quæ cancerum in vtero habebat etiam vlcera-
tum. Conuocatis Medicis eo tempore illustribus, vt Elideo præceptore meo & Luca Chini, & Passino, facta est consultatio: concluderunt, mulierem morituram, ad tempus tamen vtentes palliatione. Et illa cum magna miseria, vt hæc nostra agra, tandem obiit. Longo tempore his duabus præcesserat scirrhus, qui facile in cancerum vertitur. Causam adfert Rondeletius: Nam in partibus, quæ scirrhum patiuntur, si materia vratur, in cancerum vertitur scirrhus, ob materiæ similitudinem. Fiunt enim isti duo affectus a materia melancholica, cancer ab adusta, scirrhus a crassa frigida nondum adusta, & a pituita crassa. Cognoscimus scirrhum mutatum in cancerum, si cum prius esset sine dolore, ob materiæ frigiditatem siccitatemque; dolorem iam sentiat, ob caliditatem & humoris acrimoniam facientis cancerum. Sentitur durities in vtero, qualis erat in scirrho, & cirra magnam vteri molem. Est autem cancer duplex; vlceratus & non vlceratus. Vterque incurabilis est, quia abscindi non potest. Cum incipit negligitur, quia magnam molestiam non adfert, quo tempore posset prohiberi incrementum medicamentis, & optima victus ratione. Satis a nobis fit, si prohibeamus vlcerationem, & vlcerati incrementum. Verum cum istæ duæ mulieres primum neglexissent curationem, non ma-

gnificantes malum, nec Medicos in principio vocantes, vbi eo malignitas progressa est, vt cancer vlceratus accesserit, etiam ipsa palliatio non admodum diu vitam conseruare potuit, quanquam ad menses aliquot protraxerit. Vera enim curatio hic locum non habebat (vt in Scholio latius dicturi sumus) & si blandiendo caueatur ne vlciterius procedat vlceratio, & vita prolongetur, tamen moriuntur: cum vera curatio consistat in vrendo & abscindendo, quod hic fieri non potest.

SCHOLIA.

Cancrorum vulua alii, inquit Paulus lib. 3. cap. 67. cum exulceratione, alii citra vlcus inuadunt. Sic
& Aetius lib. 16. cap. 96. De cancri vteri, ex Archigene: *Quidam cancroforum tumorum vlcerati, quidam non vlcerati sunt*; quemadmodum in loco de mammillis prædiximus. Non vlceratus magna ex parte, vt Rondeletius censet, fit in corpore vteri; vlceratus in collo vel in orificio interiori. Causas iam diximus; cum fiant ex humore atrabilario, qui intus vi caloris efferatur & exande-
scit. Et ita ex atra bile oritur, vt Galenus lib. De diff. morb. ex se etiam, vt dictum est, vel a scirrho. Hoc si non vlceratum est, moles pondere grauis percipitur, tumorque durus colore subliuido. *Cancri ergo non vlcerati* (inquit Aetius) *huiusmodi notis indicantur: tumor induratus circa os vteri inuenitur tactui resistens inæqualis, crepidinosus, colore fœculentus, ruber, subliuidus, vehementes dolores inferens, vsque ad inguina, lumen, pectinem, & lumbos, progredientes, manuumque attritione, & medicamentorum varietate excitatur.* Eadem habet & Paulus. Exulceratum vero carcinoma, vt nominis, malignum est, ita præter ceteras notas, labra habet prætumida & dura, atque ex concreta illuue sordida, & limida: sanie quoque id manat graueolente tenue, & nigra, vel etiam fulua. In exulcerato, inquit Paulus, præter dolores, durities tumoremque, *vlcera erosa ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte sordida, labris prætumidis, albicantia, concreta, colluue humorum ingrata.* Eadem fere habet & Aetius. Erosæ enim sunt aut defossæ inæqualesque vlceratæ partes: per speculi artificium percipiuntur, quarum pleræque sordidæ sunt, crepidinosæ, albescentes, præter vehementiam doloris, tumorem & duritiem: quibus si medicamenta repurgando idonea applicentur, antiqua quædam fœculenta, rubra, sanguinolenta, deferuntur. Ab vlcere autem sanies tenuis aquosa, nigra, ignea & fœtida iugiter excernitur. Loca enim muliebria ad defluxum nata sunt peculiariter. Reliquas notas quæ vterum affectum sequi solent, paulo supra de inflammatione recensuimus. Eadem & Paulus adiungit. Ab inflammatione tamen hic affectus seiungitur, quod diuturnus sit, dolorque minus lancinans, & febris non perinde ardens. A scirrho, quod calore doloreque fatiget. Malum id, vt Aetius simul ac Paulus referunt, teste Hippocrate, insanabile est; abscindi enim non potest. Cancros enim occultos, at potissimum confirmatos, aut vlceratos, melius est
NNn

3

Ulceratus.
Non vlceratus.

Causa.

Nota non vlc-
rati.

4
Signa vlcera-
ti.

Differentia ab
inflammatione
& scirrho.

Coratio seu po-
tius palliatio

non curare: quia in quibus non curantur, diutius
viviunt: ut Galen. in Comment. 38. lib. 6. aph. Lenire
tamen possemus iuxta Paulum & Aetium, in fessi-
bus ex fœnugræe, malua, ac cataplasmatibus simili-
bus, quæ & leniunt solanturque in accessionibus,
ex malua aut althæa in mulsâ liquefacta, & rosaceo
paulum leuigata illitaque: vel ex carycis seu ficis
siccis, meliloto, ruta, thure, bunia de herba dili-
genter cum oleo contusa: vel ex palmulis in passo
coctis, quibus adiecta sint ouorum lutea, polenta-
que. Idem possunt pap. capitula trita & cribrata
cum polygoni, vel seridis, vel coriandri succo: vel
solani tenera folia cum lacte muliebri apposita:
vel solanum in rosaceo cerato exceptum. Hæc in
doloribus vsui sunt. Deinde ceratum iniiciatur
cum rosaceo aut myrteo, cum palmulis in passo
decoctis. Priuatim maleficis vlceribus conuenit
(teste Aetio) quod e fæce in cortinis ahenis balneo-
rum calidam continentibus inuenta conficitur.
Ea enim fæx sub prunis, quousque ignescat occu-
litur, deinde teritur & in rosaceum ceratum assu-
mitur. Hæc igitur extra sinum ad vteri orificium
apponitur; in ipsum vero sinum muliebri aut asi-
ninum lac, aut plantag. succus leuiter tepefactus,
præcipue si ab vlcere sanguis erūpat, vel polygoni
succus cum modico thure infunditur. Medica-
mentum ex cancris tribus vel quinque (impares
enim esse volunt) sub prunis vltis cum oleo ligu-
strino tritis, cum penna illinitis. Reliqua vide apud
Aet. & Paulum.

OBSERVATIO XLVII.

De Cancro vteri.

Adrina Nicolai, mulier annorum 50. proles
octo numero habens, multis mensibus Del-
phis decumbebat. Primo inciderat in longum &
diurnum menstruum profluuium rubrum;
deinde etiam in album, seu muliebrem fluorem:
quibus tandem & hæc symptomata accesserunt:
Dolores circa inguina & coxam adeo atroces, ut
multis deinde diebus neque dormire neque in-
ambulare potuerit. Hæc autem quatuor mensibus
continuis alterius Medici opera vsa fuerat, qui o-
mnibus modis menstrua constringere & compe-
scere, ac omnino stupefacientibus dolorem in-
tensum sedare studuit. Exhibuerat *aquam nenu-
pharis & plantag. cum syr. nenuph. ac pap. adiecto* & s.
opii. Vnde sensu obstupefacto ad tempus, per v-
num diem dolor quidem consopiebatur, sed pau-
lo post multo vehementior redibat. Vtus certe o-
pii mihi semper fuit suspectus. Nam cum & alteri
in Nosocomio decumbenti opium exhibitum fuisset,
altera die mortua inuenta est. In hac autem
muliere dolorem quidem sedabat, sed causam
morbi augebat. Vnde & Galen. lib. 2. De compos.
medicamentorum sec. loc. disputans contra Appollonium,
dixit, non debere exhiberi opium nisi in doloribus, in
quibus vel mortem vel syncopen expectamus, ad quam
syncopen sequitur mors. Et ego vidi quendam, inquit
Montanus cap. de Doloribus cap. supra Rhaf.
lect. 1. ex opio exhibitio interiisse. Periculosa, ait, sunt
ista stupefacientia, præsertim per os exhibita: quoniam
nihil aliud faciunt, nisi mortificare. Vnde nunquam

ad pholonium accedit Galenus, nisi cum timet mor-
tem; sed ad theriacam nouam & diaspermaton, ne-
que vnquam vsus est opio. Ab eo mortuus est ille in-
felicissimus Cassius Gymnasi Patavini splendor & de-
cus. Ita & Auicenna prouocaturus somnum, non trans-
ibat papauer album. Rhases proponit opium: at præ-
stat cum non sequi. Sed in hoc potius imitemur Gale-
num, qui in inflammatione aurium, accipit opium
correctum cum duplo castorii; & nunquam admini-
strauit opium, nisi cum medicina calida. Hæc fere
Montanus. Ceterum ad mulierem ut reuertra-
mur, cum dolor rediret, & perpetuo eidem ad-
hæreret, tandem mense Octobri anno 1563, Me-
dicus prior incidit in morbum articulare, &
amplius eam inuicere non potuit, & sic ego ad æ-
gram vocatus fui. Eam inueni tunc laborare ex
prægressis aliis causis, his symptomatibus præsen-
tibus; tumore præter naturam, & in vtero perfecte
cancrum vlceratum habere, ex dolore continuo
in pube, & duritie manifesta; quam exterius per-
cipiebam magis in inguine sinistro, cum intenso
dolore coxæ. Febricitabat quoque nonnihil sub
noctem: nam & vigilæ immoderate aderant, &
aphthæ subsequente sunt, & profluuium illud a-
quosum, seu muliebri's fluor, retentum erat; sed
manifeste emanabat sordities & colluies ingra-
ta, pessime olens, etiam nigra, acrimoniam & do-
lorem exedendo adferens. Quatuor, inquam,
mensibus ante me vocatum decubuerat. Erat igitur
hic cancer vlceratus ex melancholia adusta:
quod & sanies nitrosa acris effluens ostendebat.
Et ita huius mali procatasticam causam hanc
esse putabam; præterque cibum & potum, ac a-
lias res non naturales procreantes melancholiam
adustam, ignem calidum etiam ad hoc iuuisse:
perpetuo enim exercebat artem culinariam, ita ut
iugiter foco ac igni adhæreret, etiam dum sana
existeret: in ea enim domo habitabat, ad quam
carnes assandæ deferebantur: vnde & præ ædibus
inter signum artis culinariæ, seu assatoriæ pro-
pendebat. Ex illa caliditate puto in principio pur-
gationem menstruum fuisse concitatoriam; tum
ob continuos labores, & continuum motum apud
ignem. Et quia fluxus ille fuit diurnus,
tandem hepar forte refrigeratum fuit ex longo
fluxu, & ventriculus affectus: hinc & succi aquo-
si generati sunt; atque huius consequio fluxus
quoque muliebri's aquosus abortus etiam diu-
turnus. Tandem eo constricto, materia fuit in-
culcata & incinerata, ex atra bile forte post tu-
morem scirrhum: vel sane ex se ipso cancer vl-
ceratus tandem abortus est. Quem quoque in-
curabilem esse pronunciauimus, ut calumniam
declinarem. Interea palliatione tantum vtend-
um esse diximus. Quare ne vlcus magis proce-
deret, & ut dolor, quantum possibile esset, magis
mitigaretur, inhibuimus omnem cibum me-
lancholicum sanguinem gignentem. Sangui-
nem non detraximus, quia ipsa debilis, & princi-
pium iam diu progressum erat. Verum materiam
melancholicam leuiter & frequenter primo mi-
nuendo, inde eam concoquendo & vacuando,
in hunc

in hunc vel similem modum palliationem institui-
mus: *℞ elect. lenitiui, diacatholici, ana ℥ ij. con-*
fect. hamech ℥ j. ℞. cum sero lactis fiat potio breuis.
Deinde concoquatur hoc modo: *℞ syr. de bugloss.*
de fumaria, de epithymo; syr. viol. ana ℥ j. aquarum bo-
rag. lupulorum, solani, intybi, ana ℥ ij. fiat uleb pro
quatuor dosibus. Commendatur a quibusdam hoc
sequens: *℞ quinque herbarum capillarium, herba*
Roberti, chelidoni minoris, verbasci, buglossi cum rad.
summitatum lup. salictarii, fumaria, ana m. j. folio-
rum solani, (proprietate occulta discutit humo-
rem canceri) intybi satiui latioris, non lati ana m. j.
℞. uuar. passul. mund. ℥ j. trium flor. commun. ana p. j.
℞. polypodii quercini ℥ j. folior. sena orient. ℥ vj. e-
pithymi ℥ ij. (hæc humores vltos mundificant)
decoquantur in s. q. aqua ad vsque dimidii consum-
tionem; accipiatur iuris decocti lib. j. ℞. saccharo dul-
cedo inducatur, fiatque syrup. mediocriter coctus; depu-
retur, & adiectis ℥ ij. santali citrini, & ℥ j. pul. dia-
rod. abbat. suauioris & saporis & odoris reddatur. Eo
utetur ieiuna mane diebus quinque. Est autem
hoc apozema ad humores accommodum. Cum
autem sæpius purgata esset a Medico præceden-
te, cumque hoc tempore dulcia non ferret, in-
fundi iussimus folior. coluthea ℥ ℞. epithymi ℥ ij. se-
minis anethi ℥ ℞ in aqua fumaria, buglossa aut bo-
rag. & solatri: cuius medietatem cum accepisset,
dictu mirum, cum facilis solutionis esset & debi-
lis, octo secessus habuit. Et capiens omni mane
cyathum vnum feri lactis, satis faciebat etiam ad
acrimoniam humoris contemperandam. Si ita
debilis non fuisset, iterum purgassem cum diaca-
tholico exiguo, adiect. confect. hamech, vel pilulis indis.
Sed quia non nihil febricitabat, serum lactis, et-
iam exiguo subinde epithymo iniecto vel intu-
so, satis ad rem faciebat. Interim pro aphthis os
abuebat decoct. hord. plantaginis, mal. & sem. coton.
& facile curabantur. Sed, quod præcipuum erat,
ad mitigationem doloris, totus fiebat per chirur-
gum Petrum Fredericum, compatrem meum, &
cognatum ipsius ægræ, cum spongia madefacta
ex malua, fœnugræco, althæa, foliis solani in lacte
decoctis, etiam adiecto subinde lacte muliebri:
nam cum perpetuo decumberet, infellu uti non
poterat. Subinde & succo solatri in mortario
plumbeo, cum pistello plumbeo ad consistentiam
linamenti humidioris, intus mulier ipsa mulie-
bria illinebat, & cum lacte muliebri mixtum sub-
inde infundebat. Ad duritiem & dolorem exte-
rius imponebatur pestini cataplasma ex rad. al-
thæa, foliorum malua, floribus & foliis meliori, & fo-
liis solani, cum farina hordei, & sem. lini, & oleo viol.
acros. ad flacciditatem prius decoctis. Chirurgus
per speculum matricis conspexit in orificio vteri
adesse magnam duritiem, & intus rimas quasdam
• corruptas, ex quibus modo materia alba, modo
nigra fœculenta copiose cum pessimo odore e-
manabat. Tandem tota matrix affecta est dura,
cum tanto dolore, ut similem nunquam viderim.
Ex mucagine sem. fœnugræc. malua, & cremore hordei,
adiecta axungia recenti caponis, gallina, anatis, an-
seris, butyri recentis, cum oleo cheyrino, amygdal. dul.

& cera alba fiebat linimentum molle, ad duritiem ac-
dolorem, & cum bombace imponebatur subin-
de. Modo & hoc vnguento molliori utebatur:
℞ plumbi vsti, thutia preparata ana ℥ j. ℞. cerusa ab-
luta ℥ ij. succi selatri ℥ iij. succi granat. ℥ j. cam-
phora ℥ j. olei ros. & cera alba q. s. ducantur in mor-
tario plumbeo cum pistello plumbeo ad modum vn-
guenti mollioris. Sed cum omnibus parum profi-
ceremus, & viro dixissemus, quod tandem more-
retur, licet dolot iisdem remediis subinde mitiga-
retur; posthabito nostro consilio, ite reliquit, &
totam curationem Empirico cuidam glorioso, sa-
nitatem promittenti, commisit, qui, prius ex-
tortis aliquot nummis, pactum cum ipso inierat,
uxorem breui ad sanitatē se deducturum: quam-
uis vix paucis postea diebus, hæc ipsa misere cum
intensissimo dolore, ut prædixeramus, mortem
obierit. Idem contigit calcearii uxori, prope tem-
plum antiquum habitanti, quæ & cancerum vlce-
ratum in vtero habebat: quæ cum infusionibus
aptis ad palliationem uti non vellet, ex nostro
consilio, etiam morbum incurabilem prædicenti,
cum fidem mihi non haberet, me reliquit. Ei
Empiricus lithotomus postea sanitatem promit-
tens, ab ea extorsit 12. florenos; quamuis non dia
postetiam moretetur. Quemadmodum & vidua
illa Leonina, Franconis dicta, quæ multo tempo-
re aliis Medicis vsa fuerat antequam me vocaret:
& hæc quoque misere obiit, multo ante tempore
hoc malo afflictæ, & omnino mac. confecta ac
doloribus fatigata. Neq; hæc adiectiones admit-
tere voluerat, uti præcedens.

SCHOLIA.

Uterque cancer (ut diximus) siue non vlce-
ratus, siue ulceratus, in fundo vel imo vtero
existens, incurabilis est, quia abscindi non potest. Cum incipit, ut ante quoque recensimus, negl-
gitur; quia in principio subinde magnam mole-
stiam non adfert, quo tempore posset prohibe-
ri incrementum, medicamentis & optima victus
ratione. Satis a nobis fit (inquit Rondeletius) si
prohibeamus non ulcerati exulcerationem, & vlce-
rati incrementum. Prohibemus autem canceri gene-
rationem sanguinis missione e brachio, vel ex popli-
te, apertione hemorrhoidarum, ut auertamus in par-
tem proximiorē melancholicum sanguinem: frequen-
ti insuper purgatione, quæ non multum calefaciat,
& euacuet atram bilem, aut crassam pituitam: Me-
dicamenta denique quæ cap. De fluore mulie-
bri a melancholia dicta sunt, erunt valde oportu-
na. Extrinsecus & intrinsecus frigidis medi-
camentis & adstringentibus eius incrementum
prohiberi potest; ut oleo ros. omphac. myrt. vel succi
salatri, plantaginis, cum pauco aceto. Permiscentur
succum cum oleis, & sunt embrochationes, vel vn-
guenta; vel excipiuntur farina, & applicantur su-
pra partem, vnguenti modo. Aquæ vel succi her-
barum iniiciuntur. Si autem exulceratio fuerit,
metallicis est vtendum, & vngu. diapompholygas,
emplastro de cerusa, emplastro nigro, & quæcunque
parata sunt ex antimonio, plumbo, cerusa, thutia, vel

ompholyge: & ut breuiter dicam, quæcunque citra mortuum refrigerant & exsiccant. Quare neque lacrymæ neque alia medicamenta aut attrahentia, aut digerentia admiscenda sunt; ut *rhys*, *myrrha*, *galbanum*, *assa fœtida*, *cinnamomum*, *spica*, & huiusmodi. Sunt diligenter leuiganda, ut *collyria*, deinde abluenda diligentissime, & ex illis vnguenta paranda cum succis, oleo, & cera alba, vel seuo hirci. Nam aliæ axungie putrefaciunt. Attamē Aetius utitur adipe porcino in hunc modum: ℞ spuma argenti lota ℥ vj. thuris masculi, cypri, adipis porcini recentis, butyri noui, ana ℥ ij. rosacei ℥ iij. seruatur medicamentum in plumbea pyxide: quod si exaruerit, rosaceo diluitur. Sequens autem iniectione vlcerato cancro maxime conuenit: ℞ herba Roberti, verbasca, scabiosa, cheledonii minoris, anethi, stercoris humani ana q. v. comburantur: de cinere autem accipiantur ℥ iij. aqua solani ℥ vj. excepta in mortario plumbeo, pistillo plumbeo agitentur; deinde in vterum iniiciantur. Oleum ouorum frequenter ductum & agitatum in mortario plumbeo, donec spissius reddatur & plumbi colorem contraxerit, efficacissimum est medicamentum. Cinis cancerorum fluuiatilium lotus in aqua solani permixto pul. ex plumbo, vel antimonio, vlceratum cancrum curare dicitur, & creditur. Quod si non curat, saltem mitigat, exsiccatur, & depascentem cohibet. Nam difficillimum est partem iam indurata[m] emollire, & pristinae sanitati restituere. Sed metallica omnia partim repellendo, partim digerendo, citra mortuum morbum leniunt. Hæc est cura, quam vocant palliativam. Cibus dabitur, iuxta Paulum, qui facile in corporis membra queat distribui, boniq; succi, vinum paucissimum, aquosum: acrium esus, & repletio omnis vitanda est, ut quibus cibi promte corrumpantur.

OBSERVATIO XLVIII.

De vlcere matricis.

Matronæ nobilissimæ ex vtero sanies effluebat, cum ardore & inflammatione; & cum subinde leuem febrem sentiret; cognouimus, in ea vterum exulceratum esse: nam in affecta parte punctorium dolorem percipiebat; & per interualla, humor diuersus cum magno dolore excernebatur, modo paucus, cruentus; modo feculentus: qualia videlicet inflammato vlcere Paulus apparere dicit lib. 3. cap. 66. De vteri vlcere. Igitur cum hic ardor, calor, & inflammatio aliqua simul adessent, prius assumpta ℥ j. cassia in bolo, adiecto pul. sem. berberis ℥ j. saccharoque asperso; cum in vere essemus, & sanguis videretur nonnihil abundare, sanguinem detraximus ex vena basilica; & altero die ex saphena, sed in pauca quantitate; ob febrem, inquam, & inflammationem, cum non diu laborasset. Arabes vero in vlcerum locellorum principio sanguinem demunt ex vena axillari, altero die ex saphena. Id tamen faciendum iudicio oculati Medici, potissimum ubi calor & inflammatio simul adsunt cum vlcere. Aetius tamen nec Paulus de venæ sectione men-

tionem faciunt. Vnde quoque, si ex apostemate vlcus sit, & prius facta est missio sanguinis, tunc minus conuenit; & multo minus in vlcerato inueterato, nisi mulier admodum sanguine laborare videretur. Postea autem cum hic sanies exiret cum acrimonia, & materia esset acuta corrodens, syrupos præscripsimus bilem contemperantes & acrimoniam restringentes: ℞ syr. viol. nymphae, ex infus. ros. (propter abstersionem) ana ℥ j. decoctionis solani, lactuce, intubi, lupulor. fumaria, ℥ vj. fiat syrup. cum ij. de sibus. Deinde ita illam purgaui: ℞ folior. senæ ℥ ij. B. rhab. optimi ℥ j. epithymi ℥ iij. sem. anisi ℥ B. schœnanthi ℥ B. infunde per noctem in ℥ v. aqua solani, facta leui ebull. mane fortiss. express. adde syr. ex infus. ros. pallid. ℥ vj. fiat portio. & alius satis fuit soluta. Deinde ad ardorem & intemperiem atque acrimoniam tollendam imperaui, ut succum bursæ pastoris & plantaginis aliquando iniiceret cum lacte muliebri, & exterius cum iisdem succis lauaret, vel cum panno lineo applicaret. Nam supposito ibidem calore & dolore, Valescus utebatur aqua frigida: Noui enim, inquit, aliquas mulieres sentientes se habere eiusmodi vlcera: lauabant ea cum aqua frigida, mundabant deinde, & cum pannis lineis exsiccabant, & in matricem mittebant frequenter: atque iisdem præsidis saepe mutatis, hæc ipsa saepe per se ad integram curationem sufficiebant. Ablata intemperie calida, & febre iam diminuta, ad vlcera detergentibus & exsiccantibus curanda accessimus, corpore etiam cum manna & cassia adhuc semel repurgato. Multum autem hic resiccare oportet, tam ob partis naturam siccam, quam obcrementa, quibus pars illa abundat; ut latius in Scholio dicemus. Inter medicamenta detergentia vlcera, in quibus acrimonia puncturæque sentiuntur (ut hic erat) cum sine morfu esse debeant, optimum hoc sequens mihi esse videbatur, quod primo solummodo ex sero lactis constabat cum paucis saccharo; quod ut iniiceretur, iubebam, ad vlceris deterfionem; postea etiam abiecto melle & syrupo ex ros. siccis. Aliquando ut etiam iniiceret, consului decoctum lentium & plantaginis; quibus aliquando adiciebant folia myrti, oleæ, vel oleastri, ceterach, agrimonie, in decocto præcedente: nam hæc herbæ, tum aliæ amaræ, sine magna calfactione iuuant. Quare absinthium, & similes herbæ calfacientes, hæc in causa conuenire non possunt; sed potius in sordidis vlceribus, quibus alia mulier magis afficiebatur: ad quam curandam, iussi mulierculæ Adrianæ Bieselingiæ, quæ tales curabat, ut post purgationes aptas totius corporis, pituita falsa & materia crassiore sordida prius digesta, deinde euacuata cum decoct. senæ, epithymi, agar. pauco adiecto diaphœniconis, ut, inquam, iniiceret hydromel cum decocto ireos, absinthii, agrimonie. In vlceribus certe sordidis & pituitosis tales iniectiones fieri possunt, ex decoctione apii, centaurii minoris, fabarum, lupinorum, orobi; quæ magis detergent. In iis aliquando etiam dissoluimus parum Egyptiaci, vel

Chelidonium minus, alii scrophulariam appellant.

vel vnguenti Apostolorum in principio, cum vl-
 cus obductum est multo pure & carne putrida.
 Ceterum in hac prima muliere, de qua nunc agi-
 mus, cum & vlcus per aquam hordei & melle ro-
 sato satis abstersum foret, neque sordidum vlcus
 esset, mandavi, vt vnguentum conficeretur ex
 thutic ablute, & preparate, partibus duabus, cad-
 mæ, litharg. argenti, sarcocoll. ana p. j. cum oleo
 ros. vel cum aqua plantaginis inungatur, & pars
 eius aliqua iniiciatur. Ita, vlcere sufficienter de-
 tergo prædictis iniectionibus, commode dissolui-
 mus myrrham, aloem, iridem, & alia sarcotica,
 trochil. albos Rha. Demum ad vnguentum partem
 resiccantia est deueniendum, vt ad vnguentum
 pompholygos, de cerusa, de plumbo, & de aliis
 metallicis insigniter resiccantibus. Et sic nos im-
 perauius vt collum vteri vlcera tum inungere-
 tur vng. diapompholygos, & vt etiam ad fundum
 perueniret, vt aliqua pars cum decocto ros. rub. &
 plantag. iniiceretur. Egregie illis medicamentis,
 cum non diu hoc malo laborasset, curata fuit. Si
 vero eiusmodi medicamentis non possunt talia
 vlcera euinci, tunc alii iubent, & tentandum esse
 scribunt, vt fumigio pars exsicceetur. Faciendum
 autem id est ex sarcoticis, & fuliginem generanti-
 bus, vt lacrymis resinisque, aliis quibusdam per-
 mistis, vt sandaraca, auripig. cortice thuris, ladano,
 hypocisthide. vt. *℞. thuris, mastiches, ladani puri,
 myrrha, styrac. rub. ana 3 iij. marcas. & lapidis pyri-
 tis, auripigmenti rub. ana 3 ij. excipiantur terebinthi-
 na, & fiat fumigium.* Quod si mulier foetorem fer-
 re non possit, optimum erit parare aliud magis o-
 doratum hoc modo: *℞. alipta moschata 3 j. be-
 niouin. styrac. ladani puri, ana 3 iij. mastich. thuris,
 & cort. eiusdem, ana 3 ss. cum mucilag. gummi tra-
 gacanthi fiant trochisc.* quibus vtatur, vt dictum
 est. Ioannes Tiengius, Medicus Amstelrodamen-
 sis, cuius secreta a genero ipsius mihi aliquando
 communicata fuere, nobilem se matronam hoc
 modo ab vlcere vteri satis restituisse dicebat. Da-
 bat ex præscripto Placentini de quarto in quar-
 tum diem 3 v. decoct. senæ, epithymi, ros. rub.
 myrobal. Indarum, saccharo dulcoratæ. Et clyste-
 rem subinde in partem affectam iniici mandabat
 ex aqua tepida decoct. senæ, epithymi, fumarie,
 florum chamæmeli, ros. cui terebinthina exigua,
 mel rosaceum & hordei farina iniecta erant. De-
 inde pessos in vterum, seu os vteri ponebat: *℞. mel-
 lis rosacei lb ss. farina lupinorum, siliginis, fenugraci, sar-
 cocolla, an. 3 ss. fiat pessi.* Si pruritus aut ardor adesset,
 iisdem addebat *semen papau. hyoscyami & caphuram.*
 Atq; hæc etiam soluta subinde in vterum per ob-
 stetricem iniici iubebat, vel cum aquis cōuenien-
 tibus. Facta repurgatione & mūdificatione, com-
 mode hoc medicamento utebatur, quod incar-
 nabat, & exsiccabat, & consolidabat; valet enim
 ad hæc omnia post vniuersalia remedia, corpore
 prius ac vteri vlcere repurgatis: *℞. aloes, thuris,
 lapid. hematitid. pul. carta combusta, pul. cucurbitula
 combusta, an. 3 ij. pulueriscentur, & cribrentur, cum
 pennis imponantur, aut cum aquis appropriatis
 iniiciantur.*

SCHOLIA.

EXulceratur subinde vulua ex infelici partu,
 aut foetu excusso, aut corrupto, vel ex medi-
 camentis acerbis, vel fluore, vel abscessibus
 disruptis, aut fluxione erodentium succorum; vt
 & Paulus & Aetius testantur; quandoque etiam ex
 abortu, vt Erotis cap. 9. De pass. mulierum refert.
 Sic igitur fiunt vlcera post alios morbos, vt in-
 flammationem, vel abscessum; vt antea etiam
 ostendimus, & post fluxus muliebres acres, &
 post medicamenta acra apposita vel iniecta, &
 pessos acres in vuluam subditos. Fiunt aliquan-
 do per se incipiendo, ex materia calida acuta cor-
 rodente, vel ex phlegmate falso, adusto, aut aliis
 humoribus adustis; vel consequuntur apostema-
 ta vteri, post suppurationem & rupturam; etiam
 aliquando præcedente solutione continui ex vul-
 nere, percussione, aut casu. Fiunt & hoc tempore
 etiam vlcera ob contagionem luis Venereæ; aut
 propter recrementa retenta, & putrefacta circa
 pterygia vteri. Deprehenduntur facile a dolore,
 recrementis & pure reiecto. Ex Aetio dignosce-
 mus vterum esse exulceratum, quoniam pars
 ægra & affecta dolorem percipit punctorium; &
 ex interuallis foetidi ac saniosi humores ab vlcere
 lordido prodeunt; & consequuntur etiam alia v-
 tero affecto peculiaria symptomata; velut est ca-
 pitis, ac præsertim syncipitis dolor, vt de inflam-
 matione vteri prius dictum est: item dolor liga-
 mentorum & radice oculorum, qui ad manus
 vsque ad digitos se extendit; & reliqua supra de
 inflammatione relata, ex Aetii testimonio cap. 88.
 lib. 16. Quod si prompta in conspectum exulce-
 ratio venerit, specillo oriculario, quod *σπίτερον*
 vocant,prehenditur: si alte defuderit, vel in
 loco recondito, ex recrementis. Humor enim di-
 uersus excernitur inflammato quidem vlcere (vt
 præcedente Obseruat. quoque diximus) paucus, cru-
 entus, aut foeculentus, cum magno dolore eua-
 cuabitur: at si sordidum, copiosior humor & sa-
 nius cum miro cruciatu profluit: si depascens, fœ-
 tidus, niger, cum doloribus vehementioribus, a-
 liisque inflammationis signis. Præterea quæ la-
 xant medicamina, hoc irritant, contraria leniunt.
 Si ab inflammatione, signa adsunt communia
 inflammationis, dolor, pulsatio in vtero, & ef-
 fluxus sanici & virulentia, apostemate aut absces-
 su perrupto. Si vero per se incipiant, aderit pri-
 uatio signorum inflammationis, aut apostema-
 tis in matrice. Ceterum licet causas ipsas singu-
 las iam dictas facile ex loquela, vel earundem
 ægrotantium percipiemus, partim etiam ex no-
 bismet ipsis ea, quæ præcesserunt & quæ comi-
 tantur considerantibus: tamen prius distinguere
 oportet vlceris naturam; quam deprehendere
 poterimus ex causis non tantum, quæ præcesse-
 runt, verum etiam ex victus ratione, & totius
 corporis natura: num etiam a lue Venerea fa-
 ctum fuerit. Quæ post abscessus frigidos fiunt,
 solida esse solent: quæ post inflammationem a
 sanguine, & quæ post erysipelas, virulenta & de-

6

Signa vteri ex-
ulcerati.

7
Signa calli vte-
ri exulcerati, et
quando in pro-
fundo hæreat.

Signa sordidi
vlceris.

Ab inflamma-
tione.

Signa a se inci-
piens.

Signa causa-
rum.

8 *Quibus differunt
vulcera vteri a
vesica.* pascentia sunt: si post scirrhum gar g ænosa: quæ
post luem Veneream dyspulpotica & chironia. At
hic quoque animadvertenda sunt signa, quæ vi-
cus vteri ab aliis affectibus distinguunt: quoniam
si vlcera sint in matrice, apparebunt recrementa
exenntia separata ab vrina, & dolor sentietur in
profundo pectinis, & minorabitur color albus.
Si vero sint in vesica, apparebunt exenntia mixta
cum vrina, & dolor sentietur magis apud anteriora
vulvæ, & multiplicabitur color albus in rebus
exeuntibus & concurrent alia accidentia superius
scripta de scabie vesicæ, eiusque vlcere. Iam quo-
que cum vlcus est in vtero, adest ardor in vulva,
& sentitur cum pruritu, primo quidem titilloso
(*ut dicebat Bertrutus*) quemadmodum & in sa-
tyriasi: postea, dum fortificatur, est cum pruritu
acuto & pungitivo: & si tunc nihil egrediatur, tum
potius dicuntur rhagades & fissuræ; de quibus
postea. Et si egreditur sanies nigra, viridis, liuida,
cænosa, foetens, tunc vlcus appellatur: si vero san-
guis niger & crassus, tunc hæmorrhoides matricis,
seu vteri, vocantur. *Signa prognos-
tica.* Quod ad signa prognostica
attinet, nullum vero vteri vlcus contenendum
est, sed quam primum fieri potest curandum. Nam
cum vterus totius corporis recrementa excipiat,
atque nervosæ substantia sit, haud facile curatio-
nem eius admittunt vlceræ; præsertim si diuturna
fluant. Ex iis tamen ea, quæ in conspectum veni-
unt, promptius, quam quæ in profundo sunt re-
condita; & quæ pura, aut etiam simpliciter sordi-
da existunt, facilius quam depascentia, medica-
mentis cedunt. Rarius vero, secundum quosdam,
sunt consequendo; ut plurimum autem per se in-
cipiendo. Sollicite statim sint curanda: nam si per-
duraverint, fistulam periculosam, imo hæticam
febrem inducunt, ut sæpe vidimus, & tandem mor-
tem. Vlceræ quoque matricis in principio prohi-
bent conceptionem; & si prægnanti supervene-
rint, abortum inducunt, nisi ilico succurratur: quo-
niam scilicet virtutem expulsiuam stimulant, quem-
admodum & tenemus. Quouis modo fiant, ægre
semper curantur, quia pars illa, ut diximus multa
recrementa colligit, quæ vlceris consolidationem
retardant. Si igitur inflammationem experitur
vlcus, iis quæ ad illam scripsimus *sub finem Scholii
Obs. 44. huius libri*, tum quæ apud Paulum *lib. 3. c.
65. De vulvæ abscessu* scripta sunt, utendum est. Si
vero ex redundantibus, & vitiosis ac erodentibus
succis exulceratio vteri fuerit orta, purgantibus
medicamentis prius erit utendum, præsertim ubi
alterati, ac præparati fuerint, qui redundant hu-
mores: & deinceps ad vlceris curationem confu-
giendum. Interea quantum ad principalem hu-
ius morbi curationem, dicta sit civilis, line me-
rore atque animi solitudine quiescat ægra, at-
que somnum capiat moderatum, in contrariam
vlceris partem. Planum effugiat locum, humi-
dum præsertim, balnei usum, crurumque frictio-
nes. In cibis acris & amara vitanda sunt, vel sal-
sa, nimiumque dulcia, ut quæ ex melle & saccha-
ro conficiuntur. Verustiora vina & dulcia dam-
nantur, sicuti & aqua purus potus. Panis filigi-

neus utilis est sine sale, auiculæ & hædina caro. *10*
Siti ac fame vincitur id malum (*ut quidam asserunt*)
modo debiles non sint: humida esca inutilis ha-
betur. Frigida igitur ac sicca profunt, & initio
quæ abstergunt eliguntur; denum quæ cicatri-
cem inducunt offerenda sunt. Et, ut summum
dicam, ea victus ratio instituitur, ac eadem exhi-
beantur medicamenta, quæ in reliquis exulcera-
tionibus, renum potissimum & velicæ, a nobis
fuere conscripta. Quantum vero ad topica medi-
camenta spectat, si purum fuerit vlcus, leniter
astringentibus atque exsiccantibus medicamen-
tis utendum erit: quod ubi conspicuum erit, eis-
dem illinatur vlcus. Si vero profundum existat,
infundere ea oportet per instrumentum ad hoc
appositum: quare rosaceum aut tetrapharmacum
balilicum cum butyro recenti infundatur, iuxta
Paulum. Eluantur item loci decocto rosarum aut
lentium, aut prisanæ seu plantaginis succo: præta-
bit etiam portulacæ, aut polygoni decoctum cum
rosaceo. Verum ubi sordidum fuerit vteri vlcus,
detergentibus medicamentis utendum erit; velu-
ti est prisanæ cremor cum melle, vel mulla in qua
fœnugræcæ sit decoctum, aut malua, aut fursures,
aut lenticula cui cortex sit detractus. Porro, quo
magis expurgetur, etiam marrubium, aut erium,
vel melli adiuncta erui farina, vel ius, vel alumen
rotundum, vel aliquid simili iniiciatur. Hæc ipsa
etiam extrinsecus ex mulla macerata illinantur.
Peculiaris est medicamentum crocus leuigatus,
cum lacte muliebri, deinde exceptus cerato rosa-
ceo, cum adipe anserino: mungitur linteolo. At-
que hoc efficacius ad dolores. *Capita papaveris in
passo temperato madescunt diebus tribus, deinde inco-
quantur donec emollescant, postea teruntur cum fo-
lior. ros. 3 v. croci 3 iij. iure capitis pap. admisti, inde
cera cum rosaceo liquata denarii duo ipsis superfundun-
tur, ac pessulo asponuntur in rosaceo tincto.* Et illud
salutare est, ex ovis, croco, rosaceo, adipe anserino, cer-
ui medulla, præparatum. Utendum quoque ad sor-
dida vteri vlceræ eo medicamento, quod ex mel-
le, terebinthina, rosaceo, & butyro, constat. Cui ali-
liqui etiam parum croci addunt. Efficax est & *itis
imposita cum melle; & aristolochia decoctum per se, vel
cum melle infusum, teste Aetio.* Vbi pascento ter-
punt vlceræ cum inflammatione, illinitur panis
egelida maceratus ex hydromelite, oleo, alba, fœ-
nugræcæ, palmulis pinguibus. Ceterum plantaginis
succus, solani, polygoni, sereos, indetur, primum per se,
mox cum vino austero, aut aceto. At citra infla-
mationem serpentibus robustiora iniiciuntur,
veluti decoctum malicorii, rosar. summitatum olea, ca-
pressi, malorum cotoneorum, rubi, myrti, lentisui fru-
ticis, rhus coriarii, ex vino astringente: postea vero
aluminis, acacia, lycii, hypocistid. Ex eisdem vero
decoctis, iubente eodem Paulo, parabitur etiam
inseffus. Si nihil proficiunt, non alienum fue-
rit ex catra medicamen cum posca primum de-
mittere, deinde cum aceto, aut anthera iisdem-
que liquoribus & ceteris, quæ dysentericis con-
gruant.

Topica.

Si vltimū pūm.

Si sordidū fuerit
vteri vlcus, sordidū
est.

¶

Curatione.

Purgatio.

V. & u. ratio.

Vlceræ serpētinæ,
seu depascentiæ,
cum inflamma-
tione, quomodo
curantur.
(Cura inflama-
tionem serpēti-
nam curatio.)

OBSERVATIO XLIX.

De antiquo vteri ulcere & lethali.

Maria Iacobi, mulier licet crassa, satis tamen prolifica, quæ in paruo Speculo apud pontem cespitarium Delphis habitabat, vteri ulcere admodum maligno, cum insigni dolore, usque ad profundum vteri procedente, cum aliquandiu laborasset; ex Chirurghi consilio variis vtens remediis, semper peius habuit. Ad quam tandem & ego accitus, animaduertens, quod ulcera essent depascentia & efferata, post puigationes totius corporis convenientes, imperavi ex auctoritate Aetii, vt iis topicis medicamentis vteretur, quæ ipse ex Alpasia l. bro 16. capite 9. ad vteri depascentias collegit. Inprimis, vt vlcera asinino lacte, vel equino, recenter multo ablueret, & hoc ipsum ad duas heminas recens coctum, mellis herulina dimidia adiecta, & quatuor drachmis iudis farinae suspensis, calidum, vt sæpius singulis diebus per mulierem Medicam infunderetur, præcepit: interdum & aqua mulla, in qua ablinchida aut chamæmelum incoctum erat. Et vbi quod infusum esset, fuisse excrementum, vt protinus id i malum decocto elueretur; deinde pessus subderetur ex farina, erui, iudis, ana ℥ij. cum melle subactus. Ceterum nullo modo voluit admittite iniectiones, vel alia a nobis apta præscripta remedia: ita vt misere diu superfluens, cum vehementi cruetatu tandem, viribus consumpta, cum aliquot mensibus hoc malo detenta esset, interiret.

SCHOLIA.

Notesse hic quosdam canones ante vlceris vteri curationem præponunt; vt: Quanto vlcus vteri fuerit humidius, tanto medicamenta sicciore adhibenda, & apponenda, cum & siccius medicamentum per se eadem conueniat. Voluntque, resolutionem materis antecedentis & peccantis cum catarticis, & victum optimi succi, haud minimam curationis partem in se continere. Iisdem itaque imprimis conueniunt abstergentia, derergentia, & mundificantia, & consequenter exsiccantia: sub finem vero incarnantia & consolidantia. Tam internas, quam externas partes colli vteri mundas tenere cum pannis lineis puris, & albidissimis, & ab omni sorde immunes ac securas, conuenit. Si itaq; ab humore acri, materiam digerimus, seridis, cichorii lupuli, lactucæ, solani, aqvis, vel decocto, addita viola, nymphaea, ac tribus santalis; syr. etiam viol. pap. nymph. aliisve adiectis. Præparatam materiam euacuamus manna vel cassia, vel syr. ex infus. ros. pallid. Phlegma salsum præparamus decoctis & syr. e bugloss. fumaria, polytricho, adiantho, scopolop. chamæpit. chamædr. & rad. apii, petros. fœniculi, polypodio adiecto cum saccharo, & vino malo punici. Digestam materiam subducimus diaphœn cum agar. epithymo, & senæ, fumarisq; decocto. Ab his, si corpus sanguine sit repletum, cubiti venam & tali, si opus est, secamus. Et vbi expedit, digerentia & catartica repetimus. Ali-

qui & vomitum laudant ad auertendam materiam. Ab his, quæ vlcera abstergunt infunduntur; mox quæ persanant. Interea si qua inflammatio fuerit, quæ calorem mitigant imponimus. Syr. ex pap. iuiub. damus. Iuuant & iniectiones, ac vnguenta refrigerantia; vel tepidum id infusum ex quatuor ouorum albis quassatis, sacco seminis melon. pepon. cucurb. cucumeris rotundi ac magni, ex aqua viol. addito muliebri lacte. In vehemementi cruciata, & aqua virga pastoris, siue polygoni, aqua hordeacea, ana ℥ss. in ea semen psylli maceretur, & panniculo compresso; addatur ouorum candidum cum pap. & hyoscyami seminis succo, ac muliebri lacte. & si opus est, in ea mixtura exiguum caphura, opii, croci, addatur. Extrinsecus solanum imponitur, vel cotyledon, vel lactuca, pap. aut hyoscyamus. Quæ vero repurgant subinde iniicienda sunt; vt caprinum serum, & aqua hordeacea in qua glycyrrhiza incocta sit, vel saccharum. Alii oleum cucurbit. viol. cum amylo & cera confecta, soluta cum lacte muliebri aut asinino iniiciunt. At deplorata vlcera mitigatoriis (vt diximus) iniectionibus mitigantur. Putria vero mulla prius purgantur; mox adiecta iride ac aristolochia absterguntur. Vetustari vlcerum vehemētiora conueniunt; vt decoctum iridis, hyssopi, aristoloch. rotundæ, artemisæ, admixto melle, & virili viti. Repurgato vlcere, sanandum erit medicamento litharg. cerussæ, sarocollæ, ex oleo ros. & cera composito; tum aliis glutinantibus & consolidantibus, superius dictis; quæ ex aloe, myrrha, draconis sang. sarocoll. ac thure cum plantaginis succo bene trita imponuntur. Tunc etiam ægra boni succi cibis vinoque refici debet, quod caro statim procreetur, ex Pauli sententia. Deinceps his vtendum, quæ ad cicatricem perducunt; primo mitioribus, deinde efficacioribus; etiam de foris adhibitis, abdomini videlicet & vteri regioni. Nam quemadmodum cataplasmatum, ita etiam emplastrorum facultas per latentes meatus traducitur, vt idem inquit Paulus. At vteri fistulæ sanari non possunt, sicut & quæ in alio sitæ sunt. Si autem vlcera vteri a lue Venerea facta fuerint, vtile erit malam illam morbi qualitatem in toto corpore euincere & auferre, prouocando sudorem vel stuphis, vel iniectionibus, vel vsu guaiaci, vel similibus, & vnguentis prædictis argentum viuum addere, & fumigio parato ex cinnabari vti. Tunc videlicet fumigiis dictis Obseru. 48. sub finem addenda erit ℥j. cinnabaris, & per emborum, vt ibidem dictum est, fumus recipiendus. In omnibus his vlceribus vsus stupharum est vtilissimus, quia corpus vniuersum exsiccat. Sic post decoctum guaiaci, aliquando curauimus vlcera in vulua vnguento Ægyptiaco soluto cum aqua plantaginis, etiam leuiter attingendo ea, quæ in ore vel in parte exteriori conspicua forent. Vidi Chirurgum cum pluma attingentem cum aqua plantag. aut solani, iniecto exiguo puluere præcepto; tamen non sine magno dolore. Verum de his latius, de lue Venerea, suo loco.

OBSERVATIO L.

De pruritu vulvæ.

Verula mulier Alcmariana, cum pruritu vulvæ intolerabili afficeretur, ex materia biliosa, acri & salia, multumque pungente, ad me consultandi causa venit anno 1555. Quæ equidem paupercula existens, istis remediis ab illa molestia liberata fuit. Eramus in æstate: *℞ fumarie, acetosæ, lapathi acuti, cum radic. summitat. lupul. bugloss. cum floribus ana m. j. coquantur in sero lactis, adiectis xv. prunis, eoque bis utebatur in die.* Deinde, ut magis purgaretur, adieci *℥ j. foliorum senæ, seminis acetos. & anisi ana ℥ ss.* Ut vulvam laueret præcepi cum aqua plantag. quæ cum non satisfaceret, hoc decoctum præscripsi: *℞ Folia plantag. lapathi acuti, cum radic. coquantur in aqua plantag.* Post lotionem, hoc linimento inungatur: *℞ lithargyri auri per diem ac noctem in acerrimo aceto macerati ℥ j. olei viol. q. s. fiat linimentum molle.* Ita a fœda illa passione liberata est. Fuit hoc secretum præceptoris mei Elidei, Medici insignis; modo accipiendo *℥ ss. litharg. ita in aceto acerrimo macerati, addendo olei viol. modo ℥ j. modo ℥ ss.* Hoc eodem remedio per me curata fuit, & alia post vniuersalia remedia, a pruritu vulvæ vna cum satyriasi, anno 1560.

SCHOLIA.

Gvainerius in Commentariolo suo De agnitionibus matricis, capite vndecimo, sub vno capite tractat de pruritu matricis, & priapismo. Forte intelligit pro priapismo satyriasi. Pruritus tamen matricis potest esse etiam absque satyriasi. Priapismus vero est proprius morbus mentulæ, ut ad longum docuimus Observatio. 9. libro vigesimo sexto, & in eiusdem Scholio; & satyriasis similiter, ut Scholio, Observatio. 27. eiusdem libri ostendimus: quamvis inter se modo conveniant, modo differant, ut ibidem ad longum explicaui. Satyriasis tamen, ut ibidem quoque diximus, etiam mulieribus accidit, ex mente Aetii libro decimo sexto capite 8. ad quam etiam sequitur ingens pudendorum pruritus cum dolore; ac eadem adfunt signa, quæ ponit Guainerius de pruritu matricis. Potest tamen aliquando esse pruritus ex humore bilioso, salso, adusto, sine desiderio coeundi. Satyriasi, uti Moschius capite quarto, Harmoniæ Gynæciorum, tum Aetius referunt, a Satyris nomen antiquitas dedit, quod illi, ut in fabulis est, proclives in Venerem essent. In mulierum certe satyriasi adest partium pudendarum prurigo cum dolore, ita ut impatienter manus suas illuc mittant, cum in satiabili & stabili virorum desiderio, amissa scilicet omnis pudoris verecundia. Si quidem enim res hæc, quæ matricis consensum habeat, & verecundiam eis confundat ac tollat, & aliquantulum eas delirare faciat. Hæc Moschius. Noui ego vetulam quandam, cuiusdam sacerdotis famulam, hoc vitio adeo impudicam, ut satiari non posset coitu, quo imo magis inflammabatur, quæ ad hæcticam febrem,

quasi pervenerat antequam curari posset. Huius mali curationem diximus ex Aetio Scholio Observatio. 27. libro vigesimo sexto. Addit Moschius, curam eandem esse cum fervore. Potest tamen, ut dixi, esse pruritus, absque desiderio coitus. Interea si a bile vsta, quod ex colore luteo seu citrino cognoscitur, ea ipsa temperanda cum syrup. viol. nymphaeæ, & aliis cum aquis refriger. ut dictum est sæpe, & cum infus. rhabarb. oxyphænico, & syrup. ex infus. ros. purganda. Si ex sanguine, color erit rubeus, fiat venesectio si sanguis sit adustus. Si sit a pituita salia, contemperetur similiter & euacuetur cum cathol. & diaphæn. Deinde topica remedia adhibeantur. In materia calida succus solani, aut lactucæ, portulacæ, iniiciantur; vel eo vterus lauetur, vel hoc: *℞ succi foliorum salicis, succi lactucæ, ana ℥ ij. stercoris muris ℥ ij. misce, & in vterum mittantur; vel betæ succus.* Et si adest simul satyriasis, pulv. nymphaeæ ℥ j. excipiantur syrup. de pap. aut succo foliorum salicis, & ante pastum bibatur: vel succi portulacæ cum saccharo & similibus fiat syrup. Lauentur cum decocto lapathi acuti, fumarie, malvæ, oxalid. solani, scabiosæ, betæ, & penthaphylli. A pituita salia, valet hoc vnguent. *℞ litharg. cerusæ lotæ, ana ℥ iij. plumbi vsti. scorie argenti, ana ℥ j. ss. mastichis, olivani, ana ℥ j. ss. pulueris fentur in mortario plumbeo, & pistillo plumbeo agitentur, adiectis oleo ros. & aceto albo, non simul, sed alternis repetitis vicibus, donec vnguent. formam induat: deinde quidam addant argenti vivi, hominis ieiuni salivæ extincti, ℥ ij. stercoris muris ℥ ij. Accipiat huius vnguent. ℥ ss. stercoris muris ℥ ij. dissolvantur in ℥ vj. decocti superscripti; eo pruritus lauetur, tum vulva ipsa; & si opus est, in vterum iniiciatur, ut pruritus simul & satyriasis, si illa adfuerit, tollatur. Renes quoque inungantur cerato albo, adiecta exigua portione caphuræ, & lamina plumbea perforata super renes feratur; & vitex, tum alia per cubiculum spargantur, quæ ad compescendam Venerem scripsimus valere: & si simplex sit pruritus, absque desiderio coeundi, vtere vnguento illo ex lithar. cum oleo viol. ut nos vsti sumus.*

OBSERVATIO LL.

De vulvæ excoriatione.

Mulier excoriationem vulvæ habenti, cum ardore, post exhibitam cassiam cum sero lactis, mandavi, ut folia salicis, malvæ, viol. & solani decoqueret cum lacte, & eo sæpe loca excoriata ablueret, & deinde vnguent. ros. & de cerussa & albo caphurato simul mixtis inungeret; continuo bibendo lacebutyratum cum foliis acetosæ coctum. Quibus cessavit. Alteri ex lotionem sequenti intra biduum cessavit: *℞ caprifolii, bursa pastoris, caudæ equinæ, plantag. semperivi, sanicula, bugule, ana m. j. trag. gummi arab. ana ℥ ij. spodii, granor. myrti, ana ℥ ij. sem. & cort. pap. albi ℥ ss. fiat decoctio in aqua plantag. caprifolii & scabiosæ. Valent & ea, quæ mox de rhagadibus & fissuris vteri dicturi sumus.*

SCHOLIA.

SCHOLIA

EXcoriatur vterus, teste Gilberto Anglico lib. 7. sui Compendii, cap. De excoriat. eiusdem, interius. Imo etiam aliquando exterius, ex bile lateribus eiusdem inhaerente: & aliquando in eius concavitate; ut per puncturas & ardores resudante humiditate citrina cognoscitur. Imo patitur subinde & scabiem ac pustulas; ut pruritus indicat, tum superfluitates ab utero emanantes aut vulva. Digeratur oxyrach. & purgetur elect. de succo ros. & fiat balneum ex herbis refriger. & si opus est, vena saphenæ leceatur; & temperetur lycium cum lacte; ac immittatur. Vel pap. alb. gummi Arab. trag. terantur, & fiant trochisc. ponderantes ℥j. unum dissolue in lacte, & inice. Quæ ad vesicæ excoriationem valent, & hic locum habent. Adici poterit medulla vituli & cervinæ; & ita scabies pruritusque solvetur. Interea studendum vteri repurgationi, ne post istas iniectiones sempiterna inducatur sterilitas; & ideo a violentis iniectionibus abstinendum. Si exterius sit excoratio, forus & vnguentum iam dicta ad pruritus vulvæ, exterius exhibenda. At si vulnus sit in utero, utuntur remediis succo arnoglossæ, solatri, cum album. oui & succo portulacæ; & in venis corrosis, succo centaurii, sanguin. dracon. bolo armeno, aristoloch. rotunda, lycio, & acacia & similibus; & peste ex litharg. cap. & albo ovi & oleo ros. Sed de his satis. Nunc ad rhagades, quæ similem fere curationem obtinent, accedamus.

OBSERVATIO LII.

De vteri rhagadibus ac fissuris.

Mulier aliqui honesta & pudica, ex defluxu acrimie humorum in orificio vulvæ rhagadas seu fissuras patiebatur. Adhibita purgat. Ex infusione thabarb. cum syrup. violaceo, commode oleum rosaceum cum vnguent. de cerussa adhibuimus, prius tamen ablutis locis cum sero lactis. Ita & Rhaf. ubi calor adest cum acuitate, oleum rosaceum, cum vnguent. de cerussa capit. In altera & hoc nutrito commode vti sumus: olei myrtini, rosacei, ana ℥j. s. succi plantag. & consolidæ, vel pol. polygonii, ana ℥j. lithargyrii ℥ij. cerussa lota ℥j. plumbi vsti, antimonii, boli Armeni, ana ℥s. tricu- rentur subtilissime, & reducuntur ad formam nutriti.

SCHOLIA.

IN vulvæ ostio rimæ, quas Græci rhagadas vocant, ex enixu violento fiunt, teste Paulo libro 3. capite 75. & iuxta Aetium libro 16. capite 109. Etiam circa os vteri, ob acrimie humorum defluxum, loca effringentem & exurentem, fieri solent. Primum sane latent, iuxta eosdem, cum recentes adhuc ex partu sunt dolores: Postea vero paulatim percipiuntur; alias manu, alias in coitu. Nam & propter affricationem cruorem reddunt: certius tamen speculo deprehenduntur: sinu enim dilatato, diruptiones fissuræque in ostioli circuitu oculis patent, vel in ambitu oris vulvæ visuntur. Et sic rhagades proprie sunt fissuræ, quæ fiunt in collo vteri, recto intestino, & labiis aliquando, ob ariditatem, vel ob condylomatum inflationem;

& inflammationem; quamvis condylomata a fissuris, ut postea dicemus, differant; licet quidem aliquando simul, aliquando seorsim spectentur. Et sic quoque rhagades vlcera sunt vteri & sedis diductæ in fissuras. Sed alia humida & saniosa, alia callosa, quædam cancrofa sunt. Humida & saniosa detergentibus & exsiccantibus citius curantur; callosa difficilior; cancrofa sunt maligniora. In eiusmodi ergo (iuxta Aetium) muliebribus locis chirurgiam, atque omne mordicans medicamentum effugere oportet: nam talia inflammationes & convulsiones afferunt: ergo simplicioribus, etiam Paulo admonente, iniectionibus pessulisque utemur, velut ad vlcera superius memorata. Prodest etiam tetrapharmacum dilutum. Ad rhagades quoque utitur Aetius hedricis medicamentis, præcipue iis, quæ e pompholyge, stibio, & plumbo vsto conficiuntur Asclepiadæ. At nos etiam hoc vti poterimus: ℥ vnguenti pompholygos ℥j. aluminis ℥j. misce. Si saniosa, abluuntur a quibusdam sero lactis, deinde tetrapharmaco dissoluto in rosaceo illinuntur. Postea utuntur medicamentis consolidantibus, quæ parantur ex lithargyrio. Si fiant ab humoribus acribus, purgandæ sunt medicamentis præscriptis ad fluorem muliebrem a bile, & optima victus ratione acrimoniam temperare oportet, & illas humectare cibo & potu; atque illos fructus edere, qui acrimoniam humorum frangunt, ut pira, poma, iuscula cum lactucis. Supra partem vnguentum resiccans, ut in vlceribus, applicandum, quale iam diximus. Dum curantur abstinere a coitu, & pars diligentissime obtegatur, ne ab aere frigido lædatur. Callosæ egent mollientibus, cælopo, radice lilii, terebinthina, admista parte iridis Florentinæ; tum veniendum ad ea topica, quæ scripsimus Obseruat. 10. lib. 23. De anni affectibus, & in Scholio eiusdem Observationis. Vide plurima remedia etiam ad rhagades callosas apud Paulum & Aetium locis citatis. Si canceri suspicio sit, valent & illa paulo ante descripta ad canerosos vteri affectus; & diapomphol. cum cerato liquido rosaceo.

OBSERVATIO LIII.

De condylomatibus vteri.

Condylomata (de quibus etiam dicimus Obseruat. 8. & Scholio eiusdem, lib. 23.) sunt velut hypofarcoses, quæ in collo vteri, etiam in sede fluunt, post aliquam vlcerationem, vel inflammationem; quemadmodum & Aetius lib. 16. cap. 108. ex Aspasia annotavit. Condyloma, inquit, est rugæ excrescentia: rugæ enim circa os vteri existentes, dum inflammationem patiuntur, incurvantur & indurantur, & everfionem quandam & crassitudinem in locis efficiunt, præcipue vero in mensium excretionibus, & post partium turbulencias attolluntur, facileque tactu noscuntur. Eiusmodi excrescentias duplicatas & complicatas in vulvæ labiis, versus collum vteri, mulier quædam patiebatur. Cum autem caro esset fungosa, & vrticis marinis similis, adhiberi iussi fomenta exsiccantia &

Prognostica.

Curatio.

4

Rhagades.

Causa.

Signa.

Differentia.

2 astringentia ex decocto gallarum, aluminis, & malicorii. Memini me quoque felicissime vsum fuisse vnguento Ægyptiaco & Apostolorum, vt arroderentur & detergerentur. Aliquando etiam sumsi sublimatum in aqua ros. vel puluerem præcipitatum cum decocto plantag. infundendo e-lychnia, & pannum lineum in ea decoctione, & supra partem adhibendo. Acrius recte iubet, vt fomenta astringentia adhibeantur; & eiusdem facultatis suppositoria applicentur, quæ supra ad sedis condylomata memorauimus; maxime, quod e malicorio & butyro, aut quod e lycio Indico, & æsypo conficitur.

S C H O L I A.

3 D Ictum est prius, quod in vtero fiant rhagades & condylomata, modo simul, modo seorsim. Curantur vero primum condylomata, deinde scissuræ, si simul fiant, vt fiunt magna ex parte. Imo scissuræ veteres, seu rhagades, aliquando in condylomata degenerant: quod vbi contigerit, excindere iubet Paulus, atq; ad cicatricem duci. Cum enim condyloma sit hypofarcosis, siue carnis additio, ablationem sui indicat, tanquam aliquid redundans a toto genere præter naturam. Sed quia condylomata sunt in vna tantum parte, veluti verrucæ pendentes, filo ligantur, & sic alimento destitutæ decedunt, vel abscinduntur nouacula. Sanguis sinendus est aliqua parte fluere, vt pars lenietur sanguine crasso attracto, ex quo fiunt condylomata. Cum autem fiunt in circulo ani, (de quibus antea dictum est) vel in circuitu ani totius, eminentiora & maiora sunt auferenda chirurgia: minora vero, si ferre possunt, medicamentis facile resiccantibus, cum quadam astringentia. Vel si hæc non proficiant, arrodentibus sunt auferenda, vt emplastro diachalcitidis dissoluto in oleo rosaceo, reduplicata quantitate chalcitidis. Pulueres autem videntur magis conuenire ad exsiccationem, qui parantur ex resiccantibus, arrodentibus, constringentibus; quia hæc caro flaccida exsiccanda & constringenda est. Quod si dura esset, & ad naturam durarum verrucarum accederet, abscissione est potius curanda, vel emollientibus; & postea detergentibus exsiccanda, vt facere solemus in scirrho. Sed magna ex parte caro illa est fungosa. Ideo pulueres actu sicci & facultate meliores sunt. Vt: ℞ salmæ exsiccata, & tenuiss. puluerisatæ ℥j. hermodact. vstorum & myrtill. vstorum, ana ℥ij. chalcitid. aluminis, ana ℥ij. auripig. rubri ℥j. reducantur in tenuissimum puluerem, qui supra partem adhibeatur. His pulueribus nonnunquam vtile est, vt in collyriis, admiscere parum rad. mandrag. aut opii, ob sensum partis, quæ medicamenta exsiccantia cum morfu aut arrodentia difficile fert. Laudat & hic Rondeletius, vbi magna copia sanguinis apparet, prius mittere sanguinem e brachio, deinde e poplite; aut cucurbitulas in coxis, vel natibus applicare, cum profunda scarificatione in natibus, & leui in coxis, ad sanguinis deriuationem, in ea parte redundantis. Ait quoque vomitum esse conuenientissimum, & purgationem leuem, aut lenitionem

ventris. Huc etiam pertinent scirrhomata miliaria vteri, ex Actio 16. libro cap. 110. pudendo innata, quæ tactui occurrunt, vel certius speculo deprehenduntur, solentq; Veneris præcipue conficatu menses & conceptum intercipere. In his alius primo purganda, deinde lincolo locus abstergendus, & ex carne carycarum, inguium & alumine scissili imponenda, vel pessus ex alumine & felle, aut medicamenta maturandis discutendisq; panis idonea illinenda: collutionesq; ex aqua mulsa, aut quopiam aromatum decocto, faciendæ. Iam quoque in pudendo & vteri ore (eodem auctore cap. 111.) scabiola pustulæ exoriuntur: la vteri. scabiosa pustula. furfuraceas squamulas emittentes, pruritusque inferentes, & calidæ aquæ perfusione gaudentes: aduersus quas alium asinum lacte purgare, a cœna vomere, in balneo sudare, aquam calidam ingredi, vino cum nitro calfacto, & post vinum, aqua calida collui oportet, locisque licium Indicum; aut amurcam, aut butyrum cum sulphure, aut ceratum myrtinum cum spuma argenti, aut alumen rotundum cum melle, aut malicorium cum myrtino oleo & melle, illinere. Squamas autem & formicas exterit cyclamini radix cum melle illita. Ceterum ab omni acri, salso, acido, in alimentis cauendum.

OBSERVATIO LIV.

De scyphi vteri.

D Iximus libro vigesimotertio, Observatio. 9. de scyphi & thymæ. Istiustica mulier in pudendo laborabat ex lue Venerea: quamuis etiam eiusmodi excrementis etiam sine ista lue contingere possint: quemadmodum euenit matronæ nobilissimæ, quæ ficus nonnullas habebat in officio exteriori ipsius vuluæ, cum intensissimo dolore, ita vt quiescere non posset. Huic consului, quo ab hoc scædo malo liberaretur, cum non esset grauidæ, vt ex talo vena secaretur; vt ita sanguis fecalis, etiam digesto humore melancholico, deinde ater ille humor, expurgaretur. Venit mihi in mentem historia Guainerii, qui ita mulierem, post vniuersalia remedia, curauit: Capiebat picem Hispanicam, & puluerisabat in terreo vase, supra quidem latidum ignitum inflammaturumque guttatim stillare fecit, vt sic pix liquefacta in formam vnguenti coiret: eo oblinebat vteri hæmorrhoides, & ficus, ac dolorem sedabat. Modo accipiebat butyrum recens, & in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo ad formam vnguenti cogebat, eoque mirabiliter dolorem sedabat; etiam appposito succo herbæ Sancti Petri dictæ. Et vbi ardor insignis esset cum dolore, hoc vnguento commode utebatur: ℞ vnguent. popul. ℥ij. croci ℥ij. opii ℥j. vitellum vnius oui recentis: incorporentur simul & locus affectus inungatur. Magna admiratione dolorem sedat. Consului, vt hæc matrona iisdem remediis vteretur.

S C H O L I A.

G Vainerius in Commentariolo suo De agnitionibus matricis, sub vno cap. nempe 12. tracta. de hæmor-

hæmorrhoidibus matricis, moris, & ficis, clavis, siue verrucis, & carne addita. Alii de his seorsim tractant. Hæc etiam pertinent thymi, excrescentiæ turgidæ, de quibus diximus Scholio Observatione 9. libro vigesimo tertio, a corymborum montanæ herbæ similitudine sic dictæ sunt, ut etiam refert Aetius libro decimo quarto, capite quarto. De thymis, sycosis, formicis, verrucis, clavis, reliquisque eminentiis ani, quæ etiam in pudendo mulierum fiunt. Quibus autem a se inuicem differant, iam diximus Scholio Observatione 9. lib. 23. ut non opus sit eadem repetere. Ibi etiam de curatione harum eminentiarum egimus. Reliqua vide apud Aetium loco citato qui curationem longo sermone prosequitur. Ceterum quod ad præsens negotium attinet, moros seu ficus, ex fœcali sanguine ad hæmorrhoides etiam vteri Guainerius refert; & etiam verrucæ ex melancholico humore; vesicales vero & vnales, etiam si in ano apparuerint, ex phlegmate vel sanguine pituitoso fieri vult. Carnem autem additam ex successione vicerum rhagadiarum. Refert, excrescentias tales modo in profundo, modo in collo vteri seu orificio, originem sumere. Profundæ vero nec comprehenduntur, nec curantur: attamen cognoscuntur apparentes, vel tactu vel visu; honestius ex relatu infirmæ. Verrucæ difficulter, aut nunquam, iuxta eundem, sanantur. Ceteræ curationem recipiunt, & magis si ex retentione menstruorum fiant, sanguine melancholico emanante. Aliquæ serico filo ligatæ decidunt. Inungantur eæ oleo seminis lini ex nucleis persicorum; & pul. pinæ combustæ inspergatur, & cortex quere. spongia, aristolochia rotunda æquis partibus in olla furno imposita exsiccentur, ac puluere tali locus affectus cum melle inungatur, puluere super asperso, vel hic, qui fortior existit: *℞ foliorum vitæ, ficus, & ficum immaturarum, ana m. j. viridi erit ʒj. simul ponantur in olla ad furnum, & fiat pul. quo locus oleo de semine lini perunctus aspergatur.* Succus thapsi barbari cum oleo de semine lini istas verrucæ ex excrescentias egregie curat. At Aetius capit. proprio De hæmorrhoidibus vteri, ex Asphasia, lib. 16. cap. 99. Hæmorrhoides, inquit, quandoque in ore vteri, quandoque in collo, quandoque in ipso vase, nonnunquam etiam, licet raro, in pudendo contingunt; quæ quidem interdum tactu, melius tamen speculo deprehenduntur; eademque omnino accidentia inferunt, quæ reliquæ in sede euenientes inferre solent; ac præterea sterilitatem, lumborumque gravitatem purgationis tempore inducunt. Varicosas igitur & maleficas prætermittere oportet: reliquas non aliter curabis, quam quæ in sede oriuntur: duras quidem & modicum cruorem emittentes, neque valis annexas, confestim amputando. Quæ vero cruorem affatim fundunt, eas circa basin orbiculatim scarificabimus, deinde volsella suspendemus, scarificationique nodum innectentes constringemus; quas postea paulatim extensas amputabimus; atque inde antherum medicamentum aridum applicabimus. Quod si absque chirurgico opere malueris hæmorrhoidas arefa-

cere & excœcare, huiusmodi arida appones: spodium, ros. siccas terito, & inspergito: vel acaciæ cum vino austero sabactam, vel Lemnium singulum cum aceto illinito. Si plura desideres remedia, eundem consulito. Idem capit. sequenti facit mentionem de calculo vteri. Sed quomodo is extrahatur, potius ad chirurgiam spectat. De thymis & formicis vteri, & de verrucis, quomodo tales excrescentiæ cum chirurgia & sine chirurgia curentur & de nymphotomia, & cauda vteri, quæ similiter ad chirurgiam spectant; vide apud eundem Aetium libr. 16. cap. 105. 106. & 107.

OBSERVATIO LV.

De vtero imperforato.

Quædam a natiuitate (inquit Aetius libro 16. capite 98.) imperforatum vulvæ meatum habent, idque tripliciter contingit. Quibusdam enim extrinseca figura solida validaque membrana, vel carne agnata conglutinator; aliis sinus ipse; aliis vteri os obstruitur. Hanc membranam ipse specillo dissecat, donec figuram ad naturalem dimensionem duxerit, postea linamentis, quæ ex diuulsi linteoli filis conficiuntur, sectionem replet & apte deligat; tum curationem puri generando idoneam, & cataplasmata aliquot diebus adhibet; & reliquam curationem aptis medicamentis absolvit, ut loco citato videre poteris: mulierem interea supinam, pulvinar intra femora habentem, usque ad cicatricem inductam, servat. Si in sinu sit caro innata, quomodo ea manu chirurgi curari debeat, ibidem docet. Sic filiola illius obstetricis Quirinæ dictæ Alcmarianæ, cum naturalibus fœminarum clausis nata erat: quæ septem annos cum nata esset, mater pro re monstrosa id mihi ostendit. Pinnacula autem sibi cohærebant, & erat parva rima, per quam lotium reddebat. & videbatur tantum membrana coaluisse, quæ facile incidi poterat. Consului, ut enficulo acuto & parvo aperturam faceret; deinde, quæ ad cruenta valerent medicamenta adhiberet. Mater tamen medicastra & obstetrix eo tempore non ausa fuit incisionem tentare. Sed tandem post aliquot annos filiola suæ miserta, incisionem fecit, & filiam viro aptam reddidit: uti postea Delphis Alcmariam redeunti mihi narrauit, insignes quoque gratias agens, quod incisionem eidem commendaueram. Cum autem hæc puella ad me veniret, memini ilico puellæ illius, quæ naturalibus quoque clausis incisione a Beniuenio curata fuit, ut habetur capite vigesimo octavo De abditis causis morborum: e qua, membrana incisa, statim tanta tam ingenti imperu nigrior materia profluxit, ut grande lumen, quod tunc minister admouerat, extinxerit. Nam menses intus retenti fuerant, fuitque dextre ab eo curata. Hæc autem natu maior erat, quam nostra puella.

SCHOLIA.

Tales e Moschione dicuntur Atretæ. Fit tribus modis: pinnaculis sibi cohærentibus; vel, ipsis

Calculus vteri

2

3
атраты.

4 patentibus, in medio sinu muliebri pulpa vel membrana nascitur: veleriam sinu patente, orificium vteri clauditur. Vbi pinnacula coherent, ad tria officia mulieres impediuntur; ad vsum Veneris, purgationem, & conceptum: si in medio sit clausura, communicationem viri & conceptum; si quidem menstrua liquari possunt per cavernam, qua etiam vrina concluditur: si orificium fuerit clausum, non purgantur, nec concipiunt, virum tamen sustinent: si vero caverna, conceptus sit, partus tamen denegatur. Secundum eundem, clauditur & feruore; aliquando cicatrice, præcedente scilicet vulnere, aut durissimo callo. Dicitur & phymos, vel phymosis iuxta *Eginerum lib. 3. cap. 73*. Muliebrium locorum clausura; quæ etiam in pene fieri potest, ut alias diximus: cuius, & exemplum apud Amatum habes *curat. 24. cent. 1.* de quodam cui glans penis non erat a natiuitate perforata, sed circa testes foramen, per quot vrinam reddebat. Iam & ano clausa natos quosdam Beniuennius refert. Ita quandoque vitia quædam hominibus connascuntur, quæ arte subinde corrigi queunt: ut in hac puella, tum illa muliere apud Beniuennium euenit. Quandoque tamen corrigi nequeunt, unde Paulus loco citato: Loci muliebres circa ipsorum os clauduntur, vel ex præcedente exulceratione, vel curata illis inflammatione. Curabuntur tunc infessibus, qui emolliant, ex hydrelæo, & sænngæ decocto, consimilibusque cataplasmatibus & pessulis. Porro si malum inueterauerit, suffimentis vaporibusque aromatum vtendum erit. Iam vero soluit etiam hoc vitium, si nihil aliud sit quam vuluæ ostioli astrictio, pessulus ex hyssopo, nitro, resina & therebinthina. At si pinnacula sint clausa, vel membranæ, facile curari possunt, ut in priori puella Membrana enim facile tollitur & aperitur incisione, & sanguinis meatum non habet, nec aliquando renasci potest. Sed durissimæ pulpæ cum ingenti difficultate præciduntur, moleste sanguinant; & si non sollicitè fuerint curatæ, cito renasci possunt. Harum curationem vide chirurgicam per incisionem apud eundem, & Aetium loco citato. Quemadmodum fit clausura vteri, vel vuluæ quoque nimia arctitudo: ita fit & nimius hiatus ostii vteri. Et quæcunq; ad hiatus vteri commendantur, eadem valent ad violatas ne cognoscantur: quale est per clyisma ex Prisciano, alumen scissum, galla cum vino & ammeo trita ac decocta. Vel si eadem trita feruefeceris, suffitu mentiri virginitem efficit, ut docet Galenus. Alii corticem mali Punici in vino nigro austero decoquunt, alumen quoque adiciunt, & larape si modo indunt. Sic Erotis cap. 35. De modo coarctandi matricem. Nisi de restrictione amplitudinis vuluæ propter honestam causam liceret tractare, nullam de ea mentionem faceremus: sed cum per hanc impediatur aliquando conceptio, necesse est tali impedimento subuenire hoc modo: \mathcal{Z} sang. drac. bol. armen. corticis mali granati, aluminis, mastiches, gallarum ana \mathcal{Z} j. in pul. redige, & omnia simul in aqua calfacta conficiantur;

Vteri clausura
seu phymos.

Curatio.

Ex Maschione,
in parte Har-
monia postero-
ri, cap. 19.

Hiatus ostii v-
teri.

Ad virginitem
post stuprum
restituenda.

& de hac cōf. ctione pone in matricem. Vel hæc, aut similia coquantur in aqua pluuiali, & hac decoctione pudenda fomententur. At quib. modis virginitas cognoscatur, lege Gilbertum Anglicum. Virginitum quoque probatio habetur in libro matricis, ex lapatho trito carbonibus iniecto & suffumigato: si se comminuerit, virgo est.

OBSERVATIO LVI.

De puella ab hernia inguinali curata, si nupserit, num sterilis sit futura, per modum Consultationis.

QVaritur a me, nunquid puella 22. annorum nubilis, statura mediocris, bona & bitudine, quam tamen non viderim, si nupserit, sterilis sit futura, ob herniam inguinalem probe tamen curatam? Et, si non sit futura sterilis, nunquid etiam ob eam causam in partu periclitatura sit? Omisissis aliis causis sterilitatis, tam viri, quam mulieris, pro hoc tempore, quæ si absuerint, quantum ad herniam curatam, videtur mihi, quod ob eam causam solam non erit sterilis: quia illa incisio non peruenit ad matricem, aut collum eius, nec ad membra generationi deputata; ut constat ex Aetio, lib. 16. cap. 103. de inguinali raxu curatione per chirurgiam. Ideo cum membra iam dicta in tali operatione non laeduntur, nihil obstat, quin concipere poterit: & cum cicatrix in puella trium annorum cum ab hernia curaretur, iam dudum coaluerit, & recte sit curata, non rumpetur, & per consequens, ubi conceperit ob hoc non periclitabitur in partu. Non tantum ratione id constat, sed etiam experientia; cum tales mulieres & proles conceperint, retinuerint & feliciter sine periculo pepererint. Id multis hæmorrhoidis contigisse, non solum nos nouimus, sed & mecum vidit Nannius me senior, Medicus ille insignis quorundam apud Amsterdameses, mihi quoque intimus & familiaris. Et, quod magis admirari dignum est, nouimus nos mulierem quandam Alemariam a fratre transfectam per ventrem paulo infra vmbilicum, ut totum ventrem cultro aperuerit, adeo, ut intestina per vulnus propenderent, factaque per chirurgos maiori incisione, ut viderent num intestina essent lassa, iisque recte repositis in locum, quæ quidem virago ipsa cor respiciebat; eandem, inquam, recte conualuisse, & post annos aliquot viro nuptram, & tertio anno filiam quoque peperisse; nec ea in partu periclitata est: quanquam hac quasi virago post filiam illam non amplius conceperit. Hac igitur causa de qua queritur, conceptionem non impedit, neque periculum etiam in partu adferet. Quamobrem me puto huius viri doctissimi ac consularis, qui hanc questionem mihi proposuit, postulati puella nomine satisfecisse. Faxit Deus Opt. Max. ut illa ipsa mater fiat multarum prolium, tam ad corporis, quam animæ salutem. Delphis, ex nostro Museo, anno 1558. 19. die Aprilis.

Petrus Forestus Medicus
ita sentiebat.

SCHOLIA.

FOEmina (inquit Galenus) mare imperfectior est, quoniam & frigidior: et si interea partes genitales cum venis & arteriis omnibus, perquam similes

similes esse videantur, ea videlicet dundaxat differentia, quod hæc intus illæ foras promineant. Nulla sane prorsus in viris pars est, quæ in seminis eadem per resectionem non videatur: verum imperfectiora omnia membra existunt, minusque calida. Et quamuis mas & sæmina principium conferant generationis: tamen initio generationis, sicut maribus contingit, non prodire partes ipsæ mulieri, virtutis imbecillitate. Sed expedit uniuerso, imperfectum cum imperfectiori copuleretur, ex quibus alii progenerarentur. Ita a summo Creatore constitutum est. Nam si sæmella natura calidior esset, maris semen protinus feruor absorberet: quod in bonum propterea cessasse videtur, ad generis humani propagationem. Et quia membrum id intus collocatum est, ob eam rationem & testiculos habent & minores & frigidiores; unde semen frigidius ac humidius provenit, ac pariter imperfectius. Sed matricis situs intus est cauius, ut semen virile suscipiat, atque contineat: propterea in viris colis figura oblonga est, ut semen longius emittat; quod crassum & calidum esse constat. Hinc duo motuum principia cernuntur: nec tamen alterum sine altero, hoc est, maris semine efficere potest; sed ea pariter misceri atque confundi necesse est: etsi de cetero agere, donec animal perficiatur, tum sanguine menstruo opus est, ad conceptus nutritionem. Fœmininum semen per se perficere semen nequit, & ex ambobus motibus, unus exultat communicans motus. Est hoc (inquit idem autor) in gallinaceis conspicuum: concipiunt enim ova, quæ hypneumia dicuntur, hoc est, subuentanea, vel Zephyrina inania ova, sine galli semine orta, quæ fœtum nunquam excludunt, sed incubatu corrumpuntur ocyus: album enim ac luteum ex sæmella habetur: deest tantum gallinacei seminis calidioris perficiens virtus. Ex albo pulli membra constituuntur; ex luteo, quo perficitur animal donec excludatur, alimentum capit. Sic in muliere conceptus mensium facultate, donec in lucem edatur, nutritur. Nā & quas molas vocant de quibus postea in fœminis carnis frustra inertis naturæ informia, ovis subuentaneis similes esse putant: ad id usque adeo procedere fœmininum semen volunt. Quod natura, si fieri potuisset, maxime optasset suum opificium esse immortale, nemini in dubium venit: verum cum per materiam non liceret (nam quod ex arteriis, venis, nervis, & ossibus, ac præterea carne est compositum, incorruptibile id esse non potest) subsidium quod potuit ipsi ad immortalitatem est fabricata. Propterea mirabilem quandam rationem inuenit, quomodo in demortui animalis locum, nouum aliud sufficeret, quo nullum animalis genus pereat, sed incolume semper sit, & quasi immortale. Quare omnibus animalibus concipiendi instrumenta natura instituit; ad generis, inquam, instaurationem. Hæc cum communia sint, cum viris, tum mulieribus; ea propter, eisdem quandoque oblatas, contingit, aut viri, aut mulieris, aut vtriusque ratione, conceptionis impedimentis; quod quidem sterilitas appellatur. Nam nihil aliud est sterilitas,

quam priuatio conceptionis, tempore potissimum quo eandem perficere deberet. Pars igitur genitalium, tum etiam membrorum generantium, tam in viris quam mulieribus hic affecta esse potest. Sic etiam in muliere vterus afficitur tamquam concipiendi instrumentum: quod ex eiusdem vteri propriæ actionis seu usus læsione cognoscitur: ita quoque ut si partes genitales virorum generationi deputatæ fuerint oblætæ. Et sic affectus præter naturam sterilitas est symptoma in genere noxæ functionum ablatarum, vel in membris generationis virorum, aut mulierum, aut vtriusque. Et sic omnino abolita est propria ipsius vteri tanquam instrumenti actio; concipiendi, inquam. Atqui cum sterilis est, non concipit eo tempore, quo concipere debet. Ita quoque sentiendum de membris viri generationi deputatis, si eorum actio fuerit læsa & abolita. Cum & plures huius affectionis causæ esse possint, teste Aristotele 2. De generat. animal. cap. 5. Nam & a primo ortu naturæ locis ad coitum commodis oblectis, & mulieres & viri redduntur, ut alteræ non pubescant, alteri non barbescant. Aliis in processu ætatis idem accidit affectus, aut propter corporis nutritionem plenior, aut ex morbo. Viris humidum, frigidumque emittitur semen, mulieribus purgationes vitiantur. Sic & Aetius lib. 16. cap. 26. Sterilitas aut viri, aut mulieris, aut vtriusque ratione contingit. A viro quidem est, cum semen eius vel feruidum, & veluti torrefactum, vel frigidum, vel tenue, aquosum, languidum, quale decrepitorum est, vel crassius quam oportet, emittitur; vel quod viri semispadones sint, penemque breuissimum habeant, ut in vuluæ recessum semen iaculari nequeant. Quod etiam interdum nimia obesitate contingit: tale enim adeo ventricosi euadunt, ut seminis iaculatio ad profundiores vteri partes impediatur. Iam & qui immodico pene longissimoque procreati sunt infœcundiores esse traduntur; teste quoque Aristot. Ceteris quibus mediocris, propterea quod semen frigidum infœcundum est: refrigeratur autem, quod longe admodum fertur. Sic etiam Paulus lib. 3. cap. 74. Neque pingues liberis procreandis sunt idonei, eo quod genitalibus mutuo se contingere haud possint commode, tum quod momentum seminis emittunt. Neque tamen nimis extenuati liberis operam dare feliciter queunt. Ita ex Cleopatra & Moschione: Masculi valetudinarii, partes conceptui necessarias impeditas habentes non concipiunt; neque frigidi, quibus semen exstinguitur; nec nimium calidi, aut luxuria ac frequentiore Venere eneruati, & sine viribus, ac ebriosi. Erotis quoque: Semen viri nimis tenue infusum matrici, liquiditate sua, inquit, foras labitur: & viri testiculos habentes frigidos, raro aut nunquam generant. Ita & spadofactus & testiculis carens, non generat. Et sic causæ internæ sterilitatem inferunt, testes vitiosi, aut colis vitium, testium abscessus, & simile quid; vlcus, calculi renū vel vesicæ extracti, & inde natum vlcus, colis longitudo, breuitas, foraminis obliquitas, penis mollities, cōuulsio, vlcus, verru-

6
Pars affecta.

Quis affectus præter naturam sit sterilitas.

Causæ secundum Aristot.

7.
Causa cur viri & mulieres non generant.

Causa sterilitatis viri.

8

ca in meatu virgæ, vt semen iaculari non possit, qualis a me curatus fuit, vt superius dictum est. Sic quoq; noui pistorem, cui penis a natura adeo brevis, vt pollicem non excederet, nunquam is genuit. Tumores itaque præter naturam & penis & testium sterilitatem quandoq; adferunt. Sed inter omnia membra, cerebri infirmitas, iecorisque, aut renum, sterilitatem adfert, & quibus post aures venæ perfectæ fuerint, vesica tum aliis membris communicatione læsis non generant, & qui caphuram quoque ebibunt, aut hyoscya- mo cicutaue testes illitos habent, sterilesunt. Ita & virile semē, si nimium vitiatum fuerit, mulieris temperamentum corrumpit. Nam vtriusque se- xus nimia distemperantia conceptum inhibet: qui si forte disiungantur, copulata quadam cum aliis naturæ germanitate, prolem facile suscipi- unt. Fœcunditatis primariam prærogatiuam pos- sident naturæ æqualitas & temperamentum. Se- nectus quoque modo non generat, quod & sexa- gesimo anno plerumque contingit. Tempesta- te tamen nostra, inquit *Benedictus Veronensis, libro vigesimo quinto, capito vndecimo*, quidam Germa- nus nonagenarius prolem suscepit ex casta coniu- ge, quem vidimus. Eadem de Masinissa accepi- mus. Glaciales aquæ gelidæ conceptum inhi- bent, auctore *Aristotele*. Sic causæ externæ multæ, aerque frigidus, aut calidus impense, exercitium vehemens, animique affectus, mœrores, gaudi- um, coitus superfluous, tum aquæ potus, ac alia in- numera aliquo modo sterilitatem inferre pos- sunt, vt latius apud Medicos tum veteres, tum neotericos, videre liceat. Sed nunc præcipuas causas adferamus, quæ peculiariter ad mulieres pertinent. *Mulier* (inquit Aetius loco citato) *sua ipsius ratione non concipit, quod vterum habeat vel calidum & igneum, vel frigidum & humidum, vel squa- lentem & aridum, vel carnosum & pinguem, vel excar- natum & gracilem, vel debilem, vel angustum, vel bre- uem, aut quod vasa eius clausa obstructaque sint, aut ci- catricis superuentu excœcata: aut quod membranae osti- um vteri obstruentes nullum foramen relinquant, aut quod eiusdem vteri ceruix in obliquum ducatur, aut quod ostium sit vel nimis angustum, vel nimis amplum, aut quod quispiam alius affectus eorum, de qui- bus superius diximus, & qui infra dicuntur ab ip- so Aetio vuluam impediât. Sed & inuiti concu- bitus inanes ac steriles sunt: amor enim genitu- ram conciliat: ideo fœminæ amantes creberri- me pariunt. Noui nihilominus aliquas per vim stupratas, semel tantum coeuntes, prima vice in- uitas concepisse. Sic Cleopatra: *Corpus habentes ficcum, & tenues existentes, ac macilentæ, & phibifica, & contra pingues, crassæ & iracundæ, furiosæ, non con- ciunt*: partibus autem mulieres impediuntur, quoties non purgantur, aut orificium matricis obductum habent, vel contortum, aut mem- brana, vel aliqua re aliena clausum, aut callosi- tatem, aut duritiem, aut vulnus, aut si in commu- nicatione viri semen non emittunt. Erotis quo- que inquit: *Habentes matricem leuem & lubricam, semen receptum non retinent: suffocat quoque semen**

Causæ sterili-
tatis mulieris.

Errotis

19
viri aliquando sua humiditate. Verum enimvero in ipsis mulieribus nonnullæ ipsius vteri præter na- turam dispositiones possunt esse causæ sterilita- tis, & præsertim eiusdem intemperaturæ, quem- admodum & ab Hippocrate & Galeno aphorism. 62. §. libr. scriptum est. Namque bene tempe- rati vteri ad conceptionem sunt idonei: male au- tem temperati si parum a bonitate recedant, dif- ficulter concipiunt: si vero nimium, mulieres ste- riles fiunt, & proinde mulieres esse fœcundas si- ne ambabus bonis temperaturis est impossibile, vt inquit *Galenus in Comment.* Appello ambas bo- nas temperaturas, mediocres scilicet, tum ex ca- lidi & frigidi, tum etiam ex humidi & sicci com- mixtione, cum fieri possit, vt secundum vnam oppositionem bene temperatus sit vterus, secun- dum alteram vero male: propterea Hippocrates dicebat: Quæcunque vero ex vtrisque medio- crem habent temperaturam, eæ fœcundæ sunt. Nam ne mulier concipiat, potest altera efficere intemperatura, vt inquit *Galenus*, modo nimium a bonitate recedat. Hæc enim vbi frigida fuerit immodice, adeo quod ex eo vterus spissior effi- ciatur, sterilitatem efficit. Nam angusta quidem erunt supra modum ora vasorum, quæ ad ipsum pertingunt vterum, adeo vt neque secundæ pos- sint adnasci ad iam dicta ora vasorum: neque si hoc fiat aliquando, potest bene nutriri conce- ptus, cum vel nullo modo fiant hisce mulieri- bus purgationes, vel omnino paucæ, & eæ ipsæ vi- riosæ, solo tenuiore ac aquosiore sanguine perla- bente. His item eadem ora facile obstruuntur, & propter natiuam angustiam, & quoniam magna ex parte hæ mulieres humorem aggregant pitui- tosum, siquidem corpus totum fere est vtero si- mile. Ad hæc in talibus vteris contingit etiam maris semen refrigerari, nisi natura sit calidissi- mum. His itaque de causis vteri nimia frigidi- tas conceptionem omnino impedit, ac mulieres steriles facit. Ex nimia quoque humiditate vteri mulieres non concipiunt, vt paulo ante dictum est, cum genitura in his exstinguatur, quemad- modum in terra palustri cerealia semina, ex Gale- ni testimonio præcitato aphorismo: calida quo- que, veluti calidæ terræ, si semina committantur, vt in æstibus sub cane, iuxta eundem. Item sicco- res vteri non concipiunt: nam in ipsis tale quid accidit, quale vbi aut arenæ, aut argilloso terræ, aut petroso mandantur semina, eodem *Galeno* te- ste. Pingues nec macilentæ concipiunt. Accidit quoque ex vitiosorum humorum abundantia, quod mulier non concipit, ob cicatricem indu- ctam si vasa fuerint excœcata, ob vlcera membra- nam osculum vteri obturantem, vel eiusdem an- gustiam, vel amplitudinem, vt dictum est. Si et- iam menses mulieri non omnino prodeant, aut pauciores quam debent, aut plures quam oportet, non concipiunt, ex *Hippoc. auctoritate li. de steri- libus*. Flatus quoq; in vtero existentes impediunt conceptionem, & assumptum pharmacum, coitus inuiti & inanes, Ætas etiam vel iunior, vel pro- uectior conceptum intercipit. Propterea nunc primum

En Hip & G
causæ sterili-
tatis.

11

12. primum pubescentes a Venere arcere oportet, ita ut vir trigessimum annum, mulier decimum octauum attingat. Præcipue vero inepta mulieris forma sterilitati occasionem præstat. Fœcunda enim mulier habere debet proceritatem corporis moderatam, lumborum & lumbinis latitudinem, nates eminentes, commodam alui molem, pectus angustum, mamillas amplas, eiusmodi mulieres fœcundæ. His vero oppositæ steriliores sunt. Postest quidem, præter enumeratas causas, alia quæpiam magis recondita superesse, sed toridem fere sunt quæ noscuntur. Et sic mulier infœcunda est propter affectus eosdem vteri præter naturam, tum seminis sui, tum testiculorum in vltimis cornibus sitorum: si semen sit calidius, frigidius siccius, humidius, ob similem corporis totius & partium principum, & potissimum testiculorum. Sic & virago, mulier barbata, audax, virilis, voce graui, infœcunda est: quia calor multus sanguinem dissipat. Metetrices, quibus attritu multo partes sunt callosæ, non concipiunt, vel raro, cum & lubricæ sint partes, unde vasa spermatica infirma fiunt. Omnes vteri affectus superius descripti, phlegmone, erysipelas, vlcus, abscessus, cancer, vteri procidentia scirrhus, fluores muliebres, & alia antedicta conceptionem impediunt, & semen viri ac mulieris diuerso tempore emissum. Intempestius etiam congressus causa sterilitatis est, cum conceptionis tempus sit, vel incipientibus vel cessantibus mensibus. Reliquo autem alio tempore toto expurgationis, licet aperta fuerint vteri venarum ora, non tamen tunc concipere mulier villo modo potest, cum semen nequeat in vulua remanere, sed ab influentis sanguinis copia eluatur. Cessantibus autem, vel incipientibus mensibus, & ora aperta sunt, & menstruum non multum, neque vniuersum, sed paucum & paulatim effluit, unde efficitur, ut ob asperitatem vuluæ semen adhæreat, satisque alimenti ex sanguinis confluentis paucitate habeat, ante etiam quam menses veruiant, conceptus fieri propterea non valet, quia & alimento caret semen, & adhærentiam nullam inuenit, cum eo tempore oclusis vasis leuis vulua relinquatur: defluit itaque semen, neque vniri cum tunica eius potest: siquidem aspera magis idonea sunt quam leuia ad coalescendum, ex sententia Galen. lib. de dissectione vteri, ut etiam a Donato citatur. Nam si leues fuerint vteri, mulier in ventre non concipit, quoniam licet genituram suscipiant, foras tamen emittunt, ut testatur Hippocr. eodem lib. de sterilibus.

OBSERVATIO LVII.

Num vir aut mulier sterilis sit, per modum Consultationis.

1. Cum varie sint causa, vir nobilissime difficultatis impregnationis, vel sterilitatis, quæris ex me, eo quod ab vxore tua generosa prolem non suscipias, quamuis ipse ante coniugium proles ex concubinis suscepis, nunquid causa hac ad te vel vxorem sit referenda. Intellexi au-

tem ex te, coniugem tuam nobilissimam multum iam pridem vteri fluori, seu muliebri, fuisse obnoxiam, etiam aliquot annis, ita ut illa ipsa, doctissimorum Medicorum consiliis, thermas naturales accesserit, licet nondum aliquid commodi ex eis acceperit. Ego tamen ex vsu aque Porretana, nobilem Matronam Bononiensem ex consilio Elidei præceptoris mei carissimi, ob humidum vterum sterilem existentem, noui tandem concepisse. Ideo verisimile mihi videtur, quod ob phlegmaticas humiditates matricis (ut magna ex parte fieri solet) vxor tua carissima non concipiat, & quod causa sterilitatis potius penes Dominam sit, quam penes te. Nam & humidum vterum habet, in quo genitura facile exstinguitur, multoque magis cum fluore vteri laboret. Hanc autem temperaturam humidam vteri, indicant, teste Paulo Aegineta, in coitu humor destillans tenuius, & copiosum menstruum, multoque magis album profluium. Ideo ait Benedictus, Medicus Veronensis insignis libr. 25. capit. 12. De sterilitatis & fœcunditatis notis, quod illa quibus alba profluvia fiunt, raro concipiunt. Et propterea cum generosa tua vxor iis fuerit remediis vsa, quæ ad fluorem muliebrem conferant, nec ab iisdem adhuc probe curata fuerit, in dubium vertitur nunquid ab ea sterilitatis causa amoueri poterit. Et quia hæc causæ potissimum impediunt conceptionem valde sint diuturnæ, ideo & curatu difficiles. Mulier enim facile lassatur in sumendis medicamentis, & victus rationem stricte obseruando. Nam iisdem ad minus per annum esset insistendum, & nunc maxime coniux tua tadio medicamentorum affecta est, quia iam variis & multis vsa est remediis, etiam Medicorum excellentium, quæ nihil tamen profecerunt. Attamen iisdem adhuc esset insistendum, si recte curari vellet: nam continuata viget, intercisa vero pereunt. Ideo in primis fluor ille albus esset curandus. Natura enim humens a mulieris purgatione ac lubrica si fuerit non concipit, nam facile semen excidit. Præterea ante curationem quidam certis experimentis periculum faciunt, num mulier sterilis sit, necne. Et ita sterilitatis, ut tradunt, indicia deprehenduntur. In olla hordei plena vrina conicitur, decimo die quod erumpit fœcunditatem arguit. Alii surfures imponunt, & vrinam infundunt, ubi vermes progeniti fuerint, sterilitatem indicant. Mulier pariter circumpositis vestimentis, subditaque fumigatione, si ad nares nidor defertur, fœcunda creditur ab Hippocrate, ob apertas videlicet naturales vias. Nam & virginum futura fœcunditas eodem modo speratur. Verum ut sterilitas amoueri queat, causa omnium primo auferenda erit, præter ea quæ ad fluorem muliebrem valere scribuntur. Hic itaque & vteri ratio huius nobilissima Domina habenda est, & ideo cum eius humiditas causa sit, quo minus concipiat, aridioribus alimentis (ut Aetius etiam docet) uti oportebit, plurimum exerceri ac perfricari: & euacuationis auersionisque cause interdum pransam, interdum ieiunam euomere: & cibi parsimonia deficcari, carnesque potius testas videntium ac atate animalium, quam elixas, ac pisces solidiores comedere vinumque potens, meratius quidem, sed partius bibere. Arida præterea fomenta crebro,

4 at balnea perquam raro adhibenda sunt. Qui vero statim a principio desiccantia & adstringentia vtero apponunt, non parum laedunt. Cohibita enim materia ad principes partes recurrit. Sed ubi totum corpus purgatum fuerit, tutius deinceps vero adstringentia & firmantia medicamenta applicabimus. Verum cum & his adsint pituitosi humores, laboribus quidem, ut etiam Paulus suadet, vacuare, sudoribus & vomitu, vel per inferiora, expediet. Et sic materiam pituitosam prius paratam cum decoctis calfacientibus, mox educemus cum diaphoenico, agarico, & similibus, vel pilulis foetide, & de agarico, ana ℥ ℥. vel cum Indo maiore. Deinde post evacuationes convenientes, danda erit ℥j. theriaca, & conveniunt medicamenta descripta apud Guainerium & Fontanum lib. 3. morb. inter capit. 27. De oedematis vteri curatione. Quae valde calfaciunt, & potissimum quae exsiccant, egregie his conveniunt. Nam & Paulus ex medicamentis epithymum, euphorbium quoque, piper, dauci semen, petroselini semen, omnia contrita denarium duum pondere potui dat. Sed modum pro corporis viribus, propter euphorbium, observandum putamus, nam humorem alui turbat, & vterum valide calfacit. At medicamentum ex aloe picra satis erit, etiam a Galeno commendatum ad fluxorem muliebrem, vel dentur turpeti selecti ℥j. ℞. sacchar. ℥j. redigantur in pulverem, qui iure cicero rubrorum exceptus appetente diluculo sumatur. Valent & hic, quae ad hydropem vteri valere Veteres scripserunt. At corpore bene purgato, resiccantia ac astringentia commode vtero applicantur. Huiusmodi sunt, inquit Aetius, lentisci decoctum, item myrti, ros. foliorum rubi, vel tenerorum virgultorum rubi, rhus coriarii, mali punici, florum & gallarum, pillularum cupressi: ex quibus in seculis irrigationes, forus, cataplasmata, iniectiones, pessarij formari poterunt. Adhibet idem & mala cotonea similiter palmulis excepta. Ad nimiam quoque vteri humiditatem huiusmodi potiones conveniunt. Myrti baccas, aut malicorium punici dulcis cum vino terito, & exhibito: aut auellanas nuces vstas, cum vino tritas propinato, ex eodem auctore. Interea utendum iis, quae proprie ad conceptionem faciunt, quibus antiqui utebantur, ut paslinacca erratica foliis, vel semine. Leporis vterum aridum tritum utrique dari iubet idem Aetius, quin ad vulvae fluxiones seminisq; incontinentiam cerebrum leporis assumunt. Iam & leporum coaguli, ac eiusdem fimi pares portiones ex melle coguntur in pessis. Donatus pro remouenda sterilitate pluribus uti consuevit, potissimum ubi orta sterilitas non fuerit ex immodico vteri calore, id quod perrarisime accidit: quorum primum est. ℞ testiculi apri sylvestris exsiccati in umbra, scobis eboris, ana ℥j. testiculorum vulpis. ℥j. ℞. matricis & coaguli leporis. ana ℥j. semin. melon. ℥iij. cum saccharo dissoluto in aqua ros. & melissa fiant morsuli. Vel ℞ semin. seselios, scobis eboris, & matricis leporis in umbra exsiccata, ana ℥j. diambre seu eclegmatu de xyloaloe, ℥j. ℞. cum saccharo in aqua ros. dissoluto figurentur morsuli quibus utatur mulier cum paucis vino albo, aut aqua melissa, seu florum citrangulorum, per plures dies, ante viri congressum, quo etiam tempore pessarij adhibeantur ex coagulo, matrice & stercore leporis, carycis pinguibus, adipe anseris, paucis croco, aut moscho, figu-

6 rati, qui etiam in linteo serico inuoluti, & oleo irino, seu liliaceo intincti subdantur. Habemus & potiones, & pessulos, & suffumigia innumera apud Aetium, lib. 16. capit. 33. Sed haec pauca remedia nunc dicta sufficiant. Interim vngula aromatica, spica, aut cyperus eisdem permisceri poterit. A quibus desinentibus iam mensibus tempore (quod tempus optimum est) medio, multo amore (nam amor genituram conciliat, ut inquit idem Aetius) venus in eunda est. Sed & virum strenuam operam nauare oportet: interimque a Venere abstinuisse, & boni cibi succi nutritum esse, ex eiusdem Aetii decreto, corporisque temperies tum viri, tum mulieribus seruanda, & sine omni excessu. Atque hic puto me satisfecisse tuae petitioni, Vir nobilissime. Faxitque Deus optimus maximus, ut his remediis aptis vxor proles ex dulcibus amplexibus, quippe Venerem & amorem incitant, assequi possit. Vale, 10. die Februar. anno 1570.

Petrus Forestus, reipub. Delphenlis
Medicus, tui obseruantissimus,

SCHOLIA.

7. **C**Aussis sterilitatis Scholio praecedente enucleatis, harum signa diligenter excutienda sunt, antequam vera curandi methodus instituat. Verum cum aliquae causae ad virum pertineant, aliae vero ad mulieres, de viris sterilibus, & quomodo cognoscantur? primo dicemus: deinde vero de mulieribus. Effoeminatum virum sterilem iudicabimus eum, qui timidus existat, actusque muliebres plurimos habeat, & vocem muliebrem, quales eunuchi sunt, barba carentes, & frigidum temperamentum habentes, quod partes circumpositae testibus glabrae commonstrant. Sterilitatis plerumque indicia sunt, si semen genitale frigidum sentiatur, & tardius exeat, pauca adsit voluptas, nullaque coitus appetentia. Nam quibus colis vix tumet, aut erigitur, totumque membrum sit remissum, pilique sunt exiles, vel glabrities est circa testes, quique rubore in coetu mulierum suffunduntur, imberbes, tales intemperiem frigidam testium habent. Quibusdam testiculi conuulsi sunt, paralytici, ulcerati. Aliis maligna aliqua aegritudo praecessit. Quibus & venae circa aures praecisae, aut qui in principe aliquo membro egritudinem tibi notam habeant, vel antea passi sint, vel quibus nimis brevis est virga, vel nimium extensa, aut foraminis adest tortuositas, vel ex quibus lapis chirurgia extractus, testesque intus latent, vel partes genitales ignauae sunt, quae omnia visu, vel relatu aegri ignoscas, quaeque ex penis ac testium, (de quibus antea dictum est) propriis locis petenda sunt, ij, inquam, nunquam, aut raro generant. Sterilem vero, qui ex forti aut potenti calore suo generationis materiam exterminat, ex habitudine eiusque robore comprehendes: ac eum pariter, qui pinguedine nimia sterilis factus est. Nam ab excessu sex rerum non naturalium, tum ex aegri ac astan-

7. Signa sterilitatis, quae ex viris sumuntur.

tium sermone, diligenti examine plura innotescunt. Calidius siquidem temperamentum viri facile deprehenditur ex pilorum copia, potissimum vero nigrorum in partibus genitalibus, & omnibus quæ circumstant, supra quidem vsq; ad media femora. Petulca est etiam hæc temperatura, & ad libidinem prona: statim vero satiatur. Reliqua vide de testium temperatura, apud Galenum in Arte parua, & de sanit. tuenda, & Method. medendi. At vero mulier sterilis dicenda, cuius crassa vox est, pilique multi, & duri rigidique pubem obsepunt, mysticem mentumque barba circumdat: quæque plurimorum virorum amplexus experta est, neque concepit.

Vterorum frigiditatem coniectamus ex suppressis mensibus, neque enim præ nimia crassitudine commode feruntur, sed & stupidus sensus circa pectinem, lumbos ac crura percipitur, aliqua etiam crurum impotentes sunt, victus quoque præcessit frigidior, ac crassi succi. At si prorsus perfrigerata fuerint, ne Venerem quidem appetunt, vteri osculum contractum habent, vt ex Aetio capit. 27. libr. 16. & Paulo cap. 78. libr. 3. liquet. Menses his aut supprimuntur, aut parce fluunt, suntq; decolores, & menses albicantes, non rubri, fluxiles & aquosi, a liquidiore pituita. Coniectatur autem vteri caliditas ex reliqui corporis caliditate, & ex mensium paucitate cum dolore prodeuntium, ita vt pudenda mulieris exulcerent, sed & quæ prodeunt nigriora sunt, & ob nimiam puncturam nullum ordinem seruant. Sequitur etiam ad hanc temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas, celeris excretio seminis: his adest audacia, ira, sitis inexplata, & ad omnia promptitudo, pulsus celer, vrina flaua, menstrua pauca, crassa, calida, flaua, aut ex adustione nigricantia. Signa humiditatis iam diximus Obseruat. præcedente, & quomodo curetur. Adest videlicet hic sæpe vterinus fluor, frequens lumborum & pubis grauitas, Arabes addunt pilos molles, Venerem sopiram, quæ si conceperint, in incremento foetus abortum patiuntur, habentque oculos lachrymosos assidue, vt Erotis ait. Cum enim matrix cerebro per neruos alligata sit, necesse est, vt cerebrum matriçi compatiatur. Vnde si matrix nimiam in se habet humiditatem, ex ea cerebrum impletur, quæ ad oculos redundans, eas inuoluntarie cogit emittere lacrymas. At in vtero siccior humor in coitu ex eisdem haud quaquam destillat: exiguum quoque ac crassum erit menstruum, aderitque totius corporis exsiccatio. Paucus enim adest mensium fluxus, os siccum, labra scissa, coitum appetunt, vt sicca terra rorem; facile irascuntur, corpore tenues sunt, in actu Veneris nihil fere seminis emittunt. Si quando vero prædictæ simplices temperaturæ inuicem misceantur, ex earundem indiciis manifesta erit earum commixtio. Et ita frigidior & humidior ostendet reliquum corpus molle, tactu frigidum, aliosum, fluxus muliebris, perpetua vuluæ humiditas in coitu, plurima, & viro molesta, semen aquosum, quod nequit continere, menses multi fluxiles, aquosi, facultas retentrix imbecilla

ob frigiditatem & humiditatem, vnde facile abortiunt, teste Hipp. Frigidior & siccior indicant menses pauci, rari, crassi, semen paucum, appetentia coitus maior, quam in præcedente, os vteri collum siccum, & ob siccitatem rhagadibus obnoxium, vide aphorism. 57. libr. 5. Si simul ex abundantia humorum vitioforum, dignosces ex iis, quæ de mensium suppressione scripta sunt. Breuiter, si ex sola causa calida sine humore, id per calorem in fundo vteri, per punctiones oculorū, palpebrarum & amaritudinem oris, sitimq; continuam percipies, & per exiguum menstruorum educationem, per appetitum coitus & delectationem. Si cum humoris vitio, aderit pondus & grauedo, & ita in reliquis ex grauitate, cum signis prædominantis ipsius humoris, de quibus ad nauileam iam sæpe dictum est. Si enim ex pinguedine, vel nimia macilentia, ex te ipso dignoscere valebis. Pingues enim, vt diximus ex Paulo, liberis procreandis non sunt idoneæ, eo quod genitalibus mutuo se contingere non possunt. Macilente momentum seminis tantum emittunt, neque extenuatæ materiam habent. Crassarum habitudo facile nota est: e pinguedine enim comprimuntur, & eorum orificia clauduntur. A flatu vteri etiam conceptio impeditur, quem insequitur pectinis, & imi ventris tumor, extensio, dolor pungens, etiam ventus inde erumpens, vt antea, de spiritu incluso dictum est prius. At si per aliquod assumptum pharmacum, vel pessos injectos mulier non concipiat, ex eiusdem mulieris loquela, aut astantium, percipies. Si locellorum vitio eueniat a carnis excrecentia, tuberculo, resolutione, conuulsione, vlcere, apostemate, aut quouis alio vteri vitio, ex propriis locis cognoscuntur. Ita quoque si ob membranæ osculum vteri obturantem fiat, vel ob nimiam eiusdem angustiam, vel amplitudinem, vel quod ceruix vteri obliqua sit, ex obstetricum relatione tum mulierum querimonia percipies. Quibus addas experimenta per aromata, iuxta Hippocratem præcedente Obseruatione dicta, & apud Galenum Comment. aphorism. 62. libr. 5. Vel alium expurgatum pessi modo dormitura subdatur: si odor vel sapor ad os pertingat foecunda est, sin minus sterilis. Hæc ad prognostica pertinent. Si medicamenta sterilitatem inducentia, vasa vteri exercent, incurabilem plerumq; affectionem faciunt: licet quædam portiones cœcitatem curabilem inducant, cui si protinus subuenias mederi possis, ex Aetii testimonio. Quod vero quæcunque præter naturam crassæ sunt, priusquam extenuentur non concipiunt, quod omentum iis os vteri comprimat, constat ex Hippocrat. auctoritate aphorism. 64. libr. 5. & aphor. 44. libr. 5. Præterea menses iis pauci feruntur, quod potissima alimentipars in pinguedinem conuertatur, vt Aetius refert. Quæcunq; præter naturam tenues existentes vterum gerunt, abortiunt priusquam crassescant. Quapropter prius eas reficere oportet. Atq; hos duos habitus præter naturam sterilitatem efficientes ex te ipso facile dignosces. Similiter ex Galeno liquet, quod male temperati vteri, si pa-

Ex abundantia humorum.

Signa si a pinguedine, vel nimia macilentia.

11

A flatu.

Ab assumpto pharmaco.

Ex vitio locellorum ac vteri.

12

Signa prognostica.

13.

rum a bonitate recedunt, difficulter concipiunt, si vero nimium, mulieres steriles fiunt. Si vlcera in vteris fuerint etiam oborta, & si menses, sano modo prodeunt, plerumque incurabilia sunt: & propterea in ventre tales non concipiunt, quam diu vlcera habuerint, *ex sententia eiusdem Hipp. citato lib. de sterilibus*. Mulier puerpera, vel quæ vterum gerit sæpe sanior est, *iuxta Auic.* sed imbecilla & cito senescit. Sterilis contra est valetudinaria, vegeta diu & florens. Similiter post menstruam purgationem humida manet, in vtero lubricat semen. Quæ vteros habent calidos, frigidos, humidos, siccos, non concipiunt, nisi ex contrario semine *aph. 72. lib. 5*. Nec viri, qui semen habent calidum, frigidum, humidum, siccum, generant nisi in contraria vteri temperatura. Galenus tamen hunc damnat aphor. asseritque non esse Hippo. Sterilitas ex occæcatis orificiis vasorum in vtero, & in vteri paruitate, penis breuitate, longitudine insanabilis. Ex lapide dissecto curatu difficilis, nisi roborantibus partem emendemus. Os vteri durum, callosum, cōpressum, quia claudi exacte nequit, conceptum impedit, aut si clauso eo conceptus fit, partum, quia dilatari nequit, supprimit. Durum autem fit, aut a tumore præter naturam, *ut dictum est ex Hippo*. Quibus os vteri durum est, &c. aut a frigore, ex mora longa in aqua frigida, aut sessione longa supra lapidem: aut a cicatrice, post continuitatem solutam: a partu difficili, vel defloratione puellæ iunioris: a balano penis enormiore. Quæ duos aut tres menses a Venere abstinent, conceptui aptiores euadunt, & viri continentes aliquam diu generationi. Ait Gordonius, si semina vtriusque proiciantur in vas plenum aqua frigida: si supernatet, sterilis est, si fundum petat, fecunditatem arguit. Hæmorrhoides & excrementiæ in vtero non videntur recipere curationem, nec foraminis tortuositas virgæ virilis, & paruitas virgæ notatu digna curationem non admittit. Mulier quoque cicatrice e vulnere obducta non curatur: & si concipiat, metus est de morte matris, cum collum dilatari non possit in fœtus exitu, ita ut oporteat chirurgia operire, non sine vitæ periculo. Sterilitas vel difficultas imprægnationis ex verruca, apostemate duro, cancro, non curatur; quia causa remoueri non potest. Sed ob fluxum menstruorum assiduam, vel retentionem, curatur per eorundem curationem: Quæ ex lubrica vulua, difficulter concipit, ex leui causa abortit. Vidi tales, quæ quatuor vicibus admodum breui tempore abortum passæ sunt. Caueant sibi a statione, multa vociferatione & forti, a pondere eleuando, cibis vniuersis, vtantur exsiccantibus. Ad sexagesimum annum mares plurimi gignunt. Compertum tamen est (*ut superius diximus*) ad septuaginta, nonnullos ad septuaginta quinque, & octuaginta sobolem procreasse, sed per paucos, & valentissimos. Quin etiam Masinissam regem post 86. annum filium, quem Methimathum appellauerit, Catonem Censorium octogesimo exacto e clientis sui filia Salonii, generasse clarum est. Mulieres vero ad 45. magna ex parte fecundi-

cant: etsi nonnullæ annos sexaginta natæ, validiores tamen, pepererint. Noui mulierem, cum in Gallia essem, quæ anno ætatis quinquagesimo tertio, peperit, quæ adeo fecunda dicebatur, ut 23. proles pepererit. At viri (teste eodem Actio) qui ob deprauatam viuendi rationem semen corrumpunt, ad magis compositum salubrioremque victum conuersi genituræ fecunditatem acquirunt. Verum qui alienis fœminis oblectati cum propriis vxoribus non conueniunt, seruata pudicitia generabunt. Qui seminis fluore laborant, curati fecundi fiunt. Sic nouimus mulieres alias sexdecim annis viris copulatas, alias octodecim annis quasi steriles, tunc prius concepisse. Ita noui & honestam matronam, quæ cum ex primo viro non concepisset, postea alteri valde fecundo nuptam, neque tunc fecunda fuerit: verum tertio marito copulata, tunc demum concepit. Quod ad curationem attinet, vnicuique causæ sua propria debetur curatio. Si ex mala intemperie, ea ipsa auferenda erit contrariis, eaque inclinanda seu flectenda ad oppositum temperaturæ sui paris. Si simul adsit humor, ilque concoctus, purgandus erit. Si vero aliud vitium vteri fuerit, hoc ipsum propriis remediis remouendum. Nudæ intemperiei sufficiunt, alterantia & roborantia. Iam dictum est, quomodo curantur, si ob humiditatem vteri non concipiant. Si ex frigidityte, vniuersa victus ratio ad calidum vergat: cibi sint boni succi, attenuantesque, ac omnibus alimentis admisceantur, quæ purgationes irritare possunt; veluti sunt olera odorata & acria, scandix, inquam, crythmon, fœniculū, gingidiū, apium, smyrnium, tū alia: ac speciatim victum præscribendo, qualē diximus de mensiū suppressione ex frigidis succis. Reuocabimus & calorem fomentis, & potionibus, *iuxta Aetium lib. 16. cap. 26.* ex castorio, cumino, aniso, pulegio, & lumbos inungemus irino & amaracino vnguento, & pessis vtetur e myrrha, ruta, galbano, & castorio. Vel validioribus etiā, felle bubulo adiecto, molli lana inuolutis, ut sine corporis erosionē attractionem perficiant: neque difficile est eorum quantitatem metiri. Pro affectuum magnitudine, & diuturnitate medicamentorum, vires augebimus, eisdemque insistemus, vel contra minuemus, breuique tempore applicabimus. Sunt tamen sæpe causæ impediētes conceptionem, ut plurimum diuturnæ: ideo obnixe persuadendum, ne mulier, aut vir, si in causa sit, cito medicamentorum tædiis afficiantur aut lassentur, & curandum, ne Medicus in iis administrandis deficiat. Nam res aliquando eo deuenit, ut per integrum annum vel duos, vterque desistere non debeat, ut Valeriscus recte annotauit. Verum ubi frigidi etiam & crassi succi cum frigida vteri intemperie redundarint, post eorum coctionem ac præparationem, purgante medicamento vacuandi sunt: quorum copiam etiam loco iam citato inuenies, *tum apud Aetium loco citato, & 631.* Laudat is & vomitum per interualla: postea adhibet iam dicta: qualia & Paulus etiam præscribit, *ut ad longum videre licet, libro tertio, capit. 74.* Verum si caliditas vteri sit in causa

16.
CuratioFrigidi vteri
curatio.

17.

<sup>re caliditate
vri, curatio.</sup>
18 <sup>propter vteri
sterilitatem non
conspicitur, et
19</sup> causa, humidiora alimenta conueniunt; vt mal-
uæ, lactuæ, bliti, cucurbitæ, atriplex, portulaca,
cucumeres, vinum album & dilutum, somnus, ac
dulcium aquarum balnea. Lumbis vero ac sumi-
ni, refrigerantia adhibenda sunt; vt solani aut
vmbilici Veneris succus rosaceo admixtus, ac la-
na exceptus; quem etiam in sinum pudoris utili-
ter imponemus: mercurialis præterea lumbis &
pubi illita calidioribus vteris confert. Idem po-
test spuma argenti; & cerussa, si ex aqua terantur:
quorum omnium quantitatem, inquit Aetius, re-
cte metieris, si semper singula quæq; multum posse
arbitreris: ita enim refrigerationis nimietatem
cauebis. Quod si cum calida vteri intemperie, ca-
lidi ac vitiosi redundarint succi, iidem etiam prius
purgandi sunt, concoctis ipsis ac præparatis, seu a
natura deuictis; vt exemplo mox ostendemus.
Nam quoad menses, morbofi fuerint, siue biliosi,
siue pituitosi existerint, mulier nõ concipit, vt liquet
ex Hippoc. eodem lib. de sterilibus. Mulieri vero, quæ
ob vteri siccitatem non concipit, constat ex Aetio
lib. 80. c. 40. humidiora alimenta offerenda esse: toto
enim corpore humefacto, vterus quoque eiusdem
qualitatis particeps erit. Valentque balnea, inun-
ctiones, cataplasmata, infusiones, & omnia hu-
medandi vim habentia. Sed antequam ad alias
causas amouendas procedamus, exemplum se-
quens interponamus.

OBSERVATIO LVIII.

De difficultate imprægnationis in duabus mu-
lieribus, vna pituitosa, altera
biliosa.

1 **Q**uidam differentiam faciunt (vt Guainerius)
inter sterilitatem & difficultatem imprægna-
tionis. Voluntque, sterilitatem esse dispositio-
nem quandam, a generatione vel tempore ac-
quisitam, per quam vir siue mulier, ad produ-
cendum sibi simile impotentes sint. Imprægna-
tionis difficultatem, aiunt, esse dispositionem, in
viro aut muliere ex tempore aut a principio gene-
rationis acquisitam, per quam, etsi eo tempore
ad sibi simile generandum impotentes fiant; ta-
men beneficio medici, vel alia re, talis impotentia
remoueri potest. Videmus enim aliquando, quod
habitudinis dislocato, sterilitatis, vel potius im-
prægnationis difficultatis, principalis causa exis-
tat. Hinc, vt diximus, bis coniugio copulati viri,
aut mulieres, primo sæpe sunt steriles: si inde vir
cum secunda copuletur, generabit aliquando;
aut mulier secundum nupta concipiet. At quam-
uis propter causam corrigibilem, difficultatem
imprægnationis vocant, easdem tamen causas
cum sterilitate ponunt; vt Guainerius facit in suo
commentariolo, de ægritudinibus matricis: de
quibus nunc satis, tam ad virum, quam mulierem
pertinentibus, diximus. Interea tamen, si vtrum-
que sterilem nouerimus, procreandæ prolis, nul-
la spes habebitur: eorumq; curationem relinqui-
mus: quamuis vna haberi potest, si fiat coniugii
mutatio, vt contingit in maleficiatis. Quod si sola
mulier in causa fuerit, diligenter eandem consi-

derabimus. Ita istis diebus mulier pituitosa, cum
ob humiditates, & succos pituitosos imprægnari
non posset, consultandi causa me accessit. Signis
iam probe inuestigatis, cum intemperies minime
simplex, frigida & humida, vteri adesset, verum
etiam cum humoribus pituitosis; consului, vt
hoc apozemate digerente, vel simili, primo vte-
retur: ℞. rad. brusci, asparagi, fœniculi, cyperi, rubia
tinctorum ana ℥ j. artemisia, betonica, sabina (quia
aderant humiditates pituitosæ, instar floris albi)
mentha, melissa, maiorana, ana m. j. rad. inula, asa-
ri ana ℥ ij. sem. anisi, fœselis, dauci ana ℥ j. flor. an-
thos, stœchados arab. ana p. j. calom. arom. incisi ℥ ij.
passul. ℥ j. glycyrrhiz. ℥ ij. fiat decoct. in aqua com-
muni pro ℔ j. β. dulcoretur saccharo & melle; fiat ad
modum syrup. longi & arom. cum paucis cinnamomi
& nucis moschata. Materia parata purgetur cum
pilulis fœtidis, dando ℥ j. vel cum diaphœnic. & e-
lect. Indi ana ℥ ij. β. cum aqua artemis. ℥ ij. Vel de-
tur diacarthami soliti ℥ β. in tabulis. A ventris de-
iectione quidam & hic balnea naturalia com-
mendant: quæ, si desunt, fiant ex herbis iam di-
ctis, & radicibus; vt de superfluitatibus humidis
matricis, & fluore muliebri ante diximus. In exitu
detur ℥ j. theriaca. Et vbi non amplius fluunt hu-
miditates, tunc vtendum exsiccantibus, adiectis
in balneo balauistiis, mentha, corticibus olibani,
mastiche: fiantq; pessi ex myrrha, alumine, aloe,
& storace calamita. Deinde veniendum ad ea,
quæ matricem præparant ad conceptionem, vt
fumigia ex ladano, myrrha, galbano, baccis lau-
ri: quorum copiam inuenies apud Guainerium,
de iis, quæ extra admota ad conceptionem præ-
parant. Habet idem multa remedia, sed supersti-
tiosa. Eriam eo tempore, quæ ad coitus delecta-
tionem faciunt, non omittenda: qualia diximus
ad Venerem sopitam conuenire, & virgæ erectio-
nem; vt sunt oscula suauia, suctio labiorum, ample-
xus incundi, & alia apud eundem Guainerium
descripta cap. 24. Quibus etiam simplicia Vene-
rem instigantia addere possemus, vt apud eun-
dem medicus domesticus legere poterit. Omnia
hic recensere non opus est. Ideo & hic auxilia tam
viris, quam mulieribus communia adhibenda, vt
corpora in quodam temperamento, cibo, exerci-
tationibus seruentur. Iuuant calfacientia; ex ole-
ribus, eruca, erysimum: vitanda ruta & calamintha.
Profunt & redolentia olera, scandix, marathrum,
apium, smyrnium. Conceptus adiuuare credun-
tur pastinacæ erraticæ folia & semen, & caucalis
potus. Marem præterea concipi putant, si vulua
leporis in cibo sumatur, & testiculis & coagulo
epoto. Altera vero mulier biliosa, cum difficul-
ter imprægnaretur, me quoque consuluit. Hæc
enim propter humiditatem biliosam, cum a-
crimonia ex succis biliosis, concipere non po-
terat. Cum leuiter plethora, sed exigua labora-
ret, vt venam ex talo seu saphena incideret, iussi,
sed in exigua quantitate. Ast si sanguinea fuisset,
& maiori plethora laborasset, venam prius basili-
cam, deinde ex talo incisam, magis commen-
darem. Qualia autem sanguineis conueniant,

4 quæ difficulter imprægnantur, vide apud Guainerium lib. citato cap. 27. Ceterum in hac muliere, ut materia biliosa, victu humectante & refrigerante, moderate contemperaretur, præcepimus: iis adhibitis quoque, quæ præcedente Scholio diximus, caliditati vteri convenire. Interim cum syr. & decoct. ex viol. lactuc. end. scariola, & similibus, materiam paratam euacuari iussimus, cum cassia & manna & syrup. ex infus. ros. pallid. cum rhab. modo etiam cum pilulis de rhabarbar. & aggreg. deinde & corroboracione facta cum tribus sant. & similibus. Etiam si balneo vti vellet, quale descripsimus de fluore bilioso, concessimus; & ut hoc pello vteretur, qui proprietate sua abundantem in superfluitatibus biliosis matricem ad conceptionem præparat: *℞. medulla cervi vituli, cerebri cervi, butyri vaccini, adipis caprarum, seminis mercurialis ana ℥ ss. acacia, hypocist. sandal. rub. storacis liquida, cornu cervi vsti ana ℥ ij. cum oleo ros. incorporentur, & fiant pelli filo appenso, ut extrahi possint.* Deinde adhibeantur ea, quæ ab auctoribus descripta sunt, valere ad conceptionem. Hoc tamen semper præmonito, quod mulieres, quas ad conceptum facilitate volumus, sint curandæ euacuando medicamentis leuiter laxantibus, abstinendo ab opiatibus, resiccantibus, multum & semen absumentibus. Sunt autem nutriendæ alimentis Venerem excitantibus, quæ tardiores sunt. Hoc tantum (ut dicebat Rondeletius) remediis addere oportet, quod eis pessaria alia conficienda sunt, post exactam vteri purgationem, os vteri interius dilatando (minus tamen in biliosis, ubi acrimonia humorum adest) exterius constringendo. Dilatatur autem vterus vnguento ex adipibus a Rondeletio descriptis cap. de mensibus retentis, aucta dosi radic. iridis, & additis ℥ ij. styracis, & ℥ j. tereb. abietis. Sed magis in frigidis, & post usum illius vng. vtitur nascali, seu pello ex fellibus hirci vel lupi cum moscho, castorio & zibetto. Hæc enim omnia laxant, & vterum deorsum trahunt, calfaciuntque, Venerem stimulant, ut & stercus murium. Minus tamen, ut diximus, in biliosis. Exterior pars constringitur fotu. parato ex rad. herbis, floribus, & aliis constringentibus odoratis. Ut: *℞. rad. bistortæ, quinquesfolii, & cyperi ana q. j. ros. rub. cum calicibus, corticis mali granati, & balaustiorum ana ℥ j. suberis ℥ ss. hedera m. j. fiat decoctio in aqua & pauculo vino adstringente.* Foueat pars in introitu lecti. Post mensium purgationem, & usum aliorum remediorum, paulo antequam congressura sit cum viro, quia magna ex parte mulieres non concipiunt, cum semen non trahunt: aut tractum non retinent, emplastra supra vterum & renes ponenda erunt. His, quæ non trahunt semen, emplastrum ceroneum, & alia, quæ ex gummis, aliisq; attrahentibus conficiuntur, erunt ex usu. His vero, quæ non retinent, emplastra constringentia, vtcunque calida, quale est, comissa, pro matrice, de pelle arietina, de mastiche, additis rad. bistortæ ℥ ij. ladana, hypocistid. ana ℥ j. misce, fiat emplastrum; quod gestent, donec appe-

5 7
tat tempus alterius purgationis. Eo enim tempore amouenda sunt emplastra astringentia, ne menses retineant; nisi in quibus maior sanguinis copia fluit, quam pro corporis habitu conveniat. Si mulier non concipiat, ob salacitatem, & nimiam ad Venerem propensionem, quod ob acrimoniam seminis, & caliditatem fit, ut in hac vltima nostra muliere, alenda est crassis alimentis, quæ sanguinem inspissent, & semen crassius reddant. Vtus fructuum ex utilis; ut pirorum, pomorum, castanearum, quæ crassos humores, & crassos gignunt flatus, impetumque illum retardant. At stuphis vtuntur mulieres humidiores; balneis vero durum habentes vterum, aut frigidum: sed his vtendum paulo antequam fluant menses. Si mulieres sint valde obesæ, extenuandæ sunt usu medicamentorum calidorum, & incidentium, & aperientium, & tenui victu diu, antequam vtantur remediis supradictis. Postea illas optimis cibis, multumque sanguinem generantibus, oportet rursus nutrire; & imperare frictiones cucurbitas, aliaque remedia, quibus vsi sumus ad singularem deorsum trahendum. In illis constringitur os vteri, si credimus Hippocrati ab epiplo, quod ad os vsque pubis descendit. In frigidioribus ergo & humidioribus mulieribus, ut in priore hac nostra muliere, utile erit vti hac opiata, siue humiditas sit in toto corpore, siue in vtero tantum: *℞. confer. ring. & cort. citri ana ℥ j. confer. anthos, zinzib. conditi ana ℥ j. ss. cineris priapi tauri, & cineris vteri leporis ana ℥ ss. puluer. diagal. diamo, chi dulc. vel diambra ana ℥ ij. pinear. & auellan. ana ℥ iij. zacch. parum, cum syr. conferuat. cortic. citri fiat opiata: de qua capiat ad magnitudinem auellanæ longe a pastu, cum ibit dormitum.* Hæc opiata magis convenit frigidis & humidis toto corpore. Nam si vterus tantum frigidus & humidus sit, & totum corpus calidum & liccum, satius erit, fumigio per embotum recepto exsiccare, ex odoratis resiccantibus, & leuiter adstringentibus, ut: *℞. nucis moschata, macis, beniouini, styrac. ana ℥ ij. castor. ℥ ss. alypta moschata, vel gallia moschata ℥ ij. cariophyll. ladani puri ana ℥ j. zinzib. cinnamomi, folii spicanardi ana ℥ ij. excipiantur omnia terebinth. & fiant trochisci,* quibus famigetur mane & sero post mensium purgationem. Illis opiata utilis erit, si augeatur dosis pinearum & auellan. in lacte simul, & pauculo melle mixtis, subinde remouendo lac, ne acescat, & recens infundendo. Talis reficiet corpus exsiccatum, & copiam seminis generabit. In istis opiatibus adduntur multa alia exsiccantia, quæ si per se sicca assumerentur, potius impedirent quam iuuarent. Sed quia permiscuntur syr. & rebus dulcibus temperantur, conueniunt: & rasura eboris, & cornu capræ, semen seselli, medulla seminis fraxini (linguam auis vocant:) addentur & passerum cerebella, quamuis magis in cibo sint assumenda, quam ut præmissis miscantur. Nam iuuant, quod multum seminis generent: id non possunt facere, si in pauca quantitate assumantur. Satius erit cerebellum porcelli, & porci,

porci, diligenter coctum cum pauco origano, postea fruxum in sartagine, edere. Multum enim nutrit & semen auget. Opiata ad mulieres salaciores confici debet ex leniter astringentibus, & copiam seminis generantibus, parum calidis. Vt: *℞. myrob. condit. embl. & cheb. ana n. ij. corticis citri conditi cum saccharo (in aliis melle) ℥ j. pinearum infusi in lacte, seminis fraxini eodem modo infusi, ana ℥ ss. syrup. de pennis redolentibus fiat opiata, additis ras. eboris & cornu capra. ana ℥ ij. capiat ad quantitatem auellanae.* Quæ minus propensæ ad Venerem sunt, gestent ambram vel moschum, vel chirothecas odoratas: & maxime noctu habeant sub puluinariis, nisi obnoxie sint suffocationi vteri. Tunc enim melius esset illa odorata coxis alligata habere, vt egregie iam pridem Rodeletius admonuit.

SCHOLIA.

Satis iam constat, quibus modis intemperies vteri simplex, vel cum humore, si causa sit sterilitatis vel difficultatis imprægnationis, sit curanda. Intemperie itaque illa, & humoribus purgatis, ad remedia quæ proprie ad imprægnationem faciunt accedimus. Eorum alia id qualitate præstant, vel per delectationem vteri in actu coeundi adferendo; vel actiuam vim eiusdem excitando: alia quidem id præstant quadam stipticitate roborando vim retentiuam ad conceptum. A proprietate valent, vt etiam ante dictum est, coagulum leporis, stercus vulpis, medulla ossis cerui vel vituli, vterus leporis, & alia multa a Medicis descripta. A qualitate vero conferunt, vterum delectando, & vim attractiuam excitando, cinnamomum, cubebæ, masticata & cum salua virgæ inuncta: ziberrum, moschus, foramini virgæ imposita ante coitum, & oleum balsami, si habeatur. Quæ autem vterum qualitate roborant, exsiccant, retinent, sunt balnea stiptica, aromatica, & fatus, ac fumigia, quorum exempla plurima, præter iam dicta, apud auctores inuenies. In omni curatione oportet, vt causa amoueatur: quæ cum varia sit, tam in viris, quam in mulieribus, ea ipsa semper corrigenda. Ita in viris si longo morbo detineantur, nisi ab illo curentur, non possunt generare. Sic aliquem noui, qui, cum duobus annis ex quo vxorem duxerat valetudinarius fuisset, curatus postea singulis annis ex vxore prolem suscepit, vsque ad numerum vigesimum. Si igitur debilitas corporis in causa sit, corpus cibis resumptiuis reficiatur, & si adsit frigus neruorum virgæ, eiusque mollificatio, curetur, vt paralytis: alioqui si sperma ipsum vel genitalia frigore laborant, vtantur vnguentis calfacientibus. Si adsit paucitas inflationis, quæ Venerem incitent & inflent, vt fabæ, præscribantur. Si siccitas sit in causa, humectentur; & si caliditas, infrigidentur. Et si virga nimis curta est, (non enim turpe est Medico teste Auicenna cap. 44. de his loqui) in coitu ipso crura mulieris eleuentur, vt semen recipiatur. Frictio in adipibus calidis, & cibus multiplicent sanguinem, magnificat virgam. Si nimis magna, vt tota virga non im-

mittatur, iubet Gordonius, vt mulier strictam cum manu teneat, ne semen in via refrigeretur. At si adsit phymosis, quomodo curetur, prius dictum est. Ita in muliere, si collum vteri clausum est, vel callosum, relaxantibus pessis emolliendum: de quibus videas *Cleopatram cap. 3. de Harmonia gyneciorum.* Si adsint alia vitia in vtero ex supradictis, prius tollenda, Angustia ipsa infessionibus, fomentis, perfusionibus curanda cum emollientibus. Nimia apertura constringenda. Ita & Aetius cap. 31. lib. 10. de diuersis affectibus vteri curandis, quorum ratione mulieres non concipiunt, inquit: *Clausos vteros odoratorum perfusionibus, & mollitoriis ex anserino adipe confectis aperire oportebit:* prius tamen a mollioribus infessionibus & abluitionibus incoabimus, sicut & fœnugræc. sem. lini, oleo probo, interdum & melle præparatis. Postea ad validiora pergemus, vt artemisiam, conyzam, calamintham, pulegium, amaracum; his etiam adiicientes irinum ligustrinumque vnguentum: & mel, myrrha, aut troglodytica, terebinthina, nitrum, cassia, carycarum carnes, vnguentum amaracinum, & huiusmodi, supponantur. At his quæ ob vterum, seu vteri os nimium fatiscens, non concipiunt, aridus victus, aridaque fomenta conueniunt, medicamentaque adstringentia, quæ supponantur, vt hians ostium occludatur: qualia sunt galorum decoctum, cytini, lentisc. rub. myrr. & eiusmodi. Postremo vteri auersiones mollientibus fomentis dirigemus: id enim fomenta maxime possunt. Sed & mollitorii pessuli vtiliter supponuntur. Imo specillo & digito correctionem interdum tentabimus. Præcipue vero pulegii, & artemisæ, decocta, & castorium e posca bibitum, vtero auerso conferre solent: omninoque tota curatio declinationis huic vsui accommodabitur. At si ob humorum crassitudinem mulier non concipiat, humorem (Inquit Aetius) spectare oportet: ad mordicantem quidem seri lactis heminas quinque paulatim exhibendo contemperabis, cibosque boni succi offeres: vomitumque ex intervallo prouocabis. Pituitam vero & aquositatem laboribus exercitiisque plurimis, & in sudorem resoluentibus, crebroque vomitu absumes: atque ægra interim sufficet castorium ingiter bibere, ac sufficiens foueri. Sed quoniam flatus quoque vteri conceptionem impediunt, & flatus ab imperfecta coctione fiunt; primo quidem parcitas cibi adhibenda est, deinde quæ expellendo flatui conueniunt, sicut ruta, cuminum, ac reliqua consueta semina & aromata: quæ etiam supponi possunt, præcipue ruta cum melle & modico nitro: atque ex iisdem fomenta confici possunt, & cataplasmata, ac cerata, pubi applicanda. A leguminibus autem, dulcibusque eduliis, & flatuosis omnibus abstinendum. Sed si medicamentorum violentia sterilitas inducta fuerit, eius medicamenti facultas noscenda est, nunc quid attractione semen eluerit, an flatuum multitudinem eiecerit, an multa astrictione os vteri obstruxerit, genituræque aditum interceperit;

11

Ad vteri clausos.

12

Ad vteri os nimium debilem.

Ad vteri auersiones si non concipiunt.

Si mulier ob humorum crassitudinem non concipiat, quid faciendum.

Si a flatu vteri conceptio impeditur, quid faciendum.

Sterilitas a medicamentorum violentia inducta, quomodo curetur.

Causa difficultatis imprægnationis seu sterilitatis amouenda.

14
De his, quæ non
concipiunt ob
medicamentum
ad sterilitatem
inducendum.

& inde singulis erroribus occurrendum, perfusionibus & infussionibus, prout unicuique congruit: quæ præcipue viles erunt, si forte os vulvæ & acerbula adstricta sint. Pinguia etiam cuncta & fomenta adhiberi oportet, ac quæcunque humiditates attrahere possunt. Medicamenta sterilitatem inducentia, si vasa uteri excæcent, insanabilem plerumque morbum efficiunt. Ea tamen medicamenta non statim omnes penitus vires adimunt: quædam enim poriones locis demtilem cæcitatem afferunt, cui si protinus occurras, interdum mederi poteris. Quemadmodum enim lethalia venena statim vomitu, aut clystere, aut congruo ad eos usus medicamento exsoluntur; temporis vero progressu nullo consilio emendari queunt: ita quæ valde sterilitatem inducunt, si ilico aggrediaris, licebit quandoque depellere; sin diutius perseverauerint, insanabilia reddentur. Hæc quoad istas causas. Ulcera autem vulvæ, & inflammationes quemadmodum curare oporteat, & quomodo carnis excrescentias, thymos, & tuniculas auferre, singula in propriis locis feratim declarauimus. Proin superuacuum est eadem sæpius repetere. Si vero nulla re infesta, vel in utero, vel in reliquo corpore apparente, incompertum sit, cur mulier non concipiat, eam a finino lacte purgabimus, cibisque boni succi alemus, ac fomentis, suffumigiisque odoratis; & pessulis os uteri aperiemus, & sanguinem enacuabimus, Veneremque per duos aut tres menses (*inquit idem Aetius*) prohibebimus. Ita & de aliis omnibus causis statuendum. Si habitus sit gracilis, reficiatur: si sit obesus, extenuetur; si sit vlcus cicatrix, membrana os uteri obrutans, mensium suppressio, seu immodicus fluor & intempestivus, curentur singula, ut propriis locis dictum est. Nos multas vidimus mulieres quæ ob menses retentos non concipiebant: sed iis ex consilio nostro arte, vel natura apertis facile imprægnabatur. Ita quoque quædam iisdem nimium fluentibus restrictis, tandem conceperunt.

OBSERVATIO LIX.

De dubia conceptione, vel imprægnatione.

MVlier annos 34. nata, in pago Egmondano, Houæo dicto, prope Alcmariam, multis symptomatibus affecta decumbebat, anno 1557. Alii gravidam esse, alii vero non concepisse, dicebant: aderant & qui molam in utero habere suspicabantur. Cum ad eam 14. Aprilis accerferet, quatuor iam vel quinque diebus suppressione urina laborauerat, cui & ventris tumor ac pedum aderat, & facies inflata: quæ licet in prægnante aliquando adesse solet, sunt tamen etiam in mola uteri, quam iecore refrigerato, hydrops subsequi solet. Et ipsa quoque ad hydropem tendere videbatur. Constanter tamen modo se gravidam esse dicebat; postea rursus dubitans, idem negabat. Afficiebatur intensissimo dolore, circa imum ventrem, urina in totum suppressa, ut per 5. dies neq; dormire, neq; quicquam edulii sumere potuerit; licet minime febricitaret. Sed & hoc

malum accesserat ab obstetrice imperita, quæ medicamenta per os, nescio quæ, exhibuerat, unde & vomitus enormis processerat. Quartus erat mensis, quod se rursus gravidam esse diceret. Sed pectini apposita parietaria, decocta cum vino Rhenano, pauco adiecto oleo scorpionis, & assumpto decocto parietariæ, malvæ cum radicibus, adiectis granis aliquot alkekengi, & cumino, cum liquir. minxit, & dolor sedatus est. Et quanquam Oribasius ex Galen. dicat, cuminum menses provocare, hic tamen prius maceratum in aceto gravidæ mulieri obesæ & pituitosæ nihil obfuit. Postea tamen iterum rediit dolor 21. Aprilis, ac me rursus vocavit. Præscripsi clysterem in hunc modum: *℞ malva m. j. meliloti m. j. cumini, sem. lini, fenugrac. an. ʒ. ʒ. carui, ammeos ana ʒ. j. ʒ. fiat decoctio in sero lactis* (nam feces erant valde induratae) *pro lb. j. adde olei olivæ ʒ. j. ʒ. sacchar. rub. ʒ. j. duo vitella ouor. salis communis ʒ. j. ʒ. repide injectum fuit;* & multis ventositatibus reiectis, liberius mingere potuit, dolore etiam iterum sedato. At postea curationem reliquit, cum paupercula esset. Verum post aliquot dies iterum iisdem doloribus affecta, cum illam inuisere non possem. Alcmariam venit, ut integre curari posset. Fœtum tunc nullo modo sentiebat, putabatq; esse mortuum, vel molam esse, ventre, tum cruribus magis intumescens. Sed inuestigatis signis fœtus mortui, cum ventrem duriores, lumenque calidum more solito haberet, ut tactu percipiebam, neque anhelitus eidem fœteret, nullo modo fœtum mortuum esse recte e-
bam; neque molam uteri adesse, cum antea perfecte motum fœtus sensisset. Verum ut hæc certo mihi constarent, obstetricem peritam vocari iussi; cui mandabam, ut digito molliter os uteri contingeret: quod cum molle diceret, mulierem concepisse, *ut latius in scholio dicturi sumus, de signis conceptionis, dixi.* Obstetrix addebat, fœtum ad ostium uteri subsidere: quod neque credebam: facile enim abortus subsequutus fuisset. Atque adeo mirum erat, aut fœtum non mortuum esse, aut abortum non subsequutum; quum prior obstetrix medicamentum vomitorium mulierculæ propinasset atque illi imperasset, ut anhelitum eo tempore comprimeret, unumq; pedem supra alium poneret. Abhorrendum profecto cōsiliū. Sed ego priore experimento contentus eram: cum os uteri oclusum esset, & molle. Alius tamen medicus accersitus dicebat, illam minime gravidam esse, & proposuit, medicamenta esse propinanda, quæ euocarent menses, & abortum facerent, cum molam uteri esse, contenderet. Ast ego rationibus firmis persistebam, illam gravidam esse, cum & mamillæ manerent duræ. Quare usus sum lenioribus remediis, ad cachexiam valentibus, ut radicib. & seminibus fœniculi, cum parietaria, cherefolio & alkekengi, cum difficulter meieret, in vino Rhenano decoctis: quibus tandem facies, tum crura detumuerunt & urinam libere reddere potuit; licet ob imbecillitatem fœtum non ita sentiret. Tandem ita procedendo, usque ad mensem Maium, paulatim omnia acci-

dencia

Enarrationum
in quibus nihil
in sensum appa-
ret.

dentia dicta cessarunt, & fœtum viuum naturaliter se sentire dixit; & dolor in totum ablatum est, & etura pristinae sanitati paulatim restituta, vt nunc recte inambulare potuerit, quod antea facere minime poterat: atque ita, etsi grauida existens, omnibus admirantibus, perfecte curata fuit, & nono mense completo feliciter peperit.

S C H O L I A.

C Aput alii integrum depurgatum ac derafum ad vterum quidam apponunt; & postridie vident an per os oleat; & si oluerit, concipiet; sin minus, non. Si vero velis cognoscere, an mulier concipiet, vel non, butyrum & lac mulieris masculum alentis bibendum dato, & si eructauerit, concipiet, sin minus, non. Item anisum in aqua tenuissime tritum bibat, ac dormiat, & si quidem pruritus ipsam circa vmbilicum corripuerit, concipiet; sin minus, non; vt liquet ex Hippocrat. in lib. de sterilibus. At si velis dignoscere, num pragnans sit mulier, mel & anisum tenuissime terito, deinde in aqua diluito, ac exhibeto, & dormire finito: & si quidem tormen ipsi fiat circa vmbilicum, pragnans est; sin minus, non est, vt liquet ex eodem, citato loco. Item cum dormitura est, aquam mulsam potandam da, & si alui tormina patietur, concepit; sin minus, non concepit, vt liquet aphor. 41. lib. 1. At conceptionis notæ erunt, iuxta Aetium, si os vteri claudatur, & desiccetur, atque a pudendo recedat. Imo peritiores fœminæ post seminis ingressum, vterum moueri percipient. Mouetur enim genituram circumplexurus. Quibuldam illa exsultant, aliis cordis dolor & exsolutio cum quadam voluptate superuenit. Nec paruum, præter reliqua, indicium est, si mulier quopiam vrinae stillicidio vexabitur: quod præcipue patiuntur, quæ tunc primo concipiunt, & quæ menstruas purgationes integre non exegetant: quamuis idem ceteris quoque vsque ad v. idem quadantenus accidat. Post septimum vero obscura quædam picæ signa oboriuntur, acidorum salforumque desideria, vertigines, pallor, somni longissimi. Constat & eodem tempore menses sine molestia detineri. Ita ex Moschione: Quoties in fine coitus horror quidam mulieri accidit, ipsumque orificium vuluæ concludi & conduci sentitur, nihilque reliquum seminis suum mulieris humectat, & valde modicum remanet. Secundum Priscianum, si collum calidum & dorsum frigidum habuerit, concepit; si vero æquale est corpus, non differunt tamen inter se, conceptio, generatio & imprægnatio: Nam conceptio est attracti a locellis seminis commistio, in sanguinis menstrui puriori parte, in quam locellorum calor natiuus ita agit, quod viuificato, demum fœtus generatio sequitur. Moschio autem interrogatus. Quid est conceptus? inquit: Ingenti corporis labore & tormento perfertur: successione autem plusquam necessarius; vnde & retentio perseverat: animal vero aliud, cum naturali ratione & necessitate efficitur. Embryonis vero, vel, vt alii, fœtus generatio, & virilis seminis cum menstruo sanguine tam diuturna actio, quo ad

materia illa formam recipiat humanam. Imprægnatio tatummodo ex parte mulieris se tenet, quæ est aliud nihil quam conceptio, & embryonis generatio. Simulac genituram intra se vterus traxerit, vniuersum alueum, se supra duo semina colligens, ac vndiq; ea comprehendens, ita contrahit, vt nulla penitus, siue multum, siue parum seminis iaculatum fuerit, vacuitas relinquatur: atque adeo os sigillat obsepitq; vbi etiamnum deductissimi corporis acies nequiquam ingredi queat: quod Hippo. (quem ceu alteram rebus humanis lucem Deus dedisse videtur) ita prodidit. Sed primis sex dieb. lactis similitudinem semen vtero detentum refert; nouem diebus sequentibus in sanguinem vertitur; duodecim aliis diebus caro efficitur; decem tandem & octo diebus reliquis membra omnia formantur.

Sex in lacte dies, tres sunt in sanguine ternis, Bis seni carnem; ter seni membra figurans.

Vel: Iniectum semen sex primis certe diebus

Est quasi lac, reliquæq; nouem fit sanguis; at inde Consolidat duodena dies, bis nonaque demum Effigiat, tempusq; sequens producit ad ortum.

At Erotis: Primo mense fit purgatio sanguinis; secundo fit expressio sanguinis & corporis; tertio ungulas & capillos producit; quarto motum, & ideo nausæant mulieres; quinto accipit fœtus similitudinem patris vel matris; & sexto neruorum constrictionem; septimo ossa & neruos confirmat; octauo mouet natura, & infans rerum beneficio repletur; nono a tenebris procedit in lucem. De his plura vide apud Ludouicum Bonacium, Muliebrium lib. 2. cap. 3. Animæ autem creatio a Deo est: sed quo tempore corpori infundatur, furor est ac stultitia id inquirete, tum quomodo in corpus descendant animæ, & qua parte cœli descendant; ac denique in iis, quæ cum indiuisibilia atque materia prorsus immunia sint, nullo situ clauduntur, situm inquirere, vesanum est. Sane nobis est cum Augustino, animam a Deo vnico procreari & infundi. Triginta igitur dierum spatium efformatus est. Iis sexaginta adiectis, nonaginta (tres constituentes menses) soles consurgent: hoc ipso mouebitur tempore: & sic variis proefformationis varietate, temporum impendiis compos fiet, sic Hippocrat. lib. de pueri natura. Puerulum dierum triginta tractu, fœmellam quadraginta & duobus confingi, pronuntiauit. Huic quidem quartum sui motus mensem, illi vero tertium præsignauit. Et sic quidem mares circa quadagesimum solem, fœminas circa nonagesimum moueri, complures diligentissime exploratum habuere. De his varias vide opiniones auctorum, & cur septimo mense nati viuant; & qui octauo, moriantur. Astrologi octauum mensem ascribunt Saturno. Tamen octauo mense natus aliquando vixit, auctore Aristotel. lib. histar. animalium 2. De partu septimestri & octimestri, vide Hippocratem. Quia autem nono mense partus naturalis est, ideo aliqui duos partus generaliter dixerunt, vt Censorinus; alterum minorem, quem vocant septimestrem; alterum maiorem deci-

7
Imprægnatio

Hipp. li. 5. aph. 1

Egidii versu, qui c. 1000 recitantur a Ghainerio.

9

Deo tempora infans mouetur.

De die natali, cap. 52 ex Pythagora.

10 mestrem, qui edatur die 274. Mensis tam, ut Ophusius, præceptor meus Mathematicus, auctoritate Cardani, & aliorum Astronomorum, referebat, ad Lunam refertur. Primus & tribuitur Saturno, secundus Ioui, tertius Marti, quartus Soli, quintus Veneri, sextus Mercurio, septimus Lunæ, & tunc perfectus est fœtus, & vivere potest, octavus Saturno, & moritur si producat; quamquam, iuxta Aristotelem, aliquando vivat: nono mensi Iupiter præest, vitæ amicus, quamobrem partus ille laudatissimus censetur. Mars decimo mensi dominatur, vna qualitate amicus vitæ: natus igitur in hoc mense puer interdum vivit. Sol rursus vndecimo præest, & vitam nato influit; sicque in ipso natus vivere potest. Si ad duodecimum mensem pueri natiuitas protēdatur, quamvis nunquam id viderim, iuxta illas rationes, quia Venus dominatur, aliquando vivere posset: sed rara avis. Appellamus autem mensem lunarem, reditum Lunæ ad eundem locum; numerando, ut habetur apud Cardanum Segm. 1. aph. 47. dies per reditum Lunæ ad circulum horizontis, diebus viginti sex, horis novem, minutis 30. & secundis 15. Vel crassiori calculo capimus mensem pro diebus viginti octo; ut quatuor septimanæ mensem constituent. Nam ut secundum ipsum, Luna primo mense materiam conceptionis præparat, & membra adaptantur, ut deinde secundo mense a Mercurio formam accipiant, & tertio mense a Venere sexum virilem, tum fœmineum fœtus acquirat; quarto mense a Sole vitam, quinto a Marte robur: (nam is firmat creata, potissimum nervos, suo robore) deinde sexto mense Iupiter gubernans fœtum disponit, omnia confortando; deinde ad Saturnum septimum mensem referebat: qui tamen computatione incidebat in sextum mensem Medicorum. Sed eorum opinione, qui octavum mensem attribuunt Saturno, ut dictum est prius, isto mense vel mortuus producit infans, vel non diu vitalis: Septimo vero vivit, iuxta Astrologorum rationem. Medici, uti & Avicenna, aliam rationem adferunt: Fœtus, aiunt, septimo perfecte completus, auræ seu nutrimenti defectu petit exitum; quod si tunc in radice foris fuerit, nascitur, & vivit. Si autem virtutis impotentia, aut cotyledonum resistentia, nasci non possit, maxime debilitatur: quare si in octavo tunc nasci contingit, eidem advenit, quod, qui laborem secundo aggredditur, a primo nondum releuatus: etiam in tantum in secundo illo motu debilitatur, ut natus vivere non possit. Sed eadem ratione nec in decimo mense, aut vndecimo natum posse vivere argui queat. At Astrologi moras fœtus in utero distinctas inuenerunt; maiorem scilicet, mediam & minorem. Maior siquidem existit 288. dierum, qui menses novem & dies 18. constituunt. Media dierum 273. existit, quibus perficiuntur menses novem & dies 3. Minor dierum est 258. menses octo, & dies 15. perficientium. Sed hæc ad Astrologos pertinent. Istis ergo omissis, diligenter oportet distinguere notas conceptionis, & impræ-

Ratio medicorum cur septimo mense fœtus expulsus vivat, & octavo moriatur.

gnationis, ne error contingat: cum aliquæ mulieres virgines se fingant, licet gravidæ sint, ut medicos decipiant: quod aliquando evenit Medico licet peritissimo, qui puellam gravidam, hydrope fingentem se laborare, curabat, etiam adhibitis multis medicamentis. Ad hanc ego noctu evocatus, animadverti, quod conceperat. Cum autem femula esset, neque domina ipsius aut astantes gravidam eam esse, suspicarentur, ipsa acriter id negabat. Ego nihilominus perstabam, & obstetricem accersendam dixi. Qua præsentem, feliciter peperit, dolo iam omnibus aperto. Tam scelestæ est hæc puellarum quarundam impostura, ut etiam medicos, maxime nihil tale suspicantes, fallat. Præter autem signa conceptionis iam dicta, statim hic post conceptionem uteri os retrahitur & occluditur, ut diximus, etiam Veneris actus prægnanti languescit, & menstrua purgatio præter consuetudinem subsistit. Nec tamen hoc postremum statim tempore procedit: si enim uteri acetabula secundarum adhæsu obturentur, & os ipsum interius conniveat, nihil sanguinis ex uteri capacitate elabitur: At quibus fortasse sanguis primis mensibus, aut etiam postremis effluxit, ex iis venis, quæ ad uteri cervicem pertinent, quemadmodum & virginibus, emanat, citra ullam fœtus offensionem. Mense secundo, etiam si menstrui aliquid profluat, qui tamen provida solersque natura sanguinis nonnihil reponit in mammas, superioresque sedes, pectoris venæ impleri, mammas utero turgere ac durescere incipiunt. Fœtus grandescens, latera lumbique expanduntur, dilatanturque, ac venter citra manifestam gravitatem intumescit. Quibusdam tum temporis in facie citrinæ vel lividæ maculæ, ut in puella, quam medicus pro hydropica curabat. Iam & lentigenes quoque efflorescunt, vel oculorum ambitus liuescit, aspectu languido; & alia symptomata vrgent; de quibus dictum est prius. Quibus & illa addere posses, quibus virgines probari diximus. Plura de his habes apud Bonacium lib. 1. mulierum, cap. 1. Quo examine grævda cognoscitur. At signa ex urina sola desumpta sæpe fallunt, quamvis aliqui, ut Fernelius, & Guainerius, & Avicen. velint, esse subsidentiam tenuem, disiectam carminato gossypio perquam similem. Verum illud, ut in lib. nostris de incerto urinarum iudicio, contra Vromantes, patet, sæpe medicum fallere potest. Sed quibus modis fœtus & gestatio discernatur a mola, mox dicemus. At qui putant, a parte uteri dextra semper mares constitui, in sinistra fœminas; ex animalium resectionibus (inquit Benedictus Veronensis lib. 25. cap. 7.) facile redarguuntur: tum sæpenumero evenit, ut eadem in parte uteri gemini, mas & fœmina generentur. Idque satis inspeximus in viperis pedestribus. Quod igitur mares semper in dextra, & fœminæ in sinistra parte concipiantur, mera somnia sunt. Nam cum etiam gemini gestarentur, mas & fœmina, marem in læva, fœminam in dextra contineri conspectum est. Qui vero testem dextrum, marem generare arbitrantur,

Signa imprægnationis cur diligenter notanda.

Quomodo prægnantibus sanguis effluere potest ex uteri cervice.

13

14 tur, facile, inquit Aristoteles, serpentum argu-
mento conuincuntur, qui testibus carent; in quo
genere & mares & foeminae conspiciuntur; sed a
partibus dextris vel sinistris, qualis exeuntis fe-
minis non sine aliqua ratione calidius, ex quo
mares progenerantur. Alii, si a parte dextra auul-
sum semen est, & descendit in vuluam, aut locos,
masculus gignitur: foemina, cum id, quod a sini-
stra: alii propter propriam feminis commistio-
nem, vel propter caliditatem, vel frigiditatem
gigni. Calidius vero semen marem progignit,
frigidius foeminam. Gemelli & tergemini secun-
dum aliquos, generantur propter calidum se-
men in locum contractum, atque ibidem deci-
sum. Alii autem comprehensiones causantur.
Nos vero dicimus, quod si decisum sperma de-
fluxerit in locos binos, tunc gemellos; si in tri-
nos, tunc tergeminos nasci. Alii quaedam expe-
rimenta addunt, dum foemina masculum vel fo-
eminam gerat, ut ad longum videre poteris apud
Guainerum: vide & ea, quae Priscianus & Erotis
in Harmonia Gynaeiorum scripserunt. At Ae-
tius inquit: Hippocrates ceterique asseruerunt, marem
futurum indicari, si praegnantis color iucundior, facilio-
resque motus fuerint, & dextra mamma amplior tumi-
diorque, ac praecipue pupilla, apparuerit. Contra pallidus
color, mammaeque sinistrae & pupilla tumidior foeminam
indicat. Sed & in maris conceptu, dextrae partis va-
sa, venae, inquam, & arteriae, magis intumescunt,
praesertim quae sunt in lingua: sicut in conceptu
foeminae oppositum conspicimus. Certissimum
vero ac minime fallax masculi foetus indicium est,
si praegnans dextrae manus pulsum validiorem, ve-
lociorem maiorem, duriorioremque habuerit: ac fo-
eminae, si talis sinister fuerit. Nunc ad molam no-
stra vertatur oratio.

OBSERVATIO LX.

De vteri mola.

1 R Vstica mulier in Waterlandia, cum Alcmariae
medicinam adhuc facerem, multo tempore
carneam molam gestabat in vtero, aliquot etiam
annis, plus minus sex; ita ut tandem in hydropem
conuersa fuerit; doloribus tandem superuenien-
tibus: Iis illa tamen remediis, quae ad menses e-
uocandos faciunt, tum hydropem, a me curata
fuit, carneamque molam excreuit. Ita etiam per
me curata fuit, cum praxin in Gallia Pithueris ex-
ercerem, & altera mulier, quae prope Pithueros ha-
bitabat, quae per triennium molam gestauerat.
Neque illud admiratu dignum, cum & Dodonaeus,
amicus noster referat in suis Obs. cap. 49. viduam
quandam in vtero olim gestasse molam annis plus
minus quindecim. Existimabat vterum prolapsum,
quod in ostio vteri propendere aliquid sentiret:
profluebant statis temporibus menses (quod tamen
nostris agris non contingebat) & subinde copiosiores,
quam par erat. Tandem quodam tempore, super-
uenientibus nonnullis partus doloribus, rudem
excreuit, & informem carneam molem, pedem
fere longam, latam semipedem, tres quatuorue di-
gitos altam.

S C H O L I A.

E A est naturae prouidentia, ut calor opifex &
formator eorum, quae operantur, nunquam
sit otiosus; sed quamlibet materiam in opus ali-
quod miro artificio ducat, qualecunque tandem
sit. Sic ex putredine Aristoteles vermes generari
scribit. Sic ex materia, quam pro arbitrio tracta-
re non possit, quia aut copiosior, aut minore co-
pia, aut ex diuersis generibus constans, minusque
sequalis est, monstrum generat, siquidem aliquid
perfectius non licet. Ita materiam tractabilem
si repererit ex vtriusque semine, in vtero fo-
tum pulcerrimum ad vtriusque exemplar diui-
nitus fabricatur, aut vni magis quam alteri simi-
lem, pro ratione materiae & viribus imaginatri-
cis facultatis, tanquam optimi moderatoris. Si
vero ipse imbecillior sit, materia autem subiecta
qualitate, quantitate, consistentia, aut mixtio-
ne alicuius extranei, ut sanguinis crassi, aut alte-
rius succi vitiosi, ineptior ad tantam perfectio-
nem, aliquid tamen, ne nihil, generat, siue ani-
matum, siue rude & expers vitae. Sic Hollerii in-
terpres vidit mulierem, quae cum nouem men-
sium spatio vterum gestasset, omnibus, quae in le-
gitimo partu euenire solent, mirifice responden-
tibus, tandem nihil aliud praeter animalia quae-
dam ranis haud absimilia, cum multis purgatio-
nibus cruentis & corruptis, in lucem edidit. Re-
fert & de alia cui carnea moles informis cum fo-
tu, veluti superfœtatione quadam, exiit. Et ego
mulierem rusticam noui, quae cum grauida pu-
taretur, animalculum peperit instar limacis. Do-
minus Valeriola multas habet & admirandas in
eiusmodi partu observationes, curationemque
pulcerrimam de mola, cui partus quatuor men-
sium erat alligatus, cum ipsa iam pro vero foetu
nouem mensibus in vtero latitasset. Ceterum
mola, de qua nunc dicere coepimus, diuerso mo-
do sumitur: nam molam vteri, quidam omnem
rem praeter naturam quae pondere grauat, & mo-
le extendit vterum, nominant; ut Rhases, ut vide-
antur caput de falsa conceptione fecisse. Sed A-
uicenna etiam extensionem flatuum sic nomina-
ri vult, dummodo cum suppressione malum sit.
Paulus lib. 3. capit. 69. De mola, omnem duri-
tiem comprehendit, ut & scirrhus: sic enim scri-
bit: *Mola quoque induratus est tumor, interim in
vuluae ostiolo, interim in tota quoque prominet, vnde
in tophaceam quoque duritiem occalescit, tum ea qua
superiacent contrahuntur.* Nam & inter propria
quoque vteri vitia connumeratur, id quod a
Graecis *Μόλη*, a Latinis Mola nuncupatur, no-
men sumens a motus, tum difficultate, tum gra-
uitate, ut Aetius refert cap. 80. lib. 16. Nam veluti
mola ipsa grauis atque difficulter mouetur; ita
& affectus hic mola appellatur ad eius similitudi-
nem, & grauat & difficulter mouetur; licet non
nisi per accidens, ut dicemus; quemadmodum
& ipsa mola. Hanc molam indurata esse vteri
tumorem, qui modo in vuluae ostiolo, interim
in tota ipsa prominet, Aetius citato loco, & Pau-
lus cap. 69. lib. 3. fatentur; etsi idem Paulus in si-

Historia multe-
ris parientis a-
nimalia ranis
similia.

Mola vteri di-
uerso modo su-
mitur.

Mola vnde
dicta.

Barbaram se-
ctantes medici-
nam, multipli-
ces molas fa-
ciunt.

4 ne citati capitis aliorum quorundam auctoritate asserat, molam carnem esse informem, in his vuluæ tunicis adhærescentem, ac fœtus modo in lucem edi. Barbaram sectantes medicinam cum etiam triplicem molam faciunt, nonnulli & quadruplicem, carneam, humoralem, ventosam, & aquosam. De mola ex flatu exstat apud Valescum exemplum, *libr. 6. capit. 15.* Ego, inquit, tempore pueritiae meae dum addiscerem artes liberales Vlissopona, vidi quod quadam Iudaea credidit se pregnantem, cui fuerunt preparata omnia, quae sunt necessaria, & dum obstetrices matricem tractarent, tanta ventositas sine ullo alio liquore exiuit a matrice, quod fuit mirum: & hoc per totam ciuitatem Vlissopona, & per totum studium fuit diuulgatum. Id quoque a Dodonæo scribitur obseruatum *cap. 49.* & eiusmodi inflationem efficaci remedio ab ipso curatam, prodeuntibus per pudendum, veluti per anum excerni solent, ventis. Aquæ collectionem ipse etiam in vidua quadam vidit; quæ, defuncto marito, cum se gravidam relictam æstimaret, nouem mensibus adimpletis, superuenientibus partus doloribus, non nisi aquosos humores enixa est, a quibus liberata, lacte vbera repleta habuit, haud aliter, quam si fœtum peperisset. At eodem quoque auctore in Scholio, hæc quidem molæ ventosæ & aquosæ cognominatæ, a Græcis & veteribus Medicis pro molis non agnoscuntur. Flatuum in vtero collectionem *ἐμπνευµατῶσιν ἢ πύλγεσι*, Inflationem vteri, & posteriores inflationem matricis nominant; de qua dictum est antea; & curatur, ut vteri inflatio. De aquosi humoris in vtero collectione meminit Hippocrat. in libro de natura muliebri; tum & Aetius, qui vteri hydropem appellat; de qua prius quoque diximus. Hippocrates aquæ in vteris collectionem gravidis superuenire affirmare videtur: Aetius tunc humoris copiam in vterum confluere, quando menses suppressi sint, & imprægnatio impedita. *Utumque nobis*, inquit Dodonæus; *obseruare contigit: meminisse enim nonnullis vna cum fœtu copiosum aquosum humorem ex vtero processisse, fœtu debili ac non vitali.* Id etiam nos aliquando vidimus. Sed vidua altera, de qua scripsit, quæ existimabat gravidam se relictam, solum aquosum in vtero gestauit humorem. Sed & Neoterici quidam barbaram facientes medicinam, ipsi Molæ quoque varia nomina & diuersa imposuere. Nama Gordonio cum sit frustum carnis informis & sine figura, vocatur Pecus; alii vero vocant Fratrem Lombardorum; quem, inquit Gilbertus, mulieres Salernitanæ tempore viuificationis nituntur occidere potu succi apii & porrorum. Sed apium fœtui epilepsiam generat. Alii, eodem Gordonio teste, vocant Harpyiam. Intelligendum enim, inquit, quod vermes, reptilia, harpyia, & frater Lombardorum possunt generari in vtero. Sed vermes raro: quia in intestinis generantur ex superfluitate multum impura, rarissime autem in matrice: sed aliquid enorme, ut mola seu harpyia, ex semine mulieris corrupto, & ex carentia spermatis viri, & ex ca-

Diuersa Mola
nomina.

lore innaturali. Sed frequentius in mulieribus Lombardiæ (*hinc forte quoque nomen Fratris Lombardorum assumptum*) aut quia magis laborant, vel magis subiectæ sunt, propter corruptionem nutrimenti, sicuti in Apulia. Vnde communiter dicitur, Italas mulieres pessime viuere ex fructibus & herbis, at se bene induere. Azarianus Molam ad similitudinem lapidis molaris dictam putat, ex pondere & grauitate contingente in ventre mulieris, tanquam ibi lapis molaris esset; etiam ex motu huius materiæ per ventrem, dum mulier se reuoluat; vel quod ventrem comprimat ad similitudinem lapidis se mouentis. Et Valescus dicebat ex pondere aggrauante dictam esse. Verum cum alii triplicem molam faciant; melius tamen est seorsum curationis variorum affectuum ponere, neque confundere; & molam eam solam & proprie appellare, quam dixerunt talem veteres, Aristoteles & Galenus, sic defini-
entes: Mola est caro inutilis & informis in vtero genita: quæ & aliquando breui emittitur, aliquando vero diu durat per annos. Et ideo, quidquid præcitati auctores afferant, nos cum Iacchino & Donato Galenum sectantes, dicimus cum eo, Molam esse carnem informem, quæ in mulieribus vtero gestatur, ut *14. method. medend. ab eo scriptum est.* Vel: molam esse carnem quandam inutilem atque informem; eiusdem Galen. sententia *14. de usu part.* Quapropter non omnem induratum vteri tumorem molam esse fatemur, ut Paulus & Aetius sentire videntur; sed inutilem illum conceptum carnosum atque informem, qui etiam vtero gestatur. Inutilis namque est, cum sit a natura aliena caro illa, nec utilis mulieris; cum & ipsi grauet, ac laborem inferat, impediatque mensium purgationes. Nec etiam utilis pro generis propagatione, veluti naturalis conceptus est. Est idem informis caro hæc, cum artificiosa forma & humana careat, licet quandam figuram contineat: quinimo diuersasfigurationes suscipit, pro diuersitate materiæ ex qua generatur, similiter & agentis, a quofigurationem recipit. Quod vero sub conceptu mola contineatur, licet idem imperfectus, atque inconcoctus sit, confirmatur ab Aristotel. *4. de generatione animal. cap. 7. dum dixit: Cum igitur ex humore concoctu difficili conceptus consistit, tunc gignitur, quod mola dicitur: afficitur enim conceptus eo modo, quo ea, quæ inquinari dicimus cum elixantur.* Portatur etiam seu gestatur vtero conceptus hic, qui mola appellatur, & non est vteri tumor induratus in eius substantia ortus, quoniam interdum fœtus modo in lucem editur. Pariunt enim quandoque mulieres carnem hanc, quam molam vocamus ut testatur idem Aristot. eodem loco. & Aetius aliud, quorundam auctoritate, confirmauit citato loco, cum dixit; *Quidam vero tradunt in quibusdam mulieribus carunculas ad iuglandis magnitudinem per pudendum excretas esse, aliquando singulis mensibus, aliquando bimestres, aut trimestres.* Præterea Galen. eodem *14. de usu part.* scriptum reliquit, molæ conceptum oho proportionem respondere, quamuis

Mola est caro
informis atque
inutilis in vtero
genita.

Mola quid sit
ex Galeno.

7

Quamuis non perfecto, sed subuentaneo: at oua animalium partes non sunt, nec eorundem tumores præter naturam, sed proportionē respondent iis, quæ adnascuntur, *vt liquet ex eodem Galeno 11. de simpl. medic. facult.* Quare & mola in numero eorum, quæ adnascuntur existit, non tamen familiarium; & vtero gestatur, at non ipsius induratus tumor est. Hinc quoque patet eorum error (*vt paulo ante diximus*) qui volunt molam esse in multiplici differentia. Nam præter hanc, quæ carnosâ existit, quampiam etiam flatuosâ esse fatentur: quoniam nisi caro sit inutilis, atque informis, quæ in mulieribus vtero gestatur, haud quâ mola appellari debet; *vt paulo ante recensimus ex Aristot. & Galen.* Quod vero vterus afficiatur in hoc vitio ex mensium suppressione, præter naturam tumore, ac ipsiusmet vteri dolore percipitur. Affectus vero morbus in compositione, speciatim in numero, ac inter eos, qui toto genere præter naturam existunt; velut est lapis in vesica, *iuxta Galeni sententiam eodem 14. Method. medend.* Quamquam Aristot. velit, quod nec perfectam, nec alienam omnino habeat naturam mola ipsa. Atqui Galen. propterea toto genere præter naturam eam esse fatetur, veluti in vesica calculus, hypochyma, & myrmecia. quoniam omnia talia tanquam molesta, & inuilia, in totum submouere properamus; & non quod in eius generatione seu substantia nihil sit eorum, quæ secundum naturam sunt, qua de re ab Aristotele non discrepat. Sed hæc exemplis subsequētib; multo clariora patebunt.

OBSERVATIO LXI.

De mola reiecta quasi oculos multos habente, & de aliis diuersa forma.

ANNA Iuonis, vxor Bartholomæi Simonis Mercatoris dicti, mulier si quæ altera valde obesa, attamen fœcunda, quæ Alcmariæ habitabat, in platea vulgo *Houtil* dicta, cum aliquot mensibus sese putasset grauidam, postea cœpit dubitare: cuius causâ me vocauit. Ex signis dictis animaduerti illam mola laborare; ex tumore videlicet duro circa vteri partes detractiōe, seu contractione partium superiacentium; deinde, cum illa ex natura crassa & obesa esset, quod corpus gracile euadebat, deinde appetitus prostratus esset, mensesque non solum suppressi, sed & colore vitioso afficeretur; & quamuis mammæ intumescerent, manus tamē pedesq; molliores gracilescebant, incessus grauior erat, ac oculi labiaq; tumeabant, & facies palleſcebat, stomachusque subuertebatur, lumbi grauabantur, venterque attollebatur; adeo vt primum conceptus veri de se signa præberet: quod etiam peritissimis imponere potuisset: verum temporis progressu apertius discernebatur; cum & dolor punctorius adesset, nec motum vllum sentiret: nam molam dolor punctiōis sensum inferens subsequitur, nec in ea motus vllus, velut in vteri conceptu percipitur, nisi quod per compressionem dextra & sinistra mouetur, cum manibus mola comprimitur,

& ex accidenti quoq; cum mulier de vno latere in alterum vertitur. Cum hæc adessent, & postea, toto corpore imminuto, venter ampliaretur, existimauit se hydrope laborare. Præfert quidem per se postea hydropis imaginem: tamen ab illa discernitur per tumoris duritiem, & quod tumor hic ad digitorum compressionem, ac pulsationem non cedit, neq; tympani sonum veluti in hydrope edit; & quod neque ad manus contactum vlla fluctuatio percipitur; quamquam temporis progressu (*vt sæpe vidimus*) quandoque hepate perfrigerato hydrops ei superueniat, *vt liquet ex Paulo & Aetio.* Quod igitur hic neque tympanitis modo venter sonabat, neque ascitis modo ad manus contactum fluctuabat, molam esse percipi ex signis iam dictis. Primo autem nostris monitis non auscultans, multa ac varia remedia apud illam tum diuersa tentata fuere, tam per obstetricem quam per alias mulieres. Verum cum non proficeret, denuo me vocauit. Cui vt minus rædio medicamentorum afficeretur, vt nostra tum remedia tum præcepta diu diligenterque obseruaret, neque a curatione desisteret, utilis fuit hæc historia Gradi de Medico, qui breui tempore molam se curaturum promittebat. Noui, inquit, ego Medicum præstantis famæ, qui mulieri patienti molam a multis mensibus, promittebat, intra duas vel tres horas curationem. Verum ipsa animaduertēs, quod emitteret fructum carneum magnum durum, idque per duas horas quibusdam medicamentis adhibitis; prudentior ipsa admodum apposite & facere suo Medico respondit: Bone domine mi, si ista materia crassa per tot menses generata est in ventre, seu vtero, & continuo etiam augmentata in tanto tempore, quia iam transiit annus & amplius, quod hac mola laborauerim, quomodo tam exiguo tempore poterit educi, nisi cum maxima violentia? Ego, inquit, non volo liberari tam subito & repente cum medicamentis ita violentis: ~~nam~~ timerem, quod citius me interficerent, quam curarent. Et ita cum prius hunc Medicum virum doctum & peritum esse existimabat, eundem nunc minime doctrina præditum iudicabat. Verum hæc nostra ægra tandem totum negotium mihi commisit; donec ab illa molestia, & graui malo liberari posset. Ideo cum alium lenem non haberet, omnium primo exhibui lenituum medicamentum ad vnciam vnam, & quamuis hic sanguinem mittere iubent, si adsit plethora, & mulieres ferre possunt, vt adimatur alimentum; tamen hic non conueniebat in pituitosa & crassa muliere, frigidis & crassis humoribus abundante. Iis itaq; prius præparatis & purgatis, eodem modo quo faciendum docuimus ad menses suppressos; medicamentis deinde tam intus quam extra, quæ laxandi ac molliendi & mitigandi vim haberent, vti sumus; etiam subinde aluo irritata, si illa durior esset, per glandes acutiores. Inprimis ventrem imum oleis dictis sæpe foueri iussimus, anethino, chamæmelino, & liliacea, tam ob dolorem quam emolli-tionem. Hoc quoque decoctum sæpe ebibit.

4 *℞. rad. brusci, asparagi, ana ℥ j. malua cum rad. parietaria, viol. (ad emollitionem) sabina viridis, stœchados Arab. flor. chamameli Romani, cassuta, fœniculi virid. saxifrag. cum rad. pulegii, artemisia, ana m. ℔. glycyrrh. ras. ℥ vj. ruta, anethi, ana p. j. sem. anisi, carui, fœniculi, ana ℥ ij. coquantur in aqua & vino Rhenensi pro ℥ j. ℔. stent per noctem supra herbas, colatura addendo syrup. e stœchade, de artemis. de calaminth. ana ℥ ℔. mellis ros. colati ℥ ij. ℔. aromat. cum ℥ ij. cinnamomi electi: fiat apozema ad modum clareti, bis eo utebatur. Ruta & anethum hic maxime commendantur. Sic Philosophus, (teste Aetio lib. 16. cap. 82. de mola) Detentis, inquit, vxoris amici menstruis, primo eam concepisse, arbitrabar, postea exaucto magno tumore, hydro-pem suspicari cœpi, quod totum corpus ac pedes tumescere cernerem: at tandem ubi id esse morbi genus deprehendi, quod alii Plinthum, alii Molam appellant, rutam & anethum in vino antiquo ruffo odorato decoxi, atque inde herbis abiectis vinum calidum propinaui prope aqua loco huiusmodi offerens, statimque mulier, excreta cruoris copia salutem adeptæ est. Sed ut reuertar ad nostram ægotam, postea dabam has pilulas subsequentes. *℞. trochisc. de myrrha ℥ j. euphorbii gran. j. cum syrup. de artemisia, fiant pilula jx. dentur ij. omni vespere.* Postea decocto suprascripto addebam foliorum sene ℥ j. & ℥ ij. agarici optimi, & zinzib. ℔ j. Deinde iterum pilulas dedi, ventri cataplasmate sequenti imposito & pectini ipso. *℞. rad. althæe mund. ℥ ij. folior. malua, althæe, & rad. malua, ana m. j. coquantur in aqua communi, ad mollitudinem possentur, adde mucilag. fœnugrac. sem. lini, ana ℥ ℔. pul. sem. anisi, fœniculi, ana ℥ j. farina seminis lini, fœnugrac. ana m. j. butyri recentis, olei liliorum, ana ℥ j. olei chamamelini ℥ ℔. fiat cataplasma.* Alii addunt aquam mulsam & paucum vinum odoratum, & inde cataplasmata conficiunt. Pessis quoque utebamur ex œsypo, butyro, adipe anserino, medulla, cum oleo samfuchino, & intus oleo liliaceo oblinebat. Aetius & ex iisdem pessos subiicit; vel ex medulla aut cerebro ceruino, melle, caricis pinguibus passulis, cum oleo antiquo ligustrino, irino, samfuchino, safino. Verum cum nostra mulier etiam interiora vuluæ digito inunxisset sequenti linimento. *℞. olei lilior. ℥ j. moschi optimi gran. vj. croci orientalis ℔ ℔. tandem, his remediis reiteratis,* molam carneam reiecit, quasi multis oculis refertam, rotundam, multo ampliorem palma manus, imo ad duas fere excedentem. Noui & aliam mulierem, quæ nullo modo nec medicamentis poterat curari, & valde de vita periclitabatur, cui consultum fuit a vetula, ut fumigium ex anetho & cumino super prunas iniectis sub vestibis fieret, vel sub sella perforata: illudque recipiens, molam cruentam & satis magnam exeretam excreuit, & conualuit. Ita & alia, cui emplastrum ex fimo bouillo pectini appositum fuit. Venit & mihi eo tempore, quo præcedente mulierem præmanibus haberem, in mentem historia Antonii Betti, Medici Bononiensis præclari, quam ex Cronenburgio Medico Colonienſi, qui ante nos*

Bononiæ eundem Bettum subinde in praxi sequutus fuerat, accepimus. Anno videlicet 1538. mense Februario, vna cum Betto Medico, vidit mulierem, qua mense tertio abortiit, & vna cum fœtu humano perfecte, & rite figurato molam carneam ad magnitudinem fere gallina, eiecit: in qua caput erat configuratum cum rostro in similitudinem aquilæ, sed aduncum non erat: rictus cartilagineus vtriusque diduci poterat, oculorum loca expressa erant informia, a latere membrana carnea, cuiusmodi in effigie sculpta quoque erant. Cronenburgius cum condiscipulis causam inquirentis, quæ huiusmodi figuram, seu formam materia impressisset, offenderunt in cubiculo, ubi decumbebat puerpera, ad focus in camino sculptas monstrosas imagines, inter quas dua sibi ex aduerso sculpta, exquisite, perfecteque capta ad humores vsque isti monstro a puerpera edito similia præferebant. Iudicauit cum illis præceptor, vehementem earum imaginum in phantasia impressionem, causam fuisse, ut in semen virile copiosa materia menstrua monstrosam formam induxerit; aut virtute formatiua seminis virilis debili existente. Hoc ipsum confirmat Galenus, libro De theriaca ad Pisonem pag. 77. bistoram narrans de deformi quodam puellam pulcræ procreare cupiente, qui depinxit in lato ligno elegantem puellam, dicebatque mulieri, ut inter coeundum in illam inspiceret. Betrus huic mulieri ad secundinam prouocandam dedit hanc compositionem: *℞. pul. cassia lignea, cortic. interioris cassie fistula, rubia tinctorum, croci semin. porri, trochisc. myrrha, ana ℥ ℔. misce. dosis erat ℥ j. in iure gallinaceo, aut carniū, & contulit.* Eiecit autem postridie molam dictam, quum hunc puluerem ad secundinam depellendam sumisset. Tandem compositionem in pilulas formauit, ad eliciendos menses, atque in 12. pilulis formato puluere, dedit & mane tres ante potum cum decocto cicerum & capill. veneris. Vidimus Cydone, inquit Benedictus Veronensis lib. 25. cap. 34. De mola ex Aristotele, mulierem quæ octauum ante partum gestauerat, & cum insequenti se etiam concepisse putasset, & iam decimum mensem attingeret, vna nocte ei sanguis congii mensura rubicundus effluit. Vidimus mulierem, quando eo trepido profluuio omnes territi fuerant: eius labra animaduertimus tumentia, ac oculorum genas, facie de cetero palleſcente; brachia præter consuetudinem macilenta videbantur: ventrem deinde detumuisse, & in eo pondus molestum sentire se aiebat: proinde in vtero molam esse omnino adiudicauimus. Obstetrix clauſam esse naturam nuntiauit: coniectis inuicem tribus pessis ex galbano, bdellio, opoponace compositis, iam naturalia ora patefacta sunt, miro naturæ opere: modum subinde extraxit obstetrix in tria frustra discerptam, quæ subinde confuta molam integram rotundam constituere, superstitione quadam, ad auertendam talem molam, & infumari camino iusserunt. Ea informis erat, cute humana obducta, intus materia sine ossibus, sine corde, sine iecore ac intestinis; sed confusa

8 confusa quædam caro erat mollis, venis conspersa pluribus, cucumeris magni rotundi modo; ea duritiem nullam adhuc contrahere poterat. Huius rei infinita pene exempla sunt. Vidimus Genuensem mulierem ad vitæ usque exitum gestare ventosam: ac aquosam pariter ad quintum decimum mensem; cumque omnia ex ratione conceptus veri venissent, præter quod in ventre punctiones crebras submordentes patiebatur, soluto demum exiguo aquæ, cetera per se subsedere. His tamen vera mola & carnea non erat. At vera mola, *vt idem refert lib. citato, cap. 36. De mola generibus & signis*, Apuliam infestat, ac ora maritima Italiæ circa Pisanum agrum; plures enim molas simul parere visuntur. Nam quibusdam in locis superfætant, bubonis similitudinem, & animal dirum pariter cum partu humano edunt. Interdum harpyiæ (vt dicunt) forma viuere subinde, eas dicunt, ac per cubiculum volitare, quæ sæpe in vtero partum necauere, aut rostro infesto, aut compressu. Et ego audiui (inquit Gradus) *mira-bilia, sed non vidi, de animali generato in vtero cum alia, quod cum exiret matricem, volauit: multa tamen dicuntur, quæ non semper sunt vera.* At Benedictus Veronensis inquit: *Eam vim astro attribuant incolæ philosophantes: propterea fera illa belua appellatur.* Vidimus & retentis menstruis, ad quintum decimum vterum gestasse mulierem, quæ medicatis locis spirauerat, vno & continuato profluvio exonerata est, vnde molam sanguineam vocabant. Filia Gualtheri, nuper nupta, apud Amatum, cum omnium opinione prægnans diceretur, loco fœtus quatuor animalia ranis similima peperit, & optime valuit, sed postea circa pectinem dolorem sentiebat, quem paucis adhibitis remediis sedauimus, & pulcerrime viuit. Similiter mulier Dionysii Pinti, cum puerum optime peperit, inter secundas animal ranæ similitudinem eiecit, & ipsa & puer pancreatice habent. Mercatoris quoque, qui ex Anglia venit, vxor abortiuit, & secundo die post abortum simile quoque animal peperit; vt multis aliis euenisse vidimus, præcipue Anconitanis. Debet vero animal hoc inter molæ genera adnumerari, quale etiam illud, quod altera post abortum pepererit frustum quoddam carnis galli cristæ cum rostro gallinaceo similitudinem habens.

SCHOLIA.

10 **A**ristoteles igitur ait, *molam esse incoatam fœtus formationem, sed nunquam absolutam vt carnis genere deficiat generatio, ad genus vero animalis peruenire, nequeat. Hac ergo aut breui paritur, aut tota vitæ tempore seruatur, atque interim durefcit adeo, vt nec ferro quidem discindi possit: vt nos aliquando etiam spectauimus. Quod vero possit diu durare, causa est, quoniam non prorsus præter naturam, vt corrupta: est enim incoata actio. Quod vero durefcit, materia cruda est in causa. Causa autem cur ad perfectionem non ducatur, est debilitas agentis, quæ materia generationis non bene concoquitur, sed semicotta remanet, vnde & opus imperfectum facit, rerum instar, quæ ob*

debilitatem perfici nequeunt. Cur vero hoc in aliorum animalium fœminis non accidat, causa est (inquit) quod mulier plurimum abundat menstruis, & efficitur vtero, id est, patitur affectus, a quibus impeditur actio concoquendi. Vnde massa semicruda permanet. hæc ille. Est eadem ratiocinatio, quæ de menstruis agit 4. de generat. animalium 3. Cum enim agens non superat, motum non attingit: sed vel extraneum a similitudine parentum gignit: vel etiam animal solum, id est monstrum, vt paulo ante dictum est; vel etiam carnem informem, id est, non animal, sed viuens. Galenus eadem via ingressus 14. de vsu part. & cuncta in agentis debilitatem refert. Primum igitur generationem hanc similem facit, vt paulo superius dictum est, generationi oui subuentanzæ: hoc vero vno discrepare ait, quod illud sine maris consuetudine gignitur; at mola non nisi mulieribus concumbentibus. Aliis enim nunquam (vt & Iacchinus testatur) visa est euenire. Vnde concludit Galenus, in hac conceptione, dimidium agentis, & imperfectius concurrisse, id est, semen fœminæ: at quod viri est, minime; vel protinus restinctum. Agit itaque concoquendo sanguinem menstruum, & in quandam carnis speciem ducendo, seu animal delineare nequit sine operis maris. Relinquitur igitur corpus viuens, & vegetans caro, quæ in nulla specie erit, nisi vt imperfectum ad genus perfecti reducitur, id est, ad genus carnis humanæ, sicut & embryo ad genus hominis. Coitus autem non iuuat ad hoc, vt semen maris in generationem deducat: sed quia in coitu ob voluptatem mouetur naturali motu semen mulieris ad vterum, atque admiscetur sanguini menstruo, vnde & concipit. Quod vero durefcit, mora forte in causa est, vna cum materia cruda & crassa, vt Aristoteles dixit. Ita & Fernelius molæ causam efficientem dixit esse non solum sanguinem menstruum, aut muliebrem semen, sed viri semen, idque corruptum, aut quouis modo inualidum, quod alimentum quidem trahere, nihil vero conformare potest. Rondeletius putat, tam informem carnem, quam durum tumorem esse in actu (iuxta Aetium & Paulum) fierique primum ex semine veluti duram tumicam, & e sanguine crasso spissoque calore concreto, quæ nullam formam habet, & velut parenchyma quoddam vtero alligatur, & quod sicut tumor apparet, ob inuolucris duritiem, ideoque tumorem durum dixerunt, informem autem, quia nullam animalis figuram habet. Fit autem secundum ipsum a semine & a sanguine multo crasso, spisso & concreto, quem immodicus calor cogit & in carnis formam transfert. Nam id euenit, quando plus sanguinis menstrui influit, quam sit necessarium pro fœtus formatione. Spiritus autem genitiuus, aut qui opificis vires gerit, vt ait Galenus, non potest tantum materiæ elaborare, & ex ea fœtum formare. Nam ad fœtum vtrumque semen sufficit. Sanguis vero menstruus ad nutrienda illa semina vel augenda trahitur. Donatus tamen aliam generationem suscipere, ait, secundum

11
Fœmina aliorum animalium ab homine non patitur molam.

12
Causa.

Cura Actus.

13 dum quosdam, & quod hac non (vt Actius asserit) aliquando progressa inflammatione succedit: nec aliquando post locale vlcus, cui caro supercreuit, velut ea, quam ipse tumorem vteri induratum appellat: nec ex semine muliebri, & plurimi sanguinis menstrui affluxu, ac in vtero retentione, quem cogit calor immodicus, ac in carnis formam transmutat, generationemque suscipit: sed aliam tum materialem, tum efficientem quoque causam habet, vt ex Hippocr. Aristotel. & Galen. auctoritatibus (inquit ipse) demonstrabimus. Ait enim Hippocrates lib. de sterilibus: Mola porro conceptus causa hac est, cum mulier menses modicum & morbosum semen conceperint, neque conceptum recte sit, & venter plenus est, velut pregnantium: quibus verbis clare ostendit, materialem causam ipsius mola esse menses multos cum modico & morboso semine commixtos; semine, inquam, maris, & non femina. Nam si de femineo semine intellexisset, frustra modicum & morbosum adiecerit; quum quantulumcunque & qualecumque tale semen esset frigidius & humidius existens, atque imperfectius viri semine, mola conceptus non sequeretur. Addidit etiam. Neque fortis rectus sit; quasi imperfectus conceptus sit in mola ex paucitate & vitio seminis ortus: namque ex eius mediocri multitudine ac salubritate foetus rectus generatur, si cum moderatis mensibus fuerit permixtum. Quod vero idem sentiat Aristot. (addit

14 Donatus) lib. 4. de generat. animal. clare patet. Nam quaerens, cur ceteris animalibus mola non generetur, nisi quid admodum lateat, sed mulieribus duntaxat? respondet, eam inter animalia affectionibus vteri obnoxium esse, & menstruis abundare: quibus verbis menstruum copiam necessariam esse pro mola generatione fatetur. Quod vero necessarium quoque sit viri semen, eodem loco ostendit, cum dixit: Iam accidit cuidam mulieri, vt cum concubuisset, & se concepisse putasset, primum ventris moles augetur, & reliqua ex ratione venient: quae demum difficultati intestinorum implicata, eoque modo periclitata peperit carnem, quam molam vocant. Quid clarius, quod semen viri simul cum sanguine menstruo concurrat in mola generatione? Galenus autem lib. 14. de vsu part. aduersus eos, qui volebant foeminae semen conferre ad foetus generationem tamquam motus principium quoddam, hac protulit verba: Si igitur eo vsque volunt semen foeminae progredi: primum quidem, quod parum artificiosam actionem ei tribuit, quae vtrique vel soli menstruo forte affuerit, nemo est, qui ignoret: secundo autem, quod mentiuntur etiam in his, quae accidunt explorandis. Non enim sicut gallinae sine maribus oua pariunt, ita mulierem aliquando viderunt sine viro, vel molam, vel huiusmodi quippiam aliud concepisse. Cum igitur in foemineo semine nullum adsit motus principium, neque perfectum, neque imperfectum, licet ad animalis generationem aliquid conferat, aut saltem si quid haberet, non nisi cum maris semine habere putandum est; vt in eiusdem Galeni doctrina saepius legitur: absque controuersia censendum erit, neque perfectum foetum, neque etiam molam citra viri

femen posse generari, vt quidam ad pauca respicientes falso putarunt. Ceterum quod efficiens mola causa non sit immodicus calor, sed potius eiusdem caloris imbecillitas, ab eodem Aristotel. citato loco scriptum est. Loquens enim de mola generatione sic ait: Afficitur enim conceptus eodem modo, quo ea, quae inquinari dicimus cum elixantur: nec per calorem, vt quidam volunt, sed potius propter caloris debilitatem. Natura enim de vita certare videtur, nec posse perficere, finemque apponere generationi, & demum subdit: Causa namque duritia cruditas est, quippe cum inquinatio quoque cruditas quadam sit. Nam loquens de ouis, quae subuentanea nuncupantur, quibus proportionem mola respondent, asserit, ea propterea esse imperfecta, & ex ipsis animal gigni non posse, veluti ex aliis ouis, quoniam vt periciantur a masculo solam desiderant caliditatem. Ergo veluti ex diminuto calore subuentanea fiunt oua, ita & mola, quae eidem proportionem respondet, ex imbecillo & non immodico calore ortum ducit. Erit autem eius generationis modus talis, quod cum in concubitu multa copia sanguinis menstrui in vteri cauitate contineatur, proiecto a mare modico, eoque morboso semine, ac eidem sanguini menstruo commixto ex imbecillitate caloris, praecipue ipsius seminis, & secundo forte ipsius sanguinis menstrui, vtroque, tamen in vnum motum tanquam vno principio conspirante non potest eandem materiam perficere, ac concoquere, cum sit humor concoctu difficilis, vt inquit Aristot. neque finem generationi apponere, carnem hanc inutilem atque informem, quam molam vocant, idem imbecillus calor procreat, quae interim per annos tres aut quatuor, quandoque tota vita perdurat, adeo vt consenescat, vt inquit Aristot. Hac satis de causis mola verae. Nunc aliud exemplum proferamus. Sed illud prius addere libet, quod Amatus centur. 4. curat. 3. idem sentit. Cum enim monacha ex iis, quae religiose & secreta a turba viuunt, male haberet, & intra corpus motum praesentire se diceret, vnde ceterae monachae illam molam intus habere contendebant, & cum illud fieri non posset, consuluit Amatus, vt rem aut occultarent, aut alterius morbi genus asseuerarent. Quod Auerrhoes testatur, ex semine viri in balneo relicto mulierem pregnantem fuisse, quod & ante eum Hebrei testantur, qui ex filia Hieremiae Prophetae natum esse Benzyram tradunt, virum doctissimum & sapientissimum, id Galenus 7. Method. medend. cap. 6. & aliis locis non admittit.

OBSERVATIO LXII.

De mola, instar accipitris caput rostratum habente, eiecta.

Gertrudis, mulier si quae altera procera & pulcra admodum, & foecunda, quae Delphis prodigiis corui insignium habebat, cum se gravidam putaret, vndecimo mense peracto, molam se habere suspicabatur. Quamquam aliquando contigerit, post decimum & vndecimum mensem peperisse; vt etiam Amatus refert centur. 1. curat. 27.

de partu

Materialis causa
mola.

Efficiens mola
causa.

Excluditur mola
dum generatur
in mola.

de partu decimestri, & de mola generibus ac matricis varietate. Anna, inquit, consanguinea, Stephani Pyrrhi vxor, cum exacte conceptionis tempus obseruaret, post decem menses & undecimi tres exactos dies puerum optime peperit: vterum enim gessit decem mensibus, & undecimi tribus diebus. Vnde Plinium verum dixisse lib. 7. naturalis historiae cap. 5. deprehendi, inquit, vbi prater Lucii Papirij pratoris opinionem affirmantis, homini nullum esse pariendi statutum tempus, homo vsque ad initia undecimi gignitur mensis. Undecimo vero ab hora conceptionis mense Salomon Hebraeorum sapientissimus in lusem prodit, vt ipsemet testatur cap. 7. Primogenitus quoque Domini Herculis Ferraria illustrissimi Ducis decimestri est, vt omnes ibidem norunt, & Brasauola scripsit: quem terminum Hippoc. tantum lib. De natura pueri prope finem signare videtur. Sed de his, & eorum causis, Leonardum Fuchsum Germanum legere est, qui Amati sententia, praeter ceteris melius & accuratius lib. 6. Epid. ea differuit. Ceterum mulier illa, de qua nunc dicere cepimus, cum non amplius se grauidam esse puraret, molam caput rostratum instar accipituis habentem cum vi quadam & maximis tormentibus peperit, quam molam vidimus, adeo duram, vt ferro incidi non posset, & post eam reiectam subsequutus est ingens fluxus menstruum, ita vt omnino ad deplorationem decumberet. Mulierculae vulgari nomine hanc beluam appellabant *een zager*, verum vbi carnea est quidem spongiosa, & non ita dura, cum oculis referta, & mollior, solent suo idiomate appellare lingua Germanica, *een manendracht*, quamuis eadem etiam mola existat quauis caro informis. Ceterum fluxu enormi adeo subsequente, vt ipsa in syncope incidere, hoc praescripto condito, seu opiata, viribus refocillatis, & fluxu paulatim inhibito, cum pro mortua satis haberetur, praeter opinionem astantium conualuit. *Confer. ros. antiqua seu veter. 3 j. diacydon. sine speciebus 3 ss. trochisc. de carabe, de terra sigillata, de spodio, cum sem. acetos. cornu cerui vsti, an. 3 j. manus Christi cum perlis 3 ss. rasura vnicorni. gr. ij. cum syr. cydon. & menthaceo q. s. fiat conditum.* Eoq; cum vteretur ad libitum, tandem fluxus cessauit.

SCHOLIA.

4. Signa molae iam ex parte diximus Obs. 61. praecedente, & quibus modis ab hydrope & conceptione distinguatur, & quod deprehendatur grauitate vteri, & tensione maiore, quam in vera impragnatione: sequiturque mensium suppressio, decoloratio, appetentiae deiectio, mammarum inflatio, & vt breuiter rursus dicam, omnia quae in vera impragnatione solent accidere, nisi quod grauitas corporis, decoloratio, & appetitus deiectio diutius durant. Quod vero accidentia eueniant conceptioni similia, in causa est, quod vterus occluditur, non secus ac super foetum, non discernens initio vtile ab inuitili, vnde retinentur menses. Sed post tractum temporis, cum solent foetus copiam absumere, mulieres melius habent: hic vero semper deterius, quoniam semper causae male habendi, abundant in-

gia, id est, retenti menses, vnde & cachexia fit, & tandem hydrops. Signa vero distinguuntur a conceptione, saltem post tempus: quoniam vbi concipiunt, leniti in vtero solent, hic ingrauescunt, & multo deteriora fiunt de grauitate, colore. Ex motu quoque, quoniam velut pondus iners debilitatur, quod si moueatur initio, at non consequitur augendo corpus in tempore, quo foetus augeri solet. Addunt Arabes, menstruis propriis ordinate fluentibus impragnatio vera fit, mola nunquam. Ante mensem tertium, motus in matrice sentitur in vera impragnatione nunquam. Quod aliqui dicant, molam viuere etiam post partum, id ego non vidi: at Gradus scribit bis aut ter se vidisse, frustum carnis, quod mouebatur, vixisse per horas, cum tamen mulier se credebatur praegnantem vere, sed eo emissio cessauit praegnatio cum accidentibus eius: quamquam alii etiam harpyias volitasse scripserint, vt ante dictum est, easque partum necasse aut rostro infesto, aut compressu. Verum haec nostra mulier, de qua nunc diximus, solam illam molam rostratum peperit sine foetu alio. Praeterea distinguitur mola ab iisdem, quod in ea alius citissime in tumorem tum venter attollatur, & velocius incrassetur, imo saepe in tempore non perceptibili: foetus quoque dextrorsum sinistrorsumque mouetur: contra mola, nisi comprimatur, aut mulieris motu excutitur, non mouetur, vel compressione violenta manu, eaque amota, ad pristinum locum redit. Foetus quandoque ex tali compressione mouetur, quandoque minime. Praegrans quoque agilior quam molam gerens, in mola alius tactu durior reperitur, in vteri gestatione tractabilior. Quamuis his modis cognoscatur, vt apud Guainerium ad longum quoque docetur, tamen aliquando ita signa obscura sunt, vt saepe fallant etiam Medicos peritos, vt contigit Grado in propria sua vxore, cuius historiam hic liber adferre. Vxor mea (inquit) aetate annorum 33. vel 34. bona habitudine, sanguinea, bona etiam compositione, postquam habuisset prius, dante Deo tres filios, at filius postea orbata, & tali, tertio nemppe filio, annorum 14. mediocri ingenio & bona spei, adeo vehementer mater praeter tristitia continua per tres quasi continuet menses, quasi amens & debilis discursus affecta est. Tandem ei successerunt signa vera impragnationis, vnde incepit leniri de afflictione mentis ob defunctum filium, incepit quoque in operationibus animalibus & naturalibus rectificari, restrictis mensibus venter paulatim intumescere, & crescebat, cum bonitate coloris matris, & equali quasi pondere ventris & dorsi, & cum reliquis accidentibus, quibus ipsa olim praegrans afficiebatur, saluo quod in singulis temporibus debite suae menstruationis ordinate parum & valde modice sanguinis & menstrui manifestabatur. Cum tamen ante apparitionem signorum impragnationis copiose multum menstruabatur. Succedente tertio mense ad finem, vel in principio quarti, percipit ipsa motum quasi concepti, vt alias consuevit tempore praegnationis, cum accidentibus reliquis, & appetitu, & bonitate coloris ad melius conuersis: &

Signa distinguuntur a conceptione.

Historia Gradi quomodo fuerit deceptus in propria sua vxore, in falsa impragnatione.

ita successively indices amplius manifestabatur motus, ita quod 7. & 8. mense, & manifestus in 9. mihi saepe palpans manibus supra ventrem eius obiciebat motus velut infans, cum inspissatione, aliquoties impetuosi sub manu comprimente, & amplius saepe etiam, ipsa & iacente & aliquoties stante, manifestabatur visu sinistrali motus rei globosa in vtero, a dextro aliquoties versus sinistram, & quasi depressio, crescentibus semper in ea accidentibus ad bonum, & de appetitu & bonitate coloris: crescente sola gravitate ex pondere circa partes inferioris ventris, & inhabilitate ad motum progressuum, ut in reliquis communiter vero pregnantibus evenire solet in dictis mensibus. Ipsa tamen aliquoties leviter dubitante de vera pragnatione, propter id solum quod singulis suis temporibus parcissime menstruabatur, cum tamen alias, cum esset pragnans, nullo modo menstruaretur: hoc tamen & mihi & aliis quibusdam doctissimis viris ad augmentum fidei pragnationis faciebat, ut idem faciet tibi, si considerabis quae dicta sunt. Et ita his signis confirmatus sum in opinione vera pragnationis, cum iudicio etiam multarum matronarum in his expertarum. Ipsa etiam annuente, accepimus in domo unam nutricem in principio noni mensis, quae erat proxima ad partum, & infra octo dies peperit unam filiam, & eam tradidi, ut nutriretur sub alia nutrice, sustinendo lac enixa cum aliis aduentitiis lactantibus & sugentibus lac eius, hoc sine tantum, ut purgato lacte eius tempore partus uxoris fetus haberet sibi nutrimentum conveniens. At tandem transiit 9. mensis, 10. & 11. cum continua expectatione futuri proximi partus tandem transiit 12. & 14. continuatis semper accidentibus apparentis verae impragnationis, & reservando nutricem in domo, ut dictum est. Post xi. tamen coepit spes minui, & diffidentia intendi: ita quod expedito 14. mense, sublata mihi omni spe, dixi ego consorti meae, non amplius sperandum de pragnatione, nusquam legissem veram pragnationem ultra 14. mensem extendi posse, imo raro ultra 9. & rarius ultra 10. licet aliquoties mulieres cum sunt mola affectae in primis mensibus, aut duobus vel tribus mensibus, si impragnantur post vera impragnatione, quod possibile est, sicut possibile superimpragnatio, de mente Philosophi & aliorum: & tunc cum pariunt in 9. mense, & simul cum partu naturali emittitur sola mola, saltem si fuerit menstrualis, dicunt tunc mulieres se peperisse in 12. licet partus in veritate fuerit in 9. Verum tandem sic nos delusi de ista pragnatione, at ex una parte dubitabam de mola vera animata, & sic quasi de impossibilitate cura: ex alia parte, cum operationes omnes essent in ea incolumes, & naturales, & animales, praeter motivas insurgebat dubitatio, quod ibi non esset aliquid tale innaturale. Nam in tanto tempore debuisset communicare nocumentum hepati & reliquis membris, &c. Et ita in facto fuit: quoniam intra mensem, sine medicinis aliquibus acutis, sed cum solo usu pilularum elephanginarum, semel in hebdomada, remota est omnis detumescencia ventris, & inhabilitas motus, & remansit perpetuo sana. Neque recundor ego dicere, me casum illum non intellexisse: quoniam & sapientiori Medicorum Auenzoari, cui

non essim dignus solvere fimbrias calcamentorum, idem contigisse legitur de quadam pregnantem. Nam ut ipse refert 36. Theisis, erat in domo Haly filii Ioseph mulier, quae conceperat, quod mihi erat incognitum, ut dixit, cui dedi medicinam mirabilis fortitudinis, in qua nullus possit existimari evadere, sine abortu, bibendo etiam parvam eius mensuram, & tamen nihil perturbationis & malitiae pertulit, & in debito termino peperit infantem a leione immunem. Dolui errando, quod illi dederim medicinam talem, contra mandatum artis: sed feci deceptus, id est, ignorans. Subiciamus ergo ceruices nostras, & superbiam nostram: neque existimemus nos omnia posse scire, non propterea desistamus a studiis continuis. Haecenus Gradus. Diligentes igitur simus, ut recte molam a conceptione distinguamus. Verum quod ad alias species attinet, quae proprie non sunt mola verae, etiam doctiores de his mentionem faciunt, ut Benedictus Veronensis. At aquosus (inquit) interdum sanguis vitio iecoris in matricem transmittitur, unde aliud mola genus concipitur, venter gravidarum more tumet, sed mollior: praecordia plurimum veluti hydrops hyderos suppressit, unde difficulter anhelant, & cum supina moventur, sonitum intus cum murmure seu fluctuatione edunt. Simili modo & ventus concipitur, qui per naturalia ingreditur, quod percussione quandoque evenit, frigore, cibo inflante, vel crasso in vtero humore, qui in spiritum versus inflat, is saepe per crepitus emittitur, tum tympani modo sonat percussus venter, unde tympanica hyderosa nonnullis putatur, nam praecordia, ilia, inguinaque non sine cruciatu extenduntur. Prima pertinet ad hydropem vteri, ut diximus: secunda ad vteri inflationem. Nam in vera mola carnea pondus maius, quam in praeditis sentitur, & motus est ex compressione ad latera in aquosa est maior gravitas, quam in ventosa, sed durities minor & quasi nulla, quamvis in utraque venter utique extendatur, & ita gravantur partes diversae, sed in ventosa pondus extendens & grauans dorsum. Haec rursus distinguuntur ab hydrope: quoniam in vera hydrope inter intestina & peritonaeum colligitur aqua, & motu sentitur, ex fluctuatione: ita in tympanite undique venter inflatur. Verum cum haec non sit vera mola, recurrendum ad ea, quae de inflatione vteri diximus, & de hydrope matricis. Restat ut sola signa prognostica de vera mola addamus. Cum ergo intenditur hic affectus in aquam subtercutem degenerat, nonnunquam etiam insanabilis magna ex parte redditur: quibusdam & sanguis erumpit, Paulo auctore. Hanc affectionem alii velut incurabilem penitus reliquerunt, alii incipientem tantum curari posse confidunt. Negligenda eius curatio non est, sed omnia, quae conuenire videbuntur facienda, ut asserit Aetius. Quanquam Hippocrates libr. eodem de morbis mulieribus sic de ea scripserit: Hanc igitur maxime quidem ne curato, aut certe cum praedictione. Addunt Neoterici, si initio deprehendatur, non expectandum tempus partus, sic enim saepe incurabilis

Mola vera distinguatur a mola vera, nempe aquosa & ventosa.

Signa prognostica.

labilis est, aut onere grauata natura propulsatur, sed exeundo interficit, aut dolores acerbissimos, symptomataque periculosa inuehit. *Perpiniani* (inquit, interpretes *Hollerii*) vidimus mulierem nobis interisse, cum molam gestasset duodecim mensibus. Omnis inquam, mola (teste *Guainerio*) siue paucis siue multis temporis difficulter curatur: nam plurimi medici, dum dubitant de signis imprægnationis, timentes abortum, partus naturalis tempus expectant: eaque de causa forte in principio curationem facile recepisset, nunc autem cum difficultate curatur. Alii vero qui præter carneam molam veram, alias species confluunt, dicunt humorem difficilius curari ventosam, carneam difficilime. Iam & mola innumeros Medicos aberrare fecit. Antiqua hydropem ascitem inducit lethalem, ut postea exemplo docebimus: tympanitem quoque periculosam, si inflatio perdurantis vterum infestauerit: sed illa vera mola non est, uti diximus. Post molam raro rursus imprægnantur, & si conceperint, facile abortum patiuntur, aut morbosum fœtum pariunt, propter vteri vehementem debilitatem post molam relictam. Mola quoque indurata, siue id per congelationem acciderit, seu per adulationem, difficilime emittunt.

OBSERVATIO LXIII.

De Mola post fœtum perfectum reiecta.

Margaretha Cornelii, vxor *Harweri* mercatoris Delphensis, quum anno 1559. nono mense peperisset, eam eo tempore a secundina reiecta liberauimus. Hæc ipsa rursus anno 1562. 29. die Maii, qui Veneris erat, cum feliciter peperisset masculum, bene deinde habuit. Die autem Dominico (qui erat ultimus Maii) subsequente, cum paulum vini sumisset, horrorem experta est, ac parum febricitauit, & capite dolebat. Die vero Martis magis febricitauit, in ventre ac lumbis admodum torquebatur, molamque carneam reiecit. Et tunc ad illam vocati sumus. Mola autem, ut vidimus, erat instar volæ manus rotunda, dura, carnea, qualem etiam tertio die a partu nobilissimam matronam reiecit vidimus, ut antea dictum est. At hæc mola, de qua nunc loquimur, erat partu quasi secundo vel secundina interuestita, ita ut pars superior magis nervosa propenderet instar secundinæ, adeo ut mulieres astantes secundinam ipsam membranam fœtum inuoluentem esse putarent, & obstetricem inculparent, quod puerperam a partu secundo seu secundina reliquerit. Sed ea aduentante, *Heyla* nomine, aut arte obstetricandignara, ut sæpe vidimus, molam quoque esse affirmavit, nobiscum sentiens, nec secundinam esse, licet membrana secundinæ instar carnea illa mola vestita erat, cum in principio partus secundinam ipsam vna cum partu exceperisset. Cum autem molam hanc pareret, plurimum angebatur, cum ventris dolore ac lumborum acerbissimo. Sed quia purgatio non satis subsequeretur, nisi sordido quid ac male olente emanante, ventrem undique inferius inungi iussi-

mus oleo liliaceo, & pro febre quæ tunc continua erat, pisanam ex hordeo & gly. yrihiza pro potu bibendam concessimus: nam cereuisia ad caput ferebatur, & facile paraphrenitidem induxisset. Sub noctem vero *Cornelius Leydius*, collega meus me senior eo tempore, vna ad eam vocatus fuit: sed nescio, qua de causa noluit venire. Quare ut glans iniiceretur iussi, cum alium non deponeret: at cum & *Hugo Nieuenius*, Medicus *Haganus*, eius mariti sororius, expectaretur, id distulerunt in diem sequentem. Mane sequenti summo diluculo *Hugo* accessit vna cum *Cornelio Heydio*. Communi consilio tunc glans indita fuit expulser. *spec. hier. ʒj. salis exig. cum melle parata*, atque conclusum, si aliud a glande non solueretur, potionem sequentem exhibendam esse. *Electuarium lenitiui ʒvj. cum decoct. cicerum rub. propinetur.* Verum a glande copiose satis alium deiecit, ac dolore ventris nonnihil sedato, potio exhibita non fuit. Interim ut purgatio magis succederet, & menses magis fluere, ac in partu probe purgaretur, excrementis communibus nunc a glande eductis, pulu. hic descriptus est. *Nucleor. parficarum, rasura dactylor. ana ʒij. cinnamomi electi ʒj. ʒ. sem. viol. commun. seu cerulearum, ʒij. misce, fiat pulu. & diuidatur in ij. partes.* Hic enim puluis nec febre oberat, & post partum febricitantes puerperas egregie purgat, & menses in febricitantibus euocat, ut sæpe experti sumus: ac id ipsum pro arcano habemus. Vnam dosin mane dedimus, alteram hora quarta pomeridiana. Menses satis fluxere, & a partis optime purgabatur, & febris minuebatur. Hordeatum pro cibo dedimus. Sub noctem ubi rediimus, venter minus dolebat, & lumborum dolor magna ex parte cessauerat: licet in vertice capitis nonnihil doleret ad frontem & oculos dolore tendenti. Quare hic sacculus capiti appositus fuit. *ʒ. flor. nymphæ. m. j. ʒ. corticum cap. pap. albi ʒij. flor. viol. m. j. coriand. præpar. & modice contusi ʒj. in sacculum coronealem, ut artis est redigantur.* Die Iouis febris multum sese remisit, & omnis dolor in ventre ac lumbis sedatus est, nec amplius caput dolebat, ac bene in partu purgabatur: hoc tantum restabat, quod nocte non dormierat, & hoc ex hordeato venisse putabat, inquit, si lac acetosum vel ebutyratum cum ouo bullitum comedissem, ut in puerperio alias solita fui, bene dormiuissem. Tunc iterum iniecit glande, & ut illud lac sumeret admissio, amplius non febricitauit, sudauitque egregie, & purgatione menstrua optime procedente, septimo die a partu computando, a febre libera, recte deinde valuit.

SCHOLIA.

Quibus modis mola vera curetur, exemplis dictis, & postea etiam vno subsequente, satis constabit. Attamen pro eius curatione, si non sponte reiciatur, curabimus ut ægra decumbat in domuncula angustiore, minus luci exposita, modice perflata, cubili immobili, sed ita ut pedes habeat elatiores quietosque. Motus enim quamlibet flu-

Curatio mola.

tionem concitat, ut testatur Paulus. Itaque aer temperatus in actiuis, aut modice ad calidum & siccum vergens eligatur somno moderato utantur, exercitium potissimum partium infernarum fugiant, quandoque vero moderata deambulatione confert: si alius lenis quotidie & immodici animi, affectus omnino vitentur. Cibi tribuantur quantitate moderati, ac boni succi, sicque vini odorati, optime diluti potus: cum quibus interim ea quæ laxandi viribus prædita sunt, permisceas, & ea etiam quandoque quæ extenuandi vim habent. Vbi corpus plenum, in principio, ut diximus, venam secare iubent Paulus & Aetius, ac alii, si nihil prohibeat, venamque cubiti secant: interim quoque, præsertim circa initia huius affectus, malaeolorum venam secare conuenit, multo sanguine abundante post sectionem venæ cubiti. Alii imprimis corpus purgare iubent cum propriis præparationibus, respiciendo excrementa, quæ magis abundant, ne copia trahatur ad vterum: quo facto, si ferat ægra, venam secant tali, ob has cucurbitulas cum multa flamma pubi apponunt. Haud tamen multa copia sanguinis extrahenda est, quin potius, ubi opus fuerit reiteranda. Verum si frigidorum crassorumque humorum copia adsit, ij parati purgandi sunt, ut alias diximus de suppressis mensibus. Deinde particularem curationem absoluemus, iuxta Aetium & alios, per cataplasmata relaxandi vires habentia, fomenta, collutiones mitigatorias, pessos mollitorios, qui ad durities vteri ante descripsi sunt, infusiones eiusdem facultatis, cerata ex althæa & diachylo supponemus, deinde (ut Aetius inquit) cucurbitulas cum scarificatione apponemus. Hæc quidem in ipsis exacerbationibus admittere oportet, in intervallis autem corpus reficiemus iis, quæ ad hunc usum conueniunt ut gestatione, deambulatione, balneis, idoneis cibariis, ac vini potione. Partibus etiam affectu dropaces illinemus, & nitrum cum sale inspergemus, easdemque insolabimus, & medicamento e sinapi & carycis rubificabimus: mollitoriis præterea e seminibus, & baccis lauri & polyarchio ac similibus utemur: sufficimusque vapore marinæ aquæ. Primo tamen sessionibus emollientibus locos, ut facile mola excutiat, iis utemur, quæ etiam ad partum facilitandum postea dicemus conducere, atque iisdem, quæ valere diximus ad ostium vteri clausum relaxandum & aperiendum, quemadmodum etiam utilia scripsimus in virginibus, in quibus de angustia vteri nobis suspicio erat, ut sunt decocta althææ, fœnugræci, ficuum: e quibus etiam emplastra imo ventri conuenientia parari poterunt. Sed sessiones magis sunt utiles, etiam ex decocto. maluarum, althææ, chamæmeli, sem. lini, fœnugræci, meliloti, anethi, in aqua vel hydrelæo. Osculo præterea vteri cerata mollentia vntionesque admouebimus, ut æsypi ceratum, adipem, & medullas, & cataplasmata apponemus qualia posuimus, *Observat. 61.* & pessos mollitorios ibidem descriptos imponemus. Temporis processu lauri folia vel baccas, pulgium, hyssopum, thymum, saluiam, marrubium,

dictamnium, scordium, polium, centaurium, iisdem miscebimus, vel ex decocto. Olla autem cuius operculo perforato arundo commode inserta fuerit, sellæ supponetur, atque inde per arundinem vapor excipietur. Ex eorundem quoque decocto, exiguo vino albo addito, fœtus cum spongiis fiant: post quos imus venter, pectus, & inguina infra scripto vel simili vnguento perungantur. *℞ olei irini, lilior. albor. anethini, chamæmel. ana ℥j. butyri recentis, adipis anseris, ana ℥ss. ladanii ℥ij. cera & vini odorati parum, fiat vnguentum.* Adici poterunt cremor sem. lini, fœnugræci, althææ, ammoniaci, aut bdellii dissoluti in vino pauillum, & pessi subiciantur ex æsypo, butyro, adipe porcino, medulla aut cerebro ceruino, melle, carycis pinguibus, passulisque cum oleo antiquo ligustrino. Perseuerante vero malo, acrium eduliorum usus est admittendus, iisque fontibus calidarum aquarum, & marina, iuxta Aetium, est innatandum, atque a summis raphanis euomendum. Pessos tamen acriores & infusiones acriores euitare oportet, ne loca assidua eorum usu ulcerata maleficum morbum efficiant. Quibus peractis frequentissime plurima atri & grumescens sanguinis copia repente excernitur, & morbus dissoluitur. Neoterici hæc addunt, quod eadem ratio curandi hunc affectum, & intentio sit mouere menses, plane ut si deberet extrahi sicut mortuum medicamentum, vel cum retinetur secundum a partu. Omnia enim quæ venas aperiunt, & impetum humorum faciunt ad inferna, possunt hæc tria facere, sicut & facerent abortum. Priuatim vero in mola tentabimus id potionibus trahentibus ad inferna copiam sanguinis, præcedentibus prius purgationibus & remediis vniuersalibus, & demum aperientibus localibus, seu pessi sint, seu balnea, vel emplastra, vel inunctiones: tamen iisdem prius relaxantibus mitigatoriis, emollientibus utendo, ut diximus, deinde magis aperientibus, menses euocantibus, & fœtum mortuum educantibus: nam postremo loco potionibus remagemus, & pessi & balneis valide prouocantibus, de quibus etiam diximus in mensium prouocatione. Ad molam igitur, ut nos fecimus, trochiscis de myrrha utemur. Sed qua intentione? mouendi menses. Sic Rhases propinat in potione trochiscos, quos etiam propinabat supra in mensium suppressione. Etiam priuatim hos trochiscos cum adipe aliquo miscebimus, & pessum conficiemus. Quod si fortius facere libeat cyclaminis radice utemur, modis omnibus parata & in pello, & in balneo, & emplastro pubis: scilla cocta & imposita cum adipe. Iuuant vero & quæ commotionem multam faciunt, ut sternutamenta, & quæ tussim mouent. Vnde Hippoc. Si secundam procidere vis, sternutamenta moue. Est autem his omnibus viris utilis aristolochiæ vtriუსque radix, quocumque modo utaris. Nam ad facilitandum partum eius potione utitur, sic & ad secundam extrahendam, & fœtum mortuum. Iuuabit & infusus. Sed secunda sæpius retinetur (de qua suo tempore latius) quoniam in partu vterus est inflammatus, ideo extrahi nequit, ni prius inflammatio

Ratio vicia.

De vena sectione.

Purgatio.

matio solvatur, vena secta, & fotibus, & inedia, & balneis. Solent autem hi affectus periculosi esse ob acutas febres, quæ hinc sequuntur. Ex compositis etiam laudatur in hoc usus elleborus albus suppositus cum styrace liquida vel ladano. Rursus sabina herba bibita, simul & supposita naphtha. Iuuat in his omnibus casibus item hoc. *℞ opopanax, fellis taurini, ellebori albi, q. s. misce.* Aliud *℞ scammonio & agarico & hiera mistis.* Aliud simplex, borax dictus ad 3 ℔. Modus emplastri supra pectinem, cum colocynthide & cyclamine, & succo rutæ. Sic & Rondeletius ad molam vituraperientibus & fœtus mortuos aut secundinam reicientibus, de quibus multa propriis capitibus. Componit has pilulas, quibus frequenter vtantur mane. *℞ boracis 3j. carabos, asari, cinnamomi, nigellæ Romanæ, & vulgaris, sabinae, an. 3j. galbani, assæferide, opopan. bellii, ana 3j. cum melle scillitico: de quibus capiat 3j.* (textus corruptus est, qui habet 3j.) *dnabm vltimis, deinde 3 ℔. postea bibat parum vini hippocratis, aut syrap. quem describit cap. De suppressis mensibus.* Vtatur frequenter in cibo apio, aliisq; herbis aperientibus, & incidentibus, vt sanguis cōtineretur dissoluatur efficiaturq;. Non esset inutile, inquit, cutim, si in orificio appareat, nouacula, aut alio instrumento dissecare, deinde ea ratione curare, qua vsi sumus in secundina adhærente, ex putrefacientibus, vel arrodentibus, iuxta eundem Rondeletium. Addam hic casum (qui satis erit per exemplo curationis) Iohannis Tiengii Medici quondam Amstelamensis, qui anno 1518. in fine Augusti hoc modo mulierem Dauentriensem curauit a mola quam per annum gestauerat. Primo exhibuit 3j. *carbith. & xinz. cassia lignea, cinnamomi, an. 3 ℔. cum decoct. artemis.* Post quatuor dies idem dedit, deinde omni mane cyathum vni clareti, quo solitus erat vti pro partu facilitando: attamen prius dederat iuleb descriptum a Nicolao cap. De retentione menstruum. At claretum ita parabatur. *℞ capit. von. 3 ℔. verbenæ, artem. beton. pulegii, sabinae, rad. pæon. & sem. eim. an. 3j. corticem cassia, gallia moschata, an. 3j. nucle moschata, rasura lapid. dactylor. sem. althææ, fœnugr. caryophyl. ana 3j. croci 3 ℔. dictamni, baccar. lauri blatta byzantie, cubebarum, ana 3j. 3 ℔. cinnamomi electi 3j. bulliant in vini Rhenensis optimi ac puri lb ij. vel iij. cum 3 iij. sacchari, & 3j. de corde cerni, fiat claretum.* Deinde iussit, vt inungeret locellos ilia, & pectinem vnguento suo molliente, mane & vespert, ita parato. *℞ olei lilii. amygd. dulc. viol. ping. anseris, gallinae, an. 3j. o. chamamel. aneth. ping. anath. mutilag. stanngr. lini & althææ, an. 3j. 3 ℔. olei cheyrini, medulla cruris vituli, butyri recentis, an. 3 ℔. vitellos duos ouorum cinnamomi electi, gallia mosch. 3 ℔. pulueris sentar, vt docet, & fiat vnguentum secundum artem: quandoq; addebat parum pulueris pæoniæ.* Deinde aperiri iussit venam saphenæ pedis dextri. Et omnibus 4. diebus dabat turbith modo iam dicto. Postea dedit 3j. confectiois suæ de assa fœtida cum cyatho vno succorum verbenæ, prassii, mixtorum cum vino Rhenensi. Hæc est descriptio valens ad fœtum mortuum quoq; educendum. *℞ assa fœtida*

3 ℔. sem. ruta cassia lignea, rasura lapidis dactylorum, boracis, an. 3j. 3 ℔. croci 3 ℔. myrrha, theriaca diachesteron, an. 3j. Misce dabat aliquando 3j. cum aqua sabinae. Cum eo (vt idem refert) curauit mulierem quandam, quæ prius pepererat infantem viuum, sed relicto deinde altero mortuo, cuius caput & brachium detracta ac abscissa erant, reliquiæ remanentibus, cum clausum esset os sacrum, & cessassent accidentia partus. Dedit mane & vespert ante cibum 3j. donec ab omnibus repurgata & curata fuerit. Idem quoq; dedit (vt asserit) aliquando cum decoct. artemisiæ, modo cum succo verbenæ, & prassio mixtis cum vino Rhenano, & hoc auctoritate Nicoli, modo etiam cum vino decoct. verbenæ & prassii, & semper (inquit) gratia Dei, bene successit. Sed præter hæc iam dicta, etiam huic mulieri molam habenti dedit omni vespere ante coenam per boram 3j. trochis. de myrrha, cum cyatho vno clareti suprascripti. Deinde etiam peracta phlebotomia, & sumta confectioe ac potione, etiam pectinem fouebat, ac loca dicta, fotu sequenti. *℞ malua, parietar. branchæ vrsinae, mercurial. an. m. j. pulegii, sabinae, artemis. an. m. 3 ℔. sem. fœnugr. lini, althææ, anethi, an. m. 3 ℔. fiat decoctio, & fotu peracto, & corpore repurgato, vnguebat vnguento suo emolliente dicto.* Quibus præsidis fuit a mola liberata & curata. Ac iisdem remediis, vti addebat, curauit illustrissimam Elizabetham reginam Daciæ, & consultatione ad eandem præscripta.

OBSERVATIO LXIII.

De mola aut sanguine crassiore, quem hydrops subsequatur, deinde mors.

Vxor D. Guilhelmi Cripit, viri consultißimi, & vrbis Delphenis Pensionarii, cognata D. Viglii, cum ventrem tumidum a puerperio haberet, post duos menses, tumore perdurante, & magis crescente, ego & Cornelius Heydius, collega meus anno 1563. 10. die Augusti ad eam curandam, acciti fuimus. Signis igitur præcedentibus, tum præsentibus animaduertis (vt postea latius dicemus) cum a tempore partus præcedentis tumor remaneret, & non satis purgata esset, imo omnia statim retenta essent, ventre tumido perdurante, vel molam, vel saltem sanguinem crassiorem, huius mali causam esse existimauimus. Ideo operæ pretium esse duximus menses aperire: cum relaxantibus & emollientibus: etiam vnguentis per intervalla, & quæ simul status discuterent. Primo, adhibitis quoque purgationibus aptis, cum alius ficiot nequaquam responderet, etiam externis apposis quoq; emollientibus linimentis, & vnguentis: habita semper ratione ad fontem illius mali, nempe vterum. Nam ex eo reliqua symptomata oriebantur, vti cachexia, & postea superueniens hydrops, hepate refrigerato, per consensum, tandem etiam incrementum maius malum cœpit. Decimo itaque die Augusti, vtriusque consilio, pro fecum communium educatione leniens medicamentum præscriptum est. *℞ elect. lenitui 3j. dissol. cum 3 iij. decoct. pectoralis.* Mane sumit hora septima, & fecibus communibus educis 11. August. portio sequens exhibita

fuit. \mathcal{L} corticum radicum feniculi, petroselini cichorii, asperag. ana \mathfrak{z} β . semin. feniculi, petrosel. carui, dauci, ana \mathfrak{z} β . semin. 4. frig. maior. ana \mathfrak{z} β . matricariae, calamintha, arthemisia. ana m. β . capill. ven. polytrichi, ceterach. ana p. j. vuar. passul. ab acinis repurg. \mathfrak{z} j. folior. senae \mathfrak{z} β . rhabarb. selecti \mathfrak{z} j. schœnanthi. \mathfrak{z} β . fiat omnium artiratione decoct. in aqua communi ad \mathfrak{z} x. collat. addendo \mathfrak{z} ij. syrup. capill. ven. syrup. de calaminth. ana \mathfrak{z} j. arom. cum \mathfrak{z} ij. cinnamomi electiss. & fiat claretum pro duabus dosibus, fuitque ter reiteratum. Ventrem inunxit cum oleis emollientibus, ut liliaceo, & pinguedinibus anseris, gallinæ, & similibus. Postea & hoc linamento. \mathcal{L} olei sabine. \mathfrak{z} j. olei lilior. irini, unguentum Agrippæ. ana \mathfrak{z} β . misce. Die 17. Augusti. \mathcal{L} spec. dialacæ, diacucume, ana \mathfrak{z} j. spec. diacucumini \mathfrak{z} β . dissolutis in aqua artemisia, adiectis \mathfrak{z} ij. sacchar. fiat confectio in tabulis, diuidatur in partes sex: capiat vnam ante meridiem, & hora quarta pomeridiana alteram partem. Ventre modo etiam inuncto oleo liliaceo, & iterum postea etiam superscripto, & post aliquot dies sumebat rursus quod sequitur. \mathcal{L} calamintha, pulegii, nepetæ, sabinae, ana m. j. ceterach. polytrichi, ana m. β . semin. feniculi, dauci pastinacæ, ana \mathfrak{z} ij. folior. senae, \mathfrak{z} β . agar. albi feminini leui, rhabarb. elect. ana \mathfrak{z} j. zinzib. albi, schœnanthi, ana \mathfrak{z} j. fiat decoct. in aqua & vino Rheneri, vsque ad \mathfrak{z} viij. cola. adde syrup. de arthemis. \mathfrak{z} ij. fiat apozema pro ij. dosibus matutinis, clarificetur, & arom. cum paucis cinnamomo ad formam hippoc. Semper ter eo ad minus ventrem deponebat. Eodem tempore accitus est Hugo Nieuenius, Medicus Haganus: & rursus communi consilio fuit repurgata, & puluere diacumini, dialacæ, diacucume, diagal. rursus exhibito & lenitio, & medicamento purgante vsi sumus ac vnguent. emollientibus insistebamus, eisdem pulueres, vel similes, cum vino maluatico exhibentes, etiam lotionem pedum vrentes ex flor. chamæmeli, meliloti, artemis. pulegii, sabinae, matricariæ, maluæ, althææ, fœnugræc. cumino, & pastinacæ sem. in vino & aqua decoct. ut materia deorsum detraheretur, & uterus aperiretur, etiam subinde claretis supradictis reiteratis, radic. iridis adiecta, tum aliis, ut foliis senæ, agar. & rhabarb. ut prius in maiori dosi. Tandem etiam post emolitoria, hoc sub vestibis suffitu vsi sumus. \mathcal{L} myrrha, cumini, ana \mathfrak{z} ij. calami arom. cinnamomi, galangæ, maci, aristoloch. long. ana \mathfrak{z} j. fiat pulu. crasso modo contusus in tres partes diuisus: proiciebatur vna pars supra carbones ignitos, & fumum ac odorem sub vestibis recipiebat, & capiebat hora 4. matutina tres pilulas infrascriptas. \mathcal{L} trochisc. de myrrha \mathfrak{z} j. cum syrup. artemisia fiant pilula ix. Ex istis medicamentis continuatis tantum semel visi sunt menses, sed iis rursus restrictis, nihil subsequutum. Vnde tædio affecta, omnia remedia respuendo, vltius progredi recusauit. Postea anno sequenti 1564. iterum ego & Cornelius Heydius vocati fuimus, cum per annum curationem intermisisset, & rogatu Domini Pensionarii, eius mariti, hanc epistolam a me tum Heydio

scriptam ad medicos Brabantinos, ut Dominus Viglius a Pensionario efflagitauerat, misimus.

S. P. I Am integer annus elapsus est, quod nos ad uxorem

Domini Pensionarii vocaremur, ut presentes omnia contemplantes commodius ac firmitus eius incommoditati pro ratione consuleremus. Deprehendimus insignem quandam ventris cum duritie quadam et morosa. Ex domini Pensionarii matre didicimus, hebdomadas aliquot ante peperisse, vel potius ob sævum immaturitatem abortum fecisse: & propter parvæ accelerationem obstetricem non adfuisse in tempore, atque diutius hæsisse in secundarum extractione. Additum est quoque, in puerperio non satis fuisse expurgatam, & subito omnia fuisse retenta. Hinc collegimus, crassum aliquem sanguinem, in matrice suppressum, & in eo viscere impactum esse, cum admixtione humorum flatulentorum. Et quia negotium nobis videbatur, non sine periculo, vocatus est tertius Medicus Dom. Hugo Hagenfis, ut communi consilio inuestigaremus, quid utile factu foret. Primo, vsi sumus aperientibus, incidentibus, & flatibus dissipantibus. Deinde moderate purgantibus, atque incidentibus, per intervalla. Tandem ad ea peruenimus, quæ exterius applicata emolliunt, per es interea administrando ea, quæ menses euocare queant, immixtis semper iis, quæ flatibus discutere debeant. His remediis effectum est, ut semel visi sint menses. Ad extremum tadio affecta, & medicamentorum usum respuens, vltius progredi recusavit: tum quod belle se habere videretur, tum quod iterum gerere se suspicaretur. Id quia nobis non apparebat, egerrime tulimus, quod a bene corporis desisteret. Interea temporis uterus cum ventre toto molem illam sibi seruauit in hunc vsque diem. Veritus igitur Dominus Pensionarius, ne malum accresceret, ac tandem ad desperatam aliquam valetudinem deueniret, denuo nos vocauit ad diem Augusti decimum, ut diligentius omnia peruestigando de morbo uxoris, tractarem necessaria ad salutem. Inuenimus tumorem paulo maiorem quam anno præterlapso, cum aliqua corporis macie, sine vlllo tamen pedum tumore. Venter circa sinistra hypochondria ad ilia vsque nullam præ se manifestam duritiem ferebat. Totus autem versus dextram intumescibat, & tribus quatuorue locis disunctos in scirrhi modum nodos animaduertebamus. Bene tamen concoquit, & nullum prorsus sentit vllius membri, aut visceris dolorem. Hoc tamen patitur, quod consueto more diuturna exercitia ferre nequeat, nam solito citius lassitudinem, ob spiritalium partium prævitiis distentione, coarctationem sustinet. Etiam si insignis durities circa hepatis regionem reperiatur: vrina tamen optimam indicat tam colore, quam substantia ac hyposth. concoctionem. Pulsus minor, crebrior, ac cum quadam tensione, quam olim duriore. Suasimus igitur, ut rursus eadem remedia quæ alias, & si res postulet, vehementiora pro virtutis ratione adhiberi permittat. Nobis autem vsus eorum, quæ flatibus dissipant & menses euocent, placent. Balnea emollientia, aut saltem fomenta meatuum recludentia non erunt inutilia, adhibitis etiam, si opus est, metrenchytis. Si hac omittantur, veremur ne temperis tractu in ascitem, ac tandem in mortem incidat. Non dissuaderemus interea, ut peritiores aliquot

aliquot medici super hac agitudine consilia sua patefacerent, priusquam res ad actum deducatur. Nos autem accuratissime omnia perpendimus, & pro arte ac conscientia nostra hac facienda duximus. In rei veritatem ac fidei confirmationem, nostrum consuetum chirographum apposuimus. Delphi 16. August. anno D. M. D. LXIII.

Cornelius Ericius. Petrus Forestus.

Antequam ad reliqua remedia veniamus, quibus denuo usi sumus, liber his subiungere scriptum ipsius Corneli Gemmæ Medici Louanensis.

Consilium in casu vxoris clarissimi D.
Pensionarii.

Quam ex narratione vestra, celeberrime Dom. Pensionari, & signis omnibus oratione expertissim. Dominorum Doctorum luculenta atque erudita admodum descriptis, consequi licet, omnes sane mecum, ut coram differui, tum in morbi ratione, tum medendi methodo, atque vniuersali quadam consequendi scopi notione pulcre conueniunt. Symptomata etenim precipua sunt, ventris immodicus tumor; abscessus quidam scirrhus in ipso epigastrio cum duritie quadam, tensio quoque sub hypochondrio dextro, ac mensium suppressio nimis diuturna; qua tamen non tam symptoma, quam mali causa merito recenseri debet. Verum, quia circuitus quidam inter causas & effectus apparet, dicimus, factum ex suppressione mensium, ut ipse uterus inciderit in intemperiem frigidam & obstructionem validam; fierique rursus, velut per circuitum quendam, ut ex flatu & intemperie frigida iam uterum occupante, causis quoque morbisque robur accedat, ac menses ipsis magis magisque indies obstruantur. Causas externas omnino in aeris externi iniurias reici, forsitan & in intempestiuam victus rationem, non improbo. Locus affectus omnino in utero est, si de fonte mali questio fiat: quanquam & per consensum verisimile est, ut, paulatim ad hepatis regionem affectus & intemperiei noxa pertingente, paulatim quoque in corpus vniuersum deriuari possit, atque (ut clarissimi Domini Doctores referunt) etiam in tympanitem; atque inde in ascitem atque hyposarcam permutari. Posset tamen ipsum abdomen istiusmodi scirrhi corripere: aut etiam aquoso tumore repleri non affecto hepate; ut aliquando accidisse memini. Verum tunc potius afficitur ea capacitas, qua est inter abdominis musculos & peritonæum, ut humor aquosus abscedat. In hoc enim casu videtur ab utero refrigerato per venas eo pertingentes paulatim ad venam cauam atque arteriam aortam intemperies frigida processisse: inde vero propagines proximæ venarum atque arteriarum ad abdominis regionem protenduntur. Et quia non ab ipso fonte sanguificationis, sed alia parte minus principe vena refrigerantur; ideo nec aequalis tumor, nec aqualiter diffusus, sed, per modum adhuc virtutis valde expellentis, in scirrhus degenerat, exundante eo quod inutile est, & aquosum per orificia venarum in abdomen; ubi rursus a frigore circumfu-

so concrefcit, & digesto eo solo per cutem quod tenue est, reliquum magis indurefcit. Iam & ex utero affecto, ut dictum est, hepar affici possit; unde timenda ascites, ut Doctores eximii quoque timent, si remedia apta omitantur. Imo, si rem omnem ingenue fateri liceat, iam & ipsius hydropis potissimum ascitis, rudimenta ex scirrhuso tumore satis elucescunt: qua tamen sperare in ipso mali exordio, si, ut cœperunt eruditissimi Domini Doctores, tum medicaminum conuenientium, tum victus probe rationi obtemperet, omnino comprimi & extinguere posse. Causam materialem vniuersim flatuum nomine comprehendo: etsi hic ipsius paulatim, maiori oborta refrigeratione, in aquam transmutetur. Causa formalis est distensio uteri a flatu. Cui ut causa continens adiuncta est alteratrici facultatis imbecillitas in venis uteri. Morbus autem ipse obstructionis nomine est comprehendendus, cui annexa est causa continens, temperies frigida. Cui ut occurratur, omnino in rem fore existimo, ut Doctorum virorum consiliis, qua experta sit hactenus, audacter obsecundet: sunt enim Methodici, atque experientia non parua, quantum ex scriptis elicere potui. Sed ut particulariter aliquid ex me depromam, quo humilitati vestræ satisfaciam, mihi sane non inutile videretur, si lenitio medicamentorum ex rhabarb. & agar. & foliis senæ prius exhibito, etiam, si opus videbitur, adiecto pauxillo elect. de succo rosar. aut consimili medicamento, quod eius vim suppleat; ad potum ligni Indici cum vino Pictauiensi, & aqua decocti iuxta rationem quæ commodissima videbitur, velut ad salutarem anchoram, confugiat. Merito enim huiusmodi medicamentum exhiberi debet, quod continua transmutatione corpus afficiat, ac partes affectas vna corroboret, ipsique minimum fastidii pareat. Hac omnia puto esse in ligno Indico: aperit enim potenter cum adstrictione moderata, atque frigidam intemperiem, partium maxime, ad natium calorem reuocat, si pro natura & morbi conditione exhibeatur. Quæ si paulo medicandi ratio asperior videatur, habetis & radicem china, cui etsi molliori, non minores tamen vires attribuant Neoterici. Verum de his vberius atque exactius D. D. Doctorum esto iudicium, quibus illam quotidie coram intueri, ac singula definitius examinare datum est. Ego suaderem, ut semel in mense vteretur hoc infuso: ℞ rhabarb. selecti ℥ ij. agarici optimi ℥ j. foliorum senæ ℥ ij. anisi. spica. xixzib. ana ℥ ss. colligata in pupulam macerentur in ℔ j. decocti, in quo sint pruna vj. numero, cuscuta, agrimonia, eupatorii, ana ℥ j. rad. asparag. ℥ ss. radic. iridis Illyrica, gentiana, cappar. tamarisc. cyperi, ana ℥ ij. coletur. adde sacchar. optimi q. s. vini Rhenani parum: fiat potio pro ij. dosibus maturinis: pupula infusa per noctem & expressa valide, quod si minus sit efficax, addatur elect. de succo rosar. ℥ j. Inde vero confugiat ad potum ligni guaiaci preparati secundum artem; vel hoc modo, si consultum ceteris videbitur: ℞ ramentorum ligni sancti ℔ j. ss. minutim concisa macerentur in ℔ xij. aqua fontis per 20. horas, inde bulliant in duplici vase bene cooperto, adiectis ℔ iij. vini Rhenensis, circa finem decoctionis, bulliant per duodecim horas, coletur; atque ex eo bibat mane hora sexta, & post mox

11. *Idem hora quarta. Rursus super iisdem ramentis fiat altera decoctio, adiecta simili quantitate aqua ac vini; adiciantur & anisi ℥ ij. bulliant omnia per duodecim horas. Utatur eadem decoct. loco potus familiaris. Sequatur hanc rationem, si possit, per sex septimanas; sin minus, per quatuor. Quod si ab hoc curationis genere prorsus abhorrebit, suaderem illi usum huius pulvisculi, aut non absimili: ℥ rhabarb. electissimi ℥ ij. seminis bismalua. liquir. rasa, anisi, ana ℥ j. rosa. rub. corticum radic. cappar. cyperi, ana ℥ j. granorum paradisi, macis, semin. leustici, fileris, montani, baccarum, lauri, galanga, rad. irid. Illyria, gentiana, salis gemma, an. ℥ ss. cinnamomi optim. ℥ ss. sacch. diatr. frig. ℥ j. fiat pula. dos. ℥ j. semel in die sub auroram, cum medico vini Rhenensis diluti aqua cocta, in qua sit medicum sacchar. candida. Communiter suaderem & hoc elect. frui, praesertim horula una ante cibum: ℥ anisi, seminis bismalua, glycyrrhiz. rasa, melon. florum viol. ana ℥ ss. granorum paradisi, corticum arantiorum, ligni aloes odorati, ana ℥ j. galanga maioris, baccarum lauri, ana ℥ ss. seminis plantaginis maioris, ℥ j. croci, mastiches, cinnamomi, rosa. rub. ana granor. vj. calamintha, ℥ j. sacchar. albiss. dissoluti in aqua ros. q. s. adiecto modico vini granat. fiat elect. in tabulis. Unguentum quo vteretur ad emolliationem & digestionem moderatam, sic parari iubere: ℥ vnguent. resumt. opr. ℥ ij. olei mastichini, viol. olei de cappar. ana ℥ ij. mucilag. cydon. ℥ ss. coma absinthii pontici ℥ j. florum viol. ℥ ss. styrac. calamita ℥ ss. misce. Aut si malit. emplastrum: ℥ coma absinthii pontici ℥ ij. florum ros. ℥ j. vnguent. resumt. ℥ j. adipis equina testibus detractis, aut alterius magis emollient. ℥ ss. styrac. calamita ℥ ss. cera parum, mucilag. cydon. ℥ ij. misce, fiat emplastrum molle. Utatur familiariter semini anisi, feniculi, etiam radic. eringii conditis, quarum ego vim in hoc modo non leuem expertus fui; accedit quod admodum sint delicate. Caveat a vehementer diureticis, nisi adiuncto rhabarb. aut aliquo solutiuo, quod crassiorem materia partem ad intestina trahat. Vinum illi potissimum Rhenense exhiberem; sed quia diureticum est; potius cum offula darem excafactum; idque pro ientaculo. Vina fulua putarem non obfutura, etiam qua moderatam astringentem obtinent. Imo ego vidisse memini, quae solum epoto vino Hispanico, quod tincturam vocant, omnino liberarentur, expulso copiosissimo lorio, & mensibus provocatis; sed tantum utebantur dimidia uncia post meridiem aut a cena intinctis offulis. Facit id compressione quadam & partium corroboracione; nec est quod alium obstructam iri metuamus. Caveat sibi a caseo, lacte, pinguibus & viscidis cibis, pane recenti, ceruisia male cocta aut crassiore, vino crassiore, terrestri, nimium adstringente, austero, vel acerbo, fructibus omni generis tanquam a peste, lactucis & omnibus olerum generibus, salsis omnibus, & carnibus porcinis, anatis, anserum, & id generis crassi succi, a frictu in sartagine, aut bis coctis, piscibus lentis, viscidis, duris, atque crassi succi, pastillis, aut leguminibus. Utatur carne potissimum vitulina, agnina, veruecina, pullorum, perdicum, cortinicum, &c. Utatur in cibus calamintha, hyssopo, salvia, maiorana, radice fiseris, thymbra, granis paradisi, cinnamomo, macere, nucis myristica, sed moderate ta-*

men. Vitet omnem animi agritudinem, latetur, oritur vitet; fruatur Venere tempestiva & moderata, &c. Ex animo tuus

Cornelius Gemma.

Secunda vero nostra epistola ad D. Pensionarium transmissa, haec continebat.

S. P. S. *Scribis ad nos, Clarissime Domine, Dom. Mathisium optare plurimum, ut symptomata explicatus paulo a nobis enucleentur, quo firmitus iudicium de vxoris tuae valitudine ferre valeat. Aperte matricarium esse morbum, & nos illos (qui maioris pile magnitudinem, quod olim non indicauimus, superant) non in musculis, sed intus in utero, ob sanguinis crassioris suppressionem latere significauimus: unde nullo negotio poterat aut molam esse, aut sanguinem concretum induratumque (ut malis) colligere. Hypochondria sinistra olim quidem molliora, sed nunc propter abdominis distentionem prorsus indurata sunt. Necdum omnia nobis apparent magnorum vasorum oppilationis indicia: veremur tamen ne propter lienis praesentem duritiem breui adsit. Vniuersi corporis habitus, excepto abdomine, ad frigidam quandam siccitatem inclinare videtur: priusquam tamen nobis innotesceret, calida ad humidum parumper vergentis temperiei fuisse putabamus. Haec sunt, quae pauci, ob tabularii festinationem, ad T. D. exarare potuimus: pluribus egissemus tecum, si per confratris mei agritudinem licuisset. Existimamus equidem hac satis fore, modo accuratius olim a nobis scripta examinare voluerit. Ego Cornelius, cum hoc mane Domicella coniuncta tua mihi a te scriptas redderet litteras cum multis lacrymis, ad misericordiam, si tamen ea sic appellanda sit, inclinatus sum: ut plane nihil attentare audeamus sine Domini praesentia, quia visa est omnino fugere medicamentorum usum diuturniorem. Obsecramus igitur D. T. ut quam citissime, ne praterlabatur occasionis opportunitas, ad nos huc redeat. Id quod enim praeter naturam est, siue mola sit, siue sanguis concretus, statim amoueri oportebit, ne in hydropem, ut antea scripsimus, vxor tua carissima incidat. Nam ad eam iam tendere videtur. Bene valeat Excellentia tua.*

Corn. Ericius

Petrus Forestus.

Missae fuit haec epistola in principio Septembris anno 1564. ad Dominum Pensionarium, qui apud Vigiliam Praesidem Brabantiae agebat Bruxellis.

Consilium Mathisii, Medici olim Imperatoris Caroli Quinti.

D. *Domine Pensionarie, legi ea, quae a Doctoribus Delphensibus priori subscripto addita fuerunt. Mihi verisimile non fit, molam esse quae vxor tua laborat. Mola enim ex viri semine, aut corrupto, aut alioqui ad formationem inepto ac inualido, gigni solet; quaque ea laborant, cibum fastidiunt, ad incessum grauiiores sunt; artus gracescunt; extrema oedematosa fiunt; denique omnes functiones imbecilliores fiunt: venter saepe compungitur, & quasi pondus pendet, quod in decumbente impetu quodam in quodcumque latus se vertat deuoluatur; tum etiam venter du-*

ter durior eſt, quam ſi legitimus ineſſet fœtus. Ex ſcripto animaduerto, aliquam eſſe corporis maiem, ſed ſine vllō pedam tumore. Scribitur etiam ſolito citius laſitudinem quandam ſentire, ſed bene concoquere, & vrinam optimam oſtendere concoctionem, tam quoad ſubſtantiam, quam quoad hypochonchionem. Poſterius ſcriptum addit, nodos ſentiri in vtero pile in modum obſanguinis craſſioris ſuppreſſionem; & hypochondria ſiniſtra aque ac dextra diſtendi, & circa lienem non ſecus ac circa iecur duritiem ſentiri; adeo vt vereantur, breui adfore vaſorum magnorum obſtructionem ac oppilationem. Ex his colligo, functiones naturales probas eſſe, & in prima ac ſecunda concoctione nihil deſiderari: verum animales, quod laſtitudo illa facile indicat, imbecilliores eſſe. Et quod primum ſcriptum habeat, pulſum minorem, crebriorem, & ſolito duriorē eſſe in præſentia, videtur vitalis facultas non admodum eſſe robuſta. Sunt hæc difficilia iudicatu, & quæ præſentiam agra omnino requirunt: alioqui vix eſt, vt accurate aliquid aut certo ſtatui poſſit. Secundum tamen ea, quæ proponuntur, ita iudico, vim illam naturalem, etiamnum vigentem, in agra omni diligentia eſſe conſeruandam in ſuo robore, & nihil propinandum eſſe medicamento, quod ipſam poſſit proſternere. Siquidem hæc iacente, nihil proficietur. Itaque ſi quid medicamento eſt exhibendum, vt per interualla omnino opus eſt, ſit illud clemens, naturam non admodum fatigans, quale poſſit eſſe rhabarb. aut agarici dilutum, ſena infuſum, & ſyrupus ille roſa. medicamentofus, & qui de cichoreo N. coli nuncupatur. Cibi interim offerantur medicamentofa quidem aliqui obtinentes, ſed guſtum non offendent; qui cuiuſmodi ſint, non eſt neceſſe doctiſſim. Medicos docere. Nouerunt enim ipſi, incidendi, atenuandi, & abſtergendi quapiam vi præditos debere eſſe; & temporis longinquitatem conſtante functione naturali, morbum cuncturam eſſe. Quæ licet ſit moleſta, eſt tamen tuta, & hic, vt exiſtimo, neceſſaria in agra, quæ medicamentorum uſum auerſatur. Nodos & ſcirrhos illos tumores quos Medici in vtero ſtatuunt, ego autem dubito an non potius in meſenterio aut pancrea ſubſtent, cum emollientibus & diſcutientibus oppugnandos eſſe cenſeo. Quæ emollientia & diſcutientia ita temperabuntur, prout ipſorum in progreſſu uſus indicabit. Totus cuiuſmodi & illinitiones non eſt mihi neceſſum adſcribere. Sic illas hypochondriorum durities tractandas eſſe putarim: & externis auxiliis maxime eſt ſidendum, non neglecta, vt antea memini, recta victus ratione; ſine qua in vanum omnino laboratur. Et cum dico rectam victus rationem; omnia ea complector, quæ Medici non naturalia nominare ſolent. Equidem ſcio, vterinos morbos, & præſertim chronicos, difficiles plurimum eſſe: atque ea propter agra adhortanda eſt, vt pertinaciter conſilio ſibi adſe & opitulari velit. Nam vbi tria ſunt, morbus, natura, & Medicus natura miniſter; ſi victoria ſperanda eſt, neceſſe eſt, vt agra natura, cuiusque miniſtro faueat, & adſit. Alioqui ſi agra morbum fouet, & Medicum naturæ inferuentem, & manum adiutricem porrigentem non audit, vrendum plurimum eſt, ne natura ſubſidio deſtituta, vt vndique compreſſa concidat. Vides, mi Domine Penſionarie, me quoque in externis auxiliis multum ſpei ponere,

atque in iis potius, quibus Medici quoque tui probant eſſe inſiſtendum, quam in iis, quæ per os ſolent magna cum inſtantia, & agra ſtomacho, obtrudi quotidie. Non quod horum aliquando, ſed clementiorum, non ſit uſus; ſed cum prudentia per interualla ipſorum auxilium ſit inuocandum. Reliqua Medici præſentes pro ſuo iudicio & rerum uſu moderabuntur. Ipſe autem Deus Opt. Max. ſuo fauore & gratia pro ſua erga nos Philanthropia cuncta ſecundabit. Bruxellæ 14. Septemb. 1564. raptum & perfunctorie.

D. T. paratiſſimus H. Matthiſius.

Ceterum Cornelii Gemmæ conſilium, tum Matthiſii quoque ſcriptum Dominus Penſionarius nobis tradidit. Quod autem Matthiſius molam ob hoc eſſe non putaret, quod ſemper a viri ſemine corrupto aut inualido gignatur, id quidem & nos facile admittimus. Interea fieri poſteſt vt vir validus, optimo ſemine præditus, molæ cauſſam generet, quemadmodum contigit in muliere illa valde prolifica, de qua paulo ante diximus, quæ tamen poſtea rursus imprægnata, præter fœtum etiam molam peperit. Antea quidem ſemen in viro ipſo fuit validum: at nunc cum molam conciperet, non eſt dubitandum quin tunc ſemen fuerit vel inualidum, aut nimis frigidum, aut nimis calidum, aut nimis paucum, aut nimis multum, vnde mola generata, & poſt partum quoque reiecta. Ita & hic fieri potuit. Nam, vt ex obſetrice etiam poſtea intelleximus, licet tempore pariendi fœtus, non tempeſtiue adfuerat, tamen in ſecundina parienda adfuit; poſt partum æque tumido permanente ventre: quamuis primum putabat fœtum ſecundum adſe; poſtea vero cum partus non ſubſequeretur, & ſtatim purgatio non procederet, & omnia retenta manerent, exiſtimabat vel molam adſe, vel ſanguinem concretum, aut aliud quippiam etiam purgationem ſolitam impediens. Quod ſi mola non fuerit, ſaltem ſanguis ille menſtruus concretus & craſſus in vtero procul dubio aderat, ita, vt veriſimile ſit, totum mali fontem ex vtero veniſſe; eoque refrigerato, reliqua viſcera poſtea læta fuerunt: vnde & hydrops metuebatur; cuius rudimenta iam aderant, quaſi, quæ & molam ſubſequi ſolet diuturnam; poſtea quoque crure dextro œdematoſo ſuperueniente; licet bonis remediis, vt dicturi ſumus, detumuerit. Sanguis autem ille ex conſueta purgatione retenta, ſi non fuiſſet adeo craſſus, facile educi potuiſſet remediis ad menſes euocandos valentibus. Ideo forte ob ſuam craſſitiem quaſi molam ſanguineam contraxiſſe, veriſimile quoque eſſe videtur; vnde durior, & minus putredini obnoxius conſiſtentiā parenchymatis acquiſiuit. Nā mola aliquando, vt Rondeletius refert, quemadmodum & ſuperius diximus, ex ſanguine craſſo (piſſoque calore concreto, quæ nullam formam habet, velut parenchyma quoddam vtero alligatur, & ſic tumor

apparet durus: qui etiam hic in principio in regione vteri sentiebatur. Potest & talis sanguis si menstrua purgatio non subsequatur, frigore concretescere & durior euadere. Quanquam memini filiam seniore Domini Comitissae de Egmont, quæ nusperat Domino Houtkerchio, dum in puerperio existeret, & suffocatione vteri aliquando laboraret, a qua tamen subsequente mediocri purgatione menstrua utcumque curata fuerat, ut me relinqueret, postea diebus aliquot intermissis syncope prehensam dum in Haga Comitissae ageret, subitoque extinctam fuisse, ut tempus me rursus vocandi non superfuerit. Verum cadauere postea dissecto, dum balsamo, per me & Huernium, Medicinæ professorem, cadauer condiretur, sanguis adhuc leuiter concretus in vtero inuentus est, quasi putrefactus, ex quo forte vapores ad cor ascendentes, causa syncopis, deinde mortis fuere. At in hac nostra ægra cum, ut verisimile est, durior & crassior fuerit sanguis in vtero, minus corruptus, talia accidentia non adferebat. Ideo quamuis Matthiæus, Medicus excellentissimus, subtrubabat sanguinem concretum, vel nodos illos scirrhusos, potius in mesenterio seu pancrea subsistere, & non in vtero; minus credere potuimus, ob consuetam purgationem in vtero retentam, quæ post partum subsequi solet. Interea tamen vna sentiebat, qualiscunque is tumor esset vel sanguis, semper iisdem remediis quibus nos vti fueramus, eundem amoueri debere, & emollientibus & discutientibus. Ita & Cornelius Gemma nostrum processum curationis non solum laudauit; sed quod iisdem remediis insistere deberemus consuluit: quod etiam expertissimus ille Medicus senior fecit Baesdorpius, quondam etiam ipsius Imperatoris Caroli Quinti Medicus, quem & consuluerat Pisonarius. Et ideo cum morbus ex ipso vtero fons habere, prius curandus erat; aliis visceribus per consensum tandem oblatis minime quoque neglectis. Quare hic sanguis retentus & concretus, unde totius mali origo, siue in melam conuersus, siue aliter, tum emolliendus; tum dissipandus erat, etiam per ea, quæ menses euocant, exterius remediis iam superioribus dictis, tum aliis, quæ per intervalla per os exhiberentur, minime postpositis. Quamobrem Cornelius Ericius me senior, tum ego iterum, cum per annum curationem intermisisset, eoque malo ob diuturnitatem temporis in peius labente, vocati fuimus anno 1564. ut diximus, mense Septembri. Iisdem autem remediis, quibus prius vti fueramus, insistebamus, lenitio prius propinato, & aliis vntionibus exterius adhibitis; hoc quoque apozemate rursus præscripto: *℞ chamamel. chamapit. matricaria, artemisia, ana manip. j. ceterach, polytrichi, pulegii, origani, calamintha, ana m. ℞. sabina, trium flor. cord. ana p. j. radic. brusci, asparag. apii, ana ℞. seminis anisi, feniculi. carui, dauci, pastinaca, ana ℞. folior. sene, ℞. polypod. quer. ℞. rhabarb. selecti, agarici sem. ana ℞. schœnanthi, zinzib. albi, ana ℞. passul. enucl. glycyrrh. rasa, ana ℞. fiat decoct. in aqua ℞. & vini Rhenens. ℞. j. ad ℞. x. co-*

*latura addendo syr. de calaminth. de artemis. ana ℞. j. ℞. clarificetur & arom. cum ℞. iij. cinnamomi: misce pro iij. dosibus. Interea tabul. suprascriptis denuo utebatur, & imum ventrem cum oleo liliaceo & irino inungebat. In Octob. decoct. præscript. adiectæ sunt ℞. j. folio. sene & polypod. & hagioxyli artificiose leuigati ℞. j. ℞. decoct. in ℞. j. vini Rhenens. & ℞. viij. aqua pura ad ℞. j. saccharo dulcorabatur, & cum ℞. ℞. cinnamomi aromat. ad modum clareti, ventre hoc linimento iuncto: *℞ olei lini, lilior. ana ℞. j. ping. anat. gallina, butyr. recentis, ana ℞. vi. Ventre æque tumescebat, & durus erat; ut de hydropo magis suspicio increticeret; postea & vmbilico magis eminente, uti in exomphalo. Appositum est vmbilico emplastrum ex oxycroci ℞. ℞. supra corium rotundum firmiter ligando, ad aliquot dies retinendo; quo & vmbilicus subsidebat, capiendotunc ℞. j. ℞. vel duas ex rotulis spec. diacum. dianisi, diacinnamomi, & specier. diarod. abb. omni mane; & in Nouembr. ex syrup. magistrali hagioxyli sequente ita parato: *℞ calamintha, orig. artemis. nepita, sabina, pulegii, ana manip. j. rad. brusci, asparag. apii, ana ℞. j. radic. ireos, inula, paonia, feniculi. ana ℞. vi. seminis anisi, feniculi, dauci, pastinaca, ana ℞. iij. foliorum sene ℞. j. agar. semin. ℞. j. rhabarb. electi ℞. vi. zinziber. albi ℞. j. spica schœnanthi, ana ℞. j. ℞. liquir. ras. passul. mund. ana ℞. x. hagioxyli ℞. iij. fiat maceratio secundum artem, ad spatium 24. horarum in ℞. iij. aqua, & coquantur in duplici vase, & artis est, ad ℞. j. ℞. & fortissim. expressioni adde sacchari q. s. & coquantur ad consistentiam syrupi magistralis: & huius capiebat subinde cochlear vnum alternis diebus, ne tædio medicamentorum afficeretur. Interea & ventrem inungebat, ob tumorem durum, sequenti vnguento: *℞ gummi ammoniaci dissoluti in aceto ℞. j. oleo liliorum anethini, ana ℞. j. olei sabina, vnguent. Agrippæ, ana ℞. vi. cera exiguum; fiat vnguent. alioqui, vbi opus erat, apozemati superiori adiectis ℞. j. hagioxyli, cum foliis sene, agar. rhabarb. & polypod. etiam addita radic. irid. & inula: & post colaturam seu expressionem addebantur syrup. magistralis prius descripti, de eupat. de artemisia, ana ℞. j. cum ℞. iij. cinnamomi electi, ad formam clareti. In Decembri adhuc eodem, vel simili utebatur; etiam pro tribus vicibus pilulas sequentes accipit: *℞ pilul. de hiera simplici ℞. j. pilul. mastichinar. trochisc. albandal. ℞. j. fiant pilula xv. quinque pro vna dosi dabantur. Hoc quoque cerato toto ventri appposito, excepta regione hepatis, in corio ea parte exciso, ne hepar attingeret: *℞ mucilag. radic. althææ, radic. lilior. alboram, semin. fenugrac. & lini, ana ℞. iij. axungia porcina recentis, butyri non saliti, ping. gallina. caponis, anseris, ana ℞. j. ℞. ossi humid. ℞. j. quibus adde pulu. sol. malua, florum meliloti, chamamel. anethi, ana manip. iij. cum s. q. cera, fiat ceratum secundum artem; & cooperiatur sindone, cum interbattatione (ut ita dicam) ut artis est. Eodem tempore capiebat subinde cochlear vnum ex syr. sequentibus: *℞ syr. hagioxyli, de calamintha, de eupat. ana ℞. j. misc. Anno 1565. adiecimus syrupis dictis subinde syr. de artemisia & de prasio: & sumebat subinde iterum ℞. iij. confect. in tabul. ex*******

diacur.

diacur. dianis. & rursus decoctum superius descriptum, addendo, si opus esset, *folia sena, agar. & rhabarb.* vti & in Februario sine iisdem, etiam condito ex *cons. flor. rorismar, absinth.* Rom. adiect. *spec. plirisarcot. sine moscho, addito syr. de calamenth. & artemis.* Fuitque imo ventri appositum aliud ceratum ex *diachylo cum gummis, & mucilag. & empl. de melilot.* etiam assumpto subinde *syrup. de eupat. & artemis.* cochleari vno atque altero cum *spec. dialacca, & diacure.* idque bis in die. Hoc tempore coepit totum crus dextrum a femore vsque ad talum intumescere, totumque crus durum euasit, non sine oedemate, vt iam de hydropem magis mezus esset. Pro hoc symptomate totum crus balneo sequenti imposuit per duas horas, simul etiam fricando: *℞ florum chamamel. summitat. anethi, centaurei, absinthii communis, ana m. 4. florum geniste p. j. salis vitri, cumini ana ℥ ℔. incidenda incidantur, & contundenda contundantur; coquantur in aqua communis pro ℔ vj. adiciendo m. ij. salis communis.* Confect hydromi & oedemati, vt alias experti sumus; & hic adeo contulit, vt totum crus breui detumuerit. Rursus deuenimus ad decocta superius descripta ex *calamentha, puleg. sabina, & aliis, iam adiect. seminis ruta, rad. paon. rhabarb. sena, & agar.* vt supra; postea sine iis, vt hoc clareto videntes: *℞ calament. puleg. sabina, artemis. ana m. j. cap. ven. ceterach, polio. ana m. ℔. semin. iuniperi, carui, seselios, ruta, pastinac. ana ℥ ij. semin. geniste ℥ j. rad. ireos, brusci, aspar. ana ℥ ℔. liquir. ras. ℥ vj. coquantur in ij. par. vini Rhenens. & vna parte aquae communis pro ℔ j. colatura adde syr. de calament. & artemis. ana ℥ j. ℔. syr. de eupat. ℥ j. clarificetur & arom. cum ℥ ij. cinnamomi selecti, & ventre inuncto hoc vnguent. ℞ dialacca ℥ j. olei lilior. ping. gallina, olei menthini, ana ℥ ℔. pingued. anatis, medulla ceruina, exungia caponis, ana ℥ ij. misc. & denuo apposito cerato; etiam pessis ex iisdem pingued. mollitoriis vtero impositis. At istis omnibus remediis nihil profecimus, nec aperti sunt menses, nec vterus aut venter detumuit. Ideo Pensionario proposuimus, vt denuo Hugo Nieuenius Medicus accerferetur. Qui cum adesset, & praescripta remedia laudasset, conclusum fuit, vt iisdem insisteremus, & simul localibus remediis propriis ac pessis. Proponebam & ego eo tempore infusiones emollientes, deinde pessos. At pessis magis placebant & Cornelio & Nieuenio. Clareto autem superiori addebatur rub. tinctorum, ad menstrua magis euocanda, ℥ j. adiectis passulis mundatis. Pessi & hoc modo praescripti mense Martio, anno 1565. *℞ sabina, pulegii regali, origani Hispanici, florum rorismar. omnium exsiccat. ana p. j. trochisc. de myrrha spec. dialacca, diacurcuma, ana ℥ j. fiat pulu. vt alcohol. & cum melle q. s. fiant duo pessi, in quorum cuspide ponantur gran. ij. moschi, & sindone rub. cooperiantur, & filum sericum inseratur, vt ad libitum extrahi possit; circumlinantur oleo sabinae & spice, antequam per vetulam quandam honestam imponantur: idq; in diluculo mane, stomacho ieiuno, quam fieri potuit magna cum diligentia, in officium ipsius vteri vsq; ad fundum, per tres qua-**

tuorve horas ibi relinquendo. Sequenti die iterum impositum; deinde quoque adhuc semel sub noctem, ad sex horas ad minus relinquendo, vel per totam noctem. Sed vetula, vt imperauimus, prius intus vuluam digito hoc sequenti liquore inungebat: *℞ styracis, benzoini, ana ℥ j. cinnamomi electi, nucis moschata, galanga, ana ℔ j. moschi gr. ij. fiat puluer. vt alcohol. & incorporetur cum oleo spice ad vnguenti liquidi formam.* Alias ego commodè vsus sum in altera vna cum Cornelio collega, prius vtero inuncto cum oleo liliaceo, adiecto moscho, eodem tempore & hoc pello imposito: *℞ trochisc. de myrrha ℥ j. ℔. gentiana, baccarum lauri, aristoloch. vtriusq; an. ℥ j. cum suff. melle fiat pessus sindone inuolutus, & filo alligatus, vti ex diatessaro theriaca, ita dicta a quatuor rebus e quibus constat: ℞ gentiana, baccarum lauri, aristoloch. rotunda, an. ℥ ij. mellis despumati ℔ ij. Sed & hoc feliciter vsus sum ex succo mercurial, ℥ ij. salis nitri, gemmae, ana ℥ j. ex pracepto Benedicti Fauentini, praceptoris mei conuenit & hac metrenchyta: *℞ succi sabinae ℥ ij. succi ebulli ℥ j. croci ℥ j. aqua matricaria ℔ ℔. fiat metrenchyta.* At in agra hac os vteri quoq; oleo sequenti, tū pessum, antequam imponeretur, iussimus inungi: *℞ olei sabinae, liliorum sesamini, ana ℥ j. moschi gr. j.* Interea rursus utebatur hoc clareto: *℞ pulegii regali, calamentha, artemisia, melissa, sabina, maiorana, ana m. j. ceterach, capill. ven. polyt. chamapit, ana m. ℔. radic. fenic. apii, brusci, asparagi, ana ℥ ℔. radic. inula, paonia, ana ℥ ij. seminis anisi, feniculi, carui, ammi, pastinac. dauci ana ℥ j. ℔. liquir. rase ℥ ℔. coquantur in 2. partibus vini Rhenensis & vna parte aquae pro ℔ j. colatura saccharo dulcoretur & arom. cum ℥ j. specierum diacalamentha & cinnamomi ℥ j. ℔. & fiat claretum pro tribus dosibus matutinis.* In Aprili pessi ter reiterati, & decoct. long. cum sena, agar. & rhabarb. cum suis correctoriis, & herbis supradictis; & hoc linimentum rursus descriptum: *℞ olei irini, liliorum, lini, de meliloto, ana ℥ j. mucilag. fœnugrac. althæa, ana ℥ ℔. pingued. anatis, gallina, ana ℥ vj. cera medicum; fiat linimentum molle pro toto ventre, rursus apposito cerato mense Martio descripto. Paulo post pessi duo adhuc praescripti: ℞ sabina manip. ℔. calamentha, nepeta exsiccat. ana p. j. trochisc. de myrrha ℥ ij. styracis calamita ℥ ij. ℔. rubia tinctor. ℥ j. ladani ℥ ℔. gum. ammon. dissoluti in vino ℔ ij. irrita cum s. q. mellis fiant ij. pessi, vt supra. Tunc denuo visi sunt menses, & vtcunq; fluxere; at venter non detumuit. Postea rursus decoct. aperitiua descripta, etiam quæ ad hydropem facerent, adiect. radic. ebulli & aliis in vino, cum rubia tinctorum; & sub finem Aprilis pessi inditi. Denuo menses visi sunt in maiori copia. In Maio rursus decocta longa, vt supra, cum rhabarb. agar. sena, clareti insar descripta, & tabulae ex speciebus diacal. diacurcu. dialacca, arom. rosa. exhibitæ. At in mense Iunio magis ad hydropem inclinabat: & inter nos conclusum fuit, vt adderentur non solum ea, quæ aperirent & menses ducerent; verum etiam, quæ ad hydropem facerent iisdem commiscerentur. Et ad maiorem emolliationem abdominis**

28

tum ventris inferioris, & ut commodius menses quoque euocarentur, conclusum fuit uti balneo artificiali, quo in hyeme præcedente, ob aerem frigidiorē, minus uti poteramus. Interim cum Dominus Pensionarius Bruxellis esset, apud Viglium præsidem, facta est mentio de fonte quodam acido, qui in Spa visitur, de quo Limborchius Medicus libellum scripsit, quem & nos perlegimus. Sed reuerso Pensionario, atque rursus Bruxellas petente, is nobis iniunxit, ut quid de balneo sentiremus, eidem scriberemus. Nam animus erat eo mittere uxorem. Non diu post Dominus Viglius suam misit famulam Delphos, ut una Domicellam agram Bruxellas deduceret. Postridie litteræ a nobis scriptæ ad Pensionarium per me missæ sunt, omnium nostrorum nomine, cum reuersus essem Brilis: cuius hæcerat inscriptio.

Præstantissimo ac Doctissimo viro Domino Guilhelmo Cripio, Iuriconsulto prudentissimo, & Pensionario Delpheni.

29

Quandoquidem a nobis flagitavit Dominus Pensionarius, ut quæ nostra esset de fonte in Spa sententia, perscriberemus: quemadmodum & Nieuenio nostro hinc discedens iniunxerat; Anne eius usus Domicellæ uxori suæ prodesse queat, ac an inde perfectam morbi sui solutionem assequi possit: visum est nobis pro ratione respondere, fontis illius naturam nulla alia vi notam nobis esse, quam quatenus scriptis & sermonibus aliorum nobis innotuit. Cum igitur nouerimus, tam leni, quam vteri scirrhi laborantes eius usu curatos; non videretur nobis alienum si & illa quoque experiretur: modo prius balnei emollientis ac calfacientis usum tentaret, quam ad exsiccantia animum applicaret: cum videlicet fons ille ex minera ferri & sulphuris constet. Nam si tum aquam hanc assumeret, melius omnia succederent: quia (ut auctor quidam enarrat) egregie urinam prouocat; & per consequens ea, quæ urinam solent euocare, matricis obstructioni quoque succurrere, tum menses educere consueuere.

Huc usque literas conscripseramus: & antequam obsignaremus, alias a Domino Pensionario & Matthiis Doctoris sententiam de Spa simul accepimus. Quare epistolæ nostræ hoc accessorium sequens adiecimus.

30

Dubitamus tamen, non satis fore potentem ad abdominis & vteri duritiem depellendam, nisi simul emollientibus cum menses euocantibus uti studeat. Ceterum ubi inter nos conuentum esset, accepimus & legimus tuas & Domini Matthiis Medici litteras, quæ scrupulum quendam animo nostro iniecerunt; quia idem ille Dominus Matthiis fontis esse affirmat eluere, aperire, atque nimium ab obstructionibus excoacta refrigerare. At uxor nimio ac vehemēti calori non est obnoxia: sed potius duris ac concretis in utero ac frigidis humoribus vexata; qui potius hepar ipsum a iusta sua temperie ad frigiditatem, ac tandem, si vel exiguus comitatur error, in hydropem deducunt. Ab usu igitur huius balnei existimamus ac statuimus e re uxoris esse, si bituminosa illa ac sulphurea balnea inuisat tandem, qualia sunt balnea A-

quisgrani. Nam inde speramus multo maiorem fructum, quam ex ullo alio remedio; modo ea, quæ prius scripsimus de emolliente balneo, præcedant. Hoc tamen nulla ratione negligi debet, ut corpus tum pareatur, tum vniuersaliter expurgetur. Cui rei non dubitamus Dominum adhibiturum peritum aliquem, ac in arte nostra versarum Medicum, qui pro ratione ac rerum usu moderabitur omnia recte. Quod Dom. Pensionario maturius non scripsimus, causa est, quod cum uxore mentem nostram transcribere volebamus, quæ cum discederet, nemo nostrum aderat. Doctor Hugo Nieuenius apud D. de Somerdijk, Cornelius Heydius Roterodami, ego Brilis, agebamus. Erant tamen litteræ paratæ, præter hoc accessorium litteræ tuæ adiectum. Hiscæ vale. Raptim, Delphi 19. Iunii, anno 1565.

Hugo Nieuenius. Cornelius Heydius.
Petrus Forestus.

Litteræ vero Cripii ad nos scriptæ, ita sese ad verbum habebant.

Clarissimis ac Doctissimis viris D. D. Cornelio Heydio, & Petro Foresto, ciuitatis Delphenis Medicis Pensionariis, Dominis suis atque amicis singularibus.

S. P. **C**larissimi Domini Doctores, Dom. Præses Viglius mandarat Domino Matthiis Medico, ut virtutem Aquarum earum Leodiensium quarum tam celebris fama est, paucis describeret, ut ex eo vos qui longius ab iis abestis, num saluantes ea uxori meæ futura sint, statuere possitis; quod ipse cum egro aliquando eo profectus, vires earum & efficaciam perspectas habere videretur: in qua quidem re ille minime se difficilem præbuit. Sed quantum angustia temporis patiebatur, paucula vobis, sufficere existimabat, quæ in hanc quam vobis mitto schedulam: coniecit. Rogo itaque vos, ut perpensa diligenter aquarum earum vi, morbi que natura, num profectura illi videantur, difficiat. Et si, quod futurum existimo, viles futuras inducetis, illi diligenter persuadentis, ne se difficilem ad proficiscendum præbeat. Decernit quoque D. Præses post earum aquarum usum, si ea vel nihil vel non animo tam iuuent; inde ad thermas Aquenses mittere. De hoc quoque vestrum iudicium perscribat velim, idque primo quoque tempore. Valere Clarissimi ac Doctissimi viri, & D. Hugoni Nieuenio, lectissimo atque clarissimo viro, plurimam a me salutem nuntiare, atque in deliberationem, si, quod futurum credo, apud vos sit, vel alioqui profectio uxoris moram patiat, adhibere. Bruxellis postridie Idus Iunii, anno 1565. Vester, si quis alius,

Guilhelmus Cripius.

Hæc erat schedula Matthiis ad nos missa.

Aquarum acidarum in Agro Leodiensi saturientium natura ferrea est a predominio cum parte sulphurea, & non sine suspitione quadam chalybis, si eius sapor accuratius expendatur. Itaque facultas earum est aperire, eluere, refrigerare quoque nimium ab obstructionibus excoacta, corroborare; ita tamen, ut progressu temporis excoacta nonnihil & ficare valeant. Euaquant præterea alios multo sudore, nonnullos crebris diuersionibus, plerof-

plerosque vomitu, & plurimos copioso latii profluvio, prout subiectum corpus ad hoc aut illud evacuationis genus magis est propensum. Omnibus certe utiliter bibitur, quibus aliquid ex prædictis contingit. Illis tamen obest, quorum mentus adstringit, & quando permeare nequit. Unde patet, si cum recta vite ratione & corpore præparato ad potationem, bibant, multa inde sequi postea commoda, quare ipse rei eventus declarabit, pro ipsius potantis idcirco negotio. Quare in hac re prolixior esse nolo, ut cui satis fuisset dixisse, ferreas esse a prædominio, cum subdominante sulphure, & fortassis chalybano. Nam qui horum vires expendit, & facultates inde enascentes, probe animadvertere valet (potissimum si cum his conferet proprium & privatum corporis temperamentum) si facile induare potest, uti affectui prodesset, aut obesse valent. Bruxellæ, 1565.

Matthiæus.

Matthiæus hic doctissimus Medicus nihil novi nobis scripserat, præter ea quæ fere ad verbum Lymburchius Medicus in libello De eodem fonte habet. Quare cum epistola nostra supradicta scripta propemodum esset (ut diximus) præter accessorium quoddam, quod post acceptas literas Domini Pensionarii, tum hanc schedulam, adiunctum fuit, & ita misimus. Est itaque Domicella hæc Bruxellæ profecta, deinde ad fontem acidum in Spa. Ceterum ea ipsa sub finem Septembris, anno 1566. domum rediit, neque ab iisdem fontibus ullo modo in melius profecerat, neque Matthiæi opera alioqui præstantissimi Medici Bruxellæ venter detamuit. Qui Matthiæus, certe in artis operibus exercitissimus & magni nominis Medicus, eodem fere tempore cum hanc nobilem matronam curaret, ab equo calcitrone inopinato percussus (ut nobis relatum est) misere, prolix dolor, vitam finit. Quare cum neque alii Medici Bruxellenses, alioqui in re Medici versatissimi, in curando Crippli nostri uxorem quicquam proficerent; cum morbo multo validiore quam antea, etiam hydropica, domum reuersa, nullam adhibens postea curationem, octauo die Decembris ad septimam fere horam, noctu cum animam ageret, ego, utpote vicinus, subito accitus sum, sed morte instante, eaque a me prædicta, eodem tempore, anno 1566. obiit, proba me hercle matrona, cum multis lacrymis ipsius mariti.

OBSERVATIO LXV.

De citra, pica; malacia, prægnantium.

Vxor Augustini Teylingii, iuxta dicta seu Iodoca, matrona admodum honesta, socrus mea, mulier admodum fecunda, quæ & viginti proles peperit, hæc ipsa cum grauida esset, ac Amstelrodamum nauigio iret cum suo marito, cumque ad pagum Saradamum dictum peruenissent, maritus nautam interrogavit nunquid edulii penes se haberet; qui cum obtulisset aliquid halecis iam nouiter saliti, vxor ipsa duodecim comedit, nec quicquam inde mali sensit. Erat autem hæc citra circa cibum haud innaturalem: quemadmodum alteri mulieri etiam Alomarianæ contigit,

quæ ad forum veniens, anguillam coemtam statim crudam deuorauit: alia vero (ut nobis quoque relatum est) etiam pellem ouillam vna cum lana detractam deglutiuit. Altera quoque picem liquidam cochleati excipiens, nec offenti quicquam accepit. Eua Teylingia, vxor mea carissima, filia iuxta suprascriptæ, cum grauida esset, demi seorsim sportulam cerasis plenam habebat, quam & sæpissime salutabat, atque ex ea carptim subinde cerasa clam, ne quis animaduertetet, sumebat. Sed hic appetitus non ita innaturalis erat, ut quarundam mulierum, quæ & carbonem, cretam, aliaque absurda comederunt.

SCHOLIA.

Q Vomodo citra non solum prægnantibus, sed & vix quoque, tum aliis etiam puellis contingat, diximus cum de malis vetriculi ageremus, lib. 18. obseruat. 7. & Scholio eiusdem: vbi & huius symptomatis causam, signa & curationem recensuimus, ut non opus sit denno repetere. Verum tamen cum nunc de mola sermonem aboluimus, pauca hic quædam de citra aliisque symptomatis, quæ grauidis euenire consueverunt, interferere libuit, qualia hæc præcipua sunt: citra tibi fastidium, flatu, atque vetriculi dolor ex flatu, cibi que eieccio, cordis saltus, syncope, crura inflata. Vrinae difficultas, eiusque destillatio & incontinentia, renes ex calore debiles, ac alui hypressio; quibus & addunt pilorum destilium aut incrementum insolitum: lac in grauidis effluens; mensesque grauidarum & superfætationem, citra (ut etiam alias diximus) ab hedera dicta existimatur, quæ quicquid inuenit, fortiter amplectitur; mulieres molitiem seu malaciam vocant. Secundo mense prægnantibus incipit, modo citius, modo tardius. Moschione teste, quibusdam ad partum pertenerat. Galeno a 2. mense & 3. & quod quarto quiescit, partumque vomitionibus humoribus vitiosis expurgatis, partim concoctis. Si fieri potest, interponenda est vnius diei abstinentia: si minus, parcus cibus detur. Moschio aquam prius dat, deinde vinum, ciboque constringentes. Os iungit oleo mastich. ex coroneis, adiectis pul. caryophyl. menthæ, corall. rub. & similibus cera exceptis. Dat acida; & post cibum pira, cydonia, & vetriculum roborat. Vide quæ lib. 8. scripsimus Scholio obi. 7. Fastidium eo tempore prægnantibus, quo fœtus germinat capillos, contingit: tollitur cibus austeris, acidisq; & sale modico cibo adiecto. Conuenit panis sine fermento, auiculæ. Pinguis detestantur. Noui ergo prægnantes aliquas adeo cibum proprium fastidientes, ut alienos tantum vel emendicatos ederent. Valent pruna, sorba, pira, coronea, mala punica, olea alba ex dura muria, & cappares cum aceto. Flatus in vetriculo & alibi discursus, ilia & aluum in iungendo oleo lilino, seminibus fœniculi, anisi, cumini, & aliis etiam dolore ex flatibus tollentibus. Cibi reieccio, pueris coniectis vel cydoniis in vino, vel sorbis asumptis curatur. Cordis saltibus, ut quidam volunt, aliqua calida vbertim pota opitulatur. Ego commode ad palpitationem cordis vitor conferua me-

Symptomata
qua prægnantibus
euenire solent.

Citra prægnantium.

Fastidium.

Flatu.

Cibireieccio.

Salus cordis.

liffa. A syncope releuantur fale in os posito. Hoc modo Margareta Nannia, mea mater carissima, quæ septemdecim proles peperit, semper restituebatur. Nam si altius federet, ea corripiebatur. Pedum tumores Æginera illinit cimolia cum aceto mixta. Aetius perficitur cum rosaceo & aceto, fale etiam adiecto. Brassicæ folia late distensa vel cocta cum vino & aceto emplastri modo imponit:

Ad vrinæ difficultatem prægnantium millefolium tritum ex aceto, iuxta quosdam, bibitur. Ad incontinentiam vrinæ, vngulæ apri vel suis cinis portioni inspersus iuuat; leporis cerebrum ex vino potum, vel eiusdem testiculo tosti si edatur; anserum trium linguæ in cibo sumantur. Si renes ex calore debiles sint, inungantur vnguento rosa. detur conferua rosa. Ad alui suppressionem, pruna ieiunis edantur; iura pingua sumantur, cochleæ & ostrea saxatilesque pisces, panisque fermentatus.

Si pili defluant, valet adeps vrsinus, & quæ de alopecia diximus. Si gravidis lac vltro effluat, fœtum imbecillum esse notatur ex Hippocrat. & rimendusest abortus, ideo fœtus roborandus, & ea præscribenda, quæ abortum impediunt; de quibus suo loco dicturi sumus. Ita quoque si mentes gravidis fluant, fieri non potest vt fœtus bene valeat: tunc enim menses, si fieri potest, retinendi sunt, ne abortus subsequatur. Restabat superfœdatio, quæ tamen vteri symptoma non est; sed res potius naturalis, teste Aristotele. Nam & vtero gravidas superfœdare, neque fabulosum, neque nouum est; quoniam omnium maxime animalium mulier & equæ gravidæ initum nouere. Cetera (vt pote quorum natura more leporis superfœtare recuset) vbi gruida exstiterint, mares contemnunt. Verum equam haud vnquam superfœtasse cognitum est. At mulieri, quamuis raro interdum, vt superfœteret, euenit. Ob id qui longioribus temporum impendiis, post concepti sunt (altero iam pridem concepto) nihil quicquam proficere queunt: sed dolorem, quo & ipsi, & primus partus intereat, præmaturius concinnant.

Olim vt vnde tredecim, superfœtata puerperia, corruptione peracta ederentur, incidit. At vero si a primo conceptu secundus proxime secutus sit, paululumque temporis inter eos intercesserit, quod superfœtarit (quasi gemini nasci videantur) absolui edique potest. Quomodo & Herculem & Iphicium conceptos esse fabulantur. Sed id etiamnum ex adultera quadam, quæ alterum marito, alterum adultero per similem peperit, compertum est. Et item Pronconnesia ancilla eiusdem diei concubitu; alterum domino, alterum procuratori eius perquam similem egassit. Insuper quum geminos quædam ferret, tertium superfœtauit, quumque iustum parienti tempus instaret, primos vitales edidit, secundum qui obiter diem suum obierat, mense quinto elusit. Altera quum primum inuitalem mense septimo peperisset, mox geminos mensium numero vitæ compotes enixa est. Et adhuc alia iusto partu vnam, alterum quinque mensium emisit. Compluribus etiam id euenisse liquet, vt si o-

ctauo mense concubuerint, partus mucore oppletus exierit.

OBSERVATIO LXVI.

De muliere quinto mense menstruas purgationes habente, gruida, in qua metus erat de abortu, per modum consultationis.

Nobili matronæ ad quintum mensem gravidæ exsistenti menses in copia fluxere, quæ alias leuissima ex causa etiam primo, secundo & tertio mense conceptionis abortum passa fuerat; de quo etiam nunc magis metuebat: ideo obstetricem ad nos misit, vt abortus impediri posset. Huic igitur idem consulimus quod etiam aliquando filia Ioannis Theodori Harpardi, Consulis Delphensis, quam etiam colore difficilima laborantem cum metus esset etiam de abortu, curauimus; vt videre licet lib. 18. obs. 48. Consulimus, inquam, vt quieta se teneret, & in deliciis versaretur, & vt graueolentiam sonitusque horribiles euitaret, & res immundas a conspectu arceret, & odores graues: nam & abortum facere tradunt nidorem extinctæ candelæ aut lucernæ: tanta est natalium nostrorum imbecillitas; quibus & obest formido, subitusque metus, intemperataque iracundia. Recte enim iussit Aetius lib. 15. c. 12. de studio prægnantibus adhibendo ex Aspasia. Vbi prægnantes nuper conceperint, obseruabimus ne timore morore, neve vlla validiore mentis perturbatione affluctentur. Curruum præterea gestationes, violentaq; exercitia, vehementesq; spiritus detentiones & coxendicum percussiones prohibebimus; nec graue onus tollere, nec saltare, nec duris sellis insidere permittemus. Sed nec acria flatuosaque edulia, nec clysteres acutos, nec cibi & potus vel indigentiam vel redundantiam cōcedemus. Sanguinis etiam defluxus siue a narib. siue ab hæmorrhoidibus, siue ab alio quocunque loco prægnantibus periculum affert: ideo non sine ratione metuebat hæc matrona nobilis ob menses fluentes: nam menstrua purgatione, ita & fluxionibus albis fœtum in vtero sæpe dimoueri vidimus; vt & saltu, petulanti coitu, sternutamentis, luctu, & similibus. Sed de his latius in Scholio, cum de omnibus causis agemus. Alimentis (vt idem Aetius refert) ergo videndum moderatis, & stomacho congruis, lecticæ gestatione, leui deambulatione, molli frictione, lanificio circa octauum mensem, qui omnium molestissimus est; alimentum contrahere oportet, & vehementes moriones prohibere: & si alius detineatur ob intestini recti angustias, edulia offerenda erunt ventri subducendo idonea, veluti ptisanæ succus, rumex elixus, malua, lactuca; & mense nono, relaxandi corporis gratia, balneo frequentissime vtemur, omninoque providebimus, vt paritura futuros dolores validissime toleret. Hæc Aetius. Sed quia hic in quinto eramus mense, fluentibus menstruis, maximus metus erat de abortu: ideo eam in quiete detinendam esse imperauimus: & ab omnibus iam dictis, calu, percussione, pedum eleuatione, aut brachiorum nimia extensione sese cauere iussimus: nam nostræ Batauræ mulieres nimis

Pedes inflari.

Prima difficultas incontinentia.

Adrenus calidus.

Ad alui suppressionem.

Ad defluum pitarum. De lacte grauidarum effluente, & de mensibus grauidarum.

Hercules & Iphiclus nati ex superfœdatione.

nimis ædibus purioribus conseruandæ deditæ, & tabularum frictionibus, & vt telæ aranæorum, tum alia amoueant. curiosa sunt. A publicis item choreis, balneis, nisi in fine, tum tussi caueant; & a frigore externo rebusque vaporulentis custodiendæ, ne in destillationes, raucedines, sternutamenta incidant. Ceterum cum huic Dominæ menses fluere, & alias solita esset abortire, præstabat hanc potius esse sellulariam, quam vt ambularet. Sed quod ad præsentem huius matronæ affectum attinet, & auctores, vt *Gordonius*, si plethora adest in sanguinea minus obesse scribunt, nec statim menses esse constringendos, vbi prægnans nõ debilitetur, aut mammillæ graciles non fiunt, neque motus immutetur: in tali, inquam, casu nihil faciendum volunt. Verum cum hæc nobilis Matrona valde debilitaretur, referente obstetrice, & mammae extenuarentur & menses copiose fluere, nec motum pueri, vt antea sentiret: consului cum Medici præsentis moderatone, vt menstrua cohiberentur atque restringerentur. De meo hic addam quæ alias in casu pregnantis quinto mense fluxu quoque laborantis, vbi merus erat abortus commode præscripsimus, abortu impedito: *℞. coralli rub. boli armen. vera, ossium dactylorum, ana ʒ ʒ. detur cum uno sorbidi duabus vicibus*; renes tum imus venter inungantur vnguento Comitissæ, adiecto oleo myrrino, & pauca bolo armen. ad vnguenti consistentiam. Comedeat dactylos pingues maturos; & sua viscositate abortum inhibebant. Pulvere suprascripto adhuc semel cum vino rubro, exigua mumia adiecta, fluxus restringi cœpit; nec abortus subsequutus est. Vel si velint ea sequi, aut processum, quo aliquando Bononiæ præceptor meus *Elideus* in scæmina vterum gerente iam per sex menses, cui vehemens quoque mensium fluxus oboriebatur, vsus est, eundem quoque hic addam. Primo apposuit partibus infimis mammillarum duas cucurbitulas; nam sanguinem mittere non audebat, iuxta *Galenum lib. De curandi rar. per sanguin. missionem*, etiam Hippocrate vetante *s. aphorism.* propter abortum. Ex iis statim menses suppressi sunt, & sanguis fluere cœpit e naribus. Exhibuit tunc haustum vnum aquæ portulacæ cum sacchar. rosa. exiguaque portione philonii Persici admixta, cuius descriptio est apud *Auicem. lib. 5. summa 1. tract. 1.* Atque hoc ad refrigerandum & incrassandum sanguinem & restringendum, & cessauit fluxus. Victum incrassantem constituit, postea eduxit coleram cum rhabarb. portione. Cucurbitæ vero sæpius appositæ sunt: sed illa conquerebatur de conuulsione mammarum: iussit itaque poni in regione hepatis. Hæc mulier neque passa est abortum, & tempore pariendi completo feliciter peperit. Et illud non prætereundum, quod Medici aliquando in fluxu isto venam basilicam inducunt cum foramine exili & paruo, vt pederentim sanguis exeat; deinde quoque ne virtus concidat, & in modico sanguine exundo magis fiat diuersio. Quomodo autem etiam in febricitantibus aliquando sanguis mitti posset, &

etiam lenis adhiberi purgatio, aut saltem leniens medicamentum, alias ad longum scripsimus in *lib. nostris, De febribus*. Iam quoque cum hæc consulerem, accessit ad me alia obstetrix cum rustico consultandi causa pro sua vxore grauida etiam menstrua copiose habente; cui ne fieret abortus, imperauimus, vt renes vngeret vng. rosimum ventrem vnguento comitissæ, & vt etiam hæc mixtura frequenter vteretur: *℞. conser. antiqua, diacydon. siue specieb. ana ʒ ʒ. i. trochisc. de carabe, de terra sigillata, de spodio, ana ʒ ʒ. manus Christi cum perlis ʒ ʒ. cum syr. cydon. q. s. fiat conditum*. Hæc supradicta satisfacere ad rem puto. Quasi diligenter obseruentur, speratem, hanc nobilissimam matronam, Dei nutu, minime ab exorsu periclitaturâ, quodque putgationes menstruæ superflue cōstringentur, & foetus retinebitur.

SCHOLIA.

Omnia illa, quæ a pregnantibus vitanda esse diximus eadem & causæ abortis esse possunt, quemadmodum sunt incommodæ salutationes: nam & pleræque abortum fecere: sicuti scalarum lapsu, vel ictu, fulgure, tonitru, subitoque tormentorum sono fit, ac terræ motu; qualis anno 1511. vniuersam Italiam, teste *Benedicto Veronensi*; a septimo calendis Aprilis ultra quadraginta dies percussit. Pondere item, ac nimia Venere, aut petulanti, partus colliduntur: sanguinis præterea larga missione, vehementique ventris deiectione, albis fluxionibus, aut spiritu incluso disrumpente (vt *Paulus demonstrat*) vulnere item, narium vel hæmorrhoidum profluvio, ventris fluxu vel tenesmo. Sæpe abortum fieri vidimus ardente febre, imbecillitate partus vel puerperii, vel puerperæ, vel secundarum angustia, quibus partus strangulatus exit. Vidimus, inquit idem *Benedictus Veronensis*, anno præterito nobilem *Veronensem* *Dionoriam Georgiam* septimo mense quo partum gestauerat polypum peperisse monstrificum, quem nos dissectimus: in medio masculinus foetus integer palmi magnitudine repertus est, quem monstrum illud in sese genitum inter eas angustias accrescere non patiebatur, annexus tamen erat vmbilicus polypo. Fame præterea, vel siti aut crapula, *Galeno* auctore, aut mœrore, plurimas abortum fecisse non dubitamus: balneo item calido, vel nimium gelido partus sæpe eliditur. Si gemini præterea in vtero sunt sexus diuersi, facile ambo periclitantur, vel saltem, quæ scæmina est, nam imbecillior est: sed plerumque altero enecto, altero pariter menstrualiali profluvio eicitur defunctus, vt aliquando vidimus. Abortus vel ab evidentibus (inquit *Fernelius*) vel ab interioribus fit causis. Evidenter autem hæc factum erant, vt syncope, timor & tristitia, & ha-

7
Causa abortus.

8
Exemplum abortus & monstrifici partus.

Causa evidens.

9 uioris oneris gestatio, casus violenter concutiens, aut ventris ictus foetum contundens, quibus adhuc clammorem, cursum, coitum ineptum, petulantem immoderatum. Interiores vero causa sunt cibus immoderatus, & plethora foetum suffocans, aut exstinguens, mucosus humor uteri implens acetabula, & ligamenta ita remolliens ac dissoluens, ut foetum continere non possint. Et huius rei (quemadmodum addit Rondeletius) multae possunt esse causae. Aliae enim os uteri minus claudunt & constringunt, & ob nimiam humiditatem relaxantur. Aliae ob sanguinis feruorem nimis copiose menses patiuntur, & foetui adimitur alimentum. Aliae uterum habent minus amplum, aut quia non potest dilatari uterum pro incremento pueri, unde reiiciunt foetum, aliae tertio, aliae quarto, aliae quinto mense. Iam quoque cibi mali succi (teste Fernelio) & inde nata cacochymia, ob quam foetus alimenti benignitate destitutus sensim languet & emoritur. Morbus acutus, febris vehemens, tum alia, quae saepe foetum in grauius discrimen, quam matrem conicit, aliquando simul matrem cum foetu. His addere poterimus uteri affectiones inflammationes, erysipelata, abscessus, & ulcera. Quaecunque igitur mulier circa euidentem causam abortire consuevit, vel totius corporis, vel uteri totius vitio laborat. Id quoque vel ad uterum vel foetum referendum quandoque est: nam penuria, si cotyledones utero allegatae, aut indispositione vel impotentia feminis debiles procreatae, & non firmiter ligati foetus vel cotyledones abrupuntur, & fit abortus, vel ratione uteri ob causas internas, vel oris ipsius; ut ad longum videre licet apud Guainerium in suo commentariolo, De agris. uteri, cap. 38. De causis & signis abortus. adde quae in Gynaeciorum harmonia habentur. Attamen Bonaciolus videtur distinctionem facere inter corruptiones, effluxiones, abortus, abortus, vel eiectiones. Effluxiones tum corruptiones intra diem septimum incidere ait: tantisper enim geniturae instar lactis elabuntur. Abortus primis mensibus conceptu exorso fiunt. Abortus prope pariendi tempus euenit. Quamquam haec quidem (grandiore iam foetu) eiectiones vel eiectiones vuluae dicuntur: illas vero, quae intra quadragesimum a conceptu diem contingunt, abortus, illustriores appellitare solent. Hinc apud Medicorum rei professores haec uoculae plerumque confunduntur. Galen. lib. 3. De facult. natural. triplicem causam abortus statuit. Haec quidem, inquit, est aut moles nimia, aut pondus aliquod, aut morsus. Moles, ubi amplius distendi uterus non tolerat, pondus, cum supra vires eius sit quod continet: morsus, ubi vel humores, qui prius in membranis continebantur, his ruptis in uterum ipsum sunt effusi, vel etiam totus partus corruptus & putris, ac in noxiam saniem dissolutus, uteri tunicam eius occasione irritat, ac mordet. Signa abortus praesentis, & quae abortum demonstrant, quamuis sint per se nota; abortum praesagientia interim consideranda sunt antequam abortus oboriatur, ut sic abortum despectamus. Ideo recte dicebat Bonaciolus: Causa, qua maturius abortum valide proritare queunt, eundem si praesesse-

rint, futurum indicant. Etenim si mulier saltibus inhumanis iactetur, desultetque immodice, ac potissimum si resiliat, poneque saltet, aut, ut libuerit, corpore sine ratione & modo moueatur, si immaniter & vaste clamet, si obirascatur, si parcitas cibatum abliguriat, si extenuetur, ac praecipue veter, si in balneo calidae aquae vel frigidae moram traxerit; haec cum alia superius addicta si adfuerint & increlcant, abortus subsequetur; multoq; certius si iam auctae mammillae detumescant mollesque fiant, si immittes & sine misericordia dolores praegnantem rapiant, si vigor aut horripilatio eandem interdum deprehendat, doleatque caput & potissimum oculorum radices: quod si talia quidem satis remissa fuerint, tarde abortum patietur: si intensa valde, & menstrua copiose erumpant, ilico venturum exspectato: Lacte ex mammilla continue effluente: ego in muliere aliquando prognosticum feci, quod hoc argueret foetus debilitatem, paulo post abortum passuram, ut etiam euenit. Futuro abortui (inquit Aetius) aquea primo euacuatio, deinde saniosa, ac cruenta, & tanquam carniū lotura praecedat: ubi vero clare exsolatio, purus sanguis, postea grumi, ac demum foetus ipse vel formatus, vel informis excernitur, plurimis etiam lumborum coxendicumque grauitas sequitur, nec minus lumbis capitis, oculorum dolor, stomachi erosio, extremorum refrigeratio, animi deliquium, febris horrida: quibusdam conuulsiones opisthotonicae, & epilepticae superueniunt; ut nuper vidimus in vxore pharmacopaei abortientis: quanquam & haec praecipue, iuxta Aetium, contingunt medicamento- rum violentia abortientibus: nam quae sine medicamento abortiuntur, praueeniunt iis, sicut testatur Hippocrates, mammillarum gracilitas praeter rationem eueniens, femorum refrigeratio, grauitas lumbos & femora obsidens: omninoq; minus laeduntur abortu, quae saniores, & quae alui natura laxiores fuerint, & quae uteri partes humidiores habuerint, quaeque frequenter magnos infantes sine molestia parere consueuerint, atque aetate prouecta pauci sanguinis & minime pingues: sed etiam haec ad prognostica signa pertinent, uti & haec subsequencia. A coitu si sternuerit mulier, abortiuum est. Ceterum effluxionum prognosticon censetur, si oris vuluae labra leuia exstiterint, proxime enim seminale excrementum delabi ac effluere praemonstratur. Mulieres solertes post mictionem introrsum agunt, labris liquida pice illitis: foetore namque uterus resiliens attollitur, quo fit, ut ostiolum coerceatur, sigilleturque. Abortus vero index equidem euidentis verum praecipue extenuatio, Hippocrat. sic dicente: Si mulieri utero graui mamma subito extenuantur, abortus sequitur: ob defectum alimenti, inquit Galenus in Commento. Communes quaedam vena sunt mammis ac uteris, quae ubi parum habuerint sanguinis, graciles quidem mammas ostendunt: inedia enim nonnunquam foetum perimunt, vel ad excretionem excitant. Et ideo in libro, De natura foetus: Alimentum atque auctio a matre veniens

Internā.

12

Signa praesagientia abortus

10

Corruptiones.

Effluxiones.

Abortus.

Abortus.

Eiectiones.

11

Triplex causa aduersus, iuxta Galenum.

Signa abortus demonstrantia per se nota.

Aetius lib. 1. aph. 19.

13

Signa prognostica abortus.

Prognostica abortus. s. aph. 37.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Commentum Galeni. Acetabula autem sunt ora venarum & arteriarum, quæ feruntur ad vterum. Vide Soranum. Certo tempore mulier concipit aut incipiente semine, aut deficiente. Solutus in primis septem diebus perimit semen & locellis eiicit. Infans nisi latum locum habeat, quo nutriatur, agitur, crescat, macilentum fieri necesse est; utpote qui satis amplum locum ad incrementum non habeat. Eadem ratio est cum modo parui, modo magni nascuntur infantes. Quemadmodum cucumeres & arbores, & alia quædam germina, si comprimantur, & in angustis creuerint locis, partim mutila, partim tortuosa perueniunt: ita & fœtus in vtero; iuxta ea, quæ matri contingunt, vel mutilatur, vel non recte crescit. Mulier cum concepit, semen extra locellos non exsilit; menses non defluunt, siquidem fœtus sanus futurus est, præterquam pusillum primo mense. At quæcunque vterum gerentes a febribus corripiuntur, & fortiter calefiunt, sine occasione manifesta, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur. Accidit videlicet quibusdam gravidis, in quibus vitiosi humores priusquam conceperint sunt aceruari, ut nonnunquam a febribus vehementibus corripiantur, ita quod ex necessitate abortiant: nonnunquam vero mediocribus; sed hæc cum non purgentur, aliquid superest reliquiarum humorum in corpore vitiosorum, ex quibus febres ab initio sunt constitutæ, utpote non potentibus Medicis mulieri gravidæ aliquod forte auxilium adhibere, neque exquisita victus ratione in ipsis vri. Ob hanc igitur causam febris ip ipsis frequenter reuertitur & magna temporis parte grauitur se habent. Non sine ratione igitur fœtus aliquando nequit obistere, sed ex febre, & vitio humorum corrumpitur: nonnunquam vero perdurat quidem vique ad tempus partus, sed quum & ipse valetudinarius sit, ut qui longo tempore laborauerit, & quum matrem habeat imbecilem, non sine periculo paritur. Nam ad bonum partum, duorum corporum vigore est opus, & gravidæ mulieris & infantis. Numerositas conceptuum, ut recte dixit Bonacius, præterea abortum cit. Nam quandam duodecim, alteram duodeviginti, septuaginta alteram (omnibus efformatis) abortiuos abegisse, fabulosum non est. At, quod penitus incredibile censebitur (quamvis Medici rei profectus non ignobilis prodiderit) nobilis quædam mulier vna centum & quinquaginta efformatos vitæ compotes, secundis obuolutos, præmature abortu egressit: quæ cum vermiculos se peperisse arbitraretur, Medicum acersum iri iussit, quo præsentē diruptis secundis, magnitudine minimi digiti (compluribus motum habentibus) centum & quinquaginta partus connumerati sunt. Sed inter miracula non sine magna superstitione, Lolduynæ apud Batavos nostros, prope Hagam Comitum, ostenditur, comitissam peperisse tot proles, quod numero dies annus complectitur. At cum hoc fabulosum videatur, iis omissis, in Italia (inquit Bonacio-

17
Soranus, Hippo-
lib. de fœtu,

Hipp. lib. de nat.
ura pueri.

s. aph. ss. Gal.

18

19
Numerositas
conceptuum ca.
sâ abortiuam.

150 partus mi-
nimi digiti ma-
gnitudine.

le) septem, & aliam tres (quod & assidue accidit) quam etiamnum nos ipsi nouimus, abegisse certum est. Sed, quod iam etiam in prodigiosam miraculorum admirationem accessit, viperam mulierem pregnantem si transcenderit, abortionem sequi produnt: Item amphispœnam mortuam duntaxat: nam viuam habentes in pixide impunes transire, etiam si mortua sit. Et, quo magis miremur, si non effluatam grauida transcenderit, innoxiam fieri, si protinus asseruatam transcendat. Quum etiamnum corui grauidis cauendum constat, quoniam transgressus abortus asperas molitur. Simili modo castorium fibrumve grauida supergrediente, abortum facere dicitur, periclitarique partus si superferatur. Tantum inest semini draconculi virus, ut olfactum grauidis abortum inferat. Plura vide apud Plinium etiam de radic. cyclaminis, & quod neutra filix danda sit pregnantibus; quoniam non solum abortum, sed sterilitatem inducit. Ceterum quod mola quoque, ut antea dictum est, etiam abortum frequenter inferat, non opus est illud repetere. Noui aliquas mulieres humidas habentes matrices, decimateertia vice extenuissima causa abortuisse: quod etiam aliquibus contigisse nouimus, quibus acetabula mucro referta erant. Hoc est, quod Aetius, lib. 16. cap. 21. De his, qui bimestrem aut trimestrem abortiunt, dicebat; Quæcunque temperati corporis mulieres bimestrem aut trimestrem, sine manifesta causa, abortiuntur, his vuluæ acetabula mucro referta sunt: ideo foetus retineri nequit, sed elabitur, ut Hippocrates inquit: Tales antequam concipiant, purgandæ medicamentis pituitam educantibus; & toto corpore prius purgato, deinde & vtero, victus ratio adhibenda est calfaciens & exsiccans, moderata exercitia, & frictiones concedendæ, omnisque refrigerandi modus euitandus, ut si ea ratione quoque steriles sint, concipiant. Et ubi conceperint, ne amplius fiat abortus, ea quæ semen tum foetum retineant, etiam exterius ad vteri constrictionem & roborationem adhibenda. His vero, quæ ob naturalem retentricis facultatem imbecillitatem abortiuntur, innata quadam proprietate erinacei terrestris corium crematum opitulatur, si aqua aut vino dilutum propinetur & pudendi mulieris orificio illinatur. Idem potest & marinus, ac mitulæ viuentes vsu. Item myrti baccæ e vino lentiscinove oleo aut sulfino illitæ: rubi etiam, myrti, & similium decoctis loca vtiliter irrigantur. Actites præterea lapis super ventrem gestatus prægnantes foetusque conseruat, nec sinit vuluam emollefcere. Item tritici granum, iuxta eundem Aetium, quamuis superstitiosum, intra panem inuentum sinistro brachio alligatum. Vel sardonius lapis prægnantis sumini, usque ad pariendi dolores, cum filo suspendatur; & ubi partus accesserit, auferatur: vel lapis in vulua aut corde, aut intestinis ceruarum repertus pro amuleto gestetur: est enim ad retinendos foetus remedium efficacissimum. Eadem vires habet lapis trunco arboris cunei more impactus.

Vide Plin. lib. 23. c. 16. lib. 24. c. 16. & lib. 27. c. 12. & lib. 28. c. 4. lib. 37. c. 9.

Quæ abortum inducunt.

OBSERVATIO LXVII.
De prægnante vomitum enormem habente, unde abortus metuebatur: & de altera alui profluvio laborante.

Mulierem prægnantem cum vomitum enormem pateretur, ne abortus fieret, de quo erat metus, omni mane cochlear vnum atque alterum syr. de ribes, modo de agresta exhibuimus; ita, ut statim sanata, nullo modo abortierit. Alteri quoque prægnanti cum aluus multum fluere, & periculum abortus immineret, (ex mente Hippocr. & aphor. 34. lib. 5. superius citato) commode alicam in lacte caprino coctam dedimus, & panem sili-gineum nauticum, tum pira immatura exhibuimus, & caseum vetustum, iecur gallinaceum assum (quod vtiliter in cibo datur) & merulam, & palumbum foetum ex polca coctum, ouaque dura, & mala cydonia: iis aluus sistebatur, abortu minime subsequente.

S C H O L I A.

Cum variæ sint causæ ex quibus abortus subsequi possit; quantum ad curationem attinet; duplex hic scopus in vnaquaque causa tollenda statim exoritur, primo prohibendo, ne abortus fiat, si possibile sit. Et hic scopus in se continet prægnantis optimam gubernationem & conseruationem: de qua ex parte diximus, Obseruat. 66. præcedente, & de victus ratione & quibus modis illa ipsa ab abortu custodietur. Eximvero acrem temperatum inhabitabit, in primis mensibus sese custodiendo a laborioso exercitio, ne ligamenta debilia abrumpanatur, & somno temperato vteretur. Et si aluus restricta fuerit, non nisi manna aut clystere ex iure pulli cum oleo communi vel saccharo laxanda: accidentia animi omnia fugienda: pretiosos lapides apud se portet, saphyrum, hyacinthum, adamantem & turchesiam; fugiendo cibaria acuta. de quibus diximus. Et quia in prægnante materiæ corruptæ detinentur, & ad stomachum fluunt, nauseam inferunt, & vomitum & inappetentiam; ventriculi ratio habenda, & is roborandus, ut Scholio Obser. 65. huius libri diximus, ubi egimus quibus modis & accidentia prægnantium sint corrigenda & tollenda. Roboratur stomachus, ut ibidem diximus, oleo mastich. cotoneor. adiect. pul. corall. rub. menthæ, & similibus, cera pro vnguento adiecta; & diamargariton, iuxta Auicem & quæ simul ad pedum inflationes faciunt in prægnantibus, ibidem docuimus, & ad renum debilitatem, quibus potissimum prægnantes afficiuntur. Secundus scopus potius pertinet ad foetum mortuum; tunc enim abortus iuuandus esset, vel ob matrem, ubi de eius morte timetur: sed de eo postea. At primus scopus, de quo nunc agimus, maxime nobis vtilis est, ut, cognitis causis, ob quas abortiri solebat, eas ante imprægnationem quouis modo tollamus, ne ob eas causas imprægnata amplius abortum patiat. Deinde ea ipsa imprægnata ne abortum faciat præseruetur. Si igitur mulier propter extenuationem aut debilitatem abortire consuevit omnibus modis, tum vitæ institutione ac victus ratione, ante imprægnationem.

Præparatio
alg. curatio
ortus ab
matrone vel
debilitate.

nem erit impinguanda & roboranda. Eadē quoque imprægnata, si metus sit abortus ob eandem causam, vel ob inedia & famem, resumptio victu vtatur. Oportet enim pro causarum varietate remedia inuenire; quibusdam quidem ante conceptum, aliis verbō post. Si ex nimia amplitudine vteri, quomodo is sit coarctandus suo loco diximus. Si ex intemperie aliqua vteri; nam calida absument nutrimentum, quo foetus ali debet, multoque magis sicca; frigida congelat & debilitat foetum, humida nimis relaxat; quomodo istæ intemperaturæ corrigantur, iam diximus prius, quando de sterilitate loqueremur. Si a ventositate, quomodo evitari debeat abortus, dictum est prius de spiritu in vtero retento & vteri inflatione: cauendo tamen ne valde diuretica exhibeamus, vt superius ostendimus exemplo mulieris imprægnatæ a nobis curatæ, cum tormina ventris pateretur. Cum enim abortus in tribus primis mensibus sæpe contingat, inquit Alboali filius, a ventositate, tunc in cibis vtantur speciebus dictis: *℞ cinnamomi electi ℥ j. caryoph. nucis moschatæ, cardamomi, ana ℥ ij. zinzib. ℥ ss. pipetis ℥ j. croci ℥ ss.* Ventositas vbi multiplicetur, ita vt abortus metuatur, vtatur diagalanga. Et vt ad caput ascensus vaporum prohibeatur, fructus stipticos, vt pira, cotonea, mespila, & similia in fine pastus semper assumat; vel ex cōfectione diacydonite, vel de coriandris saccharo modice incrustatis aliquid capiat. Si vitio vteri abortus metuatur, ex eiusdem vlceribus, abscessu, inflammatione, erysipelate, ob vterum paruum aut densum, ex propriis locis curatio petenda. Ad erysipelas, vel ignem sacrum, terrenos vermes quidam ex aceto illinunt, aut oua cocta trita cum oleo imponunt, & ouorum trium calidum pari mensura amyli. Ad densum quidem & constrictum vterum ea, quæ dilatant, vt balnea quidem relaxantia, conueniunt. Sed id vbi in vtero gestant, vt dictum est prius ex Rondeletio, cum animaduersione, ne talia laxando abortum faciant: ideo subinde adstringentia addemus, vel iis per intervalla vtetur, vti est oleum mastichinum, lentiscinum: emolliunt ista quidem, sed simul adstringunt. At mulieres, quæ ob nimiam humiditatem foetum retinere non possunt, eas ante conceptum pilulis ex hiera & de aromatibus purgabimus, & vterum exterius quoque exsiccabimus, pituitam digeremus & purgabimus cum pilulis alephanginis. Infectiones præterea viles sunt, quibus conceptus futurus custodiri potest, & balnea quoque iuuant, qualia in agro Patauino sulphurata, ac bituminata, vel in agro Bononiensi, vel Alexandrino in Liguria: iis certe abortus euasere plures foemina. Periculum abortiendi initio & fine est maius: a quarto mense ad septimum vsque non metuit Hippoc. neque potiones; ita quod & quartus & septimus a formidine non sunt tuti: ternis intermediis mensibus, obnixè radicitur foetus, & secundarum exstantes caruncula acetabulis hærent. Quarto mense vsq; ad septimum si materia turget, purgare licet, iuxta Hippocrat. sed non fortibus. At v-

trum aliis prioribus mensibus purgatio conueniat, etiam in vltimis, tum venæ sectio, quæstionē hanc libro 2. nostro de feb. observationib. 28. & 29. & Scholis earundem ostendimus. Posse scilicet fieri, auctoritate aliorum, & præceptorum nostrorum experientia, cum mitiora habeamus pharmaca, vt mannam, pruna, tamarind. rhab. quib⁹ & nos, tum alii, re vrgente, frequenter vsi sumus sine periculo, semper cum cautione. Sed a cassia abstinemus, cum arenibus purget, vt alias diximus. Quare licet Hippocrates & Galenus, eo, quod venæ secta in vterum gerente, abortus fiat, a venæ sectione, abstinendum dixerunt; videmus tamen nostro seculo peritissimos Medicos non solum in quinto & sexto mense venam feliciter in prægnantibus secuisse, sed etiam in primis & in vltimis: quod & nos non semel, sed sæpius fecimus, in pleuritide, angina, peripneumonia, & aliis grauioribus morbis, non modo, vt abortum nō perpeffa fuerint, sed euidentissimam vtilitatem ex venæ secta senserint. Confirmatur proinde auctoritate Benedicti Fauentini præceptoris mei, & Elidei, ac aliorum quoq; illustrium Medicorum, Amati ac Iacchini, vt in lib. nost. Obs. De feb. ad longum ostendimus. Adhibenda tamen semper cautio, ne vires deiciantur prægnante, maxime in principio & fine. A quarto ad septimum minus vereri oportet, sanguine tamen in minori quantitate extracto, quam in aliis. Vide Iacchinum de acutorum morborum curatione, qui hanc rem egregie tractat. Quamobrem si ob sanguinis acrimoniam foetum reiciant, inquit Rondeletius, purgetur ante conceptum rhab. myrob. syr. ros. Vtatur victu incrassante sanguinem, & obtundente acrimoniam. Post conceptum inungat partem renum vng. sequenti: *℞ olei rosomphac. cydon. ana ℥ iij. ceruse lota in aqua ros. ℥ ss. rad. bistorta, corall. rub. ana ℥ ij. seminis berberis ℥ j. cera albæ q. s. fiat unguentum pro renibus.* Hoc ceratum etiam probatur ab aliis: *℞ mastiches ℥ ss. ladan. ℥ ij. cera citrin. ℥ ij. bistor. muscum cupressi, hypocist. acacie, sang. drac. terra sigillata, ros. rub. boli arm. ana ℥ j. ss. fiat ceratum, adiecto oleo myr. & cereb. vt melius adhæreat.* Valer etiam si ex causa timeatur abortus. Emplastrum tamen hoc seu cerata minus conueniunt, quia magis calfaciunt minusque refrigerant. Quæ nimium sanguine abundant, quia natura grauata quantitate, aperit orificia venarum & multum sanguinis reicit, deinde foetus ob penuriam alimenti vel moritur vel reicitur; his ergo quæ propter hanc causam solent abortire, vtilissimum est sanguinem trahere ex vena cubiti interna; & vt minus plena victus ratione vtantur, præscribere. Vngantur renes & regio vteri vnguento præscripto ad sanguinis feruorē, vt partes refrigerentur, quæ ob nimium sanguinem incallescunt. Sanguinis etiam missio in eius feruore & acrimonia fieri potest, sed minori quantitate, pro ratione habitudinis & sanguinis. Si mulier multum sanguinis consueuerit reicere tempore mensium, plus sanguinis trahere oportet; id tamen non vnica vice, sed interpositis 10. aut 15.

R.R.R

Vtrū in grauidis purgatio vel venæ sectio fieri possint.

7

Si ob sanguinis acrimoniam fiat abortus, quid faciendum.

8

Si ex nimio sanguine abortus fiat.

4

Ex nimia amplitudine vteri. lb intem-⁷ rie.

ventositate.

5

Ad fursum humorū vapore prohibendos. A vitio vteri.

6

Ex nimia humiditate vel ex fluxu re albo.

diebus, aut mense vno vel duobus; idq; 4. 5. 6. 7. mense, quamvis Hippocrates a quarto tantum mense usque ad 7. vterum gerentes purgari posse scribat, quod in morbis acutis faciendum dixit. Neq; etiam formidandum, quod Hippocr. mulierem abortire ob sanguinis missionem dixerit; quod est intelligendum de mulieribus habitantibus parum sanguinis, aut imbecillioribus. Nam experientia constat, mulieres, quæ sunt frequenter passæ abortum, hoc remedio retinuisse fœtū. Non solum autem ad retentionem fœtus (*inquit idem Rondeletius*) sed etiam in his, quæ difficile pariunt, sanguinem nisi cum summa utilitate. Nam cum fœtus abundat multo sanguine, in magnam molem crescit, maxime his, quæ amplum vterum habent, & postea ob magnitudinem exire non potest. Sed de difficili partu plura suo loco.

OBSERVATIO LXVIII.

De fœtu mortuo, cum intentissimo dolore ventris inferioris, cum stranguria & dysuria.

1 **E**lisabetha Henrici, vxor Magistri Ioannis cognomento Buggen, apud Delphenses ceruicarii, pro cuius ædibus trifolium insigne erat, hæc ad quintum mensem fere grauida existens, incidit in diuturnum fluxum menstruorum. Pro quo symptomate depellendo consuluit Cornelium Ericium collegam meum, & tandem fluxus ille paulum videbatur repressus; paulo post rediens, mox iterum constrictus. Ea vero debilis existens ex naturali intemperie, in domo perflati, vtero iam aperto per continuam mensium purgationem, circa illos, qui ceruiciam ferebant, valde laboriosa, multos flatus in vterum excepit, ita vt vehementissima tormina oborta sint, vt abortum metueret, statim quoque accersita obstetrice. Sed cum partus non subsequeretur, dolores paululum sese remiserunt, attamen motum fœtus, vt antea non sentiebat. Quare cum Cornelius Ericius peregre profectus esset ad 11. Octob. diem, anno 1569. hæc ipsa me vocauit. Aderat tunc dolor rursus intentissimus in imo ventre & vteri regione, & simul stranguria ac dysuria, ita vt de abortu futuro, vel potius de fœtu mortuo suspicio esset; quanquam illa hoc tempore dicebat, motum se exiguum infantis sentire, at vix effatu dignum. Sed cum aluum non deponeret, neque medicamentum aliquod adhibere audebam, glandem sequentem ad aluum irritandam subiicere iubeo: *℞. pul. hieræ picra ℥ij. pul. cumini, ob ventositatem, ℥ss. salis exiguum fiat glans seu suppositorium.* Pectinem pro dolore & dysuria inungebat oleo anethino, parte vna, & parte dimidia olei amygd. dulc. quibus dolor paululum mitigatus est, & liberius urinam reddere potuit. At 13. die Octob. cum rursus lotium cum dolore redderet, potu sequenti utebatur: *℞. rad. malua ℥ss. foliorum malua m. j. seminis anisi ℥j. B. hord. mund. p. j. semin. quatuor frigid. maior. (ob vitiæ acrimoniam) sem. pap. albi, ana ℥j. coquantur in ceruicia communi pro ℥ss.* Dulcia hæc plane abhorrebat, ob metum suffocationis vteri, qua so-

lita fuerat laborare. Ex eo decocto dolor non nihil mitigabatur. 14. die cum rursus aluum non redderet, glande leuiter soluebatur. Sed cum in ventre inferiore duritiem quandam perciperem, hoc linimento, vt pectinem inungeretur mandauit: *℞. olei amygd. dul. viol. pingued. gallina, ana ℥ij. olei ros. ℥ij. misce.* Eodem die sub noctem rediit collega, & is iterum vocatus fuit. Eidem, tum mihi suspicio erat de fœtu mortuo, cum motum infantis amplius non sentiret. Ad dolorem tamen sedandum, qui rursus vehemens erat, præscripti sunt sacculi duo: *℞. malua m. iij. flor. chamamel. meliloti ana m. j. seminis lini ℥ss. parietar. artemis. ana m. j. misce.* Fiant sacculi duo quadrati intersuti latitudine 8. digitorum, & longitudine 10. Sed eo tempore non vsa est sacculis. 15. Octob. cum valde doleret in lumbis, eos vng. ros. inungi iussimus. Nulla aderat febris. 18. Octobr. valde debilis erat, & menstrua plus æquo fluxere: exhibita est conser. ros. At dolor quotidie magis intēdebatur, & maiorem suspicionem concepimus de fœtu mortuo vel corrupto; & cœpimus inter nos differere, nū prouocandus esse; eoq; magis, quod aquosa materia, quæ partum præcedere solet, & mucosa in lotio conspiceretur. Et liquor sanguineus efflueret. Et ita cognouimus, quod abortiendi tempus instaret, cum aqua primum saniosa, pfluebat loturæ carniū similis, deinde cruenta; hinc purus sanguis, postea grumi; qualia diximus Scholio Obs. 66. huius lib. abortū iamiam instarem præcedere. Postea cœperunt omnia ingrauescere, ita vt de fœtu extincto vix dubitarem. Quū enim extinctus est fœtus, & diu in vtero subsistit, commemorata omnia, quæ superius de futuro abortu sunt dicta, magis ingrauescūt, ad suntq; stomachi morsus, animi deliquium, capitis & oculorū dolor, frequēs horror febrilis (qui aderat hoc tempore, & prius nō adfuerat) spiratio fœtida & graueolens, venter grauis, & quasi procidens, & qui etiam admota manu frigidus percipitur. Imo hic obstetrix immixtis digitis frigidam animaduertit vteri ceruicem. Interdū conuulsiones oboriuntur epilepticis finitimæ. Sed & secundum Guainerium, fœtum mortuum cognosces, eo quod motus eius non percipitur amplius, ac oculi mulierum profundantur, & fusca eorum albedo fit, & circa vmbilicum dolor atrocissimus ad pectinem usque vrget (*vt in hac erat.*) & cum a fœtu ipso mortuo inferiores partes comprimantur, straguria (*qua & hac laborabat*) & tenesmus accidit; sæpe rigent, & interdū aures ac narium extremitas, vt labia denigratur, tumescit facies; & venter, si forte non detumescat, mollis fit tamen. Quod si ventrem, super latus prægnans dum iacet, manu compresseris, rem duram de latere in latus, quæ mouetur percipies. Similiter & lumen pectinemque, qui antea calidus erat, nunc frigidum inuenies; & si fœtus putrefactus sit, eidem anhelitus olei multum: cum quo si mulier diebus quatuor, vel ultra in partu laborauerit, certior multo fies, ceteris signis præscriptis diligenter animaduersis. Cum igitur mucosa & cruenta

6 **6** cruenta exirent in hac muliere, & liquor sanguineus efflueret; ideo statim sacculos supradictos, in vino coctos & expressos, vt apponerent suassimus: sed antequam decocti essent, paulo post sub meridiem pars caluarie infantis cu maximo dolore, vna cum fluxu vehementiore, profliebat; indubitatum signum non solum foetus mortui, sed etiam corrupti. Ideo, adhibitis sacculis, & portione sequenti propinata, totu foetum mox corruptum peperit, vel abortuum corruptum: *℞. pulegij regalis m. j. cinnamomi electi ʒ j. β. daronici Romani, cassie lignee, vna ʒ β lapid. aetylor. ʒ j. β. intern. lapidum persicorum ʒ j. seminis viol. ʒ j. terantur modice, & bulliant in lb j. vini Rhenani optimi pro ʒ ix.* capiebat statim cyathum vnum, & sub noctem alterum; atque hora nona sub noctem reiecit foetum mortuum & omnino corruptum. At remansit secundina: quam cum parere non posset, decocto suprascripto adieciimus *sabina m. j.* Et decimonono die sequenti, post eiectionem foetum, cum adhuc secundina remaneret, addebamus *m. j. foliorum dictamni cretici.* Verum secundinam adhuc parere non potuit. Eo tempore Heyla, obstetrix bene exercitata, nobis narrauit de puerpera, cui post partum remanserat secundina, quod per partes sine remediis paulatim corrupta exierit, maiore tamen parte in vtero remanente; quae tamen ipsa postea ex puerperio repurgata, & tempore puerperii absoluto templum adeunti, inter eundem ad templum, excidit. Ita & huic euenit. Sumens enim ex portione suprascripta tandem per partes corruptam secundinam reiecit. Sed eodem tempore Cornelius Ericius collega noster, narrauit, *Tractati mulierem pregnantem fuisse, quae per nouem annos ossium particulas tum foetus corrupti reddiderit, vt a Medicis fide dignis accepisse se affirmabat.* Neque minus admiranda digna historia memorabilis, quae annexa est sub finem libelli Observationum Remberti Dodonaei, de muliere, quae annis tredecim in vtero gestauit foetum mortuum, vel potius sceletum foetus mortui, quod tactu cum ab ipsa matre, tum ab omnibus illi praesentibus percipiebatur: eaque narratio scripta est ad Matthiam Cornacem ab Aegidio Hertogio Medico. Similiter & altera historia adiecta est, ab Achille Grassato ad eundem Cornacem missa, de gestatione fatus mortui, post integrum annum, tempore partus iam praterito. Vtraque tamen postea superuixit. Nostra quoque, de qua nunc loquimur, recte sanata, etiamnum cum hac rescriberem, anno 1589. mense Decembri, recte valebat, & nunc cum recenseo, anno 1593. bona vitur valetudine.

SCHOLIA.

8 **8** Vbi timore matris, aut foetus, vel propter mortem foetus, aliquando cogamur abortum prouocare, vel foetum corruptum aut mortuum depellere; id nunquam faciendum est nisi re urgente in tali casu. Hinc recte Priscianus dixit, *Abortuum dare nullifas.* Enimvero vt ipse Hippocrates attestatur, tam diri reatus conscientia, Medicorum innocens officium non decet maculari.

Sed quando matricis vitio, aut aetatis propriae, frequenter eueniat vt partus aut foeminae periclitentur; expedit praegnantibus in vitae discrimine constitutis, vnius partis saepe iactura salutem alterius mercari certissimam: sicut arboribus arescentium ramorum accommodatur salutaris abscissio: & naues pressae onere, cum graui tempestate iactantur, solum habent ex damno remedium. Sic quoque Guainerius ob duas tantum causas Medicum abortum facere iudicat; quando metus est de matris morte, vel vbi foetus iam mortuus est: tunc enim excusatur Medicus pius ab ipso Hippocratis iuramento. Alioqui fas non est foetum corrumpere, aut abortum procreare. Infinita autem praescribuntur a Medicis medamenta, quae abortum faciunt. Eadem enim quae foetum corrumpunt, & mortuum educunt, abortire faciunt. Foetum corruptentia Aetius libro decimosexto capite decimo octauo, ex Aspasia annotauit, opposita offerens iis, quae de studio praegnantium egit, vt foetus retineri possit. Hic videlicet contrario modo iubet, vt vehementissimis motibus agitur, vt saliat, vt grauissima onera gestare enitatur, vtq; decoctis vrinam & menses cientibus, atq; aluum subducentibus iugiter vtatur, & acrioribus clysteribus ventrem abluat, in balneo etiam sumen & pubem singulis diebus perfricando, in labro tepidiori aqua pleno diutine immorando, in foenugraeci althaeae, artemisiae decocto. Emplastra adhibet ex cyclamine, artemisia. elaterio, & similibus: & carycas cum nitro, aut simile quippiam, in sinum pudoris ponit: violaeque albae semen, nitrum, & absinthium in vino decocta praebet: tum alia, vt apud eundem, & Guainerium, tum alios videre licet: & quae a Moschione, Cleopatra & aliis scripta sunt in harmonia Gynaeciorum. Haec enim non nisi peritis Medicis cognita esse debent, vt foetum emortuum expellere sciant, vbi opus est. Quibus illa addere possumus, quomodo corrupti foetus eiectioni auxiliari oporteat, ex eodem Aetio libro 16. capite 20. Vbi foetus abruptus fuerit, si in vteri collo detineatur, ligustrino oleo terebinthinae admixto in totum corpus, sed praecipue in partes vtero adiacentes perfundi oportet: eodem ligustrino oleo, etiam excreto foetu assidue loca irriganda sunt. Si vero id parum successerit, mulier aromatum decocto infundebit, atque interim sterputare cogetur, ac resina arida, bitumine propoli & cancris fluuiialibus aridis suffietur. Haec & alia huiusmodi facienda erunt, si inflammatio non obstiterit: nam ea infestante, intra sessiones, quae remittendi, mitigandi; vires habeant continebimus; & si foetus detineatur, quod vterus absque inflammatione occlusus persistat, papyrus quoque & spongas exarrentes, pessuli modo, primo tenuiores, postea crassiores, imponemus, atque extrema opoponace, vel radice eius e melle vel terebinthina trita illinemus. Excreto autem foetu, si locus adhuc non abscesserit, violenter euellendus non est, neque tamen vmbilicus incidendus, & locus dimittendus: summæ enim suffocationes & cer-

Quomodo corrupti foetus eiectioni auxiliari oporteat.

ta perniciēs, si id feceris, consequetur. Sed si tam graue incommodum protrahatur, vmbilicum incisum femori mulieris alligare oportebit, omniq; studio conari, vt locus abscindatur, quem admodum inferius idem de sectione fetus docet. Verum cum hæc ad chirurgos pertineat, id peritis relinquendum est. *Cuius doctrinam quoq; si videre libet, lege filium Aboali 21. terij.*

OBSERVATIO LXIX.

De partu facilitando, in nobili Domina etiam iſtero laborante.

Domina de Schagen, cum prægnans in nono mense esset, ac tempus legitimi partus instaret, & simul iſtero laboraret, sine febre tamen; ad eam in pago in arce sua Schagenſi agentem, anno 1548. cum Alcmariæ tunc habitarem, accitus fui. Hoc itaq; clareto seu vino Hippocratico assumpto mane & meridie hora quarta, quinto deinde die post assumptum claretum feliciter peperit, & simul ab iſtero liberata est. Claretum, inquam, tale erat: *℞. capill. ven. verbenæ, artemisia, prassij, pulgij, ana p. j. calami arom. incisi ℥ j. s. croci orientalis ℥ j. cinnamomi electi ℥ s. cum vino Rhenensi puro, addendo sacchari ad saporem, q. s. fiat clarectum secundum artem, propinata vna.* Illud autem ad partum facilitandum non adhibuissim, nisi Luna noni mensis præterisset, iuxta præceptum Benedicti Fauentini, carissimi mei præceptoris, qui ita in sua Empirica cap. 45. ad facilitandum partum, & ad mitigandum dolorem eius, nobis scriptum reliquit: Ad facilem partum reddendum consulo, quod nullus Medicus se intromittat, nisi postquam prægnans /gruſſa fuerit lunam noni mensis lux impregnationis.

S C H O L I A.

Morbi multum cum partu finit.

Multi morbi (ut hic iſterus) cum partu finire solent, quæ admodum & Amatus refert de mor. 2. curat. 31. de muliere vterum gerente dysenteria laborante, quæ cum gestationis nonum mensem aggrederetur, dysenteria lethali corripit coepit, quæ nullis præſidiis domabatur. At quum pareret illico dysenteria restituta est, & illa paulatim sanitatē consequuta fuit. Alteram nominus, inquit idem, prægnantem sex mensium, quæ cum dysenteriam patiebatur, abortiuit, & sana facta est. Dysenteria antepartum salubris ab Hippocrate iudicata est: quod verum esse historiæ Amati testantur. Ita & ego aliquando etiam Dominam de Harnes prægnantem dysenteria laborantem habui, quæ etiam restituta fuit. Ita enim Hippoc. lib. 7. de morbis popularib. memoriæ commendauit: *Epicharmi uxori ante partum dysenteria, dolor, alui egestiones subcruenta, mucosa: ubi peperisset, statim sana erat, diuersionis forte ratione.* Ita & huic nostræ Domine de Schagen euenisse puto iſterum solutum post partum, viis iam solutis ac apertis per diuersionem, materia deinde per vterum euacuata. Ad facilitandum partum præceptor meus commendat hoc condimentum alternis diebus sumtum in cœna: *℞. gran. iuniperi, granor. lauri, ana num. viij. cassia lignea ℥ s. cinnamomi*

Ad facilitandum partum.

integri ℥ j. omnia simul ponantur in ventre turturæ pinguis & carnosæ, deinde coquantur in uero cum pinguedine pulli, & patienti mulieri pro osu dabit. Memini, quod ego anno 1554. die 13. Nouembr. Christianæ vxor Ioannis Philippi de Eide Flandri, Mathematici insignis, cum vir a me cōsiliū peteret, p. partu facilitando, partu instante, cōsiliū dedi, vt quinq; aut sex grana iuniperi cum sicibus darentur: quibus cum quinquies aut pluries via esset, mox, vt ipsa mihi retulit, conamina partus apparuerunt, adeo (quod & dictu mirabile est) illa ipsa cum maxima facilitate gemellos feliciter peperit: & ego eo tempore vnus de fonte susceptor fui. Habes apud eundem præceptorem meum Benedictum Fauentinum vnguenta relaxantia, linimenta, fomenta quoque ipsius pectinis, vt apud ipsum ad longum vid. & possis. Facilitant quoq; partum ea, quæ ad difficiles partus præscribuntur, vt exemplis subsequētib; clarius innotescet.

OBSERVATIO LXX.

De partu difficili ex magnitudine formæ.

Vxor Ioannis Reyneri, mulier Alemariana, cum anno 1549. mense Martio in partu perichitaretur, & ob magnitudinem fetus parere non posset, quod id & aliis annis præcedentibus eidem contigerat semper dum pareret, ab ipsa, tum assantibus mulieribus intelleximus. Nam & hoc notatu dignum a mulieribus longo vsu obseruatam, quod viri, qui humeros latos habent, plerumque magnos fetus generant. Hinc Iodoca Feylingia, seu Iusta, socrus mea, quæ viginti proles ex marito susceperat, filias suas collocare nolebat viris humeros latos habentibus; yti maritus huius mulieris habebat, vir etiam crassus. At vero periclitatis & improvise magnitudinis partum, Medici aliam causam referunt, vt postea latius in Scholio dicturi sumus. Ceterum ad hanc, cum parere non posset ob magnitudinem fetus, accitus sum. Cum itaque aluum duriores haberet, glande eam soluebamus. Mox ad ampliandum vterum & relaxandū, vt oleum sequens per obstetricem infunderetur, & vt intus atque exterius eodem oleo inungeretur, præcepi: *℞. olei amygd. dul. seminis lini, lilior. viol. ana ℥ j. s. misce.* hoc cataplasmate etiam ventri post intinctionem admoto, ac pectini ipso: *℞. farina hordei m. j. s. mucilag. sem. lini, scenug. albae, malua ana ℥ ij. olei amygd. dul. lilior. viol. ana q. s. fiat cataplasma;* & cum decoctione earundem herbarum, addito scenug. & sem. lini, aliisque vinctuosis, fiat fottus; quibus partes vteri relaxabantur, & partes inferiores magis subsequentes fiebant. Sunt autem inungenda partes perinæ & caudæ. Nam eas dilatari ad meatus amplificationem oportet; non autem os pubis, quod firmiter per cartilaginem ligatum est, & per ligamentum transversum parte inferiore positum. Sed cauda cum osse sacro articulata est, vt extra moueri possit, ad ani & vteri amplificationem. Quam ob causam mulieres non

non debent inniti illa parte, sed lumbis vel coxis, vel debent sustentari viris fortiorib. per brachia. Nostra Delphenſes obſtetrices habent mulieres fortes ad ſuſtentationem deſtinatas, vt prægnantes in ſinu ſedeant, vel potius libere ſuſtineantur, vt ſic facilius parere poſſint. Nam cum ſedent vel decumbunt, illius oſſis (vt recte quoque *Rondeletius* dicebat) amplifiatio impeditur. Vtiliſſimum eſt etiam, rectum inteſtinum vacuum eſſe omnibus recrementis: Quare ſi mulier non exonerat aluum, balanſis ſollicitanda eſt potius (vt nos in hac fecimus) quam clyſtere, quia vterum conſtringere poſſet. Sed balanſis acrimonia facultatem expultricem mouet, & ſtercus ac foetus aliquando propellit. Sic mihi ſæpe euenit, vt ſolo balano indito mox foetus ſubſequeretur, & parerent: vt vxori Aſſueri Chirurghi Delphenſis. Cum itaque loca iam dicta, perinæum & cauda, oleis pinguius dictis inungerentur ac fouerentur, ſternutamenta quoque incitauimus, vt villa commodius pareret, & vt potionem inſcriptam ſimul per os ſumeret mandauimus: *℞. ceruiſia Anglicana, qua delectabatur, cyathum magnum, butyr. ʒ. j. ſ. olei amygd. dulc. recenter expreſſi ʒ. j. aqua chamamelis, lilior. albor. ana ʒ. j. ſ.* totum tepide cum ebibiſſet, maximam partem euomit, ac reliquum cum cōtinuiſſet, non diu poſt peperit feliciter, cum violentia tamen, infantem magnum ac ſanum, & ſaluam euasit; etiam locello vna excuſſo ſeu ſecundina: in puerperio porro optime habes, recte deinde valuit.

SCHOLIA.

4 **I**nter partum naturalem & abortum differentia eſt. Partus nominatur quando foetus abſolutus ac conſummatus tutus emittitur, vel quando hoc ex naturæ commodo fit: quando vero non naturæ ſponte, ſed violenter incidit, abortus prouocatur, vt liquet 3. *De facult. nat.* Appello autem abortum imperfectam foetus emissionem vt cunque factam, cum Gal. 6. *De morb. vulg.* E diuerſo autem naturalem partum nuncupamus eorundem foetus conſummatorum, ac perfectorum naturalem emissionem: qui, vt inquit Hippocrates lib. De natura pueri, hoc modo fit: Vbi enim adeo auctus infans eſt, vt alimentum, & augmentum, quod a matre deſcendit, non amplius ei ſufficiens ſit, copioſius alimentum appetens calcitrare, & membranas diſrumpens initium partus matri affert. Foetus itaque vehementiſſimis motibus ſuccedunt partus, ex Hippoc. ſententia. Hoc etiam tempore vteri, qui amplius foetus grauitatem, ac eorum diſtentionem ferre nequeunt, (*Gal teſte eodem 3. De facult. natural.*) nec minus & ſentientes interim ſe morderi a qualitate humoris in ſe ipſos effuſi, qui eos moleſtat, facultate propultrice media abicere properant: nec non & a ſe ipſis patienter in hoc præſtant opus, non mediis vteris, ſed muſculis, qui in abdomine exiſtunt: qui ad diſtentionem etiam, tum ad reddendam vrinam, nobis ſunt auxilio. Fit itaque partus hoc modo. Verum quo tempore fiat, non admodum liquet, vt etiam ſuperius diximus. Mo-

do enim 10. imprægnationis menſe, iuxta Hip. *pocrat. vel iuxta Aristot.* 10. quoque menſibus, vtque longiſſime. Quamuis & 7. menſe & 8. & 9. (*quod generaliter ſit*) parere poſſunt. At foetus, qui maturius, quam in ſeptimo menſe prodeat, nullo pacto vitalis eſt: qui ſeptimo, vitalis quidem hic plurimum erit, ſed magna parte infirmior, vt et. iā Hippocrates de partu ſeptimeſtri ſcripſit Galenus 9. menſibus perfici ſcribit, & hoc 3. *De nat. facult. & 2. De cauſſ. ſympt.* confirmauit. Atq; hæc ſunt prout alimentum perfecto & conſummato foetui, ac augmentum a matre ſuppeditatur. Diuerſimode enim in diuerſis vterum gerentibus ſe habet, ſi maiorem vel minorem ſufficientiam conſiderabis, prout ſufficientes vel paucos menſes demittere conſueuerunt. Similiter & inter ſe non parum diſſident foetus: nam prout maiores vel minores exiſtunt, aut robuſtiores vel imbecilliores, plurimo aut pauciore alimento indigent, etiam dum perfecti ac conſummati fuerint. Propterea Hippocrates horum haud ignarus, eodem lib. De natura pueri talia verba protulit: Quin et ſi alimentum a matre prius aduenit, & ante 10. menſem puer prodit; & hoc perpetiuntur magis mulieres primiparæ: deficit enim pueris alimentum, vt ad 10. vſque menſem ſufficere non poſſit. Et demum: Quæ vero menſes paucos demittunt, eæ etiam puris poſtremo tempore, vbi iam maturi fuerint, alimentum rarius exhibentes, ipſos calcitrare faciunt, vt & ante decimum prodire ſeſtinent: modicus enim ſanguis a iuueniculis ac nouellis matribus procedit. Longiſſimum itaque terminum naturalis partus coſcripſit Hippocrates eſſe 10. menſem; quamuis non neget citius contingere poſſe, vt qui & 7. 8. 9. menſe mulieres aſſeruit parere poſſe, & nonnullis 11. attingere. Et ita puer ſeptimeſtri partu natus, pro ratione natus eſt & viuit: octimeſtris autem natus nullus vquam vixit: nouem vero menſium & decem dierum partus fit, & viuit. In eandem quoque ſententiam deuenit Galenus. Nam licet nouem menſibus pariendi tempus præſcripſerit, illud plerique mulieribus contingere aſſeruit, & forte quia ſic ſæpenumero obſeruauerit, haudquaquam negat in decimo poſſe euenire: quin imo admittere illud videtur ex eiſdem Hippo. auctoritate Comment. aph. 37. 5. lib. ac aliis quoque menſibus, pro prædictorum varietate. Cum igitur conſummatus & perfectus prodeat, ſive 9. ſive 10. menſe id contingat, & cum adeo miranda pro eius emissionem requirantur, euenit (idque non raro) vt difficulter edatur in lucem foetus, & ſic difficilis fiat parientibus partus. Hunc quidam rursus naturaliter prodire volūt capite prius exeunte, facie verſus terram prolapſa, deinde collo egrediēte, mox humeris, brachiis, deinde exteſis ſupra latera procedentibus: innaturaliter vero vbi exit reſupinus, aut pedibus primo, aut manibus exeuntibus, vel ſecundum latera: difficulter, vel partum difficilem vocant, quando non poteſt exire, & laborat mater, & anguſtiatur, ac moriatur in illo labore & anxietate longo tempore. Alii vero partum

5
De tempore
prius dictum
eſt.
Sed hic con-
ciliatur Gal.
cum Hipp.
& Arist.

6

Alias diſtin-
ctio partus
naturalis, in
naturalis,
& difficilis.

Quis affectus
sit partus
difficultas.

Ad quam
noxam se-
quatur.

innaturalem etiam ad difficultatem partus referunt. & ita partus difficultas symptoma est sub genere contentorum immodice: sunt etenim foetus non vtero gerentium partes, sed proportionem respondentis, quæ adnascuntur, familiarium, inquam, quemadmodum & ova, & fructus, nimirum ad generis propagationem a natura creati; ex Gal. testimonio 11. De simpl. medic. facultatibus. Et propterea ubi detineantur tempore, quo edii in lucem debent, præter naturam detinentur. Consequitur autem hæc eorum præter naturam detentio, quod ad noxam alicuius facultatis naturalis, retentricis, inquam, aut expultricis, siue ipsius pueri, siue prægnantis. Interim vero citra noxam earundem facultatum, ad alias consequitur causas seu præter naturam dispositiones. Sed antequam ad omnes causas veniamus, cum hic vnam tantum in medium produxerimus, nempe, quod hæc mulier non poterat parere ob magnitudinem foetus; causam prius proceritatis seu magnitudinis vel improceritatis partuum dicamus; quamquam aliqua ex parte prius diximus, exemplo cucumeris & arboris, Schol. 66. huius libri, de iisdem. A nostræ vulgares mulieres, ex longo observatione dicunt, prægnantes magnos foetus parere, quæ nactæ sint maritos platonicos humeros latos habentes. At Bonaciolus l. b. 1. mulieb. ca. 4.

8 inquit: Quosdam præstanti corporis magnitudine proceritatis, partus, alios pumiliones, nonnullos proceritate insimproceritatis, parvum, alios improcera facie alios, obesos plerosque, alios graciles, quosdam inter hos omnes medios, pro locorum, capedine, recremento, um. seminalium quantitate, alimentaria materia inopia, ubertate affluentia, ve, gigni compertum est. Etenim si vteri spaciositas angusta fuerit, non amplum, sed angustum, quod in ea procreatur, esse necessum est: instar fructuum, qui quanquam sua vi suapteque natura grandiores adolebant, in angusto ac tiorique vasculo in suæ generationis primordio coacti ac coerciti excrecere ultra vasculi limites (eo impediēte) nequaquam possunt: planeque præpetibus hominum inuentis prodigiosis naturæ viribus abrogatis (cui nihil lo secius imperari audacis est credere) exoleseunt. Idem idem & de incoati hominis magnitudine facile est cuique arbitrari. Quo fit ut nani pumilive degeneres admodum in lucem prodeant. Subticeo Pygmæos ad extremos Indiæ fines, ternos longitudine dodrantes non excedētes, quos etiam a gruibus infestari Homerus prodidit: eosdemque fama est, sagittis armatos arietum caprarumque dorsis insidentes verno tempore ad mare uniuerso agmine descendere, & ova tum pullos quoque earum consumere, ternisque eam expeditionem mensibus perficere: alioquin fieri, ut futuris gruum gregibus resistere nequeant. Contra, si vuluæ alveus vastior exstiterit, modo parentes uberiores genituras suggererint, ac deinceps alimentaria muliebria tantisper affluentiore affatim suppetant, maiusculum procul dubio puerperium efficitur. Sin cauea intercapedoque medium obtinuerit, medios quoque infantes (modo cetera respondeant) gigni, credi par est. Hinc

breuiiores quosdam partibus partus easuras discas licebit, æquivalentes nonnullos, longitudine magis euctos procerioresque alios: tamen si raro admodum (seminum ubertatem exustione consumēte) eam ætate nostra fortunam indepti sunt. Quandoquidem & Homerus vates ille iam ante annos probe bis mille & sexcentos, minora mortalium corpora, quam prisca usque in id tempus conqueri non cessauerit. Nonnullos tamen patribus maiores exstitisse creditur. Quemadmodum olim ille fuerat, cuius corpus (terramotum in Cretarum monte) stans quadraginta & sex cubitorum inuentum est. Et adhuc Orestis corpus (oraculo res ossum iussu) septem cubitorum fuisse traditur. Sub diuo etiam num Claudio, Gabbara procerissimus homo, nouem pedum & totidem vnciarum ex Arabia aduectus visus est. Et sub diuo Augusto Pusonius & Secundilla duo ii priori semipede addito exstiterunt. Quantos eorum parētes fuisse, nusquam proditum est. Plura vide apud eundem loco citato. Nunc ad alia exempla difficultatis partus properemus.

OBSERVATIO LXXI.

De partus difficultate ob innaturalem positionem foetus, ac humore lapsa.

Quævis quantitas cuique in vtero fuerit, in semet conglobatus homuncio sic gestatur, ut nasum inter genua, super hæc palmas, super hæc ocellos, aures extra genua habeat, cui caput primum sursum, facie ad spinam matris versa tergo ad lumen est. At cum increuerit, exitumque appetit (ut paulo ante etiam diximus) deorsum reclinatur. Egressus huius gratia, rerum parens (quippe qui in caput commodius ederet) sic situandum in vtero duxit. Si alter exeat, difficilis fit partus: uti euenit anno 1557. mense Ianuario Mariæ Iohannis, vxori Iacobi Teylingii, sorori meæ nam capite retrosum ad scapulas mento incumbens ut exire non posset, vi obstetrix nobis ad prægnantem vocatis narrauit. Membranis vero disruptis, humore effuso & enixu partus deficiente, ob longam moram & debilitatem, matrix minus lubrica partum adiutare non potuit. Quare consului, ut obstetrix ad humectationem oleo amygdulicium pinguissem & vterum obliniret, & quod circa clauiculam aut os prædictos digito inuncto leuiter cum oleo eodem paululum subleuaret, ut sic caput ad os vteri recte descenderet. Quod ubi fecisset, & artemisiæ decoctum cum vino Rhénano, adiecto puluere cinnamomi calide propinaxsem, (quanquam prius ebibisset ceruicisiam cum oleo amygdulic. & butyro, quam etiam exonerat, factu nondum egredientem) ilico peperit, deinde post partum bene purgata, optime deinde habuit. Erat autem prius valde meticulosa, eo, quod octauus partus esset, cum mater eiusdem ex octauo partu obiisset. Illa quidem imaginatione impressa, magis sibi metuerat. Sed schemate optimi partus in rectum diducit, feliciter peperit. Eodem etiam plane modo, meo consilio, rustica feliciter enixa est, in pago ad Mosam sito.

SCHO-

S C H O L I A.

CAUSÆ autem difficilis partus variæ sunt. In-
terea vniuersæ aut internæ sunt, aut externæ.
Externæ siquidem, quæ partus difficultatem in-
ferunt, sunt aut immodicum frigus, quod vte-
rum densauerit, aut immodicus calor, qui vires
dissoluerit, aut quoddam aliud fortuito eueniens,
ut liquet ex Paulo & Aetio: Nam & mulieres dif-
ficulter pariunt ob aeris præcedentem vel præ-
sentem constitutionem, *ut Hippocrat. docuit*. Ob-
est aquilonia: Austrina iuuat sicca, fœtus &
mulieris corpus exsiccatur, & difficilem facit par-
tum. Nimis calida vires resoluit, *ut diximus*: fri-
gida partes contrahit. Humida omnium aptissi-
ma est. Quæ modice calida est, ut veris (*quod cum
autumno faciliores partus concedat.*) laudatur. In-
ternæ autem causæ, aut vitio parientis, aut fœtus,
aut membranarum esse possunt. Sub quibus &
alii intelligunt etiam posse fieri ratione vteri, vel
partium vicinarum. At parientis quidem, ut si
crassa obesaque sit, vterus exiguus, dolorum im-
patiens, aut timidiuscula, aut natura imbecillis,
ut fœtus nequeat propellere, aut etiam si ante
tempus pareat, vel inflammationem in locis ge-
nitalibus, aliave particula fuerit experta, aut alio
quodam modo laborans: ob ceruicis vteri obli-
quitatem, aut ob carnem eidem ceruici, vel oscu-
lo eius adnatam, abscessum vel duritiem. Potest
& difficultas pariendi contingere, si etiam ossa
pubis nimium conferta fuerint: quoniam enim
in partu dilatari non possunt, pariendi difficulta-
tem faciunt: similiter si puerpera vesicæ calculo
laboret, vel excrementorum copia in intestino
recto, aut vesica fuerit detenta, siue prouecta æ-
tatis fuerit, aut puella nondum virilis, nec vires
vigoris ad pta: nec minus ob nimiam lumbo-
rum cavitatem vterum comprimentem difficul-
te pariet. Ita quoque si matris adsit mala confir-
matio, staturæ breuitas: ex vicinarum partium
tumore, vel vitio vesicæ, aut musculorum abdo-
minis. Nimia quoque omenti & vicinarum par-
tium spissitudo & obesitas. Nam Hippocrates
scripsit, omenti magnitudinem impedire conce-
ptum, os vteri comprimendo: sic & facile par-
tum molestat. In quibusdam enim omentum
descendit inter vesicam & vterum, ibique spissus
fit. Colli vtero longitudo facit quoque saltem,
ut longiori tempore exeat fœtus. Fœtus vero
vitio similiter difficulter pariunt: ut si inusitata
magnitudinis fuerit, *ut Obseruat. 70. præcedente
ostendimus*, vel exiguus, & modicæ grauitatis, seu
magni capitis, vel menstruosus, vel mortuus; aut
vixit quidem, sed adeo imbecillis, ut foras non
possit procedere: similiter si plures fœtus fue-
rint. Nam Herophilus quinque edidisse mulie-
rem memoriæ prodidit. Confirmavit idem
Gallii auctoritas, qui, Diuo Augusto imperante,
ancillam in agro Laurente quinque pueros pepe-
risset testatur. Vbi biceps prodit difficulter pari-
unt, vel quouis alio modo monstruosus, gemini,
vel cōiuncti, aut duo vel tres. Nam duo corpora,
teste Valesco, nata vix sunt duo capita habentia,

duo ora, quatuor brachia, quatuor manus, vnam
anum, Primus mortuus est, & deinde alius longo
tempore post, & fœtente altero. De monstruosis
partibus & diuersis scematibus partuum, vide 4.
lib. Iacobi Rueff chirurgi Tigurini: nam & figura
ipsius fœtus naturæ contraria, ut hoc exemplo
præcedente ostendimus, difficilem efficit partum;
ut si obliquus, aut in pedes procedat, ex Hipp. au-
toritate eodem lib. De natura pueri. Naturalis
siquidem figura, prodeuntis fœtus est (*ut diximus*)
ut recte in caput manibus ad vtrumque femur
extentis prodeat. Proxima huic ubi in pedes con-
uersus est, præcipue si manibus super vtroque fe-
more extentis prodeat. Reliquæ vero omnes præ-
ter naturam sunt, Aetio & Paulo testibus: ut si ca-
put in dextram vel sinistram vteri partem decli-
net; aut altera aut vtraque manus exseritur, &
crura intus inter se diducuntur: aut etiam altero
pede intus detento, altero prodeant, aut si dupli-
cati vteris innitatur, aut etiam obliqui prodeant;
licet hi minus improbandi sint, ut liquet ex eodē
Aetio. Quapropter natura diligenter prouidit,
quo pacto fœtus, quæ conueniebat figura, ad col-
lum vteri proueniret. Caput etenim eius primum
collo matricis indidit, tum per id aliis ipsius par-
tibus viam muniuit, *ut liquet 15. De usu partium*.
Procedit autem in caput, si secundum naturam
prodierit, ut inquit Hippocrates, quoniam gra-
uissimæ sunt ipsi supernæ partes, si ex vmbilico
perpendatur. Atqui si fœtus obliquus, aut trans-
uersus paret egredi, aut si secundum longitudi-
nem quidem, sed non ut nunc, scilicet caput non
infereret, quod nonnunquam etiam, sed raro ac-
cidit, vel pedem ante caput, vel menum exserens,
difficilem aliis membris exitum efficeret, *ut eo-
dem 15. De usu partium, a Galeno scriptum est*. De
his vide plura, & quæ sint schemata infantis na-
scentis seu prodeuntis, in Harmonia Gynæcio-
rum, & quæ Moschio ad longum scripsit. Et ita
Fernelius breuiter: Quum non recta in caput
fertur, nec manibus secundum latera adductis,
sed vel ambos pedes, vel (*quod multo operosius
existit*) alterum duntaxat, vel manus primum
exserit, vel duplicatus in nates exit; vel obliquus
alterutrum latus, vel pronus ventrem primum
exhibet, quæ omnium pessima est pariendi figu-
ra. Difficilis quoque fit partus, si secunda, aut
propter crassitudinem non abrumpatur, aut pro-
pter tenuitatem antequam oportet, diuellatur si-
mul cum aliis membranis fœtum ambientibus;
siquidem humore euacuato, infans præ siccitate
ægre mouetur, ac per os & collum vteri difficulter
elabatur: humor enim iste, qui in pueri membra-
nis continetur, nedum eisdem lubricandis con-
fert, sed vteri ceruicē ad maximam dilationem
reddit facilem: prædicto namq; humore collum
humectatū mollius redditur, dilataturq; facilius,
eodem Galen. teste citato lib. 15. De usu part. Dif-
ficilem itaq; partum in propinquo esse, prænun-
tiat (*inquit Fernelius*) humor aquosus allantoide
conclusus, totus ante partum effluens, aut co-
piosior sanguinis eruptio multo tempore fœtum

Causæ ex
parte mem-
branarum.Signa diffi-
lis partus in
propinquo.

7 præcedens. Loci enim sicci manent, destituti eo humore, qui foetui transitum facilem & lubricum præbet: languidi dolores ex internallis longioribus recurrunt, quando quidem ægre abruptuntur acetabula, vixq; secundæ ab utero diuelluntur. Sed & hæc signa, præter ea quæ superius diximus, proximi partus sunt ex Mosch. Si septimo, vel nono, vel etiam 10. mense, grauedo uteri, & ex renum consensu feruor & dolor in clunibus, lumbis & inguinibus erit, ipsius etiam matricis ad inferiores partes discensus cum orificii apertione & humectatione. Cum vero proximat, superiores partes graciliores fiunt, & extenduntur loca super pectinem & inguina, & frequenter urinæ desiderium nascitur. Immissoq; digito ad magnitudinem oui in orificio inuenitur: humor vero qui effertur, primo lentus, postmodum plurimus & sanguineus. Differt autem hic dolor a feruore qui in partu occurrit, & ab inflammatione uteri, eo quod a feruore dolor cum clausura & siccitate in orificio inuenitur. At iam causa difficultatis partus antequam ad curationem accedatur, diligenter inquirenda, ut sic pro ratione causæ commoda inueniantur remedia. Et licet tot sint pariendi difficultatis causæ, haud tamen ægre a Medico percipi poterant: externæ siquidē ex astantium seu puerperæ sermonibus innotescunt: internas vero tum ex se ipsis Medici inuestigabunt, tum etiam ex earundē parientium loquela. Nam debilitas ægræ, macilentia, veluti etiam pinguedo, ex habitu corporis deprehenditur. Si uteri vitio sit ex propriis indiciis, siue ad sit vlcus, abscessus, inflammatio, aut tale quippiā, facile deprehēdes. Si quoque a frigore externo, vel calore, parientis indicio habebitur. Si mater debilis, vel lassata, vel morbum prius passa sit, vel ob longam moram magis lassata, vel famem experta, meticulosa, aut in pubertate, vel annosa, ab ipsa quoq; vel astantibus percipies. Ita & foetus imbecillitas ex debili & tarda motione habetur, si mortuus, eius signa antea diximus: a motu cessat, frigiditas ventris adest & lateris, dolor iuxta umbilicum grauis, febris lenta, faciei decoloratio, foetidis anhelitus, ascensus vaporum horribilium ad superiora, immobilitas ventris, instantia vigiliarum. Magnitudo foetus ex parentum corporis constitutione, ac ventris parientis mole conicitur, eaque grauius incedit. Quando autem hæc deficiunt, & mater fortis est, facilis motus, & foetus mouetur ad exitum, & tamē partus est difficilis, tunc signum est, secundam seu secundinam esse fortem; & tunc non exit aliqua aquositas nec superfluitas, & prægnans in enixu plurimum laborat; inde crassities secundæ colligi potest. Et siccitas uteri facile cognoscitur per siccitatem prægnantis; quia est macilenta, sicca, sitibunda, agilis, minime lubricosa. Nunc ad signa prognostica accedamus, exemplis prius productis de partu valde periculoso, & de primipara ex partu moriente.

OBSERVATIO LXXII.

De partu valde periculoso: & de primipara ex primo partu moriente.

Valde periculosum est, si puer vel foetus super pedes exierit. Euasit tamen hoc modo nata Elizabetha Iacobi Teylingii sororii mei filia. Oportet ut obstetrix pedes impellat sursum, deinde paulatim conuertat foetum. At si egrediatur vsq; ad corpus, tunc præcipe ei ut comprimatur, & fac eam sternutare cum conditi: *sæpe enim*, inquit Albucasis, *auxilio & gratia Dei, vidimus euasisse incolumes & matrem & foetum.* Et si non egrediatur hoc modo, tunc obstetrix reducat foetum paulatim donec reponat eum secundum figuram naturalem. Si ita forte reposuerit recte, facile pariet mulier. Quod si nulla harum ratio subueniat, foue uterum cum mucilagine althææ & oleo sesamino. Puto autem filiam sororii mei præmissis pedibus, manibus deorsum ad femora deductis natam; qualis est prima figura apud Iacobum Rueff: in quo casu obstetrix oleo, conuenientibusq; linimentis instructa, exitumq; infantis vngendo & demulcendo tantum inuet, ne retro feratur, sed uti cœpit ita recte pergat. In primis autem operam dabit ut utraq; infantis brachia deorsum porrecta apprehendat, firmiterq; teneat, nec retrorsum deducere permittat; sed hoc ipso modo ad partum prodire compellat, & ad reliqua pergat, ut ibidē annotatur. Si vero in pedes procidat, manibus supra caput surrectis, tunc melius est, partum in uterum repellere, *ut videre est apud eundem auctorem cap. 2. vel de secunda figura innaturali.* Si ad genua descendat, facile repellitur. Si in nates sedeat, ut contingit uxori calcearii Alcmariz, in qua foetus complicatus natibus exire nitebatur: sed manu infante repulso leuiter educus fuit. Vide 9. figuram apud auctorem citatum. Sicuti forma innaturalis foetus non careat periculo; ita pessima sunt symptomata quæ nos terrere debent; & tunc periculum prædicemus, si febris inter pariendum præcipue acuta adfuerit, dum diu in excutiendo foetum laborant, & si plurimū sudent pulsusque minuatur, & postea in totum non appareat, subsequente delirio. Tales aliquando vna cum foetu dum in paru sunt, moriuntur: ut nuper euenit primiparæ valde tenuis constitutionis & imbecillæ existenti.

S C H O L I A.

EX parientibus ac puerperis maxime laborant primiparæ, propter inexperience dorum: *Signa prognostica.* & dolent quidem totum corpus, maxime vero lumbos, ac coxendices. Nam coxendices earum disparantur. Verum expertæ iam partus, minus primiparæ dolent: quæ vero multoties pepererunt, multo minus dolent; *ut inquit Hippocrates lib. De natura pueri.* Primiparæ & iuniores difficulter pariunt; ita & seniores quæ nunquā pepererunt; & aliquādo cum vitæ periculo, si mala symptomata accesserint. Et ubi obliquus, aut in pedes foetus procedet, nedum mulier difficulter pariet, sed multæ vel ipsæ perierunt, vel puer, aut simul matres vna cum foetibus; ut Hippo. in lib. citato scriptum reliquit. Huc referendæ sunt prædictiones habitæ de conceptione: nam & mulier post annū 25. primum concipiens difficulter pariet primipara.

Signa proximi partus, ex Mosch.

1 Dolor parientis differtur a feruore seu inflammatione uteri.

8 Signa causarum difficultatis partus.

3
Signa prognostica.

para. Pinguis mulier sicut difficile concipit, ita & ægerime pariet. Si dolor imas partes ventris tentat, cum patientis virium robore, & nulla ad se anhelandi difficultas in muliere temperatur & ætatis mediocritas, bonum est: nam facilitatem partus præsignat: etiam cum dolor est prope vulvam, in dilatare licet per embryonis præsentiam prope animum existens, & cito exibat ille natus calum totus in uero foetus, dicente Valeleo. Quandoque quæ intus dolor declinat versus inferiora & anhelum, hic bonus, partus erit facilis. Mulieres, ut dixi, pingues magis laborant in partu, quam graciles aut macilentæ. Masculus cum minori labore egreditur, quam femina. Si dolor ad illa & os sacrum tendat, difficile pariet. *aph. 55. lib. 5.* Quæcumque uterum gerentes a febris corripuntur, & fortiter calefiunt sine occasione manifesta, difficulter pariunt, & cum periculo, aut ab æsum patientes periclitantur. Non sine ratione igitur fecit *Galenus in Comment.* aliquid de utero ob illud, sed ex febre & vario humorum corruptione nonnunquam vero perditur, & quædam pars, sed cum ipse & valeat, ut sit ut qui longo tempore laborauit, & ante partum non habet, non sine periculo parit. Nam ad bonum partum, ut alibi quoque videmus, dolor in corporis vigore est opus, & parit eum, si & iustus. Quidam hic adiciunt, quod illa quæ in matris partu, matris eadem. Verum utrum sit dubitamus. Plinius olcitatem in matre, ex lethale, sic voluit, *lib. 7. ca. 6.* Quod utro mulieri, quæ dicitur ulter parit, sternutatio hyperacutis bonum sit, decretum reliquit *generis prole, lib. 3.* quoniam vehementiori corpore, & terrore, partum quidem naturam excitat, partum vero excutit quæ partibus corporis firmiter infixæ adherent, ut inquit *Gal. in Commento.* Ascensus tempore in prægnationis in utero accidens lethale: & hoc quoque prius ex Hippocrate dictum. Partus autem difficilior in foetu mortuo, quam vivo.

OBSERVATIO LXXIII.

De quibusdam mulieribus in partu periclitantibus, & egregie liberatis.

CAtharina, mulier quæ extra portam qua Schiedamum itur habitabat, vxor illius Iacobi Johannis, qui vela conficiebat, cum circa tres dies in partu difficili hærens parere non posset nec lotium emittere, ad eam tandem ego accitus fui, cum obstetrix eandem pro deplorata haberet. At his infrascriptis remediis anno 1571. per medescriptis tandem feliciter peperit. 24. Febr. eam accessi, & cum alium non deponeret, balanis sequentibus soluta fuit: *℞. pul. heræ picræ ʒij. salis communis, & salis gemmæ ana parum. mellis q. s. fiant duas ppositoria.* Imperavi quoque, ut obstetrix ventrem inferiorem ad pubem usque inungeret, ob humorem effluxum & matricem siccam: *℞. ping. gallinæ, anatis, anseris, olei liliorum, cheyrini, ana ʒij. olei amygd. dul. ʒij. misce pro linimento.* Intere, dum in officio obstetricandi esset, intus vul-

nam quoque illinebat oleis sequentibus: *℞. olei amygd. dul. ʒij. B. olei liliorum ʒij. misce.* Sacculi quoque parati erant in vino Rhenano cocti, & expressi calide pectini admoti ad vrinam prolestandam (cum ea retenta esset) & partum facilitandum: *℞. folior. saluæ, flor. chamæmel. meliloti, parietariæ ana m. j. artemisiæ m. ss. semin. anisi, anethi ana ʒij. cheyris m. j. fiat sacculus quadratus intorsus.* Interim & pul. ad prouocandum partum non febricitanti per tres vices exhibitus est. Obstetrix alium puluerem pro vxore Cornelii pictoris dederat: de qua muliere suo loco dicemus; quem citra meum consilium a pharmacopœo extorserat, sed nihil effecit, cum casus ab altera dimissus esset. Verum hæc subsequentibus pulueribus cum vino assumtis, & admotis sacculis, ex iis copiose lotium reddidit, & mox feliciter peperit, & salua euasit, & sana etiamnum viuit. Hic erat pul. facilitans partum: *℞. cinnamomi selecti ʒij. B. cassiam dalylor. ʒij. sem. viol. ʒij. rad. dictamni albi ʒij. fiat puluis subtilissimus in tres partes diuisus.* Venit mihi tunc in mentem textoris vxor, quæ cum octo diebus in difficili partu valde angeretur, a M. Iohanne Tienigio Amstelrodamiensi Medico curata fuit, ubi nono die accepisset ʒij. pil. de assa foetida (de qua superius dictum est) cum cyatho vno decoct. sabina, idque ter, post prandium, & hora 4. & sub noctem hora 8. quibus eadem nocte, Dei nutu, peperit filiam, & salua mansit. Sed & alteri etiam octo diebus hærenti in difficili partu, cui ante 4. dies matrix aperta humorem mensesque profuderat, exhibita est ʒij. pil. ex assa foetida iam dicta cum vino decoct. verbenæ, sabina & artemis. & liberata est illa nocte, cum bis sumpsisset. Ita & puerpera, cui duobus diebus secunda intus permanerat, valde defatigatæ tertio die extrema inunctio adhibita fuit, ut in deploratis fieri solet. Sed singulis tribus horis accepit eandem pill. ad ʒij. (quam descriptionem accepit a Nicolo Fiorentino, auctoritate Rhas. cap. proprio De facilitando partum) exhibitas cum succo verbenæ & prassii mixtis cum vino Rhenensi, & fuit liberata. Idem utebatur suo clareto & vnguento emolliente, descriptis antea Scholio Obl. 43. huius libri.

SCHOLIA.

Curationem antequam aggrediamur, de obstetrice perita ac gnara, & sagaci, ac minime temulenta, prospiciendum est, ut per eandem omnia illa, quæ partum difficilem inferunt, recte curare possimus: nam ut traditur in Harmonia Gynæc. cap. 9. obstetrix literas nosse debet, cui & ingenium promptum, & memoria præsens adesse debent. Eaque sit studiosa, munda vniuerso etiam corpore, fortis & laboriosa; quæ & iuxta Mosch. sit medicinalibus actionibus exercitata, prouidens, iusta, diligens in adiuvando, quæque partes diuidere nouit, & accidentia mitigare, non iracunda nec turbulenta, compatiens, sobria, pudica, arguta, quieta, prudens, nec auara, atque in eo munere factilis, audacula, quæ animum primiparæ facile excitet, & quæ præparcum animum coarguat, faceta,

hilarisque, non annosa, quæque non solum difficultati partus opportune expediteque succurrat; sed etiam contra ea (*ut Benedictus Veronensis dicebat lib. 25. cap. 25.*) quæ accidunt ingeniose agat; & in præcidendo deligandoque umbilico infans non impigra sit. Non dicaculâ, sed religiosam esse oportet. Nam sæpe infans veluti emortuus enascitur, qui prius quam deligatur umbilicus, compresso intus sanguine, tanquam recepto alimento, vitæ restituitur; is alioqui deliquio moritur. At nunc de iis, quibus obstetrices indigent, ut est sella obstetricalis ab ipso Mosch. tum veteribus descripta, instar sellæ tonsoriæ similitudine lunæ præcisa, ut illuc infans cadere possit. Sed ex sinu insident alterius mulieris; ut nostras obstetrices facere diximus, non adeo incommodum est, quam quod a viris fortibus brachia teneantur: nam quædam vel aspectum virorum dum parturiunt abhorrent. Interea Moschio adesse vult ministras vna cū obstetrice numero tres, ex quibus duæ dextra læuaque ad latera stare debent, inter quas incumbere possit; tertia vero dorsum eius teneat. Sed si in sinu sedeat mulieris robustæ, tertia minus opus erit. Interea omnia sint parata quæ ad partum sunt necessaria, vaporations ex oleis calidis, spongia mollis, lana munda, fasciæ ceruicalia, resumptui odores, & cathedra obstetricalis. Reliqua vide apud eundem, quid facere oporteat antequam in sella ponatur parturiens, & quomodo eam collocare oporteat. Etenim si ita fuerit lassæ, ut supina sedens in lecto parere non posset, ad sellam eam leuant, vel in mulieris femoribus sedere debet (*ut & nos paulo ante diximus*) ut illic pariat. Obstetrix ita sedere debet ut utiliter sit cincta, auctore Moschione: & si in lecto partus efficiatur, habeat modice inferius obstetrix sedile, in quo sedeat, ut ita facillime manus mittere possit. Si vero sedens in sella paritura est, & sedeat inferius obstetrix humiliori sella, ut possit ex superioribus partibus infantes adducere, & aliquantulum pedibus suis apertis, plus tamen humiliore loco, ut eam non impediat, faciem suam auersam auertat, ne pariens præ verecundia se concludat. Ante omnia tamen ligamenti omnibus & capillis solutis, quod propter laxamentum solet fieri. Digito autē sinistro oleo calido peruncto, orificium matricis circumagendo, aperiat, ut chorium illuc cadere possit. Omni cura circa parturientem satagere debet, & petere eam, ut non clamet, sed omnē spiritum ad inferiores partes exponat, maxime cum dolor occurret. Si folliculus diu non fuerit ruptus, vnguibus eum rumpere, & immixtis paulatim digitis plus adaperire conabitur. Observandum est ne infans subito cadat, ne quassatio capiti & ceruici infantis adducatur. Naturaliter vero orificium aperitur aliquando, mergentibus humoribus per ipsum. Tunc apprehendere debet obstetrix, & in diuersum adducere huc atque illuc. Illo tempore quando se matrix aperit, conari oportet; & quando se concludit, non conetur, ne terrore aut sanguinis fluxu, ipsius matricis adductio emergat. A lateribus vero ministræ sine quaf-

satione, manibus aptis deorsum deducant. Cum vero exire foetus coeperit, manibus pannū habentibus eum suscipiat obstetrix; & id obstetricaliter quam lenissime, ut vna cum secundis procidat. Quando autem & quomodo umbilicum oporteat præcidere, ex Moschione sic habeto. Cū modice infans in terra requieverit, a ventre eius digitis quatuor scalpello aut cultro acutissimo præcidendus est. Nec superstitionibus antiquorum consentiendum est, qui lino aut vitro, vel canna acuta, aut cortice panis secabant. Cum vero præcideris, sanguinem, qui in eo remansit, coagulatum exsiccabis, & lana torta vel licio ligabis, ne subsequenti fluxu sanguinis infans periclitetur. Sed eadem hora qua natus est, ex utraque parte ligandus est, & sic in medio præcidendus, ne & ipsa parturiens fluxum sanguinis patiatur. De regimine parturientium hic ea adiungere poteris, quæ & Erotis de passionibus mulierum cap. 16. De regimine parturientium scripsit. Nunc vero quod ad difficultatem partus attinet, & rationem curandi, variatur quidem iuxta causarum diuersitatem, ut nunc nonnullis exemplis præcedentibus constat, & etiam sequentibus manifestius ostendetur, si speciatim eas curare velis: quanquam quædam sint animaduertenda tanquam omnibus causis communia, quæ primo conscribemus; simul etiam & mentionem facientes quorundam medicamentorum, quæ indifferenter omnibus puerperis difficulter parientibus ex quauis causa adhiberi poterunt; hic etiam adducentes tria documenta ab ipso Donato ab Altomari cap. De difficultate partus etiam descripta. Primum est aduertendum, quod puerperæ eo tempore, quo partus instat, non sunt multa alimentorum copia grauandæ, neque varia alimenta & crebro exhibenda sunt, veluti Neapoli abuti consueuerunt mulieres, & vetulæ, & quidam vulgares Medici, ut eisdem obsequantur; quod & magis hic apud nostras mulierculas fieri solet. Distrahitur enim calor pro conficiendis multis ac diuersis alimentis, & quia etiam coctioni ac retentioni alimentorum vacat, viriliter expellere nequit, qua facultate tamen ac functione valida eo tempore parientes indigent. Pauca itaque ac moderata alimentorum copia tribuatur, sintque concoctu faciles, bonique nutrimenti cibi; ut oua recentia, ac sorbilia, seu tremula, ius pullorum, gallinarum, phasianorum, aut starnarum, quod ex contusis carnibus sit & vulgus consummatū appellat; vel etiam eorundem animalium contusa caro, quam idem vulgus tortilium nominat, aut buccellæ panis in vino Græco aut alio odorato vino maceratæ simul cū eodem vino tribuantur. Ita & Benedictus Veronensis: *Tum interea* (inquit lib. 25. cap. 23.) *vitanda sunt acrida, appropinquante partu, exiguoq; cibo uti necesse est, qui tamen plurimum alit, vinoque odorato exinde hora interuallo.* Paritura quoque in aere calido & humido, iuxta Guainerium, collocetur; in cuius domo nulla pira dimittantur, teste Diosc. vuluam aperire prohibet: omnes lapides pretiosi ab illa amoueantur. Ad hæc, pro secundo docu-

Quando autem quomodo oportet umbilicum præcidere ex Mosch. lib. matricis.

8

Curatio.

Primum documentum.

9

Sella obstetricalis. vide Mosch.

De ministris tum aliis rebus ad partum necessariis.

Obstetrix quomodo sedere debeat.

Secundum documentum.

Tertium documentum.

Qua a proprietate facilius paritur.

documento, permittendum haudquaquam est, ut obstetrices difficile parientium vterum diutius dilanient, sed leniter, & placide vteri partes contrahant, dulci interim oleo, aut alio quopiam, eiusdem locos perfundentes. Item, pro tertio documento, non ilico parturientes in sella collocandæ sunt; sed obstetrices prius os vteri tangere debent, & primum cum in debiliscentis modum auctum animaduenerint, quod ad foetus transitum satis pateat, tunc ut surgat mulier, iubere debent, eandemque in sublellio collocare, adhortarique, ut ad expellendum foetum strenue se parer, quemadmodum; de natura facili. a Galeno scriptum est. Spiritum quidem detineant; verum non, velut imperitæ faciunt, ipsum in gutture congregare debent; sed ad inferiores partes propullare, ex decreto Aetii cap. 14. lib. 6. quo tempore, ubi partus difficilis sit, corallum aut lapidem aquilæ, aut styracem, coriandrum viride, seu polygoni radicem, in dextro crure alligare convenit. Guainerius ait: *Lupinus carnes paritur, si comederit, pariet facilius, & incantationes noxiae versus illam (inquit) non valent.* Conducunt itaque sinaragdu coxæ alligatus & cor gallinæ adhuc palpitans; & tota ala aquilæ vel penna vulturis pedibus parituræ supposita; & vnguis milui sub laborantis camisia portata, & magnes in sinistra manu retentus. Insuper, ut etiam Donatus refert, & accipitris seu falconis stercoris ʒj. cum vino albo aut aqua capill. Ven. præbe, vel tantundem cinnamomi vel cassiæ. Aut hunc in modum pulverem conficias, iuxta Donat vel nostrum vtere, de quo dictum est prius: *ʒj. sin. accipitris ʒj. cinnamomi cassiæ ana gr. viij. croci gr. iij. misceantur, & cum paucis vino odorato albo, aqua capill. Ven. aut flor. citrang. exhibeantur.* Interim quoque myrrha aut castorei ʒss. ana ʒj. cum gran. quatuor cinnamomi p. op. habis. Sunt, qui trochis. & myrrha etiam ʒj. exhibent. Insuper & phaseolorum seu ciccerum, sub ac. fenegræc. decoct. cum oleo amygd. dul. Quod si parum cinnamomi, croci, aut cassiæ, seu alterius prædictorum permisceas, magis conferet. Excitare quoque hoc tempore sternutamenta conducit, modo non admodum imbecilli capitis parturientes sint. Suffitus etiam resinæ, aut cumini, aut pinus corticis, confert, Hippocr. auctore, lib. de morbis muliebribus. Verum speciatim unicuique causæ, quæ offerunt, nunc dicamus, facti initio, si mulier ipsa, vel vteri vitium, aut morbus in causâ fuerit, hoc exemplo prius interiecto.

OBSERVATIO LXXIV.

De muliere obesa in hyeme difficulter pariente,

Mulier obesa in asperissima hyeme difficulter pariebat: nec erat mirum, cum talis, eo quod esset obesa, vulvam quoque strictam magis habebat; tum in hyeme etiam naturaliter orificium matricis magis strictum habent, ut Erotis dicebat: nam propter frigiditatem temporis & aeris plus constringitur vterus. Ad hanc accitus, quo melius pareret, propter frigoris condensas, vterum & meatus angustiores reddens, obstetrici, cum astantibus imperavi, ut parturientem in cubiculo

calido ponerent, & pannos multos calidos simul circa vulvam applicarent, & eandem, quantum possibile esset, a frigore externo custodirent, & ut partes anteriores & posteriores inungerent, cum oleo sampuchino, & etiam liliaceo. Alii, ut Rhazes, inungunt oleo iefemino, ab umbilico infra; etiam artemisiâ cōtusâ emplastri modo ventri apponunt. Quia autem hæc erat valde crassa ac obesa, cuius causâ minus parere poterat, eandem in lecto ut ponerent, iussimus; nam & pronam, vultu in terram deiecto, dum in lecto est, eam figurari volunt. Illud enim & Haly & Avicenna iubent, quemadmodum & Valescus refert. *Simuliter, inquit, fuerit pinguis, iaceat supra ventrem, id est, supra genua sub ventre.* Ista positura (testo Valesco) lacerati ventris leuius & facilius stringuntur, & sic mulier facilius parit, si crassa, pinguis, & obesa existat: & ita pariunt quadrupedia. Iussi deinde, ut obstetrix oleo liliaceo, butyro, axungia anatis & gallinæ, os vteri liniret, simul propinans, cum non febricitaret, pulverem sequentem: *ʒj. Trochis. de mirra ʒj. cinnamomi ʒj. fiat pulvis.* Sumsit cum vino Rhenano, decoct. artemisiæ: & tandem præter spem, in cubiculo ab externo frigore tuta, feliciter peperit; & deinde bene purgata, & a secunda, una cum prole liberata, recte valet.

S C H O L I A.

Cum enim pro ratione causæ remedia sunt ad-mouenda, speciatim quod ad mulieres attinet, difficulter parientes, si ob aeris constitutionem præcedentem, vel ab immodico frigore vterum condensante ac coarctante; fiat pariendi difficultas, in aere mediocriter calido locanda erit, & in eo gestationem eam mouere convenit, modo febricit, aut aliud quippiam non impediat. Nonnulli etiam conuassationes validas, sternutamentisque ciendis idonea adhibuerunt, *Pauli & Aetii testibus*: quibus etiam opem adferre oportet, laxatione per infusos calidos, & suffusiones, ac per infusiones oleorum, tum actu, tum potentia calidorum; itemque per illinitiones, ac cataplasmata eiusdem generis. Quare de re infundere oportet largiter oleum dulce, & calidum; item decoctum fenegræc. aut maluarum, vel feminis lini; deinde & pubem etiam cum abdomine & lumbis eiusdem medicamenti illinire, aut alio relaxante medicamento, ut hydrelæo & aliis huiusmodi: eadem quoque laxamenta adhibenda sunt a balneis (*Valescus utitur balneo aquæ calidæ, cauendo frigus*) si non febris aut aliud quippiam prohibuerit, ex eorundem auctorum testimonio. Si vero ob calorem immodicum vires exsoluentem, pariendi difficultas excitetur, condensatibus ac maxime constringentibus, seu adstringentibus, & firmitatem inducentibus eam roborare oportet: qualia sunt infusiones & infusiones ex myrto, pampinis vitis, malis punicis, aut rosis: nec minus odora-menta fiant ex aqua ros. myrt. & nimp. cū aceto, addendo, si lubet, parum santal. & coral. rub. Cōuenit quoque vnguentum ex vino & oleo ros. frigidis, ut inquit Aetius: nec minus cibis & potionib.

Si ex immodico frigore fiat partus difficultas curatio.

Si ex immodico calore fiat curatio.

refocillanda erit facilis coctionis, multi nutrimentum, ac modica quantitas, permixtis semper quibusdam adstingentibus, ut cydoniis, malis puniceis ac reliquis huiusmodi: insuper buccellæ panis vino imbutæ, ad ascendendum animi deliquium, eisdem off. rantur, in aereque parum frigidiori degant. Si vero siccitate, vel aliqua re comprimente, partus retardauerit, oleum dulce calidum commode iniicitur cum decoct. fenug. aut maluæ, vel seminis lini, aut ouo coniecto, nam & plurimum recreat. Exinde ventri, pubi, lumbisque cataplasmata ex lini semine imponuntur, & hydrelæo; vaporationsque & balnea ex supradietis, modo febris absit & parturientem in lectica in conclavi, ut supra, ponemus. Timidis ac puellis mentis robur admonendum, quemadmodum eis, quæ inexpertes dolorum sunt, ut validissime spiritum comprimant, & ad inguina depellant. Inprimis enim metuentem adhortamur; sicuti inexpertam doloris increpamus: sed præcipue spiritum continere & ilia conflare, si quæ animi defectum pati inceperit: etiam, præter ea quæ diximus, odorem recreamus: & ad sensus reuocatam, exiguo cibo, sed præstanti, reficimus. Sicut timidæ sunt corroborandæ, ita & ira concitatiores compescendæ sunt. At si mulier ob virium imbecillitatem parere non possit, reparanda est imbecillitas illa ante tempus partus; aut si imbecillior facta fuerit propter morbum præcedentem, aut aliquam euacuationem, aut dissolutionem spirituum, aut propter aliam causam, alenda est euchymis & multum nutrientibus, ut vino, succo carnis, testiculis galli, & similibus. Si autem ea imbecillitas proveniat ob longam defatigationem in ipso partu, citra insignem sanguinis euacuationem, bonum erit dare potionem cordialem ex confectioe alchermes cum vino, vel cum iusculo; vel parare potionem ex aliis palueribus cordialibus, ut: *℞ diamb. vel diamosch ʒj. pul. diagalanga & diarod. abb. ana ʒss. vini albi ʒij. aqua betonica & meliss. bugloss. ana ʒij misce, fiat potus.* capiat ventriculo vacuo, & per duas horas nihil accipiat. Quouis modo igitur imbecillæ sint mulieres parturientes, ex morbo, temperamento, vel ætate proeunte, eisdem cibis boni nutrimenti ac potibus reficiendæ sunt, vino odorifero, bonis iusculis, adiectis cinnamomo & croco, sumendo tessellam vnam diamarg. calidi. lucundi odores, ac styrax calamitis, molchus naribus admoveatur; nec verendum, ut quidam sentiunt, matricem, quæ bonis odoribus delectatur, sursum reuocari, sicque partum impediri. Nam fœtus grauitas vterum deprimat, sursumque ascendere prohibet, atque interim bonis illis odoribus parturientis vires, & spiritus roborantur, valdeque iuuantur. Quod si ob lumborum cavitatem, aut propter nimiam pinguedinem, pariendi difficultas contigerit, eadem erit curatio quam in præcedente Obseru. diximus. Puerpera misella prona flexis genibus collocetur, seu in lectulo, ut vterus delabens cervicem rectam extendat, atque idem e directo ostioli habeatur; quod quidem ceratis, oleis, ac pinguedine delinire di-

gito oportet, & sensim aperire. Idem quoque vteri osculum, ubi clausum fuerit aut permanferit, pinguib. medicamentis emolliatur ac relaxetur. Hæc vltima causa, sicuti & sequentes, ad vteri vitia pertinet; de quibus & nunc etiam speciatim agamus. Si igitur contingat difficultas partus ex constrictione orificii matricis, cuius cura grauior est inter omnes, ideo tale subiungimus consilium Erotis seu Trotulæ. Prouideat sibi mulier in tribus vltimis mensibus in dieta, vtatur leuib. cibis & digestilibus, & per quos membra dilatentur, qualia sunt vitella ouorum, carnes & iura pullo- rum & miorum auium, perdicum, phasianorum, & piscium squamosorum cum bono condimento. Sed hæc subsequencia instante partu, adhibenda: balneum aquæ dulcis, in qua herbe emollientes bullierint, sed balneum aerium & stupham fugiat. A balneo exiens inungatur oleo seminis lini, axung. anseris, vel anatis, vel gallinæ, ab umbilico inferius. (Actius lib. 16. cap. 22. paucis verbis dicit: Si vteri ostium clausum persistat, pinguib. medicamentis emolliemus & relaxabimus. Et ita quoque Aegineta: Si ex adstrictione sit, laxatione prius opitulandum, infundendo largiter oleum dulce & calidum, & decoctum fenug. maluæ, & sem. lini, & aliis leniendis facultate præditis: infusus ex hydrelæo & aliis supradietis. Si vuluæ paruitas in causa fuerit, loca pingui quopiam etiam inungenda & fouenda erunt, osque vuluæ digitis dilatandum, ac fœtus violenter extrahendus: idemque si non successerit, dissecandus: quod præcipue facere oportet, si fœtus præmagnus fuerit, vel interierit. Sed de his postea. Si ob alia vitia vteri mulier parere non possit, inquit Actius, siue ob inflammationem, vlcus, cedema, duritiem, aut quippiam simile; infestantibus morbis occurremus. Si ob carnem collo vteri inatam, aut tunicam obstruentem, pariendi difficultas eueniat, sicut non perforatis mulieribus accidit; quodcunque impedimento fuerit, amputabimus. Et si morbus aliquis particulas vicinas obsederit, huic etiā prospiciemus: ut si ossa pubis nimium conferta fuerint, quoniam in partu dilatari non possunt, linimentis pinguib. oleosis ea relaxabimus: ita quoque si vesicæ calculus affuerit, cum primo propellere oportet: & si eadem lotio plena fuerit, idem educendum: similiter si intestinum rectum excrementis plenum fuerit vel repletum, clysteri, inquit Actius, abluemus, vel melius cum balanis, ut prius diximus, & vrinam retentam tubulo, iuxta eundem Actium, eliciemus. Vtile enim est parturientibus ut quouis modo lotium emittant: imo vtilissimum ut rectum intestinum vacuum sit omnibus recrementis; sic enim facilius parit, ut longa experientia vidimus, & exemplo antea ostendimus. Nunc de curatione dicamus, si ex parte fœtus fiat difficultas: quæ etiā ex parte liquet Obs. 70. præcedente De partu difficili ex magnitudine fœtus, & Obs. 71. ob innaturalem positionem fœtus: tum ex sequentibus exemplis hæc curatio multo clariore euadet.

OBSERVATIO LXXV.
De partu difficili ob geminos.

Maria

Si exsiccata
re, curatio.

Si timida,
quid facien-
dum.

Si mulier ob
virium im-
becillitatem
parere non
possit, cura-
tio.

Quomodo
difficultas
partus cu-
ratur, ex co-
nstrictione ori-
ficii matri-
cis.

Si vuluæ
paruitas in
causa sit,
quid facien-
dum.

Si ex aliis v-
teri vitiis.

Si ob partus
vicinas le-
sas vel im-
peditas.

Maria Petri Sasboti diuitis illius Zythepse Delphensis filia, quæ in ædibus paternis habitabat in Mundi inter signio, ex duobus gemellis masculis in partu difficili periclitabatur. Cum itaque anno 1566. 25. Octob parere nō posset, nec obstetrix, etiam fotu adhibito ex floribus chamameli, artemis. & polygonii, quid proficeret, cum pregnantem in eo balneo pedibus ad femora vsq, imposuisset, maxima angustia parturiens correpta fuit; ita vt enixus partus qui prius aderant, omnino cessarent. Ad quam ego vna cum Ericio collega meo primum 18. die Octobris acciti fuimus, & vna hæc subsequencia præscripsimus: *℞. pulegiæ, calamenthe, hyssopi ana m. ss. caput vnum radicis liliorum albor. myrthæ ꝓ ij. puluerisatæ adde terrebintina & mellis q. s. fiant duo pessi sindone serico obuoluti. ℞. olei lilior. albor. lini, amygd. dulc. ana ꝓ j. olei irini, sabini ana ꝓ ss. misce; ac pessi illis oleis, tum vulua intus inungatur: ℞. cinnam. electi ꝓ ij. ss. nucleor. dadyl. num. ij. castæ lignee, doronici Romani ana ꝓ j. sabina m. j. fiat puluis pro ij. dosibus.* Dedimus cum vino maluatico, cum nulla adesset febris 29. octobris: *℞. cinnamomi selecti ꝓ j. doronici Romani, galanæ, calami arom. ana ꝓ ss. sabina ꝓ j. pul. perlarum subtiliss. tritarum (quia debilis) vnicornu ana ꝓ ss. rasuram nuclei dadyl. fiat puluis pro tribus dosibus;* & cum vino maluatico propinabatur. 30. Die Octob. cum partus instaret, obstetrix Heyla nomine, alioqui in obstetricandi arte perita, paratam penes se habebat expressionem foliorum lauri, gallitrici, nepitæ, cum vino Rhenano, quam propinare decreuerat. At nos, ne caput tentaret, folia lauri amouenda esse diximus, cum herba capitalis esset & eius loco (*ne gloriosa obstetrici curatio adscriberetur*) pulegium viride accepimus, atque illud expressum cum reliquis supradictis, exceptis foliis lauri, propinavimus, & post assumptum hoc medicamentum, hora secunda, eodem die peperit masculum viuum. Interea obstetrici ac assistantibus mulierculis mandaueramus, si ob partus angustiam, qui tot diebus enixu lassauerat, in lipothymiam incidetet, aut syncopen, vel in fluxum nimium, aut morbum vterinum, quo alias laborare consueuerat, a me tamen antea curata, vt ex syrupis, qui tunc ad manum erant, cochlear vnum lumeret: *℞. syr. ex ros. sic. ꝓ ij. syr. absinth. ꝓ j. perlarum exquisitarum subtilissim. tritarum ꝓ j. misce.* Sed quia syncope illam non apprehendebat, ideo propinatum non fuit. Postea cum secundum fœtum parere non posset, neque a se excutere, fluxu quoque iam apparente, inhibuimus tunc, ne ex puluere suprascripto, cum vino maluatico amplius lumeret. Deinde quia certis signis fœtum mortuum esse coniciebamus, qui etiam inuersus & cum brachio male locatus erat, cum vt obstetrix dextre reponeret præcepimus. Interim dum rursus conamina seu enixus partus intenderentur, refocillatis viribus optimis cibis, & iusculis, adiecto cinnamomi puluere. (nam omnibus modis ad partum facilitandum confert) primo die Nouemb. mane hora quarta, secundum masculum peperit, sed mortuum, cum brachio & collo

linido; obstetrice tamen affirmante, paulo antequam pareret, partum vixisse, & in ipso vehementi enixu exspirasse: Ceterum cum deinde puerpera ipsa post duos partus laboriosos maximo dolore afficeretur, qui plerumque puerperas subsequi solent, exhibuimus ceruiciam, in qua flores chamameli decocti erant. Hoc enim, licet simplici remedio, tãquam tamen arcano, etiam Alcmariæ, antequam Delphos venirem, vti solebam; & etiam nunc semper cum maximo successu. Proinde eo decocto sumto, doloribus paulatim cessantibus, optime deinde fuit purgata in puerperio, & bellissime se habuit. Quanquam hæc ipsa post duas septimanas in puerperio incidit in abscessum in axillæ, & dentium dolorem haud exiguum. At cum perciperemus, exterius in maxilla duritiem quandam esse, accepimus diachyli cum gummis ꝓ ss. supra coria rotunda quatuor eiusdem formæ, paulo ampliora daleto, inducentes: quorum continua impositione, vnus post alterum, raptus est abscessus paulo supra mentum; & facta mundificatione & cōsolidatione per chirurgum, sine manifesta cicatrice, recte fuit curata. Forte hunc abscessum contraxerat ex frigore externo cum octo diebus in difficili partu fuisset, antequam vltimus seu secundus partus prodiret. At cum hæc scriberem, mense Decemb. anno 1589. belle habebat; & etiam anno 1595. quo rursus Alcmariam a magistratu Alcmariano reuocatus eram.

SCHOLIA.

QUæ vero non vterum gerentis vitio, sed ipsius fœtus, difficultatis parienti carissæ sunt, hoc modo corrigendæ erunt. Si gemini fœtus fuerint, aut terni, aut plures, ac collum vteri obsederint, reliqui ad fundum vteri repellantur, & is, qui magis paratus videbitur, prius educatur: sentim autem & citra contusionem omnia fiant, oleo locis perundis, vt idem Paulus refert. Et sic ex Moschione: Vbi duo, tres, quatuor pluresue simul se ad orificium contulerint, in sinum vuluæ omnes sunt repellendi, & sic sigillatim recipiendi. Et ita si propter ipsius fœtus figuram præter naturam, partus difficultas adsit, ad naturalem situm reducendus est, quantum eius fieri potest, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, & partim in rectum agendo, vt inquit Paulus. Et si manum vel pedem præmiserit, ne atrahatur per membrum, nam magis impingitur, aut luxatur, aut etiam abrumpitur; verum digitis humero fœtus, vel coxæ affixis, rursus in conuenientem locum introducatur; id, quod iam præmissum est. Oportet autem obstetricem primo vnguibus incisis oleo illinitis, & digitis in vnum conductis, schemata mala infantis corrigere. Vbi enim valde infixus est, prius eum a loco inopportuno euellere oportet. Si recte positus sit, & ad manum perueniat, teneat eam, & sic educat. Sin in diuexum aut obliquum iacet, iuxta Moschionem, immissa manu obstetrix eum componat; & si in caput proximum inuenit, ipsum teneat & abducatur. Si infans caput interius habuerit, & si duas manus eicit, oportet obstetricem prius immissa manu sua, caput ad orificium

4
Si ex parte facis fiat, curatio

Si duo vel plures, quid agendum.

Si in diuexum aut obliquum iacet, quid faciendum.
Si ardua manus fuerit veniant,

corrigere, & comprehensis manibus infantis, conari, ne caput eius orificium vulvæ obturet, ut facillime omne corpus infantis exire possit, quo priores manus exierant. Quoties videlicet manus emittat, non abducatur, relicto capite intus orificium matricis obturante; sed potius digitis in humerum infixis, retrorsum agat, & in capacitate vulvæ positum ita componat, ut manus eius erectas lateribus inungat, & apprehenso capite foras conari incipiat, ne vitiosus aut manu exarticulata prodeat. Si in pedes descendat: *ut antea dictum est, age.* Si ambos eiecerit, duabus manibus suis obstetrix in inguinibus infixis sursum repellat, & compositum foras eliciat. Si vnum pedem, corrigatur; & si fieri potest, manibus eius lateribus inungat, & apprehensis pedibus foras adducere conentur. Si diuisis pedibus duabus partibus vulvæ plantas infigat, immissa manu obstetrix eos iungat ad orificia matricis, eosque componat, & sic educat. Si in genua exeat, retrorsum pellendus est, & correctis manibus, forte & pedibus, adducendus. Si in nates, retro infansem impellat, vel repellat, & correptis manibus vel pedibus educat. Si grande caput habeat, ut exire non possit, intrinsecus repellendus est, & vntionibus vincto orificio, immissa manu obstetrix eum adducat, tenens caput eius, adiuvante etiam conatu suo parturiente. Si caput contortum habuerit, immissa manu id corrigat, & humeris comprehensum leniter adducat, ne matrix ipsa quassetur. Si duplicatus; quod duobus modis fit, quoties nates in orificio inveniuntur, & in interiori parte fiet duplicatio, secundo modo, quando caput & plantæ in orificio fuerint, in superiori parte; potest obstetrix ita corrigere, ut plantis reuocatis sursum, caput hic teneat, & sic infansem foras adducat. Si in diuexum iaceat, aut supinus, vel in dentes, præcipimus, ut in vulva displicitus & apprehenso capite adducatur. Enimvero obstetrix leniter immixtis digitis in latus eum conuertat, & accepto spatio, ut vel vnam manum immittere possit, eum facillime ad integrum schema componat; & quascunque partes orificio propiores habuerit, easdem teneat, & sic adducat; ita tamen, ut maxime caput infantis quærat, & ipsum teneat, & sic adducat. Hæc autem omnia leniter ab obstetrice, & sine quassatione, facienda sunt; ita ut frequenter oleum calidum, vel succum scænuigræci, lini, & malvæ decoctum infundat. Hac enim diligentia & lapsus infantibus præparat, ut sani evadere possint, & quæ parit, sine vexatione, & sine quassatione servatur. Plures enim infantes, post difficilimum partum evasisse, cognovimus, & vivere vidimus. Si latitudinaliter exeat, pendente vna ex manibus eius, retrudatur manus: si autem non potest reduci manus, fac mulierem iam leuatam ambulare: si id non posset, iaceat supra lectum, & concure cruræ eius; & deinde adhibe linimenta ex mucilaginibus: & si accedant dolores partus, sedeat in sella, & compone fœtum secundum figuram naturalem, adhibita sternutatione, & comprimat se, donec egre-

diatur. Plura de his vide in libris Harmoniæ Gynæciorum, & præcipue librum 4. Jacobi Ruef, cum figuris schematum innaturalium partuum. At si vna cum fœtus figura mala, os vteri compressum, seu coarctatum fuerit, prius ab osculo vteri in sublime eleuetur fœtus, & postea rursus ad osculum recta dirigatur, fiantque omnia placide, leniter; ac citra compressionem, oleo assidue locis affuso: hoc etenim ex salute tum fœtus, tum parientis fuerit, & vterus ita quoque illæsus manet. Vbi vero infans præmagnus fuerit, aut totus, aut ob capitis, seu thoracis, aut ventris magnitudinem, ea adhibenda sunt, tum intus, tum extra, quæ laxare ac dilatare vteri os possunt. *Huius exemplum posuimus Obser. 70. præcedent.* Ita & anno 1561. mens. Decemb. ad mulierem obesam quoque accitus, cum duobus diebus in partu difficili fuisset, ob magnitudinem fœtus, & variis, diuersisque remediis obstetricis tum muliercularum vsa fuisset, sed aluo duriore existente, unde vterus magis compressibatur, glandem immitti iussi, & statim ubi aluum deposuisset, atque vterus per linimenta & olea emollientia relaxatus esset, & pulverem hunc sequentem parturienti dedissem, mox feliciter peperit. Hoc modo a me componitur, & in vsu habetur: *℞. rad. dictamni albi vulgar. ʒ. vj. ligni aloes, lapid. dactyl. misc. & fiat pul. datur ʒ. j. cum vino.* Est quoque in vsu apud nos pul. partur. ex sola rad. dictamni albi, si cum aqua raphani dentur ʒ. ij. non enim solum vermes, sed fœtum mortuum expellit: etiam in aqua sabina, ut experti sumus in difficili partu, etiam ad mortuum fœtum expellendum, & secundinam propulsandam. Sumserat & hæc pul. dominarum ʒ. ss. cum decoct. artemisiæ, flor. chamamel. sabina ʒ. ij. & syr. de artemis. Ita in officina paratus habebatur: *℞. cinnam. ʒ. ss. zinzib. galanga, curcuma, baccarum lauri ana ʒ. ij. caryophyll. nucis moschata ana ʒ. j. B. croci ʒ. j. cumini prepar. ʒ. j. B. macis ʒ. j. semin. iuniperi ʒ. ss. sem. zedoar. ʒ. j. sacch. ʒ. vj. fiat pulvis, & immissa glande, & irritatione eiusdem, epoto pulvere partus, clamabat, quod lectum confœdaret, & aluo soluta, mulieribus prius inunctis, enixa est, ut dixi, fœtum præmagnum. At si fœtus magnus eo, quo iam diximus nondum procedat modo, aut etiam infans mortuus fuerit, modo spes sit salutis, omnino necessarium est, fœtum secare, ex communi sententia tum Aetii, tum Pauli, ut postea discemus. At si propter fœtus imbecillitatem, aut paruitatem, difficultas pariendi contingat, præter id, quod mulieres sunt hortandæ, ut strenue mediis abdominis musculis eundem fœtum conentur expellere, vinum maluatium dandum (*si nempe minus pueri ob imbecillitatem vix sentiatur*) modo non adsit febris; alioqui iuscula ad refocillandum fœtum conueniunt. Si vero ex parte membranarum contingat pariendi difficultas, ubi secunda solidior ac crassior fuerit, quam ut rumpi possit, discindatur, inquit Aetius. Tamen secundum alios, obstetrix prius tentabit, num vnguibus leniter discerpere & rumpere possit. Verum si propter tunicarum tenuita-*

Si vna cum
tus figura
la, os vteri
pressu est, qui
fit faciendum

Si infans nimis
magnus, qui
agendum.

Historia diffi-
li partus an
magnitudine
fuit.

8

Si fœtus sit im-
becillus, quid
gandum.

Ex parte mem-
branarum si fiat
difficilis partus,
curatio.

Si ambobus pedes
vel unum reie-
citur, vel diuisi
sunt.

In genua.

In nates.

Si caput grande
vel contortum.

Si duplicatus.

6

Si in diuexum
iaceat, aut su-
pinus.

Exitus fœtus
latitudinaliter,
pendente vna ex
manibus eius.

renitatem, in quibus humor continetur, difficilis fiat partus, propterea, quod humor in membranis contentus ante debitum tempus effluerit, ita ut vteri sint resiccati; eis albumina ouorum cum malua aut scenug decocto excolato, aut cum pitisanæ cremore tepido infundantur, decreto eiusdem Aetii; cuius exemplum quoque posuimus Obseruat. 71. præcedente huius libri. Memini, sororum meam mihi aliquando narrasse, quod Catharina Iacobi, vxor Florentii Teylingii, sororii mei, propter membranam nimis tenuem statim perruptam effuso humore, plerumque per sex pluresve dies in difficili partu permanserit, non sine vitæ periculo, obstetrice imperita, nec Medicum vocante. Ita enim obstetrices quædam sunt nimis sciolæ & obstinatæ, attamen plane indoctæ, ut nec legere nec scribere norint; quales & nos, pro dolor, aliquando nouimus; & præter quod ipsæmet non sciunt adhibere remedia ad partus difficiles ob varias causas, ne Medicum quidem doctum admittunt, ut eas doceat, ac imperet quid factu opus sit.

OBSERVATIO LXXVI.

De quibusdam mulieribus, quæ ob mortuos infantes ex difficili partu laborant.

ANNO 1552. 17. die Martii, mulier Alcmariana nobis vicina, cum gemellos mortuos in ventre haberet, & quinque diebus aut pluribus in partu periclitaretur, nec, ut fieri assolet, obstetricum omnibus suis remediis tentatis ab utero depellere posset; tunc me prius vocauit, cum mulier parturiens animam ageret, humore multis diebus iam effuso, totus venter frugebat, eratque interstitium in ventre, ut facile ibi gemellos mortuos adesse censeremus; quos & ante tres quatuorve dies mortuos esse obstetrix referebat. Ego vero tardius vocatus, iussi tamen ventri ut adhiberet linimenta ex oleis relaxantibus calide, tum fomenta; similiter, ut decoct. de semine lini, scenug. malua, vna cum mucilaginibus & oleo liliaceo vterum intus humectaret; ac eiusmodi perfusionibus relaxantibus, aperientibus, & humectantibus, & moderate calfacientibus, etiam cataplasmatibus similibus ventri impositis vteretur, præcepi, dedi per os decoctum artemisiæ, sabinæ, cum aqua liliorum, deinde accepi sabinam viridem adiecto pauco croco contusam, eamque linteolo obuolutam pessi instar, & oleo liliaceo immersam, iussi, ut in vuluam poneret, & ibidem aliquantulum hæreret. A quibus medicamentis vix per quartam partem horæ mulier foetum mortuum reiecit; & deinde post horas quatuordecim, alterum etiam mortuum cum maxima difficultate & labore peperit. Erantque ambo gemelli non solum mortui, sed plumbei atque corrupti, & valde foetidi, ut vidimus. Sed misera paupercula multis diebus præcedentibus, sed frustra, defatigata, quamuis statim ut accessimus, (sed pro dolor tardius) ad vires refocillandas, iusculis tum aliis resumptiuis vteremur, cum vires tamen neque post partum villo modo reparari possent, paulo post

obiit; nimis nasuta existente obstetrice, quæ Medicum non vocauerat oportune, ita ut multæ parturientes, pro dolor, earum negligentia perderentur. Etiam altera rustica mulier, anno 1559. ad Mosam pagum per quinque dies etiam partu difficili laborabat, ex foetu non solum mortuo, sed eodem male posito, quæ erat vxor rustici illius Petri cognomento Diuitis. Ad hanc quoque vocatus, obstetrici in primis mandavi, ut ad naturalem situm, quantum possibile esset, foetum deduceret, partim flectendo leniter, partim pellendo sine vehementia; & partim in rectum ducendo. Vbi igitur dixit, recte caput ad ostium vteri lapsum esse, & nunc partum expectare, hanc potionem propinaui: *℞ decoct. sabinæ, verbena, artemisia in vino Rhenensi ℥ ij. aquæ liliorum aiborum ℥ j. pulueris dominarum ℥ j. syrup. artemisia ℥ ss. misce, sumsit unica vice.* Interim nostro iussu ventrem inferiorem inungebat obstetrix oleo amygd. dulc. sesam. cheyrino, liliorum buryr. recenti, & pinguedine gallina, simal commixtis, & digitis inunctis oleo amygd. dulc. & oleo liliaceo, ut commodius arte obstetricandi videretur, & infantem mortuum susciperet. Post duas horas, cum pro deplorata parturiens haberetur, ab assumpta potione, magno cum meo honore, a foetu mortuo liberata est, cum animam agere videretur. At hic, pro dolor, ex crassa ipsius obstetricis rusticæ imperitia, cum violenter partum ederet ægra, anus & vulua vi foetus magni ac mortui perrupta sunt, ita ut vnum foramen factum sit. Solet id enim aliquando in difficili partu, & valde violento, & in foetu mortuo, eoque magno existente, fieri, cum vehementi & magno enixu partum reiciunt. Quod equidem sæpe ob imperitiam obstetricem euenit; uti in hac parturiente rustica primipara contigit, quamuis duæ adessent obstetrices, sed rusticæ & parum in arte obstetricandi peritæ. Hac etiam de causa, ne illud amplius fieret, & ut hoc periculum euitetur, consulo semper antequam foetus reiciatur, aut nixus contingat, ut pannum lineum molliusculum, instar pilæ oblongum & contortum paratum habeant, & ut in anum ponant, mando: idque ob hanc causam, ut in quolibet conatu infantem eiciendi, firmiter obstetrix eundem pannum in anum imprimat, ne eiusmodi continuitatis solutio fiat. Estque hoc consilium Erotidis seu Trotulæ, lib. De pass. mulier. capite 10. De iis, quæ post partum accidunt. At bona fortuna hæc rustica nacta medicastrâ & chiturgi viduam, quam nos monuimus, quid agere deberet (nam obstetrices negligentes, quanquam post lotionem a sordibus & pure puerperam repurgassent, per aliquot dies illud inconueniens, seu graue symptoma subiecerunt) filo serico partes solutas vniendo, ut moris est fuit tandem probe curata. At anno 1566. mense Decembri feliciori successu Elisabetha Henrici, Iacobi ceruisiarii vxor, in cuius cupis gallus pro insigni erat, filiam cum peperisset, & secundam prolem parere non posset, his infrascriptis per me, nutu Dei, aliam femellam priorē multo maiorem, nempe secundam peperit:

4 *℞. cinnamomi puluerisati* *℥ ij. cassia lignea, doronici Romani ana* *℥ ss. nucleum vnum dactylorum, sabina* *℥ j. perlarum finissimarum* *℥ ss. fiat puluis*, partiatur in duas partes; detur cum vino maluatico: *℞. olei amygdal. dulc. liliorum, sesamini, butyri recentis, ping. gallinae, anatis ana* *℥ ss. misce*, inungatur venter inferior: *℞. manus Christi cum perlis* *℥ j. ss. detur cum panata ceruissaria, pro debilitate*. Sumto puluere, & prius vna dosi, & hora post altera, post horas quinque peperit secundum foetum, nempe foemellam. Verum vxor Cornelii Iacobi pictoris in octauo mense, anno 1571. coemiterium transiens prolapsa, post casum domum reuersa, foetum non sentiebat. Ast 14. die prius post casum subsequuta sunt partus conamina, & ingens mensium fluxus; vnde obstetrix accita fuit, vt a partu, qui etiam credebatur mortuus esse, liberari posset: sed adeo debilis erat, vt ex nimio illo fluxu lipohymian incurreret, & quasi syncopen. Tunc prius sub noctem ad eam vocatus sum 22. die Februarii. Sumserat autem eodem tempore panatam ceruissariam, cum nuce moschata, ex obstetricis, tum astantium consilio; & valde angebatur, etiam deliquio animi subsequente, ob fluxum, enixu partus cessante. Ob deliquium animi dedi sequens: *℞. syr. de limonibus* *℥ ij. perlarum subtilissime tritarum* *℥ ss. misce, statim euomit*. Post vomitum paululum recreata, hunc puluerem sequentem, vt vna hora post alteram exhiberent, mandauit: & deinde peperit foetum mortuum, cuius brachium etiam ruptum erat, ex casu praecedente: alioqui erat foetus optime formatus, sed octimestris; qui partus viuere non solent: *℞. rasura dactylore nucleor.* *℥ ss. sem. viol.* *℥ j. cinnamomi* *℥ j. perlarum gr. v. fiat puluis subtilissimus*; diuidatur in duas partes. Accepit cum vino maluatico interim digitis obstetricis, tum ventre inunctis oleis sequentibus. Et puluere exhibito paulo ante 10. horam noctis, & deinde hora 11. altera dosi sumta, & circa 12. horam noctis peperit foetum mortuum, sed ipsa salua euasit, quamuis ab omnibus pro deplorata habita. Anno 1576. 13. Augusti, paupercula cum per octo dies in difficili partu haesisset, & foetum mortuum haberet, neque parere posset, & obstetrix de vita parturientis desperaret, his sequentibus etiam a partu mortuo, Dei iuramento, liberata, peperit foetum mortuum, & sana euasit; quae adhuc viuit nunc vidua, vti & altera praecedens etiam nunc vidua, mense Decemb. anno 1589. cum haec rescriberem: *℞. olei sesamini, lilior. cheyrini ana* *℥ ss. Venter inferior sub vmbilico ad inguina vsque iis inungantur*: *℞. radic. dictamni albi* *℥ ij. ss. sem. viol.* *℥ j. sabin.* *℥ ss. cinnamom. electi* *℥ ij. rasura dactylor. gr. v. pulueriscentur subtilissime, & diuidatur in duas partes, vna dosi sumta, & deinde altera*, post duas horas foetum mortuum corruptum reiecit. Alia quoque mulier ex infima plebe, Delphis in vico fecis ceruissariae dictae, anno 1591. 22. die Aprilis, cum in difficili partu esset, foetu etiam per 4. dies mortuo, duabus praesentibus obstetricibus, manu extra vterum propendente, nullo nixu adiuta, viribus destitutis, pro deplora-

ta cum haberetur, his sequentibus remediis per me descriptis, foetum mortuum reiecit: *℞. sabina viridis* *℥ ij. artemisia p. ss. ebulliant semel in aqua artemisia, & lilior. vnica vice*; & huius expressionis accipe *℥ ij. ss. pul. sem. viol. radic. dictamni albi, cinnamomi ana* *℥ ss. misce*. *℞. butyri recentis, olei liliorum ana* *℥ j. ss. pingued. gallinae, anseris, caponis ana* *℥ ss. misce*. Per totum ventrem ab vmbilico vsq; ad pubem & inguina inungatur. Ad vires debiles capiebat zaccharum perlatum cum ceruissia. Et, Deo adiuuante, praeter omnium spem reiecit foetum mortuum: deinde bene purgata recte habuit, & conualuit.

S C H O L I A.

7 **F**oetus autem viuus suo motu nisi que partum & adiuuat & accelerat. At mortuus protus cessat a motu: adest ventris frigiditas, vt antea diximus, & dolor iuxta vmbilicum grauis, spiritus exhalat foetidus, faciei que parturientis color praeuus est. Et quia non se mouet, multo difficilius prodit, quum viuus: ideo & fortiora adhibenda saepe praesidia. Inter simplicia betonica *℥ j. bibitur* in vini cyathis tribus: & partus mortuos extrahunt radices panacis appositae. Et dictamno vis est, partus emortuos vel transuersos eicere, nec potu tantum, sed & illitu & suffitu valet. Ex Harmonia Gynaeciorum part. priore, cap. 6. de pessariis foetum mortuum expellentibus: Latridis *℥ ss. cum succo porri conteres, & facies pessarium duorum digitorum & subiicies: cito educit*. Citri folia coques in aqua, & bene inde fomenta vuluam intus, & partum educet, etiam si mortuus sit. Vide Bonatiolum muliebrium lib. 1. Suffitu vngulae asininæ, vt abortus euocetur: nec aliter adhibetur, quoniam viuentem foetum seu partum ocysime internecat, cum mortuum educat. Alii addunt hunc pessum, ad foetum mortuum educendum. *Aristolochia rotunda, myrrha, ellebori ana* *℥ ss. excipantur succo pulegii, linteis deinde raro inuoluantur, finganturq; pessus, qui in vterum demittatur*. Suffitus praeterea ex fimo equi, aut asini, aut ex vngula eorundem. Alii vtuntur *trachiscis ex gummi. inde sumigia parantes: vel ex truncis caulium, myrrha, & felle tauri, pessos conficientes, vel ex myrrha, elleboro nigro, opoponaca, felle tauri, p. e.* Et si istis non pellatur, ad sectionem veniunt: de qua postea. Nunc historiam adducamus, quomodo mulier quaedam foetum corruptum paulatim excreuerit, quae & hoc tempore adhuc viuit, nempe anno 1593.

OBSERVATIO LXXVII.

De muliere foetum corruptum paulatim exonerante.

8 **M**ULIER praegrans, quae extra fossam aqueam habitabat, cum ad 15. septimanas grauida fuisset, ab eo tempore menses non fluxerunt. Sed cum ex onere subleuato dolorem in ventre sentiret, aperti sunt menses, anno 1564. circa Natiuitatem Domini. Cum autem hyems asperrima esset, mensesque fluere, gelu quoque intensum, ita, vt tutum non esset, ambulare per plateas glacie concretas, non sine metu cadendi, haec

hæc tamen eo tempore in forum prodiit: sed curru occurrente, prolapsa in terram, & rota currus circumacta, sese eleuare subito non potuit, atque femur fractum fuit: quin ipsa referebat (*ac alii quoque, qui idem viderant*) rotam ipsam currus molitoris (*qui graue pondus, & sarcinas frumenti vel farina multas sustinet*) pectus ventremque ipsum transiisse. Ceterum hæc ipsa per chirurgum a fractura femoris curata fuit: sed menstruæ purgationes ab eo tempore paulatim stillabant: non tamen copiose, ventre tumido permanente, etiam mammillis magis accrescentibus, & in maiorem molem eleuatis, ac extruberantibus. Postea quoque a fractura femoris probe curata denuo incebat. Verum cum curru in Hagam comitis circa 26. Februarii diem, anno 1565. veheretur, domum rediens, ex concussione currus maxime in ventre dolere cœpit, & 27. Februar. die, menses aperti admodum copiose fluxerunt. Deinde cum mammillæ duræ essent, & quasi sanguis ab iis distillaret, nouitate rei obstetrix, quæ aderat, commota, me in consilium adhibuit. Postea etiam lac e mammillis fluebat. Ego vero iudicabam, fœtus corruptelam adesse, vel quod in insaniam verteretur; vt postea latius in scholio. Ceterum cum omnia mihi referrentur, quæ antea mulier passa esset, femur fuisse ruptum, deinde curatum, & currum per ventrem transiisse, cum grauida foret; ego fœtum corruptum adesse iudicabam, obstetrix vero molam carneam esse existimabat, ventre ipsius grauidæ duro permanente. Sentiebat quidem modo in hoc, modo in aliud latus, cum sese volueret aut moueret. Eo autem tempore, quo vocatus eram, lecto incumbibat, & facies ei alba & exsanguis erat, mammillæ durissimæ, & valde dolebant, vt obstetrix abscissum, quasi in iisdem exspectaret. 28. Februarii ad eam accitus, vt ventrem durum obstetrix inungeret sequenti linimento, iussi: *℞. pingued. gallin. anatis, porcin. mucilag. fenugrac. alihæ extract. cum aqua malua & lilior. olei liliorum, butyri recentis ana ℥ β. olei sabinae ℥ iij. misce.* Mammæ inungebat oleo amygdalarum dulcium; & potum sequentem sumsi: *℞. syr. artemisia ℥ ij. aqua artemisia ℥ iij. aqua lilior. albor. ℥ ij. pulueris parturientium ℥ iij. pul. dominarum ℥ j. pulu. sabinae ℥ β. diuidatur in duas partes.* Vna ebibita mane, & cum post meridiem redirem, mensibus fluentibus, incepit particulas carneas ipsius fœtus corrupti excernere paulatim, tum ossa quasi cartilaginea & mucosa, vt non compacta, & vix ossa apparerent, quæ obstetrix reseruauerat, & nobis ostendit. Mammillæ ex inunctione iam dicta molliores euadebant, postquā fœtum ita corruptum paulatim excerneret. Hora quarta pomeridiana (quanquam ægre admittebat) reliquum potionis cum altera parte pulueris propinaui. Nocte valde angebatur (non tamen febricitabar; quod mirum est in fœtus corruptela) & euomit sanguinem per superiora, vt idem etiam per os & nares exiret. At a vomitu multo melius habuit, & alleuiata est ab illo tempore, & sanguis ex mammillis amplius non exibat, omnis-

que durities mammillarum cessauit, quamuis effluerit per aliquot dies lac corruptum ex mammillis: deinde paulatim, præter multa putida sanguinolenta & saniosa, particula fœtus seu embryonis, ex vtero emanabant, vt deinde viribus refo-cillatis, tandem curata fuerit.

S C H O L I A.

Alexander Benedictus Veronensis, Medicus ⁵ doctus, refert lib. 25. cap. 33. historiam quoque ^{Historia Alex- xadri Veronensis Medici, de fœtu mortuo, & paulatim reie-} mirabilem, de Veneta matrona, cui, cum partum legitimum exclusisset, alter inter vterum māt sit mortuus; qui in magnis puerperæ difficultatib. ^{Re.} tabefactus, fluore quodam profluit, ex naturalibus oris: demum ortis in ventre tribus fistulis, ex vna, quæ omnium maxima erat, integra infantis caluaria extracta est, cunctis mirantibus; deinde singulis diebus, reliqua ossa demta sunt; vnde mirabili opere naturæ sanitati restituta est. At in nostra muliere, licet corruptela fœtus adesset, tamen cum viderent, lac in mammillis existere, non solum grauidam eam esse arbitrabantur, sed fœtum adhuc viuere, quod motum antea sensisset, priusquam ex eleuatione ponderis menses aperti fuere, quanquam postea & curru ventrem eiusdem transiisset, etiam femore rupto, deinde sanato. Solent enim quædam in tertio, aliæ in quarto mense fœtus motum sentire; imo nonnullæ volunt, (*quod tamen puto admodum rarum esse*) in septem septimanis, vel duobus mensibus, fœtum posse sentiri. Attamen, teste Hippocrate lib. De pueri natura, (vt antea quoque diximus) plurimæ mulieres paulo ante trigessimum diem perdiderunt informem: sed quæ post trigessimum diem perdiderunt, conformatus iam comparuit. At de motu fœtus prius dictum est, vt non opus sit, ea repetere. Quod lac habebat prius grauida, eoque effluente, cum fœtus corruptus esset, minus mirum; cum & in mola sæpe sint visæ mulieres lac habere; quod & a multis obstetricibus & mulierculis obseruatum intelligo. Quamuis plerique auctores dicunt, mammillas quidem intumescere & indurescere, vt fit in prægnantibus, tamen de lacte mentionem non faciunt. Noui medicum, qui eius erat sententiæ, iuxta Auicennam, & molam posse fieri, non solum ex semine viri corrupto, sed & mulieris, & quibus menstrua deficiunt; etiam lac generari posse in virginibus; quas & mola laborare fieri posse, contendebat. De lacte vero in virginibus, Hugo medicus, cum inter nos hæc quæstior oborta esset, semel se lac in virgine vidisse, affirmabat. Et Erius collega meus se ter hoc ipsum vidisse referebat, iuxta illum aphorism. Si ^{Aph. 39. lib. 9.} mulier, quæ neque grauida est, neque peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt. Sed ibi loquitur Hippocr. de mulieribus, & non virginibus. Mola tamen, vt dictum est prius, *iuxta Galenum 14. De usu partium*, non fit sine viris. Quod mulieribus vero sanguis per mammas effluere possit, id quidem certum est ex Hippocrate. Quibuscunque ^{Aph. 40. lib. 9.} mulieribus sanguis ad mammas colligitur, furorem significat: quanquam Galenus in commento eiusdem scribat, hoc se nunquam vidisse. Be-

7 nediſtus Fauentinus præceptor meus, ſuper hunc aphoriſmum ſcribens, ſic ait: Ego, per Iouem, in temporibus ſexaginta annorum practicæ meæ iam peractorum, pluries me vidiffe, fateor, & talis deſipientiæ optimam moliri curam, teſtimonium perhibeo, quoniam verum eſt; & tanto id verius cenſeo, quanto quod ab Hippocrate, antiquæ medicinæ Magiſtro, ſæpius relatum eſt. Amatus quoque *Centur. 2. curation. 21.* affirmat, vidiffe ſe ſanguinem per mammarum papillas effluere in duabus nobilibus, altera Luſitana, altera Italia, quarum nulla in inſaniam aut ſurorem deuenit; ſed potius ſanguine ex ſaphena miſſo, ilico reſtitutæ ſunt. Hæc etiam Antonius Muſa Braſſanola vidit, in muliere gemellos nutriente, qui ita exlugerent, vt ſanguinem in lac conuerſi non ſinerent; ſicuti in coitu nimio, cum ſanguis in ſemen conuerſi non poteſt. Ita hic, ſed in corruptela fœtus, primo ſanguis ex papillis emanabat, poſtea & lac: quale etiam antea dictum eſt, ſignum eſſe, ſi vltro effluat in grauidis, quod fœtus ſit imbecillis. Hic vero non tantum imbecillis, ſed mortuus erat & corruptus. Mulier hæc, *de qua nunc agimus*, agebat annum vigefimum; at curata poſtea alios infantes ſanos peperit. Quo exemplo admonentur grauidæ, ne pondus eleuent graue, & vt ſe cuſtodiant a caſu.

OBSERVATIO LXXVIII.

De Muliere ex partu mortuo ſimul occumbente, & de altera viuâ permanente.

1 R Vſtici vxor, ex infima plebe, prope flumen Sciam dictum habitans, cum quatuor diebus ex partu mortuo difficile pareret, & brachium propenderet, quod obſtetriz libenter abſcidiffet; exhibito noſtro puluere parturientis, peperit quidem fœtum mortuum iam corruptum; aſt viribus antea ex longo partu exhaustis, etiam ipſa exſpirauit. Verum cum ruſticus poſtea alteram duxiffet vxorem, ipſa quoque nono menſe duos gemellos mortuos, ſumto puluere parturientium ad 3 j. cum aquæ lilio. 3 j. & vini Rhenenſis optimi 3 j. partibusq; vteri relaxatis cum vng. emollientibus & relaxantibus, reiecit, in vita permanens.

S C H O L I A.

2 S I iſtis validioribus ſecunda vxor non peperiffet, vel fœtus mortuos excuſſiffet, conſuluiſſem embryotomiam vel incisionem, quam Albucaliſ & alii docent, & Aetius *lib. 16. cap. 23. de fœtus extractione ſive ſectione ex Philumeno.* Interea admonet Medicum, vt in eiufmodi ſectionibus peragendis prius ſpectet, num febricitet mulier, nec ne, num præſidii capax ſit, ad deplorata. Sic & Paulus *lib. 6. cap. 74.* Aliis remediis non iuuantibus, ſi quidem ſalus adhuc ſperatur, tunc manum admo-liemur: ſin contra, attingi non debet. Quæ igitur perniciem ſui portendunt, inexpugnabili dormiendi neceſſitate premuntur: Lethali enim affectu periclitantes, *teſte etiam Actio*, lethargico ſopore occupantur, febricitant, propeque mutæ euadunt, & dum maximis clamoribus vocantur, vix incertum quippiam ſuſurrantes, rursus in ſoporem deferuntur: quædam & vibratim conuel-

luntur, aut neruis conturbantur, aut tremunt, aut alimentum non ſentiunt; ac pulſus creberrimus debiliſſimusque percipitur; vel valide inturgeſcens, *iuxta Paulum*, deprehenditur, ſed languidus. Quæ incolumēs futurae ſunt, nihil eiufmodi patiuntur. Sic anno 1590. mulier, cum in partu eſſet, & fœtus mortuus, brachio extra pendente corrupto, cum adhuc valida eſſet, conſului, vt obſtetriz brachium amputaret, quo ſic melius pareret. Quod cum facere nec auderet, nec vellet, poſt duos triſue dies adhuc permanens in difficili partu, miſere mulier obiit. Quomodo fiat ſectio, docet Aetius *loco citato*. Puerpera igitur, inquit, in lecto ſupina decumbat declini capite, erectis di-ductisq; cruribus, detineaturq; vtrunque a peritis robuſtiſque mulieribus. Si vero non adfuerint, mulieris thoracem vinculis quibuſdā lectulo adfirmabunt, ne corpus attrahendo, attractionis vim diſſoluat. Ac primo duæ vel tres panis buccellæ vino madefactæ, ad arcendum animi deliquium offerantur, iugiterque in ipſo opere vino facies reſpergatur. Chirurgus autem prius difficultatis cauſam ſpeculo inſpiciens, ſit ne thymus, aut calloſa eminentia vel quippiam eorum, quæ prædiximus, videbit. Quicquid fuerit, voſſella arreptum ſcalpro polytomo amputabit; ſin tunica os vteri obſtruxerit, eam quoque ſecabit. Si vero tunicæ abruptendæ ſoliditas obſtabit, hanc ſi fieri poſſit, enſiculo haſtato, (*ſcolopomacharium* vocant) vel alio ſimili incidemus; quam deinde incilam dilatabimus, locumq; idoneum pro dituro fœtui præparabimus. At ſi caput infantis locum obſtruxerit, in pedes vertendus eſt, & ita educendus. Quod ſi adeo inhæſerit, vt nullo pacto ad profundum impelli queat, vncus instrumenti attractorii in oculo, ore, aut mento figendus eſt, & ita infans extrahendus. Instrumentum autem attractorium dextra manu detentum immitti oportet; vnicum vero eius ſiniſtræ digitis occultatim ſenſim deduci, quouſque ad vteri cavitatem peruenerit; poſtea cuiuspiam prædictorum locorum inſigi; deinde alterum instrumentum ex altera parte oppoſitum, ſimili proriſus modo imponi, & inſigi, vt æqualis & in neutram partem attractio, imo & tutior fiat: forte enim vnum tantum instrumentum in attrahendo elabi poſſet, & fœtum dimittere: æqualiter vero, nec recte tantum, ſed & oblique attrahemus; digitumque aliquo pingui illitum intra vteri os & membrum obſtructum immitteremus, orbiculatimque circumducemus. Dimidio autem fœtu prodeunte, primum instrumentum peculiariter ſuperioribus partibus, inde ſecundum alternatim figendum eſt. Quod ſi caput vel natura, vel hydrocephali morbo plus æquo intumuerit, enſiculo, quem polytomon vocant, vel communi ſcalpro incidemus, deinde contractum extrahemus. Quod ſi ne ita quidem prodierit, totum ſinciput conteremus, & oſſa digitis educemus. Si vero aliquod os eminuerit, oſſario aut radicio forcipe auferemus, ac tum demum instrumentum attractorium inſigemus, & infantem eripiemus.

Prodeunte

Prodeunte autem capite, si thorax vteri ostio impingatur, hastatum ensiculum, aut scalprum polytomum duobus digitis occultentes, inter costalem membranam circa clauem pectoris vsque ad profundum secabimus, vt, excretis humoribus, moles thoracis concidat. Sed si egresso thorace, venter mortui fœtus intumuerit, & hydropis formam induerit, eadem regula vtentes, ventrem incidemus, & intestina eximemus. Sin manus altera ad sinum pudoris exierit, prope humerum articuli excidetur. Oportebit igitur linteo manui prodeunti implicato violenter attrahere, vt humeri articulus exferatur, tuncque pudendi plicas digitis hinc inde deducere, & postea articulum scalpro secare; deinde sinistram manum immittere, & capitulum dirigere, atq; ita fortum educere. Vtrinque vero manu prodeunte, vtramque secabimus; deinceps caput conteremus; ac tum demum infantem extrahemus. Quod si venter locum obstruxerit, linteo cruribus inuoluto violenter attrahemus, vt loca pubis & sœmen effertantur, quod tanquam mollius incidemus. Sin alterum crus in sinum pudoris deciderit, linteo implicato valde attrahentes, & pudendi plicas diducentes ad inguen crus abscindemus. Si duplicatus fœtus occurrat, neq; dirigi possit, si capitulum magis paratum fuerit, eius ossa conteremus, cūte nequaquam dissecata, deinde cuiuspiam eiusdem capituli parti attractorium instrumentum infigentes attrahemus, tum crura dirigemus, & ita fœtum educemus. Sed si crura magis exposita sint, coxæ articulum abscindemus, & ita coxas transcendemus, vt caput relinquatur facili contritioni paratum. Si vero obstructio duplamenti pertinacior fuerit, pedibus magis procidentibus, caput in articulatione vertebræ amputare oportet, deinde thoracem transcendendo, pedes attrahere: & si reliquis membris capitulum relabens detineatur, sinistram manum oleo illitam in intimos recessus immitteremus, caputq; perquientes, sensim ad os vteri deducemus cui deinde manu dextera vnum vel duo attractoria instrumenta infigemus: eruntq; loca figendo instrumento maxime idonea, in capite, oculi, meatus aurium, os, pars menti inferior, in thorace, axillæ, claues, hypochondria, pectus, vertebrarum articuli, ingulum; in cruribus, ossa pubis, fœminæ infantis pudendum. Ostio tamen vteri inflammato nulla vis adhibenda est, sed perfusionibus pinguibus affatim vtendum, eiusdemq; naturæ infusionibus, irrigationibus, cataplasmatis; vt inflammatione quadantenus remissa, & vuluæ ostio dilatato, fœtus, sicuti diximus, deferatur. Vbi vero integram sectionem fœtus perfecerimus, omnia eius membra sunt componenda, diligenterq; spectandum, an quodpiam desit, vt nullum prorsus interius omitteretur: deinde loculum protinus educemus. Eadem fere habet Paulus loco citato.

OBSERVATIO LXXIX.

De secunda relicta.

Vxor Andreæ Cloethii, cognomento Antuerpiani, puerpera annos nata 40. Alematiæ eo

tempore habitans, anno 1554. mense Martio, secundam relictam cum reddere non posset, binæ obstetrices ad eandem accitæ fuere. Verum iis nihil proficientibus me vna consultauit. Cum satis adhuc robusta esset, vt sternutamentum ex elboro albo fieret mandauit: deinde vt obstetrix digitos inunctos oleo liliaceo immitteret; lente quidem, ne vterus procideret aut subsequeretur, primum in obliquum deducendo, huc illuc circumagendo, deinde paulo validius attrahendo. Hoc enim pacto, vt Paulus docet lib. 6. cap. 75. a connexu solui solet: sicuti etiam, Deo adiuvante, factum est. Verum cum 4. diebus puerpera secessum non habuisset, antequam hæc fierent balano imposito, vbi aluum exonerasset, obstetrix melius suo officio fungebatur. Postea tamen hæc ipsa incidit in quandam febriculam, sed leuem: sumebat rob cerasorum & ribes ad alterationem & sitim. At quinq; postea diebus interpositis ventre dolebat; qui dolor cessauit *inunctione olei chamamelini & anethini*. Febris iam aberat: ideo adhibito *decocto cicerum cum hordeo mundato in vino Rhodensi*, bene purgata fuit. Quanquam diebus aliquot intermissis crura inflata fuere; sed *unctione vng. pop. & alabast.* detumescere. Sed oborta quoq; leui inflammatione gutturis, aluo *cum foliorum sena infus* soluta, ex garg. aque plantag. viol. exiguo adiecto *sem. coton. facta ebullit.* & colature immiscendo *diamori & mell. ros. paululum*, ea ipsa cessauit. Contra vigilias, quibus & tunc afficiebatur, præscripsi *oleum pap. & mandrag. an. ʒij. opii thebaici gr. ij. croci gr. vnum*: & bene dormiuit. Sed post duas septimanas dolore ventriculi accedente, ex ʒij. pilul. ex aloë, tribus assumtis pilulis, cum facilis solutionis esset, hic dolor quoq; sopitus est; & bene deinde habuit.

SCHOLIA.

EX secundis interiorum Empedocles animam vocauit, exteriorum Choriom; sed ambas alii hysteram nominant. Dum enim fœtus adhuc vtero geritur, ipsum natura conformans, machinata quoque est loca, per quæ alimentum ac spiritum posset a matre suscipere, & reliqua quoque eiusdem fœtus excrementis idonea comparauit. Etenim toti ipsi membrana tenuis (vt anatomia docet, & a Donato quoque annotatur) vndique est circumiecta, quam *Amnion*, id est, amiculum appellant, fœtus velut sudorem excipiens; huic extrinsecus tenuior alia incumbit, quam *chorion*, id est, intestinalem nuncupant, in ipsius vesica perforata, quæ & hæc in se ipsa colligit vsque ad partum ipsum, velut fœtus lotium. His autem extrinsecus in orbem altera membrana circumiecta est, totum vterum intrinsecus subiungens, qua media fœtus vtero connectitur. Nam in singulis orificiis vasorum, quæ intrinsecus in vterum pertinent, per quæ etiam sanguis menstruus in ipsum, quo tempore vtero geritur, fertur, aliud vas gignitur; arteria quidem in arteriæ, vena vero in venæ orificio, vt sint ea, quæ generantur numero æqualia in orificiis, quæ intro in vterum desinunt: colligatque ea membrana hæc, *tenuis quidem, sed fortis*; ita vt simul in mu-

4 nimentum, & ligamentum eorum sit, tum inter sese, tum cum vtero. Et quoniam exiguum est vasorum quodque cum primum ab vtero exoritur, cuiusmodi sunt arboris radices extreme in terram defixæ, quæ tamen paululum progressæ per coniugationem coalescunt; ita ut ex duobus vnum procreatur, rursusque eorum singula cum singulis eiusdem generis coalescunt, fitque id perpetuo quoad parva omnia in duo magna coeant, quæ velut stygites quidam fœtus, per locum umbilici inseruntur. Quatuor itaque omnino hæc vasa sunt: duæ scilicet arteriæ, & totidem venæ, nullis diuersæ generis inter se commixtis; sed venis quidem semper cum venis, arteriis cum arteriis in idem coeuntibus: per quæ vasa, velut per trûcos quosdam fœtus ex vtero sanguinem & spiritum trahit. Verum inter hæc omnia, & vasa exigua, quæ dicta sunt, media est iam dicta membrana, quæ veluti truncorum radicatio existit, quæ radicata a Græcis *χωρίον* nuncupatur, quod nihil aliud est, quam vasorum multitudo membrana tenui connexorum, quæ haud facile numerari queat, Galen. auctore 15. De vsu part. Interim *χωρίον* seu *δύτρερον* appellatur, Comment. aphor. 49. lib. 5. a Galen. & cap. 75. lib. 6. a Paulo. Latini Secundam & Secundas nominare solent: sic quidem appellantur, quod velut secundum domicilium, ac receptaculum sit ab vtero, & velut fœtus indumentum, ut inquit Aetius cap. 24. lib. 16. Hæc secunda quoniam ex umbilico pueri hæret, & umbilicus postremus ex vtero exit. Namque si primus exiret, non accederet per ipsum puero nutrimentum, quoniam ex ipso dependet, Hippoc. auctore lib. 1. De morbu mulieb. Propterea fœtu excusso foras prodire debet in naturali partu. Sed quoniam contingit interdum, ut fœtu in lucem edito, ipsa præter naturam detineatur; inde quod eius detentione vterus quodammodo afficiatur, & quod eadem detenta morbus sit in numero atque in excessu, nemini in dubium venit. Detinetur autem, aut propterea quod fundo vteri connexa est; aut licet seiuncta fuerit, tamen circa aliquam vteri partem instar pilæ conuoluta est; vel propterea, quod os vteri clausum sit, ita ut foras prodire non valeat. Hoc est, quod Aetius refert ex Philumeno: In loculorum detentione, qui etiam secundi appellantur, interdum vteri os clausum, interdum apertum reperitur, ac nonnunquam inflammatum, nonnunquam inflammatione carens; atque locus ipse interdum vteri fundo adhuc coniunctus, interdum seiunctus est. Ita edito tandem partu, secundas lethaliter interdum hæere vidimus, quas non minus, quam abortiuum reformidamus: corruptionem enim accelerant. Propterea protinus eximendas procuramus: æstate præsertim, vnde facile mulieres examinari videntur, ubi putridi vapores cordis vitalia, stomachum, cerebrumque subeunt. Vidimus, & furore percitas nonnullas insanire, ac furere. Quomocunque tandem ipsa detineatur, neque statim ac violenter extrahenda est, neque eius eductio parui facienda, seu negligenda erit. Ob

eam rationem vasa obstetricis est umbilicum protinus femori puerperæ adalligare, ne temere retrocedant secundæ. Tum sternutamenta concitantur vtiliter: illa quoque spiritu intenta secundas deprimunt: sique umbilicus apparet, subito corripendus est, atque deligandus; cui finis filum promptum habere necessum est. Iuuant crebræ vel inanes vomitiones: os & nares obturentur, Hippoc. præcepto aphor. 49. lib. 5. præsertim si mulieres imbecillæ non fuerint. Quod si nec sic exciderit; si ergo os (inquit Aetius) vulua apertum est, & loculum seiunctum inueneris, qui alicui vulua paripila modo conuolutus inhaerit, facilima curatio est: manum enim sinistram calidam, & pingui illitam, seu oleo, in abdum recessum immittere oportet, totumque loculum extrahere. At si vteri fundo connexus sit, simili quidem modo manum calidam in pingui illitam immitteremus; sed apprehensum loculum non statim recta attrahemus, vulua procidentiam verentes: Sed placide nulla violentia adhibita. Primo in obliquum sensim ducemus, huc & illuc circumuertentes; postea aliquanto validius attrahemus. Hoc enim pacto obediens & a connectione soluetur. Si vero os vteri clausum fuerit, perfusionibus utemur, & sinistra manus digitis leniter aperire, ac paulatim dilatare conabimur. Quod nisi successerit, mulieris iacentis sumini ouium lysin illinire oportet, rursusque loca perfundere, & impingumenta fomentaque adhibere: & si patiens robusta sit, eo tempore etiam sternutatoria e castorio & pipere confecta naribus admovebimus, & potiones aliquas earum, quæ menses cient propinabimus. Quæ quidem omnia primo & altero die peragenda sunt. Præterea suffitu utemur, decoctis in olla aromatibus, qualia sunt, cassia, nardus, iunci odorati flos, artemisia, iris, sabina, dictamnus, pulegium, & huiusmodi, olla sella supposita, cui mulier insideat, vestimentis vndique circumsepta. Postea pertentabimus: & si os vteri apertum inuenerimus, manum immitteremus, & sicut diximus fœtum enitemur educere. Qui si parum obediens, dilacerandus non est: haud multis enim postea diebus marcescet, & in saniem solutus excidet. Hactenus Aetius. Atque hæc ipsa, ut rite fiant peritæ obstetrici mandabimus.

OBSERVATIO LXXX.

De secunda relicta in quibusdam puerperis: & quibus medicamentis ab ea liberata sint.

Mulierem cuidam Delphensi, honestæ matronæ, cum secunda relicta esset post partum, mulierculæ astantes pro communi remedio, quo uti solent, exhibuerunt horminum satium cum sale, sed nihil profecere. Nos ad eam acciti dedimus \mathfrak{d} j. trochisc. de myrrha cum \mathfrak{z} iij. artemisia in vino Rhenano coctæ. Et cum obstetrix diceret, secundam solutam esse, & quod tenderet ad exitum, facta quoque inunctio est per eam ex olei amygdal. dulc. listior. cheyrini, ping. anati, gallinæ, porcine, butyri recentis, ana \mathfrak{z} ss. tam intus, quam extra. Altero deinde Medico mox superueniente, ex elleb. albo pipere nigro, sternutamentum præscriptum est: Sed ab eo non sternutabat lassata prius. Et ideo ut vires resumeret, accepit ius pulli

χωρίον
seu secunda,
quid sit, vnde
nomen sumserit.

Pari affecta.

Affectus qui
sit.

Causa.

Prognostica.

pulvis cum ovo molli, paucis insperso cinnamomo & pulu. nucis myristica, totumque ventrem & inguina intingendo, ut dictum est. A potione ex trochisc. de myrrha sumpta, post quatuor horas probe a secunda liberata fuit. Altera quoque puerpera anno 1558. mense Octobri cum $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$. trochisc. de myrrha, vini Rhenensis $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. & aqua artemisia, sumisset, etiam secundam reiecit. Ut super fellam collocarent imperauimus, quo ita obstetrices melius suo munere fungerentur. Alteri quoque mulieri, quæ extra portam fossæ aqueæ habitabat, a partu difficili & periculoso euadenti, secunda post partum relicta fuit. Duæ obstetrices præsentēs eandem pro deplorata habebant, & in lecto posuerant. Vocati nos de nocte cum ex difficili partu & longa mora debilis esset, exhibuimus confectionem manus Christi perlatam (ut vocant) & puluerem propinauimus: \mathfrak{z} pulu. parturientis ex radice dictamni parati, castia lignea, pulu. seu rasura lapidis dactylorum ana $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$. aqua artemisia $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. vini Rhenensis $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. ebibit. Et tertia obstetrix magis perita superueniens manu pingui intrinsecta, e lecto muliere in sede leniter collocata, eduxit secundinam. Atque ita perfusionibus adiuta, & potione a linamentis relaxantibus, tandem & a secunda hæc quoque liberata fuit. Sed paucos post dies incidens in febrem & fluxum ventris, nec me aut alios Medicos consulens, postea, ut mihi relatum fuit e vita decessit. Verum textoris vxor, mulier parua staturæ & tenera, cum bis fœtum mortuum peperisset cum magno periculo; ac tertia vice cum rursus pareret, ac sex diebus iterum in difficili partu esset; 29. Octobris 1581. ad eam accitus sum. Cum igitur fœtus dudum esset mortuus, hoc puluerem exhibui: \mathfrak{z} radic. dictamni albi, cinnamomi ana $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$. seminis viol. $\mathfrak{d}\mathfrak{ss}$. fiat puluer. subtilissimus: sumebat cum $\mathfrak{z}\mathfrak{iij}$. aquæ artemisiæ, quod febricitaret. Die sequenti cum fœtus, seu parvus, quasi dimidiatus usque ad humeros in exitu foret, nec foras prodire posset, pulu. rursus exhibitus est cum vino Rhenano, quod minus febricitaret, fœtusque mortuus plane corruptus subsequēbatur. At obstetrix cum non posset habere secundinam, & puerpera pro mortua quasi haberetur, non sine febre; mandauimus, ut obstetrix imum ventrem totum intingeret linimento sequenti: \mathfrak{z} olei liliorum cheyrini, lini, axungie, gallinæ, caponis, canina, ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. misce. Iterum hæc pulu. ad secundinam expellendam, & cum non purgaretur, exhibitus est: \mathfrak{z} pulu. radic. dictamni albi $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$. \mathfrak{ss} . cum aqua flor. chamæmeli $\mathfrak{z}\mathfrak{iij}$. datur. at nihil subsequutum. Mulierculæ muscum pruni arboris portantis cærulea pruna, tanquam in his lymphathia esset, cum vino colatum dabant, quibus multas adiutas dicebant, licet muscus restringat: sed nihil his iuuantibus, tandem per partes corruptas, ut prædixeramus, excidebat. Et rursus exhibitio puluere sequenti cum vino, magis putrefacta per partes prodibat: \mathfrak{z} radic. dictamni albi $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$. \mathfrak{ss} . seminis viol. cinnamomi selecti, ana $\mathfrak{d}\mathfrak{ss}$. rasura dactylorum gran. \mathfrak{ij} . Quarto Nouemb. deinde & sexto rursus puluerem propinauimus; a quibus perfe-

cte, partibus omnibus corruptis paulatim excidentibus, a secundina liberata fuit; demum bene purgata recte deinde valuit. At Antonia vxor Ioannis Musii Pedemontani cum a secunda post partum liberari non posset, imo ventre tum multiebribus per obstetricem oleo liliaceo & amygdal. dulc. pinguis inuncta ac fœtu, post $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$. \mathfrak{ss} . pul. parturientium ex dictamno exhibitos. & decoctum rad. schœnanthi & dictamni in aqua liliorum & artemisia, etiam balneo immisso, ut aluum redderet, secundum mox eiecit, & deinde bene purgata optime habuit. Heyla vulgo, seu salutaris, obstetrix valde experta apud Delphenenses, cuius opera multæ mulieres in difficili partu utebantur, in obstetrici arte gnara, dum praxin Delphis exercerem: hæc ipsa ad secundinam depellendam capiebat firmum equinum, & ponebat in puppa. & cum vino insciis puerperis expressum dabat. cum nulla alia remedia iuuarent: atque eo modo plurimæ a secunda liberatæ fuere.

SCHOLI A.

Quod si istis remediis iam dictis, & sternutatione, tum sabina decocto, & trochisc. de myrrha vel borace, (quibus etiam fœtus mortuus reuocatur) secunda, vel, ut alii vocant, secundina, non expellatur, verendum est vtero eam esse affixam & alligatam. Id deprehenditur his coniecturis, quod neque medicamentis, neque vehementissimis illis conatibus mulieris, vel sternutatione, sit reiecta, & quod ante tempus puer emissus fuerit, idque aliquando sine doloribus magnis præcedentibus, ut aliquando obseruauimus secundam relicta. Dolores enim, qui præcedunt partum, fiunt, dum disrumpuntur venæ & arteriæ cotyledonibus vteri alligatæ. Itaque si dolor non præcesserit, fracta est tantum secundina, & vtero adhæret: ideo manu comprehendenda, aut vinculo, & leniter trahenda, ne disrumpatur in partes, maxime quo diutius retenta fuerit. Memini cum apud puerperam Schiedami essem, secundam fuisse retentam: sed cum quædam obstetrix nimis audax subito ad se secundinam attraheret, illico puerpera in deliquium animi cadens statim expirauit. Quare si ita adhæreat, ut vnguibus non possit extrahi, immittantur medicamenta suppurantia: nam eadem non est dilaceranda, ut quæ intra paucos dies putrefacta, ut & Paulus tenebat, in saniem dissoluta excidet; quemadmodum & paulo ante ex Aetio diximus. Ut etiam euenit vxori textoris, de qua etiam nunc in Obs. præcedente egimus. Interea illo tempore, ut & Paulus tum Aetius admonent, quia secunda ita emarcescens nimio suo fœtore caput replet, & stomachum euerit, odoramenta iugiter suffiendæ sunt, quæ possunt huiusmodi calamitatibus repugnare, & loculum subducere. Ad quos usus excellunt, cardamomum & caryca, si apte suffiantur, & bdellium cum sabina, thus cum styrace; vnguis aromaticis, ladanum iisdem castorei $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. & pulegii tantundem, ex melle propinato. Conueniunt & leniora ex his, quæ menses ducunt; artemisia decoctum, lauri bacca, myrrha & cyclamine cum vnguento mixta,

Historia Ren-
delarii.

7 *ovis & capra loculi arescunt vino triti, & propinati, aut cum vnguento impositi, aut pro amuleto gestati.* Verum, ut paulo ante diximus, fieri potest, ut in ea parte putrescat: ut & nos vidimus puerum putrefactum: quod & Rondeletius testatur se vidisse, & frustulatim reiectum. Sed, ut ille vidit, relictis magnis ossibus in vtero per longum tempus, quæ post in vtero matris mortuæ reperta sunt. Vxor fuit chirurgi Monspelienfis, qui post mortem, ut causam alicuius affectus interni cognosceret, passus est illam dissecari. Quia vero odoris gravitate (ut paulo ante diximus) caput replet, stomachum putrefacta evertit, & alia inducit sæpissime symptomata gravissima & sævissima, ad id necessarium est per intervalla iniicere ea, quæ vim habent detergendi, quod putrefactum est. Ad id valebit (teste Rondeletio) vnguentum basilicum in multo oleo lilior. Hamygd. dissolutum, vel in decoct. sequenti: *rad. mal. viol. ana ℥ ij. rad. aristoloch. longa vel rotunda ana ℥ j. semini lini sœnugr. ana ℥ ss. florum chamemeli, & centaurei minor. ana p. j. sum. p. ij. fiat decoct. in aqua & oleo. & in eadem dissolvatur vnguent. basilicum, vng. Egyptiacum, ad detersionem etiam iniici potest.* Atrodit enim & potentissime abstergit, & sua acrimonia facultatem expultricem mouet. Periclitantur mulieres, si adhareat & contineatur, & moriuntur: vel ob vsum medicamentorum acrium vlcus in vtero fit. Quamobrem optimum erit antequam adhibeantur remedia, id prædicere, ad vitandam calumniam. Potio sequens sæpe danda est: *℥ sabina. artemis. ana m. j. fiat decoct. in aqua, in ℔ ss. decocti. adde vini albi vel clari ℔ ss. arom. c. m. cinnamomo. & detur frequenter, si sine febre est.* Vel, *℥ boraci ℥ j. capiat cum ℥ ij. vel iij. prædicta decoctionis, aut cum vino albo.* Aut detur tantundem *trachis. de myrrha, vel ℥ j. carabes,* maxime si cum magno fluxu sanguinis sit. Nam vrinæ mouet, secundas deiecit, & sanguinem fluentem retinet. Decoctum vel aqua fabarum distillata, & ut aqua florum croci, detergit, secundinas pellit, & dolores illos sedat. Quare non est omittenda in hoc negotio. Memini Mariam Francisci, in foro frumentario Delphis habitantem, 6. mense peperisse foetum mortuum, & post partum relictam fuisse, secundinam ad quam 27. Septemb. die, anno 1578. accitus, valde debilem repperi, cum insigni satis profluvio sanguinis. Quare hanc mixturam sequentem sæpius sum sit: *℥ conseru. viol. borag. citri conditi (scilicet cort. eius) ana ℥ ij. fragm. lapidum pretios. vi. alcohol. puluerisatorum ℔ j. manus Christi cum perlis ℥ ss. syrup. de limonibus ℥ j. fiat mixtura, & foliis auri cooperiatur.* Deinde sumto hoc pulvere cum ceruisia: *℥ rad. dictamini albi ℔ j. seminis viol. ras. dactylorum, ana ℔ ss. fiat pulu. & inuncta vulua intus & extra oleo liliorum amygdal. dulc. sexta hora a quo sumsisset pulverem, hora diei 10. a secundina liberata fuit.* Post aliquot dies in suffocationem vteri incidens, cum neque ex odoratu foetidorum ad os, tum aliis præfidiis ad se rediret, quasi pro deplorata habita, hoc assumpto pulvere a suffocatione curata, probe deinde valuit, satis bene in puerperio re-

purgata: *℥ gran. iuniperi, calami arom. incisi, ana ℔ j. radic. ostrutii (eius loco pharmacopœus sumsit semen eius, cum radix ad manum non adesset) radic. gentiane, ana ℔ ss. seminis pastinacæ ℔ j. fiat pul. subtilissimus in duas partes diuisus: ac vna parte assumpta cum ceruisia, miraculi instar, suffocatio vteri cessauit.*

OBSERVATIO LXXXI.

De dolore post partum eueniente.

AD dolores post partum (quos vulgares mulierculæ nostræ suo idiomate, *nae vreden*, vocant) magna cum laude vtror sola flor. chamemeli decoctione in ceruisia communi: miraculi instar, dolores post partum compescit. Matrona quædam cum peperisset filios, quotannis post partum sex dies, diebus interpolatis, bibebat ℥ vj. olei amygd. dulc. recenter expressi, cum saccharo; & ita dolores mitigabat, & irritabat purgationes sopitas. Sic in Italia, ut ex præceptore nostro Romæ Gissiberto Horstio accepimus, rusticæ mulieres oleum commune, (sed minus rancidum ibi quam hic) accipiebant: quod & laudatur. At matronæ ibidem potius accipiunt ℥ iij. olei amygdalarum dulcium expressi. Hoc illico vidia dolore post partum liberatas; & commode eo in multis vti sumus. Valuit & decoctum florum chamemeli & artemisiæ cū iure pulli, etiam pro clysteri, cum fæces etiam retentæ essent in vxore puerpera Beroaldi cum oleo lilior. & vitello oui. Vbi ventositas adest, commode datur vinum decoctionis cumini, vel paulum cumini puluerisatum & inspersam, modo febris absit.

SCHOLIA.

ANtequam puerperæ recte purgentur, dolores post partum sæpe iis oboriuntur. *Matrix* enim tunc (inquit Erotis) tanquam fera syluestris, propter subitam euacuationem, quasi vagando huc illuc declinat, unde vehemens efficitur dolor. Pro dolore exhibet vinum calidum in quo cuminum bullierit. Ceterum oportet in omnibus causis quoque doloris animaduertere. Si mulier quædam Elisabetha Gellii cum pateretur enormes torsiones in ventre post partum; Ioannes Tiengius, Medicus insignis, bis terve subsequenter potionem dedit, & omnis dolor euauit: *℥ verbena, calendula, viol. ana p. j. schœnambi ℥ ij. seminis dauci, gentiane, sœnugræ. seminis althææ, ana ℥ j. fiat decoct. pro ℔ ss. (nempe in aqua, sit ad sit febris: alioqui in vino, quamuis non expresserit) exprimat, addendo syrup. de artemis. ℥ j. misce.* Sed & alia, Magdalena dicta, post partum graues dolores matricis & totius ventris incurabat, cum retentione omnium superfluitatum & menstruum & ventris stypticitate. Exhibita fuit hæc potio: *℥ radic. paonia, ℥ j. schœnambi, gentiane, florum chamemeli, ana ℥ ss. foliorum senæ ℥ ss. fiat decoctio in aqua artemisiæ pro ℥ iij. colatura adde cassia recens extracta ℥ ij. misce.* Vesperis sumsit, & curata est ab omnibus accidentibus iam dictis. Memini ipse, dum Alcmariæ praxin adhuc exercerem, vxorem Iacobi Themistoclis nautæ, paulo antequam par-

teret,

reret, Amstelrodamo vna cum marito Alcmariam venientem, in dorsum fortiter cecidisse supra scapham: ex quo casu, altero die peperit. Post quatuordecim dies a puerperio dolor ita intendebatur in dorso, & adeo vrgebat, vt multis diebus dormire non posset, subsequente febre, sed non adeo vehementi. Portionem sequentem dedi: *℞ cassia recens extracta ℥vj. diacathol. ℥ij. dissoluantur in aqua scabiosa & scolopend. q. s. mummia ℥j. mellis ros. colati ℥j.* qua medicina copiose aluum deposuit, dolore cessante, vna & febre, etiam loco dolente inuncto linimento sequenti: *℞ vnguent. dialthea, olei anethi, chamamelini, axungie vituli, ana ℥ss. misce.* recte deinde valuit. Si dolor post partum sit a ventositate, dentur semina ventositatem carminantia. Valent & ea, quæ ad inflationem vteri diximus. Sed videndum num adsit febris, & nunquid dolor ille sit ex frigore, vt magna ex parte contingit; raro enim ex calore, vt videre licet cap. proprio De dolore post partum apud Gilbertum Anglicum, tam alios, & in libro de Harmonia Gynaeciorum. Ideo & recte nos admonet Alexander Benedictus Veronensis, quod mulierem a puerperio ipso, a frigore & vento, clauso cubiculo obscuro tenebimus, a strepituque ac clamore, vestimentis bene operam, atq; iubebimus si vel molam enixa sit, aut mortuum infantem, vt somno moderato quiescat, alta ceruice, sine vilo iniungendo odore. Etiam hæc conueniunt omnibus post partum, etiam si bene pepererint: & sunt tractandæ non aliter, quam si febricitarent, ne in febre incidant: eam enim aliquando incurrunt, vt quibusdam exemplis in lib. De febribus demonstramus. Ideo cibus in initio sit præparatus, crapula enim facile febris excitatur, ac sitis validior. Propterea prima die ius gallinaceum damus pingue, ac ouum forbile, vel carnem in cœna ac prandio duntaxat. Sed modus etiam seruandus est, ne inconcoctis cruda superingerantur. Confectionem interdum damus diamargariton, aut dianisum. Vinum vtile est, quod modicas vires habeat, subdulce, hyeme tepidum; frigidis enim vulua tentatur. Ea victus ratio ad decimum vsque diem seruatur vtiliter. Vitamus carnem assam, & quicquid astringit. Alius si nihil reddit, iniectionis clysteribus mollienda est; vti nos fecimus in illustrissimi Principis Aurai uxore. Si ii non iuuant, vel si clysteres abhorreant, vt sepe euenire solet mannam damus cum cassia. Si partum purgationes sequuntur, bonum est, si hærent, non est bonum, sed tunc promouendæ sunt, vt postea dicemus. Ita ex Moschione: Ponenda est in lecto, cum prius post partum spongia longa deterfa fuerit, in cubiculo obscuro, modice patentibus pedibus, vt quicquid ex ea foras exire cœperit, non impediat, pannis loca ipsa contegantur, ita vt frequenter murentur. Sed & lanis mundis & ventrem & pectinem contegi oportet; & si sine quassatione partus effectus est, oleo viridi cum modico vino admixto ipsam partem irrigari; si vero laboriosus partus præcesserit, oleo dulci & calido ipsa lo-

ca calefieri: deinde biduo eas a cibo abstinere. Hic tamen ratio habenda, vt pro viribus parcatulantur: nostræ enim puerperæ omnimodam incediam non sustinent: tum astantes mulierculæ nostræ quædam pessime faciunt, quæ ad multos cibos tum pultes sumendas eas cogunt, dando ceruisiariam panatellam iuncto caseo, qui tamen obstruit. Id in Frisia mulierculæ faciunt, sed pessime, quamuis dicant lumbos roborare. Utantur simplici cibo. ouis forbilibus, & pultibus, primis diebus. Et si levis suspicio adsit de febre, vinum interdicator. Septimo die vinum exhiberi poterit aqua exiguo temperatum. Addunt & hæc alii, vt si pepererit masculum, quod triginta diebus sese in lecto contineat, nec foras prodeat, si foeminam, 40. Nonnullæ tamen statim a partu resurgunt, sæpe tamen suo damno. Cuius enim crudelis partus est, & exitus tardus, in primis tenuem victum huic exhibere oportet. Symptomata post partum plura esse possunt, de quibus mox agemus.

OBSERVATIO LXXXII.

De quibusdam symptomatibus puerperis euenientibus.

IN puerpera febricitante ex mēstrua purgatione suppressa recte vsus sum decocto hordei mundati, glycyrrhicz & schœnanthi in hunc modum: *℞ hordei mundati m. j. glycyrr. ras. ℥ss. schœnanthi ℥j. B. coquantur in aqua communi pro ℥ss. id quidem vel in febre non obest, & simul purgationes sopitas aperit, vt euenit puerperæ in Gryphone aureo decumbenti. Debilioribus ℥ss. schœnanthi in iure pulli bullire iubeo. Hoc modo Florentiola, Medicus Bononiensis utebatur. Valet & ius cicerum. Mulieres Bononienses dant ius columbæ in quo bullierit schœnanthum, ad purgationes promouendas, si febricitent; estq; remedium Nicolii. At in robustioribus puerperis, si menses diu retineantur, venatali incidenda. Vt in puerpera in insigni follis e regione domus ciuicæ, cum maximo successu fecimus, mēstrua purgatione subsequente; etiam sumendo ℥ss. pul. dominarū cum aqua artemisiz. Puerperæ vero Alcmarianæ, cum aluus restricta esset, valde debili existenti, ius sequens exhibitum fuit: *℞ foliorum senæ ℥vj. tamarindor. ann. ix. prun. damas. gr. j. vuar. passul. ab acinis repargat. ℥ss. sem. anisi, anethi (nam in ventre etiam maxime dolebat) ℥ss. B. florum viol. bugloss. borag. an. m. B. seminis perros. p. j. confusa in gallina pingui, prius mundata a fecibus & intestinis, & interaneis, collo pedibusq; abscessis confusa, coquantur in aqua, ad dissolutionem carnis ab ossibus: omnia cum iusculo conuadantur, & postea colentur vna cum iure, adiecto pauco vino & sacchar. pro sapore delectabiliore. Ex eo iure cyathum subinde sumens & restaurabatur, & simul secessum habebat. At Mariæ Teylingiæ in puerperio febricitanti ℥ss. B. mannæ selectæ cum iure pulli propinata, probe aluus soluta est, febrisque cessauit. Puerperæ Delpheni cum lortium retentum esset, sola inunctio olei scorpionis**

profuit. Novi & aliquas puerperas melancholicas fictas, & quasi insipientes, si filiam peperissent; si masculum, eo malo non afficiebantur: sed paucis adhibitis remediis sanæ evadabant, quemadmodum & illa apud Amatum cent. 2. curat. 52.

S C H O L I A.

- 3 **V**aria symptomata aliquando puerperis post partum eveniunt, & præter dolores, qui aliquando post partum contingunt, innumera alia contingere possunt. Præcipua vero hæc sunt, sanguinis retentio, aut eius fluxus nimius, & ulcera, & immites dolores. Si enim non repurgantur, & sanguinis fiat retentio, alii morbi quoque oboriuntur. Si ex retentione sanguinis vertigines oboriuntur, syncopes, febres, & universales agitudines ex repletione; quemadmodum de retentione menstruum diximus. Vtere iis, quæ mentes leniter educunt; sed videndum num adsit debilitas. Sic puerperæ debili existenti tali vena aperta non fuit, ut alteri robustæ: sed summitates schœnanthi, capil. ven. melissæ, rad. apii in iure decocta fuere, & vrina apparente turbida, mox leni adhibito famigio sub vestibus ex pilulis dictis: ℞ bdellii, myrrhæ, galliæ moschatæ, ana ℥j. trochisci de myrrhæ ℥j. fiat pilula cum melle ros. & vna supra prunas injecta fumus recipiatur per vulvam, cavendo tamen ne nares attingat, menses fluxerint. Si vero nimia purgatio subsequatur, & vires deficiant, leniter constringatur cum iis, quæ de nimio profluvio mensium diximus. Si istis diebus noctu vocatus sum ad puerperam, quæ ex nimia & continua purgatione inciderat in syncopen: functione digitorum ac manuum renovata, factis etiam ligaturis membrorum superiorum, ex hoc condito, meo iussu, sæpe capiebat: ℞ consér. ros. aniq. ℥j. diacydon. sine spec. ℥ss. fragment. lapid. precios. ℥ij. manus Christi cum perlis ℥ss. cornu cerui vsti ℥ij. trochisci de carabe ℥j. syr. de ribes, cydonior. mentha-cæi, ana q.s. fiat conditum. At altera quæ post abortum nimio sanguinis fluxu laborabat, sumit commodè has pilulas: ℞ pilul. de bdellio, trochisc. de terra sigillat. de carabe, ana ℥j. cum syr. myrr. fiant pil. dentur mane. Sed & istis diebus vng. comitissæ cerati instar super ventrem inferiorem positum profuit. Reliqua vide loco de iis, quæ menstrua superflua constringant; quæ non opus est ut repetamus. Ita quoque si febres eas apprehenderint, subtilia regimen, & aquam hordei in potu dato; deinde reliqua secundum exigentiam febris administra. Sed quia de his copiose diximus in libris nostrarum Obser. De febribus, eosdem consulto. Si contingant post partum ulcera, de his quoque prius dictum est. Volunt interea ut ex ros. axungia recenti & albumine oui fiant pessi. Si vulneretur vterus, vel vulvæ accedat ruptura, quidam vulnere adhibent pessos ex succo arnoglossæ, succo portulacæ, & oui albumine; ulceri vero ex cera, oleo ros. spuma argenti, ac cerusa, & alumine vng. conficiunt. Ad rupturam Eroris pul. rad. consolidæ maioris inspergit. Vide apud eundem, quid sit faciendum, si rupturæ fiant in ano & vulva. Ad do-

lores vteri, ut præcedente Scholio & Obseru. 81. etiam ex parte diximus, cataplasmata anodyna vntionisque, & alia remedia mitigatoria administranda. Aliqui exhibent trypheram opiatam in potu. Vbi dolor immitissimus est, hoc electuario vtiur Guainerius: ℞ piper. longi sem. hyoscyami albi, ana ℥x. opii thebaici, croci, ana ℥v. pyri bri, castorei ana ℥j. ammeos, baccarum lauri, cumini, folior. ruta, siccor. calamensis ana ℥ij. margarinar. hyacinthi, ana ℥j. moschi sine ℥ss. cum melle dissipato q.s. fiat electuar. Eo non utendum nisi ad minus sex menses præterierint ipsius præparationis. Datur autem a ℥ss. usque ad ℥j. cum vino calido, decoct. artemisiæ. Quamvis tamen istud statim dolorem sedat, non est utendum eo nisi magna cautione, si reliqua non inuerint: cum alia habeamus anodyna. His alii addunt contra rugas in ventre post partum remanentes: axungia enim caponis inungunt ventrem. Si post partum difficilem vteri prolapsus fiat, curetur, ut prius dictum est. Si mammillæ doleant ex lacte, Eroris apponit argillam cum aceto, mammillæ prius aqua calida fota. Alii mamillis dolentibus apponunt panem in melicato infusum cum oleo dulci contritum. Si lac ad mamillas confluit cum tensione grauedine, dolore & feruore, ex Mosch. primo impone spongiæ molles cum posca, vel panem in posca infusum cum palmulis tritis. Et si lac stringere velis apponatur pulicaria seu psyllium, vel coriandrum viride: si adsit feruor, relaxentur cum oleo & aqua calida. Si lactare non velit, lac stringitur pyrite lapide trito cum cerato. Vide ea, quæ scripsimus Obser. 8. lib. 17. de lactis exsiccatione. Ac vna passa trita lac euocat. De defectu lactis diximus Obser. 14. & 16. lib. 17. Vide in eodem libro de aliis affectibus mamillarum; & de fissuris papillarum in eodem libro sub finem; & quæ Aetius lib. 16. cap. 35. ad caput 50. De mamillarum affectibus scripserit. Vide & de lacte grumoso vel vitiato. Addemus autem quædam, antequam hunc librum finiamus, de regimine infantis, & de regimine nutricis, ex diuersis auctoribus. Eo, quod Medici de his rebus aliquando consultantur, ut ita ryrones etiam ea ad manus habeant.

DE REGIMINE INFANTIS.

Avisu fanis (inquit Eroris) premenda sunt statim: & hoc multoties est faciendum. Postea observandum ne lac subiniret, aut nares cum ablaetatur. Et ligetur umbilicus tribus digitis a vtero mensuratis. Quia secundum retentionem; umbilici, erit vnga viridis maior vel minor. Vt vero rectius loquatur, vnge palatum cum melle. & nares cum aqua calida; & factis vntionibus, semper mundificetur, & mucilagines semper emungantur & emundentur. Puer præterea sæpe est fricandus; & qualibet eius membra in vnaquaque parte fascia sunt retinenda, & iungenda: & restricta sicanda sunt eius membra; caput videlicet, frons, nares, venter, & renes temperentur, ne multa ex eis exeat vntuositas vel humiditas. Quod si aliquid istorum appareat, diutius a solita fasciatione cogatur abstinere, & diutius dormiat. Postea vero in aqua calida balneatur, & ad suam consuetudinem reducatur: & si opus sit de medicinis sopori-

Sanguinis retentio.

Superflua purgatio.

Puerperæ si vulneremur.

Ad ulcera & vulnera.

Ad do-

Contra rugas ventris post partum.

Mamillæ si afficiantur post partum.

Eroris de regimine infantis cap. 18.

seporiferis, parum detur, ut dormiat: (non tamen opium, ut nostræ mulierculæ pessime faciunt.) Cutis eius aequaliter est mouenda: quod etiam consuevit fieri post mammillarum susceptionem. In principio natiuitatis, oculi cooperiendi sunt, & summo opere cauendum ne sit in loco lucido. Ante ipsum sint diuersa vestimenta, panni diuersi coloris, margarita. Coram eo silentia & facilibus utendum vocibus, nec asperis vocibus canendum: & rauci soni vitandi, sicut bombardarum. Postquam hora loquendi appropinquarit, nutrix eius linguam frequenter cum melle & butyro ungat. Et hoc maxime faciendum est, cum loquela tardatur. Coram eo frequenter est loquendum & facilia verba proferenda. Cum vero tempus natiuitatis dentium venerit, gingiua singulis diebus cum butyro & axungia gallinae sepe fricanda sunt, & aqua hordei linienda; gula & spondylia inungenda. Quod si venter eius laxabitur, superponatur emplastrum quod fit ex cumino & aceto: & admisceatur saccharum, gummi Arabic. bel. Armen. & similia. Cum tempus aduenerit, in quo comedere incipiet, dandi sunt infanti magdaleones ad modum glandis facti de saccharo ac lacte, & similia, quæ possit in manu tenere, & cum eis ludere, & de eis sugere, & aliquid transglutire. Caro quæ est in pectore gallinarum & phasianorum, est ei tribuenda. Et postquam bene capere coeperit, mammillarum substantiam mature incipiens, eas in nocte sugere permittas. Ita & in die ordinate ducendus est, bene obseruando ne tempore calido a lacte remoueatur. Si vnum membrum pueri sit maius alio, ad bonam habitudinem sic potest reduci, si talis dispositio fuerit recens, quia inueterata nullo modo reducitur. Fomentetur ergo primo cum decocto brancae vrsinae, radic. althææ, foliorum apii, petroselinii & marathri, diutius bulliendi in aqua, & membrum patientis ponatur super vas, & cooperiatur panno lineo ut sudet. Postea chamamelum & althæa incoquantur. Et in illa viscositate malaxetur cera, & totum membrum inde cooperiatur. Postea ligetur fascia linea strictè, & ita membrum patientis sudet per noctem vnam: mane vero fricetur, ut spiritus excitentur, & fluant ad locum dolorosum. Quo facto, fricetur statim cum dialthæa ita composita, ut sint due partes dialthææ, & tertia de oleo laurino: commisceantur, & ungatur membrum prædicto modo ter vel quater in die. Tunc quoque accipe diacerasæos, ceroneum oxycroceum, & ad inuicem pulueriscentur. Deinde decoquantur althæa, & puluis ille malaxetur cum illa viscositate, quousque bene adhereat: & membrum totum patientis cooperiatur, & fascia ligetur. Et sic fomentando, & emplastra ponendo, poterit alleviari. Quibus factis, iniungatur requies & otium, & utatur calida & humida dieta, optimo vino, & mediocriter rubeo, quod bibat quousque curetur. Insuper & balneo aquæ dulcis utatur. Hactenus E-
rotis. Moschio autem hæc dat: Ex quibus probabis infantem aptum esse ad nutriendum? Ex hoc videlicet, quod illa, quæ illum in utero habuerit, omnibus mensibus sana fuerit. Vitali etiam mense si sit sanus natus ipse paruulus. Si omnibus partibus fuerit integer, omnes poros patentes habeat, vo-

cemque solidam statim ut cadit, emittat. Hæc omnia integre sanitati sunt testimonia, & pleno tempore naturæ infantem ostendunt. Quoties in die lauandus infans est? Semel. Necessitate vero aliqua occurrente, bis: frequens vero lauacrum flaccidum corpus facit (liber Matricis habet, capiti eius nocet.) In quali loco lauandus? In obscuro, & temperate calido. Quibus rebus infantis superficiem lauare oportet aut aspergi? Antiqui vino cum aqua salsa abluebant. Alii vero lotium pueri & puluerem gallarum vel myrtæ aspergebant. Nos autem salem tritum & aphronitrum aspergimus: prædicta enim res odore suo infantem ferunt, nec tutum est infantem nimium astringi: inde enim deterius habet. Si vero multum molli est infans, admixto sale (alias, melle) vel oleo, vel succo sænugrææ. asperge, aut line per corpus, ita ut neque oculis, neque ori ex his aliquid incidas. Deinde cum siccatur corpus, aqua frigida eum abluere, & aqua calida ipsum lauare debes. Dignis vero in naribus, petiore immisissis, omnia purgare, & oleum oculis infanti infundere. Deinde minimum digitum in ano infantis immisissum, meconium (in Græco πύλον) tollat, & umbilicum lana ligatum immediate sui præcidere, & linteo oleo intincto coniegere. Propter quam causam oculi infantium oleo irrigantur? ut tunc a quibus constant, emolliantur, extergantur, ut integrum visum habere possint. Quare iubentur matres post lauacrum infantum auriculas & nares exsiccare? Ne remanente ibi humore, graciles aurium pori, perfrigescent, & male accipiantur. Quomodo oportet infantes ungere? Primo ad dentes positos, deinde etiam supinos femoribus suis ante supposito linteo, ita ut aliquando singulatim manus iungat. Aliquando vtrasque iungat, & extendere etiam iuuat. Similiter etiam pedes, singulasque corporis partes formare: & quæ concava esse debent, premantur: quæ vero gracilia, cstringantur; & quæ exstantia, adducantur. Oculorum etiam ipsorum folliculos frequenter fricare, caput vero diligenter rotundum facere, patellas etiam in genibus mouere, deinde omne corpus extendere & remittere, & vniuersas partes suis officiis commemorare. Quomodo fasciandus est infans post lauacrum? (in margine annotatum erat: Forte: Quomodo disponendum est lauacrum?) Sedere debet nutrix, & genibus iunctis femoribus suis, in linteo infantem accipere, & sublati fasciis oleo tepido ungere: & in pelui grandi aqua calida limpida, & sine odore missa temperata. Deinde manum sinistram sub axillam infantis sinistram tenere, ita ut pectus supra cubitum iaceat. Deinde in aquam positum leniter fomentare. Primo dorsum, deinde supinum conuersum, & partes ipsas fouere, ita ut omnes sordes, quæ in collo sunt, & concava loca, sicuti sunt axilla & inguina diligenter extergantur. Immissoque digito intra os, saluas omnes rollere, & leniter gingiua & linguam confricare. Deinde leni manu supra pectinem premere, ut vrina officium commemoret. Sed cum videri corpus eius aliquantulum calidum, si fissi venter obruisse, lauare, & in tepida aqua deponere, ut ad usum frigide assuescere possit infans. Quomodo oportet infantem fasciare? Superposita femoribus eius fascia munda, & lata sufficienter, longa & lana, ut singulas per partes voluere va-

Harmon. gynæc. par. prior. cap. 20. & seqq. de infante, & quomodo tractandus.

17 leat, ita ut omnia loca, quae sunt gracilia, constringantur, & ante laxius circumcingantur. Deinde coniunctis genibus, & talis lana interponatur, ne ita coniunctis aliquid de membranulis cassetur. Caput pannis aut laniis mundis contegatur. Vbi oportet & quomodo infantem iacere? In locis mediocriter calidis, ita ut nihil oleat, & nec valde sit lucidus locus, stratumque eius sit concavum, nec valde molle, ne multum iacendo, spina infantis aut collum contorqueat. In mediocri mollitie collocatum etiam caput infantis iacere debet. Quanto tempore faciendus est infans? Apud quosdam diebus quadraginta: apud alios sexaginta. Apud nos quamdiu integro sui corporis infans coaguletur & solidetur: quod si citius solvatur, evenire ei solent languores, dum sano corpore sunt nati. Tardius vero solvi debet, qui imbecillus est. Semel omnis fascia, & non delapsus solvimus, sed per partes paulatim. Si vero semel soluerimus eos, & corpus mundaverimus, novitate ipsa percutitur, & male accipitur. Post quot dies umbilicus infantis cadere solet? post tres vel quatuor. Vultusque quod remanet, plumbi pulvere bene curetur. Quomodo concavitates umbilici formantur? Frustum plumbi ad similitudinem denarii factum apponimus, quod possit pondere suo concavum facere. Quando oportet infantem cibum accipere primum? Cum post omnem commotionem (alias, commutationem) quietus fuerit effectus; hoc est, post nonam (alias, octavam) vel 10. horam, talem cibum primum accipiat, qui stomachum & ventrem purgare possit, & eum nutrire, sicut est mel modice decoctum. Si enim crudum fuerit, & austerum est, & inflat: si vero paulo plus fuerit coctum, constringit. Quomodo mel ei dandum est? Nutrix debet os eius illinire, & mulsam tepidam instillare, & sic secunda die lac offerre. Cuius lac accipere debet infans? Maternum lac dare oportet: aut extraneum, non maternum, siquidem adhuc ex labore partus & turbatione, & purgatione, lac eius malum est crassum (alias, pingue) & indigestibile. Quod vero lac bonum? Bonum lac est mediocriter candidum, nec sublividum, nec gypso simile, nec subacidum, sed moderate coagulatum & stillatim in ungue leniter dilatur, nec se cito diffundat. Reliquae autem differentiae malum lac ostendunt. Maternone lacte nutriendus est infans, aut nutricis? Amabilis quidem potest a matre nutriri; verum matrona ut post partum sana esse possit, melius a nutrice potest nutriri. Vnum enim lac maturum sufficienter duobus infantibus ministratur. Post quod spatium lauacri ad mammillam applicandi sunt? Post modicum, donec omnis turbo lauacri digeratur: quicquid enim prius accipitur, corrumpitur & non nutrit. Nam & ipsa nutrix si non digesserit balneum, & exsiccatis antea mammis infantem applicet, male habebit infans. Quomodo lactari debet? Manibus acceptum infantem aliquantulum in latus ponere, & ad utrasque mammillas convertere, ut modo dextram manum infans, modo sinistram liberam habeat, & de ambabus mammis accipiat. Deinde ori eius appositam papillam teneat, & quasi latenter lac exprimatur, ne cum labore

infans didam sugere incipiat. Quoties in die infans lactari debet? Frequenter in die lactandus est, modo ex sinistra, modo ex dextra mammilla; quoniam semel, quod ei sufficiat, accipere non potest. Lassatur enim diutius lactando, aut de bono lacte cito satiatur. Non ergo determinandus est modus, sed cum visus fuerit velle, oportet eum accipere. Ita tamen ut ante lauacrum, nec in lauacro nunquam accipiat didam, ne ledatur corpus lias, cor) eius. Qui enim ante lauacrum, vel in lauacro lactantur, scias eos variis & multis languoribus detineri. Quibus signis intelligere possumus, infantem debere cibum accipere? Eo quod praecordia eius concava sunt, vel etiam tantum tempus transiit, ut cibum accipere debeat, os etiam aperiat, & labia frequentius moueat, & cum in lacte intinctum digitum labiis eorum applicuerimus, sugant eum quodam ploratu. Quomodo vero apprehendimus, an propter cibum ploret, an non? Fasciam principaliter inspiciamus, ne stricte sit, ne iacens pedem aut manum contorqueat, aut aliqua re puncturam senserit, aut de abundantia cibi, aut lactis ploret, inspicere: & ne a plurimis coopertoriis gravatus; aut ne paruitate eorum perfrigerit, aut nimio sole aestuaverit. Si vero aliqua re punctus est, subito plorare incipit. Si coopertoria plurima vel parva, id visu probatur & tactu: aut enim frigidus esse debet, aut multum calidus. Si autem abundantia lactis vel cibi premitur, huc atque illuc se proicit, & plena praecordia habet. Si aestuaverit, cum anhelitu rubet: si vero aliqua causa inaequalitatis est, & ille languet, & lac accipere non vult, & maior effectus est. Ex praedictis signis omnes ploratus eius separari possunt. Quomodo infantem a lacte deducere debemus? Post annum & sex menses, aut suppleto biennio, dentibus iam abundantibus & firmis, quod possint non tantum cibum dividere, sed etiam diligenter eum manducare. Quem cibum primum infanti dare debemus? Panosum, hoc est, micas in mulsam vel in condito, vel in lacte infusas, vel succum alicuius, vel pulvis. Deinde bibere? quid ei dabimus? Aliquando aquam, aliquando vinum, aliquantisper per vasculum vitreum ad imaginem papillae formatum & pertusum, quod rusticitas. + Vtula appellat. (Nostris datur cervisiola tenuis, & recte.) Ante paucos vero dies, paulatim cibum offerre convenit, & raro ad didas applicare, & novissime ex toto lac negare, & quae amara sunt mammillis illinire. Quando gestandus est? Ante cibum gestandus est: nunquam statim post, ut non quod accepit rumpatur aut reiciatur. Quae sunt exercitia, quae facere possunt infantes? In primis ad pilam ludunt, ut altius manus extendant. Haec exercitia utilia sunt infantibus. Addit haec Bonaciolus lib. 1. Mulieb. cap. 8. quomodo infans recens natus sit tractandus. Recrementum (quod papauerculum vocitant) plus quam pro partu magnitudine, colore cruentum atque admodum atrum piceumve deicit: quomobrem quia valde tenellus est, muria pauci salis, cui admista sunt, coctus, sumach, fenugrae, origanum, eundem praeter os & nasum, circumlinire diligentiores iussere. Damum lauatrix manu dextra, laevo brachio eius pectori adacta, eum prahendat, tepida aqua aestate, hyeme calida, moderatius generosore temeto, ouorumque vitello binis adiectis,

Quomodo tractandus nuper natus infans, ex Bonaciolo.

adiectis, a proluvie quacunque nares digitis, unguitibus excisis, perpurgando, anum minimo digito adaperiendo, exquisitè pelluat. Quod plerumque bis aut ter in die (æstu potissimum) facere conducit atque expedit. Deinceps vero laugato linteolo madidum infantem deficiat; singulaque membra leuibus pressuræ efformet, ac excultrius effigiet. Vescam, ut loquere egressus facilius sit, deprimat: leuibus pannis extensus, brachijs ad costas porrectis, obuoluitur: insitistisque capitis capite aperto, peruinciatur. In ipsius nares oleum coniciatur. Denique capite eleuato super latus, quo melius pituitosa materia ex capite expurgetur, sunabulo suauius semicirculari motu quasi so, succentante quapiam, obdormiat: mellis per diem (primum scilicet) suctu contentus, nec nisi flentis propincitur. Demum usque quo parentis temperatura pristina natura restituatur, eundem nutrix interdum bis aut ter lactet. Tantisper enim puerpera lac in pumicis modum coit, quod colostrum appellatur, ac propterea infantes qui hoc lactauerint, colostrati: sed in nutricis potius lac exhibere conuenit, quando matris exitiosum sit. Maternum tamen praferatur si bonum sit; ut mox de nutrice dicturi sumus. At cum umbilici exesa vellere pars ceciderit, (quod post tres aut quatuor dies iugiter accidit) cochlearum cinis utiliter imponitur. Paulus vero Aegineta lib. 1. cap. 5. hæc de educatione pueri paucis scribit: Primum infans recens natus melle nutriri debet; mox lacte: idque bis in die, aut plurimum ter. Cum autem promptè & alacriter puer assumit, ac spes est, eum posse quod oblatum est concoquere, tunc & cibus solidior recte datur, qui non ipsum repleat. At si forte imprudentibus nobis puer repletus fuerit, somniculosior autem statim & torpidus magis euadat, venter intumescat infleturque, & vrina aquosiores reddantur, quæ repletionis nota sunt, nihil exhibere oportet, donec cabes prius ingestos consumserit. Abunde autem fuerit duobus annis lacte puerum enutrire, inde ad cibos solidiores transgredi. Conuulsione plerique ac praecipue corpulentissimi (ut de morbis pauca adiciamus) habitissimi, & lacte copiosiore crassioreque vscantes, atque astrictas aluos habentes (quippe qui satietate vexentur, & recrementis squalescant) ac potissimum plenilunio, corripiti assolent. Quo morbo omnes ferme ante septimum solem pereunt: ob id die septimo (iis superstitis) tanquam eorum salutem magis credamus, nomina imponuntur. Proinde incur asini, panace modica admixta, in os instillatum a comitialibus morbis & aliis, quadraginta iugiter diebus substitutum, puerperia tuetur. Cerebrum capra per annulum aureum traiectum, priusquam lac decur infantibus, contra comitiales ceterosque infantium morbos instillatur. Ceterum præcox illis risus atque celerissimus, lacrymave ante quadragesimum solem maxima ex parte haudquaquam conceduntur; quanquam die eodem quo satus esset, Zoroastrem vnum risisse lectitauimus: sicuti & Crassum, Crassi in Parthis interempti auum (ob idque Agelastum appellatum) nunquam risisse ferunt, quomodo & plurimos nunquam fuisse: alios quoque multos, quod rarum sit, maximæ sapientiæ auctores, veluti Socratem, Diogenem

Cynicum, Heraclitum, eodem semper vultu, nec aut hilari magis aut turbato (quales a pueris & ætate nominant) extitisse. Qui sane animi tenor in rigorem quandam, naturæque duram atque inflexibilem toruitatem summopere exit, humanos etiamnum affectus proculdubio adimit. At quoquo modo res se habeat, si ante quadragesimum diem risus eruperit, ominosum id atque timoris plenum vulgo iudicatur. Cuius temporis partem plurimum obdormiunt. Etenim homini animum vni per aliquot menses somno confectum gignito premi sopiriq; datum est. Subinde iam longior indies insomnia. Somniare etiamnum eos cominus compertum est. Nam & pauore expectantur, & suctum imitantur. Plerique vero nunquam: quibus exitiale contra somniorum assuetudinem indicium fuisse, multorum exemplis veteres inuenere. Insper recens natis vertex adeo mollis est, ut cerebrum palpitare perpendatur; qui sane serius duratur. Quinimo Zoroastri ita palpitasse, ut impositam manum valentissime repelleret, futuræ scientiæ prælagio constat. Pueris primores 7. mense dentes gignuntur: priusque his superiores, illis inferiores; at omnibus fere prius parte supera haud dubium est. Ex quibus qui primus ceciderit, ut terram non attingat, in armillam inclusus, in brachioque assidue habitus, muliebrium locorum dolores efficacissime prohibet 7. eosdem anno decidere, ac alios suffici, dilucet. Quosdam & cum dentibus (tamen si rarer) nasci, sicut Marcum Curtium (qui ob id Dentatus cognominatus est) & Cn. Papirium Carbonem, præclaros viros, inclaret. Id quidem in viris mali fuisse auspicii, antiquitas negauit. At in mulieribus ea res infauti ominis atq; inauspicati exempli Regum temporibus extitit, quando Valeriam, ita natam, ciuitati Sessapiæ, ea tempestate florentissimæ, in quam deportata fuit, aruspicum responso vaticinante, veridico exitio fuisse dignissimam auctores scriptitauerunt. Aliqui etiamnum dentium vice osse continuo superna oris parte gignuntur; sicuti Prusiæ regis Bithynorum filium fuisse tradunt. Sed ex dentibus quaterni primi a Græcis nominantur, ii exinde quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. Ultra quos vtrinque; fere maxillares seu molares quaterni sunt; præterquam in iis, in quibus tres vltimi, qui sero gigni solent, non increuerunt: horum vtrinque; bini caninis proximiores, columellares vocantur. Quare viceni omnes erunt. Ex quibus primores singulis radicibus, maxillares utique geminis, quidam etiamnum ternis quaternisque nuntur. Atque ex radice eadem in pueris nouus (altero deciso) dens subit, qui multo sæpius prior expellit. Interdum vero, aut supra aut infra eum sese ostendit. Sed non desunt, quibus tricenos binos viris dentes attribuire, seminis numerum minorem (excepta turdulorum gente) placuerit. Quibus non plures fuere, longioris vitæ promitti spatia putant. Paulus ad dentium ortu inquit: Dentunt 7. mense pueri, quando inflammationes gingivarum, maxillarum, & tendinum, aliquando conuulsiones etiam, eueniunt.

24.

prohani corporis educationem plurimum adfert momenti. Duodecimum annum egressi, ad grammaticos, & geometras mittendi sunt; corpusque eorum exercere oportet. A quarto decimo, usque ad primum & vigesimum, mathematicis disciplinis, & sapientiae studio incumbunt: exercitiis pluribus propter corporis robur creduntur; ut & animo & corpore laborantes, a libidinis impetu coerceantur. Hic etiam vinum circumcidendum est. Aetate florentibus educatio absoluta tum animi tum corporis congruit, eoque exercitiis omnibus, praesertim quibusvisque assuevit utendum, cibo item pleniore & valentiore. Declinantibus autem moderata competit animi & corporis educatio. Exercitia enim qualiacunque fuerint, pro horum ratione imminuere oportet: alimento detrahendum, ut quorum habitus iam frigescere incipiat. Sed haec de regimine infantis, & etiam puerorum affectibus ac morbis, dicta sufficiunt; cum & de iis passim in nostris Observationibus dixerimus. Quod si quis plenior de puerorum morbis & symptomatis, tum dignoscendis, tum curandis doctrinam desideret, his adiungere poterit libellum illum Sebastiani Austrii Rubicaquensis, De puerorum morbis. Nunc de nutrice tam ex veteribus, quam Neotericis pauca adiciamus.

DE NUTRICE, VEL REGIMINE NUTRICIS.

Quamnam sit ad nutriendum apta, docet Mosch. nempe: Adolescentia, quae pulcro etiam sui corporis sit colore, & iam bis pepererit, & pectus latum habeat; ipsaeque mammae, neque nimium laxae, & rugosae, neque interim valde reusas papillae, neque multum graciles, neque valde breues, & quae non multas cavernas habet: neque iterum parvae & brevis, animosa, & quae cum integro affectu puerum amare possit, & qua nunquam irascatur, si fieri potest, grata & munda sit. Eodem modo & Paulus. Deligi nutrix debet nulli morbo obnoxia, aetate mediocri, ita ut iunior quinque & viginti annos compleverit, grandior quinque & triginta non excedat: pectore sit amplo, magnis mammis, papillisque, neque conniventibus, neque auersis: reliquo corpore nec admodum obeso, nec nimium gracili. Praeterea magnum est infanti commodum, si nutrix non multum ante pepererit, magisque si masculum. Ita quoque Erotis: Iuvenem oportet esse nutricem, clarum colorem cum albedine & rubore permixtum habentem, quae non sit partui vicina, neque multum a partu remota. Non sit maculosa: neque infirma, neque nimis grossas habeat mamillas: pectus grossum & amplum: pinguis sit moderatiter. Vitanda ei sunt (inquit Paulus loco citato) admodum siccantia, salsa, acris, acerba, & valide calfacientia. Item odores tum foedi tum suaves praeter modum, condimenta aliaque acris nocent. Ad hac Venere nutrix abstineat: manus humerosque molendo texendoque exerceat: puerum vlnis gestet, ubi tres iam menses quatuorve excesserit. Ita quoque Erotis: Non comedat salsa, nec acuta, nec stiptica, nec porros aut cepas, neque ceteras species, quae admiscuntur cibariis pro sapore, ut piper, allium, erucam: & praecipue vites

allium, solitudinem, ac sibi a menstruum provocazione caueat. Qua vita agenda est nutrix? Communiter sicut omnes homines, ut sana esse possit. Exerceri ergo debet lauacro, vel perunctione corpus reficere, cibumque sufficienter sumere, semperque ebriositatem & indigestionem vitare. Quae sunt exercitia, quae manibus nutricis fieri possunt? Exercere se debet nutrix in aliquo opere, praesertim partibus supernis, ut lac plurimum & digestum habere valeat: & si fieri potest, ad virum suum non accedat, ne per usum Venereum purgatio se commoveat; qua superueniente, copiositas lactis exterminetur aut exstinguatur. Primis vero diebus, quibus lactare incipit, simplicem cibum ac leuem accipiat, & aquam bibat, ne solidum lac mox natis infantibus cum difficultate per angustos gutturus meatus descendat. Et cum parvuli, accedentibus diebus & menses, solidantur, & fortiores fiunt, iam etiam solidiorum & fortiorum cibum capere nutrix incipiat. Postea vero vinum sic ut & conditum subiungat. Et si ita per ordinem actum fuerit, ut docuimus, infans sine laesione & sine indignatione saluus custodiri potest. Nam si nutrix ebrietati deseruiat, infans infirmabitur. Infans namque seperatus a matre, non praevaleret, haec & his similia sustinere. Sicut enim ramusculi, dum adhuc in eadem arbore consistunt, unde nati sunt, sustinent tempestates & ventos; separati vero ab arbore, inserti in alia, non praevalent sustinere, quousque radicem infigant. At laudatissimum lac est, moderatum spissitudine, copia, colore, odore, & gustu. Commendatur & quod in ungulam pollicis instillatum, eo inclinato ad lucem, neque subito neque tarde videtur defluere. Iam vero in hunc modum probari potest: infuso lacti in vas vitreum, coaguli exiguum admiscetur, digitisq; agitur: in quo, postquam concreuerit, inspicietur, num casei portior minor quam serum fuerit. Hoc enim lac inutile est: contrarium huic, concoctu contumax: probatissimum, quod utraq; habet mediocritia. Et sic lac minuatur (inquit Erotis) pulvis de farina fabarum, & similiter risi & de pane similis, cum lacte & zacchar. facta, dentur ei ad sorbendum: quibus augere etur lac: in quantum decoctione parum de semine feniculi admisceatur. Si autem lac eius fuerit grossum, nutrimentum ipsius subtiliandum erit; & ita etiam cogatur laborare. Cui insuper dandus est syrupus acetosus, & vinum subtile. Si vero lac eius fuerit subtile, nutrimenta sint grossa & fortia, & somnis utatur longioribus. Quod si venter pueri solutus sit, dentur nutrici, quae constipant. Quomodo lac vitiatum corrigatur, docet etiam Paulus lib. 1. cap. 4. his verbis: Lac vitiatum corrigi debet. Si crassius fuerit, pituita vomitu elicietur, qui optime oxymelite epoto citatur: laboribus cibum praecedentibus eadem extenuabitur. Tunc nimirum in cibo conducunt, origanum, hyssopum, satureia, scandix, & thymus, item radícula exigua, vetusque fassamentum cum oxymelite. At si acrius, tenuiusque lac euaserit, multis quidem laboribus nutricem leuare, sorbitionibus autem & carnibus suillis, saepeque & vini dulcis potu reficere conuenit. Si lac fuerit

2
Ex Marmaria
gynaeceum.3
Paulus lib. 1.
cap. 3 de lacte
nutricis.

Erotis.

Quomodo lac
vitiatum cor-
rigatur, etc
Paulo.

4

De nutrice, ex
Mosch. cap. 18.
in parte 2.
Harmon. Gyna-
eciorum.Paulus lib. 1.
2. De nutrice.Erotis de pass.
mul. cap. 19 de
electione nutri-
cis.Vitanda nutri-
ci ex Paulo.

Ex Erotis.

lac fuerit imminutum, sorbitionibus & pleniori modo sustentanda est, vinum dulce potui dabitur: pectus & mamillas perfricare oportet. Quibusdam cucurbitula quoque defixa abunde praestitit. Medicamenta vero et si lacti generando proficere quidem aliquid sciam; non tamen frequenter ipsis uti praeceperim, ut quæ violentius consumant. Est autem fœniculi radix, & sem. ptisanæ incocta; item cythi folia ex vino nigro aut ptisana: melanchion dulce & anethum, pastinacæ radix atque semen. Quæ calida prius tribrata, admoventur. Omne vero lac vitiosum, siue crassum, siue acre fuerit, & secundum puerum, qui prius suxerit, eadem qualitate inficit. Lac autem acre nunquam ieiuno exhiberi debet, fœtorem eius vinum odoratum & cibi dulces emendare possunt. De caseato lacte ipse 3. lib. cap. de mamillis idem tractat. Quid est faciendum, si nutritis lac fuerit exterminatum? Si hoc contigerit, alterum mamillas accipiat: vel si non sit aliud, cuius lac exterminatum sit, competenti diligentia prouidendum est. & si lapsam est, cibi & potionibus competentibus confortetur. Secundum auctoritatem etiam antiquorum, vbera omnium pecorum manducata, sicut vespertilionum etiam combustorum cineres, & noctuæ cum vino bibere dabant, vel cum aqua soluta mammis illinebant. Quæ nos omnia reprobamus: importunitas enim hæc stomachum exterminat, & cibum corrumpit. Illis vero, quæ plusquam debent, lac habent, & fortioribus exercitiis & laboribus, & stypticis rebus minuatur. Si vero spissum est, accipiat cibum digestibilem, & qui modice nutrice possit, neque siccus sit; aquam bibat, & quotidiano lauacro utatur. Nam & nutriti cibos saluos accipere non permitimus, quoniam paruulum corrumpunt, & lac & vires infans minuunt. Nutrix vero cibos bonos & succos, qui facile digeruntur accipiat. Potiones, quæ stomachum custodire valeant, & lac augere, bibat. Illam vero, quæ aquosum lac habet, rarius oportet lauare, & vinum bibat, & cibum accipiat solidum, sicut & sunt pulres duræ, oua elixa, frigida; & porcina caprinaue carne utatur. A somno expugnata, quid facere oportet nutricem? Deambulare modice, mammas fricare, ut lac, quod somnus constrinxit, solvatur, & sic infans applicetur. Subinde (ut diximus antea De regimine infantis) maternum lac potius sugat: quippe quod alimoniam, qua, dum in utero infans erat, alebatur, perquam simile existat: muliebria namque in vbera delatæ concoctione lactescunt, & ob id, eidem vel maxime conueniens: quod etiamnum quotidiano experimēto compertum est, propterea, quod maternis mamillis puerperii ori admotis, alliciatur, ac denique quæque eidem officerent, arceantur. Etenim a partu purgationibusque lactis copia excitatur, adeo ut plerisque non modo de papillis, sed & passim per vbera, aliquibus etiam per alas, effluat: in posterum quoque quoties nec concoquatur, neque exeat, sed redundet supra modum succus, globuli obdurefcunt, intus

mescentque. Quas murinum fimum aqua pluuiæ dilutum, reficit. Eisdem a partu adeps anseris cum rosaceo & araneo, custodit. Mammis puerperio vexatis, otidum adipem vtilem esse inuentum est. Anserino adipe mammis perunctis, dolores mulceri existimant. At ubi lactis putrescentis vberitate atque affluentia mamillæ rubore suffusæ obdurefcunt, inflammenturque, quod die tertio omnibus maxima ex parte obuenit; muricum vel purpuræ testarum cinis cum melle, efficaciter sanant. Atque aduersum eas, quæ eam fortunam inciderint, plerique Medici se Medicos non inueniunt. Ego (inquit Bonaciolus) certe scio (pace ac venia dicere liceat) raro quampiam, quæ se illis credidisset, hinc pesti ereptam. Verum ita nos eius curationem iis, quæ infra præscripta sunt, intra quartum diem expediuimus: Abrotani, menthe, apii ana m. j. psylli, acacie, gallarum ana ℥ j. cumini ℥ ℔. radic. althææ m. j. castorei ℥ ℔. seminis lini ℥ ij. radic. brassicæ, rubræ vstarum ℥ xij. cancerorum fluuiatilium exustorum totidem: Hæc cum in aqua menthe, quod sufficit, subferbuerint, donec pars tertia decesserit, mamma savius foueantur. Mox a fomento emplastrum tali illinantur: Acacie ℥ ij. cyclaminis ℥ j. mucilaginis, seminis lini, psylli ana ℥ j. ex succo apii quod sufficit, emplastrum molle confice. Subinde, tempore procedente, sandaracha, myrrhaque adiciendæ sunt, sandaracha præponderante: quæ, si mammas obdurent, foris foris maluarum, ac radicem althææ, ex aqua fontium ad tertias decoctarum, præstanter succurritur. Hercules, a partu obdictas causas duriciam iis accidere, in confesso est. Quandoquidem vbera tota fungosa exstant: adeo ut si casu aliquo pilum mulier poculo hauerit, dolor in mammis (quod malum pilare vocitant) nimirum moueatur: neque aptius sedatur, donec vel sponte vel mulatra pressus pilus egrediatur. Canceri etiamnum fluuiatiles illiti, vel marini, pilos in mamma, vel muricum carnes appositæ tollunt. Sed quoniam natura non ita fert, ut succus idem pluribus vna locis erumpere possit, hinc quam diu e mammis lac emanauerit, magna ex parte menstruæ purgationes astringuntur; assidue dixerim, haud perpetuo, quando & iam quibusdam lactantibus (ut nos ipsi nouimus) muliebria proruperint. Lac autem, donec mulier conceperit asseruari, tum autem desinere atque aboleri, tam in homine, quam in quadrupedum viuiparo genere, inclaret. Quanquam fœminis partum alentibus, si ex eodem viro rursus conceperint, lac minime corrumpi, Nigidius auctor est. At si quid (utpote quia lac integrum non sit, aut quia parens vicia, languida, aut nobilis, admodumque delitiosa sit) matrem puerulam lactare inhibuerit, nutrix eligenda, cuius ætas inter viginti quinque, & triginta quinque annos: sit viridi coloris, fortis ac robusti colli, pectorosa, musculosa, dura ac multa carnis, non obesa, non gracilis: cuius etiam mamma solida ac firma sint, mediæ magnitudinem modicamque duritudinem obtinentes. [Noui & ego nutrices, quæ

de Harmentis
puerperarum.


Maternum lac
referunt ex
Bonaciolo.

10 magnas mammas habebant, & valde somnolentæ erant, cumque noctu lactarent infantes, ac statim somniculo & dormirent, eos opprèssere, ac suffocationis causam procul dubio dedere. Ideo præstat nutricem, postquam infanti lac exhibitum fuit, eundem in cunabulis ponere.] Sit autem iisdem lac plurimum, odoratum, candidum, perdulce, aquabile, neque admodum crassum, neque tenue, cuius super vitreum umbonem recte probatio fit, si neq; prorsus fluat, neque umbone reclinato omnino constet: aut si in vasculo illius portio emulgeatur, myrrha tantillo adiecto, sero pariter atque casco pars aqua detur. Probatissimum etiam, si in vngue hæreat, nec defluat, atque quod a partu quadraginta & quinque, sexaginta vel solibus abscesserit. Si matrem iusto partu illa pepererit, neque abortiri assueta. Si laudatorum morum exstiterit, qua neque ocysime anima passionibus afficiatur, neque penitus obtusi sensus aut stolidi sit: qua lactare prohibent. Quæ nihilominus admonenda est, ne concumbat, ut probatus cibarius vescatur: ut quaque vice ante lactationem partui mellis paulillum ex paucis vino lingendum tribuat: item ut lactis quicquam mulgeat, ut mammula pressione puerperii suctionem iuuet, ne forte vehementi succtu, & gula instrumenta obladantur, & malarum ossa luxentur, quod sa-

12 pius contingit: ut singulis lactationibus non vberem lactis copiam, sed parcam exhibeat. Quod si defuerit, remedia adhibenda sunt. Nam suillum lac potum deficientia puerperarum vbera mire replet. Asininus lien inueteratus ex aqua illitus mammarum abundantiam præstat. Terreni vermes cum mulso poti lac deuocant, atq; perniciosa sorptui data mulieribus. Glauciscus e iure sumitur, & smarides cum ptisana sumta, vel cum fœniculo decocta, lactis copiam faciunt. Item cancri cum lapathio & apio in iure cocti vbertatem præstant. Itaque observati, puerulus & bene habebit, & commode lactabit. Hactenus Bonaciolus. Et ita ex præcedentibus auctoribus, quibus modis nutrix regenda sit, constat.

Absoluto igitur hoc libro vigesimo octauo de mulierum affectibus, superest adhuc liber vigesimus nonus, de extremis quibusdam partibus corporis; ut ita earum morbos & causas accuratius pariter tractemus. Transibimus itaque ad sanandas podagras & chiragras, & articulorum dolores, grauissimos plerumque morbos; quique nonnullis sæpe ut peculiare adherent. Ita tota cyclopædia nostrarum Observationum de morbis præcipue ad Medicum spectantibus absoluitur.

FINIS LIBRI VIGESIMIOCTAVI



I N D E X

R E R V M , V E R B O R V M , M O R -

B O R V M , C V R A T I O N V M , C A V S S A R V M , S I G N O R V M ,

in his Observationibus Foresti contentarum.

Numerus prior sectiones libri, sunt enim tres, quarum secunda XI. libro, altera XVI. incipit: posterior paginam, litera A, B. columnas denotat.

Sicubi vero occurrat l. denotat librum, ob. observationem.

<p>A Abscessus calidus, biliosus 3. 176. b. sanguineus, frigidus, pituitosus, melancholicus 3. 177. a Abscessus, quare in singulis partibus, aut membris: ut Parineum, Penis, &c. Abscessus in gibbo apertus & pediculis re- fertus, 1. 245. b Abscessus quomodo rumpendus, 3. 695 Abortus ab immensitate partus, 3. 743 a nidore candelæ extinctæ, 3. 740 Abortus causæ variæ, 3. 741. 742. 3. 744 745 Abortus signa 3. 742. prognostica 3. 743. differentia a partu naturali, 3. 749 Abortus differentiæ a corruptione, effluxio- ne & eiectione, 3. 742 Accessiones Tertianæ nothæ modo lon- giores, modo breviores, 1. 74. b Accessiones febrium cur somnū inducant. 1. 365 b Accessionis febris tempore nihil prorsus fo- ris admoendum, 1. 71. a in Accessionibus febrium qualis curatio adhibenda 1. 366. a Accessionum febris diversitatis causæ, & causæ ordinis servari, 1. 105. b. & caus- sæ ordinis peruersi, 1. 106. a causæ redi- tus. ibid. Aceti usus, 1. 292. a Achor, 1. 247. b Achor, 1. 246. b. achores, 1. 247. a Achoris causæ, 1. 247. b. notæ, præfagia. pag. seq. ad Achoras, 1. 250. a Achor vide Tinea & Saphatum. Acus per lotium emicta, 2. 166 Acus ænea perforato stomacho extrusa ex- trinsecus, 2. 166 Adolescens ob nimiam venerem mortuus, 3. 591 Æger apud Valescum, cum videretur eua- nuisse, 12. die ex spasmo cynico obiit, 1. 484. a Æger digitum in nares demittens, lethale 1. 30. a Ægris assistere mulierculæ non debent, & ratio, 1. 23. b Ægidii versus de procreatione hominis in vtero, 3. 719 Ægilops & fistula lacrymantis, 2. 23. a Ægilops, 2. 22. a Ægilopis causæ, prognostica, 2. 22. b Aer putrefactus pestem denuntiat, 1. 165. b Aer externus considerandus in euacuatio- nibus, 1. 208. b Aere corrupto quomodo pestis vitanda, 1. 174. a Ægyptiorum olim mos in curandis ægris, 1. 411. b Aeris turbiditas vnde, 1. 12. obf. 12</p>	<p>Æstus immodicus in febre acuta lethali, 1. 229. b Æstus quomodo dolorem capitis efficit, 1. 256. a Aetius, quibus ad pudendorum depascen- tias remediis utatur, 3. 565. quibus vehe- menter refrigerantia applicet, 3. 575. eius locus de Ganglio, 3. 570 Agarici drachma vna sumta vteri strangu- latum perfanat, 3. 678 Agglutinantia styptica, 3. 169. b Agrestes mulieres profluuium muliebri raro detineri, 3. 656 Agrypnocoma, 1. 359. a ad Affectiones inueteratas variæ curæ, 1. 15. obf. 32 Affectus quis sit in phrenitide, 1. 312 Agarici laus, 1. 395. a Agnus castus, vide Vitex. Agrimonia valet ad testium inflationem, 3. 593 Aguelloni Taurini filius curatus ab ulcere penis, 3. 67 Ajax maniacus, 1. 343. a Alatum fœtor, 3. 132. a Albumen oui in penem iaculatum, 3. 3. 566 Alcmaria cur a peste libera magis, quam a- liæ vires, 1. 162. a Alcmariana mulier empiricorum opera in erosione & ulcere vteri vsa in cachexiam prolapsa, 3. 651 Alcmariana puella naturalibus causis im- perforata nata, quomodo curata, 3. 707 Alexandri Benedicti Veronensis faceta hi- storia de sene libidinoso, 3. 591 Alexii Pedemontani remedium ad excref- centes carunculas, 3. 570 Algidra, 1. 194. a Alhasba. ibid. Alimenta & cibi quomodo facile corrum- pantur, 3. 227. b Alipasmata, 1. 763 ἀλλαντῖδης, 3. 567 Aloes pulvis, 3. 565 ad quæ utilis, 3. 239. b Alopecia ex morbo Gallico, 1. 238. b. quando ab humorum 1. 238. b. quando ab humorum ptela. 238. a Alopecia, 1. 238. a Alopecia in iuvene quodam, simul pletho- ra laborante, 1. 238. b eius notæ, 1. 239. a curatio. ibid. Alopecia quæ lepram præfagebat, 1. 238. a Alopecia & ophiasis distinctio, 1. 238. a. si- gna vtriusque communia. ibid. causæ, ibid. curatio, 246. a ad Alopecias, 1. 240. a Alopeciam indubitatum morbi gallici si- gnum esse, 1. 323. a Aberrantia & refrigerantia, 1. 323. a</p>	<p>Altharastus Anglus leuiori phrenitide la- borans, sanguinem per totum annum cum vrina emittens, 3. 560. eius historia, & mors, 3. 560. & seqq. Altoim, 1. 179. b Alui cita deiectio, 3. 347. b. eius causæ, ibid. Alui profluuium quid sit, 3. 363. a Alui fluxus in hæctica cura, 1. 124 Alui fluor perpetuus in febre pestilenti, an sit sistendus, 1. 188. b Alui profluuium cum tussi, 3. 382. b. cum febre. ib. cum phthisi. p. seq. Aluus largius succenda, si venæ sectio de- negetur, 1. 280. b Alui fluxus, 1. 132. b Alui profluuium quando malum signū sit in pleuritide, aut pulmonia, quando ve- ro non, 3. 71. b Alui fluxus, 1. 232. b Aluum agre excernentes, 3. 346. b Amati Lusitani opinio de missione sangui- nis e cubito in retentis mensib. ex pleni- tudine, 3. 632 Amati Lusitani historia curationis prola- psus vterini, 3. 683 Amati Lusitani consilium super mola in monacha, 3. 716 Amati Lusitani historia de ulcerib. renum obfirmatis, 3. 560. experimentū ad vlcus penis carnolum, 3. 570. remedium ad re- ductionem præputii, 3. 569 Amantibus prodest longa peregrinatio, 1. 353. b Ambra & moschus gestata inuitant ad ve- nerem, 3. 717 ἀμυιον membrana, 3. 763 Amentia, 1. 354. b Amor, 1. 352. a. amoris vesani signa, ibid. 194. a. causæ. ibid. signa prognostica, curatio. ibid. ibid. b Amor vesanus cum morbo vterino, 1. 352. b Amoris vesani curatio duobus modis fit, 1. 191. a. 353. b 227. b. 353. b 763. Ampulla, 1. 408. b 567. Amuleta, 1. 302. a 565. Amygdala amara contra ebrietatem valēt, 1. 285. a 239. b. 1. 231. a Anacollemata, 1. 223. b ibid. Anacolemata, 1. 223. b 238. a. Anacolema seu frontale siccum. ibid. Anchilops, 2. 22. a 238. b. ἀνὰ πλῶσιν, 1. 245. b 239. a. Anhelitus difficultas, 1. 229. b ibid. in Anasarcam prolapsa, ex abundante & longo mensium profluuiio mulier, 3. 252. a Anastomosis quid, 2. 94. a. ex quib. causis fiat, ibid. eius signa. ibid. ibid. b. Anastomosis, diapedesis, diæresis, arrosio, quomodo differant, 3. 642 Ancyloglossis, & qui vix loqui possunt, 2. 231. a 323. a. Anethum molam eiicit, 3. 724</p>
--	--	---

I N D E X

- Angina popularis multos subito interficiēs, Anorexia, 3.
 1. 152. a Anorexia, vide Inappetentia.
 Angina biliosa, 2. 155 Anorexia ex humore bilioso cum ventriculi intemperie calida, 3.
 ab Angina sanguinea curatus sine sanguinis missione, 2. 154 Antisthenis responsum, 1.
 Angina admodum periculosa in pręgnante, in qua muscoli gutturis interiores & exteriores simul inflammati erant, 2. 158 Anthracosis, lib. 11 obs. 21.
 Angina in pus mutata, & ad pulmonem & pectus conuersa, agrum pene suffocans, 2. 161 Anthrax in manu, 1.
 Angina periculosa per suppurationem finita, 2. 159 Anus & vulua vi factus vnum foramen facta, 3.
 Angina ad cor vel pulmonem, quam periculosa sit permutatio, 2. 162. signa permutatonis ib. indurationis signa, 2. 163. Anum & testiculos inter apostema, 3. 560.
 indurationis curatio ib. putrefactionis signa ib. curatio. ibid. id an recte cauterio ignito apertum. ibid.
 ex Angina latente lanio mortuus, 2. 163 Ani crista seu excrecentia, 3. 432 a
 Angina ex sanguinis repletionem cum metu Ani insignis dolor, eiusque inflammatio & strangulationis, 2. 152. Ani abscellus, 3. 436 b
 Angina admodum periculosa, 2. 147 Ani inflammationis causa, 3. 437 a
 Angina, 2. 148. eius species ex Galeno. ibid. Ani fistula. 409 b
 eius signa, 2. 149 quis sit affectus. ib. eiusdem signa. ib. Ani dolor. 409 b
 Angina & syncope multi mortui ex variolis Ani abscellus. 403 a
 & morbillis, 1. 198. b Ani fistula. 403 a
 Anhelosi, 3. 10. a Ani fistula & vlcus sinuosum, 3. 438 b
 Anima bilis & sic conturbatur, 1. 340. b Ani fistula quam hectica subsecuta fuit, 3. 439 a
 in Animi deliquio si quis obmutescat, quæ conferant, 2. 1. 6. b Ani pruritus insignis admodum molestus, 3. 435 b
 Animi deliquium ob imbecillum stomachum, 1. 215. b ex bile. ibid. ex obstructione, 1. 216. 2. ex ruptura vel sectione. ibid. Ani intertrigines, 3.
 ex dolore. ib. d. ob exsiccationem. ibid. ob siccitatem ib. b. ex alicuius rei bene malee olentis. ibid. b. ex retractione vteri ad latus, vel sursum, 1. 217. a. ex immoderato fluxu menstruum. ibid. ex vermibus. ibid.
 Animi deliquium ob metum, 1. 214. a. ex tristitia. ibid. b. timore, pauore, excaudescencia, quomodo fiat & curetur. ibid. b. ob virum imbecillitatem. ibidem.
 Animi deliquium omne communi remedio curatur, 1. 215. b
 Animi defectio ex copia humorum, 1. 211. b Animi procidentia & exitus, 3. 423 a. extensio præcedente, 3.
 ob frigiditatem. ibid. Aphorismi aliquot de infantium bonalitudine tuenda, 3.
 Animi deliquium ab vtero, 3. 117. b. ex stomacho. ibid. d. Paralysis vniuersalis cum animi deliquio leui & asthma, 3. 1. 8. b. Aphthæ, & oris vlcera, 2.
 Animi defectio ex caliditate, 1. 211. b Aphthæ, 1.
 Animi deliquium ex sudore, 1. 213. a. ex sanguinis missione, 1. 213. b. Aphthæ in gutture ex fœtore, 3.
 Animi deliquium vide Syncope. Aphthas flauas cum maximo seruore iuuenis biliosus habens, 2.
 Animi angustia cum tristitia, 1. 222. a Apophlegmatismi, 1.
 Animæ instrumentum spiritus in cerebri cavitatibus, 1. 362. b Apoplexia differt a sopore, 1.
 Animæ creatio a Deo: sed quo tempore infundatur, furor ac frustitia est inquirere, 3. a lethargo, a catalepsi, ab epilepsia, a paralyti, a syncope, ab vteri strangulatione, 1.
 Animo deficientes in venæ sectione, quomodo curandi, 1. 213. b & seq. Apoplexia curata ægri facile lacrymantur, 1. 410 a
 Animo deficientes ob subitas euacuationes, quomodo tractandi, 1. 212. b Apoplexia correpti ex austriua & humida constitutione, 1. 401 a
 ob cholera, diarrhoeam, quomodo ibid. Apoplexia ex iactu teli supra caput, ex lauto capite, ex alapa, ex pugno, ex terrore, horrore, ex ictu bombardæ, 1. 694
 ibid. Apoplexia absque ronchis & spuma quandoque lethalis, 1. 409 a. quo tempore maxime fiat. ibid.
 Animalia degentia in aquis, vel si aqua vrantur, quomodo peste inficiantur, & homines non, 1. 66. b Apoplexia lethalis, non tamen subito interficiens, 1. 407 b
 Animalia pestem præfagientia, 1. 166. a latebras suas destituentia. ibid. Apoplexia, 1. 400 a. unde ita dicta, 1. 401 a
 Anodyna quando competant, 3. 420. b Apoplexia, 1. 400 a. unde ita dicta, 1. 401 a. cur morbus attonitus sit dictus. ibid.
 143. a diem sepeliendus. ibid. b Apoplexia vehementissima & lethalis, 1. 403 b. apoplexiæ quatuor differ. species vel gradus ib. hominem subito interficiens, 405 a
 Apoplexia leuis in paralyfin mutata, 1. 411 a
 Apoplexia ex melancholia orta, & curata, 1. 416 a
 Apoplexia ex contusione, casu, ictu, vulnere, quomodo curetur, 1. 418 a
 Apoplexiæ species indicantia signa, 1. 407 a
 Apoplexiæ diuersa genera, 1. 401. b & 402 a
 Apoplexia in paralyfin desinens curata, 1. 409 b
 Apoplexiæ causæ præcætarcticæ variæ, 1. 403 a
 Apoplexiam præfagientia signa, 1. 404 a indicantia, 405 a
 Apoplexiæ sanguineæ, pituitosæ, melancholicæ, phlegmonosæ signa, 407. b signa prognostica, 1. 408 a
 Apoplexiam curandi indicationes, 1. 412 a.
 Apoplectici cur ronchillant, 1. 401 a
 Apoplecticus curatus ex sanguisugis toti corpori admotis, 1. 414 a
 Apostema renum frigidum, 3. 494 b
 Apostema frigidum ventriculi ac diuturnum in abscellum & pus transmutatum, 3. 176 a
 Apostema meri seu œsophagi sanguineum, 1. 15. obs. 31
 Apostema intercutaneum, 1. 252 a
 Apostema calidum, 3. 127 a
 Apostema frigidum, ibid.
 Apostema per viam congestionis, qui fiat; 3. 565
 plura de apostematibus quære in singulis partibus aut membris, vt Scrotum, Testis, &c.
 Apostemata hepatis & abdominis quid differant, 3. 216 a
 quid apostemata hepatis & venarum mesaraicarum. ibid.
 Apostemata vuluæ quomodo tractanda, 3. 694
 Apostematum splenis distinctio, 3. 280 a
 eius curatio. ibid.
 Apostematum hepatis discrimina, 3. 215 b
 Apostematis seu abscellus frigidi & pituitosi curatio, 3. 178 a
 Apostolorum vnguentum, 3. 564
 Apozema, 1. 98 b
 Apozema faciens ad gonorrhæam, 3. 580
 Appetentia dissoluta, 1. 229 a
 Appetentia canina, 3. 138. b
 pars affecta, 3. 139 a
 signa, causa, causarum cognitio. ibid.
 prognostica. ibid.
 curatio ex frigida intemperie, vel succis frigidis. ibid. b
 Appilatio in quibus differat ab apostemate, 3. 282 a
 Aqua frigida vtrum in syncho vel ardente febre magis conueniat, 1. 20 b
 Aqua frigida quando detur in ephemera, 1. 7 a
 Aqua frigida vtrum danda phreniticis, 1. 321 b
 Aqua gelida in colicis doloribus ab acrimonia, 3. 327 a
 Aqua

I N D E X.

- A 2

I N D E X

- Branchus vocis que raucedo diuturna, l. 15. obf. 32
Branchus seu raucedo, l. 10 obf. 134
Branchos, l.
Brume, l.
Βραχυχονδρ, 3.
Bruchus in siliqua carnea reclusus, vomitu reiectus 3.
Brutorum femellæ cur molam non concipiant, 3.
Βουβαροχονδρ, vide Hernia inguinalis.
Bubo, l.
Bubo sub alia sinistra, l.
Bubo insignis sub ala, l.
Bubo exitialis, l.
Bubo sub ala sinistra, l.
Bubonis fausta curatio.
Bubones pestiferi curati, l.
Bubonis pestiferi præsentia, l. 179 a. curatio. ibid.
Buboni quæ conferant.
ob Bubones febricitantium curatio, l. 7 b
Bulmos, 3.
Bulla, l.
Buris Auicennæ quid, 3.
Buxi emplastrum, eiusque vires, 3.

C.
Cachexia, 3.
causæ, signa
Cachexia ex mensibus retentis, & ex mensum nimia profusione, 3.
signa, curatio, ibid. b ex immodico fluxu sanguinis narium, 3.
Cachexia Chirurgus mortuus, 3.
Cadaver in somnis duplex, l.
Calculi præsentia ex parte urinae, 3. 468 b
Calculi cur senibus non generentur, 3. 537 a
de Calculi generationis modo controuersia medicorum, 3.
Calculi in vesica generationis modus, 3. 466 a
Calculus rerum cum ingenti dolore, 3. 469. b & urinae retentione.
curatio. 471. 473
cum omnimoda lotii retentione, 3. 474
b quo tempore urinam cientia, & lapidem continuentia exhibenda, 3. 476
Calculus in vterere lotium omnino retinens, 3.
Calculus cur magis in pueris quam in adultis generetur, 3.
Calculus renum qua parte generetur, 3. 465 b
Calculi materia, 3.
Calculus in renibus confirmatus, cum intolerabili lumborum dolore, ac urinae difficultate, 3.
Calculus in renibus per periodos dolorem inferens, qui dolor admodum insignis, vno clystere euauit, 3.
Calculus renum, 3.
Calculus vesicæ, per vulnus in quo facta fuerat prius incisio longo tempore, sponte reiectus, 3. 537 a. post mortem in vesica inuentus.
Calculus magnus vesicæ, qui incisus extrahi non potuit, unde tandem æger post diuturnos cruciatus mortuus est, 3. 541 a
Calculus vesicæ excisus, urina mucilaginosam permanebat, ut rursus metus esset de nouo calculo, 3.
Calculus renis in vterere impactus cum crudelissimo dolore, & urinae omnimoda suppressione, 3. 478 a
Calculi futuri signa, 3. 468 b
Calculi causa efficiens, 3. 143 a
Calculi in renibus generationis motus, 3. 599 466
Calculi renum signa demonstratiua, 3. 161 b 468 a
Calculo renum & morbo articulari matrona quadam laborans, 3. 725
Calculo vesicæ puer 10. annor. laborans, 3. 169 a 535 a
Calculosi quomodo facile reciduum patientur, 3. 181. b
182 a
179 a Caldaria balnea, 3.
178 a Calderiæ aquæ ad difficultatem urinae vtilis, 3.
184 b Calida medicamenta penis vitis quando non conueniant 3.
Callus in quo differat a scirrhus, 3. 695
Calor natiuus duplex, l. 2 a
Calor febrilis in diuersis partibus diuersas gignit febrium differentias, l. 2 a
408 b Calor putridus spiritus cordis innuens, l. 616 168 b
564. Caloris naturalis secundi generis differentia, l. 2 a
Caloris naturalis primum genus, l. 234 a
secundum genus. ibid. a b
Caluitium, l. 235 a
Cambyfes rex quid designauerit ebrius, l. 283 a
237 a Cancer mammillæ, 3.
568 Cancris quare in mammillis foeminarum potissimum contingant, 3.
468 b eius signa.
Canceri ulcerati & non ulcerati signa, 3. 697
Canceri vterini differentia ab inflammatione, 3.
Canceri cura palliatia, 3. 69
Candelæ extinctæ nidor abortus causa, 3. 700
740
Canes quibus modis suam rabiem prodant l. 350 a
474 Canina conuulsio cur ita dicta, 463 a
Canities, l. duplex.
eius causæ, signa, curatio. 482 b
Canitiei innaturalis causæ, l. 357 a
ad Canos, l. 3.
Cantharides non probat auctor, 3. ad Capillos rufos, l.
459 b Capilli plani, crispæ & tortuosi causæ, l. 237 b
Capilli ut efficiantur nigri, l. 464 b
Capillos denigrans, l. 243 a
Capilli nec ungues inter particulas corporis numerantur, l. 237
Capillorum casus post ægitudinem, l. 241 a
ad Capillorum casum, l. 240 b
Capillorum defluuii causæ, l. notæ.
curatio. ibid.
victus ratio. 240 b
Capillorum profluuii tres causæ, l. 240 b
Capillorum casus, tremor, variaque accidentia, quæ aurifici acciderunt ex deuratione. ibid. a
Capillorum amissio duplex, l. 237 b
Capillorum defluuium, l. 238 a
Capillos & barbam decorantia & augmentantia, l. 242 a
ad Capillos fuluos reddendos, l. 243 a
Capillorum asperitas quid, l. 242 a
Caprarum stercore cinis cum aqua pluuiali haustus sanguinis ex vtero imperum fit, 3. 640
Capitellum, l. 243 a
Caphura mares obore castrare dicitur, 3. 584
Capite icto, contuso aut vulnerato, quæ diligenter spectanda, l. 291 b
Capitis dolor ab obstructione, l. 295 a
a sanguine menstruo retento. ibid. b
cum catarrho. ibid. 296 a
quomodo fiat, cognoscatur & curetur. ibid.
in pericratia hærens. ibid.
Capitis dolor ex bile cum pituita mixta, cui & circa nasum accessit phlegmon erysipelatodes, l. 273 b
Capitis dolor in febricitante, l. 217 b
quomodo curandus. ibid.
intolerabilis. ibid. b
eius causæ, l. 218 a
quæ partes capitis magis doleant in febribus. ibid. curatio in febrib. ibid.
Capitis dolor cum contusione cranii & malis accidentibus, l. 287
Capitis dolor per ventriculi consensum a pituita. ib. b
eius curatio, ex ventriculi intemperie frigida, ex debilitate ventriculi. ibid.
Capitis dolor per consensum ab vtero, l. 301 a. signa. ibid.
Capitis dolor ex sanguinis abundantia, l. 265 b
Capitis dolor a cibo aut potu corrupto, quomodo dignoscatur & curetur, l. 298. b. ab humoribus congestis in ventriculo. ibid. per consensum ex hepatis vitio, l. 299 b
Capitis dolor a stomachi vitio obortus, & vaporibus a crudis humoribus ad caput elatis, l. 296 b
1. Capitis doloris curandi ratio, l. 272 b
242 a Capitis dolor ex vulnere capiti inflictæ, l. ibid. b 292 b
ibid. Capitis dolor ab intestinis per consensum originem habens, l. 299 a
351 a Capitis doloris curatio per communitatem 1. 297 b
243 a 1. 297 b
589 Capitis dolor a bile vitellina, quomodo curanda, l. 274
245 b
Capitis dolor post contusionem, multis annis relictus, l. 290 a
243 a Capitis dolor ex offensione, qui leuissimo remedio subleuatur est, l. 287 a
243 a Capitis dolor ab humiditate, l. 263 b
237 causæ atque signa, l. 264 a
Capitis dolor insignis cum delirio & vigilia, l. 271 a
246 a Capitis dolor verus quomodo curetur, l. 241 a 262 b
ibid. Capitis dolor ex capitis imbecillitate, l. ibid. 294 b
ibid. dolor Capitis ex humore melancholico, ad simul pituitoso, l. 279 a
Capitis dolor a siccitate, l. 262 b
non citra caliditatem aut frigiditatem, l. 263 a
ibid. a Capitis dolor a coitu ortum habens, l. 285 b. ex coitus abstinencia, l. 286 a
238 a

I N D E X

- Capitis dolor ex casu in aquam frigidā con-
tractus, i. 261 b
quomodo utendum medicamentis. ibid. 293 b
modus ea applicandi. ibid. 293 b
quantitas calefactionis, quomodo co-
gnoscitur, i. 261 b
Capitis dolor cum febre continua, i. 293 a
in febre quomodo fiat, dignoscatur, &
curetur, i. 293 b
Capitis dolor ex ardore Solis, i. 253 a
doloris causa, i. ibid. 272 b
semper symptoma est. ibid.
quot sint eius species & differentiae.
ibid.
Capitis dolor ex melancholia mixta cum
pituita, post morbum Gallicum, i. 281 a
Capitis dolor melancholicus ex melan-
cholia ortus, i. 278 b
Capitis doloris causa ex bile, i. 272 a
signa ibid. a fumis biliosis. ibid.
distinctio a sanguine, a bile, a fumis fla-
uibilis. ibid.
Capitis dolor diuturnus etiam a vaporibus
potest fieri, i. 303 a
Capitis dolor diuturnus ex pituita viscida
cum pauca bile. 305 b
Capitis dolor ex quoniam calore facile recur-
rente, i. 255 b
Capitis dolor in quibusdam, propria cere-
bri purgatione curatus, i. 275 b
Capitis dolor ex vermibus, 3. 358 b
Capitis dolor ab acuitate sensus, i. 294 b. ab
odore rerum calidarum, eiusque curatio,
ibid.
ab odore rerum frigidarum, eiusque cu-
ratio, i. 295 a
Capitis dolor ex materia biliosa, i. 49 a
Capitis doloris ex calida intemperie cura-
tio, i. 259 b
quomodo mensura refrigerandi inue-
nienda, i. 260 a
tempus refrigerandi & repellendi. ibid.
a frigida intemperie curatio. ibid.
eius signa, prognostica, curatio. ibid.
Capitis dolor in occipitio hærens, i. 310 b
Capitis dolor ex intemperie calida, nudæ
qualitatis citra humorem ortus, i. 258 b
Capitis dolor a pituita originem habens, i. 276 a. & eius curatio pag. seq.
Capitis dolor a bile in stomacho coacerua-
ta, ortus, i. 298 a
Capitis dolor in autumnio sæpe recurrens, i. 280 b
Capitis dolor ex carbonibus male olentibus
i. 255 a
Capitis dolor quam partem afficiat, i. 254 a.
nunquid intra calvariam vel extra caput
affectum sit, i. 254
Capitis dolor post vulnus curatum, i. 291 a
ex contusione cum vulnere. 291
quomodo leniatur & extinguatur in-
flammatiō, i. 292 a
Capitis dolor ex casu, quem subsequen-
tur obtusescencia, deinde & desipientia,
i. 286 a
ex casu & ictu quomodo fiat. ibid. b
si ad casum seu ictum sequatur vulnus.
ibid.
Capitis dolor ex sanguinis plenitudine, i. 264 b
Capitis dolor ab ebrietate, i. 282 a
Capitis dolor a vehementiore exercitio ob-
ortus, i. 257 a
Capitis dolor post vinum assumptum per-
manens, i. 284 a
in Capitis dolore & febribus quæ notanda, i.
293 b
ad Capitis dolorem enema, i. 272
minoratiua. ibid. Syrupi, i. 273 a. pilulæ.
ibid.
Capitis dolorem duo concomitantia acci-
dentia, i. 406 b
Capitis dolore an venæ sectio conveniat, i.
255 a
Capitis dolorem quæ obtundant, & acrimo-
niam humorum sedent, i. 271 b
Capitis impetigo, i. 247 a
Capitis vlcera manantia, i. 247 a
ad Capitis vitia saniosa & scabiosa, i. 250 a
Capitis doloris notæ, signa, causæ, i. 256 a
Capitis doloris ex crisi curatio, i. 294 a
in febre. ibid. 185 b
Capitis dolorem curandi methodus gene-
ralis, i. 259 b
Capitis doloris causæ ex spiritu flatuoso, i. 281 b. signa.
curatio, i. 282 a
Capitis doloris signa ab externis causis, i. 256 a.
ex partium natura. ibid. b
ex loco, ex qualitate, ex proprietate do-
lorum, a functione animi, ex antea acta
vita, i. 256 b
Capitis doloris signa prognostica, i. 256 a
duplicia ibid. b. præfagientia ibid. prognos-
tica terminationis bonæ vel malæ, i. 258 a
terminationis in alias ægitudines, vel
ad salutem aut mortem. ibid. 3.
Capitis doloris causæ a pituita, i. 274 b
signa, i. 275 a
curatio. ibid. enema. ibid. venæ sectio. ibid.
potio leniens. ibid. 614
materiæ minoratio. ibid. digestio. ibid. pi-
lulæ. ibid. 570
Capitis doloris casus mirabilis, i. 301 b
Capitis doloris causæ, i. 265 a
signa communia intemperiei cum mate-
ria ibid. doloris capitis ex sanguine aut
plethora signa. ibid. prognostica. ibid. b.
curatio. ibid. b
Capitis doloris causæ vniuersales, i. 254 b
particulares. ibid.
procatartice. ibid.
Capitis doloris ex intemperie sicca causa,
signa, prognostica, curatio, linimenta,
vnguenta, i. 263 a
Capitis doloris vniuersalia remedia, i. 268 b.
Capitis doloris ab intestinis causæ, i. 299 a
Caprina pellis comitalem morbum dete-
git, i. 382 b
Caput infantis crustis occupatum, i. 250 b
Caput an laboret primogenio, an per con-
sensus, i. 256 a
Caput purgia vtrum in ophthalmia conue-
niant, nec ne, 2. 8 a
Caput raro a melancholia pura afficitur, i. 278 a
Caput furfuraceum, i. 243 b
Caput cur doloribus maxime opportunum,
i. 264 b
Caput quibus notis deprehendatur per con-
sensus laborare, i. 297 a. b
Caput frigido & humido quomodo provi-
dendum, 3. 137 b
Caput omnium pars suprema nobis præce-
teris semper obuia, i. 237 a
Caput tineaosum ac scabiosum cum squa-
mis & crustis ac pilorum euulsione, co-
lore cinericio ac odore foetido, & aspectu
abominabili, i. 250 a
Caput purgia, i. 275 b
Carbo, i. 179 b
Carbo totam faciem exulcerans, i. 182 a
Carbones maleolentes quid importent, i.
255 a
Carbunculi pestis, i. 169 b
Carbunculum pudendorum, quæ curent,
3. 565
Carbunculus eadem signa habet quæ pe-
stis, i. 179 b
Carbunculi causæ, signa, i. 179 b
præfagia, i. 180 a
curatio. ibid.
Carbunculi pestilentes in diuersis locis, i.
ibid. 185 b
Carbunculus, i. 179 b
Carbunculus, i. 169 a
Carcinoma corneæ & excrecentia quedam
bancrota supra oculum, 230 a
Cardamomum, 3. 166 a
Cardiacus morbus, 3. 106 a
Cardialgia, i. 215 a
Cardinalis quidam 17. dies non mingens,
vitam produxit, 3. 487 a
Cardialgia seu oris ventriculi dolor cum
quodam morbo, cur bilis morbus subse-
quebatur, 3. 137
Cari a compressione, contusione, percus-
sione, casu, vulnere, curatio, i. 306 b
Carneæ particula per fistulam erumpentes
3. 562
Carnes vtrum phreniticis conueniant, i.
321 a
Carnositas in hernia qui dignoscatur, 3.
614
Caruncularum excrecentiarum remedia, 3.
ibid. 570
Caro lethalis ex cranii fractura, i. 366 b
Carus si per consensum fiat, quomodo cu-
randa. ibid. a
Carus, i. 363 a. carus in accessione febrili,
i. 365 b
Carus in quibus differat & communicet cū
lethargo, i. 364 a
a Comate & cataphora differens. ibid.
ab apoplexia ibid. b. a vulnere strangulatu
ibid.
Carus & catalepsis quid differant, i. 365 b
Cassia non conuenit paralyticis, i. 424 a
Cassia nocumentum, i. 358
Castitati custodiendæ quæ profint, 3.
572
Castoreum mirum in modum confert o-
mni paralyti, i. 431 b
Catalepsis quid, i. 368 b. causæ. ibid.
Catalepsis, i. 367 a
Catalepsis post longum capitis dolorem,
i. 367 b
Catalepticorum historia, i. 366 a. b
i. 369 a
Cataphora quomodo fiat, 3. 359 a
Cataphora, i. 232 b
Cataphora, i. 221 b
Cataphoræ somnolenta signa, i. 359 b
insomnis signa. ibid.
Cataphoræ duæ species in quo communi-
cant, i. 359 a
Cataplasma ad esthiomenon penis, 3. 568
ad testium duritiem, 3. 562. 3. 598
eorundem inflammationem, 3. 596

I N D E X.

- inflationem, 3.
 Cataplasma emolliendo apostemati, 3. 595
 ex faba Aegyptiaca, 3. 595. ex melissa & nepita ad rupturam, 3. 603. mitigans dolores penis, 3. 565. multarum virium, 3. 567. ibid. cataplasmata aegre ad inferiora loca adhiberi possunt, 3.
 Cataracta, l. 11. obs. 13.
 Catarrhi, si ex frigida intemperie fiat, signa 1. 470 b. ex frigidis succis. ibid. ex calida intemperie. ibid. per essentiam, 1. 471 a. per consensum.
 Catarrhi crudi vel concocti signa, 1. 471 a.
 Catarrhi curatio, 1. 472 a.
 Catarrhus calidus ex materia acri & salsa, l. 10. obs. 131. ex calida intemperie. ibid. cum dolore capitis, l. 10. obs. 32. catarrhi curatio. ibid. catarrhum restringentia. ibid. sistentia. ibid. constriquentia. ibid.
 Catarrhus ex pituita insipida, 1. 469 b.
 Catarrhus, 1. 488 a.
 Catarrhus ex materia frigida crassiore, cum tussi, capitisque dolore ac pectoris, 471 b.
 de Catocho medicorum altercatio, 1. 368 a.
 Catheter ad vesicam non semper potest attingere, 3. 561.
 Causae reciduae, 1. 236 b.
 Causos & tertiana continua quid differant, 1. 44 a.
 Causus exquisitus per fluxum sanguinis naturum desinens, 1. 41 a.
 Causus spurius 1. 43 a. cur ita dictus. ibid.
 Capillitium quid, 3. 456 a.
 Causus legitimus maxime solet in aestate oboriri, 1. 35 b. praecipue iuuenibus & biliosis.
 Causus illegitimus cur ita dictus, 1. 43 b.
 Causus synochides, 1. 149 b.
 Causos ardens, 1. 16 a.
 Causos nomen homonymum, 1. 35 a.
 Causos proprie dictus. ibid.
 Causos nothus. ibid. b.
 Causus exquisitus. ibid.
 Causus non exquisitus, 1. 42 b.
 Causorum curationis scopus, 1. 43 a.
 Cauteria, 1. 173 a.
 Cauteria, 1. 269 a.
 Cautio de euacuantibus melancholiam, 1. 279 b.
 Cauterium, 3. 614. an apostematibus, quae circa testes sunt, conueniat, 3. 561.
 Chamamelum florum decoctum insigne ad dolores relictos a partu, 3. 757.
 Cephalalgia sanguinea, 1. 269 b.
 Cephalalgia, 1. 254 a.
 Cephalalgia post morbum gallicum, 1. 302 a.
 Cephalalgia biliosa ex bile sincera orta, 1. 271 b.
 Cephalalgia melancholica, 1. 277 b.
 Cephalalgia ex sanguine bilioso vna cum phlegmone erysipelato in facie, 1. 263 a.
 Cephalalgia pituitosa, 1. 274 a.
 Κεφαλαλγία, 1. 253 b.
 Cephalaea ex bile, 1. 306 b.
 Cephalaea quibus cum cephalalgia conueniat, & quibus ab ea differat, 1. 303 b.
 Cephalaea cum plethora, 1. 304 a.
 Cephalaea, 1. 303 a. cur vehementius foemina tenet, 1. 304 a.
 Cephalaea nota & signa, 1. 310 a.
 Cephalopontia, 1. 593.
 Cerasa condita ad sitim, 3. 561.
 Ceratum ad herniam, 3. 683.
 Ceratum ad testium inflammationem, 3. 562.
 Ceratum Bayri ad procedentiam vteri, 3. 562.
 Cerato de mucilagibus quidam a testium inflatione curatus, 3.
 Cerium, vide Fauus.
 Cerium, 1. 471 a.
 Cerebra roborantia, 1. 471 a.
 Cerebrum si solum afficiatur in spasmo, 1. 463 a.
 Cerebrum si faciei pars duntaxat. ibid. b. si vna quaepiam pars.
 Ceruicia Gedana mulier Alcmariana ab hydropeliberatur, 3.
 Ceruicia medicata, 1. 255 a.
 Ceruicia odor ebullientis suffocat, 1. 393 a.
 Cleomedes amens, 1. 665.
 Charta combustae vis, 3. 665.
 Chirurgus fluxu sanguinis diuturno laborans, 3. 578.
 Cachexia mortuus. ibid.
 Χήμων quid, 2. 2 a.
 Cholera ex cibo diuerso & corruptente assumto, orta, 3. 192 b.
 Cholera signa demonstratiua, 3. 192 b.
 Cholera praesagientia. ibid.
 Cholera lethalis ex bilis copia, 3. 193 a.
 Cholera signa, 3. 193 a.
 Cholera cum seuissimis symptomatis & recte curata, 3. 194 a.
 Cholera seuissima duae mulieres laborantes, & curata, 3. 196 a.
 Cholera cum syncope & conuulsione. 3. 197 a.
 Cholera mutata in coeliacum morbum, 3. 198 a.
 Cholera ex medicamento assumto, 3. 190 b.
 Cholera quid sit, 3. 190 a.
 Cholera seu bilis apud Arabes maioris fama duplex est, 1. 78.
 Cholera quomodo medicamenta inducant, 3. 191 b.
 Cholera eius causa. ibid.
 Chremosis curatio, 2. 2 b.
 Christianus Ioannis ab enterocoele curatus, 3. 626.
 Christianis vitum pestem fugere liceat, 1. 228 b.
 Cibi fastidium, 1. 147 a.
 Cibi fastidio rusticus laborans post alios morbos, 3. 184 a.
 Cibi fastidium, 3. 143 a.
 Cibi fastidium ad Cimices, 1. 246 a.
 Cimolia terra Scroto in superficie extumescenti opitulatur, 3. 331 b.
 Cinctura ferrea ad herniam, 3. 211.
 Citta, pica, malacia, 447. 448. quando incipit, 3. 739.
 Claretum ad facilitandum partum, 3. 141 b.
 Clauus, 1. 751.
 Clinias iram mulcebat lyra, 1. 310 a.
 Clysmata quare populus horreat, 1. 345 a.
 Clyster, 1. 423 b.
 Clysteres emollientes, 1. 84 a.
 Clysteres emollientes an conueniant ante vel post venae sectionem, 1. 39 a.
 Clysteres, 1. 13 b.
 Clysteres vtrum in febre pestilenti conducant, 1. 96 a.
 Clysteres acuti quando conueniant in paroxysmis epileptiae, 1. 178 a.
 Clysteres vtrum iniiciendi ante vel post venae sectionem, 1. 388 a.
 Clysteribus, morbus paralyfis, 1. 268 a.
 Clysteres lenientes emollientes, 1. 336 a.
 aciores. ibid.
 Clysteres lenes, 1. 323 a.
 Coeliaca affectio cum atrophia, 3. 200 a.
 Coeliaca unde nomen sumserit, 3. 394 a.
 Coeliaca seu ventralis affectio. ibid.
 Coeliaca affectio. ib. b.
 Coeliaca affectio, 3. 199 a. causa, pars affecta, affectus, signa, prognostica. ibid.
 Coitus, vide Venus.
 Coli & ilei inflammatio quid differant, 3. 334 a.
 Coli dolor, quibus signis a reum dolore & calculo distinguatur, 3. 313 b.
 Colica apostemosa calida quomodo curatur, 3. 325 a.
 Coli dolorem sequitur paralyfis, 1. 423 b.
 Colica & iliaca, quomodo in causis & signis & curatione inter se communicant & differant, 3. 317 a.
 Colicus affectus ex calidis biliosisq; humoribus ortus, 3. 326 a.
 Colicus dolor, & spiritus flatuosus cum retentione excrementorum, 3. 314 a. eius signa & causa. ibid.
 Colicus ventosus, 3. 321 b. si ex spiritu flatuoso fiat curatio, 3. 322 a.
 Colicus dolor ex medicamento acri & venenoso, 3. 329 a. ex scammonii potu. ib. b. a veneno. ibid. aere venenoso pagin. sequi.
 Colicus dolor, a pituita crassa vitrea, 3. 315 b.
 Colicus dolor, ex crassis & lentis succis ortus, 3. 318 b.
 Colicus dolor quomodo permutteretur alio quando ad paralyfin, 3. 316 b.
 Colicus dolor ex phlegmone seu inflammatione, 3. 324 b.
 Colicus dolor ex ruptura & fecibus in intestinis vna in serotum dilapsis, 3. 330 a.
 Colicus curatio. ibid.
 Colicus dolor cum neruorum contractione, & variis symptomatis, 3. 331 a.
 Colicus curatio & victus. ibid. b.
 Colicus insignis dolor ex fecibus in intestinis retentis, 3. 322 b. eius curatio. ibid.
 Colicus dolor, 3. 312 a. ex materia quadam flatulenta ac pituitosa. ibid. b.
 Colici doloris signa, quibus coniecturis vera haberi possint, 3. 313 a.
 Coliei doloris curatio vniuersalis, 3. 318 a.
 Colicis quae indifferenter praebere possunt, 3. 331 b.
 Columella inflata cum febre postea incrementa, & in vnam permutata, l. 15. obs. 2.
 Columella contabescens, l. 15. obs. 6.
 Columella inflata & laxata, & de vna plurimum propendente, l. 15. obs. 4.
 Columella inflata & male tractata in Gangranam transiens, l. 15. obs. 5.
 Columella inflata & simul laxata sine febre l. 15. obs. 3.
 Columellae vlcerum quomodo curentur, 1. 145 b.
 Columellae vlcerum ex lue Gallica. ib.
 Coma simplex quid differat a comate somnolento, a Caro, apoplexia, syncope, vteri suffocatione, 1. 358 a.
 Coma vigilans, 1. 390 b.
 Coma soporiferum, 1. 358 b.
 Coma vigil curatum in puella, 1. 160 a.
 Comatis vigilis signa, 1. 359 b.
 Comes

I N D E X

- Comes Sfortia phreneticus 26. die obiit, 1. 313 a
- Comitiales quomodo nutriendi, 1. 389
- Compotationis commoda, 1. 284 a
- Conceptio dubia quomodo inuestiganda, 3. 718. an fieri possit absque delectatione in coitu, 3. 710
- Conceptio, 3. 719. quomodo procuranda, 3. 715
- Conceptioni aduersatur corporis exsiccatio, 3. 635
- Conceptionis tempus idoneum incipientibus aut cessantibus mensibus, 3. 625. 3. 711 aut imprægnationis signa, eaq; diligenter medico inuestiganda, 3. 719
- Conceptionem comitantium variorum accidentium curationes, 3. 739. & seq.
- Concoctio quando expectanda, & quando statim purgandum, 1. 272 b
- Conditæ, 1. 57. b. 1. 336 b
- Conditum, 1. 64 a
- Condilomata, 3. 433 b. 3. 432 b
- Confectio nucum, 1. 175 a
- Confectio muccari rosacei, 1. 229 a
- Coniugium eui institutum atque a Christo probatum, 3. 590
- Consensus varius modus, 1. 297 a
- Consolidæ radix ad herniam inguinalem, 3. 599
- Consuetudo in omnib. consideranda, 1. 208 b
- Contagionis seminata vtrum aquæ potus extinguere possit, 1. 180 b
- Continui solutio, 1. 443 b
- ad Contusiones, 1. 285 a
- Conuulsio lethalis ex cholera acutissima, 1. 452 a
- Conuulsio ex casu ab alto facta, lethalis, 1. 462 a
- Conuulsio, 1. 317 b
- Conuulsio sequens cholera fauissimam, 1. 453 a. per consensum oris ventriculi. ib. non omnis ex nimia purgatione lethalis, 1. 453 a
- Conuulsio a vermibus quomodo curetur, 1. 10. & 117
- Conuulsio ex succo pituitoso, 1. 450 a. eiusque curatio, 1. 450 b
- Conuulsio canina vide spasmus cynicus.
- Conuulsio ex vulnere, lethalis, 1. 447 b
- Conuulsio ex repletione, 1. 448 b
- Conuulsio vide spasmus.
- Conuulsio pertinet ad symptoma motus deprauati, 1. 43 b
- Conuulsio ex febre continua valde acuta, 1. 218 b
- Conuulsio ex inanitione, 1. 451 b
- Conuulsio antiqua cū maxima duritie nervorum, 1. 455 b. curatio, 1. 456 a. ob conglutinationem humoris, 1. 456 a. Conuulsio ab vtero originem habens, 1. 456 b. curatio, 1. 457 a. ab vtero & fungis comestis orta, 1. 487 a. laborum & natiū. 1. 457 a. a fungis vel veneno, 1. 458 b. Conuulsio ex pūctura nervi curata, 1. 10. & 119 a. pūctura animalis venenosi, ib. ex phalangiorum, ad scorpionis ictu. ib. Conuulsio ex vulnere, ad Cyrones, 1. lib. 10. obs. 120. causæ, ib. ex phlegmone nervo & partis. ib. ex putredine veneris. ibid. a. frigiditate loci vulnerati, ibid. ab apostemate. ibid. a. meningum pūctura, ibid.
- Conuulsionis curatio, 1. 449 a. indicationes curatiuæ, ibid.
- Conuulsionis ex repletione cum inflammatione curatio, 1. 450 a. & citra inflammationem, ibid. in conuulsione ex plenitudine sanguinis quæ conueniunt, 1. 451
- Conuulsuus motus quomodo a voluntario discrepet, 1. 443
- Conuulsuus motus vniuersalis aclethalis, 1. 442 b
- Cor reficiens potio, 1. 64 b
- Cor pilis refertum latro habens, 3. 97 b
- Cordis palpitatio, 3. 95 a. varia exempla, & de quodam vulnerato vehementissimam cordis palpitationem incurrente, 3. 95 a
- Cordis pars patefacta, 3. 97 b. de leni cordis tunica lésione. ibid.
- Cordis palpitatio vtrū veniat a sola intemperie & a calida, 3. 98 a
- Cordis palpitationis ex diuersis causis historia, 3. 105 b
- Cordis ventre vulnerato statim mors sequitur, 3. 97 a
- Cordiales materiæ frigida, 3. 102 a
- Corneæ durities, corrugatio, 1. 11. obs. 23
- Cornea, vide carcinoma.
- Corneæ ruptura, 2. 32 a
- Corneæ humectatio, 1. 10. obs. 23. tunice mutatione coloris, lib. 11. obs. 22
- Cornelia Heutera radicibus osmundæ puerum ab hernia curatum testata, 3. 604
- Cornelii Gemmæ epistola, 3. 733
- Cornelius Ioannis Vermium terrestriū pulnere ad hernias vsus, 3. 604
- Cornelius Ericius collega Foresti, 3. 867
- Corpora mortua cur viuos non efficiant, 1. 185 a
- Corporis impuritas quomodo in hectica tollenda 1. 124 b. vastitas per se non significat sanguinis copiam, 1. 267 a
- Corpus humanum quæ maxime iuuēt eadem & lædant, 3. 592. in somno nō fit calidum interius, 3. 584 a
- Corroborantia, 1. 173 a
- Corroboratio, 1. 70 b
- Corui ouum grauidis fugiendum, 3. 744
- Coryza seu grauedo lib. 10. obs. 133
- Coryza, 2. 100 b. 1. 468 b. eius curatio, 2. 101
- Crampa, 1. 442 a
- Crapula, 1. 282 b
- Crines in palpebris quomodo renascantur, 1. 239 b
- Crisis mala atq; lethalis, 1. 22 a
- Crisis in pestilentibus febribus non fit vera, 1. 172 b. crisis bona, 1. 21 a
- Crocum martis male adhibitum, 1. 114 b
- Crura tenuia quid indicent, 3. 587
- Crura & pedes quomodo resoluantur, & eius curatio, 1. 430 b
- Crurium atrophia, in qua crura resoluta videntur, 1. 434 a
- Cucurbitula, 1. 269 b
- Cygni fugiunt aquam inquinatam, 1. 166 a
- Cynanchos vera musculos inter nos laryngis occupans, 2. 149. eius causæ. ibid. eius causæ externæ, 2. 150. signa, ibid. lethalis, 2. 151. signa, prognostica. ib.
- Cynanthropia, 1. 349 a
- Cyrones, 1. 245 a
- ad Cyrones lendes pilos detrucentes, 1. 246 a
- Cucurbita radicibus mammarum in profluvio mēstruorum affigenda, 3. 646
- Cucurbitularum applicatio in priapismo, 3. 573
- Cupressi decoctum ad herpiam, 3. 680
- Curatio variatur iuxta naturam humoris melancholici, 1. 278 a
- D.
- Debilitas a seminis missione mala, 3. 584
- Decocta ad fistulæ purgationem, 3. 558
- Decoctio capitalis, 1. 275 a. Electuaria. ibid.
- Bolus, pulvis, roborans, diuersiones, particulares purgationes. ibid.
- Decoctum consolidans, constringens & incarnans, 3. 609. consolidans ficus penis, 3. 563 ad gonorrhœam in muliere, 3. 582. ad herniam, 3. 603. ad priapismum leniens inflammationem penis, 3. 564
- Dæmonium lupinum, 1. 318
- Defectio animi, vide Animi.
- Deglutiendi difficultas quomodo in febribus fiat & curetur, 1. 225 a. b
- Deglutitio plurimas ob causas impeditur, 2. 169
- Deglutitionis resolutæ curatio, 1. 428 a
- Deiectio nigra cum vermibus, 3. 354 a
- Deiectio alba, 1. 317 b
- Delirare quid, 1. 37 b
- Delirium, 1. 229 b. Galeni, 1. 315 a. simplex, 1. 312 a. Delirium seu paraphrenitis, 1. 227 a
- Delirium ex peste, 1. 170 b
- Delphensis ciuitas cū aliquando pesti obnoxia, 1. 162 a. urbis incendium horribile, 1. 161 b
- Delphensis mulier octoties abortum passa, 3. 654
- Dens ut doleat, tribus modis fieri potest, 2. 104 b. supra alterum enascens, 2. 114 a
- Dentes quot, 2. 104 a. corruptos, corrosos & fistulas habentes, quomodo extractione dentium curari fuere, 2. 108 a
- Dentes male colorati, 2. 114 a
- Dentes denigratos, liuescentesq; corrigentia, 2. 115 a. quæ conseruant, 2. 112 a
- quid reddat immunis a dolore, 2. 112 a
- mobiles, laxati & tremuli. ibid.
- Dentium dolor, 2. 703 a
- cum Dentibus qui nati sunt & quid hoc porrendat, 3. 771
- Dentium doloris curatio pro varietate causarum perficitur, 2. 106 a
- Dentium male coloratorum causæ, 2. 114. b. curatio. ibid. dolor ob gingivarum tumorem & inflammationem, 2. 106 a. stridor, 1. 317 b
- Dentitionem in pueris quæ adiuuent, 3. 772
- Dentium stridor in pueris vel in mente commotis aut adultis, 2. 111 a
- Dentium stridor ex vermibus, ibid. ex mentis commotione. ibid. eius præfagia. ibid. curatio, ibid. stupor. ibid.
- Dentes si algore afficiantur, vel debiles sint, 2. 111 b
- Dentium debilitas & eorundem conseruatio. ibid.
- Dentium erosorum curatio, 2. 109 a. putridorum curatio. ibid.
- Dentium erosorum, cariosorum doloris sedatio. ibid.
- Dentes non temere eximendi. ibid.
- Dentibus vermes innasci. ibid. b
- Dentium vermes quæ necent. ibid.
- Dentes caute ferro eximendi, 2. 110 b
- Dentitio infantium, 2. 111 b
- Dentitionis facilis, difficilisque causæ, 2. 112 a
- Dentium relaxationis causæ variæ, 2. 112 b
- ex morbo Gallico. ibid.
- Dentium mobilitas in senibus, ex qua causata, 2. 112 b. mobilitas ex siccitate, 2. 113. a. ex superflua humiditate totius vel capitis. ibid. ex ictu vel nervo emollito. ib. eius curatio. ibid. ex radicibus dentium corrosis. ibid. ex carne gingivarum absumpta. ibid. b

I N D E X.

Dentium elongatione laborans, 2.	113 b	Dolorem sedantium duo genera, 1.	271 b	Emollientia duritiem, 3.	559
Dentium elongatio & augmentum, 2.	114 a	Dolore dentium puella multis annis afflicta, 2.	107 a	Emollientia leuiter quæ, quibus conueniant, 3.	572
Dentium dolor, propria ipsius substantia affecta, 2.	105 a	ad Dolores post partum quæ conferant, 3.	570	Empedocles in Ætnam insiliens, 1.	343 a
Dentificia, 2.	115 a	Doloribus a partu relictis optime mederi decoctum florum chamæmeli, 3.	757	Empedocles secundam interiorem animam vocauit, 3.	763
Desipientia, 1.	312 a	Domina cui sanguinis ex ruptura venarum vteri fluxus restringi non potuit, 3.	642	Empirici vani pollicitatores, 3.	571
Destillatio quot modis dicatur, 1.	468 b	Donatus ab Altomari, 3.	571	Empiricus quidam in extenuata menses ciere studet, 3.	633
Destillatio, vide Catarrhus.		Dormiendum cur non sit a venæ dictione, 1.	50 a	Emplastrum Auicennæ ad herniam puero- rum, 3. 602. de ammoniaco, Forest. 2. 562. 3. 585. 3. 610. emolliens, 3. 606. 3. 613. de butyro, 3. 564. de pelle arietina, 3. 608. hernia le, 3. 619. ad herniam aquosam, 3. 618. resoluens, 3. 566. stypticum, 3. 614. & seq.	662
Destillatio acris a capite in pectus cum tussis, ex qua vena pulmon. corrosa fuit cum sanguinis cruenta spuitione, 3.	28 a	Draconis anhelitu an pestis fiat, 1.	161 a	Emplastrum ad fluorem album, 3.	662
Diabetes, 3.	443 a	Dracunculus in tibia natus, 3.	310 b	Empyema, 3.	742
Diabetes quid sit, 3.	444 b	Dropax, 1.	269 b	Empyema, 3.	742
Diabetes curatio eius,	ibid.	Dysenteria hepatica ex iccoris intemperie calida, 3.	387 a	Empyema, 3.	742
Diacarthamum tympanitem discutit, 3. 616	358	Dysenteria admodum periculosa in pueris gnante curata, 3.	407 a	Empyema, 3.	742
Diacarthamum, 3.	358	Dysenteria cum variis accidentibus, 3.	412 b	Empyema, 3.	742
Diaria quomodo per balneum curetur, 1.	6 a	Dysenteria post febrem oborta, & quomodo curata, 3.	415 a	Empyema, 3.	742
Diaria mutata in hecticam, 1. 8 a. diarie permutationis signum in alias febres, 1.	8 a	Dysenteria hepatica ex debilitate virtutis alteratricis hepatis, 3.	386 a	Enema, 1.	54 b
Diaria & hectica quid differant, 1.	111 a	Dysenteria hepatica ex intemperie frigida, 3.	391 a	Enema, 1.	54 b
Diaria seu ephemera vnde dicatur, 1.	3 a	Dysenteria, 3. 400 a. vnde nomen habeat, ibid. b. tres gradus eius, 401 a. in qua pituita mucosa & purulenta quædam cum sanguine deiciebantur, 3. 401 b. causæ, 3. 402 a	391 a	Enemata, 1.	792
Diarrhæa postea in dysenteriam mutata, & postea in tenesmum, 3.	415 b	Dysenteria contagiosa & pestilens, 3.	413 a	Enemata, 1.	792
Diarrhæa biliosa, 3.	373 a	Dysenteria, 6. mensibus ægrum infestabat, 3. 420 a. eius curatio, 3.	412 a	Enemata, 1.	792
Diarrhæa causæ, signa.	ibid. b	Dysenteria signa prælagientia demonstrantia, differentia, prognostica, 3.	405 a b	Enemata, 1.	792
Diarrhæa quibus utilis, & quibus non, 3.	364 a	Dysenteria ex venenatorum pharmacorum potu curatio, 3.	413 a	Enemata, 1.	792
Diarrhæa ex rheumatismo capitis vel catarrho, 3.	383 a	Dysentericus quidam mortem incurrens cum enemata admittere nollet, 3.	411 b	Enemata, 1.	792
Diarrhæa puri sanguinis, 3.	384 b	Dysentericus ex intestinis gracilib. ex crassioribus, ex vtraque laborans, 3.	403	Enemata, 1.	792
Diarrhæa cum vermibus, 3.	358 b	Dyspnœa vir pituitosus paulatim correptus, 3. 11 a. causæ dyspnœæ.	ibid.	Enemata, 1.	792
Diarrhæa cum tussi valida, 3.	382 b	Dyspnœa signa, 3. 13 a. prognostica.	ibid.	Enemata, 1.	792
Diarrhæa signa, 3.	363 b	Dyspepsiæ causæ, 3.	183 a	Enemata, 1.	792
Diarrhæa & alui fluxus ultra 3. annos perdurans, 3.	366 b	Dysuria curatio ex spiritu flatuoso, 3.	515 a	Enemata, 1.	792
Diarrhæa ob ventriculi imbecillitatem, 3.	367 b	E.		Enemata, 1.	792
Diarrhæa seu fluxus ventris liquidus, cum ferosis humoribus, 3.	365 a	Ebrietas non æque omnes corripit, 1.	285 a	Enemata, 1.	792
Diarrhæa biliosa, 3. 374 b. pituitosa, 3. 375 b. melancholica, 3. 376 b. melancholica ex splenis obstructione, 3. 377 b. ex lienis op- pilatione, 3.	378 a	Ebrietatis curandæ ratio, 1.	284	Enemata, 1.	792
Diarrhæa colliquans, ibid. b. a medicamento violento inducta, 3. 379 b. quæ neque diuersione, neque constringentibus curari potuit, sed tantum narcoticis, 3.	381 a	Ebrietatem contra syrupus, 1.	284 b	Enemata, 1.	792
Diaria vide Ephemera.		Ebrietatem concomitantia, 1.	283 a	Enemata, 1.	792
Diaria febris quomodo victu curetur, 1. 5 b		Ebrietatem affectus subsequentes, 1.	283 a	Enemata, 1.	792
Diaria seu ephemera in puerpera, cū phlegmone dextræ mammillæ, 1.	6 b	ex Ebrietate conuulsi & subito mortui, 1.		Enemata, 1.	792
Diaria quando in putridam transeat, 1. 8 b.		Ebrii quomodo fiant comatosi & soporiferi, 1.	359 a	Enemata, 1.	792
Diaria quando in hecticam, ib. quando ad sanguineam & synochum febrem, ibid.		Ebuli succus contra pruriginem, 3.	564	Enemata, 1.	792
Diaria ex bubone signa, 1.	7 a	Echinophthalmia, 1.	220 b	Enemata, 1.	792
Diarrhæa febri inutis, 1.	5 b	Ecthymata, 1.	192 a	Enemata, 1.	792
Diarrhæa Thessali irriteretur, 1.	76 b	Ecthymata, 1.	193 b	Enemata, 1.	792
Diuretica per accidens menses euocare, 3.	637	Ecthymatum curatio, 1.	192 b	Enemata, 1.	792
Diuretica quomodo differant a cientibus menstrua, 3.	636	Ectropion vide palpebrarum inuersio.		Enemata, 1.	792
Digestio, 1.	79 a	Electuarium ad herniam aquosam, 3.	618	Enemata, 1.	792
Digestium, 3.	568	Electuarium valde resumiuum, 1.	453 a	Enemata, 1.	792
Diogenes Cynici sordidum factum, 3.	663	Elidæi medici arcanum insigne contra fluxum immodicum mensium, 3.	641	Enemata, 1.	792
Dodonæi historia de muliere quæ tredecim annis in vtero gestauit fœtum mortuum, 3.	747	Elisabetha Daniæ regina, 3.	731	Enemata, 1.	792
Dolor quid, 1.	253 b	Elodes febris, 1.	64 b	Enemata, 1.	792
Dolor quid, 1.	210 a	Eloquentia non tollit morbos, 3.	614	Enemata, 1.	792
Dolor a pituita vel melancholia, 1. 299 a.		Emanuel Cirinius sanatus gelida ab ardentissima febre, 1.	14 b	Enemata, 1.	792
Dolor materia mixta & composita.	ibid.	Embryo, 3.	719	Enemata, 1.	792
Dolor ingens lumborum ex calore febrili, 1.	229 a	Eminentia, 1.	247 b	Enemata, 1.	792
Dolor coxarum curatus, 3.	569			Enemata, 1.	792
Dolor ratione veneni assumpti, 1.	299 a			Enemata, 1.	792

I N D E X.

- Epilepsia**, quomodo fiat ab extremo aliquo membro, 1. 398 a
- Epilepsia** per essentiam in cerebro ex materia pituitosa, 1. 390 b. lethalis ex sacco melancholico 1. 393 b. eius curatio, 1. 394 a
- Epilepsia** a pede sinistro mortem induxit, 1. 398 b
- Epilepsia** ex ventriculo prodeuntis curatio, 1. 395 a
- Epilepsia** confirmata signa, 1. 384 a
- in Epilepsia** paroxismo, quæ conueniant, & quæ agenda, quæ item postquam æger surrexit, 1. 388 a
- Epilepsiam** infans patiens, nuper natus & subito mortuus, 1. 385 b
- in Epilepsiam** scholaris ex esu anguillarum cadens, 1. 386 b
- ad Epilepsiam** experimentum & medicamentum, 1. 387 b
- Epilepticus** 15. annorum, 1. 394 b
- Epilepticus** sexagenarius, 1. 382 a
- Epilepticus** per ventriculi consensum, 1. 395 b
- Epilepticus** iuuenis, 1. 386 b
- Epilepticus** 16. annorum, 1. 390 a
- Epilepticus** trium annorum vermes eiciens, 1. 396 b. infans, 1. 388
- Epilepticorum** historia, 1. 383 b
- Epilepticis** cur decoctio ligni guaiaci utilis, 1. 395 a
- ἐπιφορὰ** quid, 2. 2. 395 a
- Epiphora**, 2. 19 a. quæ epiphoram insequantur, 2. 19 a
- ἐπιπλοκήλη**, vide Hernia omenti.
- ἐπιπλοήροισι**, 3. 3. 603
- Epithema**, 1. 604 a
- Equinum** finum e vino exhibitum secundum dam expellere, 3. 765
- Erythina**, 1. 263 b
- Eryngium**, 3. 589 3. 603
- Error** quorundam non habentium rationem vermium in febricitantibus, 1. 233 a
- Erysipelas** stomachi, 3. 174
- Erysipelas** & herpes, a fluxione biliosa sunt, sed diuerso modo, 1. 145 b
- Erysipelas** pulmonis, 1. 229 b
- Erysipelas** phlegmonodos, 1. 144 a
- ἐρύθρημα**, 1. 191 b
- Erythroides** tunica, 3. 602
- Esthiomenus** penis ex inflammatione, 3. 567
- Euacuatio**, 1. 128 a 79 a
- Euacuatio** per urinam, 1. 70 b
- Euacuatio**, quando præcedere debeat euacuatio, 1. 48 b. & quando subsequi. ibid.
- Eulogium**, 1. 194 a
- Exacerbationis** febrium causa, 1. 51 a
- Exanthema**, 1. 247 a
- Exanthemata**, 1. 194 a
- Exanthemata** quæ foras euocent, 1. 192 b
- Exanthemata**, 1. 192. a captis, 1. 751. 1. 18 a
- Exanthematum** curatio, 1. 192 b
- Excoriatio** in natibus cutata, 3. 569
- Excoriatio** ex veneno vel ex bile quæ conferant, 2. 169. ab vlcere. ibid. a pituita salsa. ibid.
- Exerescētia** carnis, seu carunculatum, 3. 570 163
- Excretio** sensibilis septem modis fit, 1. 42 b
- Excretiones** symptomatice nunc sunt impediendæ, quæ etiam ad criticas referendæ sunt, 1. 46 b
- Excrementa** per os reiecta, 1. 209 b
- Excrementa** omnia in somno retinentur præter sudorem, 1. 426 b
- Exempla** viua quid possint, 1. 283 b
- Exitum** quando propinquum quid agendum, 3. 569 a. vide Hernia umbilicalis.
- Experimentum**, num æger peste correptus, moriatur, 1. 172 b
- Exsiccantia** quæ & quib. conueniant, 3. 565. ibid.
- Exulcerationum** stomachi differ. signa, 3. 178 b
- F.**
- Faber** lignarius ter in quatuor mensibus Pleuritide correptus, 3. 50 a
- Fames** horribilis, 1. 161 b
- Fames** grandis, 3. 140 a. pars affecta. ibid. b. si in febribus accidat, 3. 141. a. a frigidis succis quomodo curetur. ibid. a
- Fanitas**, 1. 354 b
- Fanitas** differt a delirio, 1. ibid. b
- Faucium** mala, 1. 15. obs. 1.
- Fauus**, 1. 251. b. in capite manans, 1. 250 a
- Fauis** causæ notæ prognostica curatio, 1. 251 a
- Fauus** in puero lactante, 1. 250 b
- Fauus** & meliceris quid differant, 1. 251 a
- Febris** unde dicta, 1. 1. b
- Febris** quid, 1. 1. b. eius definitio. ibid. b. in febri quæ pars affecta. ibid. b. non est nisi cor præter naturam incalescat, sed non semper primo aspiciuntur. ibid. b. febris definitio. 1. 2. a
- Febris** indicatio a morbo, 1. 33. a. a hominis temperie, ibid. ab aere ambiente. ibid.
- Febricitantium** corpora putrida febre non ita scetent, 3. 132 b
- Febricitantium** ob bubones curatio, 1. 7 a
- Febricula**, cum capitis grauitate & dolore ex facum induratione, sub finem sternutatio superueniens, 1. 233 b. perperacuta, 1. 27 a. peracuta, ibid. in eius principio an liceat vii pharmaco minorante, 1. 34 a
- Febris** acuta lethalis, cum erysipelate pulmonis, æstu immodico, difficultate anhelitus, cum totius corporis, iactatione, inquietudine, & delirio, 1. 220 b
- Febris** acutus continua 14 dierum fluxum sanguinis narium terminans, 1. 30 b
- Febris** acuta, 1. 15 a. continua, lenta, ibid. putrida continua primaria duplex, 1. 16 a
- Febris** acuta continua putrida, 1. 26 b
- Febris** acuta duplex, 1. 27 b
- Febris** acuta, post 7. diem cum icteritia cessans, 3. 227 b
- Febris** acuta continua, putrida 1. 26 b
- Febris** ardens lethalis, 1. 34 b
- Febris** ardens, 7. die per fluxum sanguinis narium terminata, 1. 35 b
- Febris** ardentis signa, 1. 36 a
- Febris** ardens paribus diebus exacerbationem habens lethalis, 1. 37 a
- Febris** ardens & synocha quid differant, 1. 17 a
- Febris** ardens cum urina tenui pauca & nigra mortem inferens, 1. 36 b. eius prognostica ib. cum urina tenui pauca & nigra in pulmonis inflammationem vertitur, 1. 36 b
- Febris** ardens quando propinquum exitum est. ib.
- Febris** ardente prognostica lethalia ex rigore, 1. 37 b
- Febris** ardentissima correptus, voce clangorosa moritur, 1. 37 b
- Febris** ardentis prognostica lethalia ex rigore, 1. 37 b. ex delirio, ib. timore, ib. incontinētia, ib. ab extremarum partium frigore, ib. ex accessionibus partibus dieb. ibid. a liuore extremitatum. ib. eius signa, 1. 36 a
- Febris** ardentis, dolore capitis, vigilia & delirio, a fluxu sanguinis narium, ab urinis, sudore, ex colore linguæ, pulsu. ibid.
- Febris** ardentis curatio, 1. 40 b
- Febris** ardentis causæ legitimæ, 1. 35 b
- Febris** ardentis signa lethalia quæ, 1. 35 a. si
- Febris** salutem denuntiantia. ibid. b
- Febris** Astodes, 1. 61 a. eius causæ, notæ, præ-sagia, curatio, topica. ibid.
- Febris** biliosa maligna subintrans, cum similibus accidentibus, 1. 130 b
- Febris** biliosa composita subintrans 1. 130 a
- Febris** calida superueniens apoplexiæ, bonum, 1. 408
- Febris** cardiaca, 1. 61 b. grauis & periculosa, 1. 62 a. curatio. ibid.
- Febris** colligans, 1. 62 a. 1. 231 b. cur pessima atque maligna, ibid. eius signa, ibid. præ-sagia & curatio. ibid. b
- Febris** crimodes, 1. 60 b
- Febris** continua, biliosa, acuta, cum aphthis, 1. 31 b
- Febris** continens seu synochus putris, 1. 16 b
- Febris** continua quotidiana signa demonstrationis, 1. 52 b
- Febris** continua quotidiana, in quos morbos facile conuertatur, 1. 54 b
- Febris** continua quotidiana & notha, 1. 52 a
- Febris** continua quotidiana cur latica a Barbaris dicta, 1. 52 a. eius causæ. ibid.
- Febris** continua tertiana biliosa, 1. 43 b
- Febris** continens sine putredine, 1. 12 a
- Febris** continua cum fluxu symptomatice, 1. 34 a
- Febris** continua quotidiana latica dicta, cui & hectica admixta, 1. 146 a
- Febris** continua tertianæ finitiua, 1. 34 b
- Febris** continua, quam excepit fluxus sanguinis narium vehemens, 1. 230 b
- Febris** continua, biliosa, & acuta, ac lethalis, 1. 27 b
- Febris** continens seu synochus putris, quem exanthemata concomitantur, 1. 18 a
- Febris** continua biliosa, 1. 34 a
- Febris** τριπασφύης, 1. ib. a
- Febris** continens & hectica differentia, 1. 110 b
- Febris** continua, 1. 24 a. συνέχης & συνεχής, ibid.
- Febris** continua quotidie curatio, 1. 54 a.
- Febris** continua vena seruanda. ibid.
- Febris** continua quomodo diuersa fiant, & inter se misceantur, 1. 134 a
- Febris** ex cholera præsina aut æruginosa, 1. 78 a
- Febris** cum phlegmone in manu perperam curata, 1. 232 b
- Febris** cum urina retentione, 1. 234 b. cum urina ardore. ibid.
- Febris** cum fluxu symptomatice lethali, 1. 231 b
- Febris**, cum excoriatione ossis sacri, 1. 235 b
- Febris** diaria facillime curatur, cui & balneum commodissimum est, 1. 5 a
- Febris** Elodes, 1. 64 b
- Febris** ephemera, vide Diaria & ephemera.
- Febris** ephemera ex æstu solis, 1. 4 b
- Febris** ephemera ex motu vehementiore, 1. 2 b
- Febris** ephemera seu diaria, 1. 3 a
- Febris** diaria duplex, 1. 3 a. eius causæ. ibid.
- Febris** ephemera seu diaria ex vigilia oborta, 1. 3 b. eius futuræ signa, 1. 14 a. indicantia. ibid. signa diariæ ob lassitudinem. ib. ob iram, 1. 4 b. ob timorem, ibi. prognostica. ibid. b
- Febris** epialia, 1. 88 b. cur sic dicta. ibid. curatio, 1. 89 a
- Febris** erratica curata antequam in quartanam transiret, 1. 106 b
- Febris** hectica, vide hectica.

I N D E X.

Febris hectica quid, 1.	109 a	Febris duplex quotidiana, 1.	131 b	Febres horrida, 1.	145 b
Febris hectica lethalis ex ardente febre prius orta, & male curata, 1.	113 a	Febris quotid. intermittens a pituita mixta cum bile, hoc est, a phlegmone falso, 1. 86 b	causa, 1. 87 a. cur notha dicatur, signa, praefagia, ib. a. Anticipatio, curatio, venae sectio, ib. b	Febres intermittentes quae, 1. 43 b. continua ib. earum causa, ib. continua cur in febricitantibus non desinant, 1. 43 b. intermittentes cur desinant in febricitatione, ib. tertiana continua causa, 1.	44 a
Februm humeralium materiae communes non sunt de materia febris, sed tamen eam augent, 1.	47 a	Febris quotidiana, vide Quotidiana.		ex Febre perpera cura & angina strangulante in quarto quidam obiit 1.	27 a
Febris Herephontia acuta, 1.	28 b	Feb. solitaria cum putrida pestilenti mixta, signa, media, 1.	170 a	Febres quartanae vagis succedunt, 1.	106 b
Febris horrida, cui accessit erysipelas phlegmonodes in herpetem miliarum transiens, 1.	142 a	Febris singultuosa, 3.	605	Februm erraticarum signa, prognostica, curatio, 1.	107 a
Februm intermittendum circuitum causam, 1.	105 b	de Febre sanguinea seu synocha putrida magna est dissensio, utrum sanguis putrescere possit. 1.	16 a	Febres singultuosa, 3.	152 a
Febres intermittentes exquisitae simplices quot modis dici possint, 1.	65 b	Feb. syncopalis continua a bilioso humore, 1. 63 a. minuta curita dicta, ibid. cur acuta vocetur, ibid.	16 a	Febres subintrantes, 1. 130 a. communicantes, ib. b. coalternantes, ib.	27 b
Febris intermittens tertiana notha, 1.	74 b	Febris sanguinea seu synocha cum putredine, 1.	15 a	Febres tropicae, 1.	27 b
Febris maligna, cum fluxu alui, vermibus & cataphora, 1. 232 b	(1. 154 b)	Febris syncopalis intermittens a bilioso humore orta, 1. 80 a. curandi ratio, ibid.	10 b	Febres vagae & erraticae, 1. 106 a. cur sic dictae, 1. 106 a. causa, 1.	ibid.
Febr. maligna, & q. pestilens, vna cum vermibus.	154 a	Febris syncopalis intermittens a bilioso humore orta, 1. 80 a. curandi ratio, ibid.	10 b	Februm ardentium causa, 1.	37 b
Febres valde malignae, contagiosae & pestilentes, 1.	154 a	Febris syncopalis intermittens a bilioso humore orta, 1. 80 a. curandi ratio, ibid.	10 b	Februm tempora, 1.	32 b
Feb. mali moris diuturna cum pestilentibus vermibus febrem imitans, 1.	155 b	Febris synochus non putris, 1.	10 b	Februm putidarum signa in genere, 1. 25 a	ib. 2
Febris pestilens & maligna cum syncope & vermibus, 1.	154 b	Febris simplex cum composita quomodo miscetur, 1.	134 a	Gutturis inflammatio, 1.	ib. 2
Feb. pestilens per morbillos finiens, 1.	194 a	Febris lenta tandem in hemitritum mutata, 1.	135 b	Februm sanguinearum causa, 1.	17 a
Feb. is pestilens vide Pestilens.		Febris similitudinem habens cum hemitritum maiore, maior dicta, 1.	143 b	Februm symptomata, 1. 107 a. b. quae sint, 1. 208 a. quando curatione postulent. ib.	Februm genus medium inter hecticas & putridas, 1.
Febris phlegmonodes, 1.	60 b	Febris similitudinem habens cum hemitritum maiore, maior dicta, 1.	143 b	Februm maxime principales differentiae, 1. 2 b. minus principales, 1.	ibid.
Febres pub. grassantes, & de recidiva, 1. 236 a	150 a	Hectica simplex, inualescens mutata in febrem putridam & mortem, 1.	118 a	Februm causa in genere, 1.	24 b
Febris publice grassans comitata morbo gutturis Epidemio, 1.	150 a	Febris satis ardens septimo die cum febre soluta, 1.	42 a	Februm quae ex humoribus accenduntur diuersae species, 1.	15 b
Feb. phlegmatica, quotidiana, intermittens notha, ex phlegmone vitreo crudo, mucicillaginoso, seu pontico, 1.	88 b	Febris syncopalis, humoralis dicta, ab humore pituitoso, 1. 89 a. cur sic dicatur, 1. 90 b. causa, signa, praefagia, curatio, ib.	90 b	Februm syncopalium duo genera, 1.	90 b
Febris phlegmatica, seu quotidiana intermittens ex pituita acida, seu melancholica ex pituita, 1.	86 a	Febris symptomata, quae lenta & simplex est, 1. 60 b. lenta symptomata non simplex, sed periculosa, ibid.	ibid.	Februm continuarum subdivisio, 1.	24 a
Febris putrida continua, quamuis lenta, cum alui retentione, 1.	33 a	Fe. symptomata omnis continua est, 1. 60 a	50 a	Februm longiores periodos habentium causa diuersa, 1.	105 a
Febris putrida multiplex, 1. 15 b. continua, ib. intermittens, ib. continua duplex, ib. symptomata, ib. acuta, 1.	15 a	Febris tertiana continua, 1.	50 a	Februm salutis praefagia, 1.	32 b
Febris putrida continua, lenta, cum humorum crassitie, 1.	33 b	Feb. tertiana continua proportionata, 1. 43 b	64 b	Februm differentia, 1.	2 a
Febris putrida continua, maligna, cum vermibus, 1.	29 a	Febris tertiana intermittens, 1.	64 b	in Febribus ardentibus perniciosissimum symptomata & signum, 1.	37 b
Febris putrida, continua, lethalis in homine pituitoso, 1.	25 a	Feb. tertiana intermittens per icterum post 7. circuitum terminata, 1.	73 a	Feces mellis distillati, 3.	507
Febris putrida cum gutturis inflammatione per 24. horas tantum durans, 1.	24 a	Febris tertiana intermittens spuria, ex bile vitellina, 1.	78 b	Feles & canes quomodo in domos importent pestem, 1.	166 a
Febris putrida continua ex calida vini potatione oborta, 1.	ib. a	Febris tertiana, vide Tertianae.		Ferina phrenitis, 1.	312 a
Febris putrida continens vel sanguinea septimo die fluxu sanguinis narium terminatur, 1.	22 b	Febris tertiana intermittens nota ex bile citrina vel ex bile mixta cum putrida aqua, 1.	77	Fernelii historia de muliere vteri hydrope laborante, 3.	696
Febris putris continua in iuvene bilioso quamuis robusto, 1.	23 b	Febris semitertiana, 1.	126 a	Ficus, 1.	247 a
Febris quartana continua, 1.	55 a	Febris tertiana pura curatio, 1.	74 a	Fistula lacrymalis 2.	23 a
Febris quatuor requirit medicamentum, 1. 33 b	92 a	Febris tertiana intermittens pura septimo circuitu finiens, 1.	71 b	Fistula in perinaeo perquam vna meabat, 3. 557, 3. 159	617
Febris quartana intermittens, 1. 91 b. causa, signa, 1.	92 a	Feb. tertian. intermittens exacte pura, post tertium paroxysmum finiens, 1.	66 a	Flatus non sine aqua in hernia, 3.	303 b
Feb. quart. intermittens cum vermibus, 1. 233 a	22 b	Febris tert. intermittens exquisita, 1.	65 a	Flatus quomodo generatur, 1.	186 b
Febris quartana, vide Quartana.		Feb. tert. intermittens impura seu notha, bile mixta cum humore melancholico, 1.	ibid.	Flatus spiritus generatio, 3.	386 b
Febris qualis affectus sit, 1.	2 a	79 b. Signa, curatio, ibid.	ibid.	Fluxus hepaticus, 3.	566
Febris quintana, septimana, nonana, sextana & nonana quid differat. 1. 104 a. 1. 155	2 a	Febris Trusagalant pestilens, 1.	156 b	Fluxum sanguinis e virga sistens medicamentum, 3.	362 b
Febris quintana, vide Quintana, febris septimana, vide Septimana, febris nonana vide Nonana, febr. sextana, vide Sextana.	ib. b	Febris typhodes, 1.	59 b	Fluxus ventris diuturnus, 3.	374 b
Febris quotidiana intermittens, 1.	81 a	Febres compositae vario modo diuiduntur, 1. 125 b. compositae ex simplicibus, ib. ex diuersis febrium differentiis, 1.	125 b	Fluxus ventris biliosus, 3.	268 b
Febris quotidiana continua in hydropem mutata, 1. 53 b. Hydrops ex febri quotidiana continua, 1.	ib. b	Febres chronicae seu diuturnae, 1.	17 b	Fluxus ventris decretorius, 3.	170 a
Febris quotidianae continua signa prognostica, 1.	ib. b	Febres contagiosae cum variolis & morbillis cur salubres, 1.	194 b	Fluxus ventris symptomaticus, 3. 170 a. eius causa, 1.	ibid.
Febris quotidiana cum hectica primi gradus, 1.	147 b	Febres continuae crassam & multam habent materiam, 1. 65 a. interuenientes humorem tenuem, ibid.	161 a	Fluxus chylosus ex obstructione venarum mesaraicarum, 3. 371 a. eius tractatio, ib.	372 b
		Febres crymodis & typhodis curatio, 1. 61 a	1 a	Fluxus venteris ex alimentis corruptis, 3.	372 b
		Febres ephemerae synocha, 1.	100 b	Fluxus venteris vide Diarrhoea	
		Febres erratica cur sic dicantur, 1.	100 b	Fluor albus aut mulieris quid & unde, 3. 633	
		Febres ex bubone, 1. 7 a. ex bubone quam malae, 1.	7 a	quomodo a profluio mestrurorum differat. 655. quomodo differat a gonorrhoea copiosus est, si fiat a vitio viscerum, parior si vteri, ibid.	
				Fluoris muliebris causarum signa, 3.	656
				pro Fluore muliebri sanando secretum preceptoris auctoris, 3.	359
				Faecundae feminae qualis esse forma debeat, 3. 711.	

I N D E X.

Fecunditatis exploratio, 3.
Fecunditas ab æqualitate temperamentis & naturæ, 3.
Fœminæ purgantur quadrato Lunæ motu ætate, 3.
Fœtui vade alimentum, 3.
Fœtus proceri causæ, 3.
Fœtus septimestris cur vitalis esse possit octimestris, 3.
Fœtus mortuus quomodo extrahendus, 3.
Fœtus mortui inuestigatio, 3. 724.
Fœtum mortuum educentia, 3.
Fœtum mortuorum gestationis exempla, 3. 747
Fœtus motus quando sentitur, 3.
Fomentum ad herniam ventosam, 3. 616. 3.
Fons externæ destillationis, 1. 468. b interne destillationis,
Formicalis, 2.
Forus, 1.
Forus ad herniam, 3. 619. ad intestinorum reductionem, 3. 599. pro hernia humoralis, 3.
Fredericus Comes de Hohenloe ex aqua potu in conuulsiones incidens, 1.
Frictio manuum excitat a somno, 3.
Frictiones, 1. 7. b. duplices,
Frigida vide Aqua.
Frigida potio nō est tuta phreniticis, 1. 321 b
Frigus quomodo dolorem capitis suscitet, 1. 256. a
Fuligo fumarii, vel cacabo adhærens, 3.
Fuligine Valesius vsus ad vlcera penis, 3. 365
Fullones vrina vestes purgant, 1.
Fumi quomodo ascendant a ventriculo ad cerebrum, 1.
Fungorum esus valde pestilens, 1.
Furfures, 1.
Furfures & parallelæ quid differant, 1. 244 b
Furor ex vesano amore, 1.
Furor phrenitis & melancholia, quid differant, 1.
Furor, vide Mania.
Furor vterinus, 1. 348. a. post vlcera in crure, 1. 347. b. post menstruat purgationē, ib.
Furoris signa a feruenti sanguine orti, 1. 343
F. b. ex bile præassata, & succo melancholico adusto, ib. signa, prognostica, ib.
Furoris curandi indicationes vniuersales, 1. 344 b. vtum indicat. curatiua absolui possint, ibid.
Furoris ex feruenti sanguine curatio, 1. 345 b
Furoris ex flaua bile curatio, 1. 346 a. item ex adusto humore melancholico, ib. item ex calida cerebri intemperie, ibid. a crapula, per consensum, ibid.
In Furore quæ pars afficiatur, 7.
G
Abbara procerus, 3.
Gabriel Danagneus, 3.
Galea, 1.
Galeata passio, ouum & clavis, 1.
Galeata passio, 1.
Galiram auersabatur, 1.
Galen. in historia de præfocatione mulieris, 3.
Gal. in quibus febribus ad animi deliquium sanguinem detrahat, 7.
a morbo Gallico curati, capite frequenter dolent, a melancholia pituita permixta, 1. 281 b
Ganglion quid, quotuplex, quas partes præcipue occupet, causæ, signa, prognostica, curatio & præsertim pudendorum, 3. 507
G qui a meliceride & atheromate differat, 1.
Gargarismi, 1. 276 a.
Gargarismi quibus casibus competant, libr. 3. 457 item a retentione viinæ, 3. 506
Guilielmus de Dalen lithotomus 3. 559. &
Achates Foresti, 3. 614
Gula sclopetto traiecta. paralytis secuta l. 10 Obs. 122
Gula quomodo lædatur a rebus eam obstruentibus, 2. 267
Gulæ inhærentes res solidæ deuoratæ, 2. 166
Gurgulionis & columellæ inflatio & inflammatio, l. 15 Obs. 1
Gurgulionis inflammationis differentia, l. 15. obs. 7. caus. signa causarum, prog. cur. ib.
Gustus deprauatus 2. 128 a
Gustus deprauatus in feb. frequēs est, 7. 228 b
Gutturis inflammatio ex fœtore, 3. 568
Gutturis inflammatio, 1. 225 a
Gutturis ingens apostema internum, 2. 146
Gutturis mala l. 5. Obs. 7.
Gutturis angustia, 1. 51.
Guttaris morbus epidemicus, 7. 150 a
H
Alicacabi fructus, Arabibus alkerken- gi, 3. 560 a
Hæmorrhagia, 7. 230 b
Hæmorrhagiæ sistendæ tres modi, 1. 292 a
Hæmorrhois, 3. 426 b
Hæmorrhoides cristatæ, 3. 432 a
Hæmorrh. fluentes quæ præcedant, 1. 42 b
Hæmorrh. subito & sponte apertæ 3. 425 b
earum nomen diuerse sumtum, 3. 426 a.
cœcæ, fluentes, ib. internæ externæ, ib.
Hæmorrhoidum fluentium cōmoda, 3. 427 a. causæ, ib. a. signa præsentia, 3. 428. a demonstratiua, ib. prognost. ib. b
Hæmorrh. cœcæ cur valde dolent, 3. 428 b
Hæmorrhoides cœcæ ad condilomata accedentes, 3. 431 a
Hæmorrhoidarum dolor, 3. 429 a
Hæmorrhoidum stricturarum curatio, 3. 430
a hæmorrhoidum incommoda, ib. b
ad hæmorrhoidas, internas fluentes, 3. 431. a
Hectica febris mulieri biliosa mēstruorum profluui laboranti superueniens. 3. 649
Hectica pestilens, vide Pestilens hectica.
Hectica ex melancholica cōtracta, quæ primum gradum, postea excedens ad secundum, deinde ad tertium peruenit, ex qua æger obiit, & de hectica tabida non exquisita, 1. 111 a
Hectica post diuturnos morbos orta, 1. 115 a
indicationes curandi, ib. alimenta cōuenientia, ib. b. Hectica præsens quomodo cognoscatur, 1. 110. b Hectica simplex post Ephemerā orta, 1. 107 b. curita dicta 1. 108 b. Hecticarū genus duplex, 1. 109 a
Hectica simplex quomodo cognoscatur, 1. 110 b. quomodo discernatur a putrida, ib. b. a syncho, ib. Hectica imminens quomodo cognoscatur, 1. 110 a Hectica & continua quotid. quid differant, 1. 52 b
Hectica pestilens vna cum putrida pestilenti permixta, 1. 188 a. Hectica cum tabe, 1. 119 b
curatio, ib. marasmus in marasimum lethale desinens, ib. b. Hectica cui postea putrida accessit, priusq; ex continua orta, 1. 123 b. cum quib. putridis misceatur, ib. cum quartana continua, eaque lethali, 1. 124 a
Hectica cum quotidiana difficilis curatio. nis est, 1. 148 a
Hecticæ febris propria & inseparabilia signa, 1. 111. a. Hecticæ marasmodes signa, ibid.
Hecticæ tres gradus, 1. 109 a. Hecticæ causæ signa, 1. 110 a. Hecticæ salubris & insalubris tempora, 1. 112 b Hecticæ symptomata quomodo curanda, 1. 124 ib.
Hecticæ tempora seu gradus tria 221. a

I N D E X.

- Hectica compositio cum putrida, 1. 148 a
 Hectica febris quæ corpora & quæ ætate &
 quo tempore magis minusve subiecta
 sint, 1. 114. a
 Hecticarum febrium prognostica, 1. 1b. a
 Hecticarum diuifio, 1. 109. a
 Hedricum optimum ex Paulo ad ani infla-
 mationes & excrefcencias, 3. 434. a
 Helix Delphensis hernia magnitudine hu-
 mani capitis, 3. 207. 605
 Helidæus apud Bononienses in Italia me-
 dicus insignis, 1. 12. b
 Helleborus niger, 1. 336 a
 Hemierania, 1. 307. ab humore frigido, 1b a
 biliofo humore, 1. 308. a
 Hemierania calidior cum ophthalmia, 1.
 308 a. cum quartana per abfcelfum auris
 terminata, 1b. 309. a
 Hemipagia, 1. 310 a (1. 141. b
 Hemitritæi quo tempore apparere soleant,
 Hemitritæus minor, 1. 140 a signa, curatio
 1b b plus pituitæ in fe, quam bilis conti-
 nens, 1. 1b a
 Hemitritæus quo tempore & quibus magis
 familiaris, 1. 135 a. propria, 1b.
 Hemitritæi maioris cauffæ, 1. 143. b. signa,
 progn. curatio, 1b. 1b.
 Hemitritæus medius, 1. 142 a. cauffæ, signa,
 1b. 1b.
 Hemitritæorum typoni propria, 1. 135. a ty-
 pus verus vnde cunq; periculum porten-
 dit, 1b.
 Henricus Vergerius medicus, 3. 561
 Hepar calidum, imbecillumq; 3. 200 b
 Hepatis insignis dolor, ex materia crassa,
 ventofa, intra mēbranam hepatis & eius
 substantiam collecta, vt de apoftemate
 metus efferet, 3. 220. b
 Hepatis apoftema, in abfcelfum commuta-
 tum, mox in vlcus malignum, deinde in
 est humenō, ac grangianam, ac tandem
 in mortem, 3. 217 a
 Hepatis vlcus cur difficulter aut nullo mo-
 do fanetur, 3. 219 b
 de Hepatis carnofitate hift. Gradi, 3. 219. b
 Hepatis fcirrhus in hydropem lethalem mu-
 tatus, 3. 223. a
 Hepatis obftructio ex flatib; crassis, 3. 205 b
 oppilatio, obturatio, 1b b. ex crassis & vi-
 fcidis humorib; 3. 206 a. signa. progn. cur,
 1b a. b. obftructio ex pituita crassa, 3. 207
 a ex cauffa calida cum hepatis caliditate
 3. 208 a
 Hepatis inflammationem non femper com-
 mitatur febris acuta, 3. 209. b. inflamma-
 tio in gibba aut fima iecoris parte orta,
 quibus signis comprehendatur, 1b. 210 a.
 inflammatio hepatis quomodo distin-
 guatur ab ea, quæ est mufculorum abdo-
 minis, 1b quomodo a pleuritide, 3. 211. a
 Hepatis substantia tota purulenta, & cor-
 rupta post mortem inuenta, 3. 220. a
 Hepatis inflammatio admodum calida in
 parte gibbosa, 1. 211 a
 Hepatis inflammatio, 3. 208. b. cauffa, signa
 3. 209 b
 Hepatis inflammatio cū obftructione, &
 febre cōtinua, tendēte ad apoftema 3. 215 a
 Hepatis calidi imbecillique cauffæ, signa,
 prognostica, curatio 3. 202. a
 Hepaticus fluxus biliofus diuturnus cū va-
 riis accidentib; & dolore mingendi, quafi
 abfcelfu fuccedente, & fluxu fanguino-
 lento. modo quafi puro, modo biliofo
 modo nigro, 3. 392. a
 Hepaticus seu iocinorofus pro pleuritico
 perperam iudicatus, 3. 204. a. & 205. b
 Hepatici multi ex olere feridis curati, 3. 390.
 Hepatici qui, 3. 201. b
 Heraclitus Ephesus melancholicus, 1. 331 a
 Herba refrigerantes vicē plūbi habēt, 3. 581
 Herpes miliaris, 1. 144 a
 Hernia seu Ramex, Græcis κήλη, quid & q
 vocis erymon, 3. 599 qualis affectus, 601.
 eius generales diuifiones duæ in ruptu-
 ram & Relaxationē, item in Ofchealē &
 Inguinalē, 605 Ruptura quid, 600. cauf-
 fæ, 601 quid a Relaxatiōe differat, 1b. cur
 illi pueri obnoxii, 602. Relaxationes vbi
 accidunt, 601. earū canones & particula-
 tis curatio. 607 Hernia Ofchealis quæ &
 vnde dicta, 613 Herniæ signa, prognoses
 601. 605. & 606. initio cōtemta ab exigui-
 tate hernia mirum subito excrefcit, 606.
 hernia raro laborant mulieres, 602. varia
 ad herniam remedia, 603 604. emplastrū
 Herniale 619. extremum remediū a chi-
 rurgia, 612. fed periculofum. 1b fepe vnica
 pūctione, 1b. nec lectione fola fectio ifta
 difcenda, 1b. herniæ particularior diuifio
 in plura genera. 599. 600
 Hernia vmbilicalis ὀμφαλική κήλη, ἢ ἑξ ὀμφαλον
 3. 599. 621. 622. signa 1b. & 623. quinq; eius
 fpecies, 622 quib; plerūq; accidat, 621. cu
 ratio, 1b. & feqq. quom. chirurgia curetur
 623. ligatura ad eā apta, 1b & feq. in ileon
 lethalem tranfmutata 1b. herniæ vmbili-
 calis carnofæ hiftoria Beniuenii, 1b ruptu-
 ra fupra vmbilicum, 606. (ratio, 620
 Hernia fanguinea, 3. 605. 619 signa, 605. cu-
 ratio, 619. 621. 622. signa 1b. & 623. quinq; eius
 fpecies, 622 quib; plerūq; accidat, 621. cu
 ratio, 1b. & feqq. quom. chirurgia curetur
 623. ligatura ad eā apta, 1b & feq. in ileon
 lethalem tranfmutata 1b. herniæ vmbili-
 calis carnofæ hiftoria Beniuenii, 1b ruptu-
 ra fupra vmbilicum, 606. (ratio, 620
 Hernia inguinalis Græcis βροχονική κήλη, quid,
 3. 599 signa, 601 602. exempla herniæ in-
 guinalis, 600. 601. 602. 608. 1b.
 Hernia humoralis aut Humorofa, 3. 560 3.
 600 605. 619. vtilis ad eam fofus, 3. 562
 Hernia carnofa παρεκτική κήλη, quæ 3. 587. & 690
 eius cauffæ, 3. 601. 604. 614. signa, 604.
 progn. 614. curatio, 613. 612. chirurgia nō
 fine periculo tollitur, 613. neruo indura-
 to carnofa hernia incurabilis, 611. 613
 Hernia seu Ramex omenti Arabibus, Zir-
 balis, Græcis ἐπιπλοκήλη quæ 3. 600. 613.
 signa, 602. prognostica, 606. curatio &
 remedia, 609. 613
 Hernia Aquofa ὑδρική κήλη, 3. 600. 610. cauffæ
 601 signa, 604. curatio, 618. qui in infan-
 tibus curanda, qui in adultis, 619
 Hernia ventofa πνευματική κήλη, 3. 600. 616.
 cauffæ, 601. 616. signa, 605. quis in ea hu-
 mor dominetur, 617. curatio, 617. incifio-
 ne non curatur, 1b. pueris familiaris & fa-
 cilis in iis curationis, 1b.
 Hernia varicofa κισσακήλη, 3. 600 615. 616.
 materia, 1b. 618 signa, 604. 615. 616. reme-
 dia, 1b. 618
 Hernia gutturis βρογχοκήλη, 3. 599.
 Hernia inteftinorum & omenti mixta Græ-
 cis ἐπίπλοον περικήλη, 3. 600
 Hirudo cum aqua deglutita, 2. 169
 Hippoc. feipfum ægrotantem pro exemplo
 ponere non erubuit, 1. 9. a. vt nec Gal &
 alii præftantiffimi medici, 1. 91
 Hippocrat. altera rebus humanis a Deo da-
 ta lux, 3. 719
 Hippuris eximia ad herniā herba, 3. 603
 Hispanus feptuagenarius qui ab Hernia
 liberatus, 3. 615 (uato 2. 56. a
 Hifpiditas genarum ex pili ordine depra-
 Historia Gal de cerebro vulnerato, 1. 293. a
 Hift. Amati Lufitani de vlcerib; renū obfir-
 matis, 3. 560. cuiusdam vlcere in inferiori
 penis parte laborantis, 566. Gal. de Go-
 norrhæa in muliere, 583. iuuenis cuiusdā
 ganglio adfecti, 570. Medici qui coniu-
 gem a Phymofi curauit, 569. nobilis vir
 cui intumuerant testes. 3. 593. Religiofi
 pollationem paffi, 3. 584
 Hiftoria nobilis cuiusdam iuuenis, 1. 272. b
 Hiftoria fenis apud Gal. 1. 116 a
 Hiftor. de refoluentibus in principio phre-
 nitidis, 1. 324. a
 Hift. de croco martis male adhibito, 1. 114. b
 Hiftoriarum notitia conducibilis, 1. 315. b
 Homo & equus quam diu generent, 3. 589
 Homo plusquam cetera animalia fternu-
 tat, 1. 487. a
 Homo currato memoria & iudicio fimul
 excellat, 1. 313. b
 Horroris cauffa, 1. 145. b
 Hugo Nieuuenius Medicus Haganus, 3. 596
 ab hernia carnofa per incifionem libera-
 tus, 3. 589
 Humores quomodo corrumpantur, 3. 191 b
 Humor vifcofus quomodo purgari debeat,
 Humoris concoctio, 1. 54. b (1. 298
 Humores num in ipfo ventriculo generen-
 tur aut aliunde influant, 5. 135. b
 Humores quando dicantur furere, 1. 46 b
 Hypocephalos, 1. 152 a. quid 1b.
 Humor pituitofus quomodo præparandus
 & purgandus, 3. 101 b
 Hydronofus, 1. 157. b
 Hydrops mulier empirica & mendica exci-
 tata, quæ poftea curata fuit 3. 242 b
 Hydrops coniuncta ictero quomodo cure-
 tur, 3. 265 a (a 3. 239. a
 Hydrops, 237. a cauffa generationis, 3. 238.
 Hydrops ex quartana, 3. 240
 ab Hydrope vetula curata, 3. 253. a
 Hydropem præfagientia signa, 3. 242. a
 Hydrops fingulis mēfibus per vterum ex-
 purgatus, 3. 654
 Hydropicæ mulieres curatæ, 3. 248. b
 Hydropicus pauper, 3. 238. b
 Hydrophobia correpti, & non diu poft ex-
 tincti, 1. 350 b
 Hydrophobia, 1. 349. b
 Hydrophobiæ cauffæ, 1. 351. notæ 1b. signa
 prognostica, 1b curatio, 1b.
 Hyems frigidiffima, 3. 66. b
 Hypopyon seu pus collectum fub cornea
 tunica, 2. 29. b
 Hydropici interdum refrigerandi, 3. 256. a
 Hyofcyami emplastrum, 3. 595
 I.
 Acchinus decocto ligni indici & dictamni
 mulieri toto quinquennio non purgatæ &
 fterili mēfes euocauit, 3. 625
 Iacobus Syluius abhorret ab incifione her-
 niæ metu castrationis, 3. 612
 Iactatio corporis & inquietudo, 1. 229 b
 Icterus ex calore hepatis, ac eiufdem vifce-
 ris leui inflammatione, vna cum febre du-
 plici tertiana, 3. 225. a
 Icterus niger, 3. 232
 Icteria nigra ex vtroq; vifcere obftructo, 3.
 233 a. viridis seu mixta ex vtroque humo-
 re & ex vtroque vifcere, 3. 233. b
 Icterus, 3. 223. b
 Icterus abfq; febre, fola purgatione & no-
 dulo in ceruiffa dependente & expreffo,
 & ceruiffa ebibita, curatus, 3. 229. a
 Icterus cum obftructione iocinoris, 3. 230. b
 Icterus ex oppilatione meatus cystis seu po-
 ri fellei, tēdentis ad inteftina, vnde ingens
 dolor colicus fecutus cum induratione,
 Icteri varia nomina, 3. 224 a (2. 231. b
 Iecoris calida intemperies, 3. 389. a
 Iecoris frigida intemperies, 3. 1b. a
 Iecur femper afficitur in Hydrope, fūe pri-
 mario, fūe per confenfum, 3. 238 a
 Iecti-

I N D E X.

- I**ectigatio, i. 441 a
Iectigatio seu palpitatio musculorum maxillae apprehendens, i. 440 a
Ileos ex febre acuta lethalis, i. 209 a
Ilei dolor syncopes parit, i. 209 b
Ilei dolor ex veneno assumpto, 3. 346 a. curatio, ibid.
Ilei curatio ex stercore duro, vel ex stercore multitudine, 3. 338 b
Ileo malo mulier correpta, & in icterum incidens, & curata, 3. 266 b
Ex Ileo ab umbilici ruptura orto, mulier curata, 3. 344 a
Ileus, 3. 332 a. unde dictus 3. 333 a. signa, causae, prognostica, ibid. a b
Ileus lethalis, 3. 334 a. signa causarum, praesagientia, 3. 335 b. prognost. p. seq.
Ileus intolerabilis ab inflammatione tenuioris intestini ortus, 3. 336 b
Ileus seu voluulus ex ciborum corruptione, 3. 339 a. curatio, ibid.
Ileus ex bubonoecele ortus, cum vomitu enormi, 3. 340 a
Ileus ex omphalo ortus, curatur in muliere, 3. 341 a
Imaginationes foedae, 3. 584
Imaginatrix facultas moderatrix formae, 3. 721
Impregnatio, 3. 719
Impotentia coeundi qualis affectus causae, signa prognostica, curatio, 3. 585. 586. 587. 588
Inapetentia ex pituitoso humore, cum intemperie frigida ventriculi, 3. 146 a
Inapetentia vide Anorexia.
Inapetentia, 3. 143 a
Inapetentiae signa, 3. 145 b. prognostica ibid. curatio, ibid.
Inapetentiae causae, 3. 143 a. quae pars in ea afficiatur & quis affectus, causae, ibid.
Internatiuus pulsus, 3. 568
Incendium Delphensis urbis, i. 161 b
Incubus cur in somni initio fiat, i. 379 b
Incubus, i. 377 b
Incubus differt a care, catalepsi, apoplexia, epilepsia, i. 379 a
Incubus cum pauore, i. 379 b. eius differentiae, ibid.
Incubus quis affectus praeter naturam, i. 379 a
Incubo laborantes omnium primo a paroxysmo excitandi, i. 380
Incubo pueri & infantes maxime obnoxii, ibid.
Incubo excitatis quid faciendum ne redeat malum, ibid.
Incubi futuri signa, prognostica, curatio, i. 379 b
Inediatriennis, i. 36 a
Infans, natus sine osse coagulato & tamen curatus, 3. 120 a
Infans duorum annorum ultra 100. vermiculos per alium excernens, 3. 360 a
Infans ex epilepsia post hydrocephalon obiens, i. 252 b
Infans convulsionem patiens, i. 447 a
Infans saphatum habes seu tinea, i. 248 a
Infantes cur magis epilepsia tententur, quam adulti, i. 388 b
Infantes ex pleniore suctione fiunt somnolenti, i. 390 a
Infantium incubo laborantium curatio, i. 380 a. adultorum, ibid.
Infantis caput si crustae occupant, i. 250 b
Infantis regimen ex Errore, 3. 768. Ex Mochione, 767. Ex Bonaciolo, i. 10. Ex Paulino, 771. Ex Hippocrate, 772
Infans quo tempore moueatur, 3. 719
Infantem ante 40. diem videre ominosum, 3. 771
Inflammationis septi vel mediastini signa, 3. 43 b
Inflatio stomachi & hypochondriorum ex humore melancholico, 3. 188 a
Infusum hellebori nigri, i. 98 b
Iniectio ad vlnus penis & dolorem, 3. 562. 563. 564. 566. ad sanguinis per penem emissionem, 566
Inquietudo, i. 229 b
In quibus casibus in catarrho non liceat uti gargarismis, i. 472 b
Insania ex morfu canis rabidi, i. 349 b
Insania lupina, i. 348 b
Insectorum multitudo pestem denunciat, i. 165 b
Infessus ad sustenda menstrua, 3. 652
Intemperaturae simplices non diu protrahuntur, quin humorem accumulent, i. 264 a
Intemperies sola diu existere non potest, 3. 134 b
Intemperiei frigidae signa, eiusque curatio, ibid. calidae signa & curatio, ibid. b. tumidae, 3. 135 a. siccae, ibid.
Intemperiei cum materia curatio, 3. 138 b
Intestina in scrotum prolapsa cum hydrope, 269 a
Intestinorum colliquatio, 3. 379 a
Intestinis ablutis quae addenda, 3. 411 b
Ioachimus Monachus ex enterocoele in Ileo lapsus, 3. 609
Ioannes Heuterus hernia carnea laborans i. 18 a
Ioannes de Boys phatmacopoeus Parisiensis, 3. 615
Ioannes Tiengius Medicus acrimonia ad testium inflationem vsus, 3. 593. eius aedes emit Forestus, 695
Ioannes Dubius Medicus, 3. 570
Ioannes Cornelius testem cum scroto indurata habens, 3. 604
Iodocus Augustinus, 3. 570
Ioannes Capella medicus Francisci Regis, 3. 616
Ioannes Cantaropolitanus herniam habens instar capitis humani, 3. 616
Ioannes Roelandus a diuturno Scroto pruritu curatus, 3. 597
Ioannes Forestus, auctoris frater lusu puerili enterocelen incurrens, 3. 609
Ioannis Bimi filius umbilicum habens valde eminentem, 3. 623
Ioannes Pynhonii filia hernia inguinali adfecta, 3. 599
Ioannis Matthiis Medici epistolae, 3. 734
Ioannis Tiengii vxor a fluore muliebri per ipsum curata, 3. 659
Ioannes Langius, 3. 577
Iociaorosi, 3. 201 b
Irritatio sanguinis enaribus, i. 269 b
Ischuria perperam curata & lethalis, 3. 525 a
Ischuria, 3. 520 a. duplex, ibid. causae, ibid. quatuor diebus perdurans, ibid. causae, ibid. & 521 a. b. in puero calculoso, 522 a. ex nimia vesicae distensione, 523 b. ex limoso humore penem intus obstruente, 524 a
Ischuria & urinae retentio, ob calculum in vesica collo haerentem, 3. 529 b. curatio, 3. 530 a
Italas Mulieres pessime vivere; & optime vestiri, 3. 722
Iudaei recuti, 3. 563. inde a ceteris gentibus distincti, 563
Iudaeus impostor, 3. 557. flagellatus publice, 558
Iudicii boni vel mali in cranii fractura notae, i. 289 a
Iulapium ad singultum & febrim, 3. 566. pro sartore esthiomeno laborante, 568
Ius restaurans & simul alium subducens in puerpera, 3. 767
Iuuenis biliosus febre ardente exquisita laborans, i. 39 a
Iuuenis biliosus & robustus laborat febre putri continua, i. 3. b
Iuuenis carnosus sanguineus vere synocha patri seu continente febre laborans, i. 19 a
Iuuenis ex aquae potu in deliquium animi, deinde in pleuritidem lapsus, i. 15 a
Iuuenes in vitia penis saepius incidunt, quam senes, quod habeant humores calidiores, 3. 565

L.

Labia ulcerata, inflata, subnigra, tumida, plumbea, & dura carcinomatis instar, ex lue Gallica, 2. 102 a
Labiorum fissura, 2. 101 a. iuuamenta, ibid.
Labiorum fissurae & vlcerum quomodo curentur, 2. 102 a
Labiorum resolutio & eius curatio, i. 430 a
Labrum quibusdam tremulum, 2. 101 b
Lacedaemoniorum mos, i. 283 a
Laerymae, 2. 22 a
Lacrymae ex vno oculo vitro effluentes, 2. 18 a
Lacrymae inuoluntariae, 2. 19 a
Lacrymarum fluxus per internas venas, quomodo curetur, 2. 20 a
Lacrymarum materia, i. 19 b. causae, ibid. externae & internae, ibid. signa, prognostica, curatio, 2. 20 a
Lac colligi crescente Luna, noua, 3. 616
Lac probatum in nutrice, 3. 775
Lac vaccinum, 3. 559
Lac humanum, i. 115 b. caprinum, i. 116 a. alinum, ibid.
Lac nutricis quomodo internoscatur, i. 389 a
Lac in grumos conuersum, i. 125 a. eius curatio, ibid. b
Lactis redundantia, 3. 123 b
Lactis defectus qua via inuestigandus sit, 3. 121 b
Lactis exsiccatio in puerperis nobilibus, 3. 121 a
Lactis defectus, 3. 121 b
Lactis per defectum quid intelligendum, 3. 121 b
Lactis defectus signa, si ex sanguinis defectu proueniat, 3. 122 a. si vitiosus sanguis causa fuerit, ibid.
Lactis defectus ex lacte vitato, 3. 123 a
Lactis caseati curatio, 3. 125 b
Lactis genera, i. 115 b
Lactucam menses promouere quomodo intelligendum, 3. 3637
Lambertus Chirurgus, 3. 570
Lamia Demetrii scortum, i. 353 b
Lana succida ad herniam, 3. 608
Lancina plumbea lumbis apposita, 3. 581
Lancina perforari debet, ibid.
Lanifici puer prouocatur, i. 315 b
Lapilli in folliculo fellis reperti, 3. 226 a
Lapilli e pulmone expulsi, 3. 14 b
Lapidis calamitatis puluis exsiccat, 3. 598
Lapis vomituriectus, 3. 161 b

I N D E X.

- Lapis post insignem dolorem ex lingua pro-
diens, 2. 127 a. in tunica hepatis repertus,
ibid. b. ab intestinis eiectus, ibi. tussia pe-
ctore expulsus, ibid. 127 a
- Lapis lazuli venenosus, 1. 208 a
- Lectio & spectacula impudica vitanda, iis
qui semine abundant, 3. 576
- Lendes in capite & barba, 1. 246 a
- Lendes, 1. 245 a. causa, ibid. 245 b
- ad Lendes, 1.
- Lenticula in febre pestilenti apparentes le-
thales, 1. 189 b. causa, 1. 190 a
- Lenticula, 1. 189 a. signa, ibid. prognostica,
ibid.
- Lentis decoctum, 98 cum cortice mali pu-
nici tollit prurium, 3. 566
- Leporis coagulum cum aceto epotum ad
profluuium muliebre, 3. 659
- Leporis vulua in cibo assumpta conceptum
accelerat, 3. 715
- in Leprosi cur citius pili cadant, 1. 241 b
- ληρωσ, vide Veterius.
- Lethargo prius correptus puer, & mox in
sphacelon incidens, quarto die obiit, 1.
327 b
- Lethargo correptus iuuenis, 1. 326 a
- in Lethargum incidens, vir crassus, pituito-
sus, 1. 327 a
- Leuatorium peni ulcerosi, 3. 567
- Leucophlegmatia, cum alui profluio, 3.
245 a
- Leucophlegmatia, 3. 618
- Lotium bonum quid, 1. 28 b. lotium malum
duplex, ibid.
- Lien maiorem negligentiam fert quam he-
pat, 3. 275 a. lienem quæ minuunt, ib. b
- Colici a splenitico distinctio, 3. 275 b
- Lienis obstructio unde, 3. 294 a
- Lienis obstructio, 3. 275 b. inflatio ac tentio,
276 b
- Lienis dolor, 3. 281 a. eius signa, ibid.
- Lienis inflammati ex solo sanguine notæ, 3.
278 a
- Lienis scirrhus, 3. 283 b. curatio, 3. 286 a
- Lienem affici, 3. 232 b
- Lienosus, 3. 272 a
- Lienis affectus, 3. 273 a. obstructio, ib. b. cum
tumore, ib. obsessi & obstructi meatus, 3.
274 a. causa & signa, ibid. b. curatio. pag.
seq.
- Lienteria diurna, lethalis, 3. 397 a. signa pro-
gnost. ibid. ex causa calida, & humore a-
cri & bilioso, 3. 397 b. ex causa frigida, p.
seq. ex ulcere ventriculi, 3. 399 a
- Lienteria cum vermibus, 3. 358 b
- Lienteria antiqua, cui scurbuttum malum
adiunctum erat, 3. 393 a
- Lienteria ex ventriculi imbecillitate, cum
matena pituitosa lubricante vetriculum,
3. 395 b
- Lienteria signa, 3. 396 a
- Lienteria causa, 3. 396 b
- Ligatio ob pollutionem, 3. 584
- Lignum Guaiacum epilepticis vtile, 1. 395 a
- Limonum succus & cautio in eius usu, 3.
583
- Lingua quare sine pinguedine condita, 2.
128 b
- Lingua quare dulcibus & pinguibus oble-
ctetur, 2. 129 a
- ex Linguae colore, quomodo viscerum ve-
narumq; habitus coniciatur, 1. 217 a
- Linguae paralysis, 2. 133 a
- Linguae inflammatio atq; tumor durus in
abscessum desinens, 2. 125 a. curatio,
ibid. b
- Linguae asperitas, scabrities, siccitas, adustio
2. 126 b. curatio, ibid.
- Linguae dolor cum tumore duriusculo, 2.
127 a
- Linguae magnitudo, 2. 129 b. causa, & signa
ibid. curatio, ibid.
- Linguae grauitas, 2. 131 b. curatio, signa, ib.
ibid. b
- Linguae scabrities, 1. 225 a. inflammatio, ni-
gredo, fissura, & aphthæ, ib. 1. 226 a
- Linguae asperitas, ariditas, 1. 126 a. totiusque
oris, ibid.
- Linimentum excitanda veneri sopita, 3.
615
- Lipothymia, 1. 209 b
- Lipytia Arabum, 1. 59 a. Græcorum, ib. eius
præfagia, ibid. curatio, ibid. cibus, ib. po-
tus & balneum, ibid. forinsecus applican-
da, ibid.
- Lipytia, 1. 60 b
- Literæ auctoris ad Cripium, Pens. Delph. 3.
738
- Locustæ innumerabiles iminere mari, &
ad litus reiectæ putrido vapore, pestem
excitarunt, 1. 162 b
- Locustarum multitudo pestem præfagit, 1.
166 a
- Lomentum quid, 3. 569. 598
- Loquendi facultas ex quibus causis male
afficiatur, 2. 735 b
- Lotium, vide Vrina.
- Lotium turbidum in febre pestilenti, lethar-
le, 1. 28 b
- Lotium maximum indicium ad prognosti-
con, ibid.
- Lotium rubrum indicat morbum securum,
sed diuturnum, 1. 29 a
- Lues venerea præcipua causa morborum,
qui in pudendis, 3. 566
- Lucensia balnea clariorem conciliant vri-
nam, 3. 560
- Lumborum dolor, calor, & grauitas in fe-
bribus, 1. 229 b
- Lumbrici teretes ac rotundi, 3. 359 a. medi-
camenta, ibid. b
- Lumbrici quibus inter se differant, 3. 350 b
- eorum communes causæ, ib. adiuuantes,
ibid.
- Lumbricorum teretum signa, 3. 353 a. lato-
rum signa, ib. b
- Lumbricorum curatio, 3. 354 b
- Lupi puerilis genus apud Alemarios, 3. 609
- Lupi intestinum colico morbo resistit, 3.
331 b
- Lycanthropia, 1. 348 b. causa, signa, cura-
tio, pag. seq.
- Lypothymia & syncope quid differant, 1.
209 b
- M.
- Macula plumbea in peste, 1. 190 a. b.
- quomodo macula appareant in pe-
ste etiam post mortem, 1. 190 b
- Macula in peste, 1. 169 b
- Mador quid, 1. 227 a
- Magnes a quibusdam ceratis rupturæ im-
ponendis admixtus, vt chalybe deuora-
to, intestina attrahat, 3. 611
- μαλακία, 3.
- Malum S. Rochii, 1. 179 b
- Malum diuturnum quomodo curandum,
3. 355 a
- Mammæ cur incrementum causa, 3. 128 a
- Mammarum incrementum, 3. 128 b
- Mammarum scirrhus & durities, 3. 127 a. eius
curatio, ib.
- Mammilla vlcera sigillanda, 3. 128
- Mammilla dextra inflammatio, 3. 126 a
- cuius causa, signa, curatio, ibid.
- Mammilla sinistra inflammatio seu apo-
stema in suppurationem conuersum, 3.
126 b
- ad Mammillarum vlcera corrodentia, cu-
ratio, 3. 128 a. ad mammillarum fistulas,
ibid. b
- Mandibula ex oscitatione luxata, 1. 485 b
- Manduci effigies, 1. 283 b
- Mania in homine bilioso, 1. 345 a
- Mania, vide Furor.
- Mania, 1. 341 b. ab ipsa laruarum matre di-
cta, 1. 392 a
- Maniæ præsentis signa, 1. 343 b
- Maniam futuram indicantia signa, 1. 343 a
- Maniaci se ipsos conficiunt, 1. 343 a
- Manuum tremor, 1. 436 b
- Marasmus deurens, 1. 112 a. frigidus, ib. syn-
coposus, ibid. b
- Marasmus, 1. 109 a
- Marasmodi ex syncope quæ valeant, 1. 121 b
- Marcor, 1. 109 a
- Matenne, 1. 10 b
- Mares an in dextra, foemellæ in sinistra vteri
parte concipiantur, 3. 720
- Matia Seneca comitissa Nola, mira-
bilis vrina, 3. 630
- Marisne, 3. 426
- Maritis nouis, si officio fungi nequeant,
subueniendum, 3. 585
- Masticatoria, 1. 275 b
- Masturpatio vitanda, 3. 585
- Matalium ad gonorrhœam, 3. 581
- Mater puerorum, 1. 381 b
- Materia febris minutio, 1. 70 a
- Materia febris turgente quid agendum, 1.
48 a
- Materia februm minutio, 1. 70 a. præpara-
tio, ibid.
- Materia prauiras duplex, 1. 238 a
- Matrimonium contrahendum vitandæ pol-
lutioni, 3. 585
- Matrona mortua ex caro, 1. 365 b
- Matrona Atheniensium quo auxilio in Te-
misphoriis ad seruandam castitatem vsæ,
3. 572
- Maturatio quomodo perficiatur, 3. 63 a
- maturationis tempore, virum venæ fe-
ctio fieri possit, ibid. b
- Maximam calorem habens, 1. 73 b
- Medicamenta nunquam debent a cœna pro-
pinari, 1. 426 b
- Medicamenta acris fluxum humorum a-
crium irritant, 3. 558. vehementer exsic-
cantia, quibus conueniant, 3. 565
- Medicamentum leniens, 1. 57 b
- Medicamentum ex stercore columbino, 1.
262 b
- Medicamentum leniens, 1. 64 a. 184 a
- Medicasteria alio fere necis causa, 3. 567
- Medici nostræ ætatis taxantur in quantita-
te sanguinis mittendi, 1. 267 b
- Medici raro ad eos vocantur, qui a vini do-
lore capitis tentantur, 1. 184 a
- Medico non esse turpe loqui de partibus na-
turalibus, 3. 77
- Medicorum sententia minus meruenda
quam lenatorum, 1. 451 b
- Medicorum imperitorum error, 1. 208 a
- Medicorum in abundantia saluæ deceptio,
1. 129 a
- ib. Medicorum controuersia de aere, 1. 320 a
- 128 Medicus finem suum quibus instrumentis
allegatur, 1. 259 a
- Medicus

I N D E X.

- Medicus felix, qui in declinatione morbi venit, i.** 12. b 21 b
- Melancholia a sanguine melancholico vniuersum occupans corpus, & cerebrum ladens, i.** 336 a
- Melancholia solo cerebro affecta, i.** 338. a
- Melancholia morbus, i.** 329. a. quid sit, b. quæ pars in ea afficiatur, ib. b. differt a phrenitide & mania. ibid b
- Melancholia & amentia quid differant, i.** 334 b
- Melancholia ex sanguinis copia orta, i.** 332. a. quem cerebri morbum consequatur i. 332. b
- Melancholia paulatim initium habens, & tandem in cerebro confirmata, i.** 333. b
- Melancholia hypochondriaca, i.** 338. b. & seq eius causæ, & curatio. ibid.
- Melancholia bilis vera, i.** 332 b eiusque mediata causæ, ibid. externa, i. 333. a. remota, ibid.
- Melancholiæ signa, argumentum, signa omnibus communia, i.** 331. b. signa specierum melancholiæ ex toto, ibid b
- Melancholiæ curatio, quibus instrumentis perficiatur, i.** 335
- Melancholiæ biliosæ quæ obfunt, i.** 337 b
- Melancholiæ hypochondriacæ seu flatuosæ signa, i.** 332 a
- Melancholiæ differentiarum causarum signa, i.** 333 a
- Melancholiæ propria indicia, i.** 330 a
- Melancholiæ vigor, eiusque confirmatio, i.** 332 b
- Melancholicos quomodo Gal. ex primario cerebri affectu curabat, i.** 338 b
- in Melancholico humore unde metus & tristitia, i.** 330 a
- Melancholici multi & sapientes cur inciderunt in epilepsiam, i.** 382 b
- Melancholicorum febricitantium historia, i.** 330 a
- Melancholicorum varia visa & phantasmata, i.** 330 a
- Melancholicis ob varias cogitationes dormire non potens, i.** 361 b
- Melancholicus vtrum aliquando in capite periclitentiam sanguis detrahendus sit, i.** 335 b
- Melancholici historia, qui sibi caput amputatum putabat, i.** 330 b. mulieris, quæ se putabat serpentem deuorasse, i. 330 b
- melancholici duo fratres, vnus in lecto obiens, alter in fundum se præcipitans, i.** 330 b
- Melidia ægrotans, i.** 32 a
- Melissæ conferua ad palpitacionem cordis, i.** 739
- Membrana cerebri vulnerata, quomodo tractanda & conglutinanda, i.** 287 a
- ad Membranarum dolorem cerebri emplastrum, & ferruminans ossa caluariæ fracta, i.** 292 b
- in Capitis dolore ob crisi nihil agendum, i.** 293 b
- Membra stupida vel torpida, i.** 437 b
- Membris conuulsis quare non semper adsit dolor, i.** 443 b
- Memoria diminuta a frigidityte, siccitate, inanitione, senectate, melancholico succo, i.** 357 a
- Memoriæ detrimentum i.** 355 a. signa causarum, prognostica, i. 356 b
- ad Memoriam diminutam, & quasi deperditam experimentum, i.** 357 a
- Mensis Lunaris, i.** 720
- Mensium fluor curat febrem synocham, i.** 249 a
- ex Mensibus suppressis in virgine in anasarcam incidens, i.** 249 a
- Menstrua purgatio quibus ante xvi. annum non procedat, i.** 626
- Menstrua purgatio qua mensura in muliere sana, i.** 624
- Menstrua purgatio vomitu proiecta, i.** 38 a
- Menstrua purgatio cur quibusdam citius, quibusdam rarius procedat, i.** 625
- Menstrua purgatio in prægnantibus, a quarto ad septimum mensem tuta, i.** 745
- Menstruas purgationes frustra sæpe prouocari, i.** 633
- Menstrua moueri decrecente Luna, i.** 626
- Menstrua quando fluere incipiant, quando desinant, i.** 625
- Menstrua per os eiecta, i.** 629
- Menstrua quæ ducunt, quomodo a diureticis differant, i.** 636
- Menstrua quomodo prouocanda post partum in febricitante, i.** 770
- Menstrua cur flores & tempora vulgo dicantur, i.** 629
- Menstrua retenta aut etiam nimium fluentia hydropis causæ, i.** ibid.
- Menstruorum profluuium per anastomosis quæ conueniant, i.** 647
- Menstruorum profluuium quod sequitur abortum, periculosius quam quod sita foetu grandiori, i.** 644
- Menstruis euocandis sanguinem tribus diebus ante tempus purgationis solitum mitteri debere, i.** 631
- Menstruorum fluxum præcedentia, i.** 42 b
- Menstruorum profluuium obnoxia mulieres vegeta, i.** 656
- Menstruorum fluxus æstimandus pro quantitate & æqualitate, i.** 637
- Menstruorum retentionem impedire conceptionem, i.** 718
- Menstruorum profluuium quid proprie, i.** 641
- Menstruorum profluuii signa præfagientia, i.** 643. demonstratiua, i. 644
- Menstruorum profluuii in anastomosis curatio, i.** 648
- Menstruorum profluuium curatum quomodo, i.** 653
- Menstruorum profluuium ex pituita, i.** 661
- Menstruorum profluuium sistendo experimentum mulierularum, i.** 650
- ad Menstruorum profluuium in signe secretum Elidei, i.** 641
- ad Menstruorum profluuium non tuto utendum localibus in principio, i.** 657
- in Menstruorum profluuium cucurbitæ affigendæ radicibus mammarum, i.** 646
- in Menstruorum profluuium an inguina vinciri debeant, i.** ibid.
- Menstruorum suppressionis causæ, i.** 626
- Menstruorum suppressionis signum, i.** 629
- Menstruorum suppressorum prognostica, i.** 630
- Menstruorum suppressioni tempestiue succurrendum, i.** 631
- Menstruorum suppressio an omnis ab utero, i.** 654
- Menstruorum suppressionis ob pinguedinem, curatio, i.** 634. ob sanguinem biliosum, i. 639
- Menthæ succus, qualem vim habeat, i.** 565
- Mentula, vide Penis.**
- Mercuria quando in vlceribus penis utendum, i.** 566
- Mesenterii tumor ac durities, i.** 311. a. morbi, causæ & signa, ibid callus, inflammatio, ibid b
- Methodus medici sacra anchora esse debet, i.** 268 b
- Meiendi difficultas cum stranguria, i.** 511 a
- Mictus sanguinis ob venam ruptam in renibus, i.** 452 b ex venis renum corrolis, i. 453 a
- Mictus sanguinolentus diuturnus, i.** 453 b
- Mictus pilorum, i.** 4. 562
- Mictus sanguinis ex cantharidibus sumtis, i.** 448 b
- Mictus sanguinis ex ruptura venæ, i.** 450 a
- ex plenitudine per interualla interueniens, ibid.** 451 a
- Mictus sanguinis serosus, ibid b**
- Mictus arenarum, vide Arenarum mictus.**
- Mictus sanguinis in variolis aut morbillis periculosus, i.** 198 b
- Mictus sanguinis, vide Sanguinis mictus.**
- Miles qui semper duo cernebat, lib. 11. ibid.** 39
- Miles a vulnere impotens ad coitum factus, i.** 588
- Mingentes in lecto, i.** 524 b
- Mingendi difficultas orta ex intemperie frigida, i.** 514 b
- Mingendi difficultas ob callum carnosum vel verrucam aut excrescentiam carnis intus in pene innatam, i.** 515 a
- Mirach, i.** 587
- Mitigatoria & repellentia, i.** 270 b
- Mixtura, i.** 79 a
- Mœstitia in febribus, i.** 37 b
- Mola vteri quid, i.** 721 & 722
- Mola diuersi modo a barbaris medicis nominata & descripta, i.** 706
- Mola pluribus oculis plena, i.** 724
- Mola quot modis generetur, i.** 726
- Molæ variæ species, i.** 721
- Molæ causæ in facultate formatrice posita, ibid.**
- Molæ quæ causæ materialis, i.** 725
- Molæ distinctiua signa a vera conceptione, ceterisque similibus affectibus, i.** 7. 7. & 728
- prognostica, i.** ibid.
- Molæ curatio, i.** 729 & 731
- Mola non nisi concumbentibus mulieribus contingit, i.** 725
- Molam cur nulla præter hominem animalia gignant, i.** 725
- μολαπιδες, i.** 191 b
- Molles qui, i.** 585
- Monacha quæ per os menstrua euomebat, lib. 28. obs. 3.**
- Monacha paralyti linguæ affecta & curata, i.** 428 a
- Monacha phthifica pro deplorata habita, euasit, i.** 92 b
- Monachus melancholicus sæpe ex inani metu palpitacionem cordis incurrens, i.** 102 b
- ad cordis palpitacionem aqua mirabilis, i.** 103 b

I N D E X.

Monacha a palpitacione cordis ab humore aquofo in pericardio contento curata, 3. 104 a	habeat, 3. 625	Suffocatus, 1. 255 a
Monachus furiofus curatus, 1. 34	Mulier quomodo tractanda fi de coceptio- ne dubitetur, 3. 718	Nauta in herniam præ dolore incidens, 3. 619
Monachus admodum fenex tertiana legiti- ma laborat, 1. 67 b	Mulier ex fungis comestis infana facta, 1. 458 b	Nauta cur plerique herniofi, 3. 608
Monachus Satyriafi laborans, 3. 575	Mulier fati extenuata, & graciles mam- mas habens, ex defectu lactis laborans, 3. 122 b curatio, pro varietate cauffarum ibid.	Nebulæ post variolas & morbillos relictæ, 1. 203 b
Monachus deperiens puellam feipfam vi- triolo affumto necavit, 1. 101 b	Mulier vomitione menses ptoliciens, 3. 38 b	Nephritis seu dolor renis finiftri, 3. 440 a
Monachi quidam ac otiofi cur facile in sy- nocham febrem incidunt, 1. 11 b	Mulierculæ ægris adfiftere non debent, cum imperata medicorum negligant, 1. 23 b	Nephriticus dolor ex renum obftructione ac calculi metu, 3. 460 a
Monachi duo ex odore ceruifiæ tecem e- bullientis, in penario mortui inuenti, 1. 255.	Muliercula femitertiana decumbens, cui tertiana complicata, 1. 740 a	Nephriticus dolor ex renum obftructione, 3. 455 b
Monopagia, 1. μονοπαγία,	Mulieres cur maligna febre magis infesten- tur, 1. 156 a	Nepita menses prouocat, 3. 638
Monstra medicinæ, 3. 629	Murium ftercus mammæ induratas refi- cere, 3. 775	Nervus læfus in aure, 1. 462 b
Monstrosi partus, 3. 194 a	Murium ftercus venerem stimulat, 3. 716	Nervorum motu feruato petit fensus, & econtra 1. 421 a
Morbilli, 1. 201 a	Mutis vicinus enterocelen paffus, 3. 605	Nicolaus nauta chirurgi infcitia in duritiem inflammationemque testium lapfus, 3. 567
Morbilli cum fanguinis fluxu e naribus, 1. 251 b	Mydriasis vide Pupillæ dilatatio. Myopia l. 11. obfer 37. Myopias l. 11. obferuat. differt a strabismo. ibid.	Nodulus ad fingultum, 3. 607. 568
Morbus Epidemius cum gutturis pectoris- que anguftia inuadens, cum vermibus aliisque fymptomatibus grauioribus, 1. 251 b		Nonagenarius prolem fufcipit, 3. 710
Morbus epidemius vna cum febre publice graffans, 1. 152 b		Nucum confectio, 1. 175 a
Morbus epidemius celerem ortum & exi- tum habens, 1. ibid. a		Nutricis regimen, 3. 774
Morbus Lunaticus, 1. 381 b		Nutricibus vinum moderatum dandum, 1. 389 a
Morbus puerilis, ibid.		Nux, 1. 310 a
Morbus fecundarius, 1. 304 b		Nyctalopia seu nofturna cæcitus, libr. 11. obferuat. 38. cauffæ, figna, prognostica, curatio. ibid.
Morbus caducus, 1. 381 b		Nymphææ femen, 3. 572
Morbus epidemius cum vermibus, 3. 351 b		
Morbi contagiofi, 1. 151. a. pestilentes. ibid. pandemii, ibid. fporades, ibid. endemii, ibid. epidemii. ibid. confueti pestilentes, ibid. infolentes, ibid. epidemii fimplices. ibid.	N Arcotica qua ratione conferant, 3. 382 a	O Bmutefcentia, 2. 135 b. eius cauffæ, cu- ratio, 2. 136 b
Morbi regii ex crifi figna, 3. 227 b. curatio, 3. 228 b	Narcoticis in oculis non facile vtendum, 2. 11 b	Obmutefcentia ex temulentia, quomodo curanda, 1. 285 b
Morpiones, 1. 245 a	Narium polypus medicamentis curatus, 2. 91 a	Obftrix qualis efle debeat, & quomodo fe gerere debeat, 3. 548 713. 714 & 765
Morituri non fternutant, 1. 487 a	Narium obftructio diuturna cum variis fymptomatis, 2. 92 a	Obftrix culpata, 3. 759
Morfelli, 1. 79 a	Narium infillationes & illinitiones, 1. 263 b	Obftrix fella, 3. 754
Morfelli ad coitum iuuandum, 3. 590	Narium graueolentia, 2. 85 a. eius origo. ibid. b	Obftrix confilium abhorrendū pro mu- liere grauida, 3. 718
Mors ex carbonibus male olentibus, 1. 255 a	Narium cruftæ, vide Cruftæ. Narium vlceris humidi, fordidi, virulenti, putridi, occulti, curatio, 2. 88 b	Obftrix plurimæ parum peritæ, 3. 622
Mors fine marcere, 1. 109 a	Narium carcinoma, 2. 89 a	Obftructio penis, 3. 562
Mortem futuram in peste præfagientia, 1. 171 b	Nafi rubedo inftar carcinomatis etiam lue- fcens, quomodo curata, ibid.	Obftructionis notæ, 1. 216 a
Mortalia figna quibus funt, non omnes moriuntur, 1. 451 b	Narium venæ incifæ menses retrahunt, 3. 646	Occiput. vide Synceput.
Mortis initium a pedibus, 1. 241 b	Narium eryfipelas phlegmonofa, 2. 85 b	Oculi refoluti curatio, 1. 430 a
Mortua corpora, an viuos inficiant, 1. 185 a	Narium vlcera quibus remediis curentur, 2. 86 a	Oculi inflammatio post variolas in ptery- gion tranfiens, 1. 203 b
Mulier cholera morbo correpta, 3. 189 a	Narium vfus, l. 13. obfer 1. Nares vlcerata, 2. 86 a	Oculi macula, 2. 15 a. cauffæ, figna, pro- gnostica, curatio, 2. 16 a
Mulier ex menfibus fuppreffis quartanam intermittentem incidens, 1. 95 a	Narium vlcera per modum, 2. 87 b	Oculi procidentia 2. 32 a
Mulier bis prima die febricitans & fecunda die femel, 1. 133 b	Narium vlcerum differentia, 2. cauffæ, figna, prognostica, 2. 87 b	Oculi inflatio & tumor coniuncturæ atque durities, 2. 17 b
Mulier morbillos habens, 1. 199 b	Narium vlceris cruftofi curatio, ibid.	Oculi eminentes, libr. 11. obferu. 23. 86 a
Mulier fudamina habens, & a medicaftris male tractata, vnde tandem mors fubfe- cuta eft, 1. 207 b	Nati mense decimo vel vndecimo qui, 2. 22 a	Oculi claudendi & aperiendi difficultas, cū inflatione palpebrarum, 2. 52 b
Mulier melancholia hypochondriaca labo- rans, 1. 340 a	Natura vnus cuiusque propria a Medico exploranda, 3. 676	Oculi exitus, 2. 49 a
Mulier ex fuffocatione vteri laborans pro mortua habita, 1. 418 b	Natura ægrotantis in curationibus confi- deranda, 1. 208 b	Oculi & canthi maioris rubedo, 2. 88 a
Mulier fanguinea, febre fyncho putri correpta, quæ menfium fluore defuit, 1. 212 a	Natura deficiente deficit Medicus, 3. 589	Oculi procidentia, quid differat a phlycte- na, 2. 3 b
Mulier phrenetica & puerpera, 1. 324 a	Naufea, 1. 222 a	prognostica, curatio. ibid.
Mulier cur partes naturales gignendi intus	Naufea cum vomitu conuenientia & diffe- rentia, 3. 153 a. eius cauffa curatio, ibid.	Oculi fuffufio seu cataracta, libr. 11. obfer- uat 30. 33 a
	Nauta in naue, fpiraculis oclufis ex odo- re ceruifiæ recentis ebullientis in lecto	in Oculum impacta pars ligni, 2. lapidis fruftum in oculum impactum, 2. 25 b
		in Oculum incidens puluis aut culex, 2. 24 a
		Oculorum nebula, albugo, cicatrix in cor- nea tunica, 2. 29 a
		prognostica, figna, curatio, ibid.
		Oculo-

I N D E X

- Oculorum** pustulae, scabies, prurigo, 2. 16 a
Oculorum rubedo cum lacrymis calidis per 177 a
petuo ex oculis profluentibus, 2. 20 b
Oculorum pannus, 2. 12 b 177 a
Oculorum vitia aliquando contagiosa, 1. 204 b
Oculorum nebulae post variolas, 1. 203 b
Oculorum dolor, 2. 10 b
Oculorum morborum differentia, 2. 11 b
Oculorum dolor omnium maxime exerciat. ibid. 119 a
Oculorum nigrorum & caesiorum visus, 1. 11. b. 37
Oculorum tumor, 2. 18 a
Oculorum pustulae, vesicae, 2. 16 b. signa, causa, prognostica curatio, obf. b. & p. seq. 17 a
Oculorum pruritus & scabies, 2. 17 a
Oculorum ulcera, 2. 25 a. causa, signa, prognostica, 2. 26 a. b
Oculis quo tempore adhibenda remedia, 2. 7 b
Ex oculis sanguis lacrymarum instar per 3. septimanas copiose emanans, 2. 21 b
Odor ceruiciae ebullientis suffocat, 1. 255 a
Odoramenta mirifice cerebrum iuuant, 1. 262 b
In Oesophagi curatione quae obseruanda, 1. 11. obf. 31
Oleum praestantissimum pro tinnitu vna cum surditate, 2. 72 b
Oleum Sicyonium duplex, 1. 4. 85 b
Oleum e vitellis ouorum, 27. 599
Oleum arcer regis inuentum, 1. 284 b
Oleo an sit vtendum in febricitantibus, 1. 33 b
Olfa ctus laesio, 1. 13. obf. 1.
Ομφαλονη, vide Hernia umbilicalis.
Ophiasis, 1. 238 a
Ophthalmia vera & non vera, 2. 2 b
Ophthalmia, 1. 210 b
Ophthalmia laborans mulier, & ex mala curatione in vlcus vnius oculi incidens, 2. 27 a
Ophthalmia seu lippitudo, 2. 1 a
Ophthalmia vnde dicta, 2. 2 a
Ophthalmia in febre acuta, 1. 220 a
Ophthalmia cum variis affectibus, 2. 8 b
Ophthalmia non vera, 2. 9 b
Ophthalmia ex acri humore bilioso, 2. 3 b
Ophthalmia ex sanguine signa, 2. 4 b
Ophthalmia ex bile vel acri humore ortae signa, 2. 4 b
Ophthalmia ex crassis succis ortae signa, 1. 4 b. a. melancholico humore orta signa, ib. a spiritu flatuoso, ib.
Ophthalmia verae curatio, 2. 5 b
In Ophthalmia grauiori quid faciendum, 2. 6 b
Ophthalmia ex erodentibus succis ortae curatio, 2. 7 b
Ophthalmiae subinde ad epidemios morbos referuntur, 1. 201 b
Opisthoronus lethalis, 1. 454 a. signa, 1. 455 a
Opiata ad coitum, 3. 529
Opiata variæ contra sterilitatem pro varietate causarum, 3. 716 & 717
Opium suspectum remedium, 3. 698
Opobalsamum ad idem, 3. 590
Oppressio, 1. 221 b
Oppressio stomachi & praecordiorum, 1. 228 a
Orbieuli odorati, 1. 276 b
Orbiculi odorifini, 1. 262 b
Ore his herba ad idem, 3. 586
Orestes furiosus, 1. 393 a
Os stomachi quibus partibus consentiat, 3. Palpitationem habens puella in brachio dextro, certis periodis ab ea curata, 1. 441 b
Oris ventriculi laesi in abscessu signa, 3. 441 b
Oris foetoris variae causa, 2. 119 b. signa, prognostica, curatio, 2. 120 a
Oris inflammatio, 2. 120 a. eius curatio, 13 a
Oris ventriculi inflammatio, 3. 133 a
Oris foetor ex abscessu intus in ore latente, 2. 119 a
Orthopnea curatio, 3. 135 a. causa, ibid.
Ορχιοκήλη, vide Hernia.
Oxytachara composita, 1. 132 b
Oscitatio quid, 1. 486 a
Ostruii radix liberat ab vteri praefocatione, 3. 676
Ouum foetidum mirifice conferre ad procidentiam vulvae, 3. 689
Ouum, cap. dolor, 1. 254 a
Oua noctuae generant vini odium, 1. 284 b
Oxymel scyllitico tuto posse propinari ante purgationem pueris, 1. 396 a

P.

Pagus provinciae in quo plerique mulieres vteris procidentia laborantes nihilominus concipiunt, 3. 681
Palmarum manuum punctio in variolis, 1. 104 b
Palpebrae inflationes & tumores quomodo curantur, a causa interna oborta, 2. 53 a. a causis externis, ibid.
Palpebrarum hordeolum, 2. 55 b
Palpebrarum contractio, 2. 52 b
Palpebrarum phthirasis & madarosis, 2. 55 a
Palpebrarum crassities, 2. 50 b
Palpebrarum separatio, 2. 52 b
Palpebrarum pruritus, 2. 22 a
Palpebrarum ulcera, 2. 51 b
Palpitatio, 1. 441 a
Palpitatio lienis, 3. 307 a
Palpitatio cordis a materia calida pituitosa, 101 b
Palpitatio quid, 3. 98 a
Palpitatio quarum partium sit affectio, 3. 98 b. quibus differat a pulsu, ibid. quis praeter naturam affectus, & quae cordis morbum sequatur, ibid.
Palpitatio cordis ex sanguinis multitudine, ibid.
Palpitatio cordis ab vtero orta, eiusdem curatio si fiat in febris, si fiat a crisi, si fiat per consensum, a peste veneno, a vermibus, a causis primitiuis, 3. 105 a. a transactione meatuum, & sudore diaphoretico balneo & exercitio a solutione ne continui, a sensibilitate, a debilitate, ibid. b
Palpitationis causa, 1. 441 b. differt a pulsu & motu conuulsivo, ib. curatio, ib.
Palpitationis a flatu curatio, ab abstractione, a serosis humoribus, 3. 101 b
Palpitationis signa praesagientia, prognostica, 3. 100 a
Palpitatio cordis a frigore & materia pituitosa, 3. ibid.
Palpitationis signa a copia sanguinis crassioris vel calidi, ab humore melancholico, frigoris & pituitosi humoris, aquo sitatis in pericardio, 3. 90 b. a flatu, ab obstructione, a debilitate, a solutione contigui, a communitate totius 3. 106 a
Palpitationem habens puella in brachio dextro, certis periodis ab ea curata, 1. 441 b
Pancreas vide mesenteriam.
Pannus Sebel & vngula quid differant, 2. 13 a
Papillarum fissura, 3. 131 a
Papulae, 1. 193 a
Paracelsici male exhibent fortia metallica in quartana, 1. 96 a
Paracentesis, 1. 269 b
Purgationes eradicatae in humore calido 1. 270 a. in frigido, crasso, & viscido, ib.
Paracentesis perperam in ascitico adhibita, 3. 266 a
Paracynanches, 2. 157
Paralysis sequens apoplexiam non semper signum est salutis, 1. 410 a
Paralysis ex vulnere oborta cum leui contractione, 1. 10. obf. 121
Paralysis ex debili apoplexia orta, 1. 421 b
Paralysis sequitur coli dolorem, 1. 423 b
Paralysis a quibusdam bifaria dicitur, 1. 420 b
Paralysis ex pituita, 1. 424 a. eius curatio, 1. ibid.
Paralysis sub colicum dolorem contracta, 1. 433 a
Paralysis ex contusione, ictu aut casu curatio, ibid. b
ad Paralysis in laringis & oesophagi, 1. 429 a
Paralyticis verum venae sectio conueniat, 1. 426 a. an a coena statim medicamentum sit adhibendum, ibid.
Paralysis ossis hyoidis, 1. 429 a. signa, ibid. causa, ib. b. nervi optici & oculorum, ib. palpebrarum, linguae, genae, superciliarum, & lingulorum curatio, ibid. b. manus ac digitorum, thoracis, eorumque curatio, 1. 430 a. b. vtriusque cruris, & eius curatio, ibid. b. vesicae, eiusque curatio, 1. 431 a. b. penis, eiusque causa & curatio, 1. 432 a. b. podicis, ani & intestini recti, eiusque curatio, 1. 433 a
Paralysis paralisis, hemiplegia, 1. 422 a. eius causa, 1. 423 a. b
Paralysis ex simplici intemperie orta, 1. 425 a. ex frigore, ib. b. per medietatem corporis subito exorta, 1. 425 b
Paralysis linguae post apoplexiam, 1. 427 a. eius curatio, ibid.
Paralysis linguae subito exorta, ibid. b. eius curatio, 1. 428 a
Paralysis linguae cum subitanea obmutescencia, ibid.
Paralytici ex aquae potu quomodo curentur, 1. 433 b. ex lacte, & quomodo curentur, ibid.
Paraphrenitis, 1. 312 a
Paraphrenitis, 1. 325 a
Lethargus, ibid.
Paraplegia vide paralysis.
Paroxysmorum mordinatio, 1. 106 a
Parasynanches, 2. 158
Parotis ex sanguine redundante, 1. 12. obf. 17 causa, signa, prognostica, curatio, ibid.
ex causa frigida & materia pituitosa, 1. 12. obseru. 18. ad inueteratam, ib. ad charadas, nodos, & scirrhus emplastrum, 1. 12. obf. 18
parotides, 1. 12. obf. 16. quid, ib. bifaria sit, ib.
Pars quae dicatur per consensum affici, 1. 304 b
Pars resoluta semper indiuersum trahit muculum, 1. 403 b

I N D E X.

- Parere posse mulierem post decimum & vndecimum mensem, 3. 726
- parientibus quæ obseruanda, 3. 754 & 755
- parturientium dolor quomodo differat ab inflammatione vteri, 3. 752
- partus naturalis quis, & quis innaturalis, 3. 749
- Partus naturalis differentia ab ortu, 3. 749
- partus quomodo facilitatus in muliere pingui, 3. 755
- Partum facilitantia, 3. 731. 748. & 755
- ad Partum bonum opus est vigore duorum corporum, 3. 753
- Partus xxx. diebus integre conformatur, 3. 761
- Partus difficilis causæ, 3. 751. 754 curationes 3. 755 756. 757 & 759
- Partus difficilis signa, 3. 751. prognostica, 3. 752
- Partus difficilis mulieribus quarum virilatos habent humeros, 3. 748
- Partus difficultas quale symptoma, 3. 749
- Partus granditas causæ abortus, 3. 743
- Partus monstrosi, 3. 751
- Partus numerosi, 3. 743
- Partus subsequenter variorum accidentium curationes, 3. 767 & 768
- ad dolores post Partum quæ conferant, 3. 769
- Passerum cerebella inuant conceptum, 3. 760
- Pastinacæ erraticæ folia & semen conceptu adiuvant, 3. 715
- pastilli ad Gonorrhæam, 3. 512
- Pavor & symptoma mirabile partim incubum, partim epilepsiam imitans, 1. 380 a
- ad Pavorem quæ profunt, 1. 381 a
- Pavores infantibus obtingentes, 1. 380 a
- Pauli Ægyptæ remedium inramescendum pudendorum, 3. 566. eiusdem sententia de refrigeratione in priapismo, 573
- Pectoris angustia, 1. 151 b
- Pedecbia, 1. 189 a
- pedicularia, 3. 599
- Pediculari morbo multi mortui, 1. 245 a. curatio eius, 1. b.
- Pedicularis morbus, 1. 244 b
- Pediculatio, 1. b.
- Pediculi si a toto corpore erumpant, 1. 246 a
- Pediculi in dorso sub cutem inuenti post vesiculas incitatas & incisas, 1. 245 b
- Pediculi & vermes a quibus excrementis generantur, & a quibus pili, 1. 237 b
- Pediculis scatens caput, 1. 245 a
- ad Pediculos plattulas pedum, & alarum, & palpebrarum, 1. 246 a
- ad Pediculos, 1. 245 b
- Pediculorum generatio, ibid. a. causæ antecedens, ib. signa, ib.
- Pediculorum genera multa, 1. b.
- Pedes quibus fœteat, 3. 132 b. eius curatio, 1. b.
- Pedibus nudis ambulare Veneris appetitum minuit, 3. 584
- Pedum stupor, 1. 437 b
- Pelada, 1. 238 b
- Pelliculæ eiectæ per fistulam, 3. 562
- Penis quid, vide præfat. ad Lectorem, eius situs, 3. 557. 559. & officio suo sponte fungitur, 571. carnositas eius pars non tumet neque inflatur, 563. cur facile offendantur, 564. qui longior reddatur, 590 qui nimia longitudini consulatur 190. paruitati eius in profecta ætate viris subueniri nequit, 589. eius abscissio periculosa, 565. 567 pene carēs nihilominus uxorem ducit, 569. eo erecto qui moriantur? 572. Sanguinis pene fluxum quæ sistant? 566 penis cataplasinata adhærens radicibus excidens, 568
- Penis vitia multa, 3. 563. dolores, 564. ex nimia Venere, 565. eius dolorem mitigantia 566. penis vitia iuuenibus sæpius accidunt, 565. penis prurigo, 564. obstructio, 562. vulnus, 566. corruptio, ibid. tentigo 577. inflatio vehemens, 566. inflammationes penis & apostemata eorumque genera, causæ, signa, prognosces. & curationes, 564. 567. qualia medicamenta peni adhibenda, 566
- Penis ganglion quomodo cognoscatur & curetur, 3. 570. difficilis & non temere promittenda curatio, 570. 571. eiusdem abscissus, 557. 558. esthiomenus ex inflammatione, 567. eiusque curatio, 568
- Penis resolutio, 1. 432 a
- Penis vlcera interna externaque, eorundem causarum genera tria, signa iridem, prognosces & curationes, 3. 562. 563 vsque ad 567. non facile curantur, 576. cautio generalis in vlceribus penis, 565. cancerosa interdum sunt, 4. siccis indigent medicamentis, 565. quando mollificantibus, 1. b.
- Peper corn, 1. 189 b
- Perdis plumæ ad vteri præfocationem, 3. 676
- Pericranii doloris curatio, 1. 296 b
- Perinæi abscissus, 3. 558. in fistulam mutatus ibid.
- Peritonæum ruptum cur adduci nequeat, 3. 608
- periphymosis quid, 3. 569
- Peripneumonia, in qua pituita plurimum dominatur, 3. 67 a
- Eius varia nomina, ibid. b. quid sit, ibid. eius notæ, ibid. quæ pars affecta, & quis affectus præternaturalis, 3. 68 a causæ, ib. causarum signa, 1. b.
- Peripneumonia quibus modis a pleuritide discernatur, 3. 43 b
- Peripneumonicorum propria signa, 3. 68 a
- Peripneumonia ex sanguine magis prædominante, cum mediocri pituitæ portione 3. 68. b. signa prognostica 3. 69 b
- Peripneumonia biliosa, 3. 70 b
- Peripneumonia ex pleuritide succedens malis, 3. 59 b
- Peripneumoniæ calidæ curatio, 3. 72 b frigidæ & pituitosæ curatio, 3. 73 a
- Peripneumonia mulier in sexto occubens, 3. 72 b
- Peripneumonia ex catarrho præcedens, 3. 73 a
- Peripneumonia populariter sæuiens cum lateris dolore, 3. 66 a
- permutationum nomine quid intelligendum, 1. 318 a
- Pessus ad inflammationem vteri, 3. 692
- Pessus ad molam seu grumum sanguinis, 3. 715. 716
- Pessus ad conceptionem, 3. 565. ibid.
- Pessus ad sistendos menses, 3. 245 a
- Pessolata, 1. 245 a
- Pestis a Deo, 1. 164
- Pestes ex obsidione Hariemensi, 1. 182 b. ex castris, 1. 183 b
- pestis Delphica, 1. 182 a
- pestis quæ periculosior, 1. 171 a
- pestis signa & sæua symptomata Delphis, 1. 164 a. prædictio, ibid. si, 1. 165 a. b
- pestis cum veneni caractere, nempe bubone, 1. 177 a
- pestis quando mortem inferat, vel non, 1. 101 b
- pestis vtrum Christiano fugienda, 1. 174 a
- pestis cur non omnes regiones, nec omnes homines pleræque afficiat, 1. 162 b
- pestis est generale nomen, 1. 160 b
- pestis cum bubone sub ala sinistra, 1. 178 a
- pestis Delphensis admodum famosa, 1. 159 a. b
- pestis cum bubone sub ala sinistra, 1. 181 a
- pestis quibus grauior euadat, 1. 163 a
- pestis anguria ex vitio terræ, 1. 165 b
- pestis cum anthrace in manu, 1. 180 a
- pestis ex terra corrupta, 1. 174 b
- pestis ex Tiberi Romæ accrescente, 1. 161 a
- ex pisce oborta prope Egmondam ab Occano in litus eiecto, 1. 161 a. an draconis anhelitu fiat, ib. ex piscinis corruptis, b. ex arboribus, plantis malignis, ibid. b. ex aeris substantia corrupta ibid. post bellum pestis, ib. ex fame, ib.
- peste correptus num moriatur, experimentum, 1. 172 b
- pestes quomodo feles & canes in domos important, 1. 166 a
- peste minus inficiuntur clinici, ventri ac gula dediti, vt vespillones, 1. 167 b
- peste pueri voraces magis afficiuntur, 1. 160 b
- peste cur senes minus affligantur, 1. 160 b
- peste cur scemina magis quam viri afficiantur, 1. b.
- peste adolescens infectus seipsum de trabe seu gradibus deiecit, 1. 161 a
- pestis calamitosa apud Colonienfes, 1. b.
- pestis frequens post bellum, 1. 161 b
- pestis ex aeris substantia corrupta, 1. b.
- pestis ex fame, 1. b.
- pestis a locustis excitata, 1. 162 b
- pestis a Deo cur infligatur, 1. 163 b. & 1. 164 a
- peste puella decumbens nuda ex lecto profluit, 1. b.
- peste quando oues magis inficiantur, deinde boues & sues, capra minus & equi & canes, 1. 165. ibid. & 1. 166 a
- pestem nunquid Christianis liceat fugere, 1. 174 a
- pestis in aere corrupto, quomodo deflectenda, 1. 172 a
- pestem vnum modum præseruationis non requirere, 1. 174 a
- pestis fuga, cito, longe, tarde redire optimum remedium, 1. b.
- peste infectos non semper fugere oportet, 1. b.
- pestis tempore canes, feles ab ædibus abigenda, & publici cœtus cauendi, ibid. b
- peste corpora mortua incisa alios non inficiunt, 1. 185 a
- peste correpti cur in agone mortis alios inficiant, 1. 185 a. prægnantes cur raro euadant, 1. b.
- pestis

I N D E X.

- Pestis toti orbi grauiſſima, i.** 165 b
Pestis cur modo hæc modo alia animalia af-
ſigat, i. 167 a
pestis cum eſt futura fontes perturbantur, i.
ibid. 169 b
Pestis Delphenſis futuræ varia ſigna appa-
rentia, 166 a
Pestis futuræ auguria ex aqua, i. 168 b
pestis in partibus ſolidis, i. 169 b
Pestilens febris ſimplex ſolitaria, i. 166 b
pestis an aqua aut terra putrefactis an ſine
aeris infectione exoriri poſſit, i. 166 b
Pestis cur non omnes homines ac regiones
pleræque afficiat ac lædat, i. 167 a
Pestis Delphicæ curatio vniuerſalis, i. 170 a
Pestilentis febris nomine quid intelligatur,
i. 171 a
Pestis qualia corpora humana magis corri-
piat, i. 172 b
Pestis quomodo deſectenda ſi aet ſit corru-
ptus, i. 174 a
Pestis rerum omnium, i. 161 a
Pestis quæ ſolos bonos iugulauit, i. 162 b
Pestis præcauenda, 173 a
Pestis ſanctia, 168 b
Pestis a felibus & canibus in domos impor-
tata, i. 160 a
Pestis cum bubone exitiali, i. 179 a
pestis a cibo & potu quomodo euitanda, i.
174 b
pestis lethalis ex aquæ potu, i. 180 b
pestis cui modo in vno climate, modo in a-
lio, modo animalia tantum, modo
homines, modo vtrique inuadat, i. 181 b
pestis pulvis ſecterilis, i. 175 b
peſte inquinati ſi ſanguinem e naribus vel
ex pectore eſciant plerunque moriuntur,
i. 172 a
peſtem non ſemper idem pulvis fugat, i.
184 b
peſte affectis præſagientia ſalutem, i. 172 b
peſte corruptus num moriatur experimen-
tum, i. 170 b
peſte affecti tres delirant, vntis moritur, duo
euadunt, i. 170 b
peſtifera materia, i. 180 b
peſtilentes febres quibus ab aliis putridis dif-
ferant, & quibus cum iſdem & hecticis
conuehiat, i. 170 b
peſtilentium putridarum febrium varia ſym-
ptomata, earumque cauſæ, i. 184 b
peſtilens febris maligna, corpus cordis occu-
pans, i. 187 a
peſtilentes febres in cordis ſinubus conten-
tos humores infeſtos habentes, quibus
notis deprehenduntur, i. 184 a
peſtilens febris in ſinubus cordis, minus le-
thalis, 184 a
peſtilens febris quibus modis diſtinguitur
a cauſa, i. 170 b
a ſynochis, ab hecticis
ibid. 170 b
peſtilens hectica lethalis ex putrida peſtilen-
ti prius orta, i. 188 b
peſtilens in qua ecchymata exanthemata ap-
parebant, i. 192 a
peſtilens hectica lethalis ex ſe orta, i. 187 b
peſtilens febris ſui veneni characterē oſten-
dens facile diſgnoſcitur, i. 169 a
peſtilens febris cum putredine in corpore
cordis exiſtente, i. 187 b
peſtilens cum maculis plumbeis, i. 190 a
peſtilens maligna, cum comate vigilante &
typhomania; fluxuque biliſo, & vermi-
bus, terminata per plumbeas maculas co-
tius corporis, i. 190 b
- peſtilens febris cum pulicari rubore, i.** 190 b
peſtilentis febris incomitata, nec ſui veneni
characterem oſtendentis ſigna, i. 169 b
peſtilentis febris ſigna, ſui characterem ve-
neni oſtendētis, & ſimul locum affectum,
i. 169 b
peſtilentis febris ſigna, i. 166 a
a caloris qua-
litate, ibid. ex pulſibus, ibid. ex respiratio-
ne, ibid. ex vntis, ibid. ex calore & aliis in
facie conſiderandis, ibid. ex deliriis, ib. ex
excretionibus, ibid. ex humoribus, ibid.
e partibus ſolitatis, 169 b
peſtilentibus febribus hecticis quæ conue-
niant, i. 188 a
petala, i. 245 a
Petri Bayri Taurinenſis Medici vnguentum
pro vlceris penis, 567
Petri Roberti piſtoris filius gonorrhœam
patiens cum ſeuiffimis ſymptomatibus, 580
Petrus Brielenſis amicus auctoris, 3. 596
Petrus Foreſius in Medicum Roipubl. Del-
phensis a Coſta adiciſſus, 3. 559
Pharmaca quando exhibenda, i. 96 a
pharmaca leuiora prius danda, i. 330 a
pharmaco liberante an vti liceat in febris
principio, i. 34 a
pharmacum minorans, i. 54 b
pharmacopola incubo laborans, i. 379 a
Phlegm, i. 169 a
corum vſus, 169 a
phlegmones internæ ſigna, 3. 174 a
phlegmoſis quid a. 27 b
phlegmon ventriculi ex ſanguine medullæ
& vtili conſuens, 3. 174 a
phrenitis ex ſanguine corrupto, inſanabilis,
i. 118 b
phrenitis cum ſurore ex bile ſua immode-
ratiſſe exallata, & plus æquo aduſta, i. 319 a
phrenitis Theophili medici, i. 315 a
phrenitis legitima in puerpera, i. 321 b
phrenitis ſanguinea cui bilis in minori copia
admixta erat, i. 323 a
phrenitis, i. 311 b
cur ſic dicta, i. 312 a
phrenitis in iuvene biliſo macilentio, i. 314 a
a, eius cauſæ primitiue, ibid. corporeæ,
ibid. antecedentes, ibid. ex qua bile fiat,
quomodo cognoscatur modus, i. 314 b
coniunctæ, i. 315 a
phrenitis in prægnante curata, 3. 58 a
phrenitis lethalis, i. 317 a
phrenitis quibus modis terminetur, i. 318 b
phrenitidis ſpecies, i. 315 a
phrenitidis temporum ſigna, i. 317 a
phrenitidi affectus per conſenſum ſimiles, i.
ibid. 317 a
phrenitidis diſtinctio, i. 313 a
phrenitidis tres ſpecies ſeu differentiæ, quo-
modo diſtinguantur, i. 316 b
phrenitidis differentiæ, i. 313 a
a forma ſumæ, 313 a
ibid. 313 a
phrenitidis differentiæ a cauſa effectrice, i.
ibid. 313 a
phrenitidis confirmata ſigna, i. 317 a
in phrenitide pituitola alius aſtricta, 3. 37 a
nimis fluens, 315 b
phrenitidis imminentiſſe ſigna, i. 316 a
phrenitidis iam factæ ſigna, i. 316 a
phrenitidis ſpecies ſecunda, i. 315 b
ſpecies, 315 b
phrenitidis in augmento exiſtentiſſe ſigna, i.
316. differentiæ a ſepto tranſuerſo ſi-
gna, ab aliis delirantibus, a ſurore, a
forma, a loco affecto, a cauſa efficien-
te, ab immediata, ibid. tumultuoſæ, ob
ſcuræ & hecticæ, i. 316 b
ab immediata, i. 317 a
phrenitidis permutatio in lethargum, i. 318 a
an in hecticam vertatur, in conuulſionē,
in ſphacelon, in maniam, in melancho-
liam, ibid. b 322 b
phrenitidis vini vſus, i. 322 b
phrenitici cur fortiores, quoad virtutē mo-
riam, & debiliores iuxta virtutem ſenſi-
tiam, i. 319 a
phrenitici vtrum in tenebris vel lucetene-
di ſint, i. 320 b
phrenitidis quo tempore ſanguis mitti de-
beat, i. 322 b
phreniticos nunquid purgare oporteat, ibid.
b. & quibus purgantibus vtendum ſit.
ibid. 323 a
phrenitici quomodo lauandi, i. 323 a
phrenitici vacuandi & quibus, i. 322 a
phrenitidis vtrum actu frigida vel tepida co-
pica applicanda, i. 323 b
phrenitici vtrum tondendi vel radendi, i.
323 b
phrenitidis quæ vena ſecada, i. 322 a
& quæ-
tum extrahendum, 323 b
phrenitici modico vtentes potu, quæ
ſtrepitus tentat, tremorem incurrat, i.
318 a
phreniticorum habitatio, i. 320 a
phthiſi & hecticis quæ conueniant, 3. 208 a
phthiſi quidam longo tempore viuentes,
& tandem moriuntur, 3. 86 b
phthiſis omnis vtrum hecticus ſit, & vtrum
ſic exiſtens, diu vivere poſſit, 3. 87 a
phthiſis, i. 244 b
phthiſis vera, 3. 82 a
phimosis quid & quoruplex, 3. 579
eius duplex, 569. eius curatio, ib.
pica 3. 142 a. pars affecta, quis affectus, ſi-
gna, cauſæ, prognostica, 3. 142 a. curatio,
ibid. b 238 b
pilarella, i. 126 a
pilare malum in mammaillis, 3. 237 b
pilus frigidum & neciſſimum in corpore, i.
237 b
pili minus cadunt in axillis & inguine, i.
241 b
pili denuncati in capite exiſtentes, i. 243 b
pili vt denſiores euadant, i. 43 b
vt reddan-
tur molliores, ibid.
pili cur ſiant aſperi, i. 242 a
pili cur plures in capite, i. 241 b
pili vt omnem colorem imbibant, i. 241 b
ſiant albi, ibid.
pilorum generationis cauſæ quatuor, i. 237
b efficiens, materialis, formalis, & finalis,
ibid. 456 a
pilos mingens quomodo curatus, 3. 243 b
ad pilos cuſpōs, i. 243 b
ad pilos glaucos, ibid.
ad pilos nigros reddendos, ibid.
pilula ad gonorrhœam, 3. 583
ad penis vlcus
detergendum, 3. 562
pilula ad molam educendam, 3. 731
pilula de bdellio Rondeletii, 3. 661
pilula quo numero propinanda, i. 280 a
pilula, i. 98 b
pilula ſub lingua contra ſitim, i. 224 b
pituita in venere, 3. 158 b
pituita craſſior æſtimatoria flatuum, 3. 164 a
pituita vitrea, i. 52 b
pituita a capite in ventrem descendenti quo-
modo prouidendum, 3. 139 b
pituitosus & ſucco melancholico frigido af-
fectis magis conuenit victus attenuans, i.
338 a

I N D E X.

- Plantæ pedum punctio in variolis, 1. 194. b
 Plato vim olfaciendi vtero tribuit, 3. 663
 Plautus, 1. 245. a
 Plenitudo & plethora, 1. 265. a
 Pleuitudinem vacuantia, 1. 269. a
 Pleureseos dolor cur ad clauiculos inter-
 dum, interdum ab hypochondria veni-
 at, 3. 40. b. cur facilius in altero laterum
 decumbat, 3. 40. b
 Pleuritis in prægnantibus, 3. 46. a. legiti-
 ma, 3. 48. a. in suppurationem lethalem
 conuersarum varis symptomatibus, 3.
 61. b. quæ pthysicis superuenit, 3. 65. b.
 spuria ab externa membrana costas suc-
 cingente, cum masculis eo flatibus exte-
 rioribus inflammatis, 3. 35. b
 Pleuritis non vera, eiusque curatio, 3.
 66. a.
 Pleuritis numquid perpetuo insigni vacua-
 tione morbus lateralis curari debeat, 3.
 49. a.
 Pleuritis a phrenitide quid differat. 3.
 43. b.
 Pleuritis, 3. 39. b. & seq.
 Pleuritis mitis & benigna 3. 53. b.
 Pleuritis satis exquisita 3. 41. a. eius causæ,
 ab.
 Pleuritis valde periculosa in sen. 3. 51. a.
 Pleuritis pituitosa. 3. 56. a.
 Pleuritis ex aquæ frigida potu. 3. 42. a.
 pleuritidis biliosæ signa. b sanguineæ, pi-
 tuitosæ, melancholicæ signa. 3. 42. b.
 quibus indicibus ab aliis affectibus secer-
 natur, 3. 42. b. pleuritis ex flatu. 3. 42. b.
 quibus indicibus discernatur ab hepatis in-
 flammatione. 3. 43. a.
 Pleuritis sanguinea per sputum, deinde
 per menses critica purgatione finita. 3.
 54. b.
 pleuritis conuersa in suppurationem 3. 60. a.
 quomodo transeat in suppurationem i-
 bid. signa ibid.
 pleuritis in peripneumoniam conuersa, &
 quomodo ea fuerit curata 3. 59. a.
 pleuritis quomodo in peripneumoniam, &
 eius notæ 3. 59. b.
 pleuritis biliosa. 3. 55. a.
 pleuritis. 1. 17. b.
 in pleuritide num vtendum sit purgatio-
 ne. 3. 53. a.
 in pleuritide quæ vena secanda. 3. 50. a.
 in pleuritide an indifferenter in omni mor-
 bo laterali nulla præcedente insigni va-
 cuatione possimus calidis fomentis vri. 3.
 49. a.
 pleuritidis sanguineæ curatio. 3. 55. a.
 in pleuritide pituitosa si materia in caput
 vel nervos irruat, quid faciendum. 3.
 57. b.
 pleuritidis biliosæ curatio 3. 55. b.
 pleuriticus suppuratus, non repurgatus in
 phthisin incidit. & obit 3. 40. b.
 pleuritica mulier, in qua signa lethalia. 3.
 44. a.
 pleuritici cur interdum exscreant, quando-
 que non. 3. 40. b.
 πνευμονοκολλη, vide, Hernia ventosa.
 pollutio nocturna 3. 584. cuius causæ & cu-
 ratio. 585. ex sola inspectione orta. 584.
 cur de die raro accidat & cur non pueris
 ibid.
 polipus narium quid sit. 2. 89. b. quomodo
 curetur. ibid.
 polypi narium causæ, signa, prognostica.
 2. 90. b. curatio. 2.
 pomum Ambræ 1. 173. b.
 poma Ambræ, 1.
 poma cocta, 26.
 ponapholyx efficax ad vlcera penis recentia, Ππρῦλον, 2. 14. b
 porrigo, 1. 243. b
 porriginem abstergentia, 1. 244. b, detergen-
 tia,
 porriginem curati, 1. 244. a
 portulaca ad profluuium menstruum, 28.
 658
 porrigo, 1. 243. eius causæ, ibid. notæ, pro-
 gnostica, curatio, victus ratio, topica, 1.
 244. a
 potio correficiens, 1.
 potio leniens, 1.
 potio purgans eradicatiua, 1.
 potio ad herniam inguinalem, 3.
 potus abstinentia quibus utilis, 3. 567. qualis
 exhibendus iis qui laborant vlcere penis,
 566.
 potiones præparantes, 1.
 potiones lenientes, 1.
 prædictiones medicorum ob quas causæ
 viles, 1.
 prædictionis bonæ necessaria duo, 1.
 præfocatio ex fumo & carbonibus, seu aliis
 reb & quomodo restituantur, 2. 165
 præputium quid? 3. 563. quod reduci nō po-
 terat, 569 cum glande ablatum, 564
 præfocata a semine paratissima ad impræ-
 gnationem, 3. 672
 prægnanti quæ ratio vitæ instituenda, 3.
 740
 præfocata ante tertium diem non sunt sepe-
 lienda. 3. 672
 prægnantibus quando contingat fastidium
 3. 731
 prægnans a tertiana continua ex venæ se-
 ctione iurata, 1. 49. b
 prægnans peste affecta, 1. 185. a abortit &
 moritur, ibid.
 prægnans peperit infantem sine osse coagu-
 lato a cubito vsque ad humerum, qui ta-
 men egregie curatus est, 3. 120. a
 prægnans tertiana continua laborans, 1.
 48. a
 prægnans mulier variolas habens, 1. 202. a
 prægnantes pleuritide laborantes, 3. 46. a
 prægnantes leuissima de causa in syncopen
 incidunt, 1. 217. a
 prægnantium error in computatione men-
 strum 3. 728
 prægnantium symptomata, 3. 448
 prægnantibus vtrum conueniat venæ se-
 ctio, 1. 49. a
 prægnantibus vtrum euacuatio & venæ se-
 ctio conueniat, 1. 49. a
 præsidis Hollandiæ Corn. Susy ex origraui-
 dæ sanguinem ex vtero fluxisse sine ab-
 ortu, 3. 637
 præsagia salutis in febribus, 1. 32. b
 præuisio quibus debetur, 1. 181. a
 priapismus, quid eiusque causæ 3. 571. 573
 unde nomen traxerat, 671
 quid differat a satyriasi, 575 quibus pos-
 sumus accidat, 472
 priapismi non veri
 historia,
 promissa vaniloqua vitanda, 3. 606
 prognostica recidua, 1. 236. a
 prorogationis febrium causæ, 1. 66. a
 prouismatilis, 3. 880. a
 pruna cocta, 3. 566
 pruriginosa scabies, cum rubedine palpe-
 brarum, 2. 51. a
 pruritus scroti & excoctio in febribus, 1.
 235. b
 pruritus pudendorum qua minuant, 3. 566
 27. 589
 Ππρῦλον, 2. 14. b
 prerygion in oculo puella habens curatur,
 2. 14. a
 prerygion, 2. 13. a
 ibid. 1. Ππρῦλον, 1. 204. b
 244. a
 ptyalismus, 2. 132. b
 puellæ historia mirabilis xi. annis lecto de-
 cumbentis, 3. 143. b
 puella duodecim annorum habens sapha-
 rum in capite, brachiis, & tibus curata, 1.
 149. b
 puellæ tres variolis laborantes, 1. 203. a
 puella spirensis triennalem inedia susti-
 nuit, 1. 56. a
 pubescere citius aut tardius quid dicantur, 1.
 24. b
 puella vesano amore capta cum morbo vre-
 tino & diuersis symptomatis, 1. 352. b
 puella post vlcera curata & menstruum pur-
 gatorem, mania correpta, 1. 34. b
 puella a febre synocha putrida continente
 per fluxum sanguinis narium curata, 1.
 21. a
 puella febre continua laborans ex superpur-
 gatione mortua, 1. 208. a
 puer lumbricis vexatus quiescere non po-
 terat, 3. 564
 puer octo annorum ab achore capitis cura-
 tus, 1. 147. b
 puer ex peste carbone rotam faciem exu-
 rente, mortuus 1. 182. a
 puer trium annorum fauim in capite ma-
 nentem habens, 1. 251. a
 puer 3. annorum febre erratica laborans, 1.
 105. b
 puer laborans pustulis paruis calidis, caput
 & præcipue frontem occupantibus, 1.
 251. b
 puer 12. annorum caput scabiosum cum
 crustis habens, 1. 251. b
 puer 7. annorum ex febre synocha putri
 quarto die obit, 1. 22. a
 puer in capite ictus in altera parte, puer sub
 osse inuento, 1. 290. a
 pueri cur conuulsionibus opportunissimi 1.
 447. b
 pueri quare magis epilepsia, quam apople-
 xia tentantur, 1. 430. b
 pueris num vena secanda, 1. 22. a
 puerpera hæmorrhoidibus obnoxia, 3. 427
 puerpera variolis laborans 1. 203. a
 puerpera diaria laborans cum phlegmone
 dextræ mamillæ, 1. 6. b
 puerpera papulas rubeas habens, 1. 206. a
 pulmo costis adnatus, periculosum, 3.
 46. a
 pulmo ulceratus cur raro curetur, 3. 88. a
 pulmonis inflammatio quænam peior, &
 quæ magis salutem promittit, 3. 70. a
 pulmonis vlcus, vide vlcus.
 pulmonis vlcus, 3. 80. b
 phthisis, 5. 80. b
 pulmonis suppuratio perfecte curari ne-
 quit, vt nec vlcus, 3. 80. a
 pulmonis vlcera an possint curari, 3. 87. a
 80. a
 pulmonis vlcera curata sunt difficilima, 3.
 87. a. ratio, ibid.
 pulmonis vlcera an possint consolidari, i-
 bid.
 pulmonis vomica. 3. 79. b
 E pulmonis vlcere oritur tabes, 3. 80. b
 pulmo-

I N D E X.

[illegible]

I N D E X

Renum dolor, cum mictione multarum arenularum, 3.	457 b	Ruta, eiusque semen quibus vtilia, 3.	572	Sanguinis fluxus in quo differt a spuro san- guinis, 3.	16 a
Renum imbecillitas non separantium san- guinem ab aquositate, 3.	445 a	Sacerdos laborans ex capitis dolore ab humore melancholico, 1.	279 b	Sanguinis narium fluxus ex reseratione ve- narum, 2.	94 b
Renum dolores & causae, 3.	441 a	Sacculus, 1.	64 a	Sanguinis narium fluxus enormis post mu- stum ebibitum, 2.	96 b
Renum dolor ex flatibus,	ibid b	Sacculus in peste, 1.	177 a	Sanguinis narium fluxus, 2.	93 b
Renum caliditas,	ibid b	Sacculi ad herniam carnosam, 3.	615	Sanguinis fluxus e nare dextra, copiose ef- fluens, 2.	98 a
Renum debilitas ac lumborum dolor ac colliquatio, pedumque inflatio, 3.	442 a	Sal in os positum cum excitet epilepsiam, 1.	38 a	Sanguinis conglobati symptomata, 3.	
Renum calorem mitigans vnguentum, 3.	559	Sal gemmae, 3.	316 a	Sanguinis detractio quacunque parte pro- dest, 1.	335 b
obtusior dolor, 560. vlcera confirmata,	559	Salernitani cur viticis folia ad conuiuia ad- ferebant, 3.	584	Sanguinis 12. libr. nobili cuidam e naribus fluxerunt, 2.	99 a
eorum symptomata,	ibid.	Salinae abundantia, 1.	129 a	Sanguinis vomitus, 3.	35 a
Renes ex mala compositione dolent, 3.	441 a	Salus, 1.	441 a	Sanguinem putridum, viscidum, nigrum ab erosione venae thoracis exspuens mu- lier, 3.	33 a
Renum calculus, 3.	481 b	Saluatella quando aperienda, 1.	335 b	Sanguis an in exquisita tertiana mittendus, Sanguisuga, 1.	269 b
Renis sinistri durities, 3.	490 a	Sanguis in quibus febribus statim detrahen- dus, 1.	12 b	Saniei a semine differentia in fluxu, 3.	662
Renum apostema calidum, 3.	491 a	Sanguis putridus graueolens extractus mor- tem praesagiens, 1.	19 a	Saphatum, 1.	247 b
Renum apostematum differentie, 3.	491 a	Sanguis enaribus in febribus quid porten- dat, 1.	37 a	Saphato & tinea curati, 1.	249 a
Renum apostema sanguineum,	ib. b	Sanguis electus, 3.	580	Saphati diuisio in siccum & humidum, 1.	247 b
Renum apostemata signa praesagientia, 3.	492 a	Sanguis exeso vase erumpens, 3.	19 a	Saphati curatio adultis conueniens, 1.	248 b
Repellentia, 1.	270 a	Sanguis concretus, ex renis dextri vulnere, ischuriam inferens, 1.	530 b	quae alia medicamenta adhibenda,	249 a
quando adhibenda in dolore capitis, 1.	270 a	Sanguis electus, 3.	580	Saphati curatio pueris conueniens magis, 1.	248 b
quibus non com- petant,	ib.	Sanguis ex loco seminis, 77. annum integrum cum vrina exiens,	360	Saphatum vide Achor seu Tinea.	
Repereussinum linimentum, 3.	613	Sanguis hircinus, 3.	476 b	Sapo Saracenicus, 1.	243 a
Repulsio inhibens materiae fluxum ad locum affectum, 1.	287 b	Sanguis profluens post abortum mulier ex- stincta, 3.	644	Sapo Spatareuticus,	243 a
Resolutionis oesophagi signa, 1.	429 a	Sanguis per vterum immodici fluxus diffe- rentia, 3.	642	Sapo Gallicus,	ibid.
Res vna cur pro duabus spectetur, 1.	11. obs.	Sanguinis narium fluxus terminat causum exquisitum, 1.	41 a	Sargax, vide Hernia carnosae.	
Rhagades pudendorum & sedis quae tollant	3.	Sanguinis impetus non confestim localibus reprimendus, 3.	638	Sardonius natus, 1.	47 a
Rhagades an per modum consultationis, 3.	435 b	Sanguinis missio tutius reiteratur, quam vique ad animi deliquium educitur,	13 a	Sartor inflammatione laborans, & pos- esthiomene penis, 3.	567
Rhagades, 3.	432 b	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Satyrasis quid, eiu que curatio, 3.	375
Rhotomagensis Praesidis filiae ridere solitae ante vteri praefocationem, 3.	605	Sanguis enaribus fluens quando lethalis, 1.	29 a	quo modo differat a priapismo, 1.	ibid. mu.
Rhyas, 2.	23 b	Sanguis enaribus vel ex pectore fluens tem- pore pestis, mortem infert, 1.	172 a	Scabies tempore pestis salutatis, 1.	18 b
Rigor in phrenitide pessima deterrimum si- gnum, 1.	318 a	Sanguinis missio vtrum mensibus fluenti- bus aliquando conueniat, 1.	201 a	Scabies sicca, 1.	247 a
Rigor quando malus, 1.	318 a	Sanguinis fluxum quae sistant, 3.	649	Scabiebus in corpore posse generari, 3.	
Rigor quid in febre ardente lethali signifi- cet, 1.	37 b	Sanguinis narium fluxum, 7. die febris pu- trida continens, 1.	22 b	Scabiei reiecti, 3.	349 b
Rigorem quae tollant, 1.	100 a	Sanguinis extractio minus periculosa pur- gatione, 1.	50 a	Scarificatio an in variolis & morbillis exhi- benda, 1.	200 b
Roborantia, 1.	99 a	Sanguinis copia in qua synocha maior sit detrahenda, 1.	20 a	Scarificationes crurum conferunt ad sup- pressa menstrua in corporibus albis & pi- tuitosis, 3.	624
Roborantia in peste, 1.	177 a	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scire omnia nemo potest, 3.	728
Roborantia, 1.	64 a	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scirrhus in quo differat a callo, 3.	695
Roborantia & refrigerantia, 1.	323 a	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scirrhus incurabilis, & alia symptomata, 3.	288 b
Risus infantis ante diem 40. ominousus, 3.	771	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scirrhus stomachi vide Tumores,	
Rondeletii historia de puero frustulatum re- iecto, 3.	765	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scirrhus lienis quomodo curetur, 3.	
Rondeletii historia vulvae minus parentis, 3.	569	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scirrhus hepatis, 3.	311 a
gonorrhoeae ex abscessu renum orta, 3.	581	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scirrhii perfecta curatio, 3.	299 b
eiusdem opiata ad ventrem lenien- dam, 1.	566	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scirrhii inueteratis & corporibus agrestio- ribus quae conueniant, 3.	288 a
quae in penis vlcerebus mercurio vti suadeat, 567. eiusdem vnguentum ad phymosin,	569	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scissurae pedum manuumque quomodo differant a parallela, 1.	244 b
Rubor pulicaris in peste, 1.	191 b	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scorium ferri quomodo praeparetur, 2.	
Ructus ventriculi cum aliis symptomatibus	3.	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scorpio in cerebro natus, 1.	255 a
Ruptio apostematis quomodo perficiatur,	3.	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scorta vitanda, 3.	568
Ruptura omenti, vide Hernia omenti.	686	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scoroma & vertigo vnum ne sint, 1.	370
Ruptura supra umbilicum, 3.	686	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	a. ad quem cerebri morbum sequatur, 1.	
Rusticus ex sola inspectione pollutionem	584	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Scrotum quid, vide, Praef. ad Lectorem.	
patiens, atq; id de die, 3.	584	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	Eius pruritus diuturnus, 3.	598
Rusticus nihil aliud quam lac sumens, 1.	116 a	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b	inflammatio, eiusque si- gna & curatio. 594 595. varices, 597. cicat- tri	
Rusticus synocha laborans aquae potu cu- ratur, 1.	14 b	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b		
Rustica venam sibi incidi imperans fluenti- bus mensibus, 3.	766	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b		
Ruta molam eicit, 3.	724	Sanguinis fluxus per nares curat synochum putridam continentem, 1.	21 b		

I N D E X

- mitem quæ facile scroto laeso conciliant, 598. aqua in scroto collecta unde, & qui dignoscatur, 618. scroti & testium vlcus 598. 599. inflammatio ac apostema, 594. 596. apostema frigidum, 597. aquosum, 597. scrotum inflammatum facile patre-
 scit, 595
Scurbutus, 3. 290 b. 291 b. ubi maxime fre-
 quens, ibid. b. signa, principium, ibid. b. symptomatica, 3. 292 a. b. effectus, 293 a. causa, ibid. a. b. curatio, 296 b. signa re-
 motiora, propinquiora, 3. 304 a. causa proegumenta coniuncta, 3. 305 b. indica-
 tiones curatiue, 306 a
Scurbutto agri quinque curati, 3. 302 a
Sebastiani Aultrii medicamentum ad her-
 niam puerorum, 3. 602
Sebel, 2. 13 a. signa, ibid. differ. prognostica, curatio, ibid. b
Secretum chirurgi, 308 a
Secunda quomodo extrahenda, 3. 765
In Secunda retentione prognostica, 3. 764
Secunda unde dicta, 3. 764
Secundarum interit ab Empedocle An-
 m. dicta, 3. 763
Secundare quomodo extrahenda, 3. 763
Secundina retenta causa, 342. curatio, 3. 764. 765
In secundina retentione quæ pars afficia-
 tur, 3. 764
Secunda relicta quomodo aliqua euase-
 rint, 3. 764
pro Secundina depellenda secretum, 3. 300
ad Secundam repellendam, secreta mulier-
 ularum, 3. 765
Sella obstetricis, 3. 754
Semen matris cum semine foeminae necessa-
 rio misceri ad generationem, 3. 769
Semen non putrescere in vasis, 3. 668
Semen genitale quid, vide præfat. ad lecto-
 rem, qui moueatur & emittatur, 3. 578
 quæ id augeant, 576. 585. 591. quæ id ex-
 stinguant, 572. 576. 581. 584. semen inter
 tunicas testiculi, 603. seminis effusio mi-
 nima hecticam addit, 580. seminis multi-
 tudo unde, 576. in somno qui profluat,
 578 a. cerebro pars maior decedit, ibid.
 quando ob debilitatem facultatis reten-
 tricis profluat, 579. seminis aquositas, 577
 eiaculari semen qui non possunt, 586. se-
 mina copia quibus coaceruatur, 578. im-
 purum semen si restringatur quid efficiat
 583. seminis retentio concitata venere for-
 min. obest, 592. seminis effluuium aut
 profluuium, vide Gonorrhæa.
Semicupium pro herniosis, 3. 616
Semitertiana vera & propria, 1. 135 b. impro-
 prie dicta, ibid. exquisita, non exquisita,
 ibid.
Semitertiana ex simplici tertiana orta cum
 laeuissimis accedentibus, 1. 136 a
Semitertiana complicata cum tertiana satis
 exquisita, 1. 139 b
Semitertiana differentia, 1. 135 a. Romæ fre-
 quens, ibid.
Semitertiana vide Hemitertiana.
Senecta ex morbo, 1. 409 b
Senes apoplexiæ obnoxii, 1. 37.
Senes quare specillis indigent, 1. 11. obseru.
 37.
Senes cur penis vitiiis magis quam iuue-
 nes obnoxii dicantur, & an recte, 3. 565.
Senis libidinosi faciem exemplum, 3. 591
Senis ob nimiam venerem extincti histo-
 ria, 3. 595
Septimana, 1. 392 b
Seratis quid, 3. 566
Serum lactis, 3. 345 a
Serum caprinum quibus vlcibus utile, 3. 104 a
Sextana, 1. 312 a
Sibare, 1. 392 b
Siderum decreta medicis non sunt conde-
 mnanda, 1. 392 b
Sigilli Mariae, aut Salomonis, radix, 3. 603
Signa indicantia præsentem oris tortu-
 ram, 2. 463. b. quæ futuram præstigiunt,
 ibid. b
Signa prognostica febris acutæ, 1. 30 a
Signa præstigiennia medico cur utilissima, 1. 447 b
Signa prognostica quam utilitatem præstet,
 3. 44 b
Sinapismus, 1. 268 b
Sinapismi materia, 1. 269 b
Sinapismus, 1. 308 a
Singultus in hepatis inflammatione, ma-
 lum, 3. 212 b
Singultus, 3. 149 b eius causæ,
 Singultus cum febre acuta, 1. 230 a
Singultus a putredine, 3. 568
Singultus quid a vomitu differat, 3. 140 b
Singultus curatio a caliditate orti, & ab hu-
 moribus biliosis, 3. 151 a. ab alimentis
 vel medicamentis acerbis, ibid. ab inflam-
 matione ventriculi, vel alterius visce-
 ris, ibid. si ob febrem, ibid. ex inanitione,
 ibid.
ad Singulem, 3. 197 b
Siti, vigilia & paraphrenitidi quomodo
 succurrendum, 3. 57 a
Sitile, 1. 312 a
Sitis valida in febre biliosa, 1. 224 a. quid sit,
 ibid. curatio, ibid. b. sitis ex siccitate re-
 media, ibid. b. ex caloris copia, ibid. ex ca-
 liditate & humiditate simul, ibid. ex cali-
 ditate & siccitate, ibid. ex humore bilio-
 so, 1. 225 a. ex pituita falsa, ibid. ex inflam-
 matione partium, ibid. 217
Sitis quomodo arceatur, 3. 149 a
Sitis immensa, 3. 147 b. eiusque signa, ibi-
 dem
Situm quid sedet, 3. 197 b
Situm restringentia, 3. 37 b
Situm non sentire quid denotet in febre,
 dente, 1. 37 b
Suella Nicolaus ab hernia inguinali cura-
 tus, 3. 603
Socrates bibax, 1. 285 a
Soda, 1. 254 a
Soda sanguinea, 1. 205 a
Soda curatio ex acuitate sensus, 1. 294
Soda ex vermibus existentibus supra stri-
 cturam narium, cura, 1. 291 b
Soda ex debilitate capitis curatio, 1. 294 b
Soda biliosa sex intentionibus curatur, ab
 iis qui Arabes sequuntur, 1. 273 a
Somnus quid, 1. 232 b
Somnus profundissimus ac innaturalis, 1. 357 b
Somnus naturalis, ibid. frater mor-
 tis, ibid. causa finalis, ibid. non naturalis,
 ibid. 3581
Somnus in febribus alius naturalis, alius
 præternaturalis, 1. 221 b
Somnus quomodo fiat, 1. 221 b
Somni modus obseruandus, ibid.
Somni finis, ibid.
ad Somnulosos, 1. 224 a
 591 in Somnum profundum ex vigine in tor-
 pore mentis incidit, 1. 362 b
 772 Sonorum concinnitas animum recreat, 1. 566
Sonitus morbus, 1. 281 b
Sopor quomodo concussio, compressio, &
 effractio membranis cerebro eueniat, 1. 366 b
Soporati nonnunquam Venerem somniant,
 1. 353 b
Spadani fons acidus, 3. 738
Sparadipum ad herniam, 3. 615
Spasmi curatio ex casu, compromissione,
 vel obuiatione rei alicuius duræ, 1. 462 b
Spasmus caninus quid, 1. 444 a
Spasmus verus, 1. 444 a. per consensum,
 ibid.
Spasmi tres species seu differentia, 1. ib. b
Spasmus quos morbos sequatur, ib.
Spasmus in puero ex vermibus libr. 10. ob-
 seruat. 117. ex punctura nervi per venæ
 sectionem male peractam, ibid. obseru.
 118. ex punctura nervi fitribus de causi-
 sis, ibid. ex vulnere quando lethalis, &
 quando non, 1. 10. obseru. 118 a. punctura
 quomodo curetur, ibid.
Spasmus vide convulsio.
Spasmus cynicus, 1. 462 b
Spasmus cur ita dicatur, 1. 443 a
Spasmus post articulares cruciatus oborta,
 1. 444 b
Spasmus quomodo curari possit a febre e-
 phemera, 1. 443 a
Spasmus non proportionatus ad mate-
 riam, 1. 444 a. duplex, ibid. num a bile
 spasmus fieri possit, 1. 445 b. an a melan-
 cholia, 1. ibid. spalmi causæ, ibid. & pag.
 seq.
Spasmus ex repletionem fieri, quibus signis
 cognoscatur, 1. 446 b
Spasmus qualis sit affectus, 1. 443 b
Spasmus num semper ab elleboro ex inani-
 tione sit, 1. 446 a
Spasmus a dolore colico curatus, libr. 10. ob-
 seru. 117
Sperma, vide Semen.
Sphacellinus, 1. 328 b. eiusque nota, ib.
Sphacelos, 1. 317 a
Spina piscium tonsillis inherens, suffocatio-
 nem infert, 2. 166
Spirandi difficultas, 1. 230 a
Spirandi difficultas, 3. 10 b
Spiringius medicus semine nasturtii ad her-
 niam usus, 3. 603
Spiritus erumpere ex pudendo, 3. 684
Spiritus turbulenti motus causa, 1. 371 a
Spiritus grauius olentis remedia, 2. 85 b
Spleneticus, 3. 272 a
Splenis musculorum, & colici doloris di-
 stinctio, 3. 282 a
Sputio cruenta sapius recurrens, 3. 15 b
Sputio cruenta ex acui catarrho, pulmonis
 vasa & substantiam erodens, 3. 20 b
Sputio floridi sanguinis cruenta ex vena
 rupta pulmonis per rulum validam, 3. 16 b
Sputio cruenta in mulieribus an ab utero,
 3. 39 a
Spuma in apoplexia lethale signum est,

I N D E X

408 b. vnde oriatur, ibid. quare fit lethalis,	ibid.	ibid. varii dolores, ib. ingens dolor in potatore, ibid. b. causæ, 3.	Sudores in horridis febribus mali, 1.	145 b
Spumæ vera generatio in apoplexia, 1.	408 b	Stomachi eleuatio, 3.	163 a Sudorum papulæ, 1.	207 a
Spuma in apoplecticis num sit vera lethalis, nec ne, 1.	409 a	Stomachi oppilatio, 3.	173 b Suffocati aqua & ad vitam reuocati, 2.	165
Spuma oris in epilepticis vnde,	84 a	Stomachi dolor ex duritie, 3. 168 b. ex casu obortus, ibid. ex lapidis vel alterius ictu, ibid.	168 a Suffocatorum reuocatio, 2. 164. illorum curatio,	ibid.
Spuma cur in epilepticis non sit lethalis, & quod ea non sit vera spuma, 1.	409 a	Stomachi dolor a parte dorsi posteriore ad anteriorem transiens, 3.	Suffumigium ad fluorem album, 3.	662
Sputum sanguinis ex compressione, & venâ rupta in thorace, 3.	19 a	Stomachi doloris curatio, 3. 166 b. dolor ex vento frigido cur aqua gelida epota curetur, ibid. b. ex cathartico remedium, ib. a materia frigida curatio, ib. a. bile curatio, 3. 167 a. ex atra bile cur,	Suffusio, 1. 17. obs. 30	
Sputum sanguinis vehementius & violentum, cum copioso pure, 3.	31 b	Stomachi dolor ex pituitoso humore acensione, 3. 165 a. signa, causæ, ibi. b. prognostica, ibid. a. tebus calidis assumtis, 3.	Suffusione tres laborantes, 1. 11. obs. 31. an in vera suffusione sanguis mittendus, ib. figna, progn. curatio, ib. non vera ex ventriculi vitio, ibid. obs. 32. eius curatio, ibid. vera & confirmata, 1. 11. obs. 33	
Sputum sanguinis ex ore, & gingiuis profluens, 3.	34 b	Stomachi dolor ex pituitoso humore acensione, 3. 165 a. signa, causæ, ibi. b. prognostica, ibid. a. tebus calidis assumtis, 3.	Sugillatio, 2.	15 a
Sputum sanguinis per periodos recurrens, 3. 34 a		Stomachi innata vitia, 3. 180 a. morbi instrumentales,	Superfoetatio, non symptoma sed res naturalis, 3.	740
Sputum eruentum ex vasorum exesione, 3. 29 b. curatio, 3.	31 a	Stomachi asperitas seu nimia laxitas, 3. 180 a	Superfoetationum aliquot exempla, 3.	740
Sputum sanguinis ex catarrho obortum, potius insipidum, quam acre, 3.	26 b	Stomachi natura angustior, 3.	Supinitas stomachi, vide Nausea.	
Sputum quare in pleuritide præcipue considerandum, 3.	45 a	Strabismus.	Suppuratio seu vomica totius pulmonis, 3.	79 a
Sputi reiectionis ob rupturam curatio, 3. 23 b		Stranguria in ischuriam transiens, 3.	Suppuratio, 3. 74 a. quot modis dicatur, 3. 75 a. pars affecta, ibid b. proprie dicta quid sit, 3. 75 b. quis affectus præter naturam, ibid. eius proprie dictæ signa, 3. 75 b. ex catarrho prius orta. deinde in tabem lethalem conuersa, 3. 76. signa, prognostica	77 a
Sputo cruento laborantes curati, 3.	21 b	Stranguria ex recenti ceruicis orta, 3.	Suppuratio e sanguinis sputo, 3.	78 a
Sputi cruenti ex gingiuis curatio, 3. 35 a. ex faucibus & gurgulionibus, ibid. a capite, ibid.		Stranguria, 3.	Suppurationi proprie dictæ quæ competant, 3.	78 a
Staphyloma, 2.	33 a	Stranguria quid, 3.	Suppuratorum pulsus quales, 3.	76 a
Status morbi quomodo cognosci debet, 1. 27 b		Stranguria ex causâ frigida, 3.	Surdastris qui, 1. 12. obs. 12.	
Stercus per os eiectum, 3.	627	Stranguria laborantes ex variis causis quomodo & quibus remediis fuerint curati, 3.	Surditas, 1. 12. obs. 12. quid,	ibid.
Sterilitas quid, 3.	709	Stranguria cum insigni dolore, 3.	Surditas ex materia calida & biliosa, lib. 12. obs. 13 signa, præfagia, prognostica, ib.	
Sterilitatis causæ, 3. 709. curatio, 714. 718		Stranguriæ causæ, 3.	curatio, ibid. contracta ex crassis crudis quæ humoribus, 1. 12. obs. 14. ex frigidis, ibid	
Sterilitatis causarum signa, 3.	712	Struma pediculis resecta, 1.	Surditatis a sanie curatio, 1. 12. obseru. 15. ab ictu, a catarrho,	ibid.
Sterilitas in biliosa quomodo amouenda, 3. 715		Stultitia, 1.	ibid. b. ad Surditatem vetustissimam quæ valent, 1. 12. obs. 15	
Sterilitatis accidentia varia, & eorundem curatio, 3.	717	Stultitiæ signa, prognostica, curatio, 1.	Suspiriosus, 3.	10 a
Sterilitatis occasio a forma inepta mulieris, 3.	710	Stupefacientia suspecta, 1. 271 a. ex stupefacientibus mors subsecuta, ibid. quæ stupefaciant,	Sycosis, 3.	426 b
ad Sterilitatem variæ opiata, 3.	716	Stupefacientibus vtrum vti liceat in doloribus capitis, 1.	Sycofes, 3.	433 b
Sternutamentum pro numine quondam habebatur, 1.	487 b	Stupida membra, 1.	Synanches cum erysipelate phlegmonoso in facie, 2.	157
Sternutamenta intempestiua, 1.	472 b	Stupor pedium, 1.	Synanches a causâ frigida & pituitoso sanguine, 2. 156. eius curatio ex causâ frigida,	ibid.
Sternutamentum quæ compeſcant, 1. 234 b		Stupor quando fit vitio nerui, 1.	Synapit locus aptus ad applicanda remedia aduersus dolorem capitis, 1. 259. ibid.	
Sternutamentum quæ mouent, 1.	487 a	Stupor diminuta paralyſis, 1.	in occipite non apponenda,	ibid.
Sternutamenta in tinnitu aurium conferunt, 2.	72 b	Stuporis causæ, 1. 438 a. signa, prognostica, ibid.	Syncope, 1.	154 b
Sternutamenta, quibus vtilia, & quibus inutilia, 1.	276 a	Stychni veri raro huc adferuntur, 3.	Syncope, 1. 209 b. qualis sit affectus, & quid, ibid.	
Sternutatio quid, 1. 487 b. ad quæ affectum refertur, 1.	486 b	Subeth Sahara, 1.	Syncope stomachica,	ibid.
Sternutatio admodum molesta, curata, 1. 486 a		Succis vitiosis laborantibus communæ præceptum, 3.	Syncope ex acri & tenui humore ventriculi vellicante, 1.	210 a
Sternutatio in febribus, 1.	234 a	Succorum dignoscendorum nota, 1.	227 a Syncope cardiaca, 1.	211 a
Sternutationis indicia bona,	ibid.	Sudatorium Tritule, 3.	Syncope in hectica quomodo sananda, 1.	
Sternutationis altera causâ, 1.	234 b	Sudor vnde, 1.	Syncope ex nimio tudore, 3.	114 a
in Sternutatione cur spiritus strepit, 1.	234 a	Sudor symptomaticus in febre vires aſſertens, 1.	Syncope ex febre acuta lethali, 1.	209 a
Sternutationis modus, 1.	487 b	Sudor & febribus & multis morbis communis, 1. 227 a. eius materia, ibid. naturalis, ibid. symptomaticus, ibid. quid, ib. causæ ib. qui optimus in febribus, ib. pessimus, ibid. cardiacus,	Syncope ex collectione humorum crudorum pituitosorum in stomacho, 1.	211 a
Sternutationis duæ sunt causæ, 1.	234 a	Sudor criticus, 1. 203 a. prouocandus est, cardiacus inhibendus,	Syncope ab immenso mensium profluvio oborta, 3.	107 b
Stertor arguit fortem apoplexiam, non tamen omnes qui stertunt, in apoplexia moriuntur, 1.	408 a	Sudor an prouocandus in peste, 1.	Syncope cum fluxu & vomitu, 1.	212 a
Stipticitas ventris in febrib vnde veniat, 1.	233 b	Sudor Anglicus quando translatus in Noruegos Danos & alias regiones, 1.	Syncope ex carbonibus male olentibus, 1.	
Stipticitatis curatio ventris in febribus, 1.	233 b	Sudorem prouocantia, 1.		
Stoliditas, 1.	354 b	Sudorem prouocantia, 1.		
Stomachus vide Ventriculus.		Quotidiana internitens ex paruita insipida, 1.		
Stomachus quibus casibus intrus vulnertur, 3.	169 a	Sudorem & vrinam mouentia, 1.		
Stomachi resolutio, 3.	184 b	Sudores alias cohibendi, alias excitandi in febribus, 1.		
Stomachi dolor, 3. 162 a. differentiæ, ibid. affectus præter naturam, quis affectus,				

I N D E X.

in Syncope, qui cibi admittendi, 1.	211 b	T.	Tertiana intermittens notha, proxime	
Syncope ex vtero orta, 3.	117 a	Tabes a febre & diureticis, 3. 558. ex femi-	ad puram accedens, vndecimo circuitu	
Synopes causæ variæ, 3.	108 b	nis profluio, 3.	terminata, 1.	76 b
Synopi quomodo succurrendam, 3.	57 b	Tabes ac marasmus vera, 1. 122. a. cur dica-	Tertiana continua cum variis accidentibus	
a Syncope releuato ægro quid faciendum, 3.	115 b	tar hectica senectutis: ibid. b. causæ, signa	14. die curata, 1.	47
Synopes ex suffocatione caloris curatio, 3.	116 a	ibid. curatio, 1.	Tertiana continua nono die interficiens, 1.	50 b
Syncope ab vtero orta, ventriculo etiam pa-	106 a	Tabes, vide vlcus pulmonis, & pulmonis	Tertiana continua grauissima ex venæ se-	
tiente, 3.	106 a	vlcus.	ctione curatur in prægnante, 1.	49 b
Λειποθυμία, 3.	106 b	Tabes vlcerosæ dicta dispositio pulmonis bi-	Terra cimolia ad testes incensos, 3.	599
Λειποφυξία,	ib.	furiam dici potest, 3. 23. b. pars affecta, quis	Tertianæ continuæ signa demonstratiua, 1.	44 a
Syncope quid significet, 3. 107. a quibus a li-	107 a	affectus præter naturam, 3. 84. a. causæ	Tertianæ febris puræ causæ, 1.	65 b
pothyimia & Λειποφυξία differat, 3. 107. a.	ib.	procatartica, ib. præcedentes, ib. conti-	Tertianæ simpliciter etiam non exquisitæ, 1.	74 a
quid sit, ib. pars affecta.	ib.	nantes.	Extensio simpliciter, sufficienter,	ibid.
Syncope ex nimio sanguinis fluxu e naribus	110 a	Tabes tres species, 1.	Tertianæ nothæ ex bile & pituita signa, 1. 75	
& de alia post medicamentum purgans	110 a	Tabes tres species, 3.	b. Signa ex bile cum sanguine, 1. 76 a. cum	
oborta, 3.	110 a	Tobis signa lethalia, 3. 89. ad tabem qui pro-	melancholia naturali & atra, ibid. præsa-	ibid.
Sepeliendi qui non sint statim, 3.	112 a	ni sint,	gia,	ibid.
Synopes a dolore curatio, 3. 113. a. ex fame,	ibid. b	Tabi torridæ conuenientia, 1. 121. b. veræ ac	Tertianas febres expellentia medicamenta	
ib. ex vacuatione.	ibid. b	marasmo, quæ conueniant.	vi quadam occulta, 1.	74 a
a Synope difficili releuati & curati, 3.	114 b	Tabidorum cum exsiccantibus curatio, 3.	Tertianæ intermittens legitimæ signa, 1.	66 b
quomodo excitandi, 3.	115 a	92. a. 3. 93 b	Tertianæ duæ & duplex tertiana quid diffe-	ibid.
Symptomata quæ in pleuritide oborire so-	56 b	Tægæis seu oculi perturbatio, 2.	rant,	ibid.
lent, 3.	56 b	Taraxis seu perturbatio oculorum, quomodo	Tertiana duplex cum vomitu bilis præling.	
Symptomata febrium non sunt postponen-	23 b	do curetur, 2.	1. 127 a. curatio, 1.	128 a
da, 1.	23 b	Temperamenta partium corporis varia, 1.	Tertiana legitimæ seu puræ signa, 1. 66 b. ex	
Synochus putridus, 1.	10 a	Tendo membranofus, 3.	tingens species, ibid. a. pullu 1. 67 a. ex calo-	
Synochus non putris, in synochura putrem	10 a	Tenesmus ex colico dolore prius obortus:	ris qualitate, ibid. a. sudore, ab vrina. ex	
conuerfa, & in anginam periculofam mu-	12 a	tandem cum vlcere intestini recti, 3. 421 a	tempore accessionis, ex cœli constitutio-	
tata, 1.	12 a	tenesmi curatio ab vlcere, 3. 422 a. ab in-	ne, a symptomatibus. ibid. ex pullu qui	
Synocha, 1.	10 a	flammatione.	reperitur tempore primæ intercessionis,	
Synochus quid, 1.	ib.	Tenesmus vnde nomen sumferit, 3.	1.	67 b
Synochus caufonides, 1.	149 a	416 a	Tertianæ continuæ signa prognostica, 1. 45.	
Synochus non putris, a barbaris synocha in-	11 a	ib. Tenesmus, ex ventris fluxu bilioso retento	a. curatio,	ibid.
flata dicta, 1.	11 a	obortus, 3. 416 b. eius signa, 3.	Tertianæ nothæ signa ex bile citrina, 1.	
Synochus putrida & tertiana continua, quid	44 a	Tenesmus ex stercore indurato, obortus, 3.	78 b. præfatio, curatio, vomitus,	
differant, 1.	44 a	419 b. eius curatio, 3.	ibid.	
Synochus simplex sine putredine, 1. 10 b. ex	10 b	Tenesmus ex frigore contracto, 3. 418 a. ex	Tertianæ plurimum extensæ signa, 1.	
bile sine putredine, 1.	10 b	pituita viscida, ib. eius signa,	74 b	
Synochus non putrida, in qua metuserat,	13 b	Tentigo mentulæ, 3.	Testes seu Testiculi, quid, vide præfatio	
quod in putridam mutaretur, 1.	13 b	Tertiana intermittens exquisita mutata in	ad Lectorem, molesti abscessu pene, 3.	
Synochus putris lethalis in pleuritidem,	17 b	semitertianam, 1.	308. denudati noua carne reuerti, ibid.	
deinde in pulmoniam conuerfa, 1.	17 b	Tertiana continua in viro nobili, 1.	eorum morbi, 3. 593. inflatio, 3. 560. 583.	
17 b	17 b	45 b	593. inflammatio, 595. 596. apostema &	
Synochos continens, 1.	16 a	Tertiana satis exquisita quinto paroxismo	eius signa. causæ, ac curatio, 3. 596. 97. a-	
Synochos putris,	ibid.	terminans, 1.	postema frigidum, ibid. ventolum,	
Synochos,	ibid.	Tertiana intermittens notha, & subinde re-	597. testium dolor vnde 593. ardores, frig-	
Synochi putris signa prognostica, 1.	19 a	currens, & tandem in magis puram deli-	gus, 593. durities, 592. 594. 596. ea dif-	
Synochi putris prognostica signa, 1.	17 a	nens, 1.	ficile tollitur, 596. quibus potissimum	
Synochæ febres modo cum variolis, modo	198 b	Tertiana continua maligna, 1.	contingat, & quomodo tollatur, 594.	
cum morbillis, 1.	198 b	Tertiana intermittens legitima in monacho	596. testis induratus post inflammatio-	
Syringatione in pene, quando vtendum, 3.	567	admodum senex, 1.	nem male curatam, 596. tumores testium	
567	567	67 b	594. testes percussi, 593. testiculorum ac	
Syrupus ad sanguinis e pene fluxum, 3.	566	Tertiana duplex, 1. 126 b. quibus modis dif-	feroti vlcus, 598. 599 in testiculis caro ena-	
566	566	ferat a quotidiana.	ta, 599. testiculi sinistri tumor cum duri-	
Syrupus ad vrinæ acrimoniam, 3.	576	Tertiana producta in semiterrianam peri-	tie, 593. testis induratus post inflamma-	
Syrupus magistralis ad peritonæi rupturam	3. 608. restinguens effluuium seminis, 3.	culosa transmutata cum conuulsione &	tionem male curatam, 596. in inguem la-	
3. 608. restinguens effluuium seminis, 3.	576. sitim sedans, 3.	syncope, 1.	psum pro hernia habitus 603. testiculi au-	
576. sitim sedans, 3.	64 a	65 b	gmentum & diminutio, 597. castratio	
Syrupi, 1.	98 b	Tertiana intermittens non exacte pura, ta-	quando necessaria 597. 605. testiculo vno	
Syrupi, 1.	34 a	men legitima, septem circuitibus termi-	castrati vix in senectute generant, 606. te-	
Syrupi, 1.	96 a	nans, 1.	sticuli tertii historia, 604. inter testiculos	
Syrupi, 1.	48 a	74 a	& anum apostema, 3. 560. id an recte cau-	
Syrupi digerentes & alterantes, 1.	128 a	Tertiana duplex cum salua ex ore ob caus-	terio ignito apertura,	ibid.
Syrupi, 1.	128 a	sam calidam elabens, 1. 128 b. triplex, 1.	Testium dolor & inflatio, 1.	215 a
Syrupi alterantes, infrigidantes, humectan-	40 b	129 a	Tetanus seu tensio neruorum ceruicis, 1. 453	
tes & aquæ stillatitiæ, 1.	311 a	Tertiana intermittens, septimo circuitu	b. tetani curatio, 1.	454 a
Syrupus de betonica, 1.	311 a	finiens, 1. 68 b. nono circuitu desinens,	Thapsi barbari succus cū oleo sem. lini mi-	
Syrupi alterantes & concoquentes, 1.	1. 69 b	1. 69 b	xtus sanat verrucas, 3.	707
57 b	1. 69 b	Tertiana continua, 1.	Theodorus Teylingius herniosus, 3.	610
Syrupus contra ebrietatem, 1.	284 b	284 b	Thermæ quam vim habeant, 3.	615
Syrupus sceleretrbicus, 3.	298 b	298 b	Theognidem amabat adolescens, 1.	355 b
Syrupi ad catarrhum frigidum, 1.	472 a	472 a		

16

Yes

I N D E X

Venæ sectio ad reuulsionem dentium quo- modo instituenda, 3.	101 a	Ventris stipticitas quibus in hectica corri- gatur, 1.	124 b	Vermes cum febre pestilenti, 1. 154. a. b. & seq.	154 a
Venæ sectio vtrum in dysenteria conueniat, 3.	408 a	Ventre profluente, alia supersedendum va- cuatione, 1.	232 a	Vermes per umbilicum excreti, 1.	232 b
Venæ sectio vtrum prægnantib. conueniat, 1.	49 a	Venus seu coitus quibus proffit, 3. 572. mo- derata utilis, 592. curat a serpente iclos, in ibid. abstinentia a venere foeminis ma- gis quam viris obest, 593. nimia venus noxia, 591. 592. præputii reductionem impediens, 569. cerebrum minuit, 591. dolorem penis generat, 565. inflamma- tionem, 564. ob eam mortui adolescens, senex, 591. foeminas in rabiem trahit ve- neris intemperantia, atque vnde ea oria- tur, 592. nimis ea vrentes, quibus ab A- ristotele comparentur, ibid. cur homo & equus ea facile dissoluantur, 587. venus secessum quærit, 589. non amat balnea, 588. quibus maturis conueniat, quibus se- cus, 587. 588. quando foeminis, quando viris gravior, 589. contraria ei verecundia, 586. qui eam oderint, 586. odium eius a corde, 587. venerem irritantia, 589. 590. 591.	357 b	Vermium varia genera, 3.	348 b
Venæ sectio in febre continua, biliosa, acuta cum aphthis.	128 a	Vererrum album epilepsiæ aduersatur, 1.	395 a	Vermium signa prognostica, 3.	354 a
Venæ sectio non semper sit causa euacua- tionis, sed reuulsionis, 1.	33 b	Vererrum album male in substantia assum- tum, 1.	97 a	Vermium signa prælag. demonstrat com- municantia, specierum, 3.	353 a
Venæ sectionem quando præcedere debeat euacuatio, & quando subsequi, 1. 48. b.	153 a	Verbena testibus inflammatis utilis, 3.	595	Vermium signa obscura, 3.	351 a b
Venæ sectio, 1.	128 a	Verecundia veneri contraria, 3.	604	Vermibus laborans puer cum variis sympto- matis, 3.	355 a
Venæ sectio in hecticis febribus perperam adhibita, 1.	116 b	Vermis longitudine 9. pedum, 3. 349 a. ver- mum genera quinque, ibid. longi albi e ventriculo eiectioni, ib. quingenti a sene re- iecti, ib. trecenti, ib. crucis similes reiecti, ib. in auribus, 349 b. e nare proiecti, ibid. ex pulmone & vesica, ibid.	370 a	Vermibus laborans adolescens 18. annorum lecto decumbens conualuit, 3.	352 a
Venæ sectio in morbo Epidemio an adhi- benda, 1.	153 a	Vermis supra duram matrem instar curcu- lionis, cranio perforato & aperto iuen- tus, 1.	255 a	Vermiculi in collo vteri reperti & expulsi, 3.	362 a
Venæ sectio an in syncho admittenda 1. 20 a	200 a	Vermis procreatus in cerebro, Vermis rubeus post mortem in cerebro in- uentus	ibid.	Vertigo a plenitudine & sanguine quomo- do curetur, 1.	374 a
Venæ sectio vtrum in variolis & morbillis admittenda, 1.	200 a	Vermes ab aure expulsi, 2.	69 a	Vertigo si in crisi eueniat quid agendum, 1. 376 b	376 b
Venæ sectio in peste male adhibita lethalis, 1.	180 a	Vermes terrestres ad herniam, 3.	604	Vertigo ex bile, 1.	375 b
Venæ sectio non est facienda in syncho pe- stilenti, ad syncopen, 1.	20 b	Vermes largos habens adolescens, 3. 361 a eius in Vertigine num sanguis mittendus sit, 1. ibid.	373 b	Vertigo per essentiam ex materia biliosa, per consensum ex bile, 1.	376 a
a Venæ sectione cur non dormiendum, 1. 50 a	13 a	Vermes capillos minuantes, 1.	242 a	Vertigo a causa primitiua quomodo tol- lenda, 1.	375 b
Venæ sectionem qui facile ferant, qui minus 1.	13 a	Vermem proiciens mulier, 3.	241 a	Vertigo, 1	370 a
Venæ ingulares quomodo tundantur, 1.	413 a	Vermes multos puer 8. annorum deliciens, ad Vermes occidendos potiones, 3.	348 a	Vertigo & scotoma vnum esse volunt, 1.	370 a
Veneficiorum vis incredibilis, 2.	168	Vermes in iliaco & colico dolore, 3.	355 b	Vertigo per consensum ventriculi, 1.	377.
Veneri assumti historia, 3.	170 a	Vermes infinitos rusticus per inferiora de- iecit, 3.	357 a	Vertigo cum cerebri imbecillitate, 1.	372 b
Veneri pro sui natura varias corporis par- tes afficit, 3.	667	Vermes educuntia, 3. 858 a. prohibetia ascen- sum ad superiora, ibid. quando comperat vomitus, ibid. attractio quibus perficia- tur.	431 b	Vertigo tenebrosa per essentiam cerebro solo affecto, 1.	375 a
Ventriculus, vide Stomachus.		Vermes enecant amara eosque ac frerum e- iciunt, 3.	360 a	Vertigo differt ab epilepsia, 1.	371 a
Ventriculi imbecillitas ex laxitate & molli- tie, in quo pituita postea euacuata fuit, 3. 135 b	180 a	Vermes enecati quomodo excernendi, 3.	ibid.	Vertigo ex humore frigido, viscido, & fla- tulentio, 1.	376 b
Ventriculi cruditas, 3.	180 a	Vermes cum alui profluio, Vermes enare proiecti, 3.	357 a	Vertigines cur fiant in iudicationibus, 1.	371 b
Ventriculi læsi prognostica & signa, 3. 169 b curatio, ibid.	169 b	Vermes in materia communicant, 3.	350 a	Vertiginem curandi indicationes a quibus sumantur, 1.	373 b
Ventriculi phlegmon, vide Phlegmon.		Vermes conueniunt in efficiente eorum causa, 3.	ibid.	Vertiginis causæ, 1. 371 b. signa, 1. 372 a. pro- gnostica, ibid.	372 a
Ventriculi vlcus, 3.	178 a	Vermes in peste, 1.	190 b	Vertigines cur fiant in iudicationibus, 1.	371 b
Ventriculi dolor ex obstructione hepatis, & vteri inflatione, 3. 171 a. dolor a nimio sen- su quomodo curetur, 3.	172 a	Vermes cum febre pestilenti, 1. 154. a. b. & seq.	154 a	Vertiginem curandi indicationes a quibus sumantur, 1.	373 b
Ventriculi phlegmon seu inflammatio, 3.	172 a	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertiginis causæ, 1. 371 b. signa, 1. 372 a. pro- gnostica, ibid.	372 a
172 a. partis affecta dignono, 3. 173 a quis affectus præternaturam, ib. inflam- mationis signa, causæ, ibid. vnde tu- mor, tensio, dolor ac calor, vnde febris, 3. 173 b	173 a	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertigines cur fiant in iudicationibus, 1.	371 b
Ventriculi & pylori dolor, 3. 167 b	167 b	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertiginem curandi indicationes a quibus sumantur, 1.	373 b
Ventriculi dolor intolerabilis cum hypo- chondriorum suspensione, 3.	163 b	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertiginis causæ, 1. 371 b. signa, 1. 372 a. pro- gnostica, ibid.	372 a
Ventriculi inflatio cum ingenti dolore, 3. 186 b	186 b	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertigines cur fiant in iudicationibus, 1.	371 b
Ventriculi phlegmon seu inflammatio le- thalis, 3. 175 a. signa prognostica, ib.	175 a	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertiginem curandi indicationes a quibus sumantur, 1.	373 b
Ventriculi imbecillitas ex intemperie frigi- da & humida, cui postea etiam materia pituitosa accessit, 3.	133 b	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertiginis causæ, 1. 371 b. signa, 1. 372 a. pro- gnostica, ibid.	372 a
Ventriculi dolor ab assumpto veneno, 3. 170 a	170 a	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertigines cur fiant in iudicationibus, 1.	371 b
Ventriculi inflatio cum dolore, ex succis pi- tuitosis, 3.	187 a	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertiginem curandi indicationes a quibus sumantur, 1.	373 b
Ventriculi roboratio, 1.	79 a	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertiginis causæ, 1. 371 b. signa, 1. 372 a. pro- gnostica, ibid.	372 a
Ventriculi dolor ex febre acuta, 1.	207 a	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertigines cur fiant in iudicationibus, 1.	371 b
Ventriculi roboratio, 1.	84 a	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertiginem curandi indicationes a quibus sumantur, 1.	373 b
Ventris apertio periculosa 3.	612	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertiginis causæ, 1. 371 b. signa, 1. 372 a. pro- gnostica, ibid.	372 a
Ventris os resoluitur interdum in gonorrhæa, 3.	579	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertigines cur fiant in iudicationibus, 1.	371 b
Ventris stipticitas & de ea historia mirabilis, Vermes, 1.	151 b	Vermes per os reiecti, 1.	209 b	Vertiginem curandi indicationes a quibus sumantur, 1.	373 b

I N D E X.

Vestalis monachæ historia, 3.	576	321 b	Virium deficientium in sectione venæ & li-	gia, i.	225 b
Vestes pestiferæ, i.	180 b		pothymia futura prælagia, i.	Vnguentum, r.	64 a
Veternus, i. 325. a b. quæ pars in eo afficia-			214 a	Vnguentum cardiacum, r.	177
tur, ib. vtrum fiat per consensum, r. 325. a			587	Vnguenti Alabastrini descriptiones, i.	299.
b. quæ imminentem lethargum notent,				& seq.	
ib. affectionem præsentem indicantia, r.			421 a	Vnguentum Ægyptiacum, 3. 564.	Aposto-
325 b.			371 a	lorum, ibid. ad pruritum testium, 598 &	
Vetula per septem annos nihil audiens, r. 12.			395 a	seqq. ad priapismum, 60. ad herniam, 3.	
obl. 13.				600 ad excitandum coitum, 3. 589. ad vl-	
Vetula sexagenaria febricitans, & ex ilei do-				cus penis, 590 567. ad vlcus scroti, 3. 599.	
lore in syncopen incidens, quæ per os 58.				ad phymosin, 3. 569. impediens ne vlcera	
diebus excrementa reiecit, & quatuor ver-				serpant, 3. 599. incarnans, ib. rosaceum ib.	
mes, r.	209 b			veneris, 3. 614 pro calore renum, 3.	559
Vertiginosus senex, r.	371 b			Vnguis, i.	204 b
Viatoris seu statonis historia, 3.	571			Vnguis, 2. 14 b. Vngula, ib.	
Vibices, i.	191 b			Vngula, 2.	23 a
Viduis cur familiaris vteri strangulatio, 3.				Vngula, i.	204 b
664				Vngula signa, causæ, prognostica, 2.	14 b.
Vigilia quid, i.	222 b			curat. p. seq. a	
Vigilia quomodo fiat,	ibid.			Vnicornu ferum, i.	81 a
Vigilia modum excedens, r.	360 a			Volatilia circa terram assueta volare, ad al-	
Vigilia secundum naturam, r. 360 a				tissima montium cacumina si volent, pe-	
naturam,	ibid.			stem denuntiant, r.	166 a
Vigilia finis, i.	222 b			ex voluulo quidam cum clysteres per os re-	
Vigilia causæ,	ibid.			iecit, curatus, 3.	344 a
Vigilia ferocia nonnunquam anceps auxi-				Vomica pulmonis, 3.	79 b
lium requirit, i.	361 a			Vomiticia, i.	70 a
ad Vigiliæ quæ profint, r. 223 b. & quæ ca-				Vomitium ad reuulsionem in priapismo,	
uenda & notanda,	ib.			3.	57 a
Vigiliatum maxima instantia,	ib. a			Vomitum, i.	64 a
Vigiliatum vincula caute adhibenda, ibid. b				Vomitum, i.	84 a
poriones,	ib.			Vomitum nunquid conueniat nec ne, in do-	
caput Viua maxime petentia, i.	283 a			lore cap a pituita, r.	337 b
a Vino qui facile superantur,	ibid.			Vomitum ad nocturnam pollutionem vtiles,	
Vinum vtrum phreneticis dandum, i.				3. 584 item ad vitia penis, 3.	587
321 a				Vomitum biliosus, vomitus pituitæ, 3.	136 b
Vinum non recte adhiberi in suffocatione				Vomitum in febribus quando constringen-	
vteri, 3.	663			das, r.	221 b
Vinum vtrum ascendere facit, 3.	677			Vomitum vtrum hic conueniat, i.	273 a
Vinum an in morbo epidemio exhibendum,				Vomitum sanguinis, 3	55 a
r.	153 b			Vomitum scarabei, bruchi, lapidis, 3.	161 b
Vinum vtrum heceticis conueniat, r.	117 a			Vomitum sanguinis ab hepate, ex stomacho,	
Vinum quando in syncope competat, quan-				liene, 3.	37 a b
do non, r.	212 b			Vomitum immodicus, 3. 157 a. in quibus non	
Vinum vtrum competat in morbillis & va-				fit inhibendus, ib. a. qui vomitus compe-	
riolis i.	199			scendi, ibid. a. vomitus cibalis quomodo	
Vinum an exhibendum in febre pestilenti, r.				curetur, 3. 157 b. a percussione aut vulne-	
181 a				re, ib. a veneno, a toto vel alia parte, per	
Vinum pleuriticis mortem infert,	ib.			essentiam,	ib.
Vinum vtrum conueniat dolori capitis ex				Vomitum biliosus 3. 157 b. quomodo curetur	
sanguinis plenitudine, vel ex materia san-				3. 158 a. pituitosus quomodo curetur, ibid.	
guinea, i.	265 b			de his qui cibum frequenter euomunt,	
Vinum pandiculationibus & oscitationibus				ib. b	
cur conueniat, i.	486 a			Vomitum melancholicus, 3.	158 a
Vinum in epilepsia non nisi stomachi causâ				Vomitum tempore quid obseruandum, 3.	
admittitur, i.	390 b			156 b.	
Vinum αλυσόμενον, tenue, dilutū, aquosum,				Vomitum criticus non est retinendus, nisi vir-	
modiceq; astringens, r.	321 b			tutem deiciat,	ibid. a
Vini abundans potus ad somnum potius,				Vomitum & nausea, 3.	153 b
quam venerem prouocat, 3.	615			Vomitum symptomaticus, 3. 156 a. naturalis,	
Vinum Rhenanum minuendo foetori, 3.				ib. quierus, ib. violentus, ib. artificialis, &	
568				qualia in ipso obseruanda,	ib.
Vini in peste pro mortuis sepulti, r.	186 b			Vomitum pituitosus in altera muliere cura-	
Vini odium generant oua noctuq; i.	248 b			tus, 3.	154 a
Virga, vide Penis.				Vomitum & nausea signa diligenter sunt cō-	
Virgæ vitia quæ conceptui aduersentur, &				sideranda, 3.	154 a
quomodo arte subueniendum, 3.	717			Vomitum in quartana legitima quando in-	
Virga virilis secundum præcisionem vmbi-				stinguendus, r.	97 a
lici maior erit aut minor, 3.	768			Vomitum & fluxus cum syncope, i.	212 a
Virginis exemplum, quæ acum deuorauit,				Vomitum si periodice moueatur, quomodo	
3.	486 b			curetur, 3. 159 b. excitatus a pharmaco, ib.	
Virgines aliquando lac in mammis habere				b. a ventriculi rancore, ib. b. ex oppilatio-	
posse, 3.	761			ne piloci.	ibid.
Viri cur barbam habent, r.	248 b			Vomitum sanguinis, 3. 160 a. causæ, ibid. a si-	
Virilitas carmine ablata, 3.	589			gna, ib. periculum ex sanguinis vomitu,	
Vires quomodo recreandæ, r.	132 b			curatio,	ib. b
Vinibus collapsis omnia curatio inutilis, i.				Vomitum atræ bilis vna cum vermibus &	
				leara-	

I N D E X

- V**erabiles, 3.
- V**omitus quibus utilis est, 3.
- V**omitus conuenit in omni paralyfi, exce-
pra ea, quae in lingua, 1.
- V**omitus ob ventriculum non potentem ci-
bum continet, 3.
- V**omitum praefagientia, 1.
- quouis mente semel Vomendum, 1.
- ante Vomitum quae obseruanda, 3.
- V**ox intercepta, l. 15. obs. 32.
- V**ox rauca,
- V**ocis laesa causa,
- V**ocis sermonisque instrumenta,
- V**redines femorum & alarum, 3.
- V**reteres obstruunt, 3.
- V**rina cruenta, 3. 446 b. causa, signa, 3.
- V**rina cyanei coloris, 3.
- V**rina per quinque dies suppressa cum in-
genti circa uellicam dolore, 3. 526 a. reten-
ta a crassis viscidisque humoribus quomo-
do curetur, 3. 5. 7 a. a pure, ex calloso vl-
cere in fistula urinaria, ex inflammatione
curatio,
- V**rina per 10 dies retenta,
- V**rina mirabilis Comitissa Nola, 3.
- V**rina per fistulam stillans, 3.
- V**rina crassa, sabulosa post mictum sangui-
nis, 3.
- V**rina ex umbilico profluens, 3.
- V**rina & sudor an in peste prouocanda,
177 a
- V**rina alba, tenuis, clara in delirantibus, in
febris continuis, acutis, vel ardentibus
lethalis, 1.
- V**rina in pleuritide,
- V**rina aquola in febre & phrenitide pessima,
1.
- V**rina multam subsidentiam habens, 1.
- V**rinae ardoris ex humore vteri citratib, 3.
- 554 b
- V**rinae ardor ex esu ranarum, 3.
- V**rinae ardor ex cantharidibus vel aliis vri-
nam valde prouocantibus quomodo cu-
retur, 3.
- V**rinae ardor vna cum dysuria, vna salsa
acri quasi purulenta & mucillaginosa, 3.
- 556 a
- V**rinae ardoris & ulceris curatio, 3.
- V**rinae difficultas cum dolore in sene caleu-
loso, 3.
- V**rinae difficultas cum dolore circa pubem,
3.
- V**rinae difficultas ex causa frigida, 3.
- V**rinae Indicia in febribus acutis, 1.
- V**rinae ardor ex sola caliditate acti vrinæ ob-
bilem cum ipsa permixtam, 3.
- V**rinae ardoris ob puris e renibus aut aliun-
de descendens acrimoniā curatio, 3.
- 557 b
- V**rinae ardor, 3. 548 b. quid, 551 b. causa, ib.
ex inflammatione glandularum siue pa-
rastatarum, 3. 551 b. causa ex Neotericis,
3. 552 a. ardor vrinæ cum variis accidenti-
bus, 3.
- V**rinae suppressae signa, 3. 522 b. causa, 523 b
- V**rinae suppressio, vide Ischuria.
- V**rinae stillicidium, 3.
- V**rinae sanguinea ex Venere curatio, 3.
- V**rinae stillicidium quid, 3.
- 181 a Vrinae difficultas, 3. 560. suppressio, 3. 560. ad 3.
- 156 b id malum glans,
- Vrinae profluuium praecedentia, 1.
- 428 a Vrinae pinguedo in hectica, 1.
- Vrinae stillicidii curatio, si ex acrimonia eius
155 b dem vrinæ proueniat, 3.
- 42 b Vrinae nigrae, tenues, paucae, exitum minan-
tur in febre ardente, 1.
- 284 a Vrinae in peste, 1.
- 156 b Vrinae in peste, 1.
- Vrinam cientia, quibus conueniant, 3.
- ibid. 409 b
- 1b. Vrinam cientium periculum, 3.
- ibid. Vrinam cientia quo tempore exhibenda sunt
436 a 3.
- 522 a Vrinam nobilis puella 15. ann. ab ineunte
448 a aetate continere non potuit, 3.
- 456 a Vrinam continere quidam non potuit, 3. in
532 a
- Vrinam cientia, 1.
- Vtrum cerebrum apostema incurrat 1. 312 b
- Vterus quomodo & quot modis imperfora-
tus, 3.
- ibid. Vteri suffocatio, 1.
- ibid. b Vterus facile Scirrhum incurrit, 3.
- 630 Vteri stillicidium, 3.
558. 559. 561 Vterus quare mater dicatur & hystera, 3.
- 625
- 560 Vterus cur tetror odores refugiat, 3.
- 522 b Vterus an a suo loco dimoueat, 3.
1. Vterus in coitu deorsum mouetur, 3.
- Vterus inflammationibus obnoxius, 3.
- Vteri suffocatio ex iracundia, 3.
- Vteri praefocationis a mensibus retentis cu-
ratio, 3.
- 45 a Vteri suffocatio a retentione mēstruorum
ibid. b minor, quam quae a semine retento, 3.
- 317 b 671
- 34 a Vteri praefocatio quomodo totum corpus
iniciat, a similitudine ictus phalangii ac
scorpionis, 3.
- 555 a Vteri praefocatione an vellicandi pill. vni-
3.
- pro Vteri suffocatione secretum, 3.
- ib. in Vteri suffocatione qualis purgatio, 3.
- Vteri praefocationi cur mulieres autumno
magis obnoxiae sunt, 3.
- in Vteri praefocatione cur quaedam non lo-
quantur, 3.
- Vteri praefocationem raro patiuntur, quae
dulcia ferre possunt, 3.
- Vteri apostematis secundum varias causas
signa, 3.
- 514 a Vteri cancri varia exempla, 3.
- 31 a Vteri cancer vnde, 3. 697. eius curatio, 3.
- Vteri condylomata quae & quomodo cu-
randa, 3.
- Vteri dolor a spiritu concluso, 3.
- Vteri doloris causa variae & curatio, 3.
- Vteri excoriatio, 3.
- Vteri fistulas sanari non posse, 3.
- Vteri thymi quomodo curentur, 3.
- Vteri tumores quomodo a Scirrho distin-
guantur, 3.
- 552 b Vteri venarum obstructionis curatio, 3.
- 523 b Vteri ulcerati signa distinctina, 3.
- Vteri procidentia, 3.
- 504 b Vteri procidentiae causa, 3.
- 452 a Vteri procidentia prognostica, 3.
- 506 a Vteri prolapsus ouo Struthiocameli similis,
771.
- 561 Vteri praecipitationis varia exempla, 3.
- 42 b ad Vteri procidentiam topica varia, 3.
- 112 b ad Vteri procidentiam ceratum Bayri, 3.
- 683
- 16 a Vteri rhagades, 3.
- Vteri scirrhi causa, 3.
- 37 a Vteri oedema quid, 3.
- 172 a Vterios aperiri in omni profluuiō, 3.
- Vterios post conceptum conuerti, 3.
- Vteri praefocatio, suffocatio, vel strangula-
tio, 3.
- 548 a Vteri praefocatio a quibus causis, 3.
- 490 a Vteri praefocationis varii affectus, 3.
- Vteri suffocationis differentiae ab aliis abse-
ctibus, 3.
- in Vteri suffocatione quae pars affecta, 3.
- 664
- 84 a Vteri praefocationem signa praefagientia, 3.
666. signa eiusdem demonstratiua, ibid.
- prognostica, 3.
- 708 Vteri praefocationem quae accidentia comi-
tantur & eorum causa, 3.
688. 695 Vteri praefocatio in pregnantē & in ipso par-
tu, 3.
- Vteri praefocatio ab aere vterum implente
post menstruum purgationem, 3.
- Vteri situs, 3.
- Vteri inflammationis variae causa, 3.
- Vteri inflammationis signa, 3.
- Vteri inflammatio & cancer quomodo dif-
ferant, 3.
- Vteri inflammatio quomodo differat a do-
lore partus, 3.
- Vteri inflammationis curatio, 3.
- in inflammatione oris Vteri an vena cubiti
secari debeat, 3.
- in Vteri morbis primo totius corporis ratio
habenda, 3.
- Vteri flantibus oppleti curatio, 3.
- Vtero quae immittenda in suffocatione, 3.
- Vtero inflammato cur dolor synciput potius
quam aliam partem capitis afficiat, 3.
- Vtero an vis olfaciendi, 3.
- Vterum suppressis mensibus, exsiccare, fal-
sum, 3.
- Vterinus furor, 3.
- Vna vtilissima dysentericis hepaticis, 3.
- 340 a
- 689 Vniiformis tuniculae procidentia, 2.
- 699 Vulua minus aperta, 3.
- 696 Vulua exulcerationis causa, 3. 701. curatio
3.
- 705 Vulua pruritus causa, 3.
- 684 ad Vulua pruritum topica, ibid.
- 686 Vulua non solum exulcerata sed fere corro-
sa ex lue Gallica curata, 2.
- 145 a X.
- 703 X.
- 707 Xerophthalmia, 1.
- Xerophthalmiae curatio, 2.
- Y.
- Y'δ'ε'ρ'μ'φ'α'λ'μ'ος. 3.
- Y'δ'ε'ρ'μ'α'λ'η, vide Hernia aquosa.
- Z.
- 681 Zorastrem eodem quo natus die risse, 3.
- 771.

F I N I S

